

DE

# VI MAGNESIAE USTAE ALVUM PURGANTE.



DISSERTATIO INAUGURALIS

QUAM

CONSENSU ET AUCTORITATE

GRATIOSI MEDICORUM ORDINIS

IN

UNIVERSITATE LITERARUM CÆSAREA

DORPATENSI

AD GRADUM

DOCTORIS MEDICINÆ

RITE ADIPISCENDUM

LOCO CONSUETO PUBLICE DEFENDET

AUTOR

*Arminius Guteke.*



---

DORPATI LIVONORUM,

TYPIS VIDUÆ I. C. SCHÜNMANNI ET C. MATTIESENI.

MDCCLIV.

МАТСУ МАСИИДАМ IV  
ЗЕРНАДИЧ МУКЛА

Imprimatur

haec dissertatio ea conditione, ut, simulac typis fuerit excusa,  
numerus exemplorum lege prescriptus tradatur collegio ad libros  
explorandos constituto.

Dorpati Livon. die 29. mens. Maij a. 1854.

Dr. **Bidder**,  
ord. med. h. t. Decanus.

MANIBUS

PATERIS ET PATRUM

SACRUM.



D 17852

**D**uvat me hac occasione oblata praecepto-  
ribus summe venerandis, quorum sub auspiciis in  
hac litterarum universitate artis medicae studia  
colere licuit, palam gratias quam plurimas per-  
solvere. Praecipue autem impellit me animus,  
ut praeceptor honoratissimo, viro doctissimo, pro-  
fessori **Buchheim**, qui et potestatem mihi fecit,  
in suo laboratorio has disquisitiones instituendi,  
et, quum equidem aegrotatione prohiberer, ipse  
in se necessaria in rem meam experimenta sus-  
cepit, strenui, quod mihi praestitit, auxilii grates  
quam maximas agam. Neque possum quin gra-  
to animo idem erga me meritum fratris minoris  
**Dr. Buchheim** commemorem, qui et ipse ami-  
cissime in experimentis meis partem capessivit.

---

Magnesia, quam omnium primus *Rademacher* ad alvum purgandam commendavit, tamen ad hanc diem illo respectu parum cognita atque raro in usum vocata fuit. Namque recentissima denum acetate magnesiae ad alvum laxandam efficacie plus dignitatis attribuere coeperunt. Praecipue id medicamentum in Francogallia forma lactis magnesiae in artis medicis usum receptum est, hac forma imprimis a viro clarissimo *Mialhe* summis laudibus elata. Hoc praeparatum est hydratum magnesiae cum saccharo et syrupo flor. Naphae. Sub fine m anni proximi superioris Dr. *Cless*, hanc magnesiae efficacitatem perscrutatus, observationes suas in opusculo, ita inscripto: „Die gebraonte Magnesia als Purgmittel“, publici juris fecit. Verumtamen investigationes, a viro docto institutae, ad vim alvi solvendae solam per se pertinent. Ad experimenta sua ille magnesia usta, magnesia carbonica et sulphurica usus est; in quorum praeparatorum vim atque effectum, quattuor hominibus iisdem medicamentorum dosibus porrectis, inquisivit. Inde secundum alvi dejectionum, quae remediorum illorum usu provocatae erant, numerum diversam eorum efficaciam laxantem definitivit. Quibus periculis co adductus est, ut a copia magnesiae, quae singulis praeparatis insit, majorem minoremve alvi solvendae vim dependere arbitratus magnesiam ustam

ceteris praeparatis efficacitate praestare contendat. Rationem autem modumque, quo vis magnesiae efficiatur, non perve-  
stigat, solummodo, sive effectus sale solubili formato natalur,  
sive aliter res sese habeat, sibi magnesiae ustae divisionem  
subtilissimam maximi momenti videri indicans.

Anno abhinc modus atque ratio, qua natri sulphurici  
vis alvum laxandi efficiatur, commentatione a Dr. *Wagner*  
conscripta diligentius exposita atque explicata est. Finis  
igitur meae dissertationi propositus is est, ut exquiratur,  
quatenus effectus alvi solvendae post magnesiac ustae usum  
observatus, in similibus, atque efficacia salis mirabilis Glauberi,  
conditionibus sit repositus. Natri sulphurici dosis ad  
alvum movendam valens in tractu intestinali tardissime re-  
sorbetur, et sal, parte tantum exigua in sanguinem trans-  
gressa, motu peristaltico intestinali accelerato, ulterius  
defertur atque substantiis, quas ibi reperit, commixtum, aliquo  
temporis spatio elapo, emititur. Eadem substantia et quae  
simili sunt effectu, si dosibus ad alvum purgandam non suffi-  
cientibus porrigitur, maxima ex parte in sanguinem trans-  
gressae, tum, quantitate adaucta, in urina apparent. Quod quum  
ita sit, maxime hoc agitur, ut demonstremus, num, magnesia  
usta in usum vocata, similiter magnesiae per urinam emissae  
quantitas aucta cernatur, atque, sale Glauberi adhibito, acidi  
sulphurici, quod inest, copia accrescat. Quum autem ad  
hanc diem perpaucae institutae sint inquisitiones, quibus  
magnesiae per urinam emissio, qualis statu normali appa-  
ret, observaretur, adeoque harum paucarum investigatio-  
num eventus parum inter se congruant, omnium primum  
mibi definiendum est, quantum magnesiac urina statu nor-  
malii contineat. Namque hac demum quantitate definita de-

adaucta magnesiae in urina copia iudicium fieri posse per  
se intelligitur. Qua in re, quam mihi, quemadmodum ana-  
lysium descriptio infra preferenda edocet, paululum tantum  
operae insundendum esset, semper etiam calcariae copiam  
definiendam sumsi.

Ratio autem, quam in perscrutationibus meis, auctore  
professore *Buchheim*, secutus sum, talis erat, ut, urina, quae  
a duobus hominibus inde ab hora matutina septima usque  
ad eandem diei sequentis horam emissar fuerat, collecta tota  
que quantitate pensata, tres portiones gramm. 200 vel  
paulo amplius defunderem. Quarum portionum duas ex-  
templo ad disquisitiones adhibitae sunt; quao si forte even-  
tum praeberent parum congruentem, tertia quoque ad ana-  
lysins vocata est, numerusque medius a summis maxime inter  
se similibus repetitus fuit. Quaevis earum, quas diximus,  
portionum aliquot acidi acetici guttulis acidula est reddit,.  
quo facto urinae, in balneo aquae calefactae, ammonium  
oxalicum, donec fluidi turbatio adaugebatur, additum fuit.  
Inde urina, tali modo tractata, quoad praecipitatum maxima  
ex parte descendisset, per aliquod tempus in balneo aquae  
mansit. Tum, horis 24 circumactis, postquam urina per  
filtrum transmissa est, calcaria oxalica, quae in filtro reman-  
serat, tam diu aqua destillata abluta est, quoad aqua de-  
fluens, aliquot solutionis calcariae sulphuricae guttulis ad-  
mixtis, jam non turbidaretur. Deinde magnesia, larga li-  
quoris ammonii caustici copia adjecta, praecipitata est, quo  
facto, demum horis duodecim amplius transactis percolatio  
est suscepta. Qua in re filtra ope aquae destillatae, cui  
liquor ammonii caustici admixtus erat, eluta indeque ex-  
siccata, quantum fieri potuit, a praecipitato liberata ac sola

per se in cineres conversa sunt. Jam residuum, quod antea oblatum fuerat, catino e platino confecto impositum caudefecit. Calcaria carbonica tali modo obtenta quam pensata esset, parva ammonii carbonici quantitate adiecta, iterum fervefacta trutinaque examinata est, quoad nulla ponderis decrementa observarentur. Magnesia ammoniato-phosphorica eo usque fervefacta est, donec albidum colorem indueret; quao res tamen non semper contigit. Calcaria inde, quae in calcariae carbonicae copiis ita obtentis inerat, computando definita est; qua eadem ratione ad magnesiacem copiam eruendam utebantur.

Urina a duobus collecta est. Etenim professor cl. **Buchheim** ejusque frater Dr. **Buchheim** summa, qua sunt, benignitate, quum ipse aerotatione impediret, varias molestias, cum urina colligenda conjunctas, haud inviti subiecerunt. Ad vivendi rationem quod attinet, qua viri urinam colligentes utebantur, haec sane in utroque una atque eadem erat. Namque cibi, etiamsi fortasse diversis quantitatibus assumitis, ad qualitatem quod spectat, pares erant. Commoditatis studio commotus, in tabula infra proferenda professorem **Buchheimi** numero 1 denotabo, experimentis, quae de urina illius fratris Dr. **Buchheim** instituta sunt, numero 2 designatis.

Corporis pondus professoris cl. **Buchheim** 57846,0 grammata aequabat, fratris ejus Dr. **Buchheim** 57320 gramm.

Analyses de urina factae talem praebuerunt eventum:

Mensis	Dies	Copia urinæ gramm.	p. c. CaO. gram.			Copia CaO gram.
			Analysis I.	Analysis II.	Num. med.	
Martii	25	1596,3	0,02043	0,02267	0,02155	0,3440
	26	2471,2	0,01811	0,02062	0,01936	0,4778
	27	2889,7	0,01810	0,01899	0,01854	0,5361
	28	2136,4	0,01527	0,01614	0,01570	0,3356
	30	2202,4	0,02577	0,02674	0,02625	0,5783
	31	2653,8	0,01463	0,01449	0,01456	0,3864
	Aprilis	1	2546,9	0,01778	0,01818	0,01798
	"	2	2638,6	0,01999	0,02052	0,02025
	"	3	1880,5	0,03804	0,03344	0,03574
	"	4	1871,4	0,02747	0,02518	0,02632
	"	5	2858,6	0,01935	0,01992	0,01963
	"	6	1969,2	0,03035	0,02964	0,02999
	"	7	2832,4	0,02057	0,02058	0,02057
	Martii	26	1651,9	0,01051	0,01021	0,01036
	"	27	1536,1	0,004171	0,003990	0,00408
	"	29	2004,0	0,007521	0,006833	0,00717
	"	30	1869,0	0,005280	0,005212	0,00524
	"	31	2001,6	0,005298	0,01188	0,00858
	Aprilis	1	1694,1	0,006267	0,007920	0,007093
	"	2	1008,4	0,01167	0,01139	0,01153
	"	4	1644,6	0,005460	0,006324	0,00589
	"	5	924,5	0,009209	0,008240	0,00872
	"	6	815,8	0,01185	0,01225	0,01205
	"	7	1450,8	0,003480	0,003932	0,003706
						0,0538

Mensis	Dies	Copia urinæ gramm.	p. c. MgO. gram			Copia MgO gram.
			Analysis I.	Analysis II.	Num. med.	
Martii	25	1596,3	0,01230	0,01019	0,01124	0,1796
	26	2471,2	0,009732	0,009166	0,00944	0,2331
	27	2889,7	0,008467	0,008610	0,00853	0,2486
	28	2136,4	0,008738	0,009322	0,00903	0,1929
	30	2202,4	0,009453	0,008086	0,00876	0,1931
	31	2653,8	0,006240	0,007358	0,00679	0,1804
	Aprilis	1	2546,9	0,008142	0,008694	0,2144
Aprilis	2	2638,6	0,009621	0,01087	0,01024	0,2705
	3	1880,5	0,004345	0,003513	0,00302	0,0739
	4	1871,4	0,01351	0,01346	0,01348	0,2525
	5	2858,6	0,008535	0,008329	0,00843	0,2416
	6	1969,2	0,01200	0,01071	0,01135	0,2237
	7	2832,4	0,008493	0,009228	0,00886	0,2510
	Martii	26	1651,9	0,01763	0,01939	0,01751
Aprilis	27	1536,1	0,01436	0,01306	0,01371	0,2106
	29	2004,0	0,01702	0,01707	0,01704	0,3410
	30	1869,0	0,01516	0,01409	0,01462	0,2684
	31	2001,6	0,01067	0,009962	0,01031	0,2066
	Aprilis	1	1694,1	0,01406	0,01327	0,01366
	2	1008,4	0,02543	0,02588	0,02565	0,2588
	4	1644,6	0,008340	0,00960	0,00897	0,1475
Aprilis	5	924,5	0,01826	0,01874	0,01850	0,1710
	6	815,8	0,02678	0,02713	0,02693	0,2199
	7	1450,8	0,01373	0,01337	0,01355	0,1556

Ex numeris hisce apparet, utriusque viri urinam non parum discrepare. Nam non solum urinae copia quotidiana differt, verum etiam copiae magnesiae phosphoricae, quae insunt, diversae cernuntur. — Maxime tamen differentia, in calcariae quantitatibus observata, in oculos incurrit, diversitate, quod ad magnesiam attinet, minus insigni.

Numeri medii, ex utraque experimentorum serie deducti, haec docent:

Copia urinæ horis 24 collecta.	Calcariae copia intra horas 24 edita.	Copia magnesiae intra hor. 24 spatium accepta.
Nr. 1. 2349,8 gramm.	0,5039 gram.	0,2090 gram.
Nr. 2. 1509,4 ,	0,4409 ,	0,2243 ,

Quibus ex numeris licet videatur concludi posse, maiorem calcariae quantitatem a majore urinæ copia dependere, tamen, si singulas analyses perlustramus, eam sententiam intelligimus non confirmari. Analysis enim urinæ No. 1. die m. Martii 28 instituta, quamquam urinæ quantitas paulo minor erat numero medio, tamen minimam calcariae copiam praebuit. Minima urinæ copia d. m. Martii 25 a prof. cl. *Buckheim* collecta tamen fere centigrammate plus calcariae continuit, quam copia die Martii 28 excepta. Neque magis maximam calcariae quantitatem maximæ urinæ copiae respondere videmus, etiamsi analysim d. m. Aprilis 3 susceptam, quam verisimile est secus cedisse, non respexerimus. — Eadem rei ratio est in tabula 2. Excepta analysi d. m. Aprilis 3 facta, summa differentia copiae calcariae maximæ minimaeque in tabula I. grm. 0,2554, in tabula 2. grm. 0,1253 aequat. Inter magnesiae copiam maximam minimamque longe minor observatur differentia, quippe quae in tab. 1 grm. 0,0909, in tabula 2 grm. 0,1942 sit.

Hoc loco etiam pervestigationum seriem, quae de cal-

cariæ phosphoricae et magnesiae phosphoricae secretionem partim, saccharo in usum vocato, partim urina normali a Dr. Boecker<sup>1)</sup> institutæ atque in opusculo ejus: „Beiträge zur Heilkunde“ inscripto publici juris factæ sunt, breviter exponere licet.

T a b u l a III.

Mensis dies	Copia urinæ.	Copia Cao.	Copia MgO.	Mensis dies	Copia urinæ.	Copia Cao.	Copia MgO.	
Oct. 24.	3058,0	0,9432	0,3252	Oct. 27.	2097,3	0,3386	0,1154	
	25.	3405,0	1,2259		29.	3340,0	0,3596	0,1715
	26.	2156,0	0,2498		Nov. 1.	3303,0	0,4053	0,0942
	31.	2053,0	0,8326		3.	3090,0	0,3014	0,1085
	Nov. 20.	2990,0	1,1882		4.	2317,0	0,3165	0,1114
Saccharo adhibito	24.	2762,0	1,3206		5.	2609,0	0,4102	0,1195
					6.	2470,0	0,4387	0,0997
					7.	2148,0	0,1975	0,0912
					8.	1958,0	0,2826	0,0817

Numeri ab his perquisitionibus repetiti pariter atque experimenta a me factitata copias calcariae magnesiaeque in urina normali admodum diversas esse coarguunt. Eisdem experimentis magnesiae phosphoricae copiam ab urinæ quantitate non pendere demonstratur. Numeri medii ex tabulis petitæ tales sunt.

Copia urinæ horas 24 accepta.	Copia calcareæ latra horas 24 edita.	Copia magnesiae intra hars 24 accepta.
Urina normal.	2737,3 gramm.	0,960 gram.
Saccharo adhibito.	2592,4 „	0,3389 „

Ad numeros de calcariae quantitate quod spectat, ii quidem cum numeris mediis, qtos meae observationes praebuerunt, parum concinunt, dum numerus medius de magnesiae in urina normali copia cum numero medio a me re-

perto fere omnino congruit. Differentia inter maximam minimamque copiam calcariae in urina normali contentæ 1,0708 gram. aequal, in urina post sacchari usum emissæ 0,2412 gram.

Copia maxima minimaque magnesiae, in urina normali inventæ, secundum investigationes *Boeckerianas* 0,2054 gram. inter se differunt; in urina post sacchari usum gram. 0,0898. Differentia inter maximam minimamque calcariae quantitatæ post usum sacchari in urina repertam paene tanta est, quanta in tab. I a nobis allata. Quæ adem ratio est magnesiae.

Numeri, dum saccharum in usum vocabatur, reperti re vera, id quod etiam ab aliis auctoribus est observatum<sup>2)</sup>, tom minorem magnesiae calcariaeque phosphoricae in urina quantitatem, quam quæ in urina normali inest, animadvertis probant.

Quæ quamvis ita se habeant, tamen non possum, quin Dr. Boecker opprobrio vertam, conclusionem ex hisce scrutationibus collectam pœ properam esse. Is enim in scripto supra citato pg. 67 his verbis utitur: „der Zucker ist eine Substanz, durch welche die Mauser (die Rückbildung) derjenigen lebendigen Körpertheile, welche, wenn sie zu leben aufhören, in Bestandtheile des Harns umgewandelt werden, bedeutend vermindert wird.“ Namque partes urinam constituentes nequitiam tales solummodo substantiae sunt, quæ partium corporis vita prædictarum decompositio in urinam delatae sint. E contrario corpora, quæ tractu intestinali resorbantur, quum organismo jam necessaria non sint,

2) *Boecker*, Zur Physiologie und Pathologie des phosphorsauren und oxalsauren Kalkes. Göttingen 1850. p. 109.

1) Dr. Boecker, Beiträge zur Heilkunde Crefeld 1849. Vol. 1. pag. 37 sqq.

etiam per urinam excerni novimus. — Itaque, si quadam urinae partes decrementa capiunt, id duplici modo fieri potest. Etenim aut eorum corporum minor, quam antea, quantitas organismo subvehitur, aut eorum decompositio in ipso organismo inhibita atque impedita est coque istorum copia diminuitur. Itaque, quum et omnes viri docti sacchari effectum perscrutati et ipse *Boecker* sacchari usu ciborum appetitum minui consentiant, facillimum videtur, calcariae phosphoricae et magnesiae phosphoricae decrements eo explicare, quod ciborum invectorum copia sit deminuta. Praeterea Dr. *Beneke* sacchari usu calcariae phosphoricae et magnesiae phosphoricae secretionem adactam se observasse testatur. Quam ob causam deminuta magnesiae calcariae phosphoricae secretio non ab ipsis sacchari vi et effectu repetenda, sed tantum ejus usum subsequi putanda est, quae quidem res saccharo cum multis aliis substantiis, quae ad ciborum concoctionem turbandam valent, communis est.

T a b u l a IV.

Mensis dies	Copia urinæ.	Copia CaO.	Copia MgO.	g
Maij 6.	1359,2	0,1762	0,2037	
7.	526,4	0,0874	0,1667	
8.	672,3	0,0282	0,0420	
9.	643,4	0,0861	0,0951	
10.	833,4	0,1080	0,1272	
11.	526,4	0,0569	0,0637	
12.	906,4	0,1314	0,0873	
13.	935,4	0,1156	0,1078	
14.	848,4	0,1635		
20.	1549,2	0,3188		
21.	1680,8	0,3044	0,0526	

Hanc investigationum seriem ex quadam morbi historia desumsi, quam Dr. *Beneke* in opusculo suo<sup>3)</sup>, cuius inscriptio est: „Unsere Aufgaben“ refert. Homo pulmonum tuberculosi affectus, quum febri intermitte cor�ceptus eset, dum hoc malum perdurat, minorē calcariae phosphoricae, magisque etiam exigua magnesiae phosphoricae copiam edidit. Ceterum causa, qua factum sit, ut minor utriusque, quam diximus, substantiae copia urinæ inesset, in eadem re querenda videtur, atque post usum sacchari. Etenim, simulatque febris cessaverat, utriusque salis adacta quantitas in urina cernebatur, normali non minor.

Numeri medii e tabulis *Benekeianis* ducti hi sunt.

Copia urinæ horis 24 emissæ.	Copia CaO inter horas 24.	Copia MgO inter hor. 24 spatiis.
949,9 gram.	0,1460 gram.	0,1053 gram.

Numerus medius de copia calcariae major est quam in tab. Nr. 2, magnesiae quantitas aliquanto minor. Differencia copiae maximae minimaque calcariae 0,1906 gram. aquat; magnesiae gram. 0,1647.

3) Unsere Aufgaben. Göttingen 1852. p. 138.

utrum, horis 24 exactis, magnesiae sumptae effectus etiamnum deprehendi posset, necne.

Urinæ disquisitiones tales eventus habuerunt:

### Experimentum I.

Mensis dies, April,	Copia urinæ gram.	p. c. MgO gram.			Copia MaO.	p. c. CaO gram.			Copia CaO.
		Analysis I.	Analysis II.	Num. med.		Analysis I.	Analysis II.	Num. med.	
16.	2568,3	0,01367	0,01382	0,01375 0,3531	0,02330	0,02438	0,02384 0,6123		
17.	2230,1	0,01387	0,01335	0,01561 0,3481	0,02640	0,02751	0,02695 0,6010		

16.	1413,9	0,02904	0,01436	0,0172 0,2432	0,01320	0,01374 0,01347 -0,1984		
17.	1388,6	0,02333	0,02174	0,0240 0,3338	0,01275	0,01241 0,01258 0,1747		

Dic mensis Aprilis 18, quum professor *Buchheim* unum magnesiae scrupulum cum semuncia sacchari assumisset, bis alvus pulti similis dejecta est. Die insequenti facies normales erant. Analyses urinæ haec docuerunt:

### Experimentum II.

Mensis dies, April,	Copia urinæ gram.	p. c. MgO gram.			Copia MaO.	p. c. CaO gram.			Copia CaO.
		Analysis I.	Analysis II.	Num. med.		Analysis I.	Analysis II.	Num. med.	
18.	1896,0	0,01712	0,01716	0,01713 0,3256	0,02749	0,02811	0,02780 0,5271		
19.	2151,3	0,01157	0,01151	0,01151 0,2489	0,01850	0,01892	0,01871 0,4079		

Quorum experimentorum utrumque, praesertim quod prius attulimus, magnesiae copiam in urina auctam esse monstrat. In casu priore autem ne minimum quidem vestigium effectus laxantis animadversum est. In casu secundo, quamquam magnesiae copia, si cum quantitate normali comparetur, satis accrescisse cernitur, tamen haec incrementa non tam insignia esse videamus, quam in periculo priore. Namque, quum magnesia majore celeritate tractum intestinalem percucurisset, tanta ejus copia non potuerat in sanguinem transire. Praeterea, semuncia sacchari adiecta, magnesiae vim alvum solvendi majorem fuisse videmus; qua in re tamen quum temporis angustiae, id quod vehementer doleo, me

4) Hoc loco admoneendum est, postea Dr. *Buchheim* in experimentis partem non habuisse.

impedissent, ne ejusdem modi experimenta repeterem, ex una observatione sane certam conclusionem efficere non licuit.

Die m. Aprilis 21, quum duo magnesiae scrupula in usum conversa essent, nonnullis horis transactis, borborygmi abdominis extiterunt, alvumque hora 10 cum dimidia dejectam tempore postmeridiano hora 5 altera defaecatio secuta est. Abdominis borborygmi usque ad vesperum perduraverunt. Die sequenti faeces nondum ea, qua solebant, soliditate erant.

Pervestigationes urinae haec monstrarunt.

### Experimentum III.

Mensis dies, April.	p. c. MgO gram.			p. c. CaO gram.			Copia CaO.	
	Copia urinae,	Analysis L.	Analysis H.	Num. med.	MgO	Analysis L.	Analysis H.	Num. med.
21.	2556,6	0,01502	0,01469	0,01486	0,3799	0,02160	0,02243	0,02202 0,5630
22.	2390,7	0,01104	0,01132	0,01118	0,2763	0,02157	0,02433	0,02295 0,5487

Hoc experimentum, quamquam magnesiae vi satis magna observata, tamen etiam copiam magnesiae in urina adiunctam fuisse probat. Quae res tamen eo videtur explicanda esse, quod inter experimenta de magnesia instituta semper tantum unius diei intervallum interjectum erat, ideoque doses praecessae effectus etiam tum durabat. Quum autem tempore postmeridiano demum altera fieret alvi dejectio, adeoque die sequenti faeces molles cernerentur, magnesiae partem apparuit per longius spatium in tractu intestinali relictam satis habuisse temporis, in sanguinem transeundi.

Die m. Aprilis 25 scrupulum magnesiae unum cum dimidio assumptum est, quae dosis demum septem horis elapsis vim exhibuit, liquida alvo evacuata. Biduo insequenti, magnesiae usu jam omissa, urinam tamen collegimus. Alvi, his

diebus dejectae, ad soliditatem quod attinet, non erant normales.

Urinae analyses haec docuerunt.

### Experimentum IV.

Mensis dies, April.	p. c. MgO gram.			p. c. CaO gram.			Copia CaO.	
	Copia urinae,	Analysis L.	Analysis H.	Num. med.	MgO	Analysis L.	Analysis H.	Num. med.
25.	1888,2	0,01972	0,02019	0,01996	0,3769	0,03035	0,03057	0,03048 0,5755
26.	2237,0	0,01329	0,01323	0,01341	0,3000	0,02044	0,01911	0,01978 0,4425
27.	2325,2	0,01072	0,01125	0,01100	0,2558	0,02443	0,02395	0,02419 0,5625

Die m. Aprilis 28 prof. *Buchheim* 25 gr. magnesiae sumsit; qua dosi adhibita, quum jam horis 4 exactis alvus satis mollis dejecta esset, ea quidem videtur non peperisse a gr. 25 magnesiae usu. Eodem die altera defaecatio a normali differens secuta est. Die m. Aprilis 29 alvus nondum ad normam rediisse cernebatur. Magnesiae unus etiam die m. Aprilis 30 intermissus.

### Experimentum V.

Mensis dies, April.	p. c. MgO gram.			p. c. CaO gram.			Copia CaO.	
	Copia urinae,	Analysis L.	Analysis H.	Num. med.	MgO	Analysis L.	Analysis H.	Num. med.
28.	2240,7	0,01339	0,01452	0,01395	0,3125	0,02580	0,02544	0,02562 0,5741
29.	1671,9	0,01769	0,01543	0,01704	0,2849	0,03098	0,03161	0,03130 0,3233
30.	1252,2	0,00886	0,00873	0,00879	0,1101	0,02311	0,02570	0,02441 0,3057

In utroque experimento magnesiae copia, id quod effectui ejus exiguo respondet, satis est magna.

Quod autem copia d. m. Aprilis 30 inventa tam exigua est, alii videtur effectum esse momentis.

Itaque, quum fieri non possit, ut magnesia sua ac propria forma in sanguinem transeat, quaestio nobis offertur, cum quoniam acidorum, quae in ventriculo tractuque intestinali obvia habet, conjunctionem ineat? Qua in re sane verisimile non esse, magnesiam cum acidis anorganicis con-

jungi, infra, quo loco faecum analyses proponemus, fusius explanabimus. Itaque adducimur, ut acidum lacticum id corpus esse judicemus, quocum magnesia connulum in ea Professor illustrissimus Dr. **Buchheim** summa, qua excellit, benignitate hanc conjunctionem paravil, duabus eum in finem methodis usus. Quarum prior in eo constituit, ut magnesia lactica ex magnesia uita et aido lacticō pararet; in altera, quum calcariae lacticae solutioni magnesia sulphurica soluta adiecta esset, calcaria sulphurica precipitata, magnesiae lacticae solutio ad formandos crystallos redacta est.

Utrisque praeparati pondus atomorum tali ratione est definitum. Gram. 0,20 salis ad aërem atmosphaericum siccati, secundum methodum priorem parati, in balloco aëris calore 120° C. tam diu exsiccamus, quoad nulla amplius ponderis decrementa animadverterentur. Quo facto, magnesia lactica, tali modo exsiccata, in catino ex platino confecto eo usque est combusta, donec magnesia relicta colorem omnino albidum indueret.

Copiae modo dictae pondus statu aquae experti 0,159 gram. decreverat. Inde, postquam concremata fuit, residuum gram. 0,034 erat. Praeparatum altera ratione obtentum, quem eodem modo tractatum esset, talia ponderis decrementa cepit.

1,001 gram. magnesiae lacticae in exsiccescendo 0,227 gram. aquae perdidit, post combustionem residuo gram. 0,194 aequante. Atomorum pondus eo<sub>6</sub> consilio definitum est, ut nobis persuaderemus, num sal a prof. **Buchheim** paratum eodem modo esset compositum, quo ab aliis dicitur. Magnesiae copia in sale, secundum priorem methodum parato, in partibus centenis talis erat 100 : 17,0, in sale, se-

cundum methodum alteram obtento, talis 100 : 19,38. Auctore **Engelhardt**, ratio' haec est 100 : 19,81. Magnesiam lacticam solum nonnullis experimentis adhiberi placuit. Die m. Maji 2 prof. **Buchheim** magnesiac lacticae drachmam unam assumisit, quae quantitas fore 40 gram. magnesiac merae continet. Qua dosi sumpta, alvus mollior dejecta est. Urina hoc die et sequenti excepta, quam disquisita esset, hacc monstravit:

#### Experimentum VI.

Mensis die, Maj.	Copia urinae,	p. c. MgO gram.			Copia MgO,	p. c. CaO gram.			Copia CaO,
		Analysis L.	Analysis H.	Nom. med.		Analysis L.	Analysis H.	Nom. med.	
2.	1263,5	0,01374	0,01198	0,01436	0,1814	0,03196	0,03193	0,03193	0,4037
3.	1747,1	0,01379	0,01291	0,01335	0,2332	0,02600	0,02543	0,02617	0,4572

Die m. Maji 4, quum duae magnesiae lacticae drachmae essent assumptae, aliquot horis post vehementissimi abdominis horborygni exstiterunt et paulo post alvus liquida dejecta est, quam inde intra ejusdem diei spatium duae defacationes, quibus et ipsis massae liquidae emissae sunt, sequebantur. Urinae, et hoc die et insequenti collectae, per investigatione hacc docuit.

#### Experimentum VII.

Mensis die, Maj.	Copia urinae,	p. c. MgO gram.			Copia MgO,	p. c. CaO gram.			Copia CaO,
		Analysis L.	Analysis H.	Nom. med.		Analysis L.	Analysis H.	Nom. med.	
4.	2636,1	0,01467	0,01376	0,01422	0,3777	0,02132	0,02268	0,02200	0,5843
5.	2028,5	0,01246	0,01324	0,01255	0,2607	0,02205	0,02049	0,02127	0,4315
6.	2023,4	0,01398	0,01292	0,01300	0,2630	0,02190	0,02381	0,02286	0,5779

Ex duobus his periculis, magnesia lactica factis, ejus vim alvi purgandae majorem esse, quam, magnesiae copiae, quae inest, ratione habita, exspectare potueris, satis eluet. Quod ad magnesiae quantitatem, in urina inventam, spectat,

eam in experimento paenultimo perquam videmus exiguum fuisse. Jam ex analysi d. m. Aprilis 30 suscepta magnesiae copiam admodum parvam fuisse cognoscimus; unde colligo, res externas, mihi quidem incognitas, a quibus hic effectus pependerit, etiam his diebus vim suam continuavisse:

Praeterea haec experimenta, ut mea fert opinio, plurimum valent ad sententiam eam confirmandam, qua magnesia cum acido lacticō conjuncta efficaciam alvi solvendae ipsi propriam acquirere creditur. Si autem quispiam putaverit, magnesiam, cum acido muriatico conjunctione inita, se efficacem præcibere, haec quidem opinio, quum conjunctiones chlori omnes summa diffundi facultate excellant, ideoque celerrime in tractu intestinali resorbeantur, et magnesium muriaticum sic efformatum, quippe quod brevi tempore evanescat, vix intestina ad vigintiorem motum peristalticum excitare possit, ab omni veritatis specie vel maxime abhorret. Quod vero ad conjunctionem sulphuricam attinet, magnesiam sulphuricam in intestinis decomponi Dr. Aubert<sup>5)</sup>) suis perscrutationibus evicit.

Quia de causa, ut nobis exquirere liceret, quaenam haec esset conjunctio, de qua agitur, duo experimenta suscepimus. Quae experimenta tamen vehementissime doleo, temporis penuria impeditos, nos ad finem adducere non potuisse, per quo factum est, ut certum eorum eventum in medium proferre nequacamus. Verumtamen vir doctissimus prof. **Buchheim**, quam primum fieri potuerit, quac hisce experimentis comperta sunt, publici juris factorus est.

Die m. Maji 7 magnesiae ustae scrupula tria a prof.

**Buchheim** sumpta sunt, ut medicamentum vim alvi laxandae quam maxime exhiberet. Qua dosi adhibita, quum jam tempore antemeridiano abdominis borborygmi ingruissent, post meridiem defaecatio copiosa eaque liquida est subsecuta. Faeces dejectae, quum collectae essent, cum urina et illo et sequenti die missa ad analysim vocatae sunt. Die m. Maji 11 excrements, normali dejectione alvi emissae, collecta sunt, ut exploraretur, num ea praeter magnesiam ammoniato-phosphoricam etiam aliud sal magnesiae continent, neene? Denique d. m. Maji 12 quum magnesiacae lacticae drachmæ 7 in usum vocatae essent, jam hora octava matutina alvus liquida dejecta est, quam postea hora nona cum dodrante altera, et hora decima cum dodrante tertia est secuta. Praeter has alvos duae aliae tempore postmeridiano exinanitiae fuerunt, quae alvi quinque et collectae et simul perquisite sunt. Die m. Maji 13 etiam urina excepta est.

Faecum investigatio, ut, ad quantitates quod attinet, quam certissima comperire contigeret, summa cum cura atque diligentia est instituta. Faccies igitur, primum magna aquae destillatae copia dilutae, in filtrum e panno laneo confectum impositae sunt massaque, quae filtrum permeaverat, alteri filtro e charta facto injecta. Quia in re cognitum est, magnam multitudinem crystallorum magnesiae ammoniato-phosphoricæ ad yasis parietes adhaesisse. Inde massæ per filtrum transmissæ, usque dum fere grm. 100 relinquenter, evaporatae magnaque acidi acetici copia addita acidulæ sunt redditæ.

Qua in re acerimus acidi butyrici odor diffusus est. Deinde, eandem, atque in urina perquirenda, rationem invenentes, primum calcarium, tum magnesiam præcipitavimus

ataque ope filtri percolavimus. Jam, larga natri phosphorici soluti quantitate adfusa, extemplo praecipitatum copiosum deponi vidimus. Quae quin ita se habeant, manifestum apertumque est, magnesiam conjunctionem aliquam in tractu intestinali inire, quae tamen qualis sit, postero tempore est indagandum. Natri phosphoricus ad facces normales addito, nullum praecipitatum exstitit.

### Experimentum VIII.

Mensis dies. Maj.	Copia urinae gm.	p. c. MgO gram.			Copia MgO. Analysis L.	p. c. CaO gram.			Copia CaO. Analysis L.
		Analysis H.	Num. med.	Analysis H.		Analysis H.	Num. med.	Analysis H.	
7.	1737,8	0,02047	0,02011	0,02031	0,3530	0,03016	0,03049	0,03033	0,5271
8.	2167,0	0,0159	0,01511	0,01558	0,3365	0,02518	0,02601	0,02660	0,5548
12.	1903,5	0,0163	0,01672	0,01633	0,3146	0,03273	0,03510	0,03391	0,6455
13.	1923,1	0,01471	0,01357	0,01414	0,2719	0,02933	0,02579	0,02917	0,5610

Faecibus perquisitis talia reperi.

Mensis dies	Copia CaO gram.	Copia MgO liq. ann. c. praece. gram.	Copia MgO natri phosph. praece. gram.
Maji 7.	0,1252	0,03325	1,2684
11.	0,1682	0,06999	—
12.	0,6106	0,03656	4,4231

Denique, si efficaciam magnesiae propriam cum vi natri sulphurici comparare studuerimus, haud infliandum est, quasdam diversitates non deesse. Ex quibus praecipue ea sub aspectum cadit, quod magnesiae effectus longe tardius, quam natri sulphurici, apparet. Cujus rei causa nescio an in eo sit reposita, quod magnesia forma non solubili in ventriculum inventa ibi primum in sal soluble permutatur, quod aquae copia, ne in sanguinem transeat, impedita, vim alvi solvendae provocat. — Sal autem, quum maxima ex parte demum in intestini tenuis cursu formari videatur, cum tractus intestinalis parietibus, ex quibus ad sanguinem transferri

possit, brevius per tempus in contactu manet. — Quae videtur causa esse, qua eveniat, ut copia magnesiae in urina inventa semper haud ita magna cernatur. E contrario ex investigationibus a Dr. *Wagner* de natro sulphurico institutis eluet, in hujus medicamenti usu quantitatem acidi sulphurici in urina repertam longe adaugeri. Quodsi conclusiones, quas ex nostris observationibus deducere licet, paucis ac breviter complectamur, earum eventum in rebus gravissimis intelligimus eundem esse, quem de natro sulphurico Dr. *Wagner* nactus sit. Namque magnesiam quoque ad tractus intestinalis motum peristalticum augendum valere, tum horborygmi abdominis, tum alvi dejectiones ea effectae argumento sunt. — Inde si magnesia, dosibus minoribus adhibitis, longius per tempus in tractu intestinali permanerit, saltē pro rata parte minores copias in sanguinem transferri, magnesiae copia in urinā inventa satis coarguit. — Adacta autem magnesiae copia, in urina animadversa, nec non magnesia ea, quam in faecibus adesso analyses docuerunt, a formatione salis solubilis magnesiae sunt repetendae.

## ***Theses.***

- 1) Salia media remedia refrigerantia non sunt dicenda.
  - 2) Menstruatio non pendet ab ovulorum matuitate.
  - 3) Magnesia assumta, in tractu intestinali magnesia lactica formatur.
  - 4) Remotiores medicamentorum effectus non existant.
  - 5) Icterus idiopathicus non est.
  - 6) Sano non minus, quam aegroto, opus est medico.
-