

Ver. 1888.

IN DER

DORPATER POLIKLINIK

GEBÄUHLICHE

RECEPTE UND VERORDNUNGEN

ZUSAMMENGESTELLT

VON

DR. KARL DEHIO


PROF. EXT.


DIRECTOR DER POLIKLINIK.

DORPAT.

DRUCK VON C. MATTIENSEN.

1888.





Gedruckt mit Genehmigung der medicinischen Facultät.

Dorpat, den 16. August 1888.

Nr. 353.

Decan: Raehlmann.

43.01

Die vorliegende Sammlung von Recepten und Verordnungen beabsichtigt keineswegs die ausführlichen Compendien der Arzneiverordnungslehre, unter denen das treffliche Werkchen von O. Roth: Die Arzneimittel der heutigen Medicin, (neubearbeitet von G. Schmitt. Würzburg) als bequemes Nachschlagebuch bestens empfohlen werden kann, überflüssig zu machen. Sie verdankt ihre Entstehung lediglich der von mir bei der Leitung des poliklinischen Unterrichtes vielfach gemachten Erfahrung, dass die poliklinischen Practicanten bei den ersten selbstständigen Schritten, die sie in's Gebiet der practischen Medicin unternehmen, eines kleinen Vorrathes von erprobten Receptformeln und arzneilichen Verordnungen bedürfen, bei dessen Anwendung sie die Dosirung der gebräuchlichen Mittel und eine möglichst einfache Form der Verordnung derselben kennen lernen.

Die gebräuchlichen Recepttaschenbücher leiden vielfach an dem Fehler eine so grosse Menge von Receptformularen zu enthalten, dass dem noch unerfahrenen Studenten die Wahl schwer wird und er nicht dazu gelangt seinem Gedächtniss einen festen Grundstock von Verordnungen einzuprägen, welcher in der Praxis unentbehrlich ist. Der Wunsch, meinen Schülern einen solchen Grundstock medicamentöser Verordnungen zu bieten, hat mich veranlasst, die in der hiesigen Poliklinik üblichen Recepte und Verordnungen zusammenzustellen. Ich fürchte nicht, dadurch einem unfruchtbaren therapeutischen Schematismus Vorschub zu leisten, denn ich weiss, dass bei fortschreitender practischer Erfahrung jeder denkende Arzt von selbst auf die dem einzelnen Krankheitsfall

angemessenen Variationen seiner Verordnungen verfällt. Auch bieten die leeren Blätter, mit denen dieses Büchlein durchschossen ist, jedem Einzelnen die Möglichkeit, seine Sammlung von Recepten gemäss den Rathschlägen seiner Lehrer und dem Gange seiner Studien nach Gefallen zu vervollständigen.

Ich habe mich bemüht von den einzelnen gebräuchlichen Medicamenten, wo es anging, nur je eine Form der Verordnung, und zwar eine möglichst einfache und billige anzugeben. Hierbei ist mir der Herr Magister pharm. C. Böning, Provisor der klinischen Apotheke, vielfach behülflich gewesen, wofür ich ihm zu bestem Dank verpflichtet bin. Complicirtere Recepte, und namentlich solche, die mehr als einen wirksamen Arzneistoff enthalten, habe ich nach Möglichkeit vermieden, weil dieselben ein klares Urtheil über die Wirkung der einzelnen Ingredientien nicht gestatten. Eine durch alte medicinische Erfahrung gerechtfertigte Ausnahme habe ich allerdings bei den Laxantien eintreten lassen.

Was die Anordnung der Receptformeln betrifft, so habe ich sie im Allgemeinen nach ihrer Wirkung und Anwendungsweise zusammengestellt, ähnlich wie das Strümpell in seinem bekannten Lehrbuch gethan hat. Dass ich nicht prätendire, lauter originale Verordnungen zu liefern, brauche ich wohl nicht zu betonen.

Im Index habe ich ausser den Medicamenten, welche sich in der Sammlung verzeichnet finden, auch die zugehörigen Stammdroguen oder Mutterpflanzen angegeben, um dadurch an die Herkunft der verschriebenen Mittel zu erinnern.

Möge das Büchlein meinen Schülern ein nützlichcs Andenken an die erste Zeit ihrer practischen ärztlichen Thätigkeit sein.

Dorpat, im August 1888.

Dr. Karl Dehio, prof. ext.

I. Antipyretica.

1.
Chinini sulf. 1,0.
D. tal. dos. Nr. 3.
S. Abends ein Pulver in einer
Oblate zu nehmen.

2.
Chinini sulf. 0,3.
D. tal. dos. Nr. 6.
S. 2 bis 3 Mal tägl. ein Pulver
in Oblaten z. n.

3.
Chinini sulf. 0,3—0,6.
Syrup. oxycocci 30,0.
Acid. muriat. dil. gutt. X.
MDS. theelöffelw. (bei Kindern).

4.
Acid. salicylic. cryst. pulv. 1,0.
D. tal. dos. Nr. 6.
S. 2stündl. ein Pulver in Obl.
z. n. (bei Blasenkatarrh 4 Mal
täglich).

5.
Natr. salicylic. 6,0—8,0.
Aq. dest. 100,0.
Aq. Menthae piperit. 50,0.
MDS. stündlich ein Esslöffel
od.: Morgens, Mittags, Abds.
je 3 Esslöffel auf ein Mal z. n.

6.
Natr. salicylic. 2,0—4,0.
Aq. Menthae 25,0.
MDS. auf ein Mal z. n. (behufs
antipyretischer Wirkung).

7.
Antipyriini 1,0—2,0.
D. tal. dos. Nr. 6.
S. 3 Pulver täglich z. n. (auch
als Antineuralgicum benutzt).

8.
Antifebrini 0,3—0,5.
D. tal. dos. Nr. 6.
S. 3 Pulver täglich.

9.
Saloli 0,5—1,0.
D. tal. dos. Nr. 6.
S. 3—4 Pulver täglich.

10.
Phenacetin 1,0.
D. tal. dos. Nr. 3.
S. täglich ein (höchstens 2) Pul-
ver (auch als Antineuralgicum
benutzt).

II. Säuren.

11.
Acid. muriat. dil. 3,0.
Aq. dest. 130,0.
Syrup. spl. 20,0.
MDS. 2stündl. ein Esslöffel.

12.
Acid. phosphoric. dil. 3,0.
Aq. dest. 130,0.
Syrup. rub. idaei 20,0.
MDS. 2stündl. ein Essl.

III. Expectorantia.

13.

Liq. Ammon. anisat 10,0.
 Aq. amygdalar. amar. 20,0.
 MDS. 3 Mal täglich 30 Tropfen
 in Wasser z. n.

14.

Infus. rad. Senegae 10,0:130,0.
 Liq. Ammon. anisat. 4,0.
 Syrup. spl 20,0.
 MDS. 2stündl. ein Essl.

15.

Elixir pectoral. 20,0.
 DS. 3 Mal täglich 30 Tropfen.
 (NB. Elixir pectorale besteht
 aus: 1 Th. Extr. liquiritiae,
 1 Th. Liq. Ammon. anisat u
 3 Th. Aq. foeniculi. Auch
 Elixir pectorale regis Daniae
 genannt.)

16.

Liq. Ammon. anisat 5,0.
 Tinct. Stramon. 5,0.
 Tinct. opii spl. 5,0.
 MDS. 3 Mal tägl. 20 Tropfen.

17.

Infus. rad. Ipecacuanh. 0,5:150,0.
 Aq. laurocerasi 3,0.
 (eventuell Morph. muriat. 0,05.)
 MDS. 2stdl. ein Essl.

18.

Pulv. Doveri 0,3—0,5.
 D. tal. dos. Nr. 6.
 S. 3 Mal tägl. ein Pulver oder
 Abends ein Pulver (Hypnoticum).
 (NB. Pulv. Doveri besteht aus:
 8 Th. Kali sulf.,
 1 Th. pulv. rad. Ipecacuanh.,
 1 Th. Opium purum.)

19.

Vini Ipecacuanh. 20,0.
 DS. 3 Mal täglich 10 (Kindern)
 bis 20 Tropfen. (NB. Mace-

ration von 1 Th. pulv. Ipec.
 in 10 Th. Xeres.)

20.

Decoct. cort. Quillajae 3,0:150,0.
 (eventuell Tinct. opii spl. 1,0.)
 MDS. 2stündl. ein Esslöffel.

21.

Apomorphini mur. 0,05.
 Acid. muriat. dil. 0,5.
 Aq. dest. 130,0.
 Syrup. spl. 20,0.
 MDS. 2—3stündl. ein Esslöffel.

22.

Ammon. muriat. 3,0.
 Extract. liquirit. 3,0.
 Aq. dest. 150,0.
 MDS. 2stdl. ein Essl. (Mixture
 solvens.)

23.

Stib. sulfurat. aurant. 0,05.
 (s. Sulfur. aurat. Antimonii)
 Morph. muriat. 0,01.
 Sachar. alb. 0,5.
 M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 6.
 S. 3 Pulver täglich.

24.

Vini stibiat. 20,0.
 DS. 3 Mal tägl. 10 (Kindern)
 bis 20 Tropfen. (NB. 1 Th.
 Brechweinstein: 240 Th. Ma-
 laga.)

25.

Natr. bicarbon. 3,0.
 Aq. laurocer. 3,0.
 Aq. dest. 150,0.
 (eventuell Morph. mur. 0,05.)
 MDS. 2stündlich ein Esslöffel.
 NB. statt aqua laurocerasi kann
 auch aqua amygdalarum ama-
 rarum verschrieben werden.

26.

Natr. bicarb. pulverat. 30,0.
 DS. Messerspitzen- bis theelöffel-
 weise in warmer Milch z. n.

27.
 Natr. bicarbon. pulv. 30,0.
 Natr. chlorat. cryst. pulv. 2,0.
 M. f. pulv.
 DS. ebenso.

28.
 Ol. terebinthinae gallic. 20,0.
 DS. 3 Mal täglich 15 Tropfen
 in heisser Milch z. n.
 (Bronchitis putrida)

29.
 Plumb. acetic. 0,03—0,05.
 Sachar. alb. 0,5.
 M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 6.
 S. 3 Pulver täglich (Bronchitis
 putrida, bei Lungenoedem
 $\frac{1}{2}$ stündl. bis 0,5 p. die).

30.
 Terpin. hydrat. 2,0.
 Spirit. vini (70%) 50,0.
 Aq. dest. 100,0.
 MDS. 3 Esslöffel täglich.

31.
 Acid. benzoic. 0,1.
 Camphorae trit. 0,1.
 Sachar. lact. 0,3.
 M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 6.
 S. 2stündl. ein Pulver (Capilläre
 Bronchitis; bei Kindern die
 halbe Dosis).

IV. Sonstige bei Erkrankungen der Respirations- organe und des Rachens benutzte Verordnungen.

32.
 Plumb. acetic. 0,05.
 Opii puri 0,03.
 Sachar. alb. 0,5.
 M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 6.
 S. 2stündl. ein Pulver (Haemop-
 tysis).

33.
 Infus. Secal. cornut. 5,0:150,0.
 (eventuell Morph. muriat. 0,1.)
 MDS. 2stündl. ein Essl. (Blut-
 husten).

34.
 Secal. cornut. 0,3—0,6.
 D. tal. dos. Nr. 6.
 S. stündlich ein Pulver.

Atropin subcutan (b. Bluthusten)
 cfr. Nr. 243.
 Digitalis (bei Bluthusten) cfr.
 Nr. 53.
 Morphinum subcutan (bei Blut-
 husten) cfr. Nr. 242.
 Ergotin subcutan (bei Bluthusten)
 cfr. Nr. 247.

35.
 Extract Belladonnae 0,1.
 Aq. laurocer. 3,0.
 Aq. dest. 150,0.
 MDS. 2stündl. ein Essl. (bei
 Kindern die Hälfte zu ver-
 schreiben 2stündl. ein Theelöffel.
 Keuchhusten).

36.
 Extr. tuberum Aconiti 0,05.
 Aq. laurocer. 3,0.
 Aq. dest. 150,0.
 MDS. ebenso (Keuchhusten)

37.
 Ammon. bromat. 3,0—5,0.
 Aq. laurocerasi 3,0.
 Aq. dest. 130,0.
 Syrup. spl. 20,0.
 MDS. ein Theelöffel bis zu ei-
 nem Essl. 4 Mal tägl.

38.
 Tinct. Quebracho 30,0.
 DS. 3 Mal tägl. ein Theelöffel.

39.
 Kreosoti 1,5.
 Ol. jecor. aselli 150,0.
 MDS. 2—3 Essl. tägl.

40.
Kreosoti 1,5.

Spirit. vini (70%) 75,0.

Aq. Menthae 75,0.

MDS. 2—3 Essl. tägl.

41.

Guajacol. 1,0.

Spirit. vini (70%) 75,0.

Aq. Menthae 75,0.

MDS. 2 Essl. tägl.

42.

Agaricini 0,005—0,01.

Opii puri 0,03.

Sachar. alb. 0,5.

M. f. pulv. d. tal. dos Nr. 6.

S. Abends ein Pulver (Nachtschweiss).

43.

Inhalationen:

a. Ol. terebinth. gallic. 30,0.
DS. mit Warmwasserdämpfen zu inhalieren.

b. Balsam. peruvian. 5,0.
Spirit. vini alcoholisat. (95%) 10,0.

MDS. ebenso.

c. Natr. bicarb. 3,0.

Aq. laurocer. 3,0.

Aq. dest. 150,0.

M.

d. Natr. chlorat. (2% in wässr. Lösung)

e. Alumen pulverat (1% in wässr. Lösung).

f. Acid. tannic. (1/2%—1% in wässr. Lösung).

g. Zinc. sulfuric. (3% in wässr. Lösung).

c—g zum Inhalieren mit dem Spray-Apparat.

h. Acid. carbohic. (5% in wässr. Lösung).

im Zimmer auszusprengen.

i. Ol. terebinth. rossic. 60,0.
dgl.

44.

Acid. carbohic. crystallisat. 5,0.

Spirit. vini (70%) 5,0.

Liq. Ammon. caust. 3,0.

MDS. zum Riechen (Schnupfen).

45.

Acid. boric. pulverat. 10,0.

Jodoformii 3,0.

M. f. pulv. DS. Zum Einblasen in die Nase (chron. Rhinitis, Ozaena.)

46.

Amyli (oder Talc. venet) 20,0.

Argent. nitric. 0,1—0,4.

M. f. pulv. DS. ebenso.

47.

Natr. bicarbon. pulv. 30,0.

DS. Eine Messerspitze auf ein Glas Wasser. Zum Einziehen durch die Nase.

48.

Natr. chlorat. pulv. 30,0.

DS. ebenso.

49.

Zum Pinseln der Nasen- und Rachen-Schleimhaut:

a. Argent. nitric. 1,0—3,0.

Aq. dest. 30,0.

M.

b. Acid. tannic. 3,0—6,0.

Glycerini 30,0.

M.

c. Natr. biboric. 3,0.

Glycerini 15,0.

Aq. dest. 15,0.

M.

d. Hydrarg. bichlr. corrosiv 0,03.

Aq. dest. 30,0.

M.

e. Jodi puri 0,5.

Kalii jodati 2,5.

Glycerini 25,0.

M.

50.

Mundspül- und Gurgelwässer.

a. Kali chloric. 30,0.

DS. Ein Theelöffel auf ein Glas Wasser zum Gurgeln und Mundspülen.

- b. Kali hypermanganic. 2,0.
Aq. dest. 100,0
MDS. Ein Esslöffel auf ein
Glas Wasser zum Mund-
spülen und Gurgeln.
- c. Alumin. acetic. solut. 100,0.
(pharmacop. rossica)
DS. ebenso.
(NB. wässrige Lösung von
essigsaurer Thonerde.)
- d. fol. Salviae 60,0.
DS. als Thee bereitet zum
Mundspülen und Gurgeln.
- e. Cort. Quercus 60,0.
DS. ebenso.

56.
Infus. herb. Adonidis vernal
3,0:150,0.
DS. 2stdl ein Esslöffel.

57.
Tinct. Convallariae majal. 20,0.
DS. 3 Mal tägl. 10—30 Tropfen.

58.
Tinct. sem. Strophanti 10,0.
Aq. laurocer. 20,0.
MDS. 3—4 Mal tägl. 15—30 Tr.

59.
Nitroglycerini 0,01.
solve in Spirit. vini rectific. (70%)
5,0.

adde Aq. dest. 95,0.
MDS. 3 Mal tägl. ein Theelöff.
(NB. allmählich kann die Dosis
bis zum Fünf- ja Zehnfachen
gesteigert werden.)

V. Mittel zur Regulirung der Herzthätigkeit.

51.
Infus. folior. Digitalis 0,6:150,0.
DS. 2ständl. ein Esslöffel.

52.
Infus. folior. Digitalis 0,6:120,0.
Liq. Kali acetici 30,0.
MDS. 2stdl. ein Essl.

53.
Pulv. folior. Digitalis 1,0.
(eventuell Opii puri 0,3 oder
Chinini sulf. 2,0 hinzu.)
Extract. liquirit. q. s. ut f. pi-
lulae Nr. 30. Consp. lycopod.
DS. 6 Pillen tägl. (2stdl. eine P.)

54.
Tinct. Digitalis 10,0
Aq. laurocerasi 20,0.
MDS. 3 Mal tägl. 20—30 Tropf.

55.
Coffeini natrobenzoic. (oder C.
natrosalicylic.) 2,0.
Aq. dest. 150,0.
MDS. 4 Mal tägl. bis 2stdl. ei-
nen Esslöffel z. n.

60.
Amylii nitrosi 1,0.
DS. Zu Handen des Arztes.
(Vorsicht!)

VI. Emetica.

61.
Pulv. rad. Ipecacuanhae 1,0.
Tart. stibiat. 0,05.
M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 4.
S. alle Viertelstunden ein Pul-
ver bis zur Wirkung.

62.
Cupr. sulfuric. 1,0.
Aq. dest. 30,0.
Snrup. spl. 20,0.
MDS. alle Viertelstunden ein
Theelöffel bis zur Wirkung
(bei Kindern).

63.
Vini stibati 30,0.
DS. alle Viertelstunden ein Theelöffel bis zur Wirkung (bei Kindern).
Apomorphin cfr. Rec Nr. 244.

VII. Laxantia.

64.
Calomel. 0,3.
Sachar. alb. 0,3.
M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 3.
S. nach je 3 Stunden ein Pulver z. n.
(cave: Acid. muriat., Kali chloric, Aq. chlori!)

65.
Natr. sulfuric. cryst. 30,0.
DS. theelöffelweise in Wasser z. n.

66.
Magnes. sulfuric. 30,0.
DS. ebenso.

67.
Sal. Carlsbadens. factic. 30,0.
DS. theelöffelweise in warmem Wasser z. n.
(NB. Künstliches Karlsbader Salz besteht aus 23 Theilen Natr. sulfuric., 3 Th. Natr. bicarb., 1 Th. Natr. chlorat.)

68.
Magnes. ust. 25,0.
Aq. dest. 150,0.
MDS. Schüttelmixtur.
als Antidot bei Vergiftungen: alle Viertelstunden 4—6 Essl.

69.
Magnes. ust. 10,0.
Aq. dest. 130,0, cogne per ¼ horae adde Syrup. spl. 20,0.
MDS. 2stündl. ein Esslöffel, vor dem Gebrauch umzuschütteln.

70.
Pulv. rad. rhei 5,0.
Natr. bicarbon. 3,0.
Natr. sulfuric. 2,0.
M. f. pulv.
DS. 3 Mal täglich eine Messerspitze bis zu einem Theelöffel voll zu nehmen.

71.
Ol. ricini 30,0.
DS. nach Verordnung.

72.
Emuls. ol. ricini 130,0.
Syrup. spl. 20,0.
Ol. Menthae piperit. gutt. 2.
MDS. 2stl. ein Esslöffel.
(NB. Emuls. ol. ric. besteht aus: 2 Th. Ol. ricini, 1 Th. Gummi arabic. und 14 Th. Wasser.)

73.
Aloës pulv. 1,5.
Sapon. medicat. 1,5.
Extr. liquorit. q. s. ut f. pil. Nr. 30.
Consp. Lycopod.
DS. Abends 2—3 Stück (gehind abführend).

74.
Aloës pulv. 1,0.
Pulv. rad. rhei 1,0.
Sapon. jalapin. 1,0.
Extr. liquorit. q. s. ut f. pil. Nr. 30.
Consp. Lycopod.
DS. 3 Mal tägl. 2 Pillen.
(NB. Sapo jalapin. ist ein Gemisch von gleichen Theilen Jalapenharz u. Sapo medicat.)

75.
Aloës pulv. 1,0.
Sapon. jalapin. 1,0.
Ferri hydrogen. reduct. 1,0.
Extr. liquorit. q. s. ut f. pil. Nr. 30.
Consp. lycopod.
DS. 3 Mal tägl. 1—2 Pillen.

76.
Extract. Belladonnae 0,5.
(eventuell mit Aloë pulv. 1,5.)
Extr. liquorit. q. s. ut f. pil. Nr. 30.
Consp. lycopod.
DS. 3 Pillen tägl.

77.
Podophyllini 0,5.
Extr. liquorit. q. s. ut f. pil. Nr. 30.
Consp. lycopod.
DS. Abends 2—3 Pillen.
(Mildes Laxans.)

78.
Podophyllotoxin. 0,05.
Spirit. vini (70%) 5,0.
MDS. Abends 10—30 Tropfen in Zuckerwasser z. n. Kindern 5—10 Tropfen.

79.
Pulv. Liquirit. composit. 30,0.
DS. 3 Mal tägl. ein Theelöffel z. n. Kindern 3 Mal tägl. eine Messerspitze.
(NB. Pulv. liquorit. comp. enthält: 2 Th. fol. Sennae pulv., 2 Th. rad. liquorit. pulv., 1 Th. sem. foeniculi pulv., 1 Th. sulfur depurat., 6 Th. sachar. alb.)

80.
Infus. Sennae salin. 150,0.
DS. 3—4 Mal tägl. ein Essl.
(NB. Inf. Sennae salin. enthält: 11 Th. Aufguss von Sennesblättern (1:10), 1 Th. Natr. sulf., 1 Th. Mel. depurat.)

81.
Cort. Rhamni frangul. 60,0.
DS. Ein Theelöffel auf ein Glas Wasser zur Hälfte eingekocht. Auf ein Mal zu trinken.

82.
Tinct. Rhei aquos. 20,0—60,0.
DS. 3 Mal täglich 30 Tropfen.
(Kindern als Tonicum u. Di-

gestivum).—3stündl. ein Theelöffel bis zur Wirkung. (Kindern als Purgans.)
(NB. Tinct. Rhei aquos. ist eine Maceration aus 10 Th. rad. rhei, 1 Th. Kali carbon., 1 Th. Borax, 85 Th. Aq. dest., 10 Th. Spiritus, 15 Th. Aq. Cinnamom.)

83.
Emuls. oleos. 150,0.
Acid. salicylic. 0,5.
(event. Tr. opii spl. gutt. 10—20.)
MDS. 2stündl. ein Essl., Kindern theelöffelweise.
(NB. Emuls. oleos. besteht aus: 2 Th. Mandelöl, 1 Th. Gummi arabic. u. 14 Th. Wasser.)

84.
Sulfur. depurat. 10,0.
Kali bitartaric. 10,0.
Sachar. alb. 10,0.
Ol. foeniculi gutt. 10.
M. f. pulv.
DS. Morgens u. Abends ein Theelöffel. (Hämorrhoidalbeschwerden.)

85.
Kalii bitartaric. s. Cremor tartari 30,0.
DS. Theelöffelweise in Wasser z. n. (Temperans.)

86.
Pulv. aërophorus s. effervescens: Natr. bicarb. pulv. 2,5.
Da in capsula coerulea.
Acid. tartaric. pulv. 2,2.
Da in capsula alba.
S. Nach Verordnung zu nehmen als Brausepulver.

VIII. Adstringentia und Antidiarrhoica.

87.
Tinct. opii spl. 5,0.
DS. 2—4stdl. 5—10 Tropfen.
-
88.
Opii puri 0,03—0,1.
Sachar. alb. 0,5.
M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 6.
S. 2—4stdl. ein Pulver.
-
89.
Tinct. opii spl. 5,0.
Tinct. nuc. vomic. 3,0.
Liq. anodyn. Hoffmanni 12,0.
(oder auch Tinct. Valerian.
aether. 12,0.)
MDS. 3 Mal tägl. 10—20 Tr.
-
90.
Magister. Bismuth. 0,3.
Sachar. alb. 0,2.
(eventuell Opii puri 0,03.)
M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 6.
S. 3 Pulver tägl.
-
91.
Plumb. acetic. 0,05.
Opii puri 0,03.
Sachar. alb. 0,5.
M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 6.
S. 3 Mal tägl. ein Pulver.
-
92.
Argent. nitric. 0,2.
Aq. dest. 130,0.
Glycerini 20,0.
MDS. 3stdl. ein Esslöffel, Kin-
dern theelöffelweise.
(NB. Im Dunkeln aufzubewah-
ren oder in vitro nigro zu
verschreiben.)
-
93.
Tannini 1,0—1,5.
Tinct. opii spl. 1,0—1,5.
Aq. dest. 130,0.
Syrup. spl. 20,0.
MDS. 2stdl. ein Essl. Vor dem
Gebrauch umschütteln!

94.
Acid. tannic. 0,1—0,2.
Sachar. alb. 0,4.
M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 6.
S. 3 Pulver täglich.

95.
Decoct. rad. Ratanhae 10,0:130,0.
Syrup. spl. 20,0.
(event. mit Tinct. opii spl. 1,0.)
MDS. 2ständl. ein Esslöffel.

96.
Decoct. rad. Colombo 10,0:130,0.
Syrup. spl. 20,0.
(ev. mit Tinct. opii spl. gutt. 15.)
MDS. 2stdl. ein Essl.

97.
Naphthalini purissim. 0,3—0,5.
D. tal. dos. Nr. 10.
S. 3—5 Pulver tägl. in Obl. z n.

98.
Kreosoti gutt. 5.
Aq. dest. 40,0.
Syrup. Aurant. 10,0.
MDS. 2stdl. ein Theelöffel.

99.
Calomel. 0,006.
Sachar. alb. 0,3.
Ol. foeniculi gutt. 1.
M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 6.
S. 3 Mal täglich ein Pulver
(Säuglingen).

100.
Calomel. 0,01.
Sachar. alb. 0,5.
Tinct. opii spl. gutt. 1.
M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 6.
S. 3 Pulver tägl. (Kindern im
2. u. 3. Lebensjahr).

IX. Stomachica u. Amara.

101.

Tinct. Chinae comp. 20,0.
 DS. 3 Mal tägl 20—30 Tropf.
 in Wasser od. Wein z. n.
 (NB. aus Cort Chinae fusc.,
 rad. Gentianae, cort. Aurant.
 bereitet.)

102.

Tinct. amarac 20,0.
 DS. ebenso.
 (NB. aus fruct. Aurant, herb.
 Centaur. minor., rad. Gentian.,
 rhizom. Zedoariae bereitet.)

103.

Tinct. Gentianae 20,0.
 Acid. muriat. dil. 10,0.
 MDS. 3 Mal tägl. 20—30 Tr.
 eine Stunde nach dem Essen
 in einem Spitzglase Wasser z. n.

104.

Acid. muriat. dil. 10,0.
 DS. 5—10 Tropfen eine Stunde
 nach den Mahlzeiten in Was-
 ser z. n.

105.

Pepsin. germanic. 2,0.
 Acid. muriat. dil. 1,0.
 Aq. dest. 40,0.
 Syrup. spl. 10,0.
 MDS. Nach den Mahlzeiten ei-
 nen Theelöffel in Wasser z. n.

106.

Cort. Condurango 15,0.
 Infund. aq. frigid. 250,0 macera
 per horas 12, deinde coque
 usque ad remanent. 130,0 adde
 Syrup. cort. Aurant. 20,0.
 MDS. 3 Mal tägl. ein Essl.

107.

Tinct. nuc vomic. 5,0.
 Tinct. valerian 15,0
 MDS. 3 Mal tägl. 20 Tropfen.

108.

Magnes. ustae 10,0.
 DS. Messerspitzenweise (saures
 Aufstossen, Sodbrennen).

109.

Pulv. Magnes. c. rheo. 10,0.
 DS. Messerspitzenweise.
 (NB. enthält 4 Th. Magnes.
 carbonic., 1 Th. pulv. rad.
 rhei, 2 Th. Elacosachar. foe-
 niculi. — Hufelandsches Kin-
 derpulver.)

X. Anthelminthica.

110.

Trochisci Santonini (à 0,06) Nr. 6.
 DS. Morgens und Abends ein
 Plätzchen (3 Tage lang zu
 brauchen, hinterher Ol. ricini).

111.

Flor. Cinae pulv. 1,0.
 D. tal. dos. Nr. 6.
 S. 3 Mal tägl. ein Pulver (in
 Honig) z. n., hinterher Ol.
 ricini.

112.

Pulv. rhizomat. filic. maris 2,0.
 Extract. filic. mar. aether. 2,0.
 M. f. massa, ex qua formentur
 pil. Nr. 30.

Consp. lycopod.
 DS. In 2 Parthien zu nehmen.
 4 Std. danach Ol. ricini.
 (vorher Vorbereitungsur!)

113.

Extract. filic. mar. aether. 2,0.
 Mel. despumat. 20,0.
 MDS. In 2 Parthien zu neh-
 men, danach Ol. ricini (Kin-
 dern).

114.

Flor. Kusso 25,0.
 Mel. despumat. q. s. ut f. electuar.
 DS. In 2 oder 3 Portionen
 stündlich zu nehmen. 4 Std.
 danach Ol. ricini.

115.

Cort. rad. Granati pulv. 30,0.
 Infunde aq. frigid. 200,0 macera
 per 12 horas, tum coque us-
 que ad remanent. colaturae
 130,0 adde Syrup. Zingiberis
 20,0.
 MDS. In 2 Portionen z. n.,
 danach Ol. ricini.

XI. Diuretica.

116.

Decoct. baccar. Junip. 15,0: 120,0.
 Liq. Kali acetic. 30,0.
 MDS. 2stdl. ein Essl.
 (NB. Liq. Kali acetici enthält
 c. 33 % essigsäures Kali in
 wässriger Lösung.)

117.

Acet. Scillae 30,0.
 Kali carbonic. q. s. ad saturat.
 Aq. petroselini 100,0.
 Syrup. spl. 20,0.
 MDS. 2stdl. ein Essl.

118.

Calomel. 0,2.
 Sachar. alb. 0,3.
 M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 3.
 S. 3 Pulver im Laufe eines
 Tages (bei Hydrops durch
 Herz- und Lungenkrankhei-
 ten; nach einigen Tagen kann
 die Verordnung wiederholt
 werden.)

XII. Diaphoretica.

119.

Pilocarpin. muriat. 0,05.
 Acid. muriat. dil. 0,5.
 Aq. dest. 75,0.
 Vini lusitanic. 75,0.
 MDS. 2stdl. ein Essl.
 (NB. Wirkung zu controliren,
 bei Herzschwäche zu ver-
 meiden.)

120.

Flor. Chamomillae 30,0 oder

121.

Flor. Tiliae 30,0 oder

122.

Flor. Sambuci 30,0.
 DS. Als Theeaufguss zu be-
 reiten.

123.

Liq. Ammon. acetic. 30,0.
 DS. Ein Esslöffel zu einem
 Glase Kamillen- resp. Linden-
 blüthen- resp. Flieðerthee zu-
 zusetzen und warm zu trinken.
 (NB. enthält 15 % essigsäuren
 Ammoniaks in wässr. Lösung.)

Pilocarpin subcutan cfr Nr. 249.

XII. Bei Erkrankung der Harnorgane gebräuchliche Verordnungen.

124.

Fol. uvae ursi 60,0.
 DS. Als Theeaufguss zu be-
 reiten.

125.

Kali chloric. 3,0.
 Aq. dest. 150,0.
 MDS. 2stdl. ein Essl.

126.

Lithii carbonic. 0,3.
D. tal. dos. Nr. 12.
S. 3 Mal tägl. ein Pulver in
einem Glase Wasser oder
Selterswasser z. n.

127.

Lithii salicylic. 0,3.
D. tal. dos. Nr. 12.
S. ebenso.

Salicylsäure cfr. Nr. 4.
Salol cfr. Nr. 9.

128.

Lupulini 0,3.
Camphorae trit. 0,1.
M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 6.
S. Abends ein Pulver (schmerz-
hafte Erectionen).

XIV. Narcotica und Hyp- notica.

129.

Aq. Laurocerasi 20,0.
Morph. muriat. 0,1.
MDS. 3 Mal tägl. bis 2stdl.
20 Tropfen.
(NB. Statt aq. laurocer. wird
auch aq. amygdalar. amarar.
verschrieben.)

130.

Morph. muriat. 0,01—0,015.
Sachar. alb. 0,5.
M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 6.
DS. Abends ein Pulver (als
Schlafmittel) oder 3 Mal tgl.
ein Pulver.

Morphium subcutan cfr. Nr. 240.
Pulv. Doveri cfr. Nr. 19.

131.

Chlorali hydrati 4,0.
Aq. dest. 25,0.
Syrup. Aurant. 25,0.
MDS. In 2 Portionen innerhalb
einer halben Std. z. n. (bei
Delirium tremens, urämischen
Convulsionen in doppelter
Dosis).

132.

Paraldehydi 6,0.
Aq. dest. 25,0.
Syrup. Aurant. 25,0.
MDS. Ein Essl. (= 2,0 Paral-
dehyd.) halbstündl. bis zur
Wirkung.

133.

Sulfonal. 2,0—3,0.
D. tal. dos. Nr. 3.
S. Abends ein Pulver in Wasser
zu nehmen.

134.

Amylenhydrat 4,0.
Aq. dest. 40,0.
Extr. liquirit. 4,0.
MDS. Schüttelmixtur. In 2 Por-
tionen in $\frac{1}{2}$ Std. z. n.

135.

Kalii bromati 1,0—2,0.
D. tal. dos. Nr. 4.
S. Abends ein Pulver in Was-
ser z. n.

136.

Chloroformii 30,0.
DS. Zu Händen des Arztes.

XV. Roborantia.

137.

Liq. ferri dialysati (Dragen-
dorffii) 30,0.
DS. 3 Mal tägl. 20—30 Trpf.
in Wasser od. Zuckerwass. z. n.

138.
Tinct. ferri pomat. 30,0.
DS. ebenso.

139.
Tinct. ferri chlorati aetheraeae
Bestusheffii 20,0.
DS. 3 Mal tägl. 20 Tropfen.

140.
Ferri sulfuric. 4,0.
Kalii carbonic. 4,0.
Extr. liquirit. q. s. ut f. boli Nr 30.
Consp. lycopod.
DS. 3 Mal tägl. 2 Stück z. n.
(Blaudsche Pillen)
(NB. setzt sich zu ferrum carbonicum und Kali sulfur. um.)

141.
Ferri hydrogen. reduct. 0,1.
Sachar. alb. 0,4.
M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 12.
S. 3 Pulver tägl. (Kindern).

142.
Ferrum lactic. ebenso zu verschreiben.

143.
Ferri hydrogen. reduct. 2,0.
Acid. arsenicos. 0,06.
Extr. liquirit. q. s. ut f. pil. Nr. 30.
Consp. lycopod.
DS. 3 Pillen tägl.

144.
Tinct. ferri pomat. 15,0.
Tinct. chinae comp. 15,0.
MDS. 3 Mal tägl. 30 Tropfen.

145.
Tinct. ferri pomat. 15,0.
Tinct. Valerian. 15,0.
MDS. 3 Mal tägl. 30 Tropfen.

146.
Ferri hydrogen. reduct. 2,0.
Chinini sulf. 2,0.
Extr. liquirit. q. s. ut f. pil. Nr. 30.
Consp. lycopod.
DS. 3 Mal tägl. 2 Pillen.

XVI. Analeptica.

147.
Camphorae trit. 0,1.
Gummi arabic. pulverat. 0,4.
M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 6.
S. 3—2stdl. ein Pulver.

148.
Camphorae trit. 1,0.
Aether sulfuric 10,0.
MDS. 3—2stdl. 20 Tropfen in
Wein z. n.

149.
Aether. sulfuric. 15,0 oder

150.
Aether. acetic. 15,0.
DS. 3—6 Mal tägl. 10 Tropf.
auf Zucker z. n.

151.
Spirit. aether. Hoffmanni 15,0.
DS. 3—6 Mal tägl. 10—20 Tr.
auf Zucker z. n.
(NB. Spirit. aether. s. Liq. anodynus Hoffmanni enthält:
1 Th. Aether u. 3 Th. Spirit. vini alcoholisat. (95%).)

152.
Tinct. Valerian. aether. 15,0.
DS. 3—6 Mal tägl. 10—20 Tr.
(NB. enthält: 4 Th. Spirit. vini rectificatiss. (90%) u. 2 Th. Aether auf 1 Th. radix Valerianae.)

153.
Tinct. Valerian. aether. 10,0.
Aq. dest. 130,0.
Syrup. spl. 20,0.
MDS. 2stdl. ein Essl.

154.
Vini lusitanic. facticii 180,0.
DS. 2stdl. ein Essl.
(NB. enthält 20% Alkohol, u.
Syrup. oxycocci mit essentia
Ananas. parfümirt.)
Die Bezeichnung Vin. lusitanic.
factic. ist nicht officinell, son-
dern nur in der Dorpater
Klinik gebräuchlich.)

XVII. Nervina.

155.
Kalii bromati 4,0 - 10,0.
Aq. dest. 150,0.
MDS. 3 Mal tägl. ein Essl.

156.
Camphor. monobromat. 0,2.
Sachar. lact. 0,3.
M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 6.
S. 3 Pulver tägl.

157.
Natrii bromati 2,0 - 5,0.
Ammon. bromat. 2,0 - 5,0.
Aq. dest. 150,0.
MDS. 3 Mal tägl. ein Essl.

158.
Coffeini puri 0,1.
Sachar. alb. 0,4.
M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 6.
S. 3 Pulver täglich.

159.
Argent. nitric. 0,6.
Extr. liquirit. q. s. ad pil. Nr. 30.
Consp. lycopod.
DS. 3 Mal tägl. eine Pille vor
dem Essen z. n.

160.
Extr. secal. cornuti (s. Ergo-
tinum Bonjeani) 3,0.
Pulv. rad. liquirit. q. s. ad pil.
Nr. 30.
Consp. lycopod.
DS. 3-6 Pillen tägl.

161.
Atropini sulf. 0,01.
Extr. liquirit. et pulv. rad. li-
quirit. q. s. ut f. pil. Nr. 20.
Consp. lycopod.
DS. 1-3! Pillen tägl. (Epi-
lepsie).

162.
Solut. arsenical. Fowleri 5,0.
Aq. Menthae 10,0.
MDS. 3 Mal tägl. 6-15 Trpf.
nach den Mahlzeiten z. n.
(NB. Solut. arsenical. Fowleri
s. Liq. Kali arsenicosi ent-
hält: 1 Th. arsenige Säure
in 100 Th. Flüssigkeit. Vor-
sicht beim Gebrauch! allmäh-
lich die Dosis steigern.)

163.
Zinc. oxydat. (s. flor. Zinci) 4,0.
Sachar. alb. 16,0.
M. f. pulv.
DS. 3 Mal tägl. eine Messer-
spitze (= 0,1 Zinkoxyd pro
dosi).

164.
Zinc. valerianic. 1,5.
Extr. liquirit. q. s. ad pil. Nr. 30.
Consp. lycopod.
DS. 3 Mal tägl. eine Pille.

165.
Tinct. Valerianae 30,0.
DS. 3 Mal tägl. 30 Tropfen.

166.
Tinct. Asae foetid. 15,0.
Tinct. Valerianae 15,0.
MDS. 3 Mal tägl. 30 Tropfen.

167.

Magister. Bismuthi 2,0.
 Asae foetidae 2,0.
 Extract. Valerianae q. s. ut f.
 pil. Nr. 30.
 Consp. lycopod.
 DS. 3 Mal tägl. 2 Pillen (hy-
 sterische Cardialgien).

XVIII. Resorbentia.

168.

Kalii iodati 3,0.
 Aq. dest. 150,0.
 MDS. 3—5 Mal tägl. ein Essl.

169.

Syrup. ferri iodati 15,0.
 DS. 3 Mal tägl. 10—30 Trpf.
 in Wasser od. Zuckerwasser z. n.

170.

Syrup. ferri iodati 10,0.
 Aq. dest. 130,0.
 Syrup. spl. 20,0.
 MDS. 3 Mal tägl. ein Essl

171.

Aether. phosphorat 2,0.
 Ol. jecor. aselli 100,0.
 MDS. 2 Mal tägl. ein Thee-
 löffel; allmählich die Dosis
 steigern. Rachitis.
 (NB. Aether. phosphorat, ent-
 hält 1 Th. Phosphor in 200
 Th. Aether.)

172.

Ol. jecor. aselli 150,0.
 DS. 1—3 Essl. tägl.

173.

Ol. jecor. aselli 150,0.
 Aether. sulf. 2,0.
 MDS. 1—3 Essl. tägl.

XIX. Suppositoria.

174.

Butyr. Cacao 2,0.
 Extr. Belladonnae 0,03.
 M. f. massa ex qua formetur
 suppositorium.
 D. tal. suppositor. Nr. 4.
 S. Nach Verordnung (2 Stück
 täglich).

175.

Wie extr. Belladonn. kann auch
 Tannin 0,2; Extract. hyos-
 cyami 0,03; Opium purum
 0,03 pro suppositoio ver-
 schrieben werden.

**XX. Aeusserliche Verord-
nungen.**

176.

Ol. terebinth. rossic. 30,0.
 Ol. olivar. 30,0
 MDS. Einreibung.

177.

Ungt. Veratrini 20,0.
 DS. Einreibung.
 (NB. enthält 1 Th. Veratrin auf
 90 Th. Fett.)

178.

Chloroformii 10,0.
 Ol. olivar. 40,0.
 MDS. Einreibung.

179.

Spirit. saponat. 100,0.
 DS. Einreibung.
 (NB. enthält c. 1 Th. Kaliseife
 in 4 Th. verdünnten Spiritus,
 ist nicht officinell.)

180.

Spirit. camphorat. 60,0.
 DS. Einreibung.
 (NB. enthält 1 Th. Kampher in
 12 Th. verdünnten Spiritus.)

181.
Spirit. sinapis 60,0.
DS. Aeusserlich.
(NB. enthält 1 Th Senföl in
24 Th. Spiritus.)
182.
Spirit. sinapis 50,0.
Spirit. saponat. 50,0.
MDS. Einreibung.
183.
Liniment. volatil. 60,0.
DS. Einreibung.
(NB. Ammoniakseife aus 1 Th.
Liq. Ammon caust u 3 Th.
Provenceröl.)
184.
Liniment. saponato - camphorat.
(s Opodeldoc) 60,0.
DS. Einreibung
(NB. enthält in der Hauptsache
Natronseife, Kampfer, Am-
moniak und Spiritus.)
185.
Pulv. sinapeos nigr. 60,0.
DS. Zum Senfpflaster.
186.
Emplastr. Cantharidum ordinar.
extens. magnitudine volae ma-
nus (od. folio allato aequatum)
DS. Nach Verordnung
(NB. enthält 1 Th. gepulverte
Canthariden in 3 Th. Pflaster-
masse Bewirkt in 8—12 Stun-
den Blasenbildung.)
187.
Collodii cantharidati 15,0.
DS. Auf die Haut aufzupinseln.
188.
Jodoformii 2,0.
Collodii elastic. 20,0.
MDS. Zum Aufpinseln.
189.
Kalii jodati 3,0.
Axung. porci 30,0.
Tinct. jodi gutt. 30.
M. f. ungt.
DS. Zum Einreiben.
190.
Tinct. jodi 10,0.
Tinct. gallar. 10,0.
MDS. Zum Aufpinseln.
191.
Aq. plumbi 160,0.
DS. Aeusserlich (oder zu Um-
schlägen).
(NB. enthält 1 Th. basisch es-
sigsäures Bleioxyd in 49 Th.
Wasser.)
192.
Aq. Goulardi 100,0.
DS. Ebenso
(NB. enthält 1 Th. basisch es-
sigsäures Bleioxyd in 45 Th.
Wasser u 4 Th Spirit. vini.)
193.
Ol. Carbol. (5%) 30,0.
DS. Aeusserlich.
194.
Zinc oxydat. 10,0.
Amyli trit. 10,0.
M. f. pulv. DS. Streupulver.
195.
Talc. venet. 20,0.
DS. Streupulver.
196.
Acid salicylic. 5,0.
Amyli trit. 95,0.
M. f. pulv. DS. Streupulver.
197.
Vaselini 20,0.
DS. Aeusserlich.

198.
Ungt. simpl. 30,0.
DS. Aeusserlich.
(NB. 3 Th. Olivenöl, 1 Th.
Wachs zusammengeschmolzen.
Wachssalbe.)
-
199.
Ungt. Zinci 30,0.
DS. Aeusserlich.
(NB. enthält 1 Th. Zinkoxyd
auf 8 Th. Fett u. 1 Th. Wachs.)
-
200.
Hydrarg. praecipitat. alb. 2,0.
Vasellini od. Axung. porci 20,0.
M. f. ungt. DS. Aeusserlich.
-
201.
Acid. boric. 3,0.
Vasellini 30,0.
M. f. ungt. DS. Aeusserlich.
-
202.
Lanolini 10,0.
Aq. dest. 5,0.
M. adde Vasellini 5,0.
M. f. ungt. DS. Aeusserlich.
(NB. Diese Salbe kann auch
als Grundmasse für andere Sal-
ben an Stelle von Schweinefett
oder Vaseline benutzt werden;
ist als s. g. unguent. lanolini
nicht officinell.)
-
203.
Emplastr. litharg. simpl. (oder
Emplastr. diachylon) 30,0.
DS. Aeusserlich.
(NB. 1 Th. Bleioxyd mit 1 Th.
Baumöl und 1 Th. Schweine-
fett zur Pflastermasse verscift.)
-
204.
Emplastr. adhaesiv. extens. la-
titudine 20 Cmtr. longitudine
5 und mehr Cmtr.
DS. Nach Verordnung aufzu-
kleben.
(NB. ist emplastr. litharg. simpl.
mit Zusatz von Colophonium.)
-
205.
Emplastr. litharg. simpl. 15,0.
Ol. olivar. 15,0.
M. f. ungt. DS. Aeusserlich.
(Ungt. diachylon Hebrae.)
-
206.
Chrysarobini 5,0.
Vasellini 20,0.
M. f. ungt. DS. Aeusserlich.
-
207.
Ol. rusci (od. Picis liquid.) 15,0.
Spir. vini 15,0.
MDS. Aeusserlich.
-
208.
Ol. cadini od. Ol. empyreuma-
tic. Juniperi 5,0
Ol. olivar. 25,0.
MDS. Aeusserlich (Theeröl).
-
209.
Ol. cadini 5,0.
Ungt. diachyl. Hebrae 25,0.
M. f. ungt. DS. Aeusserlich.
-
210.
Picis liquid. 10,0.
Flor. sulfuris 10,0.
Sapon. virid 20,0.
Vasellini 20,0.
M. f. ungt. DS. Aeusserlich.
(Wilkinson'sche Salbe modificirt
von Hebra.)
-
211.
Sapon. virid. (s. sapon. Kalin.
nigr.) 30,0—60,0.
DS. Aeusserlich od. Einreibung.
(NB. Kalilauge mit Hanföl oder
Leinöl verseift.)
-
212.
Sulfur. praecipitat. 3,0.
Axung. porci od. Ungt. lano-
lini 30,0.
M. f. ungt. DS. Aeusserlich.

213.
Sulfur. praecipit. 10,0.
Aq. Laurocer. 10,0.
Aq. Calcis 50,0.
MDS. Der Bodensatz Abends
aufzupinseln.

214.
Solution, Vleminckx 100,0.
DS. Aeusserlich.
(NB. Enthält Fünffach-Schwe-
felcalcium und unterschweflig-
sauren Kalk in Wasser gelöst.)

215.
Hydrarg. bichlorat. corrosiv. 0,3.
Spirit. vini (70%) 30,0.
MDS. Aeusserlich (sub signo
veneni).

216.
Balsam. peruvian. 10,0.
Spirit. vini rectific. (70%) 20,0.
MDS. Einreibung.

217.
Petroleū 100,0.
DS. Aeusserlich (gegen Kopf-
läuse).

218.
Acid. salicylic. pulv. 2,0.
Tinct. Benzoës 3,0.
Ol. olivar. 100,0.
MDS. Haaröl.

219.
Tinct. capsic. 20,0.
Aq. dest. 30,0.
Spirit. vini (70%) 30,0.
MDS. Aeusserlich (Alopecia
areata)

220
Ungt. hydrarg. ciner. 10,0.
DS. Aeusserlich, od Einreibung.
(NB. Enthält 1 Th. Queck-
silber auf 2 Th. Fett.)

221.
Zinc. sulf. 1,0.
Aq. dest. 100,0.
MDS. Verbandwasser.

222.
Liq. ferri sesquichlorat. 5,0.
DS. Aeusserlich.
(NB. Enthält c. 30% Eisen-
chlorid in wässriger Lösung.)

223.
Liniment. calcarei 100,0.
DS. Zum Verbands (Verbren-
nungen).
(NB. Besteht aus gleichen Thei-
len ol. lini und aq. calcis.)

224.
Jodoformii 1,0.
Vasellini 10,0.
M. f. ungt DS. Aeusserlich.
(ulcus molle etc.)

225.
Injectionen in die Harnröhre:
a) Zinc. sulfuric. 0,3:100,0.
b) Zinc. sulfocarbolic. 0,3:100,0.
c) Kali hypermanganic.
0,3:100,0.
d) Hydrarg. bichlorat. corrosiv.
0,01:100,0.
Alle in wässriger Lösung.
DS. Einspritzung in die Harn-
röhre.

226.
Blasenausspülungen:
a) Argent. nitric. 1,5:500,0.
b) Resorcin. 15,0:500,0.
c) Kalii chloric. 15,0:500,0.
Alle in wässriger Lösung.
DS. Zur Blasenausspülung.

227.
Kalii sulfurat. pro balneo 100,0.
D. tal dos. Nr. 3.
S. Ein Päckchen zu einem
Bade zusetzen.

228.

Pulv. dentifric. camphorat. 20,0.
 DS. Zahnpulver.
 (NB. Enthält 2 Th. Camphor.
 trit., 2 Th. Balsam. vitae
 Hoffman., 50 Th. Calcar. car-
 bonic praecipit., 3 Th. Magnes.
 carbonic, 10 Th. pulv. rad. Iridis
 florent. — Ist nicht officinell.)

229.

Argent. nitric. fus 2,0.
 DS. Zu Handen des Arztes.

230.

Acid. chromic. 5,0.
 Aq. dest. 5,0.
 MDS. Aeusserlich (zum Beizen
 von Warzen etc.).

231.

Chloral. hydrat. 3,0.
 Camphorae 3,0.
 Ol. menthae piperit. 0,5.
 MDS. Zahntropfen
 (Guttae odontalgicae, auf Watte
 in den hohlen Zahn zu thun.)

XXI. Antisyphilitica.

cf. Nr. 168, 170, 100.

232.

Ungt. hydrarg. ciner. 4,0
 Da in chart. cerat.
 tal. dos. Nr. 6.
 S. täglich ein Päckchen einzu-
 reiben.

233.

Ungt. hydrarg. ciner. 1,0.
 DS. Ebenso (Kindern).

234.

Emplastr. hydrargyri extens la-
 titudine 20 cmtr., longitudine
 5 cmtr.
 DS. Aeusserlich.
 (NB. Enthält 1 Th. Quecksilber
 in 4 Th. Heftpflastermasse;
 auch Emplastr. mercuriale ge-
 nannt.)

235.

Hydrarg. bichlorat. corrosiv. 0,2.
 Natr. chlorat. 2,0.
 Aq. dest. 20,0.
 MDS. Zur subcutanen Injection.

236.

Calomel. via sicca parat. 1,0.
 Ol. provincial. 10,0.
 MDS. Ebenso.

237.

Hydrarg. oxydulat nigr. 1,0.
 Ol. provincial. 10,0.
 MDS. Ebenso.

238.

Hydrarg. oxydulat. tannic. 3,0.
 (eventuell Opii puri 0,3.)
 Extr. liquirit. q. s. ut f. pil. Nr. 30.
 Consp. lycopod.
 DS. 3 Mal tägl. eine Pille.

239.

Hydrarg. jodat. flav. 1,0.
 Opii puri 0,3.
 Extr. liquirit. q. s. ut f. pil. Nr. 30.
 Consp. lycopod.
 DS. Ebenso.

240.

Calomel. vapore parat. 10,0.
 DS. Aeusserlich (auf syphilit.
 Papeln aufzupulvern).

241.

Hydrarg. bichlorat. corrosiv.
 0,25—1,0.
 Aq. dest. 25,0.
 MDS. Aeusserlich. Zu Handen
 des Arztes

XX. Mittel zur subcutanen Injection.

Dieselben sind stets zu Handen
 des Arztes zu verschreiben
 und nicht den Kranken zum
 eignen Gebrauch zu überlassen!

242.
Morph. muriat. 0,1.
Aq. dest. 10,0.
MDS. Zur subcutanen Injection
($\frac{1}{2}$ bis eine Spritze p. dosi).

243.
Atropini sulfuric. 0,01.
Aq. dest. 10,0.
MDS. Ebenso.
($\frac{1}{2}$ bis eine Spritze p. dosi.
— Bei Bluthusten 3stündl.
30 Theilstriche der Spritze
bis 0,002 p. die.)

244.
Apomorphini muriat. 0,1.
Aq. dest. 10,0.
MDS. Ebenso.
($\frac{1}{2}$ bis eine Spritze p. dosi.)

245.
Camphorae trit. 1,0.
Ol. amygdalar. dulc. 10,0.
MDS. Ebenso.

246.
Strychnini nitric. 0,05.
Aq. dest. 10,0.
MDS. Ebenso.
($\frac{1}{2}$ bis eine Spritze pro dosi.)

247.
Extract. Secalis cornuti (s. Er-
gotini Bonjeani) 1,0.
Aq. dest. 10,0.
Thymol 0,01.
MDS. Ebenso.
($\frac{1}{2}$ bis eine Spritze p. dosi.)

248.
Liquor Kali arsenicosi 5,0.
Aq. dest. 10,0.
MDS. Zur subcutanen Injection.
(30—50 Theilstriche der Spritze
1—2 Mal täglich.)

249.
Pilocarpini muriat. 0,2.
Aq. dest. 10,0.
MDS. Ebenso.
($\frac{1}{2}$ bis eine Spritze pro dosi.)

ctr. NNr. 235, 236, 237.

Maximaldosen

einiger stark wirkender Mittel nach der Russischen Pharmacopöe.

NB. Die mit einem Stern (*) bezeichneten Mittel sind in der Russischen Pharmacopöe nicht enthalten.

	pro dosi	pro die
Acidum arsenicosum . . .	0,005	0,01
Acidum carbolicum cryst. . .	0,045	0,12
*Agaricinum	0,01	0,02
Ammonium bromatum . . .	2,0	8,0
*Amylenhydrat	5,0	—
Amylium nitrosum	1 Tropfen	6 Tropfen
*Apomorphinum muriat. . . .	0,01	0,05
Aqua amygdalar. amar. . .	2,0	8,0
Argent. nitric. cryst. . . .	0,03	0,18
Atropinum sulfuric.	0,001	0,003
Camphora bromata	0,36	1,25
Chloralum hydrat. cryst. . .	5,6	15,0
Chloroformium	1,5	4,0
Coffeinum purum	0,1	0,5
Cuprum sulfuric. (als Brech- mittel) von	0,18 bis 0,6	
Extract. Aconiti (tuberum)	0,02	0,1
„ Belladonnae	0,06	0,24
„ Hyoscyami	0,12	0,6
„ Secalis cornuti	0,3	1,0
Folia Digitalis (als Pulver)	0,18	0,56
Hydrarg. bichlorat. corrosiv.	0,03	0,06
„ chlorat. mite	0,6	2,0
„ jodatum flavum	0,12	0,36
Kalium bromatum	5,0	15,0
„ jodatum	2,0	8,0
Kreosotum	0,06	0,3
Liquor Kali arsenicosi	5 Tropfen	15 Tropfen
Morphium muriat.	0,03	0,12
*Nitroglycerinum	0,001	0,003
Natrium bromatum	5,0	15,0
Opium purum	0,12	0,36
*Paraldehydum	10,0	—

auf mehrere Einzel-
dosen vertheilt.

	pro dosi	pro die
*Phenacetin	3,0	
Phosphorus	0,003	0,005
*Pilocarpin. muriat.	0,03	0,06
Plumbum acetic.	0,06	0,24
Podophyllum	0,06	0,36
*Podophyllotoxinum	0,015	0,03
Resina Jalapae	0,18	0,50
*Salolum	1,0	8,0
Santoninum	0,18	0,36
Sapo jalapin.	0,36	0,72
Secale cornut. pulv.	0,6	4,0
Syrup. ferri jodati	4,0	12,0
Stibio - Kali tartaric. (als Breachmittel)	0,18	0,72
Strychninum nitric.	0,006	0,018
*Sulfonal	4,0	—
*Tinct convallar. majal.	15 Tropfen	45 Tropfen
.. Digitalis	15 "	45 "
.. nuc. vomic.	15 "	45 "
.. opii spl.	10 "	30 "
.. Stramonii	15 "	45 "
* .. Strophanti sem.	10 "	40 "
Vinum Ipecacuanh.	30 "	90 "
.. stibiatum	30 "	90 "
Zincum valerianic.	0,6	0,18

Obige Maximaldosen sind für Erwachsene berechnet. Kindern und Minderjährigen müssen entsprechend geringere Gaben verordnet werden und zwar giebt man im Allgemeinen

Kindern bis zu 1 Jahr	$\frac{1}{20}$	bis $\frac{1}{10}$	der für Erwachs. bestimmten Dosis
" " 3 "	$\frac{1}{8}$	" "	" "
" " 5 "	$\frac{1}{6}$	" "	" "
" " 8 "	$\frac{1}{4}$	" "	" "
" " 11 "	$\frac{1}{3}$	" "	" "
" " 15 "	$\frac{1}{2}$	" "	" "
Jugendl Individuen			
bis zum 20. Jahr	$\frac{3}{4}$	" "	" "

I n d e x.

A.

- Acetum Scillae 117.
Acidum arsenicosum 143.
 „ benzoicum 31.
 „ boricum 45. 201.
 „ carbolicum 43. 44. 193.
 „ chromicum 230.
 „ citricum 13.
 „ muriaticum dilutum 11. 103. 104.
 „ phosphoricum dilutum 12.
 „ salicylicum 4. 196. 218.
 „ tannicum 43. 49. 93. 94. 175
Aconiti tubera cfr. Extract. Aconiti.
Adonis vernalis. (herba Adonidis vernal.) 56.
Aether aceticus 150.
 „ phosphoratus 171.
 „ sulfuricus 148. 149.
Agaricinum (Harz aus Agaricus albus) 42
Aloë 73. 74. 75.
Alumen 43.
Alumina acetica soluta 50.
Ammonium aceticum solutum cfr. Liq. Ammon. acetic.
Ammonium bromatum 37. 157.
Ammonium causticum solutum cfr. Liq. Ammon caust.
Ammonium muriaticum 22.
Amylenhydrat 134.
Amylum tritici 46. 194. 196.
Amylnitrit 60.
Antifebrinum 8.
Antipyrinum 7.
Apomorphinum muriaticum 21. 244.

D.

Digitalis folia 51. 52. 53, siehe auch tinct. Digital.

E

Elixir pectorale 15.

Emplastrum adhaesivum 204.

„ cantharidatum 186.

„ diachylon 203.

„ hydrargyri 234.

„ lithargyri simplex 203.

„ mercuriale 234.

Emulsio olei ricini 72.

„ oleosa 83.

Ergotinum Bonjeani 160. 247.

Extractum Aconiti tuberum 36.

„ Belladonnae 35. 76. 174.

„ Filicis maris aethereum (Wolmarensis) 113.

„ Hyoseyami 175.

„ Liquiritiae 22

„ Secalis cornuti 160. 247.

„ Valerianae 167.

F.

Filix mas (rhizoma filicis maris) 112, siehe auch:

Extr. filic. mar. aether.

Ferrum carbonicum 140.

„ lacticum 142.

„ hydrogenio reductum 75. 141. 143. 146, cfr.

auch: Liq. ferri dialysati, Liq. ferri sesquichlo-

rati, syrupus ferri jodati, Tinct. ferri chlorat

aether. und Tinct. ferri pomata

G.

Gallae turcicae cfr. tinct. Gallar.

Gentianae radix cfr. tinct. Gentianae.

Glycyrrhizae radix cfr. Liquiritiae radix.

Guajacol 41.

Guttae odontalgicae 231.

H.

- Hydrargyrum bichloratum corrosivum 49. 215. 225.
 235. 241.
 Hydrargyrum chloratum mite: 64. 99. 100. 118. 236. 240.
 " jodatum flavum 239.
 " oxydulatum nigrum 237.
 " oxydulatum tannicum 238.
 " praecipitatum album 200.
 Hyosciami herba cfr. Extr. Hyosciami.

J.

- Jaborandi folia cfr. Pilocarpin. muriat.
 Jalapae resina und Jalapae tubera cfr. Sapo jalapin.
 Jodoformium 45. 188. 224.
 Jodum purum 49 cfr. auch Tinct. Jodi.
 Ipecacuanhae radix 17. 61, cfr. auch vinum Ipecac.
 Juniperi baccae 116.

K.

- Kali aceticum cfr. liquor Kalii acetic.
 " arsenicosum cfr. liquor Kalii arsenicosi.
 " bitartaricum (depuratum) 84. 85.
 Kalium bromatum 135. 155
 Kali chloricum 50. 125. 226.
 " hypermanganicum 50. 225.
 Kalium jodatum 168. 189.
 " sulfuratum 227.
 Kreosotum 39. 40. 98.
 Kusso flores 114.

L.

- Lanolinum 202.
 Linimentum calcareum 223.
 " saponato-camphoratum 184.
 " volatile 183.
 Lithion carbonicum 126.
 " salicylicum 127.
 Liquiritiae radix cfr. pulv. liquirit. comp.
 Liquor Ammonii acetici 123.

Liquor Ammonii anisatus 13. 16.
 „ Ammonii caustici 44.
 „ anodynus Hoffmanni cfr. spirit. aether. Hoffm.
 „ ferri dialysati Dragendorffii 137.
 „ ferri sesquichlorati 222.
 „ Kali acetici 52. 116.
 „ Kali arsenicosi 162. 248.
 Lupulinum 128.

M.

Magisterium Bismuthi 90. 167.
 Magnesia carbonica 109.
 „ sulfurica 66
 „ usta 68. 69. 108.
 Morphium muriaticum 23. 129. 130. 242.

N.

Naphthalinum purissimum 97.
 Natrum biboricum 49
 „ bicarbonicum 25. 26. 27. 43. 47. 49.
 Natrium bromatum 157.
 „ chloratum 27. 43. 48.
 Natrum salicylicum 5. 6.
 „ sulfuricum 65.
 Nitroglycerinum 59.
 Nux vomica cfr. Semen Strychni u. tinct. nuc. vomic.

O.

Oleum cadinum = Ol. empyreumatic. Juniperi =
 Wachholdertheer 208. 209.
 Oleum carbolicum 193.
 „ jecoris aselli 172. 173.
 „ rusci = Ol. empyreumatic betulae = Pix li-
 quida betulae = Birkentheer 207.
 Oleum terebinthinae 28. 43. 176.
 Opium 32. 88. 91. 175 cfr. auch tinct. opii simplex.
 Opodeldoc cfr. Liniment. saponato-camphorat.

P.

- Paraldehydum 132.
 Pepsinum germanicum 105.
 Petroleum 217.
 Petroselini aqua 117.
 Phenacetin 10.
 Phosphorus cfr. Aether phosphorat.
 Pix liquida pini = Fichtentheer 207. 210.
 Pilocarpinum muriaticum 119. 249.
 Plumbi aqua 191.
 Plumbum aceticum 29. 32. 91.
 Podophyllum = Resina podophyllii 77.
 Podophyllotoxinum 78.
 Pulvis aërophorus s. effervescens. 86.
 „ dentifricius 228.
 „ Doveri 18.
 „ Liquiritiae compositus 79.
 „ magnesia cum rheo 109.
 Punica Granatum cfr. cort. rad. Granati.

Q.

- Quebracho cortex u. lignum cfr. tinct. Quebracho.
 Quercus cortex 50.
 Quillajae cortex 20.

R.

- Ratanhae radix 95.
 Resorcinum purum crystallisatum 226.
 Rhamni Frangulae cortex 81.
 Rheï radix 70. 74. 109. cfr. auch tinct. rheï aquos.
 Ricini oleum 71. 72.

S.

- Sal Carlsbadense factitium 67.
 Salolum 9.
 Salviae folia 50.
 Sambuci flores 122.
 Santoninum 110.
 Sapo jalapinus 74. 75.
 „ Kalinus niger 210 211.
 „ medicatus 73.

- Sapo viridis = sap. Kalin. nigr. 210. 211.
 Scillae bulbi cfr. acetum Scillae.
 Secale cornutum 33. 34 cfr. auch Ergotinum.
 Senegae radix 14.
 Sennae foia 79. 80
 Sinapis nigra 185.
 Solutio arsenicalis Fowleri cfr. Liq. Kali arsenicosi.
 Solutio Vleminckx 214.
 Spiritus aethereus Hoffmanni 151.
 " camphoratus 180.
 " saponatus 179. 182.
 " sinapis 181. 182
 Stramonii folia cfr. tinct. Stramon.
 Stibium sulfuratum aurantiacum cfr. Sulf. aurat. antimon.
 Stibio-Kali tartaricum = Brechweinstein cfr. Tartarus
 stibiat. und Vinum stibiatum.
 Strophanti semina cfr. Tinct. Strophanti.
 Strychninum nitricum 250.
 Strychni semen = Nux vomica cfr. Tinct. nuc. vomic.
 Sublimat cfr. Hydrarg. bichlorat. corrosiv.
 Sulfonal 133.
 Sulfur auratum Antimonii 23.
 " depuratum = Sulf. sublimatum elotum 84.
 " praecipitatum = Lac. sulfuris 212. 213.
 " sublimatum = Flores sulfuris 210.
 Suppositoria 174. 175.
 Syrupus ferri jodati 169. 170.

T.

- Talcum Venetum 195.
 Tanninum cfr. acid tannic.
 Tartarus stibiatus = Stibio-Kali tart. 61.
 Terebinthinae oleum 28. 43. 176.
 Terpinum hydratum 30.
 Tiliae flores 121.
 Tinctura amara 102.
 " Benzoës 218.
 " Capsici 219.
 " Chinae composita 101. 144.
 " Convallariae majalis 57.
 " Digitalis 54.

Tinctura Ferri chlorata aetherea Bestusheffii 139.
 " Ferri pomata 138. 144. 145.
 " Gallarum 190.
 " Gentianae 103.
 " Jodi 191.
 " Nucis vomicae 89. 107.
 " opii simplex 16. 83. 87. 89.
 " Quebracho 38.
 " Rheī aquosa 82.
 " Stramonii 16.
 " seminum Strophanti 58.
 " Valerianae 107. 145. 165. 166.
 " Valerianae aetherea 152. 153.

U.

Unguenta 177. 189. 197. 198. 199. 200. 201. 202.
 205. 206. 209. 210. 212. 220. 224. 232. 233.
 Unguentum diachylon Hebrae 205.
 " simplex 198.
 " Veratrini 177.
 " Wilkinsonii 210.
 " Zinci 199.
 Uvae ursi folia 124.

V.

Valerianae radix cfr. tinct. Valerian.
 Vaselinum 197
 Veratrinum. Alkaloid aus rhizoma Veratri. cfr. ungt
 Veratrini.
 Vinum Ipecacuanhae 19.
 " Lusitanicum factitium 154.
 " stibiatum 24. 63.

X. Y. Z.

Zincum oxydatum = Flores Zinci 163. 194. 199.
 " sulfocarboicum 225.
 " sulfuricum 43. 221. 225.
 " valerianicum 164.