

FARMATSÖITILINE  
KÄSIRAAMAT

II



N. Veidolysars.




A-7477  
111

# FARMATSÖITILINE KÄSIRAAMAT

II OSA

Koostanud

Dr. pharm. H. Salasoo



---

Ajakirja „EESTI ROHUTEADLASE“ kirjastus  
Tartu 1936

2

Tartu Riikliku Ülikooli  
Raamatukogu

133574



## Eessõna.

Käesolev Farmatsöitilise käsiraamatu II osa on täielikult pühendatud nn. patentravimitele ehk spetsialiteetidele, millised leiduvad meie ravimiteturul. Käsiraamat toob andmeid kõigi praegusel ajal Eesti apteekides, laboratooriumides ja tööstustes valmistatavate ning välismaalistest Eestis tarvitatavamate originaalpakises või kaitstud fantaasia-nimede all müügile tulevate ravimpreparaatide kohta. Iga preparaadi kohta on toodud nimi, mille all see müügil leidub, valmistusasutise nimi ja asukoht, keemiline nimi, kui see olemas ja teada, koostis, tähtsamad omadused, müügivorm, indikatsiooniala ja tarvitamisviis, kusjuures kõikjal, kus see eriti pole märgitud, on annused arvatud täiskasvanuile.

Tervishoiupersonaali hulka kuuluvate kutsete liikmeil on olulise tähtsusega teada ravimpreparaatide koostist, omadusi ja tarvitamisviisi. Seni ei olnud kerge neid andmeid vajaduse korral kiiresti leida. Välismaa käsiraamatud ei suuda ses mõttes pakkuda rahuldust, kuna neis puuduvad Eestis valmistatud preparaadid.

Farmatsöitiline käsiraamat II tahab täita senise lünga, andes teatmeid nii välismaaliste kui ka kodumaaliste preparaate kohta.

Tekstis leiduvate raigusnimede ja ühikute kohta leiduvad raamatu lõpul selgitavad nimestikud, samuti ka preparaate valmistusasutiste täielikud nimed ja asukohad.

Olgu avaldatud südamlikku tänu kõigile asutusile ja isikuile, kes käesoleva II köite koostamisele nõu ja teoga kaasa aidanud ja sellele poolehoidu avaldanud.

Koostaja.



## Sisu.

	lk.
Patentravimite loetelu tähestikulises järjekorras .	7
Tarvitatavamaid ühikuid . . . . .	125
Tekstis esinevate ladinakeelsete väljendiste sõnastik	129
Preparaatide valmistusasuuste nimestik . . . .	135

---

## LÜHENDID.

a. — aasta  
alk. — alkohol  
amp. — ampull  
anorg. — anorgaaniline  
ca. — umbes (circa)  
draž. — dražee  
e. — ehk  
k. — korda  
kaps. — kapsel  
kerge. — kergesti  
K. n. kaitstud nimi  
kt. keemistäpp  
lah. -- lahustub  
l- — laevo-  
m- — meta-  
min. — minut  
mol. — molekulaarne

näd. — nädalas  
o- — orto-  
org. — orgaaniline  
p- — para-  
p. — päevas  
past. — pastill  
pud. — pudel  
pulb. — pulber  
rask. — raskesti  
st. — sulamistäpp  
subst. — substants  
süst. — süstimiseks  
tabl. — tablett  
u. — umbes  
vet. — veterinaar  
vrd. — võrdle  
vt. — vaata

## A.

**Abasin (IG).**

Atsetüülbroomdietüülkarbamiid. Valge, krist. pulb., rask. lah. vees. St. 109<sup>0</sup>. Tabl. 0,25 g. Sedativum. 3 k. p. 1—2 tabl. veega.

**Abrodil (IG).**

Natr. monojodmethansulfonicum. 52% J. Valge, lõhnatu, maitsetu, väga kerg. vees lah. krist. pulb. Subst. ja 40% vesilahus, pud. 50 ccm. Kontrastvahend püelograafias ja vasograafias. Veenisisesi 15—20 ccm või kateetriga põide kuni 80 ccm 20%-st lahust.

**Acedicon (Boehringer).**

Acetyldemetylodihydrothebainum hydrochlor. Mõru, vees lah. pulb. Subst., tabl. 0,01 g ja 0,005 g, amp. 0,01 g. Köha ja hingamisteede ärritusjuhud, mitmesug. põhjusega valud. Köha puhul 2—3 k. p. ½—1 tabl., valude vaigist. ½—1 amp.

**Acetannin.**

Acid. diacetylotannicum. K. n.: Tannigen.

**Acetopyrin (Hell).**

Phenazonum acetylosalicylicum. Valge krist. pulb., lah. külmas vees 1:400. St. 64—65<sup>0</sup>. Antipyreticum, antineuralgicum. 3 k. p. 0,5—1 g.

**Acetosal.**

Acid. acetylosalicylicum. K. n.: Acetylin, Aspirin, Rhodine.

**Acetylarsan (UR).**

Oksüatsetüülamiinofenüülarsiin-dietüülamiin. Amp. 3 ccm (23,6% lahus) täiskasvanuile ja amp. 2 ccm (9,4% lahus) lastele. Lues, spirochaetosis. Nahaalusi ja veenisisesi.

**Acidol (IG).**

Betainum hydrochloricum. Valged, vees kerg. lah. krist. Past. 0,5 g. Soolhappe asendaja subatsiditeedi, düspepsia, kroonil. maokatarri jne. puhul. 0,5 g atsidooli = 5 tilka lahj. soolhapet. 3 k. p. 1—2 past.  $\frac{1}{2}$  kl. veega.

#### Acidol-Pepsin (IG).

Betaiinkloorhüdraadi ja pepsiini segu. Valge või vähe kollakas pulb. Pastillid I (kanged), atsidooli 0,4 g, peps. 0,1 g ja II (nõrgad), atsid. 0,05 g, peps. 0,2 g, piimsuhkr. 0,25 g. 1 past. I = 8 tilka, II = 1 tilk lahj. soolhapet. Pepsinsoolhappelahuse asemel maotegevuse häirete puhul. 1—2 past. vähe veega peale söögi.

#### Acidolamin (IG).

Past. à 1,1 g, siald. 0,8 g atsidooli ja 0,3 g heksamiini. Cystitis, pyelitis, urethritis. Adjuvans gonorröa, meningiidi, sarlakinefriidi jne. puhul. 4—6 k. p. 1 past., lastele 3—4 k. p.  $\frac{1}{2}$ —1 past. suhkruveega. Kuumas vees mitte lahustada!

#### Aconit-Dispert (Krause).

Krause pihustamiseetodi abil kuivatatud akoniidimugula ekstrakt. Tabl. I = 0,05 mg ja II = 0,2 mg akonitiini. Spetsiif. trigeminusneuralgia, migreeni, hambavalu vastu. I. 1—3 k. p. 1 kuni 3—4 k. p. 3—5 tabl.; II. 1—3 k. p.  $\frac{1}{2}$  kuni 3—4 k. p. 1—2 tabl.

#### Actol (Heyden).

Argent. lacticum. Valge, valgustundl. pulb., lah. vees 1:15. Gonorröa ja aseptil. haavaravi. Gonorr. süst. 0,2% lah., haavadele 1:300—2000 või 1% salvina.

#### Acykal (Teichgräber).

Kaaliumhõbetsüaniid. 54,3% Ag. Valge krist. pulb., kerg. lah. vees. Antigonorrhöicicum. Süstimiseks 1:10 000—3000, loputuseks 1:10 000.

#### Adalin (IG).

Broomdietüülatsüülkarbamiid. Valge krist. pulb., rask. lah. külmas vees. Subst., tabl. 0,5 g. Sedativum, hypnoticum. Rahust. vahendina hüsteeria ja neurasteenil. vaevuste puhul  $\frac{1}{2}$ —1 tabl. külma veega; uinutava vahendina 2—3 tabl. kuuma suhkruveega.

#### Adamon (IG).

Dibroomdihüdrotsinnamüülhappe borneoolester. Valge, maitsetu, lõhnatu pulb. Tabl. 0,25 g. Sedativum hüsteeril. ja neurasteenil. vaevuste, menstruatsiooni,

raseduse, klimakteeriumi, seksuaalse ülierutuse jne. puhul. 3—4 k. p. 1—2 tabl.

#### Adovern (Roche).

Sisaldab Adonis vernalis'est eraldatud südamele toimivaid glükosiide loomulikus vahekorras. Tilgad, ivad ja tabl. 1 ccm = 30 tilka = 4 iva = 0,5 g Herba Adon. vern. Cardiotonicum, diureticum. 1—3 k. p. 15—30 tilka või 2—4 iva.

#### Adrecain (Ephag).

Atoksikokaiin-adrenaliin amp. à 1,1 ja 2,2 ccm. 1 ccm = 0,02 g atoksikokaiini, 0,05 g adrenaliini 1:1000 0,002 g naatriumkloriidi ja 0,004 g kaaliumsulfaati. Lokaalanestetikum. Nahaalusi ja musklišisesi.

#### Adrenalin (PD jt.).

o-Dioxyphenylaethanolmethylaminum hydrochlor. Tarvitusel vesilahusena 1:1000. Omab tugevat vere-sooni ahendavat toimet.

#### Adrenalin-Inhalant (PD).

1:1000 adrenaliinhüdrokloriidi lõhnastatud õlilahus 3% kloretooni lisandiga. Hingamisteede haiguste puhul inhalatsiooniks.

#### Adsorgan (Heyden).

Silargel (kloorhõbe-ränihappe-gel) 40, argocarbon (hõbesüsi „Heyden“) 10, magustatud kakaomassi 50. 0,25% Ag. Granuleeritud mass. Adsorbens seedetrakti haiguste, eriti mürgistuste, käärimisnähtude, kõhulah-tisuse, koliidi jne. puhul. Mitu k. p. 1—2 teelusika täit.

#### Aecachinin.

Chininum aethylcarbonicum. K. n.: Euchinin.

#### Aethomorphin.

Aethylmorphinum hydrochloricum. K. n.: Dionin.

#### Afenil (Knoll).

Kaltsiumkloriidi ja karbamiidi kaksikühend. 11,42% Ca ja 68,28% karbamiidi. Amp. 10 ccm = 1 g afeniili. Heinapalavik, astma, urtikaaria, ekseemid, seerumi-eksanteemid, menstruatsiooni korratused, klimakteeril. ja postoperatiivsed verejooksud; skrofuloos, rahhiit, gripp, migreen. Veenisisesi ½—1 amp.

#### Agesulf (Weil).

Kolloidne valkhõbeda sulfosalitsülaat-kompleks-ühend. Subst., 5% kepikesed emaka ja kusiti jaoks,

5 % gloobulid ja 10 % küünlad. Gonorröa, tsüstiit, uretriit. Tarv. erieeskirja järgi.

**Agitanol** (Heyden).

Acid. acetylosalicyl. 25,75%, Calc. salicylic. 8,5%, Calc. lactic. 8,5%, Cacao, amyli q. s. ad 100%. Dražeed. Antipyreticum. 3 k. p. 1 dražee.

**Agobilin** (Gehe).

Stront. cholic. 0,088 g, Stront. salicylic. 0,032 g, Diacetylphenolphthalein. 0,04 g igas tabletis. Cholagogum, choloreticum; sapipõie antiseptikum. 2—3 k. p. 2 tbl. vähe veega peale söögi.

**Agobilin III** — pruunid tabl., ei sisalda diatsetüülfenoolftaleiini. Näidust. ja tarvit. nagu eelmine.

**Agomensine** (PB).

Veeslahustuv corpus luteum'i preparaat. Tabl. 0,02 g subst. ja amp. 1,1 ccm = 0,04 g subst. Amenorrhoea, oligomenorrhoea, hyperemesis gravidarum. 3 k. p. 1—3 tabl. või 2—3 k. näd. 1—4 ccm veenisisesi.

**Agurin** (IG).

Theobromino-natrium aceticum. 60% teobromiini. Subst., tabl. 0,5 g. Diureticum, hydrops cardial. et renal., stenocardia, asthma cardiale. 3 k. p. 2 tabl.

**Airol** (Grenzach).

Bismutum oxyjodogallicum. 20% J. Rohekashall lõhnatu pulb., vees ja alk. peagu ei lah. Jodoformi lõhnatu asendaja. 5—10% salvina või puudrina.

**Albargin** (IG).

Želatooshõbe, želatoosi ühend hõbenitraadiga. 23,6% hõbenitraati, 15% Ag. Subst., tabl. 0,2 g. Gonorrhoea, blenorhoea, conjunctivitis, cystitis, urethritis, enteritis. Loputuseks 0,1—0,3% vesilahusena; profülaktil. instalats. 5% lahusena, millele lisatud 10% glütseriini.

**Albro** (Medikon).

Natr. bromati 5, Acid. citric., Acid. tartaric., Natr. bicarbonic. q. s. ad 70. Granulaat. Sedativum. 2—3 k. p. 1 teelusika täis kl. veega.

**Alepol** (Wellcome).

Hydnokarpusõli valitud rasvhapete naatriumsoolad steriilse lahusena. Lepra, tuberculosis.

**Alival** (IG).

Joodihüdrooksüpropan. 63% J. Värvuseta, läi-

kiv. krist., kerg. lah. vees, alk. ja riits. õlis (1:10). Subst., tabl. 0,3 g, amp. 2 ccm (33,3% lahus). Lues, arteriosclerosis, angina pectoris, scrophulosis, asthma bronchiale. Mitu k. p. 1 tbl. või 3 k. näd. 2 ccm muskli-või veenisisesi. Väliselt 10—25% salvina või küünlais (1 g).

#### **Alliocaps (Madaus).**

Küüslaugu matseraat õlis. Pehmed želat. kapsl. à 0,5 g. Käärimisdüspepsia, soolenugilised, arterioskleroos. 3 k. p. 1 kaps. enne sööki tervelt alla neelata.

#### **Allisatin (Sandoz).**

Bulb. Allii sativi plv. 0,25 g, Carb. lign. sacchar., cacao q. s. Draž. 0,55 g = 1 g värsk. küüslauku. Seedi-mishäired, arterioskleroos. 3 k. p. 1 draž.

#### **Allonal (Roche).**

Acid. allylisopropylbarbituric. 0,06 g, Amidopyrini 0,1 g. Tabl. 0,16 g. Analgeticum, sedativum, hypnoticum. 2—3 t. järele 1 tabl.; uinutava vahendina 1—2 või 2—3 tabl. magamamineku eel.

#### **Allylbarbital.**

Acid. diallylbarbituricum. K. n.: Dial, Curral.

#### **Aloxyl (Takema).**

Aluminüüloksümetüülsulfiit-monohüdraati 0,2 g, viinhapet 0,2, soodat 0,4 g. Tabl. 1 g. Fluor albus ja tupelimanaha põletikulised haigused. 2—3 k. näd. 1 tablett tuppe.

#### **Alsil (Ephag).**

Aluminium silicicum. Valge, lõhnatu, maitsetu pulb., vees ei lah. Hyperaciditas, ulcus ventriculi et duodeni. 2—3 k. p. 1 teel. täis.

#### **Alsol (Athenstaedt).**

Aluminium acetico-tartaricum. Subst. ja lahus 50% (=Liquor Alsoli 50%). Antisepticum, adstringens.

#### **Alucol (Wander).**

Aluminium hydroxydatum colloidal. Subst., tabl. 1 g, mis sisald. 0,5 g alukooli. Hyperaciditas, hypersecretio. 0,5—1 g enne ja peale söögi.

#### **Alucol compositum (Wander).**

Alucoli 0,75 g, Extr. Belladonnae sicc. Ph. Helv. V 0,01 g, Papaverini hydrochl. 0,02 g, Aethyl. paraaminobenzoici 0,02 g. Tabl. 0,8 g. Hyperaciditas, gastritis

ulcus ventriculi et duodeni etc. ½ t. enne ja ½ t. peale sööki 1—2 tabl.

**Alumnol (IG).**

Aluminium  $\beta$ -naphtholdisulfonicum. Värvusetu, vees lah. pulb. Alumiiniumatsetaadilahuse asemel anti-septikumina kirurgias, günekoloogias ja dermatoloogias. 0,5—1—2—10% lahusena, salvina ja puistepulbrina.

**Alypin (IG).**

Benzoylaethyltetramethyldiaminoisopropanolum hydrochlor. või nitric. Valge, vees kerg. lah. pulb., lahused on steriilitavad. Anesteetikum, 2—3 k. vähem mürgine kokaiinist. 1—10% värsk. valmist. lahusena.

**Amidopyrin.**

Pyrazolonum dimethylaminophenyldimethylicum. K. n.: Novamidon, Pyramidon.

**Amphotropin (IG).**

Hexaminum camphoricum. Valge, vees kerg. lah. pulb. Subst., tabl. 0,5 g, amp. 20 ccm (lahus: Amphotropini 4,8, Hexamini 37,2, Aq. dest. steril. ad 100). Anti-septikum kuseteede haig. puhul, profülaktil. neeru- ja põieoperatsioonide eel. 3 k. p. 0,5—1 g.

**Ampoules de Soufre Colloidal.**

Vt. Collobiase de soufre.

**Ampoules nevrosthéniques (Boulanger).**

Natr. kakodylic. 0,05 g, Strychnin. nitric. 0,001—0,01 g, Aq. dest. ad 1 ccm. Amp. 1 ccm. 24 ampullist koosnev seeria sisaldab 16 kordkorralt suurenevat annust strihniini 0,001 g kuni 0,01 g, kuna naatrium-kakodülaadi annus jääb muutumatuks. Neurasteenia, üldnõrkus. Nahaalusi.

**Anaesthesin (IG).**

Acid. p-aethylamidobenzoicum. Valge krist. pulb., vees ei lah. Lokaalanesteetikum; seespidi kõhuvalu, merehaiguse, oksendamise puhul. 0,3—0,5 g mitu k. p., kuni 2 g pro die! 5—20% salvi või puudrina.

**Anethym (GL).**

Anaesthesini 0,03, Phenacetini 0,08, Mentholi, Ol. Eucalypti, Thymoli ana 0,0015. Past. 1 g. Ülemiste hingamisteede haigused. 4—5 past. p. suus aeglaselt imeda.

**Angiolymphe du Dr. Rous (Moro).**

Orchis maculat. 15, Ixia rosea 5, Moraea sinensis 5,

Aq. dest. 1000. Toimeained deklaratsiooni põhjal on glükosiidid. Amp. 2,5 ja 5 ccm. Tuberkuloos. Intra-gluteaalselt.

#### Aniodol (Aniodol).

1% trioksimetüleeni (paraformaldehüüdi) vesilahus glütseriini ja 0,01% sinepiõli lisandiga. Desinficiens. Käte ja instrument. desinfits. 1:5000, haavadele 0,25:1000.

#### Ankur-Expeller (Remedia).

Piper Cayenn., Amm. caust. tripl., Glycerin., Camphor., Ol. Terebinth., Ol. Menthae, Ol. Thymi, Ol. Sinapis aeth., Spirit. 95°. Antirheumaticum. Sissehõõrumiseks.

#### Ankur Pain Expeller (Rae apteek).

Fruct. Capsici, Camphora, Ol. Rosmarin., Ol. Thymi, Ol. Lavandulae, Aq. Menthae, Aq. Melissa, Aq. Chamomillae, Sapo medicat., Liq. ammon. caust., Spir. vini, Color q. s. Antirheumaticum. Sissehõõrumiseks.

#### Anthrasol (Knoll).

Kivisöetõrvast erilisel menetlusel valmist. kollakas, tõrvalõhnaline õli, vees ei lah. Tõrvapreparaadina. *Per se* või 10% salvina, puudrina, 2,5% juuksepiiritusena.

#### Anticomán (Anticomán).

Igas tabletis dekametüleendiguanidiinbitartraati 0,0077 g, pankreasfermenti 0,1523 g, naatriumfosfaati 0,015 g, tanniini 0,025 g, vismutsubnitraati 0,025 g. Antidiabeticum. 2—3 tabl. 10—15 min. peale sööki.

#### Antiformin (Knorr).

Leeline naatriumhüpokloriidilahus, sisald. 7,5% NaOH; hapustamisel eraldab 5,3% kloori (= 5,6% naatr.-hüpokloriiti). Desinficiens. 5—10% lahus röga ja väljaheidete desinfitseer., 3% lahus käte desinfitseerimiseks.

#### Antileprol (IG).

Chaulmogra-õli mitme rasvhappe estrite segu. Subst., kapsl. 0,5 g ja 1 g. Amp. 1,5 ccm (+ 1% kamp-rit). Lepa, ozaena, trachoma. 0,5—5 g päevas peale sööki. Süst. 2 korda näd. 1 amp. veenisisesi või intra-gluteaalselt.

#### Antimosan (IG).

Natrium stibiopyrocatechindisulfonicum. 5% lahus

ampullides 40 ccm, 1 ccm = 0,00625 g Sb. Loomade sise-parasiitide raviks (sklerostomiasis hobustel, filariosis haemorrhagica koertel jne.). Hobustele nahaalusi 4—5 süstet à 10 ccm 50 kg kehakaalu kohta; koertele musklišisesi korduvalt 1 ccm iga 5 kg kehakaalu kohta.

**Antinervin** (Radlauer).

Acetanilidi 50, Ammon. bromat. 25, Acid. salicylic. 25. Valge, külmas vees osalt lahust. pulb. Antipyreticum, antineuralgium, antinervinum. 4—5 k. p. 0,5 g.

**Antiphlogistine** (Denver).

Glycerin. 45 g, Bol. alb. 54,8 g, Jodi 0,01 g, Ac. boric. 0,1 g, Ac. salicylic. 0,02 g, Ol. Menth., Ol. Eucalypti, Ol. Gaultheriae ana 0,002 g. Kataplasma iga-suguste põletikuliste protsesside: ägeda tonsilliidi, nasofarüingiidi, larüingiidi, välis- ja keskkõrva põletiku, kopsupõletiku, abstsesside jne. raviks.

**Antipyogenes-Yatren** (IG).

Segavaktsiin: stafülo-, strepto-, pneumokokkide, coli- ning pyocyaneus-bakterite suspensioon 3%-ses jatreenilahuses. Amp. 2,5 ccm kordkorralt suureneva bakterite arvuga. Pud. 25 ccm. Vastavate pisilaste tekitatud haiguste raviks. Muskli- ja veenisisesi, suurendades annust igal teisel päeval.

**Antirheumaticum** (Medicon).

Koostis, nagu Manol'il. Vt. see.

**Antisclerosin** (Natterer).

Koostis vastab vereseerumi sooladele: Natr. chlorat. 0,8, Natr. sulf. 0,08, Magn. phosphor. 0,03, Natr. carbon. 0,03, Natr. phosphor. 0,025. Tabl. 0,25 ja 0,5 g. Arterioskleroos ja selle kaas- ning järelnahud. 3 k. p. 2 tabl.

**Antispasmin** (Merck).

Natr. narceinicum ja Natr. salicylicum. 50% narctseini. Valge, hügrokoopne, kerg. vees lah. pulb. Antispasmodicum, sedativum. 3—4 k. p. 0,01—0,05 g.

**Antithyreoidin** Moebius (Merck).

Kilpnäärmetu (thüreoidektomeeritud) oina seerum. Vedelik, amp. (1 ccm = 0,1 g antitüreoidiinkuivainet), tabl.: nõrgad — 0,05 g, kanged — 0,5 g kuivainet. Morbus Basedowi, hyperthyreosis. Ved. 3 k. p. 10 tilka, suurendades annust igal teisel päeval 5 tilga võrra kuni 30 tilgani, siis samal viisil alandada. Tabl. 3—

4 k. p. 1 tabl., suurendades annust igal teisel päeval kuni 5 k. p. 2 tabl. Kahepäevase vahe järgi samal viisil alandada. Süst. ülepäeviti 1 ccm. Peale 10 päeva 1 ccm päevas, järgm. 10 päeva jooksul 2 ccm päevas.

**Anusol** (Goedecke).

Bismut. oxyjodresorcinsulfonic., ZnO, Bals. peruvian., Ungt. cereum, Ol. Cacao. Hemorroidid, pärakulõhed ja pärasoole põletikud. 2 k. p. 1 küünal.

**Aolan** (Behringwerke).

Toksiinivaba, steriilne lehmapiima-valgulahus. Amp. 1, 5 ja 10 ccm. Valguterapiaks. 5—10 ccm musklišisesi või 0,3—0,5 ccm nahasisesi (intracutan).

**Aperitol** (Riedel).

Phenolphthaleinum valerylacetylicum. Valge, peagu maitsetu ja lõhnatu pulb., ei lah. vees. Tabl. 0,2 g. Mahe lahtistav vahend. 2 tabl. korraga.

**Arcanol** (Schering).

Acid. acetylosalicylic. ja Methyl. phenylchinolincarbonic. ana. Tabl. 1 g. Gripp, angiina, külmetushaigused. 1—4 tabl. päevas.

**Areginal**.

Taimekaitsevahend. Sisaldab tetrakloorsüsinikku.

**Argentamin** (Schering).

Värvusetu, leelise reakts. vedelik, sisaldab 10% etüleendiamiini ja 10% hõbenitraati. Viimase asendajaks. Süstimiseks kehaõõneisse 1:50—500, loputuseks 1:500—3000, pinseldamiseks 5%, silma 1—5%.

**Argocarbon** (Heyden).

Antitoksiliste ja bakteritsiidsete omadustega taimesüsi, millele sadestatud 0,5% kolloidset hõbedat. Käärimisdüspepsia, lihamürgistuse jne. puhul.

**Argochrom** (Merck).

Metüleensinise ja hõbenitraadi ühend. Pruun, rohekalt helkiv pulb., lah. vees tumesiniselt. 20% Ag. Subst., 1% lah. ampullides 5, 10 ja 20 ccm. Septil. üldinfektsioonid, mädaveresus, lapsevoodipalavik, gonorröa jne. 10—20 ccm 1% vesilahust veenisisesi; ka küünlatena *per rectum*.

**Argonin** (IG).

Kaseiinühbe. 4,2% Ag. Hallikas pulb., kerg. lah. vees. Gonorröa puhul 1—2% lahusena.

**Argoplex** (Roche).

Hõbepolüglütsiinnitrat. 10% Ag. Värvusetu, valgustundlik pulb., lah. vees. Gonorröa, dermatosid jne. 0,1—2% lahusena; suu, nina ja kurgu loput. 0,1%, silmaraviks 0,5—2% lahusena.

**Argyrol (PD).**

Vitelliinhõbe. 30% Ag. Tumepruun pulb., lah. vees. Lahustuva hõbepreparaadina. 2—5% süstimiseks, 0,1% loput.

**Arheol (Astier).**

Santaliõli toimeaine (Santalool?). Kapsl. 0,2 g. Tsüstiit, põeliit, gonorröa. 3 k. p. 3—7kapsl.

**Arhovin (Goedecke).**

Difenüülamiini, tümooli ja etüülbensoaadi segu. Kollakas ved., kõrvet. maitsega. Kapsl. 0,25 g. Gonorröa, epididümiidi, tsüstiidi, uretriidi jt. kuseteede haiguste puhul. 3 k. p. 1—2 kapsl.

**Aricyl (IG).**

Dinatrium acetylarsenicum. Amp. 1 ccm (= 0,003 g As, väikeloomadele) ja 10 ccm (1 ccm = 0,015 g As, suurtele loomadele). Roborans, toonikum, plastikum. Nahaalusi korduvalt 1 amp.

**Aristochin (IG).**

Dichininum carbonicum. Valge, lõhnatu, maitsetu pulb., vees ei lah. St. 189<sup>o</sup>. Kiniini asendaja, eriti läkaköha puhul. 0,5—1 g mitu k. p.

**Aristol (IG).**

Ditümooldijodiid. 45% J. Punakaspruun pulber, vees ei lah. Haavade ja põletishaavade raviks. *Per se* või 10% õlilahusena, salvina, puudrina.

**Arnikapsiin (Vana apteek).**

Ol. Sinapis aeth., Methyl. salicylic., Tr. Arnicae flor., Tr. Capsici. Antirheumaticum. Sissehõõrumiseks.

**Arrhenal (Adrian).**

Natrium methylarsenicum puriss. Tilgad, amp. 0,05 g ja 0,1 g, graanulad 0,01 ja 0,02 g ja tabl. 0,025 g. Dermatoosid, tuberkuloossed haigestumised, gripp, skrofuloos, artriit, malaaria jne. 10—20 tilka, 1—2 amp., 2—6 graanulat või 1—3 tabl. korraga.

**Arsacetin (IG).**

Natrium acetylarsanilicum. 21,5% As. Valge krist. pulb., kerg. lah. vees. Prototsoade ja spiril-

lide tekit. haigused. 0,1—0,45 g 10% lahusena nahaalusi.

**Arsentriferrin (Knoll).**

Ferrum arsenparanucleinicum + Ferr. paranucleinicum. 0,1% As. Oranž pulber, vees ei lah. Subst., tabl. 0,3 g. Kehvveresus, hüsteeria, nahahaigused. 3 k. p. 0,3 g.

**Arsycodile (Leprince).**

Natr. kakodylicum. Amp. 1 ccm (5% lahus) ja terad 0,025 g. Toonikum. 1 ccm 8—10-päevaste vahelega; 1 tera igal söömaajal.

**Arsylen (Roche).**

Natrium (süstimislahus) või Calcium (graanulad) allylarsenicum. Amp. 1,1 ccm ja 2,2 ccm à 0,05 ja 0,1 g (= 0,0225 g ja 0,045 g As). Graanul. 0,01 g (= 0,0045 g As). Roborans; asteenia, kehvveresus, tuberkuloos; ekseemid, furunkuloos, tbc ja luesi põhjustatud nahahaigused. Ravi individuaalse erieeskirja kohaselt; tavaliselt nahaalusi, muskli- või veenisisesi alates 0,5 ccm 1 k. p. ja tõustes kuni 2 k. p. 4 ccm. *Per os* alates 1 terast ja suurendades annust 2—3 tera võrra nädalas.

**Arthigon (Schering).**

Ettevaatlikult surmatud gonokokkide emulsioon steriilses urotropiinilahuses. Pud. 6 ccm ja amp. 1 ccm. Annus I—VI — 10, 30, 40, 50, 100 milj. kokki 1 ccm-is. Arthigon „extra stark“: pud. 3 ccm ja amp. 1 ccm, annus VII—XII — 200, 300, 400, 500, 750, 1000 milj. kokki ccm-is. Spetsiifikum gonorröa tüsistuste, epididümiidi, artriidi puhul ja latentse gonorröa diagnoosiks. 50—200 milj. musklisisesi, 10—50 milj. veenisisesi.

**Artosin (Boehr. Mannh.).**

Acidum phenylchinolincarbone-anilidocarbonicum. Värvusetu, maitsetu pulber. Subst., tabl. 0,3 g. Arthritis urica. 2—4 k. p. 0,3 g.

**Asche's Bronchial-Pastillen (Asche).**

Fruct. Cubebae, Fr. Anisi, Fruct. Foeniculi, Rad. Pimpinellae, Rad. Ipecacuanhae, Ol. Neroli, Saccharum.

**Asciatin (UR).**

Dimetüülamiidofenatsoon-butüülklooraalhüdraat. Valge krist. pulb., st. 82—84°. Tabl. 0,25 g. Analgeticum, sedativum. 1—3 tabl. vähe veega.

**Askaridol (IG).**

Ussimaltsaõli pallastaineist vabastatud toimiv osis. Helekollane, õline, aromaatselt lõhnav vedelik. 1 g askaridooli = 35—45 tilka *Ol. Chenopodii*. Kapslid 0,3 g ja 2,5% lahus riitsinuseõilis. Sooleparasiitide, eriti solkmete ja ankülostoma vastu. 1—2 tunni järgi 3 korda 1 kaps., lastele pro dosi eluaasta kohta 1 ccm lahust.

**Asool.**

Taimekaitsevahend. Sisaldab 5% arseenishapet.

**Asparol (Stroschein).**

Coffein. acetylosalicylic. 18,66, Calc. acetylosalicylic. 40,67, Calc. carbon. 10,1, Acid. acetylosalicylic. 36,6. Tabl. 0,5 g. Antineuralgicum, analgeticum. Mitu k. p. 1—2 tabl.

**Aspirin (IG).**

Acid. acetylosalicylicum. Valge, hapu maitsega krist. pulb., vees ei lah. Subst. ja tabl. 0,5 g. Analgeticum, antipyreticum, antirheumaticum. 2—6 k. p. 0,5 g.

**Asthmacid (Sarsa).**

Bensüülbensoaat ja Extr. *Grindeliae* fluid. Asthma bronchiale, angina pectoris. 10—20—40 tilka vee või piimaga.

**Asthmolysin (Kade).**

Extr. gland. suprarenal. 1:1000—50 ccm, Extr. gland. hypophysis 20 ccm, NaCl 0,9 g, HCl lahj.  $\frac{1}{2}$  gtt, Acetonchloroform. 0,5 g, Aq. dest. steril. ad 100 ccm. Amp. 1,1 ccm; lahus (glütseriini lisandiga); tabl. (à 0,15 g Theobr. acetylosalicylic., 0,032 g KJ, 0,018 g Magn. carbon., Gland. supraren. 0,005 g, Gland. hypophys. 0,005 g). Astma puhul. Nahaalusi, sissehingamiseks või 1—3 tabl. peale sööki.

**Astonin (MBK).**

„Schwach“: Natr. glycerinophosphoric. 0,1 g, Natr. monomethylarsinic. 0,05 g, Strychnini nitrici 0,0005 g pro 1 ccm. „Stark“: samu aineid 0,1 g, 0,075 g ja 0,00075 g. Amfioolid 1 ccm. Toonikum peale kurnavaid haigusi. Nahaalusi või veenisisesi seeriais, 5—6 süst. 2—3-päevaste vaheaegadega.

**Asurol (IG).**

Amiidoksüvõihappe ja naatriumoksümerkuurialit-

sülaadi kaksikühend. 40% Hg. Kollakas, hügrokoopne pulb., kerg. lah. vees. Subst., amp. 2,2 ccm (5% lahus). Antilueticum. 0,1—0,15 g 1—2 k. näd. süstida.

**Atochinol (PB).**

Acid. allylphenylcinchoninicum. Kollakas, krist. pulb., vees ei lah. Tabl. 0,25 g ja 20% salv (lanoliiniga) tuubides 30 g. Artriidi, reuma, neuralgia puhul. 4—8 tabl. päevas, kroonil. juhtudel 2—4 tabl. päevas, nõdalase vaheajaga peale 5-päevast tarvitamist.

**Atophan (Schering).**

Acid. phenylchinolincarmonicum. Kollakas pulb., vees ei lah. Subst., tabl. 0,5 g, salv (sisaldab 10% atofaanamüülestrit, 10% fenüülsalitsülaati ja 5% kamprit rasvast ja seebist koosnevas salvialuses). Artriit, reuma, neuralgilised valud. 2—4 tabl. päevas.

**Atophanyl (Schering).**

Atofaan ja naatriumsalitsülaat vesilahuses. Kollakaspruun, neutraalne vedelik. Amp. 5 ccm 0,025 g novokaiini lisandiga süstimiseks musklistisesi, amp. 10 ccm süstimiseks veenisisesi. Artriit, reuma, neuralgia, gripp, pneumonia ja ülemiste hingamisteede põletikulised katarrid. 1—2 süstet päevas.

**Atoxicocain (Siegfried).**

**Procainum.**

**Atoxyl (IG, Wellcome).**

Natr. arsanilicum. Valge, lõhnatu, krist. pulb., kerg. lah. vees. 24% As. Trypanosomiasis. Varemalt tarvitatud antilueetikumina. 0,05—0,2 g nahaalusi või veenisisesi mitu k. näd.

**Aulin (Boehringer).**

Aulinogeni 10% vaseliinõli-lahus 10% tetraliini lisandiga. Väliselt sügeliste ja teiste inim- ja loomade välisnugiliste vastu.

**Aulinogen (Boehringer).**

Bisaethylxanthogen. 52% org. seotud S. Kollane krist. pulb., vees ei lah., lahustub alkoholis. St. 28°. Kroonil. ekseemid, neurodermiit, akne, sügelised. 4% salvina või auliini kujul.

**Avertin (IG).**

Alcohol tribromaethylicus. Valged krist., lah. vees 2,7%. St. 79—80°. Lahus pudeleis 10, 100 ja 300 ccm (66,6% lahus amüleenhüdraadis). Põhinarkootikum

kirurgil. ja günekoloogil. operatsioonide juures; poolune (Dämmerschlaf) tekitamiseks sünnituse, psühhopaatsete erutusseisundite, teetanuse ja eklampsia puhul. Tarvitamine kontraiinditseeritud raskete maksa- ja kopsuhaiguste puhul. Põhinarkootikumina 0,08—0,1 g 1 kg kehakaalu kohta, pooluneks ja eklampsia puhul 0,05—0,07 g 1 kg kehakaalu kohta. Rektaalselt 2,5% lahuseks, veenisisesi 3% lahuseks.

#### Avitebecin (RSi).

Bact. tuberculosis typ. avium'ist valmistatud kontsentritud (1:10) preparaat. Pud. 1, 5 ja 10 ccm. Diagnosticum, omab allergilist toimet tuberklitega infitseeritud organismile.

## B.

#### Bacillosan (Güstrov).

Bac. lacticus aerogenes'i elektiivselt kasvatatud tüvide puhaskultuur segus piimsuhkruga. Subst. ja tabl. 1 g. Fluor albus ja tupelimanaha põletikud; desinfitseeriva vahendina enne tupeoperatsioone. 2 k. näd. 2 tabl. tuppe.

#### Balnacid (Nördlinger).

Pöökpuutõrva preparaat. Must, tõrva lõhnaga, vees lah. vedelik. Ekseemid ja teised nahahaigused. 100—200 g vanni jaoks või salvina (5—10%).

#### Barbipyrin.

Amidopyrinum diaethylbarbituricum. K. n.: Veramon.

#### Barbital.

Acidum diaethylbarbituricum. K. n.: Veronal.

#### Barbital. solubile.

Natrium diaethylbarbituricum. K. n.: Veronal-Natrium.

#### Bassurol (Ephag).

Eril. menetusel valmist. paakspuukoore ekstrakt ja tragagant šokolaadiga kaetud granulaadina. Taimne pundumisvahend habituaalse ja kroonil. kõhukinnisuse puhul. 2 k. p. 1 teelusika täis.

#### Baume Bengue analgèsique (Bengue).

Mentooli 10, metüülsalitsülaati 10, lanoliini 12.

Salv tuubides, jooksja ja neuralgiliste valude vastu.

**Baume Ephag** (Ephag).

Mentholi, Methyl. salicyl. ana 1, Lanolini 2. Tuub. 60 g. Akuutne ja kroonil. lihase- ja liigesejooksja, kuiv pleuriit, neuralgil. valud.

**Baume K. & B.** (Ephag).

Menthol., Methyl. salicyl., Aq. dest. ana 15, Cer. flav. 10, Adip. Lanae 45. Antirheumaticum.

**Baume palsam** (Lill).

Mentholi, Methyl. salicyl. ana 5,3, Cer. flav. 3,4, Lanol. anhydr. 16. Tuub. 30 g. Reuma, jooksja, neuralgilised valud.

**Belladonna-Neutralon** (Schering).

Neutraloon 0,6% belladonnaekstrakti lisandiga. Tarvit. nagu neutraloon.

**Bellafolin** (Sandoz).

Karumustikalehe alkaloidid puhtal kujul. Tabl. 0,25 mg, tilgad 1:1000, amp. 0,5 mg. Sedativum, antispasmodicum. 3 k. p. 1—2 tabl. või 10—20 tilka või 1—2 amp.

**Belloc Pastilles de Charbon.**

Paplipuu söest vedela tragagantlima abil valmistatud pastillid à 1 g.

**Bensons Plaster** (Seabury).

Türgipipra ja *Scopolia carniolica* ekstraktiga immutatud perforeeritud kautšukplaaster. Reuma, jooksja.

**Benzocain.**

Aethylum aminobenzoicum. K. n.: Anaesthesin.

**Benzonaphтол** (IG).

$\beta$ -naphtholum benzoicum. Valge krist. pulb., lah. vees 1:10 000. St. 108—110<sup>0</sup>. Soolteantiseptikum. Mitu k. p. 0,25—0,5 g.

**Benzosol** (IG).

Guajacolum benzoicum. 54% kvajakooli. Valge, lõhnatu, maitsetu krist. pulber, vees ei lah. St. 60—61<sup>0</sup>. Tuberkuloos, tsüstiit, suhkurtõbi. 3 k. p. 0,25—0,3 g peale sööki.

**Betol** (Merck).

$\beta$ -naphtholum salicylicum. Peagu valge, lõhnatu, maitsetu pulb., vees ei lah. St. 95<sup>0</sup>. Antisepticum, antineuralgicum, antirheumaticum.

**Bibrophen** (Aroom).

Bismut. dibromphenylic. Tabl. 0,4. Seedeorganite haigused. 2—3 k. p. 1—2 tabl.

**Bilivaccin antityphique (Bio).**

Tüüfuse ja paratüüfus A ja B kuivatatud pisilastest valmist. tabl. 0,15 g (lisaks sapipillid 0,2 g). Vakt-sineerimiseks tüüfuse vastu.

**Bilival (Boehringer).**

Letsitiin-naatriumkolaat, sisaldab 25% letsitiini. Kollane, mõru, vees lah. pulber. Terad 0,15 g. Chologogum, roborans. 2—3 tera 3 k. p. peale sööki 2—3 näd. jooksul. Ravi korratakse peale 8—14 päevast vaheaega.

**Biresol (Ephag).**

Bismut. diresorcinsulfonic. 6,5 g, Bismut. subgallici 6,5 g, Bals. peruvian. 3,25 g, Lanolini anhydr. 1,5 g, Ol. Cacao 79,0 g. Küünlad hemorroidide, pärasoole ja tupe limanaha põletikkude puhul.

**Bismogenol (Tosse).**

Bismut. subsalicylicum 5 või 10% steriilse emulsioonina õlis. 1 ccm = 0,05—0,06 g Bi. Pud. 15 ccm ja amp. 1,2 ccm. Lues. 1 ccm musklistisesi igal 3—5-dal päeval.

**Bismophanol (Riedel).**

Bismut. phenylcinchoninicum umbes 10% emulsioonina parafiinõlis. 26% Bi. 1 ccm = 0,025 g Bi. Anti-lueticum. 1 ccm igal 3. päeval. 5 süst. järgi 1 näd. vahet.

**Bismoterran (Mendel).**

Vismuti ja ränihappe ühend. Hüperatsiditeet, hüpersekreetsioon, mao ja soole haavad, enteriit, kõhulahtisus. 3—5 k. p.  $\frac{1}{2}$ —1 teelusika täis enne sööki.

**Bismusol (Ephag).**

Resorcini 2,5 g, Bismut. oxyjodogallici 6,5 g, Zinci oxydat. 13,0 g, Ol. Cacao 78,0 g. Küünlad à 2 g. Hemorroidid, pärasoole ja tupe limanaha põletikud. 1—3 küün. päevas.

**Bismutin (Ephag).**

Bismut. subnitric. 10% steriilne suspensioon happevabas oliivõlis anesteetikumi lisandiga. Pud. 15 ccm. Lues. 1—1,5 ccm intragluteaalselt.

**Bismutose (IG).**

Vismuti-valguühend. 22% Bi. Kollakas, lõhnatu, maitsetu, õhu mõjul tumenev pulb. Maohaavand, vere-

jooks sooltest, gastroenteriit, kõhutüüfus. Mitu k. p.  $\frac{1}{2}$ —1 teelus. täis.

### **Bisuspen** (Heyden).

Bismut. subsalicylic. (10%) suspensioon oliivõlis, sisaldab 6% (bisuspeen lastele 1,2%) Bi; 1 ccm = 0,06 või 0,012 g Bi ja kresooli 0,01%. Pud. 12 ccm. Lues. Musklisisesi 0,5—1 ccm, tavaliselt 10—15 süst. 3—4-päevaste vahedega. Lastele kuni 1 a. 0,1—1 ccm igal 3—5. päeval.

### **Blutan** (Helfenberg).

Alkoholivaba atsidalbumiiniga valmist. söehappega küllastatud ja aroomistatud raua- ja manganpeptonaadi vedelik. 0,6% Fe 0,1% Mn. Kehvveresus, kloroos. 3 k. p. 1 supilusika täis.

### **Borohexamin.**

Hexaminum boricum. K. n.: Borovertin.

### **Boromenthol** (Ephag).

Natr. biboric. Glycerin. ana 18, Lanol. anhydr. 180, Vasel. alb. americ. 180, Menthol. 6, Novocain. hydrochl. 3,6, Aq. dest. 3,6. Nohusalv.

### **Boromenthol** (Lill).

Acid. boric. 0,5, Mentholi 0,15, Vaselin alb. 10. Nohusalv.

### **Boromenthol** (Remedia).

Acid. boric. 1, Mentholi 0,5, Vaselin. alb. 38, Ceresin. alb. 0,5. Nohusalv.

### **Boromentool** (Odor).

Mentholi 9, Acid. boric. 41, Vaselin. alb. 200, Ceresini alb. 33, Vaselini alb. 67. Nohusalv.

### **Borovertin** (IG).

Hexamethylentetraminum triboricum. Valge, vees 1:12 lah. pulb. 48,5% boorhapet, 51,5% heksamiini. Subst., tabl. 0,5 g. Põiedesinfiitsiens. 2—8 tabl. päevas.

### **Brausebromsalz** (Sandow).

20% Kal. bromat., 20% Natr. bromati, 10% Ammon. bromat. Sedativum.

### **Bromalin** (Merck).

Hexaminum bromoethylicum. Valge, krist., kerg. vees lah. valgustundlik pulb. Epilepsia, neurasteenia. Mitu k. p. 2—4 g.

**Bromeval.**

Monobromisovalerylurea. K. n.: Bromural, Isonaurin, Verobroman.

**Brom-Fersan (Fersan).**

Fersani 0,5 g, Natr. bromati 0,1 g. Neurasteenia ja hüsteeria puhul. 2 k. p. 3—4 pastilli.

**Bromglidin (Klopfer).**

Broomi ühend taimevalguga. Tabl. à 50 mg Br. Sedativum. 1—2 tabl. p.

**Bromipin (Merck).**

Broomi ühend seesamõliga. 10% — helekollane õli, 10% Br. org. ühend. Valgustundlik. 33% — kollakaspruun õli, 33% Br. org. ühend. Broomsoolade asendaja. 1 teelus. täis mitu k. p.

**Bromocoll (IG).**

20% broomi, 40% tanniini, 30% želatiini, 10% vett. Kollakas, lõhnatu, maitsetu, vees mittelahust. pulb. Seespidi epilepsia puhul; välisp. hemorroidide, sügelemise jne. puhul. 1—6 g mitu k. p. sisse võtta, välis. 10—20% salvina.

Bromocollum solubile: Bromocolli 62,5 g, Boracis 37,5 g.

**Bromural (Knoll).**

Monobroomisovalerüülkarbamiid. Valge, vähe mõru, rask. vees lah. pulb. Subst., tabl. 0,5 g. Sedativum, hypnoticum. 1—2 tabl. mitu k. p. Uinutina õhtul 3—4 tabl.

**Brovalopin-vannid (Pharmacosma).**

Männiokkaekstrakti ja palderjanijuure toimeained. Lisand vannidele neurasteenia ja unepuuduse puhul.

**Brovaloton (GL).**

Pooraks broomkaaliumi, palderjani- ja männiõli ning värvaine lisandiga. Vannideks neurasteenia ja unepuuduse puhul.

**Butolan (IG).**

p-Oksüdifenüülmetaani karbamiinhappe ester. Valge, lõhnatu, peagu maitsetu krist. pulb., vees rask. lah. Subst., tabl. 0,5 g. Oxyuriasis. 3 k. p. 1 tabl. (väikelastele ½ tabl.) nädal aega.

## C.

**Cadechol** (Boehringer).

Acid. choleincamphoricum. 28% kamprit. Valge pulb., vees ei lah. Subst. ja tabl. 0,1 g. Analeptikum kroonil. vereringehäirete ja südamenõrkuse, pneumonia, kopsutiisikuse jne. puhul. 3—6 tabl. peale sööki.

**Calcacetosal.**

Calcium acetylosalicylicum. K. n.: Aspirin solubile.

**Calcinat** (Lill).

Calc. gluconicum. Subst. (granulaadina) ja amp. (10% üleküllastatud lahus) 5 ja 10 ccm. Skrofuloos, tuberkuloos, anafülaksia. Muskli- või veenisisesi 10 ccm igal 2—3-dal päeval.

**Calcium-Diuretin** (Knoll).

Theobromino-calcium salicylicum. 11% Ca, 48% teobromiini, 38% salitsüülhapet. Vees rask. lahustuv valge pulb. Subst., tabl. 0,5 g. Arterioskleroos, hüpertoonia; üldiselt diureetikumina. 3 k. p. 0,5—1 g.

**Calcium-Sandoz** (Sandoz).

Calcium gluconicum. 9% Ca = 12,6% CaO. Maitsetu, lõhnatu, vees u. 3,5% lahustuv, kergesti üleküllast. lahuseid andev pulber. Subst., tabl. 1,5 g, kihisevad tabl. 4 g, 10% lahus amp. à 5 ja 10 ccm. Kaltsiumteraapiaks. 2—3 k. p. 1 dessertlusika täis või 1 tabl. või igal 2—3-dal päeval 10 ccm muskli- või veenisisesi.

**California Syrup of Figs.**

(Califig.) Erilisel menetlusel valmist. kalifornia viigi siirupit 75, sennalehe vedelekstrakti 20, ingveri ja nelgi eliksiiri 5. Tumepruun meeldiva maitsega vedelik. Lahtistav vahend. ½—1 supil. täis päevas.

**Caliobenum.**

Calcium monojodbehenicum. K. n.: Sajodin.

**Calorose** (Güstrov).

Steriilne invertsuhkrulahus. 70% — pud. 50, 100 ja 1000g, 10% — amp. 10 ja 20 ccm, 35% — amp. 10 ja 20 ccm. Sissenõristuseks viinamarjasuhkru asemel.

**Calsil** (Lill).

Calc. silicic. colloidal. Hallikasvalge, lõhnatu, maitsetu pulb., vees ei lah. 0,9 g kalsiili seob 75 ccm 0,1-n HCl. Gastritis, ulcus ventriculi et duodeni. 3 k. p. ½ t. enne sööki ½—1 teelus. täis.

**Calsil cum Belladonna.** Calsil +0,5%  
Extr. Belladonnae. Tarvit. nagu Calsil.

**Camphochol** (Riedel).

Kampri ja  $\alpha$ -dioksükolaanhappe (Acid. apocholic.) ühend. Nõrga kampri lõhnaga krist., vees ei lahustu. 28% kamprit. Subst. ja kapsl. 0,1 g. Erutusvahend vereringehäirete puhul; üldsepsis, difteeria, tüüfus, angina pectoris, kopsupõletik, gripp ja juhud, kus teised südameergutajad, nagu digitaalis, pole soovitatavad. 3—5 k. p. 1 kaps. peale sööki.

**Camphogen** (Boehringer).

Dietüülatsetaamiidi (25%) ja naatriumsalitsülaadi (15%) abil valmistatud kampri (2%) vesilahus. Amp. 1 ja 2 ccm. 1 ccm = 0,02 g Camphor. raffinat. Kollaps ja äkiline vereringenõrkus. 1—2 ccm veeni- või musklisisi.

**Camphopin** (Pharmacosma).

Ol. Sinapis 0,8 g, Chloroform. 16 g, Methyl. salicyl. 8 g, Ol. Camphor. 32 g, Sapon. kalin. ad 80 g. Antirheumaticum, antineuralgicum.

**Campolon** (IG).

Erilisel menetsusel maksast valmist. kollakaspruun vedelpreparaat. Amp. 2 ccm. Kehvveresuse raviks. 1—3 k. p. 2 ccm musklisisi.

**Candiolin** (IG).

Biokeemilisel teel valmistatud heksoosdifosforhappe kaltsiumühend. 12—14% P, 16—17% Ca. Valge, peagu maitsetu aine. Subst. ja tabl. 1 g. Kasvamishäired, väsimusseisundid, ainevahetusanomaaliad eriti lapseas, rahhiit, osteomalaatsia, kehvveresus, tuberkuloos jne. 3—4 k. p. 1 tabl.

**Capsifor** (Ephag).

Methyl. salicyl. Mentholi ana 15 g, Fruct. Capsici 5 g, Camphorae 2 g, Ammon. caust. sol. 4 g, Ol. Rosmarini 0,5 g, Ol. Thymi 0,25 g, Spir. sapon. 58,25 g. Antirheumaticum.

**Capsules d'essence de Santal Midy.**

Vt. Santal Midy.

**Capsules de Goudron Guyot** (Frère).

„Veeslahustuv tõrvapreparaat“. Kapsl. Ülemiste hingamisteede haigused ja tsüstiit. 2—6 kapsl. päevas.

**Capsules Thyroidectin** (PD).

Thüreoidektomeeritud loomade vereseerum kuivatatult. Pruun pulber. Kapsl. 0,3 g. Struma. 3 k. p. 1—2 kapsl.

**Captol** (Mühlens).

Kloraalhüdraadi ja tanniini kondensatsiooniprodukt 25% alkoh. lahuseks. Peakõõma vastu. 1—2% alkoh. lahuseks homm. ja õhtul peanahasse hõõruda.

**Carbo-Allium** (Ephag).

Bulb. Allii sativ. recens + Carbo medicinal. Tabl. 0,3 g (= 0,5 g värsket küüslauku + 0,2 g sütt). Anti-diarrhoicum, antidüspepticum; rheuma, podagra, arteriosclerosis. 3 k. p. 1—2 talb.

**Carbromal.**

Diaethylbromacetylurea. K. n.: Adalin.

**Cardiazol** (Knoll).

Pentametüleentetrasool. Kerg. vees lah. valge pulb. Vesilahus on neutr. reakt. ja steriilitav. Subst., tabl., amp. 1,1 ccm (1 ccm = 0,1 g). Analeptikum kollapsi, südamenõrkuse, kopsupõletiku, nakkushaiguste puhul. 3—4 k. p. või iga 1—2 tunni järele 1 tabl. Nahaalusi, muskli- või veenisisesi 1 ccm,  $\frac{1}{2}$ —1 tunniste vahedega.

**Cardiazol liquidum** (Ephag).

10% kardiatsooli vesilahus. Pud. 10 g. Nagu eelmine, 20 tilka korraga.

**Cardiazol-Dicodid** (Knoll).

Cardiazoli 10%, Dicodidi hydrochlorici 0,5% in aqua. Pud. 10 g. Hingamisorganite haiguste, läkakõha, vereingehäirete, düsmenorröa puhul. 2—3 k. p. täiskasv. 15—20 tilka, lastele 2—5—10 tilka suhkruveega.

**Casbis** (IG).

Erilisel menetlusel valmist. vismuthüdraadi suspensioon õlis. 1 ccm = 0,1 g Bi. Pud. 15 ccm, amp. 1,5 ccm. Lues. Alates 0,5 ccm, siis 1 ccm 3-päevaste vahedega, intragluteaalselt.

**Cascara Evacuant** (PD).

Cascara Sagrada koorest valmist. tumepruun hea lõhnaga ja maitsega vedelik. Lahtistav vahend. 10 tilka —  $\frac{1}{2}$  teelus. täit korraga.

**Cascara Sagrada Barber.**

Vt. S a g r a d a B a r b e r.

**Cascarine Leprince** (Leprince).

Cascara Sagrada koore toimeained. Terad 0,1 g,

eliksiir, küünlad. Lahtistav vahend. 1—2 tera või 20—30 tilka öhtueine ajal.

**Caseosan (Heyden).**

Eril. menetl. valmist. steriilne, u. 5% kaseiinnaatriumilahus. Amp. 1,5 ja 10 ccm. Parenteraalselt proteiinteraapiaks lokaalsete põletikkude raviks; profülaktiselt nakkushaiguste, lapsevoodipalaviku, septilise abordi jne. vastu. Muskli- või veenisisesi 1—2 ccm igal 2. või 3. päeval.

**Castoreumbromid (Weigert).**

Broomsoolade segu palderjani vedelekstrakti ja kopranõretinktuuri lisandiga. Kollakaspruun kihisev sool. Sedativum, hypnoticum, antiepilepticum. 2—3 k. p.  $\frac{1}{2}$ —1 teelus. täis.

**Catamin (Riedel).**

Lanoliini ja vaseliini alusel valmistatud salv 10% ZnO ja 5% eril. menetl. (sadestamisel amorfsete sapihapete soolade juuresolekul) valmistatud väavli sisaldusega. Tuub. 55 g. Scabies. 3 päeva järgimööda haigele kohale määrada ja siis hoolikalt pesta.

**Causyth (Ephag).**

Amidopyrin. oxychinolinsulfonicum. Kollakas, mõruhapu pulber. Tabl. 0,5 g. Antipyreticum, analgeticum. 1—2 tabl. korraga.

**Cehasol (Seidel).**

Ammon. sulfobitumenosum (ihtüooli samand).

**Cerebrum siccatum (Merck).**

Kuivatatud ajusubstants. Tabl. 0,1 g = 0,5 g värsket aju. Psühhoosid, neurasteenia, taabes, hüsteeria. 2—4 tabl. mitu k. päevas.

**Ceresan.**

Taimekaitsevahend. Sisaldab elavhõbedat.

**Cerolin (Boehringer).**

Pärmirasv. Terad 0,1 g. Seespidi furunkuloosi, akne, teiste nahahaiguste ja kroonil. kõhukinnisuse puhul. 3 k. p. 1—3 tera.

**Chambard Thé (Sicre).**

Fol.Sennae 40, Fol.Menthae, Fol.Melissae, Flor. Calendulae, Flor.Malvae ana 15. Laxativum.

**Chineonalum (Merck).**

Chininum diaethylbarbituricum. Värvusetu, mõru, vees 1: 500 lah. pulb. St. 132<sup>o</sup>. 63,8% kiniini, 36,2% ve-

ronaali. Sedativum palaviku puhul nakkushaiguste ajal. 0,6 g pro dosi.

#### Chininphytin (PB).

Kiniini ühend fitiiniga. 57% kiniini. Kollane mõru pulb. Gripp, malaaria, migreen, läkaköha jne. 1—3 tabl. päevas.

#### Chinosol (Fritzsche).

o-Oksükinoliini ja kaaliumbisulfaadi ekvimol. segu. Helekoll. pulb. kõrvetava maitsega, kerg. lah. vees. Antisepticum, desinficiens. Lahusena 1:1000—5000.

#### Chloramin (Heyden).

Natrium chloramid-p-toluolsulfonicum. Nõrga kloori lõhnaga pulb., lah. vees 1:6. Subst., tabl. 0,1 ja 1 g. Desinficiens, desodorans, antisepticum. 0,2% tupe loput., 0,2—0,5% käte ja instrumentide desinfits., 0,02—0,1% ureetra ja põie loput., 0,1—10% haavade pesemiseks.

#### Chloretone-Inhalant (PD).

Chloretoni (Aceton-Chloroform.) 1 g, Camphorae 2,5 g, Mentholi 2,5 g, Ol. Cinnamomi 0,25 g, Paraff. liquid. puriss. 93,75. Selge, värvusetu vedelik. Ülemiste hingamisteede ärrituste ja põletikuliste affektsioonide puhul, samuti põletishaavade raviks.

#### Choleflavin (IG).

Trypaflavini 1,5 g, Papaverini hydrochl. 0,4 g, Podophyllini 0,2 g, Ol. Menthae gtt XXX, Succ. et plv. Liquirit. q. s. ad pil. No. LX. Hõbedaga kaetud terad à 0,18 g. Cholagogum. 3 k. p. 2 tera enne sööki.

#### Cholelysin (Stroschein).

Natr. oleinici 80%, Albumini 15%, Ol. Menthae 1%, Aquae 4%. Tabl. Sapikivid, koletsüstiit, kollatõbi. 3 k. p. 2 tabl. ½ tundi enne sööki.

#### Cholestin (GL).

Cholesterini 0,6 g, Ol. Ricini 3 g, Carbon. tetrachlor. 2 g, Terpeneoli 3 g, Extr. Chinae 0,1 g, Spirit. 75 g, Aquae 14 g, Ol. Aeth. comp. 2,3 g. Alopecia. Sissehõõrumiseks.

#### Choleval (Merck).

Kolloidhõbeda preparaat, sisald. Natr. choleinic. kaitsekolloidina. 10% Ag. Tumepruunid läikivad lehekese, kerg. lah. vees. Subst., tabl. 0,25 ja 0,5 g, vaginaaltabl. 0,05 g + 0,25 g kihisevat segu, kepikesed

emakakaela ja ureetra jaoks (2,5 ja 10%); emulsioon 2,5% parafiinõlis, elastil. kapsleis; 1,5 ja 3% steriilne boolus. Gonorröa, sapiteede infektsioonid; üldantiseptikum furunkuloosi, larüingiidi jne. puhul. 0,25—2% lahustena gonorröa puhul, muil juhtudel veenisisesi 1—2% lahusena.

#### **Chologen** (Rosenberg).

I. HgCl, Podophyllini ana 0,005 g, Pulv. vegetabil. ad 0,1 g.

II. HgCl 0,005 g, Pulv. vegetabil. ad 0,1 g.

III. HgCl, Podophyllini ana 0,005 g, Mentholi, Camphorae ana 0,0025 g, Pulv. vegetabil. ad 0,1 g.

Sapikivid, koletsüstiit, kollatõbi, kroonil. kõhukinisisus ja muud seedimisrikked maksa puuduliku tegevuse tagajärjel.

#### **Cibalgin** (PB).

Amidopyrini 0,15 g, Acidi diallylbarbiturici 0,05 g. Tabl. 0,3 g = 0,2 g tsibalgiini. Sedativum, analgeticum. 1—2 k. p. 1—2 tabl.

#### **Cigarettes d'Abyssinie d'Exibard** (Ferret).

Kal. nitric. 33 g, Fol. Stramonii 32 g, Fol. Belladonnae 12 g, Fol. Digitalis 11 g. Sigaretid. Asthma bronchiale.

#### **Cigarettes Espic** (Mossat).

Fol. Bellad. 30 g, Fol. Hyoscyami 15 g, Fol. Stramonii 15 g, Fruct. Phellandrii 5 g, Extr. Opii 1,3 g in Aq. laurocerasi q. s., pro 100 cigaret. Asthma.

#### **Cignolin** (IG).

Dioxyanthranol. Kollane pulb., vees ei lah. St. 173—175°. Psoriasis, lichen ruber, dermatomycosis. 0,25% lahusena või 2% salvina.

#### **Cinchophen.**

Acidum phenylchinolincarboicum vel phenylcinchoninicum. K. n.: Atophan, Hexophan, Polyphlogin.

#### **Cinnozyl** (Comar).

Benzyl. cinnamylic. 0,05 g, Cholesterini 0,1 g, Camphorae 0,125 g, Ol. Olivar. 5 ccm. Amp. 5 ccm. Tuberkuloos. 5 ccm päevas nahaalusi või musklisisesi.

#### **Citarin** (IG).

Natrium anhydromethylenocitricum. Valge, hüg-

roskoopne pulb., lah. vees 1:1,5. Tabl. 2 g. Jooksja, põie- ja sapikivid. 3—5 k. p. 2 g.

**Citrodisalyl.**

Acid. methylenocitrylodisalicylum. K. n.: Novaspirin.

**Citrohexamin.**

Hexamin. anhydromethylenocitric. K. n.: Helmitol.

**Citrophen (Roos).**

Monophenetidinum citricum. Valge kristalne pulber, lah. vees 1:40. St. 188<sup>o</sup>. Antipyreticum, antineuralgicum. 0,5—1 g pro dosi.

**Citrovanille (Lill).**

Amidopyrini 25 g, Acetosali 40 g, Nuc. Colae 3 g, Acid. citric. 2 g, Vanillini 1 g, Sacchari lactis 80 g. Pulb. à 1 g. Antidolorosum. 1 pulb. tarviduse korral.

**Citrovanillin Kola (Aroom).**

Koostis ja tarvit. nagu eelmine.

**Citrovanillin Kola (Ars).**

Koostis ja tarvit. nagu eelmine.

**Clauden (Luitpold).**

Kopsukoest isoleeritud hemostüptiline substants. Steriilne pulb. klaastorudes 0,5 g, tabl. 0,5 g (sisald. 0,125 g subst. ja kaltsiumlaktaati 0,05 g), steriilne lahus amp. 2,5 ja 10 ccm. Hemostüptikum. Parenteraalselt (ka veenisisesi), *per os* või rektaalselt.

**Clavipurin (Gehe).**

Eril. menetl. tungalterast erald. alkaloidid viinhappesooladena. Tilgad, tabl. 0,0005 g, amp. 1 ccm = 0,0005 g. Hemostüptikum verejooksu puhul naissuguelundeist; morbus Basedowi. 3 k. p. 30 tilka või 3 tabl. Nahaalusi või muskulisisesi 1—2 ccm, veenisisesi 0,5—1 ccm.

**Coagulen (PB).**

Sisaldab verehüübumist edustavat substantsi loomaverest või verdmoodustavaist organeist. Subst., tabl. 0,5 g, amp. (3% lahus) 1,5, 5 ja 20 ccm. Hemostüptikum. *Per os*, nahaalusi või veenisisesi.

**Codeonal (Knoll).**

Codeini diaethylbarbiturici 11,8%, Natr. diaethylbarbituric. 88,2%. Valge, mõru pulb., lahust. vees 1:30. Subst., tabl. 0,17 g. Sedativum, hypnoticum. 2—3 k. p. 1 tabl., õhtul magamamineku eel 2—3 tabl.

**Coffeopyrin.**

Phenazonum cum coffeino citrico. K. n.: Migraenin.

**Coffetylin (Heyden).**

Atsetüülsalitsüülhappe 10% kofeiini lisandiga. Tabl. 0,3 ja 0,5 g. Analgeticum. antipyreticum. 1—3 k. p. 1—2 tabl. veega.

**Collargol (Heyden).**

Argentum colloidal. 70% Ag. Sinika või roheka metalliläikega lehekesed, vees kerg. lah. pruunilt. Antiseptikum septiliste ja nakkushaiguste puhul. 15% salvinä (Ungt. Créde), veenisisesi 0,5—2% lahusena.

**Collobiase de soufre (Boulanger).**

(Ampoules de soufre colloidal injectable.) Sulf. colloid. 0,33 g, Lysalbiini 5 g, Gummi arabici 9,5 g, NaCl 9,5 g, Aq. dest. ad 1000 ccm. Amp. 2 ccm. Antirheumaticum. Nahaalusi või musklisisesi 1—2 ccm päevas, veenisisesi 0,5—1 ccm päevas.

**Collobiase d'or (Boulanger).**

Kolloidkullalahus ampullides. Roiskveresuse ja septiliste haiguste puhul. Muskli- ja veenisisesi.

**Colloidine (Dubois).**

Eril. menetl. valmistatud sisesekreetsiooninäärmete ekstrakt joodalbumiini lisandiga. Dražeed rasvumise vastu. 2—4 draž. päevas.

**Colloide (Dubois).**

Kolloidse joodi preparaat. Antiseptikum.

**Compral (IG).**

Triklooruretaani ja püramidooni ühend. Tabl. 0,5 g. Analgeticum. 1—2 tabl. tarviduse korral.

**Comprimés de Vichy (Vichy).**

Vichy mineraalveeallikate soolad tablettides. Põie- kivide, suhkurtõve, seedimishäirete jne. puhul. 4—5 tabl. 1 klaasi veega.

**Coramin (PB).**

Püridiin- $\beta$ -karboonhappe dietüülamiidi 25% vesilahus. Tilgad (5% piimhappe lisandiga), amp. 1,1 ccm. Excitans, stimulans vereringehäirete puhul. 30—60 tilka veega lahjendatult; 1—2 ccm nahaalusi või musklisisesi.

**Coryfin (IG).**

Etüülglükoolhappe mentoolester. Värvusetu, õli-

taoline, peagu lõhnatu vedelik. Puhtal kujul pud. 2 ja 5 g, kompvekid à ca. 0,01 g. Ülemiste hingamisteede katarrid, migreen, näolihaste neuralgia, kihelemine. 1—2 komp. või 5—6 tilka 2—3 k. p.

#### Creosotal (IG).

Kreosotum carbonicum. Värvusetu, püdel, nõrga kreosoodilõhnaga vedelik, vees ei lah. Kopsu- ja soolteitiisikus, tüüfus, kroonil. bronhiit. 1—3 g, lastele 0,2—0,5 g mitu k. p.

#### Crurin (IG).

Kinoliinvismutrodanaat. Telliskivipunane krist., valgustundl. pulb., vees lahustamisel laguneb. Haavade, varikooside, lueetiliste paisete jne. raviks. Puistepulb. rina segus tärklisega 5—10—50%.

#### Curcumen (Temmler).

Dražeed à Calc. cholic. 0,1 g, Curcumin-Natr. 0,1 g. Cholericum. 3 k. p. 1—2 draž. peale sööki.

#### Cusytol (IG).

Cupr. citric. + Natr. borocitric. ana mol. hulka. dena. 14,9% Cu. Sinine pulb., lah. vees. Trachoma, conjunctivitis, blenorrhoea jne. Salvina või lahusena (0,3—5%).

#### Cutivaccin Paul (Labopharma).

„Tuberculomucin Weleminsky“ (tuberklibatsillidest valmist. valkainevahetusprodukt), „autolüüsitud bakterid saprofüütide rühmast“, surmatud rõugelima, 5% (mite) või 7% (forte) Alt-Tuberkulin Koch ja fenool konservimisainena. Spetsiaalvaktsiin reuma, išiase, riiniidi jne. vastu. Vaktsineerimine toimub nahatäkke kaudu 8-päevaste vahedega, tavaliselt à 2 vakts. „mite“ ja „forte“.

#### Cyanogas.

Taimekaitsevahend. Hall pulber, eraldav niiskusega kokkupuutel tsüaanvesinikku.

#### Cyarsal (Riedel).

p-Tsüaanmerkurisüülhapu kaalium. Amp. 2,2 ccm (1% Hg sisald. lahus). Süüfilise ühisraviks koos neosalvarsaaniga. 0,5—2 ccm veenisisesi koos neosalvarsaaniga.

#### Cycloform (IG).

p-Amiinobensoehappe isobutüülester. Valge, vees peagu lahustumatu pulb. Tarvit. anesteetikumina (nagu

anestesiin). 5—10% salvi või puudrina; seepidi 0,2—0,5 g pro dosi.

**Cylotropin** (Schering).

Urotropini 2 g, Natr. salicylic. 0,8 g, Coff. natr.-salicylic. 0,2 g, Aq. dest. ad 5 ccm. Amp. 5 ccm (veenisisesi) ja 5 ccm 0,025 g novokaiini lisandiga (muskli-sisesi süstimiseks). Tsüstiit, püeliit, püelonefriit, maksa-sapiteede põletikulised protsessid. Ülepäeviti 1 amp.

**Cyprodyl**.

Vedel taimekaitsevahend, sisaldab kaltsiumarse-naati.

## D.

**Decholin** (Riedel).

Acid. dehydrocholicum. Tabl. 0,25 g, amp. 10 ccm 5% või 20% naatriumiühendi lahust. Maksa ja sapi-teede haigused, astsiit, migreen; diagnostiliselt koletsüs-tograafias. 3 k. p. 2 tabl., veenisisesi mitu k. näd. 5—10—15 ccm.

**Decorpa** (Norgine).

Kuivast, seedimatust, tugeva pundumisvõimega tai-melimast valmist. pruunid šokol. kaetud terakesed. Rasvumise vastu dieteetikumina, tekitab täiskõhu tun-net. 1—2 dessertlusika täit enne sööki.

**Degalol** (Riedel).

„Mentha-dioxycholan“-happe preparaat. Vees mit-telah. pulb. Subst., tabl. 0,1 g. Maksa ja sapiteede haiguste, eriti sapikivindite puhul; sooltedüspepsia, kroonil. ja habituaalne kõhukinnisus, super- ja subatsi-diteet. 3 k. p. 2, valude puhul 3—4 tabl.

**Degrasin** (Schering).

Erilisel menetl. kuivat. kilpnääre. Tabl. 0,3 g = 0,2 g värsket näaret. Rasvumise vastu 1—6 tabl. päe-vas.

**Derma puuder** (Ephag).

Ol. Jecoris chlorati 10, ZnO 10, Talci 80. Puuder toosides 100 g. Intertrigo, pruritus, combustio: stadi-um erythematosum et bullosum, ulcus cruris, decubi-tus pemphigus etc. Puudrina.

**Derma salv** (Ephag).

Ol. Jecoris chlorati 16%, ZnO 45%, Bol. alb. ste-

ril. 5%, Lanol., Vaselin., Ol. Vaselini, Terpeneoli. Tuub. 30 g ja kliinikupakendis 250 g — 1 kg. Põletishaavade, lamatise, ekseemide, haudumise ja muude nahaärrituste ja -vigastuste raviks.

#### Dermatebin (RSi).

Bac. tuberculosi typus humanus et bovinus ana valmist. tuberkuliin, kontsentritud 1:25. Kutsub tbc-ga infits. organismi nahal esile reaktsiooni. Diagnostil. kui ka ravimise otstarbeks.

#### Dermatol (IG).

Bismutum subgallicum. 46,6% Bi. Kollane, lõhnatu, maitsetu pulb., vees ei lah. Antiseptikum. Seespidi 3 k. p. 1 g, välisp. *per se* või 10—20% salvina või puudrina.

#### Desencin (IG).

p-Joodäthoksübensoehappe bensüülestrit 0,2425 g, pseudosulfimiidbensoehappe atsiidi 0,0075 g. Valge pulb., vees peagu ei lah. 31,5% J. Tabl. 0,25 g. Hüpertoonia, veresoonte lubjastus, nefroskleroos, veresoonte spasmid, astma. 2—5 k. p. 1 tabl.

#### Desitin (Desitin).

S a l v: Ol. Jecoris chlorati 17% (0,03% kloori org. seotud), Vaselini 20%, Lanolini 11%, ZnO 47%, Bol. alb. 5%. Haavade ja põletishaavade raviks.

K ü ü n l a d: Ungt. Desitini, Ol Cacao ana part. Hemorroidide puhul.

O o v u l i d: Acid. lactic., Acid. salicylic. Ol. Jecor. chlorat., Ol. Cacao. Fluor albus, kolpitis, portio erosioonid jne.

P u u d e r: Ol. Jecoris chlorati 10%, ZnO, Talc. Põletushaavade, lamatise, ekseemide ja nahapunetiste raviks.

#### Devegan (IG).

Acid. oxyacetylaminophenylarsinic. 0,25 g, Acid. boric. 0,03 g, eril. menetl. valmist. süsivesikuid 0,67 g, Talci ad 1 g. Tabl. 1 g. Tupe limaskestast düsfunktsioonide varal kulgevad voolused. 1—3 k. p. 1—2 tabl. tuppe.

#### Dial (PB).

Diallülbarbituurhape. Valged krist., rask. lah. külmas vees. Subst., tabl. 0,1 g, pud. 15 ccm, amp. 2,3 ccm (1 ccm = 0,1 g). Hypnoticum, sedativum. 3 k.

p. 0,05 —0,1 g või 15—30 tilka; muskli- või veenisisesi 1—4 ccm.

### Diamorphin.

Diacetylmorphinum. K. n.: Heroin.

### Dicodid (Knoll).

Dihydrocodeinon. St. 193—194<sup>o</sup>. D. bitartaric. (lah. 5 osas vees, väga rask. külmas alk.): subst., tabl. 0,005 g ja 0,01 g. D. hydrochloric. (lah. 2 osas vees ja 10 osas alk.): subst., amp. 0,015 g. Narkootil. ja rahustav vahend eriti köha, läkaköha, erutusseisundite jne. puhul. Täiskasv. 2—3 k. p. 0,005—0,01 g, lastele  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  tabl. à 0,005 g. Nahaalusi 0,5—1 ccm.

### Difteeria kaitsesalv (Viini RSi).

Mürgitustatust difteeriabakterite puljongikultuurist valmist. pruun, õline, veeslahustuv mass.

### Digalen (Roche).

(Digitoxin. solubile Cloetta). Vereva sõrmkübara koguglükosiidid. Tilgad (1 ccm = 150 konnaannust = 0,1 g Fol. Digital. titrat.), amp. 1,1 ccm (1 ccm = 0,05 g Fol. Digital. titrat.). Cardi tonicum. 10—20 tilka korraga, süst. 1—2 ccm päevas.

### Digifoline (PB).

Pallastainevabad sõrmkübaralehe koguglükosiidid. Tilgad (Digifolini pur. 0,015 g, Aq. dest. 12,735 g, Spir. vini 1,5 g, Glycerini 0,75 g), ampullid 1,1 ccm (Digifol. pur. 0,001 g, NaCl 0,009 g, Aq. dest. ad 1,1 ccm), tabl. (Digifol. pur. 0,001 g, Sacch. lact. 0,099 g). 1 ccm = 1 tabl. = 0,1 g Fol. Digital. titrat. Cardiacum.

### Digipuratum (Knoll).

Sõrmkübaralehe pallastaine- ja digitoniinivabad toimeained. Kollakas, mõru pulber. Subst., tabl. 0,1 g, lahus (sisald. glütseriini ja kampri jälgi), amp. 1,1 ccm ja 2 ccm. 1 tabl. = 1 ccm amp. e. lahust = 0,1 g Fol. Digital. titrat. = ca. 200 konnaannust. Cardi tonicum. Kuni 4 tabl. p., 3 k. p. 10—15 tilka või 1—2 ccm süst.

### Digitaline Nativelle (Nativelle).

Digitalinum crystallisatum Pharm. Gallic. Amp. 0,25 mg, graanul. 0,1 mg. Cardi tonicum. 1—10 tera või 1—2 amp. päevas.

### Digitalis-Dispert (Krause).

Sõrmkübaralehtede külmmatseraat, kuivatatud Krause pihustamismeetodi abil. Tabl. à 150 konnaan-

nust = 0,06 Fol. Digital., subst. 1 g = 1500 konnaanust. Cardiotonicum. 3 k. p. 1—2 tabl.

#### **Digitalysat (Ysat).**

Füsioloogiliselt teimitud dialüsaat sõrmkübaralehtedest. Tilgad (20 gtt = 0,15 g Fol. Digital.), tabl. à = 0,1 g Fol. Cardiotonicum. 3 k. p. 10—15 tilka või 1 tabl.

#### **Digotin (Gehe).**

Digitoxin. puriss. cryst. Lahus (1 g = 0,00033 g), tabl. 0,1 g (= 0,00045 g), amp. 1,1 ccm (= 0,00045 g). Cardiotonicum. 2—3 k. p. 20 tilka veega või 1 tabl.

#### **Di-Hexin (Lill).**

Hexaminum sulfosalicylicum. Tabl. 0,5 g. Siseantiseptikum põie- ja kuseteede haiguste, gripi jne. puhul. 4—6 k. p. 1 tabl.

#### **Dijodyl (Riedel).**

Ritsiinsteearoolhappe dijodiid. 46% J. Valged, maitsetud, valguskindlad kristallnõelad, vees ei lah. Subst., tabl. 0,15 g ja 0,3 g, kapsl. 0,3 g. Joodiraviks joodisoolade asemel. 1—3 k. p. 1—2 kapsl. või tabl. peale sööki veega.

#### **Dilaudid (Knoll).**

Dihydromorphanonum hydrochloric. Valge krist. pulb., kerg. lah. vees ja kuumas alk. Amp. 1,1 ccm = 0,002 g, tabl. 0,0025 g. Tarvit. morfiini asendajana eriti spastil. seisundite puhul ja narkoosi ettevalmist., toimib kiiremalt, vähem mõjustab peristaltikat ja on paremini talutav. ½—1 tabl. mitu k. p. katkinärimatult alla neelata.

D. - Atropin amp. = Dilaudidi 0,002 g, Atropini 0,0003 g.

#### **Dimmunol (Takema).**

Strepto- ja stafülokokkide antiviirust sisaldav salv. Mädavistrikute, furunklite, mädanevate haavade, ekseemide, roosi jne. raviks.

#### **Diplosal (Boehringer).**

Acid. salicylosalicylicum. Valge pulb., vees ei lah., kerg. lah. alk. ja eetris. Subst., tabl. 0,5 g. Äge ja kroonil. liigese- ja musklireuma ning kuseteede infektsioonid. 0,5—1 g korruga 3—6 k. p.

#### **Disalyl.**

Acid. salicylosalicylicum. K. n.: Diplosal.

**Distan (Takema).**

Extr. Filicis 50, Ol. Terebinth. 12, Spir. camphor. 13, Benzoli 75, Carbonei tetrachlorat. 100. želatiin-kapsl. Lammaste maksakaantõve raviks.

**Distol (Chinoin).**

Sõnajalajuurika spetsiifil. toimivate ainete lahus tetrakloorsüsinikus ja parafiinõlis (lammastele) või heksaklooretaanis (veistele). Kapsl. Veiste, lammaste ja kitsede maksakaantõbi. Tarvit. erieeskirja järgi.

**Diuretin (Knoll).**

Theobromino-natrium salicylicum. Valge pulb., kerg. lah. vees. Subst., tabl. 0,5 g. Diureetikum, vere-soonte toonikum; mõnel astma juhul spasmolüütikumina ja saledusraviks. Täiskasv. kuni 5 g päevas, arterioskleroosi puhul 1—1,5 g päevas.

**Diuretysat (Ysat).**

Merisibulast, kadakamarjadest ja kaselehtedest valmist. füsioloogil. teimitud dialüsaat. Lahus ja tabl. (1 tabl. = 5 ccm. lahust). Diureticum. 3 k. p. 1 teel. täis või 1 tabl.

**Dohyfral (Houten).**

Puhas D-vitamiin tabl. à 0,025 mg. Rahhiit, teetania. Profülaktil.  $\frac{1}{2}$ —1 tabl., raviks 1—2 tabl. päevas, lahustatult soojas piimas (mitte keeta!).

**Dolorsan (Opfermann).**

Jodi 7,1 g, Camphorae 17,9 g, Ol. Rosmarini 6 g, Alcoholi 43 g, Liq. ammon. caust. 71 g.

D. - p a l s a m : Mentholi 4,3%, Methyl. salicylic. 4,3%, Jodi 0,17%, Camphor. 0,72%, Ammoniaci 0,35%. Analgeticum, antirheumaticum, antiphlogisticum.

**Dormalgin (Riedel).**

(Doralgin). Noktaali 1, amidopüriini 3. Kollakas, mõru, vees rask., org. lahustajais kerg. lah. pulb. Subst., tabl. 0,2 g, lahus pud. 15 ccm (25 gtt = 0,1 g), amp. 2,2 ccm (1 ccm = 0,2 g). Analgeticum. 1—3 k. p. 0,2—0,4 g; amp. nahaalusi, muskli- või veenisisesi.

**Doryl (Merck).**

Trimetüülamiinoförmüül -  $\beta$  - oksüetüülammooniumkloriid. Subst., tabl. 0,002 g, amp. 0,0001:1 ccm ja 0,0005:1 ccm, pud. 5 ccm (1 ccm = 0,0075 g, ainult silmaraviks). Suurendab pulsimahtu, tekitab süljevoolust ja maomahla eritumist. Glaukoom, südame-neuroos,

migreen, epilepsia, seedimishõrkus. 1—3 k. p. 1 tilk silma; seespidi  $\frac{1}{2}$ —1 tabl. tarvid. korral, või 1—2 ccm nahaalusi.

**Dragées Bengue au Menthol** (Bengue).

Draž., sisald. mentooli ja naatriumboraati. Ülemiste hingamisteede haiguste puhul suus imeda.

**Drosithym** (Ysat).

*Drosera rotundifolia* ja *Thymus serpyllum*'ist valmist. dialüsaat. Pud. 10 ccm. Expectorans, eriti läkaköha puhul. Imikuile ja lastele kuni 2 a. homm. ja õht. enne sööki 1 tilk, üle 2 a. kaks tilka. Täiskasv. bronhiidi ja katarride puhul 3 k. p. 5—10 tilka.

**Duotal** (Heyden, IG).

Guajacolum carbonicum. Valge krist. pulb., vees ei lah. St. 86—88°. Tbc, bronhiit, kopsupõletik; soolteantiseptikum tüüfuse ja nakkuslike soolekatarride puhul. 3 k. p. 0,2—0,5 g.

**Dusturan.**

Püreetriimaga (ekstraktiga) immutatud Bolus alba või talk. Soojavereliste loomadele kahjutu taimekaitsevahend.

## E.

**Ecobol** (Riedel).

Kontsentritud sõnajalaekstrakti 15% lahus keemil. puhtais süsivesikuis. Kapsl. à 3,5 ccm. Lammaste maksakaantõve raviks. 1 kaps. iga lambale.

**Ektebin** (Merck).

Lanoliiniga valmist. salv, sisald. tuberkuliini ja tuberklibatsillide antigeene salitsüülhappe lisandiga. Tuub. 1 ja 10 g. Välispidiselt bronhiaalnäärme tbc, skrofuloosi, pleuriidi, imikute ja suuremate laste luu- ja liigesetuberkuloosi ning täiskasvanute kopsu-, silma- ja nahatuberkuloosi puhul.

**Ekzemyl** (Henning).

Tr. carbon. deterg. 10%, Resorc. 1%, Vasel., Lanol., Ol. Paraffin. q. s., Aethyl. clorat. 87,5%. Vinnataolise seadeldisega suletud klaaspudel, millest preparaati väljub udustatult või tilgakaupa. Kroonil., akuuts. ja subakuuts. ekseemide, dermatomükooside, tööstuseksee-

mide, soomusohatiste jne. raviks. 2—3 k. p. haigetele kohtadele pitsida.

### Elafrosin.

Rohekas pulber, sisaldav vaskarsenaati. Taimekaitsevahend.

### Elarson (IG).

Strontium chlorarsinosobehenolicum. 6% Cl, 13% As. Valge, maitsetu pulb., vees ei lah. Tabl. à 0,5 mg As. Eisen-Elarson — 1 tabl. = 0,5 mg As ja 30 mg Ferr. reduct. Jod-Elarson — 1 tabl. = 0,5 mg As ja 65 mg KJ = 50 mg J. Primaar- ja sekundaar-anemia, kloroos, neurasteenia, Morbus Basedowi, nahahaigused; samuti (Jod-Elarson) struuma, skrofuloosi, arterioskleroosi, lueetil. haiguste puhul. 3 k. p. 1 tabl. peale sööki, suurendades aegamööda ühekordset annust kuni 3 tableti.

### Elbon (PB).

Tsinnamoül-p-oksüfenüülkarbamiid. Valge, peagu maitsetu ja lõhnatu pulb. Tabl. 1 g. Antipyreticum, antisepticum nakkuseliste katarride ja tuberkuloosse püreksia puhul. 2—3 k. p. 1 tabl. vähe veega.

### Eldoform (IG).

Parkhappe ühend pärmiga. Hallikaspruun, peagu lõhnatu ja maitsetu pulb., vees ei lah. Tabl. 0,5 g. Soolteadstringens kõhulahtisuse puhul. 3—4 k. p. 1—2, lastele  $\frac{1}{2}$  tabl.

### Electrargol (Clin, Heyden).

Elektrokolloidne hõbedalahus. 0,04% Ag. Amp. 2, 5, 10 ja 25 ccm. Nakkushaiguste ja nakkuspõletikuliste protsesside puhul. 5—20 ccm muskli- või veenisisesi.

### Elityran (IG).

Kilpnäärme preparaati. 0,5% org. seotud J. Tabl. 0,025 g = 10 meriseühikut. Kilpnäärme tegevushäired, müksödeem, kretinism, rasvumine jne. Üldiselt 3 k. p. 1—2—3 tabl.

Ellimans Royal Embrocation for horses and cattle (Elliman).

Ol. Terebinth. 75, Acet. pyrolignos. 50, Albuminis 25. Antiphlogisticum, resolvens, antineuralgicum veterinaar-praksises.

### Elsulin (GL).

Mentholi 0,75 g, Ol. Andromedae, Terpeneoli ana 1,5 g, Paraffini liq. ad 15 g, Chlorophylli q. s. Antirheumaticum, antineuralgicum. Sissehõõrumiseks.

**Embarin** (Heyden).

8,5% steriilne merkurisalitsüülsulfohapu naatriumi lahus (3% Hg), ilma või 0,5% akoiini lisandiga. Amp. 1,2 ccm. Lues'i kõik staadiumid. Tarvit.: ilma akoiinina: veenisisesi kombiinitult neosalvarsaaniga (0,45 g + 4 ccm aquae + 1 ccm embariini), algul 4, siis 5—6-päevaste vahedega; akoiiniga: nahaalusi või veenisisesi 0,3—1 ccm igal 2.—3. päeval (üldse 12—30 süstimist).

**Embial** (Merck).

Bismut. naphtenicum steriilses maapähkliõlis. 1 ccm = 0,07 g Bi. Pud. 15 g. Antilueticum. Musklisisesi 1 ccm igal 3.—4. päeval (üldse 12—20 süstimist).

**Empyroform** (Schering).

Formaldehüüdi ja lehtpuutõrva kondensatsiooniprodukt. Hallpruun, peagu lõhnatu pulb., vees ei lah. Ekseemide raviks. *Per se*, 5—20% salvina või puudrina.

**Emsi pastillid** (Bad Ems).

10% loomul. Emsi allika soola, 90% suhkrut. Solvens ja antisepticum suu- ja kurgule, ka hüperatsidi-teedi puhul.

**Endojodin** (IG).

Heksametüüldiamiino-isopropanooldijodiidi 20% lahus. 1 ccm = 0,118 g J. Amp. 2 ccm. Hüpertoonia, arterioskleroos, aortalgia, astma, süüfilis jne. Nahaalusi, muskli- või veenisisesi 1—2 ccm päevas.

**Enesol** (Comar).

Natr. methylarsinic., Hydrarg. salicylic. ana part. 28% As, ca. 20% Hg. Amp. 2 ja 5 ccm (1 ccm = 0,03 g enesooli). Lues, gonorröa ja selle komplikatsioonid, malaaria jne. Keskmiselt 2 ccm päevas musklisisesi.

**Eno's fruit salt** (Eno).

Natr. bicarbon. 54,3%, Natr. bitartar. 1,75%, Acid. tartaric. 43,85%. Digestivum. 1 tee- — 1 supilusika täis klaasi veega.

**Eparseno** (Spiess).

Amiinoarsenofenooli 10, glükoosi 75, bidestillitud vett 25. Siirupitaol. oranž vedelik. Amp. 1,2 ccm. Lues. Tarvit. erieeskirja järgi.

**Ephetonin (Merck).**

Phenylmethaminopropanolum hydrochloric. (ratseemil. efedriin). Valge krist. pulb., lahust. 2 osas vees ja 40 osas alk. St. 186—188<sup>o</sup>. Vesilahus on steriilitav. Amp. 0,05:1 ccm, tabl. 0,05 g. Adrenaliini asemel astma, heinapalaviku jt. allergiliste haigestumiste vastu; hingamisteede katarrid, vanadusemfüsee, vererõhulangus; koos homatropiiniga mydriaticumina. 1—3 k. p. 1 tabl., amp. nahaalusi.

**Epicarin (IG).**

$\beta$ -oksünaftüül-o-oksü-m-toluüülhape. Punakas pulb., vees ei lah. St. 199<sup>o</sup>. Sügelised ja nahahaigused. 5—10% salvina või alkoh. lahusena.

**Epilepticon (Weil).**

Haemoglobin, Ferr. bromat., KBr, emajuure mõruained, kolaniin, hüpofüüsi ekstrakt. Pulb. ca. 3 g. Epilepsia, hysteria, neurasthenia, agrypnia nervosa. 1—4 pulbr. päevas.

**Epinephrin.**

Dioxyphenylaethanolmethylaminum. K. n.: Adrenalin, Epirenan, Paranephrin, Renoforn, Scurenaline, Suprarenin.

**Ergotin (MBK).**

Tungaltera toimeaineid muutumatult sisaldav tume-punakaspruun, selge, steriilne vedelik; 1 g = 4 g tungaltera. Amfiolidid ja tabl.

**Ernes Testament (Medikon).**

Cort. Condurango, Chinae, Aurant., Cascar. Sagrad., Cinnamomi, Rad. Gentian., Sarsaparillae, Rhiz. Rhei, Calami, Lign. Santali rubr., Caryopylli, Aloë. Roborans.

**Erugon (IG).**

Noorte härgade munandeist ekstraksiooni teel alkoholiga või atsetooniga saadud ja valgust ning mitespetsiifilistest lipoididest vabastatud toimeained steriilses õlilahuses. Amp. 1 ccm = 2 kukeharjaühikut. Impotents, vaiml. ja füüsil. väsimus, neurasteenia, prostaktoomia järelused jne. Musklisisesi 1 ccm 2—3 k. p.

**Essentia testicularum Semin (Medikon).**

Härja munandeist valmistatud alkoholoolne ekstrakt piparmündiõli lisandiga. Sugulise nõrkuse ja enneaegsete vananemisnähtude puhul.

**Eucaïn- $\beta$  (Schering).**

Trimethylbenzoxypiperidinum hydrochloric. Valge, vähe mõru krist. pulb., lah. vees 1:30, alkoholis 1:9. St. 268<sup>o</sup> (lagunedes). Lokaalanesteetikum. Kirurgias 2—6% lahuseks, hambaravis 1—2%.

**Eucerin** (Beiersdorff).

5% lanoliinist eraldatud oksükolesteriini, 95% para-fiinsalvi. Kollakas, 200% vett siduv salvitaoline mass. Salvialusena.

**Euchinin** (IG, Zimmer).

Chininum aethylcarbonicum. Valged peagu maitseta siidpehmed nõelad, väga vähe lahust. vees. St. 95<sup>o</sup>. Kiniini asendaja palaviku alandamiseks nakkushaiguste puhul (malaaria, gripp, tüüfus jne.); lastele eriti läkaköha puhul. 0,5—1 g mitu k. p.

**Eucupin** (Zimmer).

Isoamüülhüdrokupreiin. Valge, peagu maitsetu pulb., vees ei lah., lahustub alk., eetris, kloroformis ja rasvõlides. Antiseptiline anesteetikum vähktõve, röntgenihaavade, hemorroidide jne. puhul. 1—4% õililahusena, 5—20% salvina; seespidi 0,25—0,5 g 1—2 k. p.

**Eugallol** (Knoll).

67% pürogalloolmonoatsetaati ja 33% atsetooni. Pruun vedelik, lah. vees. Psoriasis, lichen ruber, lupus vulgaris jne. Välispidi lahjend. atsetooniga 1 + 1 või tsinkpuudri või tsinkpastaga.

**Euguform** (Güstrov).

Osaliselt atsetüülitud metüleendikvajakool. Valkjashall, peagu lõhnatu pulb., vees ei lah. Haavaraviks. Pulbrina, 5—10% salvina, 50% atsetoonilahusena.

**Euka-pastillid** (GL).

Mentholi 3,75 g, Eucalyptoli 0,25 g, Thymoli 0,025 g, Terpeneoli 0,025 g ad past. No. 1300. Pastillid ca. 1 g. Ülemiste hingamisteede haiguste puhul. Kuni 10 past. päevas aeglaselt suus imeda.

**Eukodal** (Merck).

Dihydrooxycodoinum hydrochloric. Kollakasvalge krist. pulb., kerg. lah. vees, rask. alk. Lahus on steriilitav. Subst., tabl. 0,005 g, amp. 0,01 ja 0,02 g 1 ccm. Narcoticum, anodynum. ½—1—2 tabl. või nahaalusi 0,01—0,02 g päevas.

**Eulatin** (Östreicher).

2 osa antipüriini ja p-broombensohappe mol. hulk.

segu + 1 osa antipüriini ja o-amiidobensohappe mol. hulk. segu. Valge, mõru pulb., vees osalt lahustuv (lahus lilla fluorestsentsiga). Subst., tabl. 0,25 g, siirup 5%. Bronhiit, läkaköha. 3 k. p. 1 tabl. või 1—2 teelus. täit siirupit.

**Eulatin-siirup** (Kuik).

Euladini solubil. 35 g, Sir. Rubi id. 100 g, Sir. spl. 900 g. Hingamisteede katarride puhul. 3 k. p. teelusika täis.

**Eumenol** (Merck).

Hiina Tang-Kui (*Angelica anomala sinensis*) juure vedelekstrakt. Vedelik ja tabl. (0,3 g kuivekstr. = 0,6 g eumenooli). Emmenagogum ja düsmenorröa puhul. 3 k. p. 1 teelus. täis või 2—4 tabl.

**Eu-Ment pastillid** (Ephag).

Mentholi 10 g, Thymoli 0,2 g, Terpeneoli 0,5 g, Eucalyptoli 5 g ad 1000 past. à 1 g. Ülemiste hingamisteede põletikulised haigestumised. 1—2 pastilli tunnis aeglaselt suus laguneda lasta.

**Eumydrin** (IG).

Atropinum methylonitricum. Valge krist. pulb., kerg. lah. vees. St. 163°. Tarvit. nagu atropiin, 0,001—0,003 g 1—2 k. p., ka nahaalusi; silmatilkadena 0,025: 10.

**Eunatrol** (Zimmer).

Natrium oleinicum. Valge või kollakas pulb., lah. vees ja alk. Cholagogum. Homm. ja õhtul 0,5 g.

**Eupaverin** (Merck).

Methylendioxybenzyl-methylmethylendioxyisochinolinum hydrochloric. (tabl.) või sulfuric. (amp.). Subst., tabl. 0,03 g, amp. 1 ccm = 0,03 g. Spasmolüütikum papaveriini asemel, sellest toimivam ja vähem mürgine. 1—3 k. p. 1—2 tabl., nahaalusi või veenisisesi 0,03—0,06 g.

**Euphtalmin** (Schering).

Fenüülglükolüül-N-metüül-β-vinüüldiatsetoonalkamiinkloorhüdraat. Valge krist. pulb., kerg. lah. vees. St. 183°. Lahused on steriilitavad. Mydriaticum. 2—10% lahusena.

**Euphyllin** (Byk).

Teofüllüüni (u. 80%) ja etüleendiamiini ühend. Subst., tabl. 0,1 g, amp. 2 ccm ja 10 ccm (1 ccm =

0,24 g eufüll.). Diureticum, cardi tonicum. 2—3 tabl., või 0,48 g musklisisesi, või 0,24 g veenisisesi.

**Euresol (Knoll).**

Resortsiinmonoatsetaat. Kollakas püdel, valguse tundlik vedelik, lahustub alkoh., vees ei lah. Resortsiini asemel akne, seborröa, külmamuhkude jne. puhul. 5—10% lahuseana või salvina.

**Europphen (IG).**

Isobutüül-o-kresooljodiid. 25% J. Valguse- ja niiskusetundlik, pruun, amorfne pulb., vees ei lah. Haavade ja põletushaavade raviks. Puudrina, segus 2—3 osa boorhappega või 5—10% salvina.

**Evipan (IG).**

N - metüültsükloheksenüül - metüülmalonüülureiid. Valge, maitsetu, vees rask. lah. pulb., St. 143—145<sup>o</sup>. Tabl. 0,6 = 0,25 g evipaani. Hypnoticum. 1—1½ tabl. magamamineku eel.

**Evipan - Natrium.** Kerg. vees lah. valge pulb., kuivampullides à 1 g. Lühi- ja eelnarkoosiks (30—40 min. kestvusega). Lahust. 10 ccm vees ja süstit. veenisisesi.

**Exalgin (Merck).**

Metüülatsetaaniliid. Valge, lõhnatu, maitsetu, krist. pulb., lah. vees 1:60. St. 100—101<sup>o</sup>. Neuralgil. valude puhul. Homm. ja õht. 0,25 g.

**Extr. Chinae Nanning (Nanning).**

Kiina vedelekstrakt, sisaldav 5% alkaloide ja 30% glütseriini. Stomachicum, tonicum. 3 k. p. 20 tilka veega.

## F.

**Fantan (Merck).**

Fenüültsinhonüüluretaan. Kollakasvalge krist. pulb., st. 173—174<sup>o</sup>. Vees ei lah. Subst. tabl. 0,5 g. Antarthriticum, antirheumaticum. 3—4 k. p. 1—2 tabl. vähe veega.

**Farnotän (Ephag).**

Sõnajalajuurikaekstrakt koos riitsinuseõliga želaatiinkapslites.

**Fay's Sodener Mineralpastillen (Soden).**

Taunuses asuva Bad Soden'i allikate vee aurusta-

misel saadud soolad mentooli lisandiga. Solvens ülemiste hingamisteede katarri puhul.

**Ferratin** (Boehringer).

Natr. ferrialbuminum. 6% Fe. Punapruun, peagu lõhnatu ja maitsetu pulb., lah. aegl. soojas leelises. Subst., tabl. 0,25 g. Roborans, ka kehvveresuse, kloroosi jne. puhul. 3—4 k. p. 2—4 tabl.

**Ferratol** (Ephag).

0,3% rauda sisaldav aroomistatud ja magustatud rauaoksüüdilahus. Roborans. 3—4 k. p. 1 supilus. täis.

**Ferratol** (Medikon).

Ca. 0,2% rauda sisaldav magustatud ja aroomistatud rauaoksüüdilahus. Roborans. 3—4 k. p. 1 supilusika täis.

**Ferratol** (Remedia).

Ca. 0,5% rauda sisaldav magustatud ja aroomistatud rauaoksüüdilahus. Roborans. 3—4 k. p. 1 tee- kuni 1 supilus. täis.

**Ferratol Richter** (Ephag).

0,3% rauda ferratiin-naatriumina sisaldav aroomistatud ja magustatud vedelik. Kloroosi, kehvveresuse, nõrkuse, isupuuduse puhul. 3 k. p. 1 tee- või 1 supilusika täis.

F. cum arseno. 0,003%  $As_2O_3$ .

F. cum Jodo. 0,3% J.

**Ferratose** (Boehringer).

(Liquor Ferratini) 5% ferratiinilahus, aroomistatud ja magustatud. Roborans. 3—4 k. p. 1 supilus. täis peale sööki.

**Ferricodile** (Leprince).

Ferrum kakodylicum oxydulatum. Amp. 1 ccm = 0,0005 g, tabl. 0,025 g. Lymphadenitis, leucaemia. 1 amp. päevas.

**Ferrocoll** (Ephag).

5% rauda sisaldav magustatud rauaoksüüdihüdraadi dialüsaat glütseriini lisandiga. Kloroosi, kehvveresuse, nõrkuse, isupuuduse puhul. 3 k. p. 1 teelus. täis.

**Ferrogliadin** (Klopfer).

„Raua-taimevalk“. Tabl. à 25 mg Fe. Kehvveresuse, kloroos jne. 2—3 k. p. 1 tabl.

**Ferroglycerophosphat** „Ars“. (Ars).

Ferr. glycerophosph. 2 g, Calc. glycerophosph. 6 g,

Sirup., Spirit., Tr. aromat., Tr. aurant. Aquae q. s. ad 200 g. Roborans kehvveresuse, üldise nõrkuse jne. puhul. 3 k. p. 1 supilus. täis.

**Ferroglycerophospat tabl. c. lecithino (Ephag).**

Calc. glycerophosphoric., Ferr. glycerophosphoric. ana 0,15 g, Lecithini 0,02 g. Tabl. 0,3 g. Neurasteenia, asteenia, vaimline ja füüsiline liigväsimum, kehvveresus, taastoibumine. 3—6 tabl. päevas, lastele vastavalt vähem.

**Ferrum Vitrum (Vaseus).**

Liq. ferri caseinopeptonici. 0,97% Fe. Meeldiva maitsega vedelik. Tonicum. 3 k. p. 1 tee—1 supilusika täis.

**Ferrolin (Medikon).**

Rauaalbuminaati, hemoglobiini, (kiniini?), letsitiini, vanilliini, rauaoksüüdi ja suhkrut sisald. tabl. 0,5 või 0,8 g. Kehvveresuse ja närvinõrkuse puhul. 3—6 tabl. päevas.

F. vedel: ferratiini, rauaalbuminaati, hemoglobiini, ovoletsitiini, rauaoksüüdi, alkoholi, suhkrut ja maitse- ning lõhnaineid (ka rosina ekstrakti) sisald. vedelik. 3—4 k. p. 1 supilus. täis.

**Ferro-Maltol (Aroom).**

Linnakseekstrakt 0,05% rauakarbonaadi lisandiga. Kehvveresuse puhul.

**Ferrophag (Ephag).**

0,2% rauda sisaldav magustatud ja aroomistatud rauaoksüüdilahus. Roborans. 3—4 k. p. 1 supilus. täis.

**Ferrophytin (PB).**

Ferrum inosithexaphosphoricum. Terad 0,25 g = 0,15g Ferrophytini, 0,1 g Extr. Gentianae. Roborans, tonicum. 3—4 k. p. 1—3 tera.

**Ferropyrin (Knoll).**

Rauakloriidi ja antipüriini ühend. 64% antipüriini, 12% rauda. Punane krist. pulb., lah. 5 osas külmas, 9 osas kuumas vees. Hemostüptikum. Siseverejooksudel 0,5 g; välispidi 10—20% lahusena vees või glütseriinis.

**Ferrose (Jürgens).**

Eril. menetl. valmist. magustatud ja aroomistatud vedelik, sisald. 0,55% kahe- ja 0,05% kolmevalentset (tsitraadina) rauda. Rauapreparaadina 3 k. p. 1 teekuni 1 supilus. täis.

**Ferrostabil (Schering).**

Stabiliseeritud  $\text{FeCl}_2$ , dražeed à 0,05 g. Rauapreparaadina kehvveresuse, raskete verekaotuste jne. puhul. 3 k. p. 3—4 tera.

**Ferrovarial (Merck).**

Bioloogil. standarditud novariaali ja org. rauaühendi kombinatsioonpreparaat, vees lah. kollane pulber. Tabl. à 10 hiireühikut. Munasarja funktsioonide puudulikkus samal ajal esineva kehvveresusega. 3 k. p. 2—3 tabl.

**Fersan (Fersan).**

Rauda sisaldav nukleoproteiid. 0,25% Fe. Subst., pastill. 0,25 ja 0,5 g. Roborans. 1 dessertlusika täis pulbrit või 5 pastill. 2 k. p.

**Festal (IG).**

Eril. menetl. valmist. ensüümpreparaat. Dražee 0,5 g sisaldab pankreasfermendipreparaati 0,175 g, hemitsellulaasiprepar. 0,05 g, sapiosiseid 0,05 g. Düspepsia, koletsüstiit, kroonil. gastroenteriit jne. 3 k. p. 1 dražee vahetult peale sööki.

**Fibrolysin (Merck).**

Tiosiinamiini ja naatriumsalitsülaadi ühend. Amp. 2,3 ccm ja 11,5 ccm (vet.), supp. 0,3 g. Mitmesuguste armkudede pehmemdamiseks. 2—3 k. p. 2 ccm intragluteaalselt; 1—2 küünalt päevas.

**Fichera 365 (IG).**

Erilisel menetl. vasikate põrnast, harknäärrest ja luuüdist valmist. ekstraktide segu NaCl-ga. Punakaspruun vees lahustuv mass kuivampullides. Terapeutil. ja profülaktil. kasvajate raviks. Nahaalusi või musklišisesi 1 amp. (lahust. 2 ccm steriilses vees) 2 k. näd.

**Filmaronöl (Boehringer).**

10% filmarooni (sõnajalajuurikast ekstraktimisel saadud aspidinofilitsiini) lahus riitsinuseõlis. Aspidinofilitsiin on amorfne, helekollane happel. omadustega pulber, ei lah. vees, lahust. õlis ja org. lahustusaineis. Lahus ja kapsl. (3 kapsl. = 0,85 g filmarooni + 1,7 g mandliõli). Soolenugiliste (Taenia, Diphyllbothrium, Ankylostoma, Ascaris, Oxyuris) vastu. Täiskasvanuile 8—10 g õli, lastele 3—8 g.

**Flavosol (Ephag).**

Diamiinometüülakridiinkloriidi 0,003 g, heksamiini

0,1 g. Tabl. 0,5 g kakao ja maitseainete lisandiga. Suukoopa ja kurgu desinfitseerimiseks haiguste puhul ja profülaktil. difteeria, gripi, sarlaki ja angiina vastu. 1—2 tabl. tunnis aeglaselt suus imeda.

#### Fluorol (TÜBI).

Alumin. formaldehydosulfurosi basici 0,1 g, Ac. tartaric. 0,45 g, Natr. bicarbonic. 0,5 g. Tabl. 1,1 g. Mitmekesise etioloogiaga tupelimanahapõletikkude ja düsfunktsioonide alusel tekkinud vooluste raviks. 2—3 k. näd. 1—2 tabl. tuppe.

#### Fögyl (Chatelaine).

Natr. benzoic. ja Natr. cinnamylic. ekvimol. hulk. segu 0,5 g, Natr. perboric 0,5 g, Eucalyptoli 0,2 g, Mentholi 0,2 g, Ol. Melaleucæ 0,2 g, Sacchar., Talci ad 100 g. Pastillid 0,6 g. Angiina, bronhiidi jne. puhul. 10—12 past. päevas.

#### Formamint (Bauer).

Igas tabletis 0,01 g formaldehüüdi seotult laktoosiga. Desinfits. suu- ja kurgulimanaha põletikuliste haigestumiste puhul, profülaktil. kõigi suu kaudu organismi tungivate nakkushaiguste vastu. 1 tabl. tunnis aegamööda suus imeda.

#### Forman (Lingner).

Kloormetüülmentüülester. Värvusetu, niiskes õhus lagunev õli. Inhalatsiooniks õlilahuses hingamisteede katarride puhul. Forman-puuvill: formaaniga immutatud puuvill nohuraviks.

#### Formine (Adrian).

Hexamethylentetramin. Tabl. 0,5 g. Põie ja kuse-teede antiseptikum. 3 k. p. 0,5 g.

#### Formintol (Ephag).

Paraformii 0,01 g, Mentholi 0,0025 g ad tabl. 1 g. Suukoopa ja kurgu desinfitseerimiseks. 10—15 tabl. päevas imeda, lastele  $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$  tabl. korraga.

#### Fortossan (Ciba).

Inosiitheidsafosforhappe neutraalne Na-sool piim-suhkruga. 0,75% P. Tabl. 2,5 g. Roborans nõrkade ja rahhiitiliste imikuile ja lastele kuni 2 a. vanuseni. 2—4 k. p. 2—4 tabl. piimaga või pudruga.

#### Fosfarsin (Ephag).

I. Natr. glycerinophosphor. 0,1 g, Natr. monomethylarsenicicic 0,05 g, Strychnin. nitric. 0,0005 g, Aq. re-

dest. ad 1 g. II. Samu aineid vastavalt 0,15 g, 0,075 g ja 0,00075 g ad 1 g. Amp. 1 ccm. Nõrkus, taastoibumine, tbc, neurasteenia, funktsionaalne impotents, vaimline ja füüsiline liigväsimus, kehvveresus. Nahaalusi  $10 \times 1$  ccm I-st ülepäeviti, siis  $10 \times 1$  ccm II-st 1—3-päevaste vahedega ja siis jälle I-st  $10 \times 1$  ccm.

#### Fruktus-roheline.

Vaskarsenaati sisaldav pulbrikujuline taimekaitsevahend.

#### Fulmargin (Rosenberg).

Kolloidne hõbedalahus, valmist. elektrolüüsi teel, ca. 0,1% Ag. Selge, kohvipruun vedelik. Amp. 5 ccm. Nakkushaiguste raviks. 5 ccm päevas veeni- või muskulisisesi.

#### Fusariol.

Pulbrikujuline taimekaitsevahend, teravilja puhtimisvahend, sisaldav ca. 30% Hg toimiva ainaena.

## G.

#### Gallabis.

Bismutum subgallicum. K. n.: Dermatol.

#### Gallabis jodatum.

Bismutum subgallicum oxyjodatum. K. n.: Airol.

#### Gamelan (Hausmann).

(Saksamaal nime all Lipomykol). Kalamaksaõlist valmistatud lipoidide, rasvade ja vahade segu. Amp. 2 ja 5 ccm (Camphor. 2, Cerae 0,5, Ol. Jec. 10,5, Ol. Olivar. 35, Lipoid. 0,06) ja salvitabl. 5 g (Cerae 9,2, Paraffini 3, Ol. Jec. 10, Ol. Olivar. 27,5, Lipoid. 0,05, Ol. aether. 1,3, Ac. salicylic. 0,125). Tiisikuse mittespetsiifiliseks ärritusraviks. Nahaalusi või sissehõõrumiseks.

#### Gardan (IG).

Amidopüriini ja novalgiini mol. hulk. segust koosnev valge, vees 1:9 lah. pulb. Tabl. 0,5 g. Antipyreticum, analgeticum, antirheumaticum. 3—4 k. p. 1—2 tabl.

#### Gardenal (Poulenc).

Acid. phenylaethylbarbituric. Tabl. 0,1 ja 0,05 g. Amp. (naatr.-ühend) 0,2 substantsiga 10% lahuse ise-

valmistamiseks. Hypnoticum, antiepilepticum. 0,05—0,3 g pro dosi.

### Gelargentum.

Argentum gelatosatum. K. n.: Albargin.

### Gelodurat-kapslid (Pohl).

Formaldehüüdi abil kõvendatud želatiinkapsl., mis ei lah. maos, vaid lah. alles soolte leelises mahlas. Halvamaitsete või -lõhnaliste või mao limaskestast ärritavate (eeterõlid, palsamid, kreosoot jne.) või maos enneaegselt lagunevate (joodiühendid) või alles sooltes toimele pääsema pidavate (tanniin, anthelminthica, laxantia) raviainete paigutamiseks. Müügil on kapslid salitsüülhappe, bornüülvalerianaadi, kavasantaali ja sandliõliga.

### Gelonida aluminii subacetici (Goedecke).

Eril. menetl. valmist. tabl., mis maos kergesti lagunevad. Koosnevad alumiiniumsubatsetaadist, mis eriliselt viisil segatud kergesti punduva ainega (trioksimetüleenželatiiniga).

I. Gelon. alumin. subacet. comp. c. aluminio sulfurico 10%. Oxyuriasis.

II. Gelon. alumin. subacet. ilma lisanditeta.

III. Gelon. alumin. subacet. comp. c. 0,1 g Phenolphthaleino. II ja III soolekatarri, sooletiisikuse, kollatõve ja enterogeense loomuga nahahaiguste puhul. 3—5 k. p. 1 tabl.

### Gelonida antineuralgica (Goedecke).

Codein. phosphor. 0,01 g, Acetosali, Phenacetini ana 0,25 g. Tabl. 0,5 g. Antineuralgicum. 2—4 k. p. 1—2 tabl.

### Germisan.

Punane pulbrikujuline taimekaitsevahend, külvi- ja puhtimiseks ja maapinna desinfitseerimiseks. Sisaldab ca. 30% Hg.

### Gland. Thymi sicc. (Merck).

Kuivatatud harknääre. Tabl. 0,5 g = 3 g värsket näeret. Arenemishäired, infantilism, idiotia thymica, rahhiit, struuma, Morbus Basedowi, vähktõvi, kloroos. 3—5 tabl. mitu k. p.

### Globeol (Chatelaine).

Kolloidseid raua- ja mangaanisoole ning vaakumis aurustatud hobuseverd sisaldavad pillid. Kehvveresus,

kloroos jne. 3—5 tera päevas.

**Glycerophosphat-tabl. c. Haemoglob. et Lecithino (Ephag).**

Calc. glycerophosph. 0,1, Haemoglobini 0,2, Lecithini 0,02. Tabl. 0,3 g. Neurasteenia, asteenia, vaimline ja füüsiline liigväsimum, kehvveresus, taastoibumine. 3—6 tabl. päevas.

**Glycerophosphate Robin (Robin).**

Calc. glycerophosph. 5 g, Natr. glycerophosph. 1 g, Sacch. alb. 94 g. Granulaat. Roborans. 1—3 dessert-lusika täit päevas, vee või piimaga söögi ajal.

**Gonobletten (Colmann).**

Saloli 0,15 g, Hexamini 0,2 g, Extr. Uvae ursi 0,025 g, Extr. Pichi-Pichi 0,025 g, Ol. Menthae pip. q. s. Puna-nased dražeed. Conorröa. 2—3 tunni järgi 1—2 draž.

**Gonocystol (Tosse).**

Santalolum lacticum ja Extr. Kawa-Kawa. Kera-tiinitud terad. Gonorröa. 3 k. p. 2 tera.

**Gonosan (Riedel).**

Resina Kawa-Kawa puriss. soluta in Ol. Santali 4 + 1. Kapsl. 0,3 g. Gonorröa, uretriit, tsüstiit. 3—5 k. p. 2 kapsl. söögi ajal.

**Gonostyli (Beiersdorf).**

Suhkrust, dekstriinist, tärklisest, limaaainest ja glütseriinist koosnevad 4 mm jämedad, 4, 10 või 18 cm pikad batsillid albargiini, protargooli (6%), kolevaali (8%) jne. lisandiga. Gonorröa raviks.

**Gono-Yatren (IG. Behringwerke).**

Polüvalentne gonokokkide vaktsiin: 50—400 milj. kokki 2,5 ccm-is 3% jatreenilahuses. Amp. 2,5 ccm suureneva kokkide arvuga. Pud. 25 ccm = 50 milj. pro ccm ja pud. 50 ccm = 500 milj. kokki pro ccm. Kroonil. gonorröa ja selle komplikatsioonid. Muskli- ja veenisisesi suurenevais annuseis 2—4-päevaste vahedega.

**Gouttes Livoniennes (Trouette).**

Kreosoti 0,05 g, Bals. Tolutan. 0,075 g, Pic. liquid. 0,075 g. Kapsl. Tuberculosis. 3—10 kapsl. päevas.

**Gralit.**

Mustjashall pulbrikujuline taimekaitsevahend, sisaldab kaltsiumarsenaati ja siliitsiumfluoriidi.

**Granugenol (Knoll).**

Teatud määrani puhastatud, kollakas, nõrga lõh-

naga neutraalne mineraalõli. Kt. 300—360°. Pud. 100 g, vaginaalkapsl. 1 g, puuder 5%. Fluor albus, kolpitiis; haavade raviks.

**Granugen-Pasta** (Knoll).

Granugenoli duri (Granugenol + 10—20% Ceresini) 50, ZnO 20, Talci 20, Bol. alb. 10, Vaselini, Lanolini q. s. Haavade raviks.

**Guacamphol** (Henning).

Guajacolum camphoricum. Valged, lõhnata kristallnõelad, vees ei lah. Tiisikushaigeile higistamise vastu. 0,2 g õhtul.

**Guipsine** (Leprince).

Extr. Visci albi. Amp. 1 ccm = 0,05 g ja terad à 0,05 g. Hypertoonia. 1—2 ccm päevas musklišisesi või 4—10 tera söömaaegade vahel.

**Gyneclorina** (Heyden).

Parfüümitud kloramiin tablettides. 1 tabl. = 0,5 g kloramiini. Desinfitseerimiseks ja desodoreerimiseks. Tupe loput. 0,2%, käte desinfits. 0,2—0,5% vesilahusena.

**Gynergen** (Sandoz).

Tungalterast eraldatud peaalkaloid ergotamiin viinhappeühendina. Tabl. 1 mg, lahus 1:1000, amp. 0,5 ja 1 ccm (1 ccm = 0,5 mg). Hemostüptikum atoonia või verevooluse puhul peale sünnituse, abortide puhul jne. 2—4 tabl. või 15—30 tilka päevas või 0,5—1 ccm nahaalusi või musklišisesi.

## H.

**Haemalbumin** (Klewer).

Verest valmist. raua-valgu preparaas, pruunmust pulber. Kehvveresus, kloroos. 1—2 g mitu k. p.

**Haematogen** (Hommel).

Kontsentritud, püsiv verepreparaas, 20% glütseriini sisaldusega ja maitseainetega. Roborans. 3 k. p. 1 supilusika täis.

**Haematogen** (Medikon).

7% hemoglobiinilahus 20% glütseriini lisandiga ja maitseainetega. Roborans. 3 k. p. 1 supilusika täis.

**Haematogen (Remedia).**

Värskest defibriinitud ja eetriga puhastatud loomaverest valmist. magustatud preparaas. Roborans. 3 k. p. 1 supilusika täis.

**Haemocerebrin-Cacao (Ephag).**

Ajusubstantsist ja verest kakao ja suhkru lisan-diga valmist. orgaan. lipoidpreparaas. Neurasteenia, vaiml. ja füüsil. liigväsimum, unepuudus, kehvveresus, nõrkus tbc tagajärjel, taastoibumine, seniilsed ergu-kava häired, avitaminoos, skrofuloos. 3 k. p. 2 teelus. täit, lastele 1 teelus. täis klaasi sooja piimaga. Mitte keeta!

**Haemoferratol (Ephag).**

Liq. Haemoglobini cum Ferro. 0,6% Fe. H. c u m a r s e n o : 0,005%  $As_2O_3$ . Nõrkus, kehvveresus, taas-toibumine, isupuudus, närvlikkus. 3 k. p. 1 supilusika täis peale sööki piimaga.

**Haemogallol (Merck).**

Verest valmistatud punakaspruun pulb., vees ei lah. 0,4% Fe. Kloroosi ja kehvveresuse puhul. 3 k. p. 0,5 g.

**Haemol (Merck).**

Verest valmist. rauapreparaas. Pruunmust pulb., rask. lah. vees. Kloroosi ja kehvveresuse puhul. 0,5 g mitu k. p.

**Hämoferrol (Remedia).**

Defibriinitud verest ja rauaoksüüdi dialüsaadist glütseriini ning maitseainete lisandiga valmist. 0,4% rauda sisaldav vedelik. Roborans. 3 k. p. 1 supilusika täis.

**Hämoferrose (Jürgens).**

0,4% rauda sisaldav loomaverest ja rauaoksüüd-hüdraadist valmistatud, magustatud ja aroomistatud punakaspruun vedelik. Kehvveresuse, üldise nõrkuse puhul. 3 k. p. 1 supil. täis. H. c. a r s e n o : 0,5% Fe, 0,005% As naatr.-ühendina; c. J o d o : 0,4% Fe, 0,4% J; c. c a l c e : 0,4% Fe, 1,1% Calc. glycerophosph.; c. a r s e n o e t c a l c e : 0,4% Fe, 0,004%  $As_2O_3$ , 1,1% Calc. glycerophosph.

**Hämojodidum (Jürgens).**

Verevalgu ühend joodiga. 10,3% J sisaldav tume-pruun pulb. Subst., tabl. = 0,05 g J. Joodiraviks.

**Hämojodose (Jürgens).**

Hämojodiidi 1% vesilahus alkoholi ja lõhnainete lisandiga. 0,1% org. seotud joodi. Joodiraviks.

**Hedonal (IG).**

Metüülpropüülkarbinooluretaan. Valge krist. pulb. St. 76<sup>o</sup>. Lah. vees 1:12. Hypnoticum. 1,5—2 g pro dosi.

**Hegonon (Schering).**

Hõbeda valguühend, ca. 7% Ag. Pruun, vees 10% lah. pulb. Vesilahus leelise reaktsiooniga. Subst., tabl. 0,25 g, bacilli urethr. 10% — 0,7 g, bacill. cervical. 10% — 0,3 g, bacill. urethral. 2%. Gonorröa raviks. Süst. uretrasse 0,25%, loput. 0,015—0,05% lahusena.

**Heliobrom (Teichgräber).**

Dibroomtanniinkarbamiid. Kollakas, lõhnatu ja maitsetu pulb., vees ei lah. Ekseemid, kollatõbi, hemorroidid jne. 10% alk. lahusena või salvina.

**Helminal (Merck).**

*Rhodomelaceae* sugukonda kuuluvast vetikast *Digena simplex* veega valmist. kuivekstrakt. Tabl. 0,25 g, ja granulaat. Anthelminthicum, eriti solkmete vastu. Väikelastele 3 k. p. 1 teelusika täis granulaati, suurematele lastele ja täiskasvan. iga 2 tunni järgi 1—3 tabl., katkinärimata tervelt alla neelata.

**Helmitol (IG).**

Hexamethylentetraminum anhydromethylenocitricum. Valge vees lah. pulb. St. 165—170<sup>o</sup>. Subst., tabl. Põie ja kuseteede antiseptikum. 3—4 k. p. 1—2 tabl.

**Helpin (Grünau).**

Steriilne valguvaba lipoidemulsioon (letsitiin-glütseriin). Amp. 1,5 ccm. Intragluteaalselt asteenia, kehvveresuse, tiisikuse, kosutusravi, kaheksia, nõrkusseisundite ja rohke verekaotuse puhul. 1,5 ccm päevas või ülepäeviti, üldse kuni 30 süst.

**Hepamult (Schering).**

2 osa veise või vasika maksa, 1 osa Castle fermenti sisaldavat jahvat. sea magu, massa cacao q. s. Granulaat, 1 g = 25 g värsket maksa. Anaemia pernicioosa. 10—20 g päevas söögi ajal.

**Heparex (Kuik).**

Eril. menetl. valmistatud Extr. Hepatis fluid. 1 g

= 10 g värsket maksa. Kehvveresuse puhul. 3—4 k. p. 40 tilka.

**Hepar preparatum (Ephag).**

Kuivat. vasikamaks ja Castle fermenti sisaldav maolimanahk 2 + 1, granulaadina. Mitmesug. liiki kehvveresus, eriti Biermeri tüüp; üldnõrkus, põhinev üliväsimusel või kroonil. intoksikatsioonil, pernitsioosne aneemia, millejuures vere koostis pole muutunud. 1,5 g päevas toiduga või veega. Lastele vastavalt vähem.

**Hepracton (Merck).**

Maksast valmistatud pruun, hügrokoopne, lihaekstrakti maitsega pulb., 5 g = 250 g toorest maksa. Subst. ja tabl. 1 g. Anaemia pernicioosa. 5 g päevas.

H. pro injectione. Amp. 1—2 ccm. 1 ccm = 300 g värsket maksa. 2 ccm musklisisi.

**Hercynia.**

Pulbrikujuline taimekaitsevahend, sisaldav kaltsiumarsenaati.

**Heroin (IG).**

Diacetylmorphinum hydrochloricum. Valge, mõru krist. pulb., kerg. lah. vees. Köha vaigist. morfiini asemel. Mitu k. p. 0,001—0,005 g. Hädaohtlik, sest tekitab kergesti narkomaaniat.

**Hetol (IG).**

Natr. cinnamylicum. Valge, magus pulb., vees lah. 5%. Tiisikuse raviks. Veenisisi 0,5—1 mg alates kuni 15 mg pro dosi.

**Hetralin (Zimmermann).**

Heksamiini ja resortsiini ühend. Nõrgalt roosad või värvuseta, magusa maitsega nõelad, lahust. vees 1:14. Põieantiseptikum. 3 k. p. 1 g.

**Hexacitrol (Lill).**

Hexaminum anhydromethylenocitricum. Tabl. 0,5 g. Põieantiseptikum. 3—4 k. p. 1 tabl.

**Hexal (Riedel).**

Hexamethylentetraminum sulfosalicylicum. Valge, hapu, krist. pulb., lah. vees 1:8. Subst., tabl. 0,5 g. Põieantiseptikum. 3—6 k. p. 1 g veega peale sööki.

**Hexaminum.**

Hexamethylentetraminum. K. n.: Formine, Urotropin.

**Hexarol (Ephag).**

Sol. Hexamini puriss. 40%. Amp. 5 ccm, 0,02 g prokaiinhüdrokloriidi lisandiga. Angiina, gripp, sepsis, meningiit, poliomüeliit, tsüstiit jne. 1—6 amp. päevas veeni- või musklisisesi.

#### Hexeton (IG).

Metüülisopropüülsükloheksenooni lahus naatrium-salitsülaadilahuses. Kapsl. 0,1 g, 1% lahus amp. 1,2 ccm (sinine klaas), 10% lahus amp. 2,2 ccm (pruun klaas). Südame ja vereringe nõrkus, arütmia, hingamishalvatus, mürgistused, siledade lihaste krampid jne. Veenisisesi 1 ccm 1% lahust, musklisisesi 1,5—2 ccm 10% lahust või mitu k. p. 2—3 kapslit veega peale sööki või söögi ajal.

#### Hexonin (Ephag).

Cinchopheni 0,5 g, Hexamini 0,1 g. Tabl. 0,6 g. Podagra, jooksja, liigesepõletik, lumbago, išias jne. Ägedail juht. 4—6 tabl. päevas, kroonil. juht. 2—3 tabl. päevas klaasi veega, milles lahustatud noaotsa täis söögisoodat.

#### Hexophan (IG).

Acid. oxyphenylchinolindicarbonicum. Subst., tabl. 0,5 g ja 10% lahus amp. à 10 ccm (3,3% atsetüüluretaani lisandiga). Antarthriticum, antirheumaticum. 2—4 k. p. 1—2 tabl., musklisisesi 10—20 ccm, veenisisesi 2,5—5—10 ccm päevas.

#### Hopogan (Kirchoff).

Magneesiumperoksüüdi ja piimsuhkru segu. Kangus I — 15%, kangus II — 25% MgO<sub>2</sub>. Tarvit. nagu MgO<sub>2</sub>.

#### Hydropyrin (Gedeon).

Lithium acetylosalicylicum. Tabl. 0,5 g. Antipyreticum, antirheumaticum. 3—4 k. p. 1 tabl.

#### Hypersol (Moskva).

Natr. chlorat. 5 g, Natr. sulfuric. 1 g, Natr. phosphoric. 0,5 g, Natr. bicarbonic. 0,4 g, Kal. chlorat. 0,35 g, Aq. dest. 100 g. Amp. 2,5 ccm. Arterioskleroos. 0,5—2 ccm nahaalusi.

#### Hypnal (IG).

Antipüriin-klooraalhüdraat (55% + 45%). Valge krist. pulb., lah. vees 1:10. Sedativum, hypnoticum, 1—2 g vees lahustatult pro dosi.

**Hypnon.**

Atsetofenoon (metüülfenüülketoon). Valged kristall-lehekesed, rask. lah. vees. St. 20,5<sup>0</sup>. Hypnoticum. 0,05—0,2 g koos glütseriiniga žel.-kapsl.

**Hypoloban** (Schering).

Ajuripatsi esisagara ekstrakti sisald. tabl. 0,3 g. Suhkruta liigkusesus, adipoosogenitaalsed toitumushäired. Mitu k. p. 1—2 tabl.

**Hypophen** (Gehe).

Ajuripatsi tagumise sagara standarditud ekstrakt. 1 ccm = 6 Vögtlin-ühikut = 0,25 g värsket nääret. Amp. 1,1 ja 5 ccm. Amenorröa, düsmenorröa, südame- ja vereringenõrkus pneumonia või peritoniidi tagajärjel; soolte atonia, suhkruta liigkusesus. Sünnitusabiks 0,5—1 ccm musklisisesi või nahaalusi.

**Hypophysin** (IG).

Sisaldab ajuripatsi tagumise sagara toimeaineid. Amp. 1 ccm (1 ccm = 3 Vögtlin-ühikut) ja amp. 0,5 ja 1 ccm (Hypophysin stark, 1 ccm = 10 VÜ). Sünnitusabiks 3 VÜ, post partum kuni 10 VÜ. Astma puhul 0,1—0,2 cm, sisehaiguste puhul 3—10 VÜ.

**Hyrgol** (Heyden).

Hydrarg. colloidal. 75% Hg, 7% Sn kolloidse Sn-happena ja Ammon. citric. Mustjashall, metallise läikega teraline pulber, kerg. lah. vees tumepruunilt. Süüfilise raviks. Salvina (10%), seespidi 0,01 g pro dosi, nahaalusi 1—2% lah., veenisisesi 0,1—0,2% lah. Lahused on steriilsed, neid ei tohi keeta.

**I.****Ichthalbin** (Knoll).

Ichthyol-valguühend. Hallikaspruun pulb., vees ei lah., lahustub lahj. leelises (sooltemahl). Subst., tabl. 0,3 g. Soolteantiseptikum. 3 k. p. 1 g, lastele 0,5 g, imikuile 0,1—0,3 g.

**Ichthargan** (Cordes).

Argentum thiohydrocarbonosulfonicum solubile. 30% Ag, 15% S. Pruun valgusetundlik pulb., lah. vees. Antigonorrhöicum. 0,02—0,1% lahusest süst.

**Ichthoform (Cordes).**

Ichthyolformaldehyd. 14,5% S. Mustpruun, peagu lõhnatu ja maitsetu pulb., vees ei lah. Soolteantiseptikum. 3—4 k. p. 1—2 g.

**Ichthyol (Cordes).**

Ammonium sulfoichthyolicum. Tirooli kiviõli sulfoonimisel saadud mustpruun, tõrvalõhnaline, siirupitaoline vedelik, lahust. vees ja alk. Desinfitseeriv, põletikuvastane ja valuvaigistav nahahaiguste, lümfiäärme- ja limanahapõletiku, roosi ja hemorroidide puhul. 5—10% salvina või 10—20% glütseriinilahusena.

**Ichthosulfol (Siegfried).**

Ihtüoolile analoogne preparaat.

**Idozan (Ephag, Ferrosan).**

Kuiv — 40% Fe. Vedel (Liq. ferri idozani) — 5% Fe. Magustatud ja aroomistatud punakaspruun vedelik. Toonikum kloroosi, kehvveresuse, isupuuduse ja nõrkusseisundite puhul. 3 k. p. 1 teelusika täis peale sööki.

**Iminol (Boehringer).**

Agaricini 0,005 g, Papaverini 0,02 g, Coffeini 0,1 g, Theophyllini 0,1 g. Tabl. 0,225 g. Migreeni ja profülaktil. astma vastu. 1 tabl. hoo lähinemisel.

**Immunogen (RSi).**

Autolüsaat bakteritest: Bact. suipestifer, paratyphi, pyogenes, prodigiosus, coli, pullorum, rhusiopathiae, Brucellae Bangi, Streptococc. pyogenes, Str. agalacticus, Staphylococc. pyogenes, 1% metüülantigeeni ja lipiidide lisandiga. Amp. 2 ccm, 10 ccm ja 20 ccm (1 ccm = 1000 milj. bakt.). Mittespetsiifil. ärritusvahend akuutsete, subakuutsete, üld- ja lokaalinfektsioonide puhul.

**Impletol (IG).**

Novokaiini ja kofeiini mol. hulkade kompleksühend. Amp. 2 ccm (1 ccm = 0,02 g nov., 0,014 g kof. ja 0,05 g NaCl). Analgeetikum eriti migreeni puhul. 1 ccm nahaalusi või muskklisisi.

**Inglis reumalimiment (Lill).**

Ol. Terebinth. 52, Acid. acetic. 80% 5, Ovi gallin. ½, Aq. dest. 42. Antirheumaticum, Sissehõõrumiseks.

**Injectio Matico** (Grimault).

Cupr. acetic. 0,2 g, Aq. Fol. Matico destill. (1:10)  
140 g. Antigonorrhoeicum. Süstimiseks.

**Insulin** (Degewop, Gans, IG, Leo, Schering etc.).

Pankreasnäärmest valmistatud hormoonpreparaat.  
Taval. amp. 5 ccm, à 1 ccm. = 10—20 kliinil. ühikut.  
Diabetes mellitus. Nahaalusi või veenisisesi.

**Iriphan** (Laves).

Stront. phenylchinolincarboicum. 14% Sr. Kol-  
lakas krist. pulb., kerg. lah. kuumas vees. Tabl. 0,6 g.  
Reumaatil. vaevused, kollatõbi, sapitee-põletik. 3 k. p.  
1—2 tabl. veega.

**Isacen** (Roche).

Diatsetüülbisoksüfenüülisatiin. Valge, lõhnatu,  
maitsetu pulb., vees ei lah. St. 242<sup>0</sup>. Terad 5 mg. Lah-  
tistaja spetsiifilise jämesoole toimega. 1—3, lastele 1  
tera korraga.

**Isapogen** (Schürholz).

Vedel seep 6% joodi ja 6% kampri sisaldusega.  
Punane, selge vedelik, lah. vees. Salitsüül-isap.:  
15% salitsüülhappe lisandiga; ihtüool-is.: 10% ihtü-  
üooli lisandiga. Reuma, išias, neuralgil. valud. Sisse-  
hõõrumiseks.

**Iso-Arhéol** (Astier).

Kõvad želat.-kapsl., sisald. 0,2 g seedriõli. Põieanti-  
septikum sandliõli asendajana. 3—4 k. p. 2—3 kapsl.

**Isonaurin** (Heisler).

Monobroomisovalerianüülkarbamiid. Subst., tabl.  
0,3 g. Sedativum, hypnoticum. 3—4 k. p. 0,3—0,6 g.  
Istizin (IG).

Dioxyantrachinon. Oranž pulb., rask. lah. vees. Tabl.  
0,15 ja subst. vet. otstarb. Lahtistaja. 1—3 tabl. peale  
õhtusööki. Lastele vastavalt vähem.

**Itrol** (Heyden).

Argentum citricum. Valge valgusetundlik pulb.,  
lah. vees 1:3800. Kerg. laguneb. Conorröa, silma- ja  
haavaraviks. Süst. ureetrasse 0,2—0,25%, loputuseks  
0,01—0,05% lahusega.

## J.

### Jecototal (Lill).

Kalamaksaõlist valmistatud kindla vitamiinisisaldusega preparaat, kollakas aroomistatud õli. 1 ccm = 15000 vitamiin-A ühikut ja 7500 D-ühikut. Rahhiit, skrofuloos, tuberkuloos. 5—10 tilka 2—3 k. p.

### Jemalt (Wander).

Linnakseekstrakti ja hüdreeritud kalamaksaõli segu. Helepruun, meeldiva maitsega sömer pulb. Kasvamishäired ja arenemiskorruptused lapseas. Kuni 2 a. lastele 3—6 teelus., vanemaile 3—6 supilusika täit päevas.

### Jod-Calcium-Diuretin (Knoll).

Calcium-Diuretin 0,5 g, KJ 0,1 g. Tabl. 0,6 g. Ste-nokardia, astma, arterioskleroos, hüpertooniam. 3 k. p. 1—2 tabl. peale sööki.

### Jodex (Klopfer).

Salv: sisaldab 0,13% kolloidse joodvase kõrval veel 4% joodi, mis joodalkali abil on seotud indifferentse salvialusega. Vedel: jodeeritud taimeõli 1% joodi-sisaldusega. Resorbens, antiseptikum, antiflogistikum igasuguste põletikuliste protsesside puhul.

### Jodglidine (Klopfer).

Jodeeritud taimevalk. Tabl. à 50 mg J. Arterioskleroos, teisene ja kolmandane luues, astma, bronhiit, reuma, skrofuloos jne. 1—2 tabl. p.

### Jodidur (Ephag).

Jodi puri 2%, KJ 8%, Agarici albi 80%. Haavade raviks.

### Jodipin (Merck).

Jodeeritud seesamõli, milles jood on keemil. ühend. õli rasvhapetega. Kollane (10%) või pruunikaskollane (20% ja 40%) õli. Vedel. ja tabl. 0,125 g 40% = 0,05 g J. Joodiraviks tertihaar-süüfilise, bronhiidi, struuma ja liigestehaiguste puhul; diagnostil. otstarb. neeru-vaagna, kuseteede ja selgrookanali röntgenograafias. Raviks 3 k. p. 2—4 tabl.

### Jodival (Knoll).

Monojoodisovalerianüülkarbamiid. 47% J. Valge, mõru, krist. pulb., vees lah. 1:650., kerg. lah. alk. Subst., tabl. 0,3 g. Joodiraviks. 3 k. p. 0,3 g.

### Jodocitin (Gedeon).

Joodletsitiin. 24% J, sellest  $\frac{2}{3}$  org. šeotud. Kollakaspruun mass. Tabl. à 0,25 g joodletsitiini = 0,06 g J. Joodiraviks.

#### Jodoformin (Marquart).

Heksamiin-jodoform. Valge või kollakas krist. pulb., ei lah. külmas vees. St.178<sup>0</sup>. Haavaantiseptikum.

#### Jodol (IG).

Tetraajoodpürrool. 89% J. Kollakas, valgusetundlik, lõhnatu ja maitsetu krist. pulb., lah. vees 1:5000. Välisp. jodoformi, seesp. joodisoolade asendaja. 5—10% salvina, seesp. kuni 0,2 g *pro dosi*, 0,5 g *pro die*.

#### Jodone (Robin).

Jodi 0,04 g, Peptoni 0,15 g, Glycerini ad 1 ccm. Astma ja arterioskleroosi puhul. 1—2 ccm 24 tunni jooksul.

#### Jodostarin (Roche).

Taririinhappe dijodiid ( $C_{18}H_{32}J_2O_2$ ). Tabl. 0,25 g = 0,12 g J. Joodiraviks. 3 k. p. 1—4 tabl.

#### Jodothylin (IG).

Kilpnäärme valmist. joodipreparaat. Tabl. 0,2 g. Müksödeem, kretinism, sklerodermia jne. Alates 1 tabl. suurend. annust 3—5 tabl-ni päevas ja alandat. siis jälle 1 tabletini.

#### Jothion (IG).

Dijoodhüdrin (dijoodhüdrosüpropan). Kollakas õlitaol. vedelik, erikaal 2,5! Lahust. vees 1:80, glütseriinis 1:20, oliivõlis 1:2, seguneb alkoholiga ja eetriga igas vahekorras. 80% J. Joodiraviks. Kroonil. liigesepõletikkude, reumaatil. vaevuste, näärmepõletikkude, dermatooside jne. puhul. 10—25% salvina või õlilahusena.

#### Jodthymol.

Dijoddithymol. K. n.: Aristol.

#### Joghurt (Trainer).

Jogurt-bakterite tabl. 0,5 g. Roborans, eriti kehvveresuse ja seedeorganite haiguste puhul. 3 k. p. 1—2 tabl. piima, tee või veega.

#### Joodkepikesed (Merck).

6,5 või 15 ccm pikad kepikesed, mis ühest otsast on kaetud kolloidse, vees lahustuva joodiga. Desinfitseerimiseks joodtinktuuri asemel.

**Jubol (Chatelain).**

Agar-Agar 0,1 g, Extr. Fel. tauri 0,03 g, Extr. Intestin. 0,02 g, Extr. Fuc. vesiculos. 0,01 g, Podophyllini 0,008 g, Extr. Aloës 0,025 g, Extr. Hyoscyami 0,0025 g, Extr. Bellad. 0,01 g, Boli alb. 0,01 g. Tabl. Lahtistaja. 3 tabl. õhtul.

**Juvenin (IG).**

Metüülarsiinhapu johimbiini ja metüülarsiinhapu strühniini ühend. Amp. 1 ccm (= 0,01 g + 0,0005 g) ja tabl. (= 0,0065 g + 0,0005 g). Toonikum seksuaalneurasteenia ja vaimlise ning füüsilise liigväsimume puhul. 3 k. p. 1 tabl. või ülepäeviti 1 ccm nahaalusi.

**K.****Kabjol (GL).**

Pölevkiviõli sisaldav salv. Hobuste kabjahaiguste raviks.

**Kalmopyrin (Gedeon).**

Calc. acetylosalicylicum. Tabl. 0,5 g. Antipyreticum, antirheumaticum. 3—6 k. p. 0,5 g.

**Kalzan (Wülfing).**

Calc. lactic. ja Natr. lactic. kaksiksool. Subst. ja tabl. 0,5 g. Kaltsiumraviks. 3 k. p. 1 teelusika täis või 2 tabl., lastele vastavalt vähem.

**Kalziium-Injection (Helfenberg).**

Manniitväävelhapu kaltsiumi 20% vesilahus. Amp. 10 ccm. Kaltsiumraviks. Veenisisesi.

**Kamillosan (Bad Homburg).**

Eril. menetl. valmist. kummeliõite ekstrakt. 1 g = 0,7 g droogi. Liquidum: 5,6% lahus 50% alkoholis; tabl.: 0,5 g, sisald. peale kummeliekstrakti veel salvei- ja arnikaekstrakti ja vesinikuülihapendi fosforhappeühendit; salv: 14% ekstrakti. Desinficiens, adstringens.

**Kapsicin (Lill).**

Türgipipratinktuur kampri, lavandli- ja rosmariiniõli, kaneeli- ja tindipähklitinktuuri, ammoniaagi ja seebi lisandiga. Antirheumaticum. Sissehõõrumiseks.

**Kasoraan (TÜTK).**

Vedel, rohekat värvust taimekaitsevahend, peami-

selt karusmarja jahukaste tõrjumiseks. Sisald. ca. 0,85%  $As_2O_3$  naatriumarsenaadina. Tarvit. lahjendatult 1:50.

#### **Kephaldol (Stohr).**

Chinini 10, Acid. citric. 5, Phenacetini 50, Natr. salicylic. 35. Kollakasvalge, mõru pulb., osalt lah. vees. Tabl. 0,5 g. Antineuralgicum, antipyreticum, antirheumaticum. 0,5—2 g mitu k. p.

#### **Kihisev broomsool (Lill).**

Kal. bromat., Natr. bromat. ana 3,5 g, Ammon. bromat. 1,7 g, Natr. bicarbonic. 24 g, Acid. citric. 9 g, Acid. tartaric. 10 g, Sacch. alb. 4,5 g. Sedativum. 1 teelus. täis 3 k. p.  $\frac{1}{2}$  klaasi veega.

#### **Kissinger Entfettungstabletten (Boxberger).**

Sal thermar. Kissing., Magn. ust., Natr. cholic., Extr. Rhei, Extr. Casc. sagrad. Adipositas. 2 k. p. 1—2 tabl.

#### **Kissinger Pillen (Boxberger).**

Sal. therm. Kissing., Extr. Rhei, Extr. Casc. sagrad. Lahtistaja ja hemorroidide puhul. Öhtul 1—2 tera.

#### **Klewein's Abführungspillen (Klewein).**

Extr. Cascar. sagrad., Extr. Rhei, Extr. Belladonnae, Podophyllin. Hõbedaga kaetud pillid. Lahtistaja. Tarviduse korral 1—3 tera.

#### **Klimaktodin (Lill).**

Ovar. siccat. 0,03 g, Thyreoid. sicc. 0,006 g, Bromovali 0,15 g, Calc. Theobromsali 0,15 g. Tabl. 0,5 g. Klimakteerilised vaevused. 3 k. p. 1 tabl.

#### **Klimakton (Knoll).**

Matlillad oakujulised dražeed, à: Ovaradeni 0,03 g, Thyradeni 0,006 g, Bromurali 0,15 g, Calc.-Diuretini 0,15 g,  $MgCO_3$  0,005 g, Calc. lactic. 0,003 g. Klimakteerilised vaevused ja tervishäired peale röntgenkiiritamise.

#### **Klimasan (Chemosan).**

Teobromiinkaltsiumi ja kaltsiumlaktaadi kaksikühendit 0,5 g, nitroglütseriini 0,0002 g igas tabl. Tabl. 0,6 g. Klimakteerilised vaevused, tervishäired munasarjaoperatsioonide tõttu. 8 päeva järgimööda 3—4 tabl. päevas, 1 näd. vahe järgi korrata.

#### **Kola Astier granulé (Astier).**

Kolaekstraktiga immutatud suhkruterakesed. Toonikum. 2 teelusika täit päevas.

**Kola tabletid (Ephag).**

Nuc. Colae 0,5 g in tabl. Neurasteenia, asteenia, vaiml. ja füüsil. liigväsimus, närvilised depressiivseisundid, taastoibumine. 3—6 tabl. päevas. Kola tabl. cum lecithino: Nuc. Colae 0,5 g, Lecithini 0,05.

**Kontussin (Ephag).**

Infus. herbae Thymi ca. 0,8% naatriumbromiidi, 3% kaaliumsulfokvajakolaadi, 4% Elix. pectoral. ja 8% glütseriini lisandiga. Läkaköha, bronhiit, kopsupõletik, gripp, larüngiit, farüngiit. 3—5 k. p. 1 lusika täis.

**Kresival (IG).**

Calc. cresolsulfonici 6% lahustatult siirupis. Pud. 125 g. Expectorans ekssudatiivse diateesi, kopsupõletiku ja kopsutuberkuloosete affektsioonide puhul. 3—4 k. p. 1 lusika täis, lahj. veega.

**Kresolan (Ephag).**

Liq. Cresoli depurat. saponat. Desinfitseerimiseks. 0,25 —2% lahusega asjade, ruumide, pesu, väljaheidete jne. puhastamiseks.

**Kryofin (Ciba).**

Metüülglükoolhappe p-fenetidiid. Valge, mõru krist. pulb., lah. vees 1:600. St. 98—99°. Antipyretikum, antineuralgikum. 3 k. p. 0,5 g.

**Krysolgan (Schering).**

Natr. aminoaurothiophenolcarbonicum. Rohekaskollane vees kerg. lah. pulb. 50% Au. Amp. 0,01 g, 0,025 g, 0,05 g, 0,075 g ja 0,1 g. Tbc, lepra. Veenisisese.

**Köharohi (Remedia).**

(Sirupus Thymi comp.) Extr. Thymi comp. fluid., ca. 0,4% kaaliumbroomidi sisaldisega. Ülemiste hingamisteede haiguste puhul. 3—4 k. p. 1 lusika täis.

## L.

**Lacarnol (IG).**

Soojavereliste lihaskoest valmist. termostabiilne nukleosiid-preparaat, koosnev vereringet mõjustavaist rakutuuma-ainevahetuse produktidest. Tilgad, amp. 1 ccm. Angina pectoris, südame ja soonte haigused. 1—3

k. p. 10—25 tilka või 1—2 k. p. 1 ccm musklisisesi või nahaalusi.

**Läckerol Bröst Tabletten (Ahlgren).**

Gumm. arabic. 55 g, Sacch. alb. 34,5 g, Succ. Liquirit. 10 g, Mentholi 0,5 g, Ol. Eucalypti 0,4 g. Pastillid. Köha vastu.

**Lactéol (Boucard).**

Piimafermenti sisaldavad tabletid. Dieteetilise vahendina.

**Lactobacilline (Ferment).**

Piimhappebakterite kultuuridest valmist. ferment, mis hävitab roiskumispiisilasi. Tabl. soolekatarri ja kõhulahtisuse vastu. 2—3 tabl. piimaga peale sööki.

**Lactocalc (Kuik).**

Calc. lactic. 0,25 g, Calc. phosphoric. 0,01 g. Tabl. 2,5 g. Toidulisana imikuile, ravitoiduna kunstl. toidetaavaile imikuile toitumushäirete puhul. Tarvit. erieeskirja järgi.

**Lactophenin (Boehringer, IG).**

Laktüül-p-fenetidiin. Valge, lõhnatu, mõru krist. pulb., lah. vees 1:40. Antipyreticum, antineuralgicum. Mitu k. p. 0,5—1 g.

**Larocain (Roche).**

p-Aminobenzoyldimethyl-diaethylaminopropanolum hydrochlor. Valge, kerg. vees lah. krist. pulb. St. 196—197<sup>0</sup>. Lahused on steriilitavad. Subst., tabl. 0,5 g. Kokaiini asendaja lokaalanesteetikumina, vajaduse korral adrenaliini lisandiga. Larüngoloogias 5—10%, oftalmoloogias 2—5%, urooloogias 0,5—0,75%, infiltratsioonja juhtivusanesteesiaks 0,25—2% vesilahusena.

**Larosan (Roche).**

Kaseiinkaltsium. 2,5% CaO. Kollakas, lõhnatu ja maitsetu pulb. Lisatoiteaine sooltekatarri, kõhulahtisuse, düspepsia, maohaavandi jne. puhul. 2% piimale lisaks.

**Laudanon (Boehringer).**

50% morfiini, 30% narkotiini, 5% kodeiini, 10% papaveriini, 2,5% tebaiini, 2,5% nartseiini kloorhüdraatidena. Oopiumi ja morfiini asendaja. 0,01—0,03 g pro dosi. Dosis max. 0,06 g.

**Laxin (Lingner).**

Roosad kompvکید à 0,125 g fenoolftaleiini. Lahtistaja. 1—3, lastele ½—1 korruga.

**Laxo pillid nr. 1 (Ephag).**

Podophyllini, Extr. Rhei comp. ana 0,01 g, Aloës 0,05 g, Cort. Frang. 0,025 g igas tabl. Vegetabiilne lahtistaja. Homm. ja õht. 1 tablett.

**Laxo pillid nr. 2 (Ephag).**

Extr. Belladonn. 0,005 g, Podophyllini, Sapon. medic. ana 0,015 g, Aloës 0,05 g, Cort. Frangul. 0,025 g igas tabl. Vegetabiilne lahtistaja. Homm. ja õht. 1 tabl.

**Lecithin (Merck).**

Tabletid 0,025 ja 0,05 g letsitiini, emuls. 10% amp. 2 ja 5 ccm. Kasvamishäired, kehvveresus, neurastenia, tbc. jne. 0,2—1 g päevas sisse võtta või nahalusi 1—3 ccm.

**Lecithin tabletid (Rae apteek).**

Lecithini 0,05 g, Calc., Natr. glycerophosph. ana 0,1 g, massa ad 0,5 g. Tabl. 0,5 g. Toonikum. 3—6 tabl. päevas.

**Lecithol (Riedel).**

Munarebust valmist. letsitiin. Kapsl. 0,15 g ja terad 0,05 g. Toonikum kehvveresuse, kloroosi, tbc. jne. puhul. Mitu k. p. 0,15—0,3 g.

**Lenicet (Reiss).**

Kontsentritud aluseline alumiiniumatsetaat lõhnatu pulbrina, vees ei lah. 30% Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Tarvit. salvina või 10—20% talkpuudrina.

**Lenigallol (Knoll).**

Triatsetüülpürogallool. Valkjas, valgusetundlik pulb., vees ei lah. St. 165<sup>0</sup>. Kroonil. ekseemide raviks. 3—10% salvina.

**Levuretin (Feigel).**

Puhas kuivpärm. Furunkuloosi ja nahahaiguste raviks. 1—2 teelusika täit päevas sisse võtta.

**Levurinose (Blaes).**

Puhastatud ja mõrutustatud õllepärmist valmist. pulb. Roborans ja dieteetikum kehvveresuse, avitaminoosi, diabeedi, düspepsia, dermatooside jne. puhul; ka lokaalselt fissuuride, ulkuse, fluor albus'e raviks. 3 k. p. 10—15 g sisse võtta.

**Lianthral (Beiersdorf).**

Puhastat. kivisöetõrv. Tumepruun tõrvalõhnal. vedelik. 10% salvina nahahaiguste raviks.

**Linycol** (Chatelain).

Zinc. salicyl. 1, Monosalitsüülhappe glütseriinestrit 3, metüleendimetülaati 1, mentooli 4,5, terpinooli 2,5, Ol. Melaleucae 1, Ol. Juniperi 1, Pic. albae 4, Glycerini 6, Vaselini 36, Lanolini 40. Salv tuubides. Antirheumaticum. Sissehõõrumiseks.

**Lipiodol** (Lobica).

Jodeeritud nelgiõli. 1 ccm = 0,54 g J. Joodiraviks.

**Liquitalis** (Gehe).

(Liquor Digitalis.) Sisaldab kõik südametoimivad sõrmkübaralehe glükosiidid (peam. gitaliin, digitaleiin, digitoniin ja väh. hulg. digitoksiini) vesilahuses glütser. ja alk. lisandiga. 1 ccm = 100 konnaannust. *Liquitalis pro injectione* sisald. gitaliini, digitaleiini ja digitoksiini steriilses lahuses. Amp. 1,1 ccm (1 ccm = 100 konnaannust). *Cardiotonicum*. *Per os* 4, hiljem 2 k. p. 35 tilka = 1 ccm. Veenisisesi või nahalusi 1—3 k. p. 1 ccm.

**Liquor Alsoli** (Athenstaedt).

Alsooli 50% vesilahus.

**Lipatren** (IG).

Loomaaju lipiidid ja jatreen steriilses kolloidlahuses. Amp. 1 ccm, tabl. 0,5 g. Mittespetsiifil. ärritusraviks tbc puhul; arenemiskorratud, struuma ja teised kilpnäärme põhjustatud haigused. Tarvit. individuaalselt arsti eeskirja kohaselt.

**Lipojodin** (Ciba).

Dijodbrassidiinhappe etüülester. Valge, lõhnatu, maitsetu pulb., vees ei lah. 41% J. St. 36—37<sup>o</sup>. Joodiraviks arterioskleroosi, astma, emfüseemi, skrofuloosi puhul. 1—3 tabl. peale sööki.

**Lithacetol**.

Lithium acetylosalicylicum. K. n.: Hydropyryn.

**Litonal** (Ephag).

(Sal Piperazini comp. effervesc. granulat.) Piperazini chinic. 1 g, Hexamini 6 g, Natr. benzoic. 2 g, Natr. phosphoric. 8 g, Lith. carbonic. 1,5 g, Acid. benzoic. 1,5 g, Acid. tartaric. 34 g, Natr. bicarbonic. 46 g. Podagra, äge ja kroonil. jooksja, liigesejooksja, arterioskleroos, rasvumine, erguvalud, maksa-, neeru-, põie- ja sapiteede hädad. 3—4 k. p. 1 teelus. täis veega.

**Lobelin** (Boehringer).

*Lobelia inflata*'st eraldatud puhas alkaloid soolhappe ühendina. Valge, mõru, 40 os. vees ja 10 os. alk. lah. aine. St. 183<sup>o</sup>. Subst., amp. 0,003 ja 0,01 g. Excitans hingamiskeskuse primaarse ja sekundaarse halvatuse puhul, eriti narkoosi, mürgistuste (morfiini-, valgustusgaasi-mürg.), õnnetuste (uppumine, elektrilöök) jne. puhul; asphyxia neonatorum, pneumonia jne. 0,003 g veenisisesi (aegamööda süstida!). Süst. võib korrata 15 min. pärast. Vastsündinuile 0,003 g, üle 4 kuu vanustele 0,005 g, 1 a. alates 0,01 g nahaalusi või veenisisesi. *Max. pro dosi* 0,02 g, *pro die* 0,1 g!

#### Lopion (IG).

Natr. auroallylthiocarbaminobenzoicum. Pruunikas pulb., kerg. lah. vees. 43% Au. Kuivamp. 0,01 g, 0,025 g, 0,05 g, 0,1 g, 0,25 g, 0,5 g, 0,75 g. Tbc, kroonil. sepsis. Veenisisesi, alates 0,01 g ja suurendades annust kuni 0,5 g.

#### Loretin (IG, Schuchardt).

Acid. jodoxychinolinsulfonicum. Kollane, peagu lõhnatu ja maitsetu pulb., lah. vees 1:500. Antiseptikum. (Vrd. Yatren.)

#### Luatol (Spiess).

Natr. et Kal. bismuto-tartaricum. Steriilne 10% lahus vees või 25% viinamarjasuhkrulahuses, või amp. 1 ccm = 0,1 g. Lues. 1 ccm ülepäeviti musklisisesi.

#### Luminal (Merck, IG).

Acid. phenylaethylbarbituricum. Valge, mõru pulb., vees ei lah. Subst., tabl. 0,015 g (Luminaletten), 0,1 ja 0,3 g, amp. (20% lahus) 1 ja 2 ccm. Sedativum, hypnoticum, antiepilepticum. Epilepsia puhul 0,05—0,2 g, unetuse puhul 0,1—0,2 g päevas, erutusseisundite puhul 0,2—0,4 g kuni 0,6 g päevas. Musklisisesi unetuse raskeil juhtudel, krampide, rasedate oksendamise, eklampsia puhul 1 ccm 2—3 k. p.

#### Luminal-Natrium (Merck, IG).

Natr. phenylaethylbarbituricum. Vees lahust. pulb. Subst., tabl. 0,3 ja kuivamp. 0,22 g. Näidust. ja tarvit. vt. luminaal.

#### Luteoglandol (Roche).

Corpus luteum'i kuivsubstants ja ekstrakt. Amp. 1,1 ccm ja tabl. 0,35 g. 1 ccm = 1 tabl. = 0,5 g värsket nääret. Menstruatsiooni korratudused, eklampsia,

rasedate oksendamine, verejooksud raseduse ja klimakteeriumi puhul. 3—5 tabl. või 1—3 süst. päevas.

#### Luteo-Transannon (Gehe).

Corpus luteum'i substants transannooni lisandiga. Oakujul. dražeed, igaüks sisaldab: Calc. lactic 0,5 g, Ol. Salviae 0,001 g, Calc. sulfoichthyol. 0,04 g. Extr. Aloës 0,025, MgO 0,02 g, Acid. citric. 0,07 g, Corp. lut. sicc. 0,1 g, Fol. Digital. titr. 0,02 g. Klimakteeril. vaeused. 3 k. p. 1—3 või 3—1 dražeed.

#### Lycetol (IG).

Piperazinum dimethyltartaricum. Valge, lõhnatu, hapu maitsega pulb., kerg. lah. vees. Jooksja ja kusi-hapu diatees, tsüstiit jne. 1—1,5 g koos sama hulga MgO või MgCO<sub>3</sub>-ga hommik. ja õhtul veega.

#### Lysoform (Lysoform).

Formaldehüüd-kaaliseebilahus, ca. 6—7% formaldehüüdi. Kollakas, vees lah. vedelik. Desinfitseerimiseks 2—5% lahusena.

#### Lysol (Lysolfabrik).

Liquor Cresoli saponatus. 50% kresoolidest (peam. m- ja p-kresool) ja 50% linaõli-kaaliseebist koosnev pruun terava lõhnaga vedelik. Desinfitseerimiseks. Käte pesemiseks 1—3%, kirurg. esemete desinfits. 3—5% vesilahusena.

## M.

#### Magnesium-Perhydrol (Merck).

Magnes. peroxydat. puriss. 15% ja 25%. Valge, lõhnatu, maitsetu pulb., vees ei lah. Subst., tabl. 0,5 g. Käärimisdüspepsia, hüperatsiditeet, meteorism, kroonil. kõhukinnisus. 1—3 k. p. ½—1 teelus. täis või 1—2 tabl. veega vähe aega peale sööki.

#### Mammae siccatae tabl. (Merck).

Tabl. 0,1 g. 1 g = 8,75 g värsket nääret. Menstruatsiooni korratud, emakafibroomid. 3 k. p. 3—6 tabl.

#### Manol (Medikon).

Türgipipratinktuur kampri, punase sandlipuu, salitsüülhappe, metüülsalitsülaadi, sinepi- ja teiste eeterõlide ning seebi lisandiga. Antirheumaticum, Sissehõõrumiseks.

**Maretin.**

Karbamiinhappe m-tolüülhüdrasiid. Valge, lõhnatu, maitsetu pulb., vees lah. 1:1000. St. 183—184<sup>o</sup>. Antipyreticum, antineuralgicum. 3 k. p. 0,1—0,25 g.

**Marienbader Reduktionspillen (Kleewein).**

Sal therm. Marienbad. 1 g, Extr. Rhei spir. 2 g, Extr. Chinae frig. par. 2 g, Extr. Aloës 0,1 g, Extr. Casc. sagrad. 0,3 g, Extr. Frang. aquos. 0,3 g, Natr. taurocholic. 0,6 g, ad pil. No. 50. Saledusraviks. 2—4 tera päevas.

**Medinal (Schering).**

Natr. diaethylbarbituricum. Subst., tabl. 0,5 g. Sedativum, hypnoticum. 0,3—0,5—0,75 g öhtul veega; rektaalselt 0,5 g 5 ccm vees klüsmata või küünlana; nahaalusi 5—10 ccm 10% steriilset lahust (värskelt valmist.!).

**Melubrin (IG).**

Natr. phenyldimethylpyrazolon-aminomethansulfonicum. Valge, kerg. vees lah. pulb. Subst., tabl. 0,5 ja 1 g, amp. 2 ja 4 ccm (50% lahus). Antirheumaticum, antineuralgicum, antipyreticum. 3—4 k. p. 1 g; veenisisesi 1—2 ccm, musklisisesi või nahaalusi 4 ccm 2 k. p.

**Melupyron (Lill).**

Natr. phenazonaminomethansulfonicum. Tabl. 0,5. Antineuralgic., antirheumatic., antipyreticum. 3 k. p. 1 tabl.

**Menformon Folliculin (Degewop).**

Standarditud ovariaalhormoon. Amp. 1 ccm = 100 hiireühikut, dražeed à 100 ja 500 HÜ. Menstruatsiooni korratud, klimakteerilised vaevused. Kuni 600 HÜ. päevas.

**Menolysin (Güstrov).**

Yohimbin Spiegel. Tabl. 0,005 g, amp. 0,01 g. Menstruatsiooni häired. 1—3 k. p. ½—1 tabl.

**Menthaval.**

Mentholum valerianicum. K. n.: Validol.

**Mergal (Riedel).**

1 osa Hydrarg. cholic., 2 osa Tannin. albuminat. Metall. maitsega pruunikaskollane pulb., vees peagu ei lah. 6,5% Hg. Kapsl. 0,15 g. Antilueticum. 3 k. p. 1 kapsl. peale sööki, suurend. annust kuni 5—6 k. p. 2 kapsl.

**Meritol.**

Pulbrikujuline (roheline) taimekaitsevahend, sisaldab kaltsiumarsenaati.

**Mesotan (IG).**

Salitsüülhappe metoksumetüülester. Õlitaol. aromaatne vedelik, vees vaevalt lah. Kerg. laguneb õhu ja niisk. mõjul. Väliseks salitsüülraviks. Õlilahusena või salvina.

**Mesotol (Spiess).**

Aethylium salicylicum. Raske, õlitaoline, värvusetu või kollakas vedelik, vees ei lah. Pud. 25 g. Antirheumaticum, analgeticum. Oliivõliga pooleks sissehõõrumiseks.

**Mesurool (IG).**

Dioksübensoehappe monometüülestri aluselise Bisoola 20% emulsioon seesamõlis. Amp. 1 ccm (= 0,11 g Bi) ja pud. 15 ccm. Lues. Intragluteaal. 0,5—1 ccm igal 3.—4. päeval, kuni üldse 9—10 ccm.

**Metallosal (Leo).**

Mangaankloriid 0,02 mol, berüllkloriid 0,02 mol, kaadmiumkloriid 0,02 mol, jt. Amp. 5 ccm. Tbc, jooksva, nakkushaigused, furunkuloos jne. Tarvit. erieskirja järgi.

**Methylarsin.**

Natrium methylarsenicum. K. n.: Arrhenal.

**Methylcinchophen.**

Methylium phenylcinchonicum. K. n.: Novatophan.

**Migraenin (IG).**

Antipyrinum coffeino-citricum. Subst., tabl. 0,37 ja 1,1 g. Analgeticum, antineuralgicum. 2—3 k. p. 1—3 tabl. à 0,37 g või 1 tabl. 1,1 g.

**Migrenervin (GL).**

Amidopyrini 0,325 g, Guarana 0,25 g, Nuc. Colae 0,05 g, Bromevali 0,1 g, Corrigent. q. s. Pulb. à 1 g. Antineuralgicum, antidolorosum. 1 pulb. tarviduse korral.

**Mineraltabletten (Schering).**

Tabletid kunstl. karlsbadi ja marienbadi vee valmistamiseks, koosnevad vastavate mineraalvee allikate sooladest.

**Mistol (Nujol).**

Camphor. 0,47 g, Eucalyptoli, Mentholi ana 0,63 g, Alcohol, trichlorbutylic. 1 g, Paraffin. liq. ad 100 g,

Color. q. s. Rhinitis, laryngitis, pharyngitis. Välisp. instillatsiooniks.

**Mitigal (IG).**

Dimetüüldifenüleendisulfiid. Kollane, peagu lõhnatu õli, vees ei lah. 25% S. Pud. 75 ja 150 g. Nugiliste tekitatud ja sügelevate nahahaiguste puhul. Välispid.

**Mitinum (Krewel).**

Mitin. purum: valge, peagu lõhnatu, püsiv salvi-  
alus: ülerasvatatud emulsioon lanoliinist, seerumit  
sisaldava vedelikuga. Mitin. mercuriale: he-  
hall elavhõbedasalv mitiiniga. 33,3% Hg.

**Modenol (MBK).**

Naatr.-metüülaršinaadi ja elavhõbesaltsülaadi la-  
hus kahes kanguses: 0,4 ja 1% Hg ja 0,6 ja 0,9% As.  
Amp. 2 ccm. Lues. Intragluteaal. alates 0,5 ccm kuni  
2 ccm *pro dosi*.

**Moronal (Heyden).**

Aluminium formaldehydosulfurosum basic. Valge,  
vees kerg. lah. pulb. Antisepticum. Haavade pesem.  
1—2%, suu loput. 0,5—1% lahusena.

**Mortaliit.**

Kaltsiumarsenaati sisaldav taimekaitsevahend.

**Mouches de Milan.**

Empl. Cantharidum perpetuum 1 g.

**Muiracithin (Sarsa).**

Lecithini 5 g, Extr. fluid. Muirae-Puamae 100 g,  
100 pilli kohta. Tonicum, aphrodisiacum. 3—6 tera  
päevas.

**Musratin (RSi).**

Bac. typhi murium elusbakterite suspensioon. Pud.  
100, 500 ja 1000 ccm. Hiirte ja rottide hävitamiseks.

**Myo-Salvarsan (IG).**

Natr. dioxydiaminoarsenobenzol-dimethansulfoni-  
cum. Kollane, vees kerg. lah., õhu- ja valgusetundlik  
pulp. Sobib süstim. musklisisesi ja nahaalusi. Kuiv-  
amp. 0,01—0,6 g ja isokaksikampullid. Lues. Tarvit.  
erieeskirja järgi,

## N.

**Naftalan (Donner).**

Kaukaasia toornaftast 3—5% naatriumstearaadi lisandiga valmist. salvitaol. pruunmust mass, sulam. algab 65—70° juures. Seguneb kuni 25% veega. Nahaiguste raviks.

**Narcophin (Boehringer).**

Narcotin-Morphin. meconicum. 30% morfiini. Subst., tabl. 0,015 g, amp. 3% — 1 ccm, 1% — 1 ccm. Narkootikum, narkoosi ettevalmistamiseks ja poolune tekitamiseks. Doosimine vastavalt morfiinisisaldusele.

**Nasalgan (Lill).**

Dijodthymoli 0,5 g, Procaini hydrochl. 0,2 g, Ephedrin. hydrochl. 0,15 g, Mentholi 0,08 g, Eucalyptoli 0,1 g, Paraffin. liq. 4 g, Lanolini 5 g. Tuub. 9 g. Nohuraviks.

**Nateina (Llopi).**

Vitamin. A, B, C, D ana 0,05 g, Calc. phosphor. tribasic. 0,1 g. Tabl. 0,6 (= 0,3 g eelmist segu). Hemofiilia, rahhiit, skorbuut, luu pehmumus jne. 6—24 tabl. päevas, jaotatult 3—4 söömaajale.

**Necaron (Boehringer).**

K-Ag cyanatum ja Kal. cholicum mol. hulk. segu. Krist. pulb., lah. vees. Antigonorrhoeicum. Süstimiseks 1:2000 kuni 1:200, loput. 1:10000 kuni 1:3000.

**Neisser-Sieberti salv (Ephag).**

a) salv: HgCl<sub>2</sub> 0,3 g, NaCl 1 g, Tragacanth., Amyl., Glycer. etc. ad 100 g. b) vedelik: Protargoli 20 g, Glycerini 80 g, HgCl<sub>2</sub> 0,05 g. Profülaktikum suguhaiguste vastu. Erieeskirja järgi.

**Neo-Bismutin (Ephag).**

Bismut. salicylic. 10,4 g, Prolypin. hydrochl. 1 g, Ol. Olivar. ad 100. Suspens. purkides 18 g. 1 ccm = 0,06 g Bi. Lues. 1—1,5 g intragluteaal.

**Neo-Bornyval (Riedel).**

Borneooli isovalerüülglükoolhappe ester. Valge, peagu lõhnatu ja maitsetu õlitaol. vedelik. Kapsl. 0,25 g, taimevärviga punaseks värvitud. Sedativum, analepticum. 2—4 k. p. 1—3 kapsl. vee või piimaga peale sööki.

**Neodorm (Knoll).**

*α*-Isopropüül-*α*-broombutüülamiid, Valge, mentooli-

maitsega pulb., lah. vees 1:150, kerg. lah. org. lahus-  
tajais. Tabl. 0,3 g. Sedativum, hypnoticum. Öhtul  
1—2 tabl.

#### Neo-Hexal (Riedel).

Sekundaarne heksamiinsulfosalitsülaat. Hapu mait-  
sega, kerg. vees lah. pulb. Subst., tabl. 0,5 g. Pöie-  
antisepticum; külmetus- ja nakkushaiguste puhul. 3—  
6 k. p. 0,5—1 g vähe suhkruveega võimal. peale sööki.

#### Neo-Reargon (Norgine).

Antrakinoonglükosiid-hõbeda ühend. 15% Ag, 63%  
glükosiide. Punapruun, kerg. vees lah. pulb. Gonor-  
röa vastu 0,5—5% lahusena.

#### Neo-Riodine (Astier).

Keemiliselt iseloomustamata orgaanil. joodiühendi  
naatriumsool. 44% J, 11,11% S. 10% vesilahus am-  
pullides 5 ccm. Joodiraviks. 2—5 ccm 3—4 k. näd.  
muskli- või veenisisesi.

#### Neo-Salvarsan (IG).

Natr. dioxydiaminoarsenobenzol-monomethylensulf-  
oxylicum. 18,5—19,5% As. Kollane, vees kerg. lah.  
õhutundlik pulb. 1,5 g neosalv. = 1 g salvars. Kuiv-  
amp. 0,045 g, 0,075 g, 0,15 g, 0,3 g, 0,45 g, 0,6 g, 1,5  
g, 3 g ja 4,5 g. Ka isokaksikampullides. Lues. Tarvit.  
erieeskirja järgi.

#### Neo-Silbersalvarsan (IG).

Neosalvarsaani ja hõbesalvarsaannaatriumi mol.  
hulk. stabiilne ühend. 19,5% As, 6—7% Ag. Pruun-  
must pulb., väga kerg. lah. vees. Kuivamp. 0,1 g, 0,2 g,  
0,3 g, 0,4 g, 0,45 g. Ka isokaksikampull. Lues. Tarvit.  
erieeskirja järgi.

#### Neostibosan (IG).

Diaethylaminum p-aminophenylstibinicum. Valge  
pulp., kerg. lah. vees kollakaspruunilt. 42—43% Sb.  
Kuivamp. 0,05 g, 0,1 g, 0,2 g, 0,3 g. Kala-Azar, Leish-  
maniosis ja muud troopil. haigused, mis vajavad Sb-  
ravi. Tarvit. erieeskirja järgi.

#### Neo-Treparsenan (Comar).

Natr. dioxydiaminoarsenobenzol-monomethylensulf-  
oxylicum. Amp. 0,15 g, 0,3 g, 0,45 g, 0,6 g, 0,75 g,  
0,9 g. Lues, trypanosomiasis, amoebiasis, malaria,  
febris recurrens, angina spirochaeto-bacillaris etc. Ala-  
tes 0,15 kuni 1,05 g igal viiendal päeval.

#### Neo-Trepol (Torande),

Metallilise vismuti suspensioon isotoonil. seerumis. Amp. 2,5 ccm, 1 ccm = 0,1 g Bi. Lues. Musklisisesi igal 3. päeval 1 amp.

#### Neotropin (Schering).

Butüüloksüdiamiinoasopüridiin. Kollane pulb., lah. vees. St. 129<sup>o</sup>. Subst., dražeed 0,1 g. Urogenitaaltrakti nakkus-põletikuliste haigestumiste puhul. 3 k. p. 2—3 draž.

#### Neuronal (IG).

Dietüülbroomatsetamiid. Valge krist. pulb., nõrga kamprilõhnaga, mõruda maitsega, lah. vees 1:120. St. 66—67<sup>o</sup>. Hypnoticum. 0,5—2 g pro dosi.

#### Neuro-Yatren (Behringwerke, IG).

Neurotroopsete bakterite (bact. prodigiosus, b. pyocyaneus ja Staphylococc. aureus) autolüsaat 3% jatreenilahuses. Amp. 1 ccm, pud. 25 ccm. Ergukava kesk- ja perifeersetes haigestumiste puhul, neuralgia ja neuritiidide raviks. 0,1—0,5 kuni 2 ccm. süst.

#### Neutralon (Schering).

Süntetil. alumiiniumsilikaat. Valge, kerge, lõhnatu, maitsetu pulb., vees ei lah. Hyperaciditas, ulcus ventriculi. 1 teelus. ½—1 tund enne sööki. Vrd. Belladonna-Neutralon.

#### Nirvanol (Heyden).

Fenüületüülhüdantoin. Valge, lõhnatu, mõru pulb., väga rask. lah. vees. Hypnoticum. 0,3 g võimal. kuuma joogiga.

#### Nitroscleran (Tosse).

Pro injectione: alkalinitriidi steriilne lahus anorg. Trunečeki seerumi sooladega (veresooladega). Amp. 1,1 ccm = 0,02, 0,04 ja 0,1 g.

Per os: alkalinitriiti 0,03 g, salpeetrit 1,2 g, kaaliumbikarbonaati 1,8 g, granulaadina. Hüpertoonia, soonte skleroos, angina pectoris. 1 amp. nahaalusi või veenisisesi.

#### Noctal (Riedel).

Acid. isopropylbrompropenylbarbituricum. Valge, nõrgalt mõru pulb., rask. lah. vees. St. 178<sup>o</sup>. Subst., tabl. 0,1 g. Sedativum, hypnoticum. 1—3 tabl. magamineku eel.

#### Noridal-Kerzen (Neumann).

Igas küünlas Calc. chlorat. 0,05 g, Calc. jodat.

0,01 g, Paranephrini Merck. 0,0001 g, Bals. Peruvian.  
0,1 g, Ol. Cacao, Lanol., Cetac. q. s. Hemorroidide raviks.

**Normacol** (Schering).

„Bassoriinrea taimelima *Rhamnus frangula* toimeainete lisandiga“. Pruun granulaat. Lahtistav vahend. 2 k. p. 1—2 teelus. veega.

**Normolactol** (Boehringer).

Piimhapest (30,4%) ja selle kaltsiumsoolast (69,6%) koosnev nn. puhversegu (pH = 3,7). Tabl. 0,3 g. Lahus: Ac. lactic. 14,5 g, Natr. lactic. 16,9 g, Aq. dest. 68,6 g. Fluor vaginalis, peritonitis, pruritus ani. Loputuseks 1—2 supil. 1 liitri vee kohta.

**Nosophen** (Rhenania).

Tetraajoodfenoolftaleiin. Kollakas, lõhnatu, maitsetu pulb., vees ei lah. Lahj. leelistes lah. tumesiniselt. Antiseptikum jodoforni asemel, ka seespidi mao- ja sooltekatarril puhul. Väliselt *per se*, seespidi 0,3—0,5 g pro dosi.

**Nosprasen.**

Hall pulbrikujuline taimekaitsevahend, sisaldab vaskarsenaati.

**Nosprasiit.**

Hall pulbrikujuline taimekaitsevahend, sisaldab vaskarsenaati.

**Novalgin** (IG).

Natr. phenazono-methylaminomethansulfonicum. Vees kerg., alk. rask. lah. pulb. Subst., tabl. 0,5 g, amp. 1 ja 2 ccm (50% lahus). Analgeticum, antirheumaticum, antipyreticum. 3—4 k. p. 1—2 tabl., 2—3 k. p. 1—2 ccm nahaalusi või musklišisesi või 0,5—2 ccm veenisisesi.

**Novamidon** (UR).

Amidopüriin. Tabl. 0,1 ja 0,3 g. Analgeticum, antipyreticum. 2—3 k. p. 0,3 g.

**Novargan** (Heyden).

Hõbeda valguühend. 10% Ag. Pruunkollane, mõru, kerg. vees lah. pulb. Gonorröa. 0,2—2% lahusena süstitamiseks, 0,5% lah. loputamiseks.

**Novarial** (Merck).

Ovariaalsubstantsist kunstliku seedimise varal saadud. Kollakas, nõrga peptonitaol. lõhnaga pulb., kerg. lah. vees. 1 g = 10 värsk. munasarja. Subst., dražeed. Ovarialinsufficitas. 3 k. p. 2—4 draž.

**Novarsenobenzol (Spiess).**

Dioksüdiamiidarsenobensool-monometaansulfohapu naatrium. Neosalvarsaani asendaja kuivampullides. Lues. Tarvit. nagu neosalvarsaan.

**Novaspirin (IG).**

Metüleensidrunhape salitsüülester. 62% salitsüülhapet. Valge, lõhnatu, vähe hapu pulb., vees ei lah. Antipyreticum. 1 g mitu k. p.

**Novasurol (IG).**

Natr. oxymercuri-o-chlorphenoxylacetic. ja Di-aethylmalonylurea kaksikühend. 33,9% Hg. 10% vesilahus amp. 1 ja 2 ccm. 1 ccm = 0,0339 g Hg. Diureetikum kardiaal- ja renaalödeemi puhul; polyserositas, adipositas, lues. Mitte tarvitada glomerulonefriidi, raske nefroosi ja raske kahheksia puhul. 1—2 k. näd. 1—2 ccm intraglut. või veenisisesi.

**Novatophan (Schering).**

Methylum phenylchinolincarbonicum. Kollakas, maitsetu pulb., vees ei lah. St. 58—60°. Subst. tabl. 0,5 g. Antarthriticum, antirheumaticum, antineuralgicum. 1—2 g päevas.

**Noviform (Heyden).**

Bismutum tetrabrompyrocatechinicum. 32% Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Kollane, lõhnatu, maitsetu pulb., vees ei lah. Jodoformi asendaja. *Per se* või 3—20% salvina.

**Novocain (IG).**

p-Amiidobensoül-dietüülamiinoetanool-hüdrokloriid. Valge, lõhnatu, krist. pulb., kerg. lah. vees. Kokaiinist u. 10 korda vähem mürgine lokaalanesteetikum. Lahused on steriilitavad.

**Novocain-Corbasil (IG).**

Corbasil on dioksüfenüülpropanool-hüdrokloriid (dioksünoorefedriin-hüdrokloriid), suprarenini asendaja. Värvusetu, maitsetu, lõhnatu, krist. pulb., st. 178°, kerg. lah. vees. Vastandina neerupealise preparaatile ei põhjusta järsku vererõhulangust uitergu refleksi varal. Tabl. E: Novoc. 0,02 g, Corbasili 0,0002 g; amp. 1 ja 2 ccm (1 ccm = 0,02 g novoc. + 0,0002 g corbas.). Näidust. ja tarvit. nagu novokaiinil adrenaaliniga.

**Novocain-Suprarenin (IG).**

Ampullid. A. (0,5%) 5 ja 10 ccm. 1 ccm =

novoc. 0,005 g, supraren. 0,000005 g, NaCl 0,007 g. Infiltratsioonanesteesiaks.

B. (2%) 1, 2 ja 5 ccm. 1 ccm = nov. 0,02 g, supr. 0,00005 g, NaCl 0,003 g. Juhtivusanesteesiaks.

C. (5%) 3 ccm. 1 ccm = nov. 0,05 g, supr. 0,00008 g. Medullaaranesteese.

E. Amp. 1, 2 ja 5 ccm. 1 ccm = nov. 0,02 g, supr. 0,00005 g, NaCl 0,002 g, kaaliumsulfaati 0,004 g. Juhtivusanesteesiaks.

I. (1%) 1, 2, 5, 10 ja 25 ccm. 1 ccm = nov. 0,01 g, supr. 0,000025 g, NaCl 0,006 g. Juhtivusanesteesiaks.

L. Amp. 2, 5 ja 10 ccm. 1 ccm = nov. 0,02 g, supr. 0,000005 g, NaCl 0,0045 g, kaaliumsulfaati 0,004 g. Juhtivusanesteesiaks.

M. (4%) 1 ja 2 ccm. 1 ccm = nov. 0,04 g, supr. 0,00005 g. Juhtivusanesteesiaks.

Tabletid. A. 1 tabl. = nov. 0,125 g, supr. 0,000125 g ja annab 25 ccm steriils. 0,9% NaCl-lahuses 0,5% nov.-lahuse. Infiltratsioonanesteesiaks.

B. 1 tabl. = nov. 0,1 g, supr. 0,00025 g ja annab 10 ccm steriils. 0,6% NaCl-lahuses 1% nov.-lahuse. Juhtivusanesteesiaks.

C. 3 tabl. = nov. 0,15 g, supr. 0,00025 g ja annavad 3 ccm steriils. vees 5% isotoonse nov.-lahuse. Medullaaranesteesiaks.

D. 1 tabl. = novoc. 0,2 g, NaCl 0,06 g ja annab 10 ccm steriilse veega 2% nov.-lahuse, millele enne tarvit. tuleb lisada kuni 10 tilka suprareniinilahust (1:1000). Juhtivusanesteesiaks.

E. 1 tabl. = nov. 0,02 g, supr. 0,00005 g ja annab 2 ccm steriilses 0,6% NaCl-lahuses 1% nov.-lahuse. Lokaalanesteesiaks, eriti hambaravil.

H. 1 tabl. = nov. 0,5 g, ja annab 100 ccm ster. 0,9% NaCl-lahuses 0,5% isotoonse nov.-lahuse. Veenianesteesiaks.

P. 1 tabl. = nov.-hüdrokloriidi 0,4835 g ja nov.-alust 0,0165 g ja annab 5 ccm ster. veega 10% lahuse. Pindanesteesiaks.

R. 1 tabl. = nov. 0,25 g, supr. 0,0025 g. Lisamiseks rivanolilahustele.

**Novojodin (Scheuble).**

Hexamindijodiid. Helepruun pulb., vees ei lah. Jodoformi asendaja haavade ravil.

**Novonal (IG).**

Dietüülallüülätsetamiid. Valge, krist. pulb., lah. vees 1:120. St. 73<sup>0</sup>. Subst., tabl. 0,3 g. Sedativum, hypnoticum. 1—2 tabl. klaasi sooja veega magamineku eel.

**Novopin männinõelavannid (Pharmacosma).**

Ol. Pini pumil. et silvestr. ana 0,8 g, Ol. Abiet. pect., Pini sibir. ana 0,1 g, Fluoresc. 0,8 g, Boracis 13 g, Natr. bicarbon. 4 g, tselluloidist kapslis. 1 kaps. vanni jaoks.

**Novopin-närviviin (Pharmacosma).**

Menthol. 0,8 g, Ol. Pini silv. 1,5 g, Ol. Pini pum. 0,75 g, Ol. Abiet. 0,5 g, Ol. Lavand., Citri, Rosmarin. ana 0,25 g, Fluoresc. 0,08 g, Spir. 126 g, Ag. dest. ad 180 g. Sissehõõrumiseks.

**Novozon (Novavita).**

Magnes. peroxydatum 20%.

**Nuclargentum.**

Argentum nucleinicum. K. n.: Argyrol.

**Nujol (Nujol).**

Keemil. puhas parafiinõli. Lahtistaja ja mehhaaniline, mitteimenduv soolte libivahend. 1 supil. korraga õhtul või 2 k. p.

**O.****Octin (Knoll).**

Metüül-oktenüülamiin, sek. küllastamatu alifaatne alus. Octin-alus on värvusetu õli, hüdrokloriid väga hügro-sk. pulb., oleinaat õlides kerg. lah. püdel õli, bitartraat valge, vees ja alk. kerg. lah. pulb., st. 78—80<sup>0</sup>. Tabl. 0,15 g okt. bitartr.; liquid. 10 g 10% hüdroklor.-lahus; amp. 1,1 ccm (1 ccm = 0,1 g hüdroklor.); supp. à 0,25 g oleinaati. Spasmolüütikum ja valuvaigistaja samul näidustusil, nagu papaveriin. 10—20 tilka 3—4 k. p. või 2 tabl. valude algul.

**Odylen (IG).**

Mitigaali ja kõrgemolekulaarsete ketoonide segu. Kollane nõrga kamprilõhnaga õli, vees ei lah. 20% S. Veterinaar-praksises ekseemide ning nugiliste tekit. nahahaiguste raviks.

**Olobinthin (Riedel).**

Mitmesuguste puhastatud, happevabade tärpentiinõlide segu 10% rasvõlilahus. Ärritusraviks kõigi põletikuliste ja mädanemisprotsesside puhul. 0,5—1 ccm igal 3—4. päeval musklisisesi või nahaalusi. Suurim ühekordne annus 3—5 ccm.

#### **Omnadin (IG).**

Mittepatogeenseist saprofüütseist baktereid saadud valkude, sapi lipoidainete ja loomarasvade segu emulsioonina. Amp. 2 ccm. Ägedad palavikulised nakkushaigused, kõrvapõletik, neuralgia, isias, furunkuloos, sepsis jne. 1—2 ccm musklisisesi või nahaalusi.

#### **Ophorin (Freund).**

Eriliselt kuivatatud ovariaalsubstants. Draž. 0,3 ja 0,5 g. Klimakteeril. vaevused ja muud munasarja alategevusest sõltuvad tervishäired. Mitu k. p. 1—2 draž.

#### **Opsonogen (Güstrov).**

Polüvalentne stafülokokkide vaktsiin. I, Ia, II, III, IV à 100, 250, 500, 750 ja 1000 milj. bakt. 1 ccm-is. Amp. 1 ccm, pud. 5 ccm. Furunkuloosi ja stafüloomükooside raviks. Nahaalusi ja intraglut. täiskasvanuile ja lastele alates 50—75 milj. kuni 1000 milj. ja rohkem; imikuile palju suuremais annustes, päevas 500—1000 milj. ja rohkem.

#### **Optalidon (Sandoz).**

Dražeed, igaühes 0,05 g isobutüülbarbituurhapet, 0,125 g amidopüriini ja 0,025 g kofeiini. Sedativum, analgeticum, antirheumaticum. Mitu draž. päevas.

#### **Optannin (Knoll).**

Calc. tannic. basic. 85% parkhapet, 14,4% CaO. Hallpruun, lõhnatu, maitsetu pulb., vees peagu ei lah. Subst., tabl. 0,5 g. Soolteadstringens kõhulahtisuse puhul. 3—4 k. p. 0,5 g.

#### **Optarson (IG).**

Amp. 1 ccm = 0,01 g solarsooni ja 1 mg strychn. nitric. Toonikum. Ülepäeviti 1 ccm nahaalusi.

#### **Optochin (Zimmer).**

Aethoxyhydrocupreinum. O. basic.: valge pulb., vees ei lah. O. hydrochlor.: valge, mõru pulb., lah. vees 1:2. Pneumokokkide infektsioonid, kopsupõletik. 0,2—0,25 g 2—3 k. p.

#### **Orexin (IG).**

Phenyldihydrochinazolinum tannicum. Kollakas, lõhnatu, maitsetu pulb., kerg. lah. lahj. hapetes (mao-

mahlas). Subst., tabl. 0,5 g. Stomachicum isupuuduse, alatoitumuse, merehaiguse, oksendamise jne. puhul. 2—3 k. p. 0,5—1 g enne sööki.

**Orphol** (Merck).

Bismutum  $\beta$ -naphtholicum. Hallkollane pulb., vees ei lah. 77% Bi<sub>2</sub> O<sub>3</sub>. Soolteantiseptikum. 3 k. p. 0,5—1 g.

**Orthoform** (IG).

Metamiinoparaooksübensoehappe metüülester. Valge, vaevvalt vees lah. pulb., St. 141—143<sup>o</sup>. Lokaalanesteetikum, eriti larüngoloogias; valude vastu maovähja puhul. *Per se* või 5—10% salvina: seespidi 0,5—1 g mitu k. p. enne sööki.

**Otalgan** (SS).

Phenazoni 5 g, Extr. Opii 0,85 g, Papaverini 1 g, Glycerini anhydrici 10 g. Keskkõrva põletiku raviks. Instillatsiooniks.

**Ouabaine** (Nativelle).

Kristalne g-strofantiin. Tabl. 1 mg, amp. 1 ja 2 ccm (0,25 ja 0,5 mg). Cardiotonicum. 3—4 tabl. päevas või 1—2 ccm veeni- või muskklisisi.

**Ovaraden** (Knoll).

Munasarja kuivekstrakt. Subst., tabl. 0,05 g (= 0,5 g värsk. näär.). Klimakteeril. vaevused, menstruatsioonid korratud jne. 2—3 tabl. päevas.

**Ovaraden-Triferrin** (Knoll).

Ovaradeni 0,06 g, Triferrini 0,1 g. Tabl. 0,5 g = 0,16 g ovaradeen-triferriini. Klimakteeril. vaevused, kehveresus, genitaalide hüpoplaasia, Morbus Basedovi. 2—3 tabl. päevas.

**Ovarial tabletid** (Merck).

Ovaria siccata Merck. Subst. ja tabl. 0,07 g (= 0,5 g värsket ovariaalsubstantsi). Klimakteeril. vaevused, menstruatsioonid korratud, infantilism jne. 1—2—3 tabl. päevas.

**Ovogal** (Riedel).

Albuminum cholicum. Rohekaskollane pulb., vees ei lah. Cholagogum. 0,5 g 2—3 k. p.

**Ovo-Sedicyl** (Wiernik).

Sedicyli 0,018 g, Ovar. sicc. 0,025 g, Ovarialhormon 0,001 g (= 10 hiireühikut), massa ad tabl. 0,25 g. Klimakteeril. vaevused. 1—2 tabl. päevas.

**Ovo-Transannon** (Gehe).

Standarditud ovariaalhormoon-preparaat transan-

nooni lisandiga. Dražeed à 20 hiireühikut. (Calc. lactic. 0,5 g, Calc. sulfoichthyolic. 0,04 g, Ol. Salviae 0,001 g, Extr. Aloës 0,025 g, MgO 0,02 g, Acid. citric. 0,07 g, Corp. lut. sicc. 0,1 g, Fol. Digital. titr. 0,02 g). Klimakteeril. vaevused, menstruaatsiooni korratud. 14 päeva järgimööda: algul kuni 8. päevani suurend. annust 3 k. p. 1—3 tabl. ja siis alandades 3—1 tabl., siis 10 päeva vahet pidada.

#### **Oxaphor (IG).**

Oksükampri 50% alk.-lahus. Hingamishäired. 40—60 tilka 1—2 k. p.

## **P.**

#### **Pacyl (Wiernik).**

Dimetüüldioksüpuriiin-metaankarboonhapu trimeetüül-β-broometüülammoonium. Tabl 0,05 g, amp. 1,1 ccm. Hüpertoonia, jäsemete krambid jne. 3 k. p. 1—2 tabl. või 2—3 k. näd. 1 amp.

#### **Padutin (IG).**

Kallikreiin Bayer, vereringe-hormoon Frey-Kraut'i järgi. Amp. 1 ccm ja pud. 10 ccm (1 ccm = 3 ja 7 bioloog. ühikut). Vereringe korraldamiseks mitmesuguste haiguste puhul: Raynaud'i gangreen, hüpertoonia, stenokardia, klimakteer. vaevused. 3 k. p. 25—50 tilka või musklisisi 2 k. p. 0,5 ccm, kolme päeva pärast 2 k. p. 1 ccm.

#### **Pagéol (Chatelain).**

Santalyli cinnamylici, Hydrosantalyli ana 0,035 g, Ol. Cedri 0,07 g, Extr. Fabianae imbr. 0,04 g, Extr. Hysterionicae baylahuen 0,04 g, Extr. Convallar. majal. 0,02 g, Acid. camphoric. 0,001 g, Resorcini 0,001 g, Natr. benz. 0,07 g, Hexamini 0,07 g. Draž. 0,87 g. Pöieantiseptikum. 6—16 kapsl. päevas.

#### **Pain Expeller (Ephag).**

Tinct. Capsici et Piperis nigri, kampri, seebi, rosmariini, lavandli-, nelgi- ja kaneeliõli ning ammoniaagi lisandiga. Antirheumaticum. Sissehõõrumiseks.

#### **Pain Expeller (Lill).**

Türgipipratinktuur kampri, kaneeli- ja tindipähkli-tinktuuri, rosmariini- ja lavandliõli, seebi ning ammoniaagi lisandiga. Antirheumaatikum. Sissehõõrumiseks.

**Pain Expeller (Medikon).**

Türgipipra, nelgi- ja kaneelitinktuur kampri, rosmariiniõli, sandlipuu, seebi ja ammoniaagi lisandiga. Antirheumaticum. Sissehõõrumiseks.

**Pandigal (Beiersdorf).**

*Digitalis lanata* glükosiid lanadigiin keemil. puhtal krist. kujul. St. 245<sup>0</sup>. Pulb., tabl., vedelik, amp.; 0,2 g pulb. = 1 tabl. = 25 tilka = 1 ccm = 1 amp. = 0,2 mg lanadigiini. Cardiotonicum. 3 k. p. 0,1—0,2 mg või 2 k. p. 2 ccm veenisisesi.

**Panflavin (IG).**

Pastillid à 0,003 g trüpaflaviini ja 0,0003 g mentooli. Suu ja kurgu desinfitseerimiseks ja profülakt. külmetus- ning nakkushaiguste (gripi, difteeria, sarlaki polüomüeliidi jne.) vastu. 1—2 tabl. tunnis suus aeglaselt imeda.

**Pankreas-Dispert (Krause).**

Krause menetlusel kuivatatud pankreasnääre. Subst., tabl. 0,1 g kuiva nääret. Pankreas-alasekretsioon, seedehäired, eriti käärimisdüspesia, akolia, imikute kõhulahtisus. 2—4 tabl. igal söömaajal.

**Pankreatin (Merck).**

Looma pankreasnäärmest valmist. preparaat, sisaldav peamiselt entsüüme trüpsiini, diastaasi ja lipaasi. Tabl. 0,1 g. Digestivum. 2—3 tabl. 1 tund enne sööki.

**Pankreon (Rhenania).**

Pankreaskuivainet 85 g, tanniini 3 g, anorg. ja org. stabilisaatoreid (Mg, Na sooli) 12 g. Subst., tabl. 0,25 g. Mao-, soolte ja pankreasfunktsioonide häirete puhul. 0,5 g igal söömaajal.

**Pankrophorin (Freund).**

Pankreaspreparaat, sisaldav 1 g-is 11 lipaasiühikut ja 1400 trüptaasiühikut. Keratiiniga kaetud, peensooles lahustuvad tabl. 0,3 g. Peensoole katarrid, pankreasnäärme alategevus. 3 k. p. 2 tabl. enne sööki.

**Pantocain (IG).**

p-Butüülamiinobensoüüldimetüülamiinoetanool. Valged läikiv. krist., lah. kerg. vees, St. 149—150<sup>0</sup>. Amp. 10 ccm (0,1% + supraren.), 2 ccm (0,2% + supr.), 2 ccm (0,5%), pud. 25 ccm (2%). Infiltratsioon anesteesiaks 0,1% lahus, juhtivusanest. 0,2% lahus, pinnaanest.

tees. 1—2% lahus, lumbaalanest. 0,5% lahust 1,5—2 ccm, silmaraviks 0,25—1% lahus.

**Pantopon (Roche).**

Oopiumi koguaalkaloidid soolhappeühenditena (ca. 50% morfiini). Pruun, vees kerg. lah. mõru pulb. Subst., tabl. 0,01 g, amp. 1,1 ccm (= 0,02 g). Oopiumi asendaja. 1—3 k. p. 0,01—0,03 g.

**Paracodin (Knoll).**

Dihydrocodeinum hydrochlor. vel bitartaric. Mõlemad vees kerg. lah. Subst., tabl. 0,01 g, amp. 1 ccm (= 0,02 g), siirup (0,2% parakodiini, Extr. Grindeliae, Extr. Althaeae, Acid. benzoic., Glycerin). Kodeiinist tugevama toimega rahustav ja uinutav vahend, eriti kõha puhul. 3 k. p. 0,01—0,03 g.

**Paramorfan (Knoll).**

Dihydromorphinum hydrochloric. Vees kerg. lahustuv morfiini asendaja. Subst., amp. 1 ccm = 0,02 g. 0,01—0,02 g nahaalusi.

**Paranephrin (Merck).**

Adrenaliinile analoogne preparaat.

**Pegnin (IG).**

Veiste maost valmist. laabferment piimsuhkru ja 10% keedusoola lisandiga. Valge, vees lah. magussoolane pulber. Dieteetil. vahend seedimiskorratuste puhul lehmapiima seeditavamaks tegemiseks. 10 g ühe liitri piima kohta.

**Pektorol (Medikon).**

Extr. Thymi fluid. 1 g, Elix. paregoric. 10 g, Spir. vini 40 g, Ol. Anisi, Ol. Eucalypti ana 0,1 g, Extr. Liqurit. sicc. 0,5 g. Tussis. 3—4 k. p. 25—30 tilka.

**Pellidol (IG).**

Diatsetüülamiinotoluool. Punane pulb., vees ei lah. Subst., 2% salv, kepikesed (8 ja 18 cm pikad, sisald. 5% pellid., 2% Bals. Peruv., 1% Jodol., 1% Acid. boric., 1,5% Procaini, 0,05% Argent. nitr.). Raskesti paranevate haavade, ekseemide, mitmesug. epiteelidefektide raviks; kepikesed uretraal-, tservikaal- ja rektaal-gonorröa raviks.

**Peptonate de fer Robin (Robin).**

Ferri pepton. (25%) 1,6% magustatud ja aroomistatud vesilahuses. Roborans. 1 supilusika täis peale sööki.

**Per-Abrodil (IG).**

Dijoodpüridoon-N-äädikhapu dietanoolamiini 35% steriilne vesilahus. 1 ccm = 0,175 g J. Amp. 20 ccm. Neeruvaagna, kusejuhade ja põie, samuti liigeste, uuriste jne. röntgenograafiaks. 20 ccm veenisisesi.

#### Percain (PB).

$\alpha$ -Butylcinchonino-diaethylaethylendiamin. hydrochloric. Valge, lõhnatu, maitsetu, krist. pulb., kerg. lah. vees. St. 97<sup>o</sup>. Lahused kestavad keetmist ja on neutraalsed. Subst., tabl. 0,05 ja 0,1 g ning 0,05 g cum adren. et NaCl, amp. 2,3 ccm (isotoon. lahus 0,2% + adren.), 2,3 cm (0,3% + adren.), 5,5 ccm (0,1% + adren.). Anesteetikum infiltratsioon- ja juhtivusanesteesiaks (0,05—0,1%), limanahaanestees. (0,15—0,2%), ureetra ja põie anest. (15—30 ccm 0,1—0,15% lahust + 10—15 tilka adrenal. — iga 100 ccm kohta); 0,025—0,05% lahusega valutavate haavadele, põletishaavadele, nahahaiguste puhul, 0,1—1,5% salvina valutavate ekseemide, hemorroidide jne. puhul.

#### Perdolat (Heyl).

Amidopyrini 50, Cinchopheni 40, Coffeini 10. Tabl. 0,5 g. Analgeticum, antirheumaticum. 3—4 k. p. 1—2 tabl.

#### Pergenol (Byk).

Natr. biboric. ja Natr. bitartaric. mol. hulk. segu, mis vees lahust. eraldab vesinikuülihapendit. Tabl. 0,5 g, piparmündiõli lisandiga. H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> asendaja.

#### Perhydrit (Merck).

H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> ühend karbamiidiga (stabilisaatoriks oksüamiinohappe asüül). Tahke aine, sisald. 33 kaalu-% vesinikuülihapendit. Subst., tabl. 1 g. H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> asendaja.

#### Perhydrol (Merck).

Hydrogenium peroxydatum solutum concentratum 30 kaalu % H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>.

#### Perichol (Boehringer).

Cadechol + Papaverin. Subst., tabl. 0,13 g (= 0,1 g kadehhooli + 0,03 g papaveriini). Spetsiifikum südame voolmete puhul. 3 k. p. 1—2 tabl.

#### Peristaltin (PB).

Cort. Cascar. Sagrad. veeslahustuvad glükosiidid. Tabl. 0,1 g, amp. 1,5 ccm = 0,15 g. Kroonil. ja habituaalne kõhukinnisus, sooltehalvatus peale operatsioone, soolte ja mao muskulatuuri atoonia; kiireks soolte tüh-

jendamiseks mürgistuste puhul. 1—3 tabl. *per os* või 1—2 amp. nahaalusi, muskli- või veenisisesi.

**Perlatan** (Boehringer).

Krist. folliikelhormoon. St. 259—260<sup>o</sup>. 0,1 mg = 1000 hiireühikut. Amp. 1 ccm (perlataani 0,5 mg (*forte*: 1 mg), glükooleetrit 0,075 ccm, oliivõli ad 10 ccm). Tabl. à 0,05 mg. Tilgad pud. 10 ccm. 1 ccm = 50 tilka; 1 tilk = 8 hiireühikut; 1 ccm = 400 HÜ. Folliikelhormoonteraapiaks, menstruatsiooni vaheajal 2 näd. jooksul 2—3 k. p. 1 tund enne sööki võimal. tühja kõhuga 1 tabl. või 30 tilka või 1 ccm musklisisesi.

**Pernocton** (Riedel).

Sekundaarne Natr. butyl- $\beta$ -bromallylbarbituricum, 10% vesilahus. Amp. 1,1, 2,2 ja 5 ccm. Hypnoticum. Muskli- või veenisisesi kuni 6—8 ccm. Süstida väga aeglaselt, mitte üle 1 ccm minutis.

**Peronin** (Merck).

Benzylmorphinum hydrochloric. Valge, krist. pulb., lah. vees 1:130. Morfiini asendaja. 0,02—0,06 g pro dosi.

**Peroxyl tabletid** (Ephag).

Hyperoli 50 g (Hyperol = H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> ja karbamiidi ühend, ca. 35% H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>), Mentholi 0,5 g, Amyli ad 56 g. Tabl. 0,3 g. Suu- ja kurguhaiguste puhul vesinikuühilhapendi asendaja. 1—2 tabl. ½ klaasi veega loput. ja kuristamiseks.

**Peroxyl vannid** (Ephag).

Natr. peroxydat. 50, Natr. pyroboric. 100, Kal. hypermangan. q. s. Hapnikku eraldava vanni valmistamiseks. Tarvit. erieeskirja järgi.

**Pertussin** (Taeschner).

Ol. Thymi 0,2%, Tinct. Thymi 25%, Sir. spl. 75%. Pertussis ja hingamisteede katarrid. 1—2 tunni järgi 1 supi-, lastele 1 teelusika täis.

**Peruol** (IG).

Bensoehappe bensüülester (peru-palsami toimeaine) õlilahuses. Välisp. sügeliste jt. nugiliste põhjust. nahahaiguste puhul.

**Phanodorm** (Merck, IG).

Acid. cyclohexenylaethylbarbituric. Valge, lõhnatu, mõru, vees väga rask. lah. pulb. St. 173<sup>o</sup>. Subst., tabl. 0,2 g. Hypnoticum. ½—1—2 tabl. vajaduse korral.

**Phanodorm-Calcium** (Merck; IG).

Fanodormi kaltsiumiühend. Valge pulb., lah. vees 1%. Tabl. 0,2 g. Hypnoticum.  $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$  tabl. magamineku eel.

**Phenazon.**

Phenyldimethylpyrazolonum. K. n.: Analgesin, Antipyrin, Pyrazoline.

**Phenobarbital.**

Acid. phenylaethylbarbituricum. K. n.: Gardenal, Luminal. Phenobarbital. solubile: Natr. phenylaethylbarbituric. K. n.: Luminal-Natrium.

**Phenobis bromatum.**

Bismutum tribromphenylicum. K. n.: Xeroform.

**Phenocoll** (Schering).

Paraaminoacetphenetidinum hydrochloric. Valge, mõru, krist. pulb., lah. vees 5%. Antipyreticum, anti-neuralgicum, antirheumaticum. Mitu k. p. 0,5—1 g.

**Phenopurgen** (Ephag).

Phenolphtaleini 0,1 g, Sacch., cacao q. s. Tabl. Lahtistaja. 1—3 tabl. õhtul.

**Phytin** (PB).

Inosiitheidsafosforhappe hapu kaltsiummagniumsool. 22,8% org. seotud P. Valge, vees lah. pulb. Subst., tabl. 0,25 g, kapsl. 0,25 g, vedelik: naatriumühendi 25% vesilahus. Skrofuloosi, tbc, kehvveresuse, rahhiidi jne. raviks. Kuni 1 g päevas.

**Pilules Cascara Sagrada Midy** (Midy).

Sagraadakoore ekstrakti sisaldavad pillid. Lahtistav vahend.

**Piperazine effervescent Midy** (Midy).

Piperazini 3,5 g, Natr. bicarbonic. 43 g, Acid. tartaric. 30 g, Acid. citric. 12 g, Sacchar. ad 100 g. Kusi-happe diatees, jooksva jne. Ägedail 4—6, kroonil. juhtudel 2—3 teelus. täit päevas  $\frac{1}{2}$  klaasi veega.

**Pitraphorin** (Schering).

Steriilne ajuripatsi tagumise sagara ekstrakt. Amp. 1 ccm = 4 Vögtlin-ühikut. Väitenõrkus, atoonil. verejooksud, soolteatoonia, peritoniit jne. 1—2 ccm nahalusi, veenisisesi vähem.

**Pittylen** (Lingner).

Formaldehüüdi ja okaspuutõrva kondensatsiooniprodukt. Kollakaspruun amorfne pulb., vees ei lah.

Nahahaiguste raviks. 10—20% salvina, 2—10% seebina.

### **Pityglandol (Roche).**

Steriilne ajuripatsi tagumise sagara ekstrakt. Amp. 1,1 ccm ja tabl. 1 tabl. = 0,5 ccm = 1,5 Vögtlin-ühikut. Väitenõrkus, atoonil. verejooksud, amenorröa, soolteatoonia, astma, suhkruta liigkusesus jne. 3 k. p. 1—2 tabl., 1—2 ccm päevas nahaalusi, muskli- või veenisisesi.

### **Pituitrin (PD).**

Füsioloogil. standarditud steriilne ajuripatsi tagumise sagara ekstrakt. Amp. 0,5 ja 1 ccm (1 ccm = 10 Vögtlin-ühikut). Väitenõrkus, astma, suhkruta liigkusesus, endokardiit. Sünnitusabiks 0,2—0,25 ccm, muidu 0,2—1 ccm nahaalusi, muskli- või veenisisesi.

### **Plasmogen (Ephag).**

Natr. thiosulfuric. 0,05 g, Natr. silicic. 0,95 g, Bismut. subnitr. 1,2 g, Natr. sulfuric. sicc. 7,5 g, Calc. glycerinophosph. 5 g, Calc. phosphoric. 34 g, Calc. lactic. 31,2 g, Calc. sulfuric. 0,5 g, Natr. bromat. 8,2 g, Magn. sulf. sicc. 1,4 g, Sacchar. lact. 5 g, Cacao tost. 5 g ad 200 tabl. à 0,5 g. Kopsu, näärme-, luu- ja nahatiisikus. 3 k. p. 2—3 tabl. peale sööki.

### **Plasmon (Plasmon).**

Kuivatatud piimakaseiin naatriumbikarbonaadi lisandiga. Toitevahend.

### **Polygalysat (Ysat).**

Seenegajuure dialüsaat 1:1. Tilgad, tabl. (1 ccm = 1 tabl.) Expectorans. 3 k. p. 10—20 tilka või 1 tabl.

### **Polyphlogin (Heyl).**

Acidum phenylchinolincarmonicum. Tabl. 0,5 g, amp. 5 ccm (10% liitiumsoola lahus 25% karbamiidi lisandiga). Antarthriticum, antiphlogisticum, anti-rheumaticum. 3—6 k. p. 0,5 g.

### **Ponndorfs Haut-Misch-Impfstoff B (SS).**

(Rheumakutin) Sisaldab stafülo-, strepto- ja pneumokokkide ning influentsabatsillide autolüüsil saadud valkaineid, kombinatsioonis tiisikusebatsillide anti-geeniga. Kapillaarides. Reuma ja liigesepõletiku raviks. Vaktsineerit., alates kaks korda kolm ccm kuni 4 korda 6 ccm skarifitseeritud nahale. 4—6 vaktsineerimist mõne näd. jooksul.

**Ponndorfs Tuberculose-Impfstoff A. (SS).**

Sisaldab tiisikusepisilaste ekstrakti ja autolüsaati. Kapillaarides. Tbc algstaadiumi, liigese-, näärme-, luutiisikuse puhul vaktsineerimiseks skarifitseeritud naha kaudu.

**Poral (Chatelain).**

Natr. benzoic., Natr. cinnamylic. ana mol. hulk. ad 20, Guajacol. carbon. Guajacol. phosphoric., Kal. sulfoguajacol. ana 28, Sulf. colloidal. 4, Extr. Convallar., Pulsatill., Lobeliae, Droserae rotundifol. ana 2, Extr. Sisymb. officinal. 8, Extr. Eucalypti 12, Terpinhydrati 20. Terad 0,55 g (sellest eelmist segu 0,25 g). Hingamisteede haigused. 6 tera päevas.

**Poudre d'Abyssinie Exibard (Ferret).**

Kal. nitric. 33, Fol. Stramonii 32, Fol. Belladonn. 12, Fol. Digitalis 11. Astma puhul suitsetamiseks.

**Poudre de Charbon de Belloc (Frère).**

Carbo Populi. Subst., pastill. Adsorbens. 2—6 supilus. või 4—12 pastilli päevas.

**Proallon (GL).**

Amidopyrin. allylisopropylbarbituric. Tabl. 0,16 g. Analgeticum, sedativum. 1—4 tabl. päevas.

**Probilin (Goedecke).**

Pillid à 0,1 g haput naatriumoleaati salitsüülhappe, mentooli ja fenoolftaleiini lisandiga. Sapikivide vastu. Homm. ja õht. 3—4 tera.

**Procain.**

Aminobenzoyl-diaethylaminoethanol. K. n: Atoxicocain, Novocain.

**Progynon (Schering).**

Kontsentritud hormoon looma platsentast. Dražeed à 250 hiireühikut ja amp. 1 ccm = 100 HÜ. Klimakteeril. vaevused, menstruatsiooni korratudused jne. 2 draž. päevas. Süst. nahaalusi või musklisisesi individuaalselt.

**Progynon B oleosum (Schering).**

Dihüdrofolliikelhormooni bensoehappeester õlilahuses. Amp. à 10 000, 50 000 ja 100 000 hiire- ehk ben-

soaat-ühikut. Klimakteeril. vaevused, menstruaatsiooni korratud. Musklisisesi erieeskirja järgi.

**Prokliman (PB).**

Tabl. 0,55 g. Igas tabl. ovariaalhormooni 0,02 g, peristaltiini 0,015 g, nitroglütseriini 0,0002 g, amidopüriini 0,1 g, kofeiin-naatr.-salitsül. 0,05 g. Klimakteeril. vaevused. 1—2 k. p. 2—3 tabl.

**Prolan (IG).**

Ajuripatsi esisagara standarditud hormoonpreparaat Zondek'i järgi. Amp. 100 ja 500 rotiühikut ja draž. à 150 RÜ. Arenemiskorratud, infantilism, koos primaarse amenorröaga, menstruaatsiooni korratud jne. *Per os* 150—450 RÜ, musklisisesi 100—300 RÜ päevas.

**Proluton (Schering).**

Corpus luteum-hormoon õlilahuses. Amp. 2 ccm = 20 kliinil. ühikut. Emaka verejooksud. Musklisisesi.

**Prolypin.**

Benzoylaethyltetramethyl-diaminoisopropanol. K. n.: Alypin.

**Prominal (IG).**

Acid. N-methylphenylbarbituricum. Valge, peagu maitsetu, vees rask. lah. pulb. St. 176—178<sup>0</sup>. Tabl. 0,2 g. Epilepsia. 0,1—0,6 g päevas.

**Propaesin (Fritzsche).**

p-Amiinobensohappe propüülester. Valge mõru pulb., vähe lah. vees. St. 73—74<sup>0</sup>. Anestesiini asendaja.

**Propylbarbital.**

Acid. dipropylbarbituricum. K. n.: Propanol.

**Prostigmin (Roche).**

m-Oksüfenüültrimetüülammoonium - metüülsulfaadi dimetüülkarbamiinhappe ester. Amp. 1,1 ccm (1 ccm = 0,0005 g) vesilahust. Soolteperistaltika ergutamiseks (füstostigmiini asemel), eriti operatsioonidele järgneva sooltehalvatuse puhul. 1 ccm nahaalusi, muskli- või veenisisesi.

**Protargentum.**

Argentum proteinicum. K. n.: Protargol.

**Protargol (IG).**

Hõbeda valguühend. 8,3% Ag. Pruun, vees kerg. lah. pulb. Lahused külmalt ja alati värskelt valmistada! Protargool-granulaat: prot.+

karbamiid (33,3% prot.), kollakaspruun granulaat, väga kerg. lah. vees. Gonorröa ja selle tüsistused (0,25—10%), blefariit, konjunktiviit, kurgu-, nina- ja kõrvahaigused (2—5—10%).

### Protylin (Roche).

Paranukleiin-valgupreparaat. Kollakas, peaaegu maitsetu, lõhnatu pulb., vees ei lah. 2,7% P, 81% valku. Tabl. 0,25 g. Kerg. seeditava fosforipreparaadina. 3 k. p. 2—4 tabl.

Eisen-Protylin sisald. 2,3% Fe.

### Psicain.

Süntetil. valmist. kokaiini isomeeri, d—ψ—kokaiini tartraat. Valge, krist. pulb., lah. vees 1:4. Lahused on steriilitavad. Lokaalanesteetikum, eriti uroja larüngoloogias. Toime kokaiinist 2 k. tugevam, süstitult nahaalusi mürgisus poole väiksem.

### Pulbit (IG).

Eril. menetl. valmist. vismutsubnitraadi ja valge booluse segu. Valge, maitsetu pulb., vees ei lah. 3,7—4,5% Bi. Antidiarrhoicum veterinar. Suurtele loomadele 70—100 g, keskmistele 20—50 g, väikeloomadele 5—20 g.

### Pulmoserum (Bailly).

Calc., Natr. ja Codein. phosphogujacolicum'i lahus Extr. Pulmonariae lisandiga. Hingamisteede katarrid, läkaköha, gripp, kopsupõletik. Homm. ja õht. 1 teelus. täis.

### Purgen (Bayer & Co).

Phenolphtaleini 0,05 g (lastele), 0,1 g (haigeile) ja 0,5 g (täiskasvanuile). Lahtistaja. 0,1—0,5 g korraga.

### Pyocyanase (SS).

Sisaldab Bac. pyocyanus'e kultuuridest saadud proteo- ja bakterioliütilisi ensüüme. Pud. 10 ja 50 ccm. Desinfitseerimiseks iga etioloogiaga nakkuseliste ja põletikuliste protsesside puhul (difteeria, angiina, ekseemid, haavad jne), mille pahaloomulisus nõuab eriti intensiivset ravi. Pinseldamiseks, inhaleerimiseks, tampoonideks. Instillats. mitu k. p. 10 tilka, kurist. iga 2 tunni järgi 1 teelus., per os mitu k. p. 1—2 teelus.

### Pyramidon (IG).

Dimetüülamiinofenüüldimetüülpüratsoloon. Valge

mõru pulb., lah. 20 osas vees, kerg. alkohol. St. 108<sup>o</sup>. Subst., tabl. 0,1 ja 0,3 g. Antipyreticum, antineuralgicum, analgeticum. 2—3 k. p. 0,3 g.

**Pyrazoline (UR).**

Phenazonum. Tabl. 0,5 g. Antipyreticum. 3 k. p. 1 tabl.

**Pyrenol (Goedecke).**

Siambensoehapet ja tümooli (2%) ning võrds. osi naatriumbensoaati ja naatriumsaltsülaati (ana ad 100 %) sisald. pulb. Subst., tabl. 0,5 g. Expectorans, sedativum astma, läkaköha, gripi ja reuma puhul. 3—5 k. p. 0,5—1 g.

**Pyridium (Boehringer).**

Phenylazodiaminopyridinum hydrochloric. Telliskivipunane, külmas vees rask., keevas kerg. lah. värvaine; sissevõetult annab uriinile kollakas-kuni veripunase värvuse. Subst., tabl. 0,1 g. Antiseptikum peamiselt urogenitaaltrakti haiguste puhul. 3 k. p. 0,1—0,2 g.

**Pyrocol (RSi).**

Bact. coli surmatud mikroobide suspensioon 0,85% NaCl — lahuses. I konts. 50 milj., II — 100, III — 200, IV — 500, V — 1000, VI — 2000, VII — 5000 milj. mikroobi 1 ccm-is. Kunsttehisliku palaviku tekitamiseks mitmesuguste haiguste ravimisel. Tarvit. individuaalselt.

**Q.**

**Quadronal (GL).**

Oxyaethylacetanilidi 0,15 g, Phenazoni 0,15 g, Cofeini 0,05 g, Lactyl—p—phenetidini 0,005 g, Hexamini 0,025 g, MgO<sub>2</sub> 25% — 0,02 g. Tabl. 0,5 g. Analgeticum, antirheumaticum, antineuralgicum. 1—4 tabl. päevas.

**Quadronox (GL).**

Quadronali 0,12 g, Barbitali 0,48 g. Tabl. 0,6 g. Hypnoticum. 1—1½ tabl. 1—2 tundi enne magamaminekut.

**Quinisal (Boehringer).**

Chinin. bisalicylosalicylicum. 45% kiniini. Valge, mõru, vees 1% lah. pulb. Subst., tabl. 0,25 g. Gripp, külmetushaigused ja liigesejooksva. 0,25—0,5g 3—6 k. p.

## R.

**Racedrin (IG).**

Süntetiline ratseem-efedriin. Värvuseta kristallid, kerg. lah. vees. St. 188<sup>0</sup>. Subst., tabl. 0,05 g, amp. 1 ccm (5% lahus). Kollapsiseisundid, hüpotoonia eriti peale nakkushaiguste, astma, bronhiit, heinapalavik.  $\frac{1}{2}$ —1 tabl. päevas. Nahaalusi 0,5—1 ccm mitu k. p.

**Radiosclerin (Radiosclerin).**

Natr. bicarbonic. ja Acid. tartaric. vähese hulga Na, K, Ca, Mg ja Fe soolade ning raadiumkloriidi lisandiga. Viimast igas tabletis  $1,388 \times 10^{-5}$  mg. Arterioskleroos, reuma, isias. 3 k. p. 1—2 tabl. vees lahustatult.

**Reactogen (TÜBI).**

Sisald. mitmesuguste bakteriteliikide valke ja lipoide. Amp. 2,2 ccm. Haiguste puhul, kus on vajalik organismi tõkkefunktsioonide kiire mobiliseerimine: stafülo-, strepto- ja pneumokokkide põhjustatud nakkused — furunkuloos, roos, mädaveresus, kõrvapõletik, silmainfektsioonid, gripp, bronhhopneumonia, limanahkade põletikud jne. 1—2 ccm musklišisesi.

**Reargon (Norgine).**

Antrakinoonglükosiid-hõbeželatoos. 5% Ag. Pruun pulb., kerg. lah. vees. Gonorröa puhul 0,5—5% lahusena.

**Recresal (Albert).**

Kaltsineeritud naatriumdihüdroortofosfaat. Tabl. 1 g. Toonikum konstitutsionaalse nõrkuse ja füüsil. ning vaimlise liigväsimume puhul. 2 k. p. 1—3 tabl. peale sööki.

**Rectosan (Lill).**

Extr. Hamamelid. 0,2 g, Ac. boric. 0,1 g, Liq. Alsoli 50%—0,01 g, Kal. oxychinolinsulfon. 0,004 g, Formalini 0,004 g, Bals. Peruvian. 0,02 g, Aethocaini hydrochl. 0,008 g, Ungt. Glycerini 33 g. Salv tuubis. Hemorroidid, fissura et pruritus ani. 1 k. p. 2—3 g erimenetlusel.

**Recto-Serol (Merz).**

Extr. Hamamelid. 7,5 g, Alumin. aceticotartar. 0,4 g, Acid. boric. 3 g, Kal. oxychinolinsulfon. 0,1 g, Formaldehüdi 0,1 g, Bals. Peruvian. 0,5 g, Procaini hyd-

rochl. 0,25 g, Seroli (veeslahustuvat piimavalku sisaldav salviaalus) ad 100 g. Hemorroidide vastu erimenetlusel.

### Recvalysat (Ysat).

Värske palderjanijuure dialüsaat 1:1. Tilgad. Sedativum ja mahe hypnoticum. 3 k. p. 20—30 tilka.

### Regulin (Helfenberg).

Agar-Agar 90, Extr. Casc. Sagrad. aquos. 10, Sacchari 20. Subst., tabl. 0,6 g. Kroonil. ja habituaalne kõhukinnisus. 1—3 k. p. 1 tee- kuni supilusika täis lisandina toidule või 1—2 k. p. 2—5 tabl.

### Renoform (Schering).

Neerupealise toimeaine. Renoform boric. mixt.: Acid. boric. 25, Sacchari lact. 75, Renoform. 0,08. Hemostaticum; nina- ja kurgulimanaha põletikkude raviks.

### Resorbin (IG).

Mandliõlist, vahast, želatiinist, seebist, lanoliinist ja veest valmistatud salviaalus.

### Reumatose (Medikon).

Chinin. salicylic. 5, Lith. salicyl. 50, Acetosali 940, Eucalyptoli 5. Tabl. 0,5 g. Antirheumaticum, analgeticum. 3 k. p. 1 tabl.

### Rheumasan (Reiss).

Methyl. salicyl. 2, Ac. salicylic. 8, Sapon. medicat. 25, Adip. lanae 15, Vaselin. flav. 50. Antirheumaticum, antarthriticum. Sissehõõrumiseks.

### Rheumatol „Ars“ (Ars).

Türgipipratinktuuri, rohelise seebi, sinepiõli, salitsüülhappe, kampri, kajeputi- ja tärpentiiniõli alkoholiline lahus. Antirheumaticum. Sissehõõrumiseks.

### Rhino-Fogyl (Chatelain).

Resorcini 1 g, Ol. Melaleucaae, Ol. Eucalypti ana 2 g, Mentholi 0,25 g, Sulf. colloidal. 1 g, Lanolini 3,75 g, Cerae 14 g, Vaselini 76 g. Salv nohu ja heinapalaviku vastu. 2—3 k. p. ninasõõrmeisse.

### Rhodan-Calcium Diuretin (Knoll).

Calcium-Diuretin. 0,5 g, Kal. rhodanat. 0,1 g. Subst., tabl. 0,6 g. Hüpertoonia ja apopleksia oht. 1. näd. 3 tabl. päevas, 2—3. näd. 2 tabl. päevas, 4—6. näd. 1 tabl. päevas veega peale sööki.

### Rhodapurin (Bad Homburg).

Theobrominum ammonio-rhodanatum. Valge, krist.,

hügrokoopne pulb. Tabl. 0,3 g = 0,133 g rodapuriini. Hypertonia, angina pectoris, klimakteerilised vaevused. 1—2 tabl. päevas.

#### Rhodarsan (UR).

Natr. dioxydiaminoarsenobenzol-methylenosulfoxylicum. Kuivampull. 0,15 g, 0,3 g, 0,45 g, 0,6 g, 0,75 g ja 0,9 g. Lues, ulcus molle, angina Plaut-Vincenti. Veenisisesi või nahaalusi analoogselt neosalvarsaanile.

#### Rhodine (UR).

Acid. acetylosalicylicum. Tabl. 0,5. Antipyreticum, analgeticum. 1—2 tabl. korraga.

#### Rhonnol (Leprince).

Pillid: Acid. nucleinic. 0,05 g, teraviljaekstrakti 0,01 g, Natr. methylarsinic. 0,001 g. Granulaat: Acid. nucleinic. 0,1 g, teraviljavalku 0,1 g, suhkrut 5 g. Tonicum. 4—6 tera või 2—5 teelusika täit päevas.

#### Dr. E. Richteri hommikueine taimetee (GL).

Fol. Sennae, Herb. Violae tricolor. ana 25, Fol. Rubi fruticos. 20, Fol. Theae sinens. 15, Herb. Asperul. odorat., Flor. Acaciae, Flor. Cyani ana 5. Lahvistav tee.

#### Rinool-nohuõli (GL).

Camphor. 0,094, Eucalyptoli, Mentholi ana 0,126, Trichlorbutylalcohol. 0,2, Paraffin. liquid. 20, Extr. Alcann. q. s. Rhinitis, laryngitis, pharyngitis. Instillatsiooniks.

#### Riodine (Astier).

Riitsinusõlihape joodglütseriinester. 20% J. Želatiinkapsl. 1 kaps. = 0,2 g KJ toimele. Joodiraviks. 2—6 k. p. 1 kaps. enne sööki.

#### Riopan (Byk).

Sisaldab ca. 45% ipekakuannaalkaloide kloorhüdraatidena. Pruunikas, vees kerg. lah. pulb. 1 g = 20 g droogi. Subst., tabl. à 0,0025 g alkaloide, aniisiõli lisandiga. Expectorans. 3—4 k. p. 1 tabl.

#### Rivanol (IG, Heyden).

Aethoxydiaminoacridinum lacticum. Kollane, peenkrist. pulb., aegl. lah. ca. 15 osas vees (22°). Subst., tabl. 0,1 g, rivanoletid à 0,092 g glükoosi ja 0,008 või 0,025 g rivanooli. Haavade desinfitseerimiseks, loput. stomatiidi, mastiidi, konjunktiviidi, angiina jne. pu-

hul. *Per os* amööbdüsenteeria ja imikute ning väike-  
laste kõhulahtisuse puhul. Lahustena 1:500—2000.  
Isotoonil. lahuse valmistamiseks 5% glükoosiga, kus-  
juures tuleb hoiduda NaCl lisamisest. Salvina 0,5—1%,  
puistepulbrina 2,5%, kliismaks 1:3000—5000. *Per os*  
meestele 0,025—0,05 g, naistele ja lastele 3 k. p. 0,025  
g, imikutele 2—4 k. p. 0,004—0,008 g.

#### Rodagen (AVCF).

Thyreodektomeeritud kitsede piimast valmist. pul-  
ber. 25 g = 500 ccm piima. Subst., tabl. 2 g. Morbus  
Basedovi. 2—3 näd. järgimööda 5—10 g päevas.

#### Rütgers.

Kollane, fenooli, kroomi ja fluoriühendeid sisaldav  
pulber. Tarvit. peamiselt puu immutusvahendina ma-  
javammi eest hoidumiseks.

## S.

#### Sagrada Barber (Apoth. z. h. G.).

Cascara Sagrada kuivekstrakt. Past. 0,5 g. Lah-  
tistaja. 1—3 past. korraga.

#### Sagrotan (Schülke).

p-Kloor-m-kresool ja kloorksüleenool seebilahuses.  
Helepruun vedelik. Desinfitseerimiseks. 0,5—5% la-  
husena.

#### Sajodin (IG).

Calc. monojodbehenicum. 25% J. Valge, lõhnatu,  
maitsetu pulb., vees ei lah. Subst., tabl. 0,5 g. Joodi-  
raviks, eriti luesi, arterioskleroosi, bronhiidi, emfü-  
seemi jne. puhul. 2—3 k. p., 0,5—1 g peale sööki.

#### Salacetol.

Atsetoolsalitsüülhappe ester. Valged kristallnõe-  
lad, lah. kuumas vees. St. 71<sup>d</sup>. Antirheumaticum, soo-  
leantiseptikum.

#### Salen (Ciba).

Salitsüülglükoolhappe metüülestrite ja etüülestrite  
segu. Õlitaoline vedelik. Antirheumaticum. Sisse-  
hõõrumiseks.

#### Salenal (Ciba).

33% saleen-salv. Antirheumaticum.

#### Salicain.

Methylum aminooxybenzoicum. K. n.: Orthoform.  
**Salicylohexamin.**

Hexamethylentetraminum salicylicum. K. n.: Saliformin.

**Salimenthol (Mor).**

Mentholum salicylicum. Värvitu, püdel vedelik, lõhnatu, magusa maitsega, vees ei lah. Antirheumaticum, soolteantiseptikum. 0,25 g 3—6 k. p., välisp. 15% salvina.

**Salipyrin (Riedel).**

Phenazonum salicylicum. Valge krist. pulb., lah. 250 osas külmas vees. St. 91—92<sup>0</sup>. Subst., tabl. 0,5 ja 1 g. Antipyreticum, analgeticum, antineuralgicum. 3 k. p. 0,5—1 g.

**Salit (Heyden).**

Borneolum salicylicum. Pruun õlitaoline vedelik, vees ei lah. Antirheumaticum, antineuralgicum. Sissehõõrumiseks. 33—50% õlilahusena.

**Salophen (IG).**

Acetyl-p-amidosalol. Valge krist. pulb., vees ei lah. St. 190<sup>0</sup>. Subst., tabl. 0,5 g. Antipyreticum, antineuralgicum, antirheumaticum. 3 k. p. 0,5 g.

**Salosantal.**

33,3% saloolilahus sandliõlis vähese hulga piparmündiõli lisandiga. Gonorröa, tsüstiit. 0,5 g mitu k. p. želatiinkapsleis.

**Salvarsan (IG).**

Dioxydiaminoarsenobenzol. Kollane, vees kerg. lah., väga valguse- ja hapnikutundlik pulb., ca. 30% As. Kuivamp. 0,05—3 g. Lues. Veenisisesi erieeskirja järgi.

**Salvysat (Ysat).**

Salveilehtede dialüsaat 1:1. Suukoopa desinfitseerimiseks, higistamise vastu. 3 k. p. 20—30 tilka, loput. 20 tilka klaasi vee peale.

**Salyrgan (IG).**

Naatrium-salitsüülallüülamiidatsetaadi ja elavhõbeda kompleksühend. 10% lahus 5%-ses teofüllinihahuses. Amp. 1 ja 2 ccm. Tugev diureetikum südameteede ödeemi puhul; myodegeneratio cordis, polyserositas, lues. Muskli- või veenisisesi 0,2—2 ccm ülepäeviti.

**Sanguinal (Krewel).**

Peamiselt hemoglobiinist ja veresooladest koosnevad pillid arseeni (igas pillis 0,0006 g  $\text{As}_2\text{O}_3$ ), letsiitini (0,025 g), kreosoodi (0,05 ja 0,1 g), joodi (0,004 g), kiniini (0,05 g), kvajakoolkarbonaadi (0,05 ja 0,1 g) ja ihtüooliga (0,05 g). 3 k. p. 2—3 tera.

**Sanguitonin (Ephag).**

$\text{NaCl}$  0,0984 g,  $\text{Natr. sulfuric.}$  0,0088 g,  $\text{Natr. phosphoric.}$  0,009 g,  $\text{Natr. bicarbon.}$  0,008 g,  $\text{Kal. chlorati}$  0,07 g,  $\text{Aq. dest. steril.}$  ad 2 ccm. Arterioskleroos, hüpertoonia, müokardiit, angina pectoris, asthma cardiale, glaukoom jne. Musklisisesi 2 ccm korruga.

**Santal Midy (Midy).**

Ol. Santali 0,25—0,3 g želatiinkapsleis. Gonorröa. 3—6 kapsl. päevas.

**Santal-Monal (Monal).**

Ol. Santali 0,12 g, Gurjunbals. 0,12 g, Ol. Cinnamonomi  $\frac{1}{2}$  gtt, Methylen. coerul. 0,03 g. Kapsl. Pöieantiseptikum. 4—10 kapsl. päevas.

**Santuben (Weiss).**

Tuberculin Koch 20 g, Guajacol. liq. 5 g, Camphor. 3 g, Ol. Rosmarini, Ol. Pini ana gtt X, Terr. silicic. 10 g, Eucerini ad 100 g. Tbc. raviks. Santuben tabl.: Guajacolum silicic. 0,3 g.

**Santyl (Knoll).**

Santaloolsalitsülaat. Helekollane, peagu lõhnatu ja maitsetu õli. Subst., kapsl. 0,4 g. Gonorröa ja selle tüsistused, tsüstiit, uretriit jne. 3 k. p. 25—50 tilka või 2 kapsl.

**Sapoform (Ephag).**

Liq. Formaldehydi saponatus, lõhnastatud lavandliõliga. Helekollane vedelik. Desinfitseerimiseks 1—2% lahuseana, loput. 1—2 supilusika täit 1 liitri vee peale.

**Sapoformal (Bengen).**

Liq. Formaldehydi saponatus. (Vrd. eelm.)

**Saposal (Vana apteek).**

Jodi puri, Camphorae ana 6 g, Acid. salicylic. 15 g, seepi 73 g, alkohol. 5 g. Tumepruun, vees lah. vedelik. Reuma, išias, neuralgil. valud. Sissehõõrumiseks.

**Saridon (Roche).**

Isopropylphenazoni 0,15 g, Acet-p-phenetidini 0,25 g, Sedormidi 0,06 g, Coffeini 0,05 g. Tabl. 0,6 g. Antidolorosum, antineuralgicum, antipyreticum. Vajaduse korral 1 tabl.

**Dr. Schweitzer's Pessarien** (Schweitzer).

Lamedad tahvlikesed, sisald. kiniini, tribroomnaftooli, boorhapet ja kakaovõid. Anticoncipiens.

**Scillaren** (Sandoz).

Merisibulast eraldatud glükosiid-toimeaine. Tabl. 0,8 mg, lahus (20 tilka = 0,8 mg), amp. (1 ccm = 0,5 mg). Cardiotonicum, diureticum südamenõrkuse puhul. 3—4 tabl. või 2—4 k. 20 tilka päevas, või veenisisesi 0,5—1 ccm.

**Scotts Emulsion** (Scott).

Ol. Jecoris Aselli 40%, Glycerini 3%, Calc. et Natr. hypophosphorosi ana 0,5%, Tragacanth. 1%, Ol. Amygdal., Cinnamom., Gaultheriae. Rahhiidi ja skrofuloosi puhul.

**Scurenaline** (UR).

Adrenaliinhüdrokloriidilahus 1:1000 füsioloog. lahuses.

**Secacornin** (Roche).

Sisaldab tungaltera ballastainevabu toimeaineid. Tilgad, amp. 1,1 ccm, tabl. 0,25 g. (1 ccm = 30 gtt = 4 tabl. = 4 g tungaltera). Verejooksud naissuguelundest, menstruatsiooni korratud. 0,5—1 ccm musklisesi või 15—30 tilka või 24 tabl. päevas.

**Secalysat** (Ysat).

Tungaltera dialüsaat 5% oksümetüülhüdrastiini lisandiga. Tilgad, amp. 1,1 ccm (20 gtt = 1 ccm = 4 g tungaltera). Hemostüptikum tungaltera asemel. 3 k. p. 10—15 tilka või 1 ccm intragluteaalselt.

**Sedicyl** (Wiernik).

Koliinester-preparaat. Tabl. 0,35 g. Klimakteeril. vaevused. 1—2 tabl. päevas.

**Sedobrol** (Roche).

Taimsed ekstraktained ja 55% naatriumbromiidi. Vürflid 2 g. Sedativum ja soolavaeseks dieediks neeruhaiguste, langetõve jne. puhul. 1—2—5 tk. päevas.

**Sedormid** (Roche).

Allylisopropylacetylcarbamiid. Valge krist. pulb., rask. lah. vees. St. 194<sup>0</sup>. Tabl. 0,25 g. Rahustav ja

mahe uinutav vahend, 2—3 k. p.  $\frac{1}{2}$ —1 tabl. või 1—2 tabl. õhtul.

**Seemne mahl (Remedia).**

Veise testiikleist valmistatud preparaat. Värvu-  
setu lahus. Toonikum. 20—30 tilka 2—3 k. p.

**Selectan (Schering).**

Oksüjoodpüridiin-naatrium. Lahustub vees (20°)  
4%. Lahus on püsiv ja steriilitav. 4% kollane lahus  
pud. 50, 100 ja 500 ccm. Vet. parenteraalselt strepto-  
ja diplokokkide infektsioonide, mastiidi, aktinomükoosi  
jne. puhul.

**Septamid-Streupulver (Heyden).**

Magnes., Talc. et Bol. alba cum 10% Chloramin-  
Magnes., Ol. Eucalypti ad odor. Desodorans, haavaanti-  
septikum.

**Selvadin (IG).**

Calcium-Natrium calcio-pyrocatechinsulfonicum.  
Amp. 10% (kollakas-roosa) lahus + 1% glükoosi. 1 ccm  
= 9 mg Ca. Kaltsiumraviks. 5—10 ccm muskli- või  
veenisisesi.

**Sidonal (VCW).**

Piperazinum chinicum. Valge krist. pulb., hapu  
maitsega. Antirheumaticum. 4—8 k. p. 1 g klaasi  
veega.

**Silargel (Heyden).**

Kloorhõbe-ränihappegel. 0,5% Ag. Lõhnatu, pea-  
gu maitsetu, valge pulb. vees ei lah. Seespidi adsor-  
bens seedehäirete puhul, rektaalselt kliismana soolte  
limanaha nakkuseliste põletikkude puhul, välispidi 10%  
salvina, puistepulbrina. Mitu k. p.  $\frac{1}{2}$ —1 teelusika täis  
veega.

**Silargetten (Heyden).**

Kummipastillid, sisald. 10% silargeeli. Suu ja  
kurgu desinfitseerimiseks. Mitu past. tunnis suus  
sulada lasta.

**Silber-Salvarsan (IG).**

Hõbedioksidiamiinoarsenobensooli dinaatriumühend.  
17,5—19,5% As, 12—13% Ag. Mustpruun pulb., kerg.  
lah. vees; väga õhutundlik. Kuivamp. 0,05 g, 0,1 g,  
0,2 g, 0,25 g, 0,3 g. Ka isokaksikampullides. Lues.  
Tarvit. erieeskirja järgi.

**Sileesia roheline.**

Roheline pulbrikujuline taimekaitsevahend, sisaldab vaskarsenaati.

**Silicol (Laves).**

Kolloidne ränihapevalk. 10% SiO<sub>2</sub>. Valge, maos mittelahustuv, sooltes kerg. lah. pulb. Subst., tabl. 0,6 g. Algav tbc, pleuriit, kroonil. liigesepõletik, skrofuloos, ekseemid jne. 3 k. p. 1—2 tabl. aegl. suus laguneda lasta.

**Sirolin (Roche).**

Pomerantsikoore siirup, sisaldav 10% tiokooli. 1 teelusika täis = ca. 0,5 g tiokooli. Expectorans. 2—6 teelus. päevas.

**Sirolin (Medikon).**

Kaaliumsulfokvajakolaadi (ca. 3%) siirup pomerantsikoore vedelekstrakti lisandiga. Expectorans. 3 k. p. 1 supilus. täis.

**Sirolin (Remedia).**

Ca. 6% tiokooli-siirup pomerantsikoore vedelekstrakti lisandiga. Expectorans. 3 k. p. 1 supilus. täis.

**Sirop de Blancard (Blancard).**

Jodi puri 1,225 g, Ferri limati 0,625 g, Sir. spl. 310 g. 1 supilus. täis = 0,1 g rauajodüüri. Kehvveresus, kloroos, skrofuloos. 1—3 lusika täit söögi ajal.

**Sistomensine (PB).**

Ovariaalhormoonpreparaat. Tabl. 0,0125 g, amp. 1,1 ccm (= 0,05 g õlis). Menstruatsiooni korratused, steriilsus, laktatsiooni häired. 3 k. p. 1—2 tabl. või 1—2 ccm päevas nahaalusi või veenisisesi.

**Sklerolsyrup (Mariatherma).**

Extr. Droserae 30, Silic. colloidal. 1, Sir. Aurant. 170. Arteriosclerosis. 3 k. p. 2 teelusika täit veega.

**Sloans Family Liniment (Sloan).**

Liniment. ammon. caust. 0,05 g, Ol. Sassafras aeth. 1 g, Methyl. salicyl. 1,33 g, Ol. Pini silv. 5,66 g, Ol. Camphor. 19,4 g, Ol. Terebinth. 34 g, Ol. Petrae crud. 37,66 g. Antirheumaticum. Sissehõõrumiseks.

**Sodener Mineralpastillen (Soden).**

Bad Soden'i allikavee soola pastillid, ka mentooli lisandiga. Solvens ülemiste hingamisteede katarride puhul.

**Solarson (IG).**

Ammoonium-heptiinkloorarsinaat 1% steriilses iso-

toonil. NaCl-lahuses. 1 ccm = 0,004 g  $As_2O_3$ . Amp. 1,2 ja 2,2 ccm. Kehvveresus, kloroos, leukeemia, Morbus Basedovi. Nahaalusi 1 ccm ülepäeviti.

### Solbar.

Rohekashall pulbrikujuline taimekaitsevahend, sisaldab baariumtetrasulfiiti.

### Solganal (Schering).

Sulfometüülamiino - auromerkaptobensool - sulfohape dinaatriumühend. 36,5% Au. Valge, valguse- ja õhutundlik pulber, kerg. lah. vees. Vesilahus kollakaspruun. Substantsina ampullides ja eriapullides lahustusainega: 0,01 g (+ 1 ccm füsioloog. NaCl-lahust), 0,05 g (+ 0,5 ccm Aq. dest.), 0,1 g (+ 1 ccm Aq. dest.), 0,25 g (+ 2,5 ccm Aq. dest.), 0,5 g (+ 5 ccm Aq. dest.), 1 g (+ 10 ccm Aq. dest.). Tbc, streptokokkide infektsioonid, skleroos, leepira. Veenisisesi, doosides individuaalselt.

### Solganal B (Schering).

Aurotioglükoos. Kollakas, vees neutr. reakts. kerg. lah. pulb. Subst. amp. samades annustes, nagu Solganal, samade lahustusainetega ja samaks otstarbeks. Musklisisesi või nahaalusi.

### Solganal B oleosum (Schering).

Soganal'i 2% ja 20% suspensioon ölis. Pud. 5 ccm, amp. 0,01 g, 0,05 g, 0,1 g ja 0,2 g. Näidust. ja tarvit. nagu solganaalil.

### Solubaine (Nativelle).

Ouabaine sol. 1:1000. Ouabaini 0,1 g, Alcohol. 95% 54 ccm, Glycerini 33 ccm, Aq. dest. 13 ccm. 50 tilka pakisele lisatud pipetiga = 1 mg uabaiini. Cardiotonicum. Individuaalselt arsti määramisel.

### Solurol (Clin).

Thümiinhape (tüümusnukleiinhape laguprodukt). Tabl. 0,25 g. Äge ja kroonil. jooksva, reuma, neuralgia, liigesepõletik, neerukivid, dermatoosid. Ägedail 6—8, kroonil. juhtudel 2—4 tabl. päevas.

### Solu-Salvarsan (IG).

Diatsetüülamiinooksüarsenobensool - naatriumglükolaat. Kollane pulb., kerg. lah. vees. Amp. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ccm 10% lahust. Tarvit. nagu salvarsaan, 2—3 k. näd. musklisisesi.

**Solveol (Heyden).**

Kresotiinnaatriumi abil valmist. 25% o-m-p-kreesoolide vesilahus. Pruun, püdel vedelik, lah. vees kuni 8%. Desinfitseerimiseks 2% lahuse, loomakärnade raviks 3—5% lahuse või salvina.

**Solvochin (Bad Homburg).**

Chinin. basicum 25% vesilahuses (pH = 7,2). Amp. 1 ja 2 ccm. Kopsupõletik, malaaria, väitenõrkus jne. 1—2 k. p. 0,5—2 ccm intragluteaalselt.

**Somnacetin (Weil).**

Natr. diaethylbarbituric. 0,3 g, Paraacetphenetidiini 0,25 g, Codeini phosphoric. 0,025 g. Tabl. 0,6 g. Rahustav, mahe uinutav ja valu vaigistav vahend. 3—4 tabl. päevas.

**Somnaethyl (Henning).**

Etüülkloriid vähese hulga kummeli- ja palderjani eeterl. ekstraktide ja eeterl. õlide lisandiga. Vinnataolise seadeldisega suletud klaaspudel, millest preparaati väljub udustatult või tilgakaupa. Narkoosiks, eriti hambaravil, operatsioonide toimetamisel suukoopas. Tarvit. ja doosimine nagu klooretüülil.

**Somnifen (Roche).**

1% barbitaali ja 1% allüülisopropüülbarbituurhappe dietüülamiinsoola sisaldav glütseriin-alkohoolne vesilahus. Pud. 12 ccm, amp. 2,2 ccm. Sedativum, hypnoticum. 20—40 tilka suhkruveega või 1—3 amp. muskli- või veenisisesi.

**Sophol (IG).**

Argent. formonucleinicum. 20% Ag. Kollakas, vees kerg. lah. pulb. Höbenitraadi asendaja blenorhoa neonatorum jne. puhul. 3—5% lahuse.

**Spton (Temmler).**

Natr. dichlorylsulfamidbenzoici 1 g, Acid. tartar. 10,5 g, Natr. bicarbon. 12 g, Sacch. lact., Amyli ana ad 100 g. Tabl. Anticoncipiens.

**Spirobismol (Bad Homburg).**

Kiniini, vismutjodiidi ja kaaliumnaatrium-vismutüültartraadi steriilne suspensioon happevabas oliivõlis. Pud. 10, 25, 40 ja 80 ccm, amp. 2 ccm. (1 ccm = 0,03 g Bi, 0,025 g J, 0,015 g kiniini). Lues. Intra-gluteaalselt 1—2 ccm.

**Spirocid (IG).**

Acid. oxyacetylaminophenylarsinicum. Valge, lõhnatu pulb., kerg. lah. vees. Tabl. 0,01 ja 0,025 g. Lues, framboesia, febris recurrens, angina Plaut-Vincenti, chorea etc. Tarvit. erieeskirja järgi.

**Spirosal (IG).**

Etüleenglükooli monosalitsüülester. Õlitaol. värvusetu vedelik, lah. u. 110 osas vees, 6 osas oliivõlis, kerg. alkoholis. 33,3% õlilahas. Antirheumaticum. Sissehõõrumiseks.

**Spuman (Luitpold).**

Bism. subgallic. 0,1 g, Thymoli 0,2 g, Hexamini 0,1 g, Alumin. aceticotartar. 0,7 g, Kal. borotartar. 32 g, Corpus spumans 66,9 g. Peale selle 5% piimhappe, 12,5% salitsüülhappe j. t. lisanditega. Naisuguelundite põletikuliste haiguste puhul. Tarvit. erieeskirja järgi.

**Staphylosan (SS).**

Autolüüsitud polüvalentne stafülokokkide vaktsiin. Amp. 20, 50, 100, 400, 600, 1000 milj. kokki 1 ccm-is. Pud. 5 ccm, 400, 1000 ja 3000 milj. kokki 1 ccm-is. Stafülokokkide tekit. nakkushaigused, furunkuloos, lokaliseeritud abstsessid, keskkõrvapõletik, osteomüeliit jne. Nahaalusi 3—4 süstet suurenevas kontsentratsioonis.

**Staphylo-Yatren (Behringwerke, IG).**

Polüvalentne stafülokokkide vaktsiin. 30—600 milj. kokki 2,5 ccm-is, 3% jatreenilahuses. Amp. 2,5 ccm suureneva kokkidearvuga, pud. 25 ccm, 50 milj. kokki 1 ccm-is. Ägedate ja kroonil. stafüloomükooside raviks. Muskli- ja veenisisesi.

**Stomin (Medikon).**

Rad. Rhei, Ol. Menthae, Ol. Foeniculi, Rad. Zingiber., Rad. Galangae, Rad. Valerianae, Cort. Cinnamonomi, Cort. Chinae succirubr., Magn. carbon., Rad. Genticianae, Natr. bicarbonic. Pulber seedimise korraldamiseks.

**Stovain (Poulenc).**

Dimetüülamiinobensoüül - etüülisopropüülalkoholi kloorhüdraat. Valge krist. pulb., kerg. lah. vees. St. 175°. Lahused on steriilitavad. Lokaalanestetikum. Tarvit. nagu kokaiin.

**Stovarsol (Spiess).**

Oksüatsetüülamiinofenüülarsiinhape. 27% As. Valge, lõhnatu pulb., vähe lah. külmas vees. St. üle 220°. Tabl. 0,01 g, 0,05 g ja 0,25 g stovarsooli. Amoebiasis, lambliaosis, helminthiasis, spirochaetosis, sypilis. 0,5—1 g pro die.

**Strepto-Yatren (Behringwerke, IG).**

Polüvalentne streptokokkide vaktsiin. 25—300 milj. kokki 2,5 ccm-is 3% jatreenilahuses. Amp. 2,5 ccm suureneva kokkidearvuga, pud. 25 ccm, 50 milj. kokki 1 ccm-is. Ägedate ja kroonil., streptokokkide põhjustatud haiguste raviks. Muskli- ja veenisisesi.

**Strontiuran (Weil).**

1 mol. strontsiumkloriidi ühend 4 moli karbamiidiga. 10% vesilahus amp. 5 ccm, tabl. 0,8 g. Verejooksud, rasedate oksendamine, postoperatiivse pneumonia profülaksiks jne. 5—10 ccm veenisisesi või 3—4 k. p. 1 tabl.

**Strophantose (Güstrov).**

G-strofantiini lahus 20%-lises steriilses invert-suhkrulahuses. Amp. 10 ccm (I = 0,25 mg, II = 0,5 mg strofantiini). Cardiotonicum. Veenisisesi.

**Stypticin (Merck).**

Cotarninum hydrochloricum. Kollane, hügrokoopne, kerg. vees lah. pulber. Subst., tabl. 0,05 g. Hemostüptikum emakaverejooksude, verise kõhulahtisuse, neeru ja põie verejooksude jne. puhul. 3—4 k. p. 0,05—0,1 g.

**Styptol (Knoll).**

Cotarninum phthalicum. Kollane, krist. pulb., väga kerg. lah. vees. Subst., tabl. 0,05 g. Hemostaatikum eriti emakaverejooksude puhul. Sedativum menstruatsiooni korratuste, pollutsioonide, enuresis nocturna puhul. 3—4 k. p. 2—3 tabl. tervelt alla neelata.

**Styracol (Knoll).**

Guajacolum cinnamylicum. Valge krist. pulb., ei lah. vees. St. 142°. Subst., tabl. 0,5 g. Expectorans, anti diarrhoicum. 3—4 k. p. 1 g.

**Subcutin (Ritsert).**

Anaesthesinum p-phenylsulfonicum. Valge krist. pulb., lah. külmas vees 1%. St. 195,6°. Anesteetikum. Tarv. nagu anestesiini.

**Sufrogel (Heyden).**

Peendispergitud väävli 0,3% suspensioon 10%-ses želatiinilahuses. Amp. 1 ja 5 ccm. Kroonil. liigese-põletik, liigesejooksua, isias, akne, hüpertoonia. Musk-lisisesi 0,2—0,3 ccm.

**Sulfidal (Heyden).**

Sulfur colloidal, ca. 75% S. Kollakas, vees kol-loidselt lahustuv pulber. Nahahaiguste väävliraviks. 1—10% vesilahusena, 5—20% salvina.

**Sulfocol siirup (Ephag).**

Sirup. kal. sulfoguajacolic comp. 6% Kal. sulfo-guajac. Hingamisteede katarrid, köha, pneumonia, bronhiit. 3—5 supilus. täit päevas.

**Sulfoderm (Heyden).**

1% väävlit ultramikroskoopes peenuses adsorbi-tud Bolus alba'le. Akne ja taolised nahahaigused. Puudrina.

**Sulfoform (Kaufmann).**

Trifenüülstibiinsulfiid. Valge, lõhnatu krist. pulb., vees ei lah. St. 119—120°. Nahahaiguste raviks. 5—25% õlilahusena või salvina.

**Sulfosot-Syrup (Roche).**

Siirup, sisaldav 150 grammis 15 g sulfosooti (Kal. sulfocresotic.) = 10 g kreosooti. Expectorans. 3—4 teelusika täit päevas.

**Sulfotreparsenan (Comar).**

Natr. dioxydiaminoarsenobenzol-methylensulfoni-cum. 20% As. Amp. 0,02—0,6 g. Lues, trypanoso-miasis, amoebiasis, malaria, febris recurrens, angina spirochaeto-bacillaris etc. Veeni- või musk-lisisesi suu-renevais annustes 0,02—0,6 g igal 5. päeval.

**Sulfoxyl-Salvarsan (IG).**

Natr. p-arsenophenoldimethylaminopyrazolon-me-thylensulfoxylic. 5% isotoonil. steriilse lahusena. Kuivaines 17,5—18,5% As. Kollane, omapär. väävli-taol. lõhnaga vedelik. Amp. 8, 10 ja 12 ccm. Lues. Tarvit. erieskirja järgi.

**Suprarenin (Heyden, IG).**

l-o-Dioksüfenüületanoolmetüülamiin, loomulik või sünteetil. saadud vasemale pöörav neerulealise (gland. suprarenal.) toimeaine. Väga rask. lah. vees, kerg. lah. lahj. happeis. Subst. klaastorudes 0,05 ja 1 g.,

tabl. 0,001 g, amp. 0,5 ja 1 ccm (1:1000) ja pud. 5, 10 ja 25 ccm (1:1000). Verejooksude sulgemiseks; südamel ja veresoonte kollaps, postoperatiivne šokk, päikesepiste, astma, verikõhimine, mao- ja sooleverejooksud. Nahaalusi 0,2—1 ccm (1:1000), veenisisesi 0,5—1 ccm (1:1000) 500 ccm-is 0,9% keedusoolalahuses (infusiooni kestvus 2—3 tundi.), per os 10—20 tilka (1:1000) või ½—1 tabl.

#### Supurorenin (Ephag).

I. Gland. suprarenal. sicc. Kurrot 0,15 g, Camphor. monobrom. 0,15 g, Urotropin. 0,15 g, Extr. Valerian. 0,05 g.

II. Gland. suprarenal. sicc. Kurrot 0,05 g, Camphor. monobrom. 0,15 g, Acetphenetidin. 0,15 g, Urotropini 0,15 g, Extr. Valerian. 0,05 g.

III. Gland. suprarenal. sicc. Kurrot 0,05 g, Camphor. monobrom. 0,15 g, Acetphenetidin. 0,15 g, Natr. bromat. 0,15 g, Extr. Valerian. 0,05 g. Lähemad andmed otstarbe ja tarvit. kohta puuduvad.

#### Sügelin (Medikon).

0,5% salitsüülhapet, 2,5% naftaliini, 2% kreoliini, 5% väävlit ja kasetõrva sisald. salv. Tuub 25 g. Sügeliste raviks.

#### Synthalin (Schering).

Dekamethylendiguanidinum dihydrochloric. Draž. 0,01 g. Diabetes mellitus. 0,01—0,03 g päevas.

#### Synthalin B (Schering).

Dodekamethylendiguanidinum dihydrochloric. Draž. 0,005 g. Diabetes mellitus. Tarvit. eriskeemi järgi.

#### Syrgol (Siegfried).

Kolloidne hõbeeksüüd. Mustad läikivad lehekesed, aegl. lah. vees. 20% Ag. Gonorröa. 0,1—0,4% lahustena.

## T.

#### Tamar Indien Grillon (Grillon).

Pulpae Tamarindor. 3,25 g. Fol. Sennae pulv. 0,75 g. Vanilli ja sidruniõliga lõhnastatud pastillid 4 g. Lahtistaja. Öhtul 1 pastill.

#### Tamin (GL).

Pulp. Tamarindor. 12 g, Extr. follicul. Sennae

1,8 g, Extr. cort. Frang. examarat. 3 g. Pastillid à 2,5 g. Lahtistaja. 1—3 k. p. 1 pastill.

**Tannalbin (Knoll).**

Tanninum albuminatum. Pruunikas, lõhnatu, maitsetu pulb., väga rask. lah. vees. Subst., tabl. 0,5 g. Kõhulahtisus. Mitu k. p. 0,5—1,5 g.

**Tannalbumin.**

Albuminum tannicum, tanninum albuminatum. K. n.: Tannalbin.

**Tannigen (IG).**

Diatsetüültanniin. Kollakashall, peagu maitsetu ja lõhnatu pulb., vees rask. lah. Subst., tabl. 0,5 g. Adstringens, antidiarrhoicum. 2—4 k. p. 0,5 g.

**Tannismut (Heyden).**

Bismutum bitannicum. 22% Bi. Kollakashall, hapukasmõru pulb., vees ei lah. Subst., tabl. 0,5 g. Adstringens, antidiarrhoicum. 3—5 k. p. 0,5—1 g.

**Tannobromin (IG).**

Dibroomtanniini ja formaldehüüdi ühend. Punakas, vees peagu mitte lah. pulb. 30% Br. Külmamuhkude raviks; juuste väljalangemise puhul. 3—10% alk. lahusena või salvina.

**Tannoform (Merck).**

Metüleenditanniin. Pruunikas, lõhnatu, maitsetu pulb., vees ei lah. Soolteadstringens, haavade raviks. Seespidi 0,1—1 g, välisp. *per se* või 20% salvina või talkpuudrina.

**Tannyl (Gehe).**

Oksükloorkaseiintannaat. Kollakaspruun, lõhnatu, maitsetu pulb., vees ei lah. Nõrgas leelises (sooltes) laguneb oksükloorkaseiiniks ja parkhappeks. Subst., tabl. 0,3 g. Antidiarrhoicum. 3—4 k. p. 0,3—1 g.

**Targesin (Goedecke).**

Kolloidne diatsetüültanniinhõbeda valguühend. 6% Ag. Vees kerg. lah. pruun pulb. Antigonorrhhoicum. 1—2% lahus süstimiseks.

**Taxol (Lobica).**

Mucosae intestin. pulv. 0,05 g, Extr. Bilis 0,1 g, Agar-agar 0,05 g, Ferment. acid. lactic. 0,05 g. Tabl. 0,025 g. Kõhukinnisuse füsioloogil. raviks 1—6 tabl. päevas.

**Tenosin (IG).**

Sünteevil. valmist. tungaltera toimeaine, p-oksüfenüületüülamiin ja imiidasooletüülamiin. Vedelik (2% lahus), tabl. 0,1 g (= 0,01 g), amp. 1,2 ccm. Emakaverejooksude puhul. 3 k. p. 15—20 tilka või 1 tabl. või nahaalusi või intragluteaal. 1 ccm.

**Termogen (Karlova apteek).**

Bol. alb. steril., Glycerin. pur. ana 500 g, Aq. dest. 50 g, Ac. salicylic. 1 g, Acid. boric 1,5 g, Tinct. Jodi 5 g, Methyl. salicyl. 1 g, Ol. Eucalypti, Ol. Menthae ana 0,5 g. Igasuguste põletikuliste haiguste: hingamisteede põletikkude, kurgupõletiku, kopsupõletiku, kopsukelmepõletiku, rinnanäärmepõletiku, munandite-põletiku, munasarjapõletiku, põiepõletiku, kõhukelmepõletiku, jooksja, išiaase, luupõletiku, paisete, roosi, kõrvapõletiku, angiina jne. puhul. Kuumade mähistena erieeskirja kohaselt. Jahedate mähistena põletushaavade ja päikesepõletuse puhul.

**Terpichin (Östreicher).**

Ol. Terebinth. bisrectific. 15%, Chinini, 0,5%, Anaesthesini 0,5%, Ol. Olivar. 84%. Amp. 1 ccm. Nakkusliste nahahaiguste, näärmepõletikkude, furunklite, gonorröa jne. puhul intragluteaalselt.

**Testifortan (Promonta).**

Sisaldab testes, paratestes, vesicula semin., prostata, gland. supraren., ajuripatsi esisagara hormoone ja toniseerivaid aineid. Draž. ja amp. 2 ccm. Impotents, seksuaalneurasteenia, vananemishäud. Ülepäeviti 2 ccm nahaalusi või muskklisisesi ja samal ajal 3 k. p. 2 tabl.

**Testiglandol (Roche).**

Testes-ekstrakt ja kuivaine. Amp. 1,1 ccm, tabl. 0,35 g. 1 amp. = 1 tabl. = 4 g värsket nääret. Impotents, seksuaalneurasteenia, senilitas praecox. 1—3 süst. või 3—5 tabl. päevas.

**Testiphorin (Schering).**

Härja munandite kuivaine. Tabl. 0,3 g nääret. Impotents, seksuaalneurasteenia, suhkruta liigkusesus. 3 k. p. 1—2 tabl.

**Testogon (Henning).**

Iga tabl. sisaldab kuivainet 1 grammist värsk. munandist, 0,2 g värsk. neerupealisest, 0,1 g ajuri-

patsist, 0,003 g johimbiini ja 0,05 g kaltsiumhüfosfiiti. 1 amp. sisaldab 1 ccm-is samu aineid ilma kaltsiumhüfosfiidita füsiol. keedusoolalahuses. Panaceum meestele.

#### **Tetrophan** (Riedel).

Acid. dihydronaphtacridinmezocarbonic. Tabl. 0,1 g. Paralysis, ataxia; tõstab tundeerkude vastuvõtlikkust. 2 k. p.  $\frac{1}{2}$ —1 tabl. Dos. maxima 0,3 g *pro die!*

#### **Theacylon** (Merck).

Theobromin. acetylosalicylic. Valge krist. pulb., vähe lah. vees. St. 195<sup>0</sup>. Subst., kapsl. 0,25 (lah. peensooles), tabl. 0,5 g. Diureticum. 2—3 k. p. 0,5—1 g.

#### **Thelygan** (Henning).

Iga tabl. sisaldab kuivainet 1 grammist värskest munasarjast, 0,2 g värsk. neerupealisest ja 0,1 g ajuripatsist, 0,003 g johimbiini ja 0,05 g kaltsiumhüfosfiiti. 1 amp. sisaldab 1 ccm-is samu aineid ilma kaltsiumhüfosfiidita füsiol. keedusoolalahuses. Panaceum naistele.

#### **Theobromsal.**

Theobromino-natrium salicylicum. K. n.: Diuretin.

#### **Theominal** (IG).

Theobromini 0,3 g, Luminali 0,03 g. Tabl. 0,33 g. Spasmolüütikum ja korrastav vahend stenokardia, hüpertoonia jne. puhul. 2—3 k. p. 1 tabl. veega.

#### **Thigenol** (Roche).

Süntetil. valmist. sulfoöli naatriumisool, sisald. ca. 10% S. Pruun siirupitaol. vedelik. Tarvit. nagu ihtüool.

#### **Thiocol** (Roche).

Kalium sulfoguajacolicum. Valge, mõru, krist. pulb., lah. vees 1:8. Expectorans. 3 k. p. 0,5—1 g.

#### **Thioform.**

Bismut. dithiosalicylicum basicum. Kollakaspruun, lõhnatu pulb., vees ei lah. Mao- ja soolekatarri, välisp. haavade raviks. 0,2—0,5 g 2—3 k. p.

#### **Thiol** (Riedel).

Sulfureeritud ja sulfoonitud mineraalöli. T. liquidum: must, püdel vedelik, 18% kuivjääki, kerg. lah. vees. T. siccum: pruun pulb., aegl. lah. vees. Tarvit. nagu ihtüool.

**Thymoferrol (Ephag).**

Gland. Thym. sicc. Kurrot 0,1 g, Calc. glycerophosph. 0,1 g, Ferr. jodat. 0,02 g, Ferr. lactic. 0,1 g. Tabl. 0,32 g. Üldvaimline ja füüsil. kängujäämine, loidus ja apaatia lastel, skrofuloos, rahhiit, nõrkus, kehvveresus. 6 kuu—1 a. vanustele lastele  $\frac{1}{4}$  tabl., 1—8 a.  $\frac{1}{2}$  tabl., üle 8 a. l. 1 tabl. 3—4 k. p. piimaga.

**Thymophysin (Chemosan).**

Harknäärme ja ajuripatsi tagumise sagara ekstrakt. Amp. 0,6 ja 1,1 ccm = 6 ja 10 Vögtlin-ühikut. Väitenõrkus. 1 ccm intragluteaalselt, toime möödumisel võib korrata.

**Thymus-Opton (Merck).**

Kunstl. seedimise varal harknäärmest valmist. preparaat. Amp. 1 ccm = 0,06 harknäärmesubst. Harknäärme alategevuse puhul.

**Thyraden (Knoll).**

Sea kilpnäärmest valmist. preparaat. 1 g = 0,7 mg J = ca. 2 g värsk. nääret. Tabl. 0,15 g. = 0,0001 g J. Kilpnäärme alategevuse põhjustatud haiguste puhul. 1—3, hiljem 3—6 tabl. päevas.

**Thyreoglandol (Roche).**

Kilpnäärme kuivaine. Tabl. à 0,35 g = 0,3 g värsket nääret = 0,1 mg spetsifil. seotud J. Adipositas, myxoedema, infantilismus, struma etc. 1—3 tabl. päevas.

**Thyreoidin (Merck).**

Gland. Thyreoid. siccata. Subst., tabl. 0,1 g (= 0,5 g värsk. nääret) ja 0,3 g (+ 0,3 g soodat). Hypothyreosis, myxoedema, adipositas etc. Kuni 1 g päevas.

**Thyreototal (Lill).**

Kilpnäärme standarditud kuivsubstants. T. mite: 1 tabl. = 0,25 hiireühikut; T. med.: 1 tabl. = 0,75 hiireühikut. Myxoedema, cretinismus etc. Erieeskirja järgi.

**Thyrolitin (Ephag).**

Gland. thyreoid. sicc. Kurrot 0,1 g, Camph. monobrom. 0,15 g, Urotropini 0,15 g, Lith. carbonic. 0,15 g, Extr. Valerianae 0,15 g. Tabl. 0,7 g. Podagra, kroonil. reuma, liigesepõletik, rasvastus, müksödeem, neuralgia jne. 2—3 tabl. päevas peale sööki  $\frac{1}{4}$  kl. veega.

**Thyroxin (Roche).**

Kilpnäärme spetsiifil. hormoon, valmist. sünteetil., dijoodfenüülamiinopropioonhape, ca. 65,3% J. 1 mg = ca. 0,2 g kuiva näaret. Tabl. 1 mg, amp. 1,1 ccm = 1 mg. Adipositas, myxoedema, oliguria etc. Alates 4 tabl., suurendada annust kuni 8—10 tabl. päevas, või 1—2 ccm päevas nahaalusi, muskli- või veenisisesi.

**Thyroxin (Schering).**

Kilpnäärme sünteetil. hormoon, dijoodtürosiini dijoodoksüfenüülester. 65,3% J. Tabl. 0,25 g = 1 mg ja 0,3 mg ning amp. = 1 mg. Hypothyreosis. 2—8 mg päevas.

**Tillantin (IG).**

Tillantin B: 5% As, 42% vasesulfaati, 52% vaiksoola, 1% värvi. Tillantin C: 5% As, 10% vasekloriidi, 84% vaiksoola, 1% värvi. Pakised 50, 100, 250, 500 g. Hallikasroheline pulb., kerg. lah. vees. Taimekaitsevahend teravilja puhtimiseks.

**Tiodine (Cognet).**

Tiosiinamiinetüüljodiid. 46,5% J. Valge krist. pulb., kerg. lah. vees. St. 68—71°. Pillid 0,1 g, amp. 1 ccm (10% ja 20% lahus). Kroonil. reuma, skleroos, emfüseem, seljataabes. 2 k. p. 0,1 g või 1 ccm nahaalusi.

**Titretta analgica (Grünau).**

Codeini, Narcotini ana 0,02 (0,03) g, Amidopyrini 0,2 (0,3) g, Theobromini 0,05 (0,075) g. Tabl. Analgeticum.  $\frac{1}{2}$ —1 tabl. 3—4 k. p.

**Togal (Kuik).**

Acid. acetylosalicyl. 71,25 g, Acid. citric. 1,02 g, Chinin. tannic. 2,65 g, Lith. salicylic. 10,9 g, Amyli 10,49 g. Tabl. 0,33 g. Antineuralgicum, antipyreticum, antirheumaticum. 1—3 tabl. 3 k. p.

**Tonicum Roche (Roche).**

Siirupitaol. vedelik, mille 5 ccm sisaldab 5 mg naatriumallüülarsinaati, 185 mg naatriumbifosfaati, 0,16 mg strühnosealkaloide, 1 mg manganit ja 1 g magustatud koolaekstrakti. Tonicum. 1—2 teelus. täit söögi ajal, lastele vastavalt vähem.

**Tonicum 1422 (Rae apteek).**

(Liquor Colae comp. c. strychno et arseno.) Nuc. Colae 4 g, Cort. Chin. 1 g, Extr. Maltis 5 g, Calc. glycerophosph. 4 g, Natr. glycerophosph. 1 g, Extr. Stry-

chni spir. 0,06 g, Liq. Fowleri 0,04 g, Mangani 0,02 g, Corrigent. et sirup. ad 120 g. Tonicum. 3 k. p. 1 teelusika täis.

**Tonocard** (Lill).

Püridiin- $\beta$ -karboonhappe dietüülamiidi 0,25 g, Corrigent. q. s., Aq. dest. ad 10 g. Pud. 10 ccm. Analepticum, stimulans vereringe ja hingamise häirete puhul. Tarbekorral 1 ccm veega.

**Tonophosphan** (IG).

Naatriumdimetüülamiinometüül - fenüülfosfinaat. 11% P. Amp. 1 ccm 1% lahust ja (fortius) 2% lah. Väsimus- ja nõrkusseisundid, eriti peale nakkushaiguste. 1 ccm nahaalusi või muskklisisesi.

**Toponal**.

Alcaloida Opii hydrochlorata. K. n.: Nealpon, Pantopon, Pavopin.

**Transannon** (Gehe).

Calc. lactic. 0,6 g, MgO 0,02 g, Ol. Salviae 0,001 g, Extr. Aloës 0,025 g, Calc. sulfoichthyolic. 0,04 g, Acid. citric. 0,07 g, Alumin. 0,005 g. Alumiiniumiga kaetud dražeed. Klimakteer. vaevused, liigesepõletik jne. 3 k. p. 2, hiljem 1 tabl.

**Transargan** (Henning).

Natrium-Argentum thiosulfuricum. Valge, vees lah. pulber. 32% Ag. Antigonorrhoeicum. 0,1—2% lahuseks.

**Transpulmin** (Bad Homburg).

Chinini 3 g, Camphor. 3 g, Ol. Menthae 10 g, terpeene 20 g, Ol. Olivar. ad 100 g. Bronhiit ja teised hingamisteede haigused. Süstimiseks.

**Treparsénan** (Comar).

Dioksüdiamiidarsenobensooli dikloorhüdraat. Amp. 0,1—0,6 g. Lues, trypanosomiasis, amoebiasis, malaria, febris recurrens. Veenisisesi 0,1—0,6 g, kordkorralt suurendades annust igal 5. päeval.

**Trépol** (Trenaude).

Kaal. ja naatr. tartrovismutaat maapähkliolis suspensioonis. Amp. 3 ccm = 0,3 g trepooli. Lues. Muskklisisesi 3 ccm igal 3-dal päeval.

**Treposan** (Chatelain).

Bismut. succinici 0,3 g, Ol. Olivar. steril. ad 3 ccm Amp. 3 ccm. Lues. Muskklisisesi.

**Tricalcol (Laves).**

Kolloidne lubja-valkfosfaat. 11% Ca, 10% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. Valge, maitsetu, maos lahustumatu, sooltes kerg. lah. pulb. Subst., tabl. 0,45 g. Ca- ja P-puudus raseduse ja imetamise ajal, kasvuedendamiseks lapseas, neurasteenia puhul jne. 3 k. p. 3—4 tabl.

**Triferrin (Knoll).**

Ferrum paranucleinicum. 16% Fe, 2,5% P. Kollakaspunane maitsetu pulb., vees ei lah. Subst., tabl. 0,3 g. Roborans. 3 k. p. 0,3 g peale sööki.

**Trigemin (Heyden, IG).**

Amidopüriin-butüülkloraalhüdraat. Valge krist. pulb., lah. 65 osas vees ja 2 os. alk. St. 82—84<sup>0</sup>. Subst., tabl. 0,25 g ja kapsl. 0,25 g. Analgeticum eriti hambavalu puhul. 1—3 k. p. 0,5 g. Pruunikaks muutunud preparaati mitte tarvitada!

**Trikresol (Schering).**

Peamiselt kolmest isomeersest (o-, m-, p-) kresolist koosnev puhas kresool, vesiselge vedelik. Kt. 185—205<sup>0</sup>. Desinfitseeriv vahend naha- ja juukstehaiguste puhul.

**Triomalt (GL).**

Nisu- ja rukkipeetist eril. menetl. valmist. diastaa-sitid jahu, millele lisatud anorg. sooli. Sisaldab rasva 0,73%, süsivesikuid 77%, valku 10%, tselluloosi 0,21%, vett 7,85%, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 0,53%. Dieteetiline vahend. Tarvit. erieeskirja järgi.

**Triphal (IG).**

Natr. aurothiobenzimidazolcarbonicum. Helekollane, vees ja glütser. kerg. lah. pulb. 44% Au. Kuiv- ja isokaksikampullid 0,001 g, 0,0025 g, 0,005 g, 0,01 g, 0,025 g, 0,05 g, 0,1 g. Tbc, lupus erythematodes, lupus vulgaris. Tarvit. erieeskirja järgi.

**Tropacocain (Merck).**

Benzoylpseudotropein. Valge krist., väga kerg. vees lah. pulb. St. 271<sup>0</sup> (laguneb). Lokaalanesteetikum. 5—10% lahusena.

**Trophil (SS).**

Kaltsium-monometüülarsinaadi isotoonil. lahus. Amp. 1 ccm = 0,015 g As ja 0,004 g Ca, ka 0,0001 g strühniinnitraadi lisandiga. Tonicum. 1 ccm nahaalusi.

**Trypaflavin (IG).**

Diamiinometüülakridiinkloriid. Punakaspruun pulb., kerg. lah. vees ja glütser. Subst., tabl. 0,1 g (välispid. lah. valmistamiseks), amp. 5 ja 10 ccm (0,5% ja 2% lahus). Antiseptikum haavade pesemiseks ja nugiliste tekitatud nahahaiguste puhul; septil. haigused, nagu entsefaliit, meningiit, lapsevoodipalavik, endokardiit, gonorröa jne. Veenisisesi 5—20 ccm 0,5—2% lahust, väliselt 5% puudrina või 2% salvina; loput. ja pesem. 1:1000. (Vrd. Panflavin, Trypasol).

**Trypasol (Ephag).**

Diamiinometüülakridiinkloriidi 0,003 g, boroheksamiini 0,05 g, mentooli 0,0002 g, eukalüptooli 0,00005 g, mass. q. s. ad tabl. 0,5 g. Kurgu ja suukoopa desinfitseerimiseks nakkushaiguste ajal ja profülaksiks. Iga 1—2 tunni järgi 1 tabl. suus aegl. imeda.

**Tsinknaftalaansalv (Lõvi apteek).**

ZnO, Naftalan. ana part. aequal. Hall salv tuubides. Ekseemide ja nahahaiguste raviks.

**Tsitrovanilliin Ephag (Ephag).**

Amidopyrini 1 g, Acid. citr. 0,1 g, Sem. Colae 0,02 g, Vanillini 0,03 g, Sacch. lact. 0,3 g, Sacch. alb. 2 g. Pulbr. 1 g. Peavalu, migreen, neuralgil. valud. 2—3 k. p. 1 pulb.

**Tumenol (IG).**

Ihtüoolile analoogne preparaas, pruunmust siirupitaol. vedelik.

**Tussol (IG).**

Antipyrinum cinnamylicum. Valge krist. pulb., lah. vees 6%. St. 52—55°. Läkaköha, bronhiit. 0,05—0,5 g 3—4 k. p.

**Tutan.**

Tumerohekashall pulbrikujuline taimekaitsevahend teravilja puhtimiseks. Sisaldab elavhõbedat.

**Tutocain (IG).**

p - Amiinobensoüldimetüülamiino - metüülbutanoolkloorhüdraat. Vähe kollakas krist. pulb., kerg. lah. vees. St. 213—215°. Lahused on steriilitavad. Subst., kuivamp. 0,075 g; tabletid: T I. 0,05 g + 0,000125 g supra-  
ren., T II. 0,1 g, T III. 0,5 g, T VIII — 0,02 g + 0,0001 g supr.; ampullid: T IV — 2 ccm, 0,2% + 0,00001 g supr., T V — 2 ccm, 0,75% + 0,000075 g supr., T VI

— 2 ccm, 1% + 0,000075 g supr., T IX — 1 ccm, 1% + 0,0001 g supr. Lokaalanesteetikum eriti lumbaalanesteesiaks. Infiltrats.-anesteesiaks 0,2% + supra-reen., juhtivusanesteesi. 0,5—1% + supr., lumbaalanest. 1—1,5—2% + supr., limanahaanest. 3—5% + supr.

## U.

### Umbrenal (Schering).

Lithium jodatum'i 25% steriilne lahus. Amp. 12 ccm (lämmastiku atm.). Püelograafiaks. 12 ccm pro dosi.

### Uden (IG).

Standarditud ovariaalhormoon-preparaat. Dražeed 100 hiireühikut, lahus pud. 10 ccm (1 ccm = 200 HÜ), amp. 2 ccm (1 ccm = 100 HÜ). Klimakteeril. vaevused, menstruatsiooni korratud. Keskmiselt 300 HÜ päevas.

### Urania roheline.

Roheline pulbrikujuline taimekaitsevahend, sisaldab vaskarsenaati.

### Urazine (UR).

Piperazinum citrosalicylicum. Valge, krist., vees lah. pulb. St. 190<sup>0</sup>. Tabl. 0,3 g ja 10% kihisev granaulat. Neeru- ja põieantiseptikum, reuma. 3—4 tabl. või 2 teelus. täit päevas.

### Ureabromin (Gehe).

Kaltsiumbromiidkarbamiid. 36% Br. Valge, mõru, vees kerg. lah. hügrokoopne pulb. St. 186<sup>0</sup>. Subst., tabl. 1 g. Sedativum, antiepilepticum, broomsoolade asendajana. 3—4 k. p. 0,1 g. Epilepsia puhul kuni 4 k. p. 2 g.

### Uresan (Lill).

Piperazinum citrosalicylicum. Tabl. 0,3 g. Antirheumaticum. 3 k. p. 1 tabl. veega.

### Uresan sal effervescens (Lill).

Piperazin. citrosalicylic. 4 g, Lith. benzoic. 2 g, Hexamini 6 g, Natr. citric. 5 g, Natr. phosphor. 5 g, Sacch. alb. 3 g, Ac. tartar. 40 g, Natr. bicarbon. 44 g. Antirheumaticum. 2—3 k. p. 1 teelus. täis klaasi veega.

### Uricedin (Stroschein).

Sidrunimahlast valmistatud naatriumtsitraati 36,94%, naatriumsulfaati 54,88%, NaCl 2,5%, Naat-

riumatsetaati 1,28%, naatriumtartraati 1,5%, rauda 0,045%, ekstraktaineid 2,86%. (Koostis kõikuv!) Lah-  
tistav vahend. 2—3 k. p. 1 teelusika täis klaasi veega.

#### Urodonal (Chatelain).

Piperazini chinici 6 g, Methylglyoxalidini 8 g, Hexamini 0,5 g, Natr. benzoic. 2,5 g, Lith. benzoic. 2 g, Natr. phosphoric. 10 g, Natr. bicarbonic. Acid. tartaric. ana q. s. ad 100 g. Granulaat. Reuma, išias, hüperatsiditeet, põie-, neeru- ja sapikivid. 3—4 k. p. 1 tee-  
lus. täis 1 klaasi veega.

#### Urolith (GL).

Piperazini 0,5 g, Lith. carbonic. 1,25 g, Natr. phos-  
phoric. 5 g, Hexamini 2,5 g, Ac. tartar. Natr. bicarbon.  
ana 20 g. Reuma, podagra, arterioskleroos, neeru- ja  
sapikivid jne. 3—4 k. p. 1 teelusika täis klaasi veega.

#### Uronovar (Heyl).

Hexaminum methylenodiphosphoricum. Valge, vees  
kerge lah. pulb. Tabl. 0,5 g. Põieantiseptikum tsüstiidi,  
püeliidi, püelonefriidi jne. puhul. 3—4 k. p. 1—2 tabl.  
klaasi veega.

#### Uropherin.

U. benzoicum: Theobrominlithium-Lithium ben-  
zoicum; U. salicylicum: Theobrominlithium-  
Lithium salicylicum. Valge pulb., lah. vees 1:5. Diu-  
reticum. 3—4 g päevas.

#### Uroselectan (Schering).

Oksüjoodpüridiin - N - äädikhappe naatriumühend.  
42—43% J. Valge, vees kerge lah. pulb. Kontrastva-  
hend püelograafiaks. Veenisisesi.

#### Uroselectan B (Schering).

Dijoodpüridoksüül - N - metüüldikarboonhappe di-  
naatriumühend. 51,5% J. Veet kerge lah. Amp. 20  
ccm = 15 g ainet, 10% invertsuhkrulahuses. Kontrast-  
vahend püelograafiaks. 20 ccm veenisisesi.

#### Urosin (Zimmer).

Lithium chinicum. Valge, krist., hügrokoopne  
pulb., väga kerge lah. vees. Tabl. 0,5 g ja 50% vesi-  
lahus. Antarthriticum. 6—10 tabl. või 6—10 g lahust  
päevas.

#### Urotropin (Schering).

Hexamethylentetramin. Valge, krist., kerge vees  
lah. Subst., tabl. 0,5 g, amp. 5 ccm (40% lahus). Põie-

antiseptikum. 1,5—2,5 g või 2—3 k. 5 ccm veeni- või muskklisisesi päevas.

**Uvalysat (Ysat).**

Leesiklehe dialüsaat 1:1. Põiehaiguste puhul. 3 k. p. 30—40 tilka.

**Uzara (Uzara).**

*Asclepiadaceae* suguk. kuuluvate *Comphocarpus*-liikide juure koguglükosiidid. Lahus (5%) ja tabl. 0,02 g. Igasuguse etioloogiaga kõhulahtisus, düsenteeria, tüüfus, spasmid, düsmenorröa jne. 3—6 k. p. 30 tilka või 2—3 tabl.

## V.

**Vaccigon (SS).**

Polüvalentne gonokokkide vaktsiin. Amp. 1 ccm, 100, 300, 500, 600, 1000 ja 5000 milj. kokki ccm-is ja pud. 5 ccm, 100, 500, 2000, 5000 ja 10000 milj. kokki ccm-is. Gonorröa ja selle tüsistused. Nahaalusi või muskklisisesi.

**Vaccineurin (SS).**

*Staphylococc. pyocyaneus* ja *Bact. prodigios.* auto-lysaat. Seeriad I—III suureneva pisilaste arvuga. Neuralgia, neuritiidid, ka kunsttehisliku palaviku tekitamiseks. Muskli- või veenisisesi.

**Valda pastillid (Pastival).**

Mentholi 3 g, Cineoli e fol. *Eucalypt.* 0,2 g, *Thymoli* 0,02 g, *Terpineoli* 0,02 g, *Indigo ad color.*, *Sacchar.*, *Gummi q. s. ad 1000 g.* Pastillid ca. 1 g. Ülemiste hingamisteede katarrid.

**Valeriana Digitalysat (Ysat).**

Sõrmkübaralehest, palderjanijuurest ja piparmündilehest valmist. dialüsaat. 20 tilka = 1 ccm = 0,15 g *Fol. Digitalis. Sedativum, cardiotonicum.* 3 k. p. 15—25 tilka.

**Valerianate Pierlot (Pierlot).**

Värske palderjanijuure destillaat ammooniumvalerianaadi lisandiga. *Sedativum, analepticum.* 1 teelusika täis 3—4 k. p.

**Validol (Zimmer).**

*Mentholum valerianicum 30%* vaba mentooliga. Värvusetu vedelik, ei lah. vees. Vedelik ja kapsl. à 8

tilka. Sedativum, antihystericum, analepticum, stomachicum. Mitu k. p. 4—16 tilka.

**Valisan** (Schering).

Borneolum bromisvalerianicum. Värvusetu, õlitaol. nõrga lõhna ja maitsega vedelik. Kapsl. 0,25 g. Sedativum ja mahe hypnoticum. Mitu k. p. 1—3 kapsl.

**Valofin** (Helfenberg).

Palderjanijuure ja piparmündilehtede kontsentritud destillaat, millele lisatud Ammon. valerianic. ja Aethylum valerianic. Selge vedelik. Sedativum, antihystericum. 3 k. p. 20—25 tilka.

**Valyl** (Heyden, IG).

Palderjanhappe dietüülamiid. Värvusetu vedelik. Kapsl. 0,125 g. Nervinum, sedativum. 3 k. p. 2—3 kapsl. peale sööki.

**Vamianine** (Chatelain).

Extr. ligni Guajac., Extr. rad. Sarsaparill., Extr. Corydalis formosae ana 20 g, Grey powder (Hg 1, CaCO<sub>3</sub> 3) 2 g, Aur. colloid., Argent. colloid. ana 0,1 g, Peptoni jodat. 0,5 g, Rad. Liquirit. et Althaeae etc. ad 100 g. Draž. 0,5 g. Lues. 6 draž. päevas.

**Varico-Calorose** (Güstrov).

50% ja 60% invertsuhkrulahus. Amp. 5 ja 10 ccm. Veenilaiendid, päarakukomud. 2—20 ccm veenisisesi.

**Varitonin** (Ephag).

Sol. Natr. chlorat. puriss. 20% 10 ccm. Procaini 0,04 g. Amp. 10 ccm. Veenilaiendite raviks. Veenisisesi erieeskirja kohaselt.

**Varitonol** (Ephag).

Sol. Sacchar. uvic. puriss. 66% 10 ccm, Procaini hydrochlor. 0,04 g. Amp. 10 ccm. Veenilaiendite raviks. 10 ccm veenisisesi erieeskirja järgi.

**Vasano** (Schering).

l-Skopolamiinkamforaati 75% ja l-hüostsüamiinkamforaati 25%. Tabl. 0,5 mg, amp. 0,5 ccm = 0,25 mg, supp. 1 mg. Spetsiifikum mere-, õhu- ja raudteehaiguse vastu. Profülaktil. 2 tabl. enne sõidu algust, terapeutil. rask. juhtudel 1 supp. või 0,5 ccm nahaalusi.

**Venituse pulber** Helsinki (Medikon).

Natr. bicarbon. 25 g, Natr. sulfuric. sicc. 8 g, Natr. chlorat., Rad. Gentian. ana 1 g, Rad. Valerian. 0,1 g,

Cort. Chinae 0,1 g. Stomachicum. 3 k. p. 1 teelusika täis veega.

**Ventraemon** (Degewop).

Kuivatatud loomamagu. Subst., tabl. 10 g. Anæmia perniciosä. 15—30 g päevas.

**Veramon** (Schering).

Amidopyrini (71,52), dietüülmalonüülkarbamiidi (28,48) mol. hulkadena. Subst., tabl. 0,4 g. Analgeticum. Mitu k. p. 0,4—0,8 g.

**Verobroman** (Ephag).

Monobroomisovalerianüülkarbamiid. Tabl. 0,3 g. Sedativum ja mahe uinuti. 2—4 k. p. 1—2 tabl., unepuudusel öhtul 1—3 tabl.

**Verodigen** (IG, Merck).

Sõrmkübaralehe gitaliin-osa. Tabl. 0,8 mg = 0,1 g droogi. Cardiotonicum.  $\frac{1}{2}$ —1 tabl. 2—4 k. p.

**Veronal** (IG, Merck).

Acid. diaethylbarbituricum. Valge, mõru pulb., lah. vees 1:170 (15<sup>0</sup>). Subst., tabl. 0,1 ja 0,5 g. Hypnoticum. 0,25—0,5 g 2 tundi magamamineku eel.

**Veronal-Natrium** (IG, Merck).

Natr. diaethylbarbituricum. Valge, mõru pulb., lah. külmas vees 1:5. Subst., tabl. Hypnoticum. 0,3—0,6 g suhkruveega; nahaalusi või muskklisisesi 5—10 ccm 10% lahust.

**Vichy pastillid** (Vichy).

Vichy allikate sool pastillidena ca. 1 g. Põie- ja sapikivid, suhkurtõbi, seedimishäired jne. 4—5 past. 1 klaasi veega päevas.

**Vigantol** (IG).

Standarditud D-vitamiini preparaas, valmist. puhtast kristalsest D-vitamiinist. Õlilahus (1 ccm = 0,3 mg krist. D-vit. = 15000 rahvusvah. ühikut), dražeed (1 draž. = 5 tilka õlilahust), kalamaksaõli vigantooli lisandiga (1 ccm = 2 kliinil. [antirahhiitil.] ühikut). Rahhiit, kondikava kasvuhäired, laste tetaania ja spasmofiilia, skrofuloos, luutiisikus, mitmesug. nakkushaigused. Profülaktil. imikuile ja väikelastele 2—5 tilka õli,  $\frac{1}{2}$ —1 draž. või  $\frac{1}{2}$ —1 teelus. kalaõli päevas, suuremaile lastele 5 tilka õli, 1 draž. või 1—2 teelus. täit kalaõli päevas, 8-päevase vaheajaga peale 4-näd. ravi. Terapeutil. otstarb. imikuile ja väikelastele 5—10 tilka

õli, 1—2 draž. või 1 teelus. täis kalaõli päevas 4 näd. järgimööda, vajaduse korral mõnepäevase vaheaja järgi ravi korrata; suuremaile lastele 10—15 tilka õli või 2—3 draž. või 1—2 teelus. päevas 8-päevase vaheajaga 4—6 näd. ravi järgi. Täiskasv. 5—10 tilka õli või 1—2 draž. või 1—2 supilus. täit päevas.

#### Viigi siirup (Ephag).

Infus. Caricis, Decoct. follicul. Sennae, Decoct. cort. Frangul. naatriumtartraadi, naatriumsulfaadi ja maitseainete lisandiga. Mahe lahtistaja akuutse ja kroonil. kõhukinnisuse puhul. 2—3 k. p. 1—2 supi-, lastele teelusika täit.

#### Vioform (Ciba).

Joodklooroksükinoliin. 41,5% J. Kollakashall, pea-aegu lõhnatu ja maitsetu pulb., ei lah. vees. St. 173—176<sup>o</sup>. Jodoformi asendaja. Puudrina või 2—10% salvina.

#### Viscysat (Ysat).

Puuvõõriku (*Viscum album*) dialüsaat 1:1. Hüper-tonia kardiaal., renaal., sklerootil., neurootil. või kli-makteeril. põhjusel. 3 k. p. 20—30 tilka.

#### Vismulen (Stroschein).

Bismut. ammoniocitricum. Steriilne vesilahus amp. 1 ccm = 0,04 g Bi, pud. 15 ccm. Lues. 2 k. näd. 1 ccm muskli- või veenisisesi.

#### Vitacol (Ephag).

40% kalamaksaõli-emulsioon 0,5% kaltsiumglütse-rofosfaadi lisandiga. Skrofuloos, rahhiit, osteomalaatia, kehvveresus, lümfadeniit. 3 k. p. 1 supilusika, lastele 1 teelusika täis peale sööki.

#### Vitakalk (Marienfelde).

60% „kloorkaltsiumtärklist“, 21% ultraviolettkiiritatud pärmil, 2% „tärklisfosforhapet“, 17% kaltsiumfosfaati. Söödalubi loomade kondihaiguste profülak-siseks. Looma suurusele vastavalt kuni 40 g päevas.

## W.

#### Wunderkronessents (Remedia).

Aloes 9 g, Rad. Rhei, Rad. Gentianae, Croci ana 1 g, Spir. 200 g. Seedeorganite haigused. 3 k. p. 15—30 tilka.

**Wybert-Tabletten (Gaba).**

Succ. Liquirit. 21%, Ol. Menthae pip. 0,3%. Pastillid suukoopa desinfitseerimiseks. 1—2 tabl. tunnis aegl. suus imeda.

**Ä.****Ära köhi (Medikon).**

Sirup. Thymi compos.: 1% liivatee vedelekstrakti, 0,04% aniisi, apteegitilli, eukalüpti ja liivatee eeterõli. Köha ja hingamisteede haigused. 3 k. p. 1—2 teelusika täit.

**X.****Xeroform (Heyden).**

Bismut. tribromphenylicum. 44,9% Bi. Kollane pulb., vees ei lah. Antiseptikum põletushaavade, mädade ekseemide jne. puhul. *Per se* või 5—10% salvina.

**Xifalmilch (SS).**

Steriilne rasvatustatud piim, nõrga toksilisusega vaktsiini lisandiga. Amp. 2 ja 5 ccm. Epilepsia, polio-müeliit, müokardiit, epideemiline ajupõletik jne. 1,5 (lastele) —2—5 ccm muskklisisesi.

**Y.****Yatren (Behringwerke, IG).**

Joodoksükinoliinsulfohape (78%) + naatriumbi-karbonaat (22%). Sisald. seotud J 28%. Kollane, lõhnatu pulb., lah. külmas vees 4%, kuumas vees 10%. Subst., amp. (3% lahus) 1 ja 5 ccm, pud. 25 ccm. Pinna- ja süvaantiseptikum kirurgil. ja muuks otstarb. (angiina, stomatiit, vaginiit jne.). Haavadele 3% puudrina või mähisena; abstsesside puhul süstida mõni ccm 3% lahust; oto-rino-larüngoloogil. otstarb. loput. 1%, põie loput. 1—3% lahust 50 ccm.

**Yatren-Casein (Behringwerke, IG).**

Amp. 1 ja 5 ccm ja pud. 25 ccm, igas ccm-is 0,03 g jatreeni ja 0,025 g või 0,05 g kaseiini ja 0,01 g või 0,02

g naatriumbikarbonaati. Mittespetsiifil. ärritusraviks.  
Muskli- või veenisisesi.

**Yoghurt.**

Vt. Joghurt.

## Z.

**Zelio.**

*Z. ivad*: talliumsulfaadiga immutatud viljaterad, eosiiniga punaseks värvitud. *Z. pasta*: talliumsulfaati sisaldav rohekat värvust pasta. Rottide ja hiirte hävitamiseks.

**Zymin** (Dresdeni õueapteek).

Steriilne, püsiv pärmipreparaat. Peagu valge, kuiv pulb. Haavaraviks. Puudrina.

---

## Tarvitatavamaid ühikuid.

**Ühikuna** mõistetakse meditsiinis tavaliselt mingi aine või preparaadi pisimat hulka, mis on võimeline teatud kindlaksmääratud tingimusil esile kutsuma teatud, täpselt piiritletud toimet.

## Hormoonid.

### Ajuripatsi esisagar.

Sugunäärmete (munandi ja munasarja) tegevuse korraldamiseks. Bioloogilised katseobjektid: kastreerimata infantilise hiire või roti munasari ja tupp.

Hiire- või roti-ühik — pisim hulk, mis keskmiselt 100 tunni jooksul peale süstimist põhjustab 1) tipes polügonaalsete rakkude moodustumist ja epiteelkihtide sarvumist (Schollenstadium), 2) emaka suurenemist ja sekreediga täitumist, 3) munasarjas folliikli küpsusnähte, vaskulariseeritud *corpus luteum*'i tekkimist.

### Ajuripatsi tagasagar.

Tagasagara hormoonid standarditakse võrdlemisel standardpreparaadiga, nn. Vögtlin-pulbriga, mis saadakse vasttapatud loomade ajuripatsist.

Vögtlin-ühik vastab toimelt 0,5 mg standardpulbrile.

Vögtlin-oksütotsiin-ühik (oksütotsiin — väiteid tekitav hormoon) — 0,5 mg standardpulbrile vastav hulk, mille toime mõõdetakse neitsiliku merisea isoleeritud emakal.

Vögtlin-vasopressiin-ühik (vasopressiin — vererõhku kõrgendav, antidiureetiliselt toimiv ja soolteperistaltikat ergutav hormoon) — 0,5 mg standardpulbrile vastav hulk, mille toime mõõdetakse vererõhukatsel narkotiseeritud koeral või peatul kassil.

**Kilpnääre.**

**Merisea-ühik** — pisim hulk, mis, antuna nahaalusi või *per os*, on võimeline neljast 250—300 g kehakaaluga meriseast vähemalt kolmel vähendama 6 päeva jooksul kehakaalu umbes 10%.

**Atsetonitriil-ühik** — pisim hulk, mis tõstab hiirte vastupanu atsetonitriil-mürgistusele 100% võrra.

**Aksolotli-ühik** — pisim hulk, mis lõpuste varal hingava 12—15 cm pika meksiko aksolotli 4 nädala jooksul muudab kopsude varal hingavaks salamandriks.

**Köhunääre (pankreas).**

**Insuliini-ühik** —  $\frac{1}{3}$  annust, mis 24 tundi nälgitud normaalsel, umbes 2 kg kehakaaluga kodujänesel alandab veresuhkruhulga krampetekitava kontsentratsioonini (0,045 g/%). Toime poolest vastab üks IÜ 0,125 mg rahvusvahelise standardpreparaadile.

**Munasarjad (ovaria).**

**Hiire- või roti-ühik** — pisim annus, mis kastreeritud emastele hiirtele või rottidele 3 osas 24 tunni jooksul nahaalusi süstitult põhjustab tupepreparaadis leukotsüütide kadu ja tuumaga või tuumata epiteelrakkude esinemist. Toime poolest vastab 0,1 gamma kristalse folliikelhormoonile.

**Bensoaat-ühik** — vastab toimelt 0,1 gamma rahvusvahelise standardpreparaadile (östradiaalbensoaat, dihidrofolliikelhormooni bensoehappe-ester). Üks bensoaat-ühik = 1 hiire-ühikule.

**Munandid (testes).**

**Kukeharja-ühik** — pisim hulk, mis noortele, valgeile, kastreeritud Leghorn-kukkedele nelja päeva jooksul igapäev 2 korda muskulisisesi süstitult põhjustab viiendaks päevaks harja suurenemist 15% võrra.

**Vitamiinid.****A-vitamiin (antikseroformiline).**

Kasvamist soodustav ja nakkushaigusile vastupidavust suurendav, rasvas lahustuv, kalamaksaõlis,

võis jne. sisalduv vitamiin. A-vitamiini puudumisel kasv jääb seisma, kehakaal langeb, tekib kseroftalmia ja keratomalaatsia. Katseobjektiks kasvav rott.

**A-vitamiin-ühik** — annus, mis vastab toimele  $\frac{1}{1000}$  mg rahvusvahelise standardpreparaadile (karotiin). A-vitamiinivabal toidul peetud noorte rottide paranemiseks kseroftalmiast on vaja 3—5 ühikut.

#### **B-vitamiin (antineuriitiline).**

Veeslahustuv, riisikliides, pärmis jne. sisalduv vitamiin. Koosneb mitmest osavitamiinist, milledest B<sub>1</sub> on tegelikult antineuriitiline vitamiin. B-vitamiini puudumisel gangliumirakud lõpetavad tegevuse ja manduvad; tekivad haigused, nagu beri-beri, pellagra jt. Katseobjektiks rotid ja tuvid.

**B-vitamiin-ühik** — annus, mis vastab toimele 10 mg rahvusvahelise standardpreparaadile, määratud B-vitamiinivabal toidul peetud noorte rottide kasvu normaalse euenemise ja poleeritud riisiga toidetud tuvide polineuriidist tervistumise varal.

#### **C-vitamiin (antiskorbuutiline).**

Veeslahustuv, herne-s, spinatis, tomatis jne. sisalduv väga labiiline vitamiin. C-vitamiini puudumisel tekib hemorraagiline diatees (skorbuut ja Möller-Barlow haigus — verevalumid nahas, muskleis ja igemeis jne.). Katseobjektiks merisead.

**C-vitamiin-ühik** — võrdub toimele 0,1 ccm värske sidrunimahlale. See on ligikaudu  $\frac{1}{10}$  annust, mis vajalik skorbutitoidul (terad ja vesi) peetava noore merisea juures makroskoopsete skorbutinähtude ärahoidmiseks.

#### **D-vitamiin (antirahhiitiline).**

Rasvas lahustuv, ergosteriinina loomarasvades ja taimeraskvades ning õlides provitamiinina esinev, kolesteriini aktiveerimisel tekkiv vitamiin. B-vitamiini puudumisel tekivad lübi-ainevahetuse häired, rahhiit ja osteomalaatsia. Katseobjektiks kasvav rott.

**D-vitamiin-ühik** — vastab toimele kiiritatud ergosteriini rahvusvahelise standardlahuse 1 milligrammile.

**Roti-ühik** — pisim päevane annus, mis 14-

kordsel igapäevasel andmisel teatud tingimusil vähemalt 80% katseloomi kindlasti kaitseb rahhiidi eest.

Kliiniline ühik — vastab toimelt 100 roti-ühikule.

## Digitaalis.

Digitaalse-ühik — vastab toimelt 0,1 g rahvusvahelise standardpreparaadile. Katseobjektiks konn.

Konna-annus — pisim hulk, mis 24 tunni jooksul surmab konna. Üks gramm *fol. Digitalis titrat.* — ca. 2 000 konna-annust, 1 g digitoksiini — ca. 200 000 konna-annust, 1 g g-strofantiini — ca. 2 000 000 konna-annust.

---

TEKSTIS ESINEVATE LADINAKEELSETE VÄL-  
JENDUSTE SÖNASTIK.

- Achylia gastrica* — maomahla puudumine.  
*Acne* — vistrik.  
*Adipositas* — rasvastus, rasvumine.  
*Adjuvans* — abivahend, kaasaaitav vahend.  
*Adsorbens* — adsorbiv vahend.  
*Adstringens* — vanuti, kokkutõmbav vahend.  
*Agrypnia* — unepuudus.  
*Amenorrhoea* — kuupuhastuse puudumine.  
*Anaemia* — kehvveresus.  
*Analepticum* — elustamisvahend, virgutamis-  
vahend.  
*Analgeticum* — valuvaigistav vahend.  
*Angina pectoris* — südame volmed.  
*Anodynum* — valuvaigistav vahend.  
*Antarthriticum* — liigesepõletikuvastane vahend.  
*Anthydroticum* — higistamisevastane vahend.  
*Antidiarrhoicum* — kõhulahtisusevastane  
vahend.  
*Antilueticum* — süüfilisevastane vahend.  
*Anticoncipiens* — rasedaksjäämisevastane  
vahend.  
*Antineuralgicum* — erguvaluvastane vahend.  
*Antiphlogisticum* — põletikuvastane vahend.  
*Antipyreticum* — palavikuvastane vahend.  
*Antirheumaticum* — reumavastane vahend.  
*Antisepticum* — haigusidusid hävitav vahend.  
*Antispasmodicum* — krampidevastane vahend.  
*Aphrodisiacum* — kiimavahend, sugutungi tõstev  
vahend.  
*Apoplexia* — rabandus.  
*Arhythmia perpetua* — kestev rütmitus  
(südame).

- Arteriosclerosis — tuiksoonte kõvastus e. lubjastus.  
 Arthritis — artriit, liigesepõletik.  
 Ascites — astsiit, kõhu-vesitõbi.  
 Asphyxia — lämbus.  
 Asthenia — asteenia, jõuetus, rammetus.  
 Asthma bronchiale — bronhiaal-astma e. kopsu-hingelämb.  
 Asthma cardiale — kardiaalne astma e. südamehaiguste põhjust. astma.  
 Avitaminosis — avitamiinosis, vitamiinipuudusest tekkiv tõbi.  
 Blepharitis — blenorröa, silma mädapõletik.  
 Blepharitis — blefariit, laupõletik.  
 Bronchitis — bronhiit, kopsutorude põletik.  
 Cardiacum — südametegevust mõjustav vahend.  
 Cardiogenicum — südametegevust suurendav vahend.  
 Cataplasma — puderhautis.  
 Chlorosis — kloroos, koltushaigus, kahvatustõbi.  
 Cholaemia — koleemia, sappveresus.  
 Cholagogum — sapi eritumist esilekutsuv vahend.  
 Cholangitis — kolangiit, sapiteepõletik.  
 Cholecystitis — koletsüstiit, sapipõiepõletik.  
 Cholelithiasis — kolelitiaas, sapikivitõbi.  
 Chorea — korea, tantstõbi.  
 Coma — kooma, oimetus.  
 Combustio — põletus.  
 Conjunctivitis — konjunktiviit, silma sidekesta-põletik.  
 Cretinismus — kretinism, kääbustõbi.  
 Cystitis — tsüstiit, põiepõletik.  
 Decubitus — lamatis.  
 Dermatitis — dermatoos, nahahaigus.  
 Desodorans — haisutustav vahend.  
 Diabetes insipidus — suhkruta liigkusesus.  
 „ mellitus — suhkurtõbi.  
 Diarrhoea — kõhulahtisus.  
 Digestivum — seedimist kiirendav vahend.  
 Distomiasis — maksakaantõbi.  
 Diureticum — kusenõristust edendav vahend.  
 Dysbasia — düsbaasia, käimishäire.

- Dysmenorrhoea — düsmenorröa, kuupuhastus-  
häire.  
 Dyspepsia — seedehäire.  
 Dyspnoe — hingeldus.  
 Eclampsia — kräptõbi.  
 Emmenagogum — kuupuhastust esilekutsuv  
vahend.  
 Emphysema — emfüseem, puhitus.  
 Encephalitis lethargica — epideemiline ent-  
sefaliit e. ajupõletik.  
 Endocarditis — südame sisekesta põletik.  
 Endometritis — endometriit, emakapõletik.  
 Enteritis — enteriit, peensoolepõletik.  
 Enuresis nocturna — voodisse kusemine.  
 Epididymitis — epididümiit, munandimanuse  
põletik.  
 Epilepsia — langetõbi.  
 Excitans — erutav vahend.  
 Expectorans — rögastamisvahend.  
 Febris recurrens — taastuv soetõbi.  
 Fissura ani — päarakulõhe.  
 Fluor albus — valgevoolus.  
 Gangraena — gangreen, roiskkärbus.  
 Glomerulonephritis — glomerulonefriit, neeru-  
päsmakeste põletik.  
 Gonorrhoea — gonorröa, tripper.  
 Haemophilia — hemofiilia, veritsustõbi.  
 Haemoptoë — verikõhimine.  
 Haemostaticum — verd tõkestav vahend.  
 Haemostypticum = haemostaticum.  
 Helminthiasis — usstõbi, sooleussid.  
 Hemiplegia — ühepoolne halvatus.  
 Herpes — ohatis.  
 Hydrops — vesitõbi.  
 Hyperaciditas — liighappesus (maos).  
 Hyperemesis gravidarum — rasedate liig-  
oksendamine.  
 Hyperhidrosis — liighigistamine.  
 Hyperthyreosis — kilpnäärme tegevuse liig-  
tugevus.

- Hypertonia — hüpertoonia, ülipingus (veresoonte).  
 Hypnoticum — uinuti, uinutamisvahend.  
 Hypothyreosis — kilpnäärme tegevuse nõrkus.  
 Icterus — kollatõbi.  
 Idiotia — idiootsus, totrus.  
 Impotentia — suguvõimetus.  
 Infantilismus — lapsearenemisastmel püsimine.  
 Insufficiens — puudulikkus.  
 Kachexia — kahheksia, kurtumus (tugev kõhnumine).  
 Kolpitis — kolpiit, emakatupepõletik.  
 Laryngitis — larüngiit, kõripõletik.  
 Laxativum — kõhulahtisti, lahtistav vahend.  
 Lepra — leepira, pidalitõbi.  
 Leucaemia — valgeveresus.  
 Lues — luues, süüfilis.  
 Lupus — söötraig, nahatuberkuloosi vorm.  
 Lymphadenitis — lümfadeniit, mahlanäärme-põletik.  
 Lymphangitis — lümfangiit, mahlasoonepõletik.  
 Malaria — malaaria, halltõbi.  
 Mastitis — mastiit, nisapõletik.  
 Meningitis — meningiit, ajukelmepõletik.  
 Menorrhagia — kuupuhastuse liigtugevus.  
 Meteorismus — meteorism, kõhutuulsus.  
 Metritis — metriit, emakapõletik.  
 Metrorrhagia — emakaverejooks.  
 Morbus Basedovi — Basedovi tõbi (kui kilpnäärme suurend. tegev. põhjustatult tekib hõõtsik, punnissilmsus jne.).  
 Mydriaticum — silmatera laiendav vahend.  
 Myelitis — müeliit, seljaajupõletik.  
 Myodegeneratio cordis — südamelihase mandumine.  
 Myxoedema — müksödem, limaturse.  
 Narcoticum — uimasti, uimastusvahend.  
 Nephritis — nefriit, neerupõletik.  
 Nephrosclerosis — nefroskleroos, neerukõvastus.  
 Neuralgia — erguvalu.  
 Neurasthenia — neurasteenia, närvinõrkus.  
 Oligomenorrhoea — kuupuhastuse väheveresus.

- Oliguria* — vähekusesus.  
*Osteomalacia* — luu pehmumus.  
*Osteomyelitis* — osteomüeliit, luuüdüpõletik.  
*Otitis media* — keskkõrvapõletik.  
*Oxyuriasis* — maat-usstõbi.  
*Ozaena* — vinanohu, haisev nohu.  
*Pediculosis* — täitõbi.  
*Pemphigus* — vill-ohatis.  
*Perimetritis* — perimetriit, emakakelmepõletik.  
*Peritonitis* — peritoniit, kõhukelmepõletik.  
*Pertussis* — läkakõha.  
*Pharyngitis* — farüngiit, neelupõletik.  
*Phlogosis* — põletik.  
*Pleuritis* — pleuriit, kopsukelmepõletik.  
*Pneumonia* — kopsupõletik.  
*Prostatitis* — eesnäärmepõletik.  
*Pruritus* — kihelmine.  
*Psoriasis* — sammaspoolik.  
*Pyæmia* — mädaveresus.  
*Pyelitis* — püeliit, neeruvaagnapõletik.  
*Pyelonephritis* — püelonefriit, neeru- ja neeru-  
 vaagnapõletik.  
*Pyorrhoea* — mädavool.  
*Pyrexia* — palavikkus.  
*Rachitis* — rahhiit, inglishaigus.  
*Recurrentis* = febris recurrens.  
*Resolvens* — lahendav vahend.  
*Rhinitis* — riniit, nohu.  
*Roborans* — ergutav, virgutav vahend.  
*Scabies* — sügelised.  
*Sclerodermia* — kõvanahksus.  
*Scrophulosis* — skrofuloos, näärmetiisikus.  
*Seborrhoea* — rasunäärmete liigtegevus.  
*Sedativum* — rahustav vahend.  
*Senilitas præcox* — enneaegne raukus.  
*Septicæmia* — roiskveresus.  
*Spasmolyticum* — krampevaigistav vahend.  
*Spermatorrhoea* — erektsioonita seemnevoolus.  
*Spirochaetosis* — spirohetoos, spiroheetide teki-  
 tatud haigus.  
*Staphylococcosis* — stafüloomükoos, kobarseente  
 tekitatud haigus.

- Stenocardia = angina pectoris.  
Stimulans — tegevusele ergutav vahend.  
Stomachicum — maotegevust virgutav vahend.  
Stomatitis — stomatiit, suupõletik.  
Struma — struuma, hõõtsik.  
Subaciditas — happe liigväheesus.  
Superaciditas — liighappesus.  
Tabes dorsalis — seljataabes, seljaajukuive.  
Tachycardia — südameruttus.  
Tonicum — jõudulisav vahend.  
Trachoma — trahoom, silmamarjad.  
Ulcus — paise.  
Ulcus cruris — säärepaise.  
„ molle — pehme šanker.  
„ ventriculi — maopaise.  
Urethritis — uretriit, kusitipõletik.  
Urticaria — nõgeslööve.  
Vaginitis — tupepõletik.  
Varices — veenikomud, veenilaiendid.
-

PREPARAATIDE VALMISTUSASUTISTE  
NIMESTIK.

- Adrian — Adrian & Co, Paris III.  
 Albert — Chem. Werke vorm. E. Albert, Wiesbaden-Biebrich.  
 Aniodol — Laboratoire de l'Aniodol, Paris.  
 Anticomman — Anticomman GmbH, Berlin.  
 Apoth. z. h. G. — Apotheke z. heilig. Geist, Wien.  
 Aroom — Keemiatehas Aroom, Tallinn, Narva mnt. 10.  
 Ars — Laboratorium Ars, Narva, Suur 26.  
 Asche — C. F. Asche & Co, Hamburg 19.  
 Astier — P. Astier, Paris.  
 Athenstaedt — Chem. Fabr. Athenstaedt & Redeker, Hemelingen b. Bremen.  
 AVCF — E. Boehden & Co, Fabr. chem.-pharm. Präparate GmbH, Berlin NW 40.  
 Bad Ems — Staatl. Bade- u. Brunnendirektion, Bad Ems.  
 Bad Homburg — Chem.-pharm. A/G, Bad Homburg, Werk Frankfurt a. M.  
 Bailly — Laboratoire A. Bailly, Paris.  
 Bauer — Bauer & Co, Berlin.  
 Bayer & Co, — Dr. Bayer & Co, Chem. Fabr. Budapest IX.  
 Behringwerke — Behringwerke A/G, Marburg, Lahn.  
 Beiersdorf — Beiersdorf & Co, A/G, Hamburg 30.  
 Bengen — Bengen & Co, GmbH, Hannover.  
 Bengué — Dr. Bengué, Pharmacien, Paris IX.  
 Bio — La Biotherapie, H. Villette, Pharmacien, Paris XV.  
 Blaes — Chem. Fabr. J. Blaes & Co, A/G, Lindau i. Bayern.  
 Blancard — Bertaut-Blancard Frères, Paris.  
 Boehringer — C. H. Boehringer Sohn A./G., Nieder-Ingelheim a. Rh.

- Boehr. Mannh. — C. F. Boehringer & Söhne, GmbH,  
Mannheim-Waldhof.
- Boucard — Laboratoire du Dr. Boucard, Paris.
- Boulangier — Les Laboratoires Boulangier-Dausse,  
Paris.
- Boxberger — Boxbergers Hofapotheke, Bad Kis-  
singen.
- Byk — Chem. Fabr. Byk-Guldenwerke A/G, Berlin  
NW 40.
- Chatelain — Etablissement Chatelain, Paris.
- Chemosan — Chemosan-Union u. Fritz-Pezoldt A/G,  
Wien III.
- Chinoin — Sanabo-Chinoin GmbH, Wien I.
- Ciba — Ges. f. Chem. Industr., Basel. Sõsartehased  
Pabjanitsas (Poolas) ja mujal.
- Clin — Laboratoires Clin, Comar & Cie, Paris.
- Cognet — Laboratoire des Produits Cognet, Armin-  
geat & Cie. Paris III.
- Colman — Dr. Colman GmbH, Berlin W 15.
- Comar — vt. Clin.
- Cordes — Ichthyolgesellschaft Cordes, Hermanni &  
Co, Hamburg.
- Degewop — Degewop, Ges. wissenschaftl. Organ-  
präparate A/G, Berlin-Spandau.
- Denver — The Denver Chemical Mfg, New-York.
- Desitin — Desitin-Werk, Fabr. pharm. Präparate,  
Hamburg 19.
- Donner — Naftalan-Ges., Jul. Donner GmbH, Dres-  
den.
- Elliman — Elliman, Sons & Co, Ltd, Slough, Eng-  
land.
- Eno — Eno's Fruit Salt GmbH, Berlin SW 68.
- Ephag — A/s. Ephag, keem.-farm. laboratooriumid,  
Tallinn, S. Kloostri 18.
- Feigel — E. Feigel, Fabr. de Prod. Chim. et Pharm.,  
Lutterbach, Alsace.
- Ferment — Le Ferment, Laboratoires Darrasse,  
Nanterre, France.
- Ferre — Laborat. Dr. H. Ferre, Paris XV.
- Ferrosan — A/G Ferrosan, Kõbenhavn.
- Fersan — Pharm. Industrie A/G, Wien III.
- Frère — Maison L. Frère, E. Vaillant & Cie, Paris.

- F r e u n d** — Dr. Freund & Redlich, Fabr. org., therapeut. Präpar., Berlin-Adlershof.  
**F r i t z s c h e** — W. Fritsche, Fabr. chem.-pharm. Präpar., Weinböhlen b. Dresden.  
**G a b a** — Gaba A/G, Basel.  
**G a n s** — „Pharmagans“, Pharm. Inst. L. Gans A/G, Oberursel b. Frankfurt a. M.  
**G e d e o n** — Chem. Fabr. Gedeon Richter A/G, Budapest X.  
**G e h e** — Gehe & Co, A/G, Dresden.  
**G L** — Gnadeberg-Leyden-Jürisoni apteek, Tallinn, S. Karja 4.  
**G o e d e c k e** — Goedecke & Co, A/G, Berlin-Scharlottenburg.  
**G r e n z a c h** — Chem. Werke Grenzach A/G, Berlin.  
**G r i l l o n** — Société du Tamar Indien Grillon, Paris.  
**G r ü n a u** — Chem. Fabr. Grünau, Landshoff u. Meyer, A/G, Berlin-Grünau.  
**G ü s t r o w** — Chem. Fabr. Güstrow A/G, Mecklenburg.  
**H a u s m a n n** — Hausmann A/G, St. Gallen.  
**H e i s l e r** — Chem. Fabr. Dr. Heisler, Chrast, Chrudim; Tšehhoslovakkia.  
**H e l f e n b e r g** — Chem. Fabr. Helfenberg b. Dresden.  
**H e l l** — G. Hell A/G, Troppau.  
**H e n n i n g** — Chem. u. pharm. Fabr. Dr. G. Henning, Berlin-Tempelhof.  
**H e y d e n** — Chem. Fabr. v. Heyden A/G, Radebeul-Dresden.  
**H e y l** — Heyl & Co, Chem. pharm. Fabr., Berlin N 65.  
**H o m m e l** — Hommel A/G, Zürich.  
**H o u t e n** — N. V. Pharm. Prod. Mij. Phil. van Houten, Amsterdam.  
**I G** — Interessengesellschaft Farbenindustrie A/G, Leverkusen a. Rh.  
**J ü r g e n s** — Dr. pharm. A. Jürgens, farm.-keemil. laboratoorium, Tartu Aleksandri 70.  
**K a d e** — Dr. Kade's med.-pharm. Fabrikationsgeschäft, Berlin SO 30.  
**K a r l o v a** apteek — Karlova apteek, Tartu, Tähe 64a.  
**K a u f m a n n** — Dr. Ludwig Kaufmann, Berlin-Wilmersdorf.

- Kirchhoff — Chem. Werk. Kirchhoff & Neirath, GmbH, Berlin W 15.
- Kleewein — S. E. Kleewein, Apoth. z. Schwarz. Adler, Krems bei Wien.
- Klopfer — Chem. Werk Dr. Klopfer GmbH, Dresden.
- Knoll — Chem. Fabriken Knoll A/G, Ludwigshafen.
- Knorr — H. Knorr, Scharlottenburg.
- Krause — Krause-Medico GmbH, München.
- Krewel — Krewel-Leuffen, GmbH, Eitorf a. Sieg.
- Labopharma — Labopharma Dr. Laboschin GmbH, Berlin-Scharlottenburg.
- Laves — Lecinwerk Dr. E. Laves, Hannover.
- Leo — Leo Insulin Co (Nordisk Insulin laborat.), København.
- Leprince — Laboratoires du Dr. Maurice Leprince, Paris.
- Lill — A/s. prov. Julius Lill, rohukauba suurlaad ja laboratooriumid, Tartu, Narva 6.
- Lingner — Lingner—Werke, Vertriebs-GmbH, Dresden.
- Llopis — Llopis Hermanos, Madrid VIII.
- Lobica — Laboratoires Lobica, Paris 17.
- Luitpold — Chem. pharm. Fabrik Luitpoldwerk, München.
- Lysoform — „Lysoform“, Dr. Hans Rosemann, Berlin-Schöneberg.
- Lysolfabrik — Lysolfabrik Schülke & Mayr A/G, Hamburg 39.
- Lõvi apteek — Lõvi apteek, Pärnu, Vilmsi 4.
- Madaus — Dr. Madaus & Co, Radebeul-Dresden.
- Marquart — Chem. Fabr. Dr. L. Marquart A/G, Beuel a. Rh.
- Mariatherma — „Mariatherma“, Chem.-med. Fabr. A/G, Marienbad, Tšehhoslovakkia.
- Marienfelde — Chem. Fabr. Marienfelde GmbH, Berlin-Marienfelde.
- MBK — Merck-Boehringer-Knoll.
- Medikon — Keemiavabrik Medikon, Tallinn, S. Tartu mnt. 72.
- Merck — E. Merck, Chem. Fabrik, Darmstadt.
- Merz — Chem. Fabrik Merz & Co, Frankfurt a. M.

- Midy — Laboratoires Midy, Paris.  
 Mor — Chem.-pharm. Fabr. Mor Fekete, Wien I.  
 Moro — Laboratoire d'Angiolympe Eugen Moro, Paris.  
 Moskva — Moskva kõrgema tehnikakooli anorg.-keemia laboratoorium.  
 Nanning — Dr. H. Nanning, Pharm.-chem. Fabr., Haag.  
 Nativelle — Laboratoire Nativelle, Paris.  
 Natterer — Chem.-pharm. Fabr. W. Natterer GmbH, München W 19.  
 Neumann — Dr. Neumann & Co, Chem. Fabr., Berlin.  
 Nördlinger — Chem. Fabr. Dr. N. Nördlinger, Flörsheim a. M.  
 Norgine — Pharm. Werke „Norgine“ A/G, Praha.  
 Novavita — Chem. Fabr. Novavita GmbH, Berlin-Pankow.  
 Nujol — Ameerika-Saksa Petroleumi ühing. Nujol-osakond, Hamburg 36.  
 Odor — A/S. Odor, Tallinn, Kivimurru 2.  
 Östreicher — Dr. L. Östreicher, Berlin.  
 Pastival — Etablissements Pastival, Paris IV.  
 PB — vt. Ciba.  
 PD — Parke, Davis & Co, London W 1.  
 Pharmacosma — Pharmacosma GmbH, Berlin.  
 Plasmon — Plasmon GmbH, Neubrandenburg in Meckl.  
 Pohl — Chem.-pharm. Fabr. G. Pohl, Danzig-Langenhof.  
 Poulenc — vt. UR.  
 Promonta — Chem. Fabr. Promonta, GmbH, Hamburg.  
 Radiosclerin — Radiosclerin-Ges. m. b. H., Berlin.  
 Rae apteek — Rae apteek, Tallinn, Raekojaplats 11.  
 Radlauer — Radlauer's Kronen-Apotheke, Berlin.  
 Reiss — Rud. Reiss, Rheumasan u. Lenicet-Fabrik, Berlin NW.  
 Remedia — O/ü. keem.-laboratoorium Remedia, Tallinn, Pühavaimu 11.  
 Rhenania — Rhenania Kali-Chemie A/G, Berlin.

- Riedel — I. D. Riedel — E. de Haën A/G, Berlin-Britz.
- Ritsert — Dr. E. Ritsert, Frankfurt a. M.
- Robin — Laborat. Robin, Paris.
- Roche — Hoffmann La Roche & Co, Basel.
- Rosenberg — Physiolog.-chem. Laborator., Hugo Rosenberg, Freiburg i. Br.
- RSi — Riiklik Seerumi-instituut, Tartu, Tähtvere mõis.
- Sandow — Dr. E. Sandow, Chem. Fabrik, Hamburg 30.
- Sandoz — Sandoz A/G, Nürnberg 25.
- Sarsa — Sarsa Chem.-pharm. Ges. mbH, Berlin S 42.
- Schering — Chem. Fabr. Schering-Kahlbaum A/G, Berlin.
- Scheuble — Scheuble & Höchstetter, Hamburg.
- Schuchardt — Dr. Th. Schuchardt, GmbH, Görnitz.
- Schürholz — Chem. Fabr. Schürholz, GmbH, Köln-Zollstock.
- Schweitzer — Dr. Schweitzer GmbH, Berlin-Reinickendorf.
- Scott — Scott & Bowne, Frankfurt a. M.
- Seabury — Seabury and Johnson, New-York.
- Sicre — G. Sicre, Paris.
- Sloan — Dr. Earl Sloan, New-York.
- Soden — Sodener Mineralprodukte GmbH, Frankfurt a. M.
- Spiess — Ludwig Spiess ja Poeg A/s, Warssaw.
- SS — Sächsisches Serumwerk A/G, Dresden.
- Stohr — Pharm. Vertriebsges. mbH, München.
- Stroschein — Stroschein, Chem. Fabr. GmbH, Berlin SO 36.
- Taeschner — E. Taeschner Chem.-pharm. Fabrik, Potsdam.
- Takema — Tartu keemia ja maitseainete tööstus, Tartu, Narva 35.
- Teichgräber — Th. Teichgräber A/G, Berlin.
- Temmler — Temmler-Werke, Ver. Chem. Fabr., Berlin-Johannistal.
- Tosse — E. Tosse & Co, Fabr. chem. u. med. Präparate, Hamburg.

- T Ü B I — Tartu Ülikooli Bakterioloogia Institut, Tartu, Aia 46.
- T Ü T K — Tartu Ülikooli Taimehaiguste Katsejaam, Tartu, Raadi mõis.
- U R — Société Parisienne d'Expansion Chimique, Paris VIII (end. „Usines du Rhône“ ja „Poulenc Frères“).
- U z a r a — Uzara GmbH für pharm.-chem. Präparate, Melsungen.
- V a n a a p t e e k — Vana apteek, Pärnu, Riia 15.
- W a n d e r — Dr. A. Wander A/G, Bern.
- V a s e u s — Apoteksvarucentralen Vitrum, Apotekareaktiebolaget, Stockholm.
- V C W — vt. A V C F.
- W e i g e r t — Aesculap-Apotheke, E. Weigert, Breslau.
- W e i l — Dr. Weil, Chem.-pharm. Fabr., Frankfurt a. M.
- W e i s s — Dr. Rich. Weiss, Fabr. pharm. Präparate GmbH, Berlin NW.
- W e l l c o m e — Burroughs, Wellcome & Co, London EC 1.
- V i c h y — l'Etablissements thermal de Vichy, Paris.
- W i e r n i k — Chem. Fabr. Dr. Joachim Wiernik A/G, Berlin-Waidmannslust.
- V i i n i R S i — Viini riiklik seroterapeutiline instituut.
- W ü l f i n g — Joh. A. Wülfig & Co, Berlin SW 68.
- Y s a t — Ysat-Fabrik GmbH, Joh. Bürger, Wernigerode.
- Z i m m e r — Vereinigte Chininfabriken, Zimmer & Co GmbH, Frankfurt a. M.
- Z i m m e r m a n n — Zimmermann & Co, Hamburg.
-

# ARMATSÖITILINE KÄSIRAAMAT I OSA

---

ilmunud 1931. aastal, on ainult brošeeritult  
veel saadaval „Eesti Rohuteadlase“ toime-  
tusest, Tartu, Rüütli 2, või abitoimetusest,  
Tallinn, Lai 38, hinnaga 1 kroon.

---


Käsiraamatus leidub muuseas:

*Raviainete sünonüümide tabel; tilgatabel; lühen-  
dused retseptidel; mürgistusnähud ja neid põhjus-  
tavad mürgid ühes raviga; tähtsamate toitainete  
kaloriteväärtus, koostis ja vitamiinisisaldus; and-  
meid ebakohastest ravimisegudest, raviainete  
lahustumisest, desinfektsioonist, toitainete- ja kuse-  
analüüsist, ravimiplekkide eemaldamisest j.n.e.*

Lähemalt käsiraamatu sisu kohta vaata:  
„Pharmacia“ nr. 4, 1931 ja „Eesti Arst“  
nr. 3, 1931.

---

Kes raamatu hinna kr. 1.— rahas või post-  
markides toimetusele saadab, sellele saade-  
takse raamat postikuludeta.



APTEEGI, ROHU, VÄRVI JA  
KOSMEETIKA KAUPADE  
SUURLAOD

Soodsaim ostukoht

APTEEKIDELE JA  
ROHUKAUPLUSTELE

*Müük suurel ja väiksel arvul.*

**A.-S. MEY & LANDESEN**

TALLINN, VIRU TÄN. 9 TEL. 446-46

**SAMA HÄSTI**

KUI VÄLISMAA TRÜKIKOJAD  
VALMISTAB TEILE IGASUGUST  
TRÜKITÖÖD VÕRDLEMISI  
MÕÕDUKATE HINDADEGA

OSAÜHING

**K. MATTIESEN'I  
TRÜKIKODA**

TARTU, VALLIKRAAVI 4 • TEL. 4-80

*Soodsaim ostukoht Eestis*

**haigemajadele ja apteekidele**



**MARLI,**

pleegitud ja pleekimata,

**PUUVILL,**

liht- ja hügrokoopne,

**LIGNIIN-**

kõrgepleek,

**KUMMI- ja**

**KOMPRESSRIIDED**

*Müük suurel ja väikesel arvul.*

**M. Jänes'e suuräri**

Telefon 5-91.

Asut. 1899. a.

**Tartus, Kaubahoov 9-10-11-12**

# Gnadeberg - Leyden - Jürisoni

apteegi laboratooriumis valmistatud  
preparaadid:

- Anethym-pastillid
  - Brovaloton
  - Cholestin
  - Elsulin
  - Euka-pastillid
  - Migrenervin
  - Novopin
  - Proallon
  - Rinol
  - Triomalt
  - Urolith
  - Vaseliin-puuder

*Ainuesindused ja valmistamine Eestis:*

„Dr. Madaus & Co“ preparaadid

„A.-s. Asta“ preparaadid: Quadronal —  
Quadronox

„A.-s. Radiosclerin“ Radiosclerin tabletid

**G. Gnadeberg-E. Leyden-K. Jürisoni apteek**

**Tallinnas, Suur Karja 4, telef. 445-88**



A.-S.

PROVIISOR

# JULIUS LILL

*Rohukaubasuurlaad ja laboratooriumid*

*PEAKONTOR ja LADU:*

TARTUS, NARVA TÄN. 6

*OSAKONNAD:*

TARTUS, RÜÜTLI TÄN. 10

TALLINNAS, VANA-VIRU 15

**Kemikaalid**

Patent-ravimid

Klaas- ja kummikaubad

Kosmeetilised preparaadid

Reaktiivid

Fotoaparaadid

Fotokemikaalid

j. t. foto tarbeasjad

**ESINDUSED:**

„HOFFMANN LA ROCHE“ Basel

„CHINOIN“ Ungari

RIIKLIK SEERUMI-INSTITUUT, Tartus, j. t.

SEEBIVABRIK Asut. 1849

**A. FREDERKING**

---



---

Tartu, Aleksandri 46 \* telefon 2-57

Tallinna ladu: Saiakangi 2, tel. 431-50

Pärnu ladu: Vilmsi 15, telefon 4-33

---

*Arstlikud seebid:*

BORTIMOOLSEEP

IHTÜOOLSEEP

GLÜTSERIIN-VÄÄVLISEEP

TÕRVASEEP

PIMSIKIVISEEP

KARBOLSEEP

VÄÄVLISEEP

SUBLIMAATSEEP

TÕRVA-VÄÄVLISEEP

BOORAKSSEEP

ROHELINE SEEP

METAMORFOOSA PILEERSEEP

·RAADIUMAKTIIVSEEP

---



---

# RIIKLIK SEERUMI-INSTITUUT

TARTU, TÄHTVERE R/MÕIS.

Kirjakast 109, telef. 902, telegr. aadr.: SEERINST TARTU.  
Panga arve: Eesti Panga Tartu osak., jooksev arve nr. 1579.

Difteeriaseerum	Agglutineerivad seerumid
Difteeria-anatoksiin	Viinamarjasuhkrulahus
Difteeriatoksiin	Rõugelima
Difteeriasalv	Sigade punataudiseerum
Sarlakiseerum	Põrnataudi seerum
Sarlakitoksiin	Tuberkuliin Koch
Teetanusanтитoksiin	Ambootseptor
Hobuse ja veise normaal-seerumid	Gonokokkide vaktsiin
Streptokokkide antiviirus	Musratiin, bioloogiline rottide ja hiirte hävi- tamise vahend
Stafülokokkide antiviirus	Metüül-antigeen
Strepto-stafülokokkide antiviirus	Pyrocol
Bact. coli antiviirus	Percoserin
Diagnosticum typh. abdo- minalis	Staphylo-streptokokkide vaktsiin
Diagnosticum paratyphi A	Streptokokkide seerum
Diagnosticum paratyphi B	Coli-vaktsiin
Läkakõha vaktsiin	Dermatebin
	Testiseerumid

*Firma „Bayer-Meister Lucius“ esindus*

Kõik Riiklikus Seerumi-instituudis valmistatud seerumid kontrollitakse Riiklikus Arstirohtude Proovimise Instituudis. Seerumite valmistamine toimub T. Ü. Bakterioloogia Instituudi juhataja prof. K. Schlossmanni alalisel nõuandel ja järeelvalvel.

*Esindajad: A./S. PROV. J. LILL, TARTUS  
A./S. „EPHAG“, TALLINNAS*

---



---



A.-S.

*Eestimaa Apteegi- ja  
Rohukaubanduse-Ühing*

„*EPHAG*“

Juhatus:

Tallinn, Harju tän. nr. 41,  
omas majas.

Kodune keskjaam 427-09

Osakond:

Tartus, Suurturg nr. 16  
kõnetraat 3-86

Abikauplus:

Tallinn, Narva mnt, nr. 42

**Keemia-farmatsöitilised ja  
kosmeetilised laboratooriumid**  
Tallinn, S. Kloostri 18

VALMISTAVAD:

Farmatsöitilisi spetsiaalpreparaate, mis väljatöötatud „Ephag’i“ uurimislaboratooriumis vastavalt moodsa kemoterapia nõuetele.

Kõiki galeenilisi preparaate, mis analüüsitud ja standarditud „Ephag’i“ analüütilises laboratooriumis.

Tablette, pastille, supposiite jne.

Steriilitud lahuseid ampullides.

Kosmeetilisi vahendeid, nagu puudreid, kreeme, hambapastasid, huulepulki jne.

Parfüüme igalõhnalisi.

Essentse likööri-, kompeeki- ja limonaaditööstustele. Maitseaineid majapidamiseks.

KOSMEETIKAVAHENDID „**ISIS**“ JA „**PA-MU**“

*A./S. „Ephag’i“ keemia-farmatsöitiliste laboratooriumide saadused on hinnatud 1932. aasta arstiteaduslikul näitusel Tartus esimese auhinnaga.*

---



---

# „Eesti Rohuteadlane“

## 1936. aastal

algab oma 11-dat aastakäiku.

### „EESTI ROHUTEADLANE“

edumeelne farmatsöitiline kutseajakiri, mille veerud kõigile kutsekaaslastele alati avatud, ilmub Tartus, Akadeemilise Rohuteaduse Seltsi ja Eesti Rohuteadlaste Ühingu väljaandel järjekindlalt üks kord kuus, iga järgmise kuu esimesel nädalal 2—2½ trükipoogna suuruses.

### „EESTI ROHUTEADLANE“

omab laialise kaastööliste pere nii kodu- kui välismail, mis tagab sisu mitmekesisust ja huvitavust.

### „EESTI ROHUTEADLASE“

aastakäigud on käsitanud küsimusi nii teoreetilise kui ka praktilise farmaatsia alalt, originaalartiklitena ja referaadidena, ja on seega tähtsaks ja tunnustatud vahendiks farmatsöitkonna teaduslike ja kutsehuvide arendamisel.

### „EESTI ROHUTEADLANE“

tahab samas suunas jätkata oma ilmumist ka edaspidi, püüab oma lehekülgede arvu ja sisu väärtust senise järjekindlusega veelgi tõsta ja kõigiti kohanduda ametvendade kutsehuvidele.

### „EESTI ROHUTEADLANE“

omab kindla ja püsiva tellijate ringkonna, järjekindlalt kasvava ja suureneva, mis kõige kindlamalt tagab ajakirja korralikku ilmumist ja edu.

---



---

## „EESTI ROHUTEADLASE“

toimetusse kuuluvad: prov. J. Koitnõm, kaitseväge ülemparmatsõit ja apteeker Tallinnas; dr. E. Labi, Viljandi Linna Apteegi juhataja; dr. H. Paris, ülikooliapteegi juhataja; mag. A. Äniline, van. assistent T. Ü. Farmatsõitilise keemia Instituudis; dr. N. Veiderpass, T. Ü. Galeenilise farmaatsia õppejõud. Vastutav ja tegevtoimetaja on mag. K. Puusepp Tallinnas,

## „EESTI ROHUTEADLASE“

toimetus ja talitus asub Tartus, Rõõtu 2, abitoimetus — Tallinnas, Lai tn. 38.

## „EESTI ROHUTEADLASE“

tellimisi võtavad vastu peale talituse ja kõigi E. V. postkontorite veel: Tartus, mag. A. Äniline, Rõõtu 2, ja Tallinnas prov. Koitnõm, Lai 38, mag. K. Puusepp linnaapteegis ning hr. Põllundi, ka linnaapteegis.

## „EESTI ROHUTEADLASE“

tellimishind on aastas: kr. 4.—, ½ aastas kr. 2.—.

## „EESTI ROHUTEADLASE“

eelmisi aastakäike on talitusest veel saada.

Need aastakäigud sisaldavad kestva väärtusega teaduslikke artikleid, kutsekõimuste alal aga kujutavad alati huvipakkuvat peatükki farm. kutsetegevuse arenemisest iseseisvas Eestis. Igale kutsekaaslasele on nende vananematu sisuga tutvumine väga tähtis.

## KELLE NIMI

täna veel ei leidu „EESTI ROHUTEADLASE“ tellijate nimestikus, telligu „EESTI ROHUTEADLANE“ omale aegsasti, sest „EESTI ROHUTEADLASE“ kaudu kõigi tähtsamate kutsekõimustega kontaktis olla on iga kutsekaaslase otsekõhene kohus.

# Tartu Ülikooli

## Bakterioloogia Laboratoorium

---

Tartus, Aia tän. 46, tel. 2-17

### Reactogen

AMPULLID

Stafülokokkide, streptokokkide ja pneumokokkide põhjustatud nakuste raviks — erysipelas, furunculosis, angina etc.

### Fluorol

TABLETID

Mitmekesise etioloogiaga tupelima-  
naha põletikkude ja düsfunktsioonide  
alusel tekkinud vooluste (fluor  
albus) raviks.

# VEIERNER MIEHIKS

*Beiersdorfi saaduste esindaja*

TALLINN, VENE 19, TEL. 455-38, 456-12

*Aolan*

*Capsiplast*

*Cornina*

*Elastocorn*

*Elastoplast*

*Eucerinum anh.*

*Gonostyli*

*Guttaplast*

*Hansaplast*

*Hansaplast elast.*

## NIVEA-KREEM

Nivea hambapasta

Nivea õli

Nivea seep

Nivea lasteseep

Nivea näovesi

Nivea suuvesi

Nivea huulepulgad

Nivea ihupuuder

Nivea takajuureõli

*Konnasilmaplaastrid*

*Konnasilmarõngad*


*Leukoplast*

*Liantral*

*Nabiline*

*Umbiline*

*Pandigal*



Destillimisaparaadid  
 Vakuumaparaadid  
 Sterilisaatorid  
 Infundiiraparaadid  
 Perkolaatorid  
 Laboratooriumipressid

*Samuti kõik laboratooriumide sisseseaded  
ja arstikabinettide tehnilised sisseseaded.*

*Vase-, masina- ja aparaatidevabrik*

F I R M A

**A. HOFRICHTER**

**Tartu, Kaluri tän. 43, telefon 7-36.**

# Keemiatööstus „AKS“

Tartus, Aleksandri 46



**Putukamürk „Kadu“** on mõjuvamaid ja kangemaid vahendeid kõikide külmavereliste putukate nagu: lutikate, prussakate, kärbeste, sääskede, koide, kirpude jne. hävitamiseks. ● KADU mitte ainult ei uimasta, vaid **tapab kindlasti** kõik putukad, kes temaga kokku puutuvad. ● KADU on täiesti kahjuta inimestele ja loomadele. ● KADU on teaduslikult ja praktiliselt proovitud ja **ainus** Tartu Ülikooli Entomoloogia Katsejaama poolt soovitatud putukatõrje vahend.

**„Rotinol“** on kindlmaid vahendeid rottide, hiirte, põldhiirte ja muldrottide hävitamiseks. Müügil pasta kuju ja terades. ROTINOL aja jooksul oma mõju ei kaota. ● ROTINOL on proovitud ja soovitatud Tartu Ülikooli Entomoloogia katsejaama poolt.

## Seelivalerik „Veronika“

Tartus, Aleksandri 16, tel. 8-30

### SOOVITAB

- ▮ Rohelist seepi med. ja tehn.
- ▮ Bor-Thymol seepi
- ▮ Väävliseepi
- ▮ Tõrvaseepi
- ▮ Karbolseepe
- ▮ Shampoo
- ▮ Blondol-Shampoo
- ▮ Kummeli shampoo
- ▮ Hambaseep Monopol
- ▮ Kreeme ja igasuguseid teisi seepe rikkalikus valikus

# JOH. LORUP'i

## KLAASIVABRIK

VALMISTAB

**APTEEKIDE, ROHUKAUPLUSTE ja  
LABORATOORIUMIDE**

jaoks parimast valgest ja pruunist klaasist  
igat liiki korgitavaid ja lihvitud korkidega  
rohupudeleid, materjali pudeleid, materjali  
purke.

Pealkirjadega

seisupudeleid ja seisupurke, tilkpudeleid.

Seotavaid ja kaanega

salvipurke.

Vintkaelaga

lõhnaõli-, lõhna- ja eliksiiride-pudeleid.  
Rohusissevõtmisklaase / Lapseklaase / Irri-  
gatoore ja uriinklaase / Lehtreid / Veinibal-  
loone ja veinipudeleid / Klaastorusid.

Apretuur-, Liimi-, Tindi-, Tushi-, Äädika j. m.  
pudeleid.

*Tellimiste täitmine kiire ja korralik.*

KONTOR:

Tallinn, Viru 11. Kõnetr. 447-01

VABRIK:

Kõnetr.  $\frac{428-49}{77}$   
Kõnetr. 428-49  
Kõnetr. 77



Π A

7477

133 574V