

A-5783

Kogerman-Männik-Mahlstein

LOODUSEÕPETUS

Ühtluskooli IV õppeaasta

Viies trükk

K./Ü. „Loodus“, Tartus

1927

58097

Kogerman-Männik-Mahlstein

Looduseõpetus

Ühtluskooli IV õppeaasta

Viies trükk

~~11388~~

K.-Ü. „Loodus“, Tartus

1927

K.-Ü. „Looduse“ keeleline korrektor Tartu Ülikooli eesti keele lektor
J. V. Veski.

Tehniline korrektor A. Estam.

2



A-5783

K. Mattiesen'i trükk, Tartus.

Eessõna.

Paljude meie loodusloo-õpetajate korduvaks nõudeks on olnud loodusloo õpperaamat, mis käsitleks ühtluskooli neljanda, viienda ja kuuenda õppeaasta eluta kui ka elusa looduse kursust õppekavade ulatuses. Sellele soovile vastu tulles ja tugeses moodsale loodusloo järjestusele ning käsitlusele esinevad käesoleva raamatu autorid kogutööga „Looduseõpetus“, mis ilmub ühtluskooli IV, V ja VI õppeaasta kursustena. Eluta looduse kursust käsitleb P. Kogerman, elusa looduse osa H. Männik ja inimest L. Mahlstein.

Raamatu korraldamisel on õppekava arvustavalt võetud; seletuskirja näpunäiteid on silmas peetud.

Raamatu käsitlus püüab läheneda töökooli loodusloo-õpetuse nõudeile, niipalju kui see meie praegustes koolioludes on võimalik.

Kehade ja nähtuste tundmaõppimine algab kõige pealt õpilaste iseseisvaist vaatlusist. Sellele järgneb seletav ja kirjeldav osa. Lõpuks pöörduvad õpilased jälle tagasi iseseisvale kordavale tööle, lahendades ülesandeid ja küsimusi. Suurt rõhku on pandud joonistamisele. Kodumaa majandusele kasulikud nähtused on esitatud tulususe seisukohalt. Tööde juures peab õpilane vahet pidamata kasutama vaatluste-kaustikut. Kõik vaatlused, ülesanded ja küsimused tuleb korralikult lahendada, nende arvu võib õpetaja ennemini suurendada kui vähendada.

Eluta looduse neljanda õppeaasta esimesed tunnid on üleminekuks koduloost puht-looduseõpetusele. Arvesse on võetud ka koduloo-tundidel omandatud teadmised. Füüsikat ja keemiat kui ferialasid ei ole sel astmel käsiteldud. Samuti on autorid hoidunud liiga täpsaist määranguist, tugeses tähtsamate kasvatusteadlaste arvamisele. Taimedeosas on materjal asetatud läbi-

võtmise järjekorras, kuna aga loomad ja inimene on käsiteldud alanevas korras. Sügise- ja kevadekursuseks on valitud taimed, mida kodumaal vastavail aasta-ajul igal pool kergesti võib saada. Taimede talvekursuses puudutatavad küsimused on esitatud peajasjalikult vaatluste ja küsimustena. Zooloogilisi esindajaid tuleks õpetajail vastavail võimalustel puudutada, selleks on nad raamatuse kirjeldatud ka võimalikult iseseisvate ühikutena. Inimene on esitatud ainult lühikese sissejuhatusena.

Kursuse läbivõtmisel soovivad autorid silmas pidada õppekava järjekorda. Raamatusse on katsutud võtta selgitavaid pilte võimalikult rohkel määral; puuduvad ju paljudes meie koolides tarvilikud tabelid. K.-Ü. „Looduse“ heasooviliste uuenduspuüete tõttu on võimalik raamatusse ka värvilisi tahvleid mahutada.

Raamatu korraldamisel on kasutatud järgmiste autorite töid: venekeelseid — Vassiljev ja Kostšenko, Susman, Zinger, Gerd, Okunjkov, Botš, Wagner, Trojanovski, Kapelkin, Polovtsov, Saint-Hilaire j. t.; saksakeelseid — Kraepelin, Reinfurth, Clasen-Lorenzen-Fitschen, Schmeil, Sommer, Niessen, Twiehausen, Meyer j. t.; ingliskeelseid — Hill, Webb, Shann, Briggs ning McPherson ja Henderson.

Peatükk „mõõtmine“ on osalt aritmeetikatundide kordamine, kus käsitellakse ka mõõtmist, ainult teiselt seisukohalt; mõne definitsiooni eest võlgneb selle peatüki autor tänu hr. K. Veskile ja J. Grünthalile.

Keelelisele korrektorile J. V. Veskile, kes oma lahket kaastööd ei keelanud, avaldame siinkohal tänu.

Autorid oleksid tõsiselt rahuldatud, kui raamat meie õpetajate seas rohkem poolehoidu leiaks.

15. augustil 1922. a.

Tartus.

Autorid.

Käesolev trükk on eelmise trüki kordamine vähemate mitteiluliste muudatustega.

1. IX. 1927. a.

Autorid.

Eluta loodus.

Maapind.

Muld.

Vaatlused. Vaatle maapinda õues, aias, kraavikaldal!
Vaatle järve-, jõe-, mere-äärset maapinda ja kalda ehitust!

Maapinnal näeme aasu, väljasid, võsastikke ja metsi. Maa pealmist kihti, kuhu taimed juurtega kinnituvad, kutsutakse mullaks. Muld on inimesele väga tähtis, sest mullast oleneb kõikide taimede kasv. Leidub kohti maakeral, kus muldkate puudub; seal moodustab maapinna liiv või paljas kivi. Mullakiht on kaunis kore; tema all leiame liivakivi või lubjakivi tiheda kihi. Seda kihti, mis mulla all lasub, kutsutakse aluspinnaks. Värskest kaevatud augu küljel võib näha, kuidas aluspind pikkamööda mullapinnaks üle läheb (1. joon.). Aja jooksul on mullapind aluspinnast tekkinud. Mulla paksus pole igal kohal ühesugune: mõnes paigas, näit. Põhja-Eesti rannikul, on ta vaevalt paari tolli paksune, teises paigas, nagu Lõuna-Venemaal, ulatub mullapinna paksus kolme arssinani.



1. joon. Muld ja aluspind. 1 ja 2 — aluspind, 3 — mullapind.

Harilikult sisaldab muld liiva ja savi, mis segatud on mustja ainega — huumusega. Huumus tekib looma- ja taimejäänuste mädanemisel. Mulda, mis rikas huumusest, nimetatakse mustmullaks. Mõni muld sisaldab veel palju lupja.

Ülesanded ja küsimused. 1. Joonista (umbkaudu) üles jõe- (järve-) või kraavikaldal nähtavale tulevad kihid nende loomulikus järjekorras! 2. Võta aiast või väljalt paar peotäit mulda, korja suuremad kivitükid välja ja laota paberile, aseta paber mõneks tunniks tuule kätte, päikesepaistele või sooja kohta! Missuguseks on muld kuivamisel muutunud? 3. Võta kuiva mulda, riputa portselankausikesse ja hakka kuumutama! Sega aeg-ajalt mulda kausikeses! Märgi kaustikusse kõik, mida sa kuumutamise ajal tähele paned! Kas põleb muld täiesti ära? 4. Riputa kuiva mulda vette (klaasis) ja sega hästi! Mida sa näed klaasis tunni aja pärast?

Liiv.

Vaatlused. 1. Võta peotäis liiva ja vaatle hästi üksikuid teri; kas on nad kõik ühesugused? 2. Pane tähele taimi, mis liivasel pinnal kasvavad!

Puhas liiv on valge, niisugust liiva leiame aga harva; harilikult on liiv kollakas. Kollaka karva annab liivale raud, mis liivale juurde on segunud. Liiv koostub üksikuist teradest, mis pole üksteisega seotud. Liivatera läigib kui klaas. Ta on õige kõva, — löikab klaasi, ja nuga ei hakka tema peale. Liiv laseb vett kergesti läbi, kusjuures sogane vesi liivast läbi nõrgudes saab puhtaks. Märjast liivast võib „koogi“ valmistada, see aga laguneb kuivamisel ära.

Maakera pinnal leiduvad suured maa-alad, mis on ainult liivaga kaetud. Seesuguseid kohti nimetatakse kõrvedeks.

Palju liiva leiame ka mererannalt. Lained kannavad („uhavad“) liiva alatasa kaldale ja jätavad ta sinna maha. Tuul kuhjab liiva hangedeks ehk luideteks (2. joon.); ta kannab liiva kergesti ühest kohast teise ja tihti matavad tuiskliiva hanged viljakandjad kohad endi alla. Inimesed katsuvad liivahangede liikumisele piiri panna, istutades tuiskliivale taimi, mis liivasel pinnal võivad kasvada. Omavahel põimudes koovad taimede juured võrgu, mis liiva paigal hoiab. Liivane maa laseb



2. joon. Liivahanged ehk luited.

vihma- ja luevett kergesti läbi, mis sügavamaisse maakihtidesse nõrgub. Seepärast kannatavad taimed liivasel maal veepuudust.


Liiva tarvitatakse (ühes teiste ainetega) telliskivide ja klaasi valmistamiseks. Klaasi valmistamine sünnib järgmiselt. Puhast valget liiva segatakse taimetuhaga ehk potassiga, lisatakse lupja juurde ja segu pannakse pottidesse, mis tulekindlast savist valmistatud. Potid asetatakse isesugusesse ahju. Kõrge kuumuse käes hakkab liiva ja potassi segu sulama. Sulast klaasist valmistatakse mitmesuguseid klaasnõusid. Kuidas klaasite-



3. joon. Klaasitehases.

hases (3. joon.) sula segu käsitletakse, oleneb valmistatavast klaasnõust. Paljusid asju, näit. pudeleid, valmistatakse puhumise teel. Sula klaasi võetakse peene raudtoru otsa ja pistetakse sellekohasesse valemisse (vorm, mudel). Puhudes raudtorru sunnitakse venivat klaasi valemi kuju omandama. Suuremais tehastes valmistatakse pudeleid nüüd masinate abil; esiti valmistatakse kael ja pudel puhutakse surutud õhu jõul. Kui värvilist klaasi tahetakse saada, siis lisatakse klaasisegule mitmesuguseid aineid juurde.

Ülesanded ja küsimused. 1. Katsu liivatera äärega klaasi kriimustada! Kas kriimustab? 2. Võta klaaslehter, aseta keeduklaasi peale, pane pehmet tükk vatti põhja ja vala peent liiva lehtrisse! Vala nüüd viinaklaasi-täis vett juurde! Mis sünnib? Vala veel paar klaasi-täit vett liiva! Mis sünnib nüüd? (4. joon.). 3. Võta veega täidetud klaas ja riputa puhast liiva vette! Mis sünnib veega? liivaga?



4. joon. Liiv laseb vee läbi.

Savi.

Vaatlused. 1. Vaata, kas tuleb savikiht kuskil naabruses nähtavale. Vaata savist kohta peale vihma ja võrdle teda liivase kohaga (loigud)!

Savi on mitut karva: valge, kollane, punane, sinakas jne. Täiesti puhas savi on valge; seesugust savi nimetatakse kaoliiniks; harilikult on savi teiste ainetega segatud. Kuiv savi on kõva kui kivi, vasaralöögid purustavad ta kildudeks. Valades kuivale savile vett näeme, et savi vett neelab, endasse imeb, ja veega läbi-imbunud savi muutub pehmeks ning venivaks; säärasest savist võib mitmesuguseid asju valmistada. Ta ei lase vett läbi ja seepärast koguneb vihma ajal savisel pinnal vesi loikudeks. Looduses leidub savi väga sagedasti: mõnes paigas lasub ta kihtidena, mis mitusada silda paksud ja mis sadade verstadeni ulatuvad. Meie maa põhjarannikul leiame mitmel pool ka sinakat savi.

Palaval ajal paatub savine maapind, s. o. kuivab kõvaks, mille tagajärjel taimede juured temas ei saa kasvada. Vihmavee mõjul muutub aga savikiht pehmeks tainaks ja liigne vesi paneb taimed mädanema. Nii siis ei ole liiga savine maapind taimekasvule kasulik.

Harilikust savist põletatakse telliskive, valmistatakse pot-tisid, kaussisid j. m. Kaoliinist valmistatakse portselan-nõusid: tassid, taldrikuid, vaase jne. Savist valmistatud nõud lastakse ära kuivada ja põletatakse siis sellekohaseis ahjudes.

Põletatud savi ei ime endasse vett ega lähe pehmeks, vaid laseb vett läbi. Et potte veekindlaks teha, vaabatakse neid, s. o. nende pind kaetakse peale esimest põletamist isesuguse vedela seguga, mis muutub uuel põletamisel kõvaks, klaasjaks korraks.

Ülesanded ja küsimused. 1. Võta tükk kuiva savi ja katsu seda vasaraga purustada! Hõõru üks osa savi uhmrís peeneks! 2. Katsu kuiva savitükiga klaasi kriimustada! Kas kriimustab? 3. Puhu savitüki peale hingeõhku ja nuusuta? Kas on lõhna tunda? 4. Võta suur lehter, pane vatitükk põhja ja riputa lehtrisse peeneshõõrutud savi, sama palju kui eelmisel korral liiva (4. joon.). Vala viinaklaasi-täis vett peale! Mis sünnib? 5. Litsu niiske savi lehtris kokku, nii et savi ja lehtri seinte vahele ruumi ei jää, ja vala vett peale! Mida näed nüüd? 6. Valmista niiskest savist kausike ja lase ära kuivada! 7. Võta veega (mitte ääreni) täidetud klaasike ehk purk (silinder) ja riputa vette savipuru! Missuguseks muutub vesi? 8. Võta tükk telliskivi, katsu teda vasaraga purustada! Katsu telliskivi-tükiga klaasi kriimustada! 9. Hõõru väike telliskivi-tükk uhmrís peeneks! Vala vett puru (pulbri) peale! Kas muutub telliskivi-pulber siduvaks ja venivaks? 10. Võta klaasitäis liiva ja puista ühe kaalu-kausi peale; võta sama palju savipuru ja puista teisele kausile! Kumb on raskem? 11. Sega vähe puhast liiva savipuruga ja puista segu vette! Mis sünnib liivaga? saviga? 12. Kuidas liiva savist eraldada?

Vesi.


Vesi looduses.

Vaatlused. 1. Pane tähele veeojakeste voolu peale suurt vihma! 2. Pane tähele lainete löökisid mererannal! 3. Kas on õue peal kaevus vett? Millal tõuseb veepind kaevus? 4. Vaatle lähemalt kuue peale sadanud lumehelvet (räitsakat)! 5. Vaatle kevadel jää minekut!

Suurem osa maakera pinnast on veega kaetud: maismaad on umbes üks veerand maakera pinnast, ülejäänud osa katab vesi. Merevee maik on kibekassoolane, mis oleneb vees lahustunud sooladest. Maismaal leiame vett peasjalikult järvede ja jõgede näol. Neid toidab peasjalikult vesi, mis vih-

mana ja lumena maapinnale langeb. Vihma, lund, rahet ja kastet kutsutakse sademeteks.

Üks osa mahasadanud veest aurab ära, teine osa voolab madalamaile kohtadele, järvedesse, jõgedesse ja merre, kolmas osa imbub maapõue. Maakoarde imunud vesi tungib ikka sügavamale, kuni ta viimaks jõuab niisuguse kihini, mis vett läbi ei lase, nagu seda on savi ja tihe kivi (5. joon.). Siia koguneb ta, läbi leotades savi- või kivikihil lasuvat kihti; seesuguseid veega läbi-imbunud kihtisid kutsutakse põhjavee-kihtideks. Maakoares lasuvad kihid suuremalt jaolt längus ehk kallakult; neisse ei jää vesi mitte peatuma, vaid nõrgub allapoole. Kui põhjavee-kiht kuskil päevavalgele tuleb, siis ilmub seal vesi allikana ehk lättena. Kui veekindel kiht lasub maapinna lähedal ja pinna lang sel kohal on väike, mis vee




5. joon. Põhjavee-kiht (Q).

äravoolu takistab, siis moodustab veega läbi-imbunud ülemine kiht raba või soo. Rabad või sood tekivad veel teisel viisil, nimelt järvede kinni- ja umbekasvamise teel. Järve pinnale tekib isesuguseist veetaimedest ja samblast kate, esiti ranna ääres, kust see kate end aegamööda üle kogu järvepinna laiali laotab. See taimekord kasvab aasta-aastalt paksemaks ja võib kogu järve ära ummistada. Nii tekib soo. Kui ummistunud järve peale tungib turbasammal, siis tekib seal raba. Meie kodumaa on soode ja rabade poolest rikas. Soodest saavad alguse mitmed jõed.


Kaevud. Põhjavesi toidab ka kaevusid. Kaevu kaevatakse niikaua, kuni põhjavee-kiht ehk „veesoon“ vastu tuleb; sealt nõrgub vesi kaevu. Kui veekindel kiht on nõrgus, siis voolab vesi madalamasse kohta kokku ning on seal rõhu all. Kui nõo kohal kaevu kaevata või puurida ning põhjavee-kihini jõutakse, purskab vesi mööda auku üles. Säherdusi kaevusid nimetatakse

arteesia-kaevudeks — Prantsuse maakoha Artois' (artua) järele, kus neid kaeve esimestena on valmistatud. Arteesia- ehk puurkaevud on harilikult väga sügavad (6. joon.). Ameerikas annab üks arteesia-kaev öö-päeva jooksul 1 000 000 pange vett.



6. joon. Puurkaev (arteesia-kaev).

Vesi lumena ja jääna. Värskest sadanud lumi on pehme ja kohev; seesugusena ei püsi ta aga kaua, vaid muutub seismisel aegamööda tihedamaks. Kui kevadise sooja päikese mõjul pealmine lumekord hakkab sulama, siis imbub lumi vett täis ja muutub külmudes jääteradeks, mis kõvasti üksteise külge liituvad. Nii võib lumi aegamööda jääks muutuda. Ka maanteedel, kus talv läbi sõidetud ja lumi oli alati enam-vähem rõhu all, muutub lumi jäiseks.



7. joon. Jää paindumine.

Harilikult peetakse jääd hapraks kehaks, kuid jää võib oma kuju muuta ka murdumata. Võtame pikerguse jäätüki, seome ta üht otsa pidi pingi külge ja paneme teise otsa peale mõne raske asja, siis paindub jäätükk raskuse mõjul (7. joon.). Seda keha omadust kutsutakse plastilisuseks. Plastilisuse tõttu võib suur jääkogu oma raskuse all liikuda, edasi tungida, nagu vesi. Jää liikumist võime tähele panna kõrgeil mägedel, mida katab püsivalt kestev lumi — igilumi. Kõrg-

mäestikus valitseb aasta läbi külm ja sademetest näeme siin peajasjalikult lund. Lumi katab kõrgmägede harju aasta läbi. Suveaja vahelduva sulamise ja külmumise tõttu ning mõnel pool ka ülemiste kihtide rõhu all muutub lumi teraliseks — sõmerlumeks ehk firniks. Aja jooksul muutub firn firnjääks. Raskuse mõjul hakkab jää pikaldaselt mööda mäeveerusid alla libisema. Sitkuse ja plastilisuse tõttu ei murdu see liikuv jäämass, vaid tekitab „jääjöe“ ehk jääliustiku (8. joon.) Ühe




8. joon. Jääliustik

jääliustiku peale ehitati hurtsik; aasta jooksul kandis jää hurtsiku 50 sülda edasi ja 14 aasta pärast oli ta esialgsest ehitusepaigast juba $1\frac{1}{2}$ versta kaugusele jõudnud.

Talvel katab meie maal lumi maapinda ja jää jõgesid ning järvi. Kaugel põhjamaail ning kaugel lõunas katab jää maad ja merd aasta läbi. Suvel tekivad jäässe praod, lained rebivad üksikud pangad lahti ja kannavad ulgumerele. Mõned lahtirebitud jääpangad on mitu versta pikad ning laiad ja moodustavad ujuvad jääväljad. Kui jääliustik nabamail tekib, siis ei sula

ta sisemaal, vaid ulatub otsaga merre. Merre libisemisel murdub jää üksikuiks pankadeks; need on mõnikord kohutavalt suured, kuni 50 silda kõrged, aga palju suurem osa jääpangast




9. joon. Jäämägi.

on vee all. Sääraseid hiiglasuuri ujuvaid jääpankasid nimetakse jäämägedeks (9. joon.). Tuul ja merevoolud kannavad neid merel edasi; sooja vöösse sattudes sulavad nad aegamööda ära. Sagedasti ümbritseb jäämägesid udu. Jäämäed on laeva-sõidule väga kardetavad. Põrgates kokku jäämäega teel Euroopast Ameerikasse hukkus 1912. a. hiigla-reisijatelaev „Titanic“; üle pooleteise tuhande reisija leidis külma-des voogudes omale haua.

Ülesanded ja küsimused. 1.

Võta kaks klaastoru, ühenda nad kummitoruga ja täida mõlemad veega! Ühe toru ots olgu peeneks toruks tõmmatud (10. joon.). Hoi torud esmalt ühekõrgusel, lase siis peene otsaga toru järsku allapoole! Mida näed?

2. Võta pikergune jäätükk, aseta ta kahe pingsi otsade peale ja pane



10. joon. Katse, mis artesias-kaevu tegevust seletab.

peen traatling üle jää keskpaiga! Seo traadi külge mõni raske asi, nagu tina- või terasetükk, ja lase mõni aeg seista! Kas löikub traat jäässe?

Lahustuvus vees.


Vaatlused. 1. Pane tähele, mis juhtub suhkrutükiga, kui see kuuma tee sisse panna! 2. Mis aitab suhkrul sulamisele kaasa?

Eespool nägime, et kui puhast liiva vette puistata, siis vajub liiv põhja, kuna vesi selgeks jääb. Korrates katsed saviga näeme, et savist läheb vesi sogaseks. Jõed ja ojad kannavad endi veega alati liiva- ja saviosakesi ühes; jõesuus, kus voolus nõrk, langevad niisugused veega ühes kantud ained, lisandid, pikkamööda põhja.

Võtame veega täidetud klaasi ja puistame $\frac{1}{2}$ teelusika-täit keedusoola vette; liigutame lusikaga vett. Aegamööda kaob sool, vesi jääb seejuures läbipaistvaks. Me ütleme: sool lahustub vees. Paneme veel $\frac{1}{2}$ teelusika-täit keedusoola juurde, ka see lahustub mõne aja järel; lisame veel lusikatäie soola juurde, nüüd ei lahustu sool enam. Lahus on küllastunud soolaga.

Võtame nüüd keedusoola asemel maarjajää, nii et ta umbes $\frac{1}{4}$ osa keeduklaasist täidaks; üks osa lahustub vees, teine osa jääb lahustumatuks. Paneme klaasi keedurõngal asuvale võrgule ja ajame vee keema. Keevas vees lahustub ka ülejäänud osa maarjajää. Tähendab, kuum vesi võib

maarjajääd rohkem lahustada kui külm. Laseme vett jahtuda; peagi hakkavad omapärase kujuga maarjajää-osakesed, maarjajää-kristallid, põhja sadestuma. Lahus on nüüd jällegi küllastunud (11. joon.).




11. joon. Kristallide saamine.

Vee kurnamine.

Vaatlused. 1. Puistame vähe kriiditolmu vette ja laseme vee läbi paberkurva. Missugune on läbinõrgunud vesi?


2. Lahustame vees vähe silmakivi ehk vasevitrioli ja laseme läbi kurna. Missuguseks on vesi läinud kurnast läbinõrgumisel¹⁾?

Kurna abil eraldame veest selles hõljuvad ained, mitte aga vees lahustunud ained. Vähest



12. joon. Paberkurn.

veehulka võib kahel viisil puhastada: esiteks, kurnates läbi puusõe, teiseks, tarvitades paberkurna (12. joon.). Kurnamispaber keeratakse kuhikuks (koonuseks), asetatakse klaaslehtrisse, nii-



13. joon. Liivkurn, 1 — vesi; 2 — peenliiv;
3 — sõmerliiv.

utatakse, et paber jääks tihedalt lehtri külge, ja valatakse soggast vett kurna. Kurnatud vesi on täiesti selge.

Süsikurn puhastab vee soggast ja sagedasti ka värvainetest. Väikesed süsikurnad ehk süsifiltrid kaotavad kiiresti oma puhastamisvõime.

Joogivee kurnamine. Paljud linnad varustavad oma kodanikke jõeveega. Jõevesi on puhastamata kujul tarvitamiseks sagedasti kõlbmatu, sest neis kohtades, kus inimesi jõe ääres tihedalt elab või teha-

1) Need katsed teeb õpetaja. Õpilased ainult vaatlevad.


sed asuvad, sisaldab vesi alati palju mustust, pisielukaid j. m., mis tervisele hädaohlikuks võivad saada. Enne tarvitamist puhastatakse jõeveet kurna abil. Üks lihtsamaist kurnadest on liivkurn (13. joon.). Seesuguse kurna moodustavad peenliiva ja sõmerliiva kihid, millest vesi pikkamööda läbi nõrgub: ühe osa vee sees leiduvaist lisanditest imeb liiv endasse, teise osa laotab ära. Puhastatud vesi koguneb torru A (13. joon.), kust teda linna juhitakse. Kurnad on kaetud, mislābi nad tolmu ja külmumise eest on kaitstud. Ameerika Ühendriikides on umbes 400 linna joogivee-kurnadega varustatud, ja nakkavate (külgehakkavate) haiguste juhtumuste arv on neis linnades pärast kurnade tarvituselevõtmist märksa vähenenud.

Ülesanded ja küsimused. 1. Pane kurna kuivi värsked sötükke! Lisa veel mõni tilk punast tinti juurde ja lase läbi kurna! Missugune on kurnatud vesi? 2. Lahusta vees mõni silmakivi-kristall ja sega kriidipuru juurde! Lase sogane sinakas vesi läbi kurna! Missugune on kurnatud vesi? 3. Missugune peab hea joogivesi olema?

Kõva ja pehme vesi.

Vaatlused. 1. Vala portselankaussi harilikku joogivett! Auruta piirituslambil vesi kausis ära (14. joon.)! Kas jääb kausi põhja midagi? 2. Katsu, kummas vees vahutab seep paremini, kas kaevu- või vihmavees?

Et vesi paljusid aineid lahustab, siis ei leia me loodusest täiesti puhast vett. Kõige rohkem leidub lahustunud lisandeid merevees; kõige puhtam on vihma- ja lumevesi. Kaevu-, allika- ja jõeveest leiame alati lisandeid, neist kõige sagedamini lupja. Vett, mis palju lupja sisaldab, nimetatakse kõvaks ehk kargeks veeks. Karges vees ei vahuta seep ja ta ei kõlba pesemiseks. Oad ja herned ei kee kõvas vees pehmeks, sest keetmisel sadetub lubi veest herneste ja ubade peale ning katab neid õhukese koorega, mis takistab kuuma vee juurdepääsu. Vihma- ja lumevett, mis vähe lahustunud lisandeid sisaldab, kutsutakse pehmeks veeks. Pehmes vees vahutab seep hästi. Mõne allika vesi sisaldab niisuguseid lahustunud




14. joon. Vee aurutamine.

aineid, mis hõlbustavad paljude haiguste paranemist. Neid allikaid nimetatakse tervisvee-allikateks.

Vee keetmine.

- Vaatlused.** 1. Missuguseid vedelikke oled keemas näinud?
2. Mille järel otsustatakse, et vesi keeb?

Läbipaistmata katlas pole võimalik tähele panna kõiki nähtusi, mis vee keetmisel esinevad; sellepärast võtame keeduklaasi ja valame tasse pooleni vett. Lisame noaotsa-täie saepuru juurde (15. joon.). Asetame keeduklaasi võrgu peale ja süütame võrgu all piirituslambi põlema. Paneme põleva küünla keeduklaasi taha, et keemisnähtusi selgemini võiks näha. Alguses ujub saepuru veepinnal. Peagi ilmuvad keeduklaasi seintele väikesed mullikesed. Need on õhumullid: ka õhk lahustub vees, kuumendamisel paisub ta ja tungib veest välja. Keevas vees ei ole enam õhku. Mõne aja pärast märkame, et saepuru osakesed vees liikuma hakkavad:



15. joon. Vee keetmine.

vajuvad alla ja tõusevad jälle üles. Neid paneb vesi liikuma. Keeduklaasi põhjas saab vesi enamini soojaks: ta on tulele lähemal; soe vesi aga on kergem kui külm ja kerkib üles pinnale, kuna külm põhja poole langeb. Uuesti vajuvad saepuru kübed — veest kantuina — alla ja kerkivad jällegi pinnale. Seesugune vee ringvool kestab seni, kuni kõik vesi ühetasa kuumaks on läinud. Mitte ainult keeduklaasi seintel, vaid ka põhjal tekivad väikesed mullikesed ja tõusevad pinnale. Aga väikeste mullikeste kõrval tekivad peagi suuremad mullid, kerkivad ülespoole, kuid ei jõua veepinnani, vaid kaovad uuesti ära.

Kui kõik vesi on ühekorruga kuum, siis tõusevad ka need mullid veepinnale ja lõhkevad siin väikese „plaksuga“, aurupilvekest sünnitades: need on aurumullid. Aurumullid sünnivad klaasipõhjaga kokkupuutuvast veekihtis, tihenevad aga esialgu pealmistes, jahedamates kihtides uuesti veeks. Mida kuumemaks läheb vesi, seda suuremaks kasvab aurumullide arv; nad panevad vee kihama. Seda nähtust kutsutakse keemiseks. Meie ei näe mitte ainult, kuidas vesi keeb, vaid ka kuuleme vee „laulu“.

Auramine.

Vaatlused. 1. Pane tähele, kuidas kuivab niiske maapind päikese käes! 2. Vala tassi vähe vett ja lase tass mõni päev lahtiselt seista! Mis sünnib veega?

Kui vesi keeb, siis tõusevad aurumullid veepinnale. Veeaur on nägematu; see aurupilveke, mida keeva vee kohal näeme, koostub imepisikestest veetilgakestest. Juba enne keemist eraldub sooja vee pinnalt auru. Kui märg riie päikese kätte nõõrile riputada, kuivab ta peagi ära; tähendab, vesi eraldub temast nägemata auruna. Samuti kuivavad peale vihma savisele pinnale kogunenud veeloigud. Seda nähtust, kus vesi muutub nägemata auruks, ilma et vesi keeks, s. o. ilma et enne tekiks aurumulle, nimetame auramiseks. Auramine sünnib ainult vedeliku vabal pinnal. Maapinnal aurab vesi alatasa ja täidab õhku vee-auruga. Nagu sool vees lahustub, nii kaob ka vee-aur õhku.


Teatav veehulk võib ainult teatava piirini soola lahustada, niisama võib teatav õhuhulk ka kindla hulga vee-auru sisaldada: õhk küllastub vee-auruga.

Kui keeva vee kohal mõni külm asi, näit. nuga, hoida, siis kattub see peagi veepiiskadega. Vee-aur tiheneb veeks. Külm õhk suudab endasse vähem vee-auru mahutada kui soe. Talvel lähevad aknad sagedasti märjaks: külm klaas jahutab sooja toaõhu ja aur tiheneb aknaklaasil veeks. Suure külmaga jäätuavad aknad, veepiisakesed külmavad jääks. Mõned ained, nagu sammal, vatt, väävelhape (lõngaõli) j. m., neelavad vee-auru. Neid tarvitatakse talvel akende kuivakshoidmiseks.

Ülesanded ja küsimused. 1. Võta kaks pudelit, vala mõlemisse ühepalju vett; jätta üks lahtiselt seisma, teine korgi kinni! Mida märkad

mõne päeva pärast? 2. Kus kuivab märg pesu kiiremini, kas tuule käes või vaikes kohas? 3. Miks aurab talvel „hingeõhk“? 4. Millest tekivad jääroosid aknale?

Vee ajamine ehk destilleerimine. Võtame keedupudeli, valame tasse umbes pooleni vett, paneme korgi, millest painutatud klaastoru läbi käib, talle peale, asetame keedupudeli võrgule ja juhime klaastoru katseklaasi, mis asub külma veega täidetud klaasis (16. joon.). Süütame võrgu all piirituselambi põlema. Mõne aja pärast hakkab vesi keedupudelis keema ja aur tungib klaastoru kaudu katseklaasi. Külmas katseklaasis jahtub vee-aur ja tiheneb ehk kondenseerub veeks.



16. joon. Vee destilleerimine.


Säärast toimetust, nagu siin kirjeldatud, kus kinnises anum as vesi keema aetakse ja aur uuesti veeks jahutatakse, nimetatakse, vee destilleerimiseks ehk läbiajamiseks. Lisame keedupudelis keeväle veele mõne tilga tinti juurde, siis värvub vesi keedupudelis, katseklaasi koguneb aga täiesti puhas vesi. Kurnamine vabastab vee sogast, s. o. lahustumata lisanditest, kuna destilleerimine vee ka lahustunud lisanditest vabastab. Destilleerimisel saame täiesti puhta vee.

17. joonis kujutab suure veehulga destilleerimist. Parem pool on anum, milles vesi keema aetakse, ja pahemal pool jahuti, kus vee-aur uuesti veeks kondenseerub.

Ülesanded ja küsimused. 1. Võta keedupudelisse vett, milles mõni silmakivi-kristall on lahustunud, ja destilleeri! Missugune on vesi kogujas? 2. Vala destilleeritud vett portselankaussi ja auruta ära! Kas jääb kaussi midagi?

Pilved ja udu. Vesi aurab maapinnal alatasa: niiske muld, järved, jõed ja mered saadavad vee-auru õhku. Vee-aur läheb õhus laiali; ta on nägematu ja me ei märka teda. Õhku, mis palju vee-auru sisaldab, kutsutase niiskeks; kuivas õhus leidub vähe vee-auru. Eespool nägime, et teatav, piiratud

õhuhulk ainult teatava hulga vee-auru võib sisaldada; sedasama võib oletada kogu õhumere kohta, mis teatavat maa-ala katab. Mida soem on õhk, seda enam võib ta endasse vee-auru mahutada; kui õhk jahtub, siis langeb ta aurumahutamise-võime: üks osa aurust tiheneb veeks. Need tihenenud veepiisad on imetillukesed ja heljuvad vabalt õhus. Kui me talvel väljas hingame, siis aurab ka väljahingatud õhk. Vee-aurude tihenemine toimub looduses vahet pidamata. Näiteks, suvel või soojal kevadisel päeval aurab vesi jõgedes, soodes ja järvedes. Niiskeis




17. joon. Vee destilleerimine suuremal määral. A — katel, kus vesi auruks muutub; B — toru jahutisse; C — jahuti; D — jahutusevee sissevoolu toru; E — jahutusevee väljavoolu toru; F — destilleeritud vee koguja.

kohtades on õhk vee-auruga enam-vähem küllastunud. Kui nüüd soojale ilmale järgneb külm öö, siis jahtub õhk ja ei suuda endas enam niipalju auru hoida kui päeval: vee aur küllastab õhu ja tiheneb siis veepiisakesteks, moodustades u d u. U d u pole muud midagi kui „nähtav“ vee-aur.

Kõrgeil mägedel on õhk alati jahedam kui all orus; ka pealmised õhukihid on jahedamad kui alumised, maapinna lähedal olevad. Soe õhk an aga kergem kui külm. Kui rikkalikult vee-auruga täidetud soe õhk ülespoole kerkib, külmemate õhukihidega kokku puutub, siis küllastab vee-aur esiti õhu ja tiheneb veel kõrgemal u d u ks, mis meile maa pealt vaadates

pilvena paistab. Nii on siis pilv ainult udu, mis maapinnalt kõrgel heljub.

Sademed. Kui sooja tuppä klaasitäie külma vett toome, kattub klaas niiskusega. Kokku puutudes külma klaasi seintega jahtub soe toaõhk; ühes õhuga jahtub ka selles peituv vee-aur ja sadestub klaasile veepiiskadena. Suure külma käes jäätvad need piisakesed. Kirjeldatud viisil tekivad looduses kaste ja härmatis. Maa läheb päeval kiiresti kuumaks, aga niisama kiiresti jahtub ta öösi. Külma maapinna juures jahtub õhk; kui



18. joon. Lumeräitsakad.

õhus palju vee-auru leidub, siis tiheneb see ja langeb maapinnale, rohu, põõsaste j. m. peale kaste n a. Talvel külmub kaste härmatiseks. Sattudes külmemasse õhukihti koonduvad veepiisakesed pilves suuremaiks piiskadeks; neid ei suuda õhk endas enam kanda ja piisad langevad vihm a n a maapinnale. Talvel muutub vee-aur õhus pisikesteks jäändel-

teks, mis ühte külmudes lumehelbed sünnitavad (18. joon.). Lumehelvetel ehk -räitsakatel on väga mitmesugune kuju.

Ülesanded ja küsimused. 1. Kas on külma vee-auru näha? 2. Kuidas kuivab talvel märg pesu külma käes? 3. Mispärast ei saa suure külma „lumesõda“ pidada?

Kehad.

Vaatlused. 1. Nimeta asju, mida sa näed oma ümber toas ja õues. 2. Pane „tühi“ klaas kummuli vette! Kas täidab vesi klaasi? 3. Kuidas saad klaasi veega täita?


Kõike seda, mida enda ümber näeme: loomi, puid, kive, päikest ja tähti ning ka teisi inimesi, — kõike seda, mida inimene oma käte abil pole teinud, nimetame looduseks. Asju, mis inimene on valmistanud, nimetame kunstlikeks asjadeks ehk kehadeks, kõik teised meid ümbritsevad asjad on looduslikud kehad.

Me nägime, et vesi võib olla mitmes olekus: jääna on ta tahke (kindel) keha, veena — vedel keha ehk vedelik ja auruna — gaasiline keha. Ka kivi, kriit ja raud on tahked kehad, piiritus ja õli — vedelikud ning õhk — gaasiline keha. Tahkeil kehadel on kuju, mida nad alal hoiavad; kivitüki võime lauale panna, ilma et ta kuju seejuures muutuks. Et kivi välimust, kuju muuta, teda purustada, selleks peame jõudu tarvitama. Tahkeile kehadele on ainult alust vaja, mille peal nad seisavad. Vedelikel puudub kindel kuju, neid peab nõus hoidma, s. o. alt ja külgedelt piirama, tuge andma, — muidu jookseb vedelik laiali. Vedelik omandab selle nõu ehk anuma kuju, millesse ta on valatud. Ka gaasidel pole kindlat kuju; peale selle ei hoiavad oma ruumala, s. o. ruumi, mida iga keha täidab, alal; gaasidel on tung laiali laguneda ehk hajuda. Kui meil vaja on gaasi alal hoida, siis peame ta täiesti kinnisesse nõusse juhtima, näit. pudelisse, ja kõvasti kinni korkima (kummkorgiga).

Raskus ja raskuse mõõtmine. Võtame rauatüki pihku; rauatükk rõhub peo peale, püüab kätt alla vajutada. Laseme rauatüki käest lahti, ta langeb maha. Võtame pliiatsi kätte, ka pliiats rõhub käe peale, ehk küll mitte nii tunduvalt kui rauatük. Käest lahtilastud pliiats langeb samuti maha. Iga keha tungib maa poole ja rõhub alust, millel ta seisab. Seda kehade omadust nimetatakse raskusetungiks ehk raskuseks.

Igal kehal on teatav raskus, ühel suurem, teisel vähem. Seome rauatüki kõva nõõri otsa ja hoiame teisest nõõri otsast kinni — rauatükk tõmbab nõõri pingule. Laseme nõõri otsa käest lahti, siis langeb rauatükk maa poole, sihis, mida pinguli olev nõõr esmalt näitas. Seda sihti, milles vabalt langev keha maa poole liigub, nimetatakse püst-, lood- ehk vertikaalsihiks. Püstihti määratakse loe ehk loodlaua abil. Lood on niit, mille otsa on seotud mõni raske keha, näit. teraskuul. Vaba veepind on püstisihiga ristis ehk perpendikulaarne. Vaba veepinna ehk horisontaalset sihti määratakse vesiloodiga. Vesilood valmistatakse vähe painutatud klaastorust pannakse üks ots kinni, kallatakse vett täis, nii et ruumi jääb ainult ühele õhumullikesele, ja pannakse siis ka teine ots kinni. Toru kinnitatakse puulauakese külge, kumerus ülespoole. Kumera koha kes-

kele on kriips tõmmatud. Kui lauake toruga maha panna, tungib õhumull kõrgemale kumerusse, s. o. kriipsukohale.



19. joon. Kangkaal.

kaused on tühjad, siis peab kang vesiloodis püsima.


Raskuse põhimõõt on gram (g), mis võrdub ühe kant-sentimeetri puhta vee raskusega.

1000 grammi = 1 kilogramm.

1000 kilogrammi = 1 tonn (meetertonn).


1 nael = 409 grammi (28. joon.).

Ülesanded ja küsimused. 1. Valmista lood ja vaata, kas lähevad toa seinad loodsihiga ühte! 2. Vaata vesiloe abil, kas koolilaua pind on rõhtus! 3. Kuidas saab loodi ja täisnurga abil rõhtsihti määrata? 4. Kirjelda, missuguseid kaalusid oled sa näinud! 5. Kuidas võib kaalude abil antud rauatüki raskust teada saada? 6. Mitme naelaga võrdub üks kilogramm? 7. Mitu grammi kaalub üks teeklaasi-täit vett, kui vee ruumala on 200 sm³? Kaalu ära!



20. joon. Kaalupommid ehk vihid.

Erikaal. Kaupluses leiba ostes märkab igaüks, et leiva ruumala on palju suurem kui teisel kaalukaasil asuva pommi ruumala, ehk ta küll on leivaga üheraskune. Ka nael lambiõli ehk petrooleumi on ruumala poolest palju suurem kui teda tasakaalus hoidev kaalupomm. Võtame ühte kätte raudkuuli ja teise kätte sama suure puukuuli, siis tunneme, et raudkuul on raskem. Nii siis ei olene keha raskus mitte ainult antud keha suurusest, vaid ka aimest ehk materjalist, millest keha on tehtud. Kehade raskust võrreldakse teatavate raskuse-mõõtühikutega.



21. joon. Keha erikaalu määramine.

Raskuse põhimõõt on gramm; ta võrdub kindlaksmääratud vee-ruumala raskusega. Inimesed on kokku leppinud võrrelda kõikide kehade raskust vee raskusega. Kui teatava keha ruumala on võrdne vee ruumalaga, siis, jagades keha raskuse, ükskõik mis ühikutes, vee raskusega, saame arvu, mida nimetatakse keha erikaaluks; see näitab keha raskust veeraskuse suhtes, kui ruumalad on ühesuurused.

Näiteks on hõbeda erikaal 10, aga männipuu erikaal $\frac{1}{2}$, see tähendab, et hõbe kümme korda rohkem kaalub kui hõbeda ruumalaga võrdne veemass, kuid puu raskus on ainult $\frac{1}{2}$ vee raskusest. Antagu meile vett, hõbedat ja puud, igaüht üks kantsentimeeter. Eespool-toodud seletusest selgub, et vesi kaalub 1 grammi, hõbe 10 grammi ja puu $\frac{1}{2}$ grammi; järjekult, arv, mis näitab,

mitu grammi kaalub ühe kantsentimeetri suurune keha, võrdub keha erikaaluga.


$$\text{Erikaal} = \frac{\text{raskus}}{\text{ruumala}}$$

kui raskus on antud grammides ja ruumala kantsentimeetrites.

Erikaalu leidmiseks kaalutakse antud keha ja mõõdetakse tema ruumala ära; siis võrreldakse keha kaalu võrdse ruumala vee kaaluga (21. joon.). Kui on mõni niisugune keha, mis vees lahustub, näit. suhkur, ja takistus tekib tema ruumala mõõtmisel, siis võetagu mõni muu vedelik, milles suhkur ei lahustu, näit. õli, ja mõõdetagu selle abil keha ruumala (22. joon.).

Erikaalude tabel.

kuld	19.3	alumiinium	2.6
tina	11.4	tammepuu	0.8
hõbe	10.5	kuusepuu	0.5
vask	8.9	kork	0.2
raud	7.8	vesi	1.0
elavhõbe	13.6	piiritus	0.8
petrooleum	0.8	eeter	0.73




22. joon. Ligikaudsed ruumalad, mida täidab 1 gramm mitmesuguseid aineid. 1 — kuld, 2 — tina, 3 — hõbe, 4 — vask, 5 — raud, 6 — alumiinium, 7 — tammepuu, 8 — kuusepuu ja 9 — kork.

Ülesanded ja küsimused. 1. Leida raua erikaal, kui rautükk kaalub 75 grammi ja tema ruumala on 10 cm^3 . 2. Kuidas elavhõbeda erikaalu teada saada? 3. Kuidas saab korgi erikaalu määrata? 4. Mitu puuda kaalub tahatud männipalk, mille pikkus on 8 m, laius — 25 sm ja paksus — 12 sm? 5. Mitu kilogrammi kaalub üks toop petrooleumi (ligikaudu)?

Soojus.

Vaatlused. 1. Hoiä käsi esmalt kuumas vees ja pista siis leigesse vette; hoiä pärast käsi külmäs vees ja pista siis leigesse vette! Kas tundub vesi ka teisel juhtumusel külm olevat? 2. Kuidas tundub sügäv kelder olevat suvel, kui väljast sisse tuleme? kuidas tundub ta talvel? 3. Võta kaks väikest lauätükki, löö kaks peent naela läbi niisuguses kauguses

teineteisest, et vaskraha parajasti nende vahelt läbi pääseb. Kinnita naelte otsad teiselauätükikese sisse, nii et naelte vahe jääks püsivaks (23. joon.). Võta vaskrahatangi de vahele ja aja piirituslambil kuumaks; katsunüüdraha endises seis-




23. joon. Kindla keha paisumine soenemisel.

kus naelte vahelt läbi pista (nagu joonis kujutab). Kas kuum vaskraha mahub läbi? Oota, kuni raha jahtub, ja korda katset!


Külma ja sooja tundmus oleneb põhjusest, mida me sooju-seks nimetame. Soojuste pea-allikaks maakeral on päike. Soojuste tekib ka puude, süte, öli j. m. ainete põlemisel. Sel teel saadud soojust kasutame eluhoonete soojuste alalhoidmiseks külmal ajal, toidu keetmiseks, masinate käimapanemiseks jne.

Katse vaskraha (3. vaatlus) näitab, et kindel keha paisub soenemisel ja tõmbub kokku jahtumisel. Kui katsed mõne müü metallringiga korrata, siis kordub sama nähtus. Sellepärast ei panda raudtee-rööpaid tihedalt otsapidi teineteise vastu, vaid jäetakse väike vahe. Võtame keedupudeli ja valime tema jaoks paraja läbipuuritud korgi. Korki pistame

klaastoru, mille külge paberist skaala ehk numbri laud on kinnitatud. Täidame keedupudeli ääreni värvitud veega (värviks võib fuksiini tarvitada) ja paneme korgi peale; üks osa vett jookseb üle ääre, aga teine osa tungib klaastorru. Pühime kolvi puhtaks ja soendame teda piirituslambil (24. joon.). Esmalt tõuseb vesi torus kuni *a*-märgini, vähe aja pärast langeb kuni *b*-märgini ja peale seda hakkab järjekindlalt tõusma ning võib kogu toru täita. Esialgse tõusu põhjuseks on gaasi, nimelt õhu paisumine, mille tagajärjel keedupudeli sisu suureneb. (Tuleta meelde keemisnähtust!) Pärastine tõus sünnib aga vee paisumise tagajärjel.



24. joon. Vedeliku paisumine soenemisel.



25. joon. Õhk paisub soenemisel.

See katse näitab, et vedelikud soojusest paisuvad. Kirjeldatud katse seletab meile ka keemise juures tähelepanud nähtust, et kuum vesi pinnale kerkib: kuumendamisel paisub vesi, tema ruumala suureneb, kuna tema üldine hulk kaalu järele muutumatuks jääb; järjeli-

kult muutub ka tema erikaal, ja kuum vee erikaal on külma vee erikaalust vähem, teiste sõnadega, kuum vesi on külmast veest kergem.

Seame kokku riista, nagu 25. joonis kujutab. Asetame keedupudeli veevaagnasse ja toru otsa laseme klaasi vee alla. Soendame vaagnat piirituslambil. Mõne aja pärast hakkavad õhumullid toru otsast veepinnale kerkima: õhk paisus keedupudelis soendamisel.

Katse abil jõuame otsusele, et kõik kehad paisuvad soendamisel.

Harjutused ja küsimused. 1. Miks aetakse raudvits (rehv) kuumalt rattale peale? 2. Millest tuleb õhutõmbus ahju kütmisel? 3. Siduge

kolvi kaela otsa mängu-õhupall, nii et õhk kolvist võib palli pääseda! Mida näete kolvi soendamisel? 4. Miks läheb mõnikord külm klaas lõhki, kui temasse kuuma vett valada? 5. Klaaskorgid jäävad mõnikord pudeli peale kinni; et nad ära tuleksid, soendatakse pudeli kaela tulel; miks? 6. Millal on raudtee-rööbaste otsade vahe suurem, kas suvel või talvel? 7. Kui sõrmust soendatakse, kas läheb ta siis vabamalt sõrme või mitte?

Temperatuuri mõõtmine ja termomeeter. Vesi võib olla oma soojusastme ehk temperatuuri poolest kas külm, leige või kuum. 1. vaatlus tõendab meile, et meie tunded on väga petlikud; sellepärast on tarvilik mitmesuguste temperatuuride mõõtmiseks leida täpise pealne riist. Seda riista, mille abil me temperatuuri mõõdame, nimetatakse sooja mõõtjaks ehk termomeetriks. Kehade üldomadust, soenemisel paisuda, kasutatakse temperatuuri mõõtmiseks. Termomeetri pea-osa on õõnes klaaskuulike, mis peene klaastoruga on ühendatud (26. joon.). Termomeetrit valmistades täidetakse klaaskuulike elavhõbedaga (mõnikord piiritusega või muu vedelikuga), nii et elavhõbe osalt ka torru tungib; peale seda aetakse õhk torust välja ja joodetakse lahtine ots kinni. Soenedes paisub elavhõbe kuulis ja kerkib torus, jahutudes tõmbub ta kokku ja langeb.

Võtame keeduklaasi või pesukausi, täidame ta lumega või peente jäätükkidega; toome kausi lumega tupp ja laseme lund sulada; pistame termomeetri sulavasse lumme: niikaua kui lumi (jäät) sulab, püsib elavhõbe torus ühel teataval kohal. Seda punkti nimetatakse jää sulamispunktiks (26. joonis S. P.). Võtame nüüd termomeetri ja asetame ta keeva vee auruks. Elavhõbe tõuseb torus ja jääb lõppeks peatuma ning püsib uuel kohal niikaua, kui vesi keeb. Seda punkti nimetatakse vee keemispunktiks (26. joonis K. P.). Kui tugevasti me vett ka ei soendaks, ikkagi seisab elavhõbe muutmatult keemispunktis: kõik väline soojus kulub vee auruks muutmise peale. Sulava lume ja keeva vee abil saime termomeetri jaoks kaks jäävat punkti. Vahe



26. joon. Termomeeter.

nende kahe peapunkti vahel jagatakse kas **80** või **100** võrdseks osaks. Neid osasid nimetatakse kraadideks ehk pügalateks. Kraadisid märgitakse väikese nulli abil (⁰). Jagamine 80 kraadiks annab meile Réaumuri¹⁾ (l. reomüür) skaala ehk lihtsalt Réaumuri termomeetri, mida igapäevases elus tarvitatakse; jagamine 100 osaks annab Celsiuse²⁾ skaala, mida teaduslikes mõõtmis ja arstiteaduses tarvitatakse. Lume sulamispunkti märgitakse Réaumuri ja Celsiuse termomeetritel 0°. Kraadide arvu järele kirjutatakse veel tähed R ja C, et vahet teha, missuguse skaala ehk astmiku järele kraadisid lugeda. Näit. 25° R tähendab 25 kraadi Réaumuri järele, 30° C tähendab 30 kraadi Celsiuse järele. Kraadidesse jagamist jätkatakse nii allapoole jää sulamispunkti kui ka ülespoole, vee keemispunktini. Igapäevases elus nimetatakse kraadisid allpool nulli «külma» kraadideks; neid märgitakse miinusega (—). Näit. —16°C tähendab 16 kraadi allpool nulli Celsiuse järele.

Inglismaal ja Ameerika Ühendriikides tarvitatakse veel kolmandat termomeetrit, nimelt Fahrenheit'i termomeetrit. Selle skaala järele on sulamispunkti temperatuur 32° ja vee keemispunkti temperatuur 212: vahe peapunktide vahel on **180** võrdseks osaks jagatud.

Temperatuuri ümberarvutamiseks ühest skaalast teise saame toodud seletuste põhjal järgmise võrdluse:

$$80^{\circ} R = 100^{\circ} C = 180^{\circ} F, \text{ või koondatult}$$

$$4^{\circ} R = 5^{\circ} C = 9^{\circ} F.$$

Näiteks, olgu leida toa temperatuur Celsiuse järele, kui Réaumuri termomeeter näitab 16°. 4°R võrduvad 5°C:ga ehk 1°R = $\frac{5}{4}$ C:ga, nii siis 16°R = $(16 \times \frac{5}{4})^{\circ} C = 20^{\circ} C$. Olgu veel leida piirituse keemistemperatuur F järele, mis võrdub 78°C:ga. $78^{\circ} C = (78 \times \frac{9}{5} + 32) = 172.4 F$.

Ülesanded ja küsimused. 1. Võta portselankauss, täida lumega, aseta keedurõngale ja hakka soendama! Pista termomeeter lumme, nii et ots põhja ei puutuks! Kui palju näitab soojamõõtja täpsalt? 2. Kuidas mõõta inimese kehasoojust? 3. Kui palju näitab Celsiuse termomeeter, kui on 10°, 25°, 60° ja —20°R järele?

1) Réaumur — kuulus prantsuse õpetlane.

2) Celsius — tuntud rootsi õpetlane.

4. Kui suur on inimese harilik temperatuur Réaumuri järele (Celsiuse järele 37°)? 5. Kui palju näitab Fahrenheiti termomeeter, kui on 15°C ? — 4°R ?

Soojuse levimine.

Vaatlused. 1. Pane teelusikas kuuma vette! Mida tunned, kui lusika otsast kinni hoiad? 2. Pane väike puulusikas või -pulk kuuma vette! Kas läheb puulusikas niisama kuumaks? 3. Laota lume peale kaks lappi, üks villane, teine linane! Pane tähele, missuguse lapi all sulab lumi kiiremini! 4. Korda eelmist vaatlust, tarvitades kaht linast lappi, milledest üks must, teine valge.


Vaatlused näitavad meile, et soojus kehasid mööda edasi võib minna, laiali laguneda, levida: raudora käes hoides ja tema otsa tules soendades tunneme peagi, et soojus rauda mööda laiali laguneb. Seesugust soojuse levimisviisi nimetame soojusejuhita-

vuseks. Tahkete kehade soojusejuhitasus on väga mitmesugune: põlevat tikku võime lasta sõrmede vahel lõpuni põleda, ilma et kinnihoitav osa liiga kuumaks läheks. Head soojuse juhid on kuld, hõbe, vask, raud ja teised nende sarnased kehad, siis veel kivid.

Halvad soojuse juhid on puu, vill, klaas, jää j. m.


Vett keema ajades nägime (lk. 18), et saepuru osakesed vees liikuma hakkasid, vees tekkisid voolused: kuumaks saades paisub alumine veekiht; tema tihedus väheneb ja ta kerkib üles ning seguneb osalt pealmiste kihtidega. Alumised vee osad kannavad soojust ühest kohast teise. Seesugust soojuse levimisviisi nimetatakse soojuse edasikandumiseks ehk konvektsiooniks. Soojuse edasikandumine on võimalik vedelikes ja gaasides, aga mitte tahkeis kehas. Et soojusejuhitasust vees teada saada, selleks peame vett pealtpoolt soendama hakkama (27. joon.).

Laseme väikese jäätükikese katseklaasi, paneme kaks tikku pinguli risti tema üle, et jää veepinnale ei saaks kerkida, ja täidame katseklaasi veega. Hoiame katseklaasi alumisest osast kinni



27. joon. Soojusejuhitasus vees.

ja soendame vett ainult ülemises osas. Mõne aja pärast hakkab ülemises osas vesi keema, kuna jäätükk ikkagi põhja jääb, ja me võime katseklaasi julgesti käes hoida. See katse näitab, et vesi on halb soojuse juht.



28. joon. Soojuse edasikandumine õhus.

Veel halvem soojuse juht on aga õhk. Põleva küünla leegi juures võime sõrme hoida, ilma et leek sõrme „põletaks“. Õhus levib soojus edasikandumise teel. Soenemisel, näit. küdeva ahju juures, paisub õhk ja tõuseb üles lae alla. Teeme talvel toa ukse, mis kotta viib, paokile ja hoiame kolm põlevat küünalt mitmesuguses kõrguses: ühe põranda ligidal, teise ukse keskkoha, umbes käepideme kohal ja kolmanda ukse ülemise ääre juures. Alumise küünla leek kaldub toa poole, keskmisel jääb tuli otse põlema, kuna ülemise küünla leek külma koja poole kaldub. Nii siis tungib soe õhk toast välja ja külm õhk õuest tuppa. Sooja elutoa jahutamiseks on kõige parem akende ülemised pooled („ülemised“ aknad) lahti teha. Õhuvoolu kiirendamiseks varustatakse akende ülemisi osasid või sellekohaseid avausi seintes „tiibratastega“, mida elekter või kuum õhk liikuma paneb. Seesugust riista kutsutakse õhupuhastajaks ehk ventilaatoriks.

Tuul. Kui õhk maapinnal ühetasaselt see ei ole, siis tekivad temas voolused. Õhu liikumist ehk voolamist nimetatakse tuuleks.

Soojuse pea-allikaks maakeral on päike; ta soendab ka õhku, kuid mitte otsekohe: päikese kiired tungivad õhust läbi ja soendavad maapinda; õhk saab oma soojuse maapinnalt. Soojuse kiiri saadavad endast kõik kuumad kehad välja, näit. küdev ahi, hõõguv sepa-ääs jne. Säärast soojuse levimise viisi nimetame soojuse kiirgamiseks. Päikese kiirgamisest soenenud maapind soendab kõige pealt maa lähedal asuvaid õhukihte. Mida kaugemal maast, mida kõrgemal asuvad õhukihid, seda külmemad nad on. Õhku üles tõustes leiame, et õhk ligikaudu iga 50 sülla kohta ühe kraadi võrra jahedamaks läheb. Näit.,

kui maapinnal, orus on 30° C sooja, siis on maapinnast 50 sülle kõrgusel 29° C ja ühe versta kõrgusel 20° C ning 3 versta kõrgusel ainult 0°. Sellepärast on nüüd arusaadav, miks kõrgete mägede harju katab igilumi.

Päike ei soenda meie maakera mitte ühetasaselt. Lõunamail valitseb suurem kuumus, kuna põhja pool, nagu Eestis, lumi mitu kuud aastas maad katab. Säherduse mitte-ühetasase soenemise tagajärjel on õhk alati liikumas. Palavvöö-mail soeneb õhk, paisub ja tõuseb üles, sooja õhu asemele voolab teistest kohtadest külmem õhk; üleval kõrges liigub aga soe õhk neisse paikadesse, kust külm õhk tulnud.


Ülesanded ja küsimused. 1. Miks kantakse talvel tumedaid, suuremalt jaolt villaseid rõivaid? 2. Miks kantakse suvel heledaid, linaseid (puuvillaseid) rõivaid? 3. Mil moel kaitseb lumi talvoraseid ärakülmumise eest? 4. Mispärast ei tohi rõivad ja jalanõud liiga kitsad olla? 5. Mis kasu on talveakendest? 6. Missugune ahi jahtub kiiremini ära: kas pott- või raudahi? 7. Võta toas seisnud rauatükk (võti) ja puupulk kätte! Kumb tundub külmem olevat? 8. Millega seletada seda, et pilved mõnikord „vastu tuult“ jooksevad?

Õhk.

Vaatlused. 1. Tuleta meelde ja kirjuta üles, missugused on õhu omadused. 2. Pakasel talvel, kui paks jääkoor tiikisid ja järvi katab, surevad kalad neis sagedasti ära. Mispärast? 3. Võta teeklaas, täida ta ääreni veega; kata klaas õhukese paberilehega kinni ja pööra ta, kätt peal hoides, kummuli! Kui käsi alt ära võtta, kas voolab vesi välja?

Õhk ümbritseb meid igalt poolt. Ta on nägematu, sellepärast ei pane meie tema olemasolu iga kord tähele. Lehitame aga paberilehega või raamatuga näo ees, siis tunneme õhu liikumist. Sel juhtumusel tõukame meie raamatuga õhku, ta hakkab liikuma, lööb meile näkku ja meie tunneme tuult. Eespool kuulsime juba, et tuul on ainult liikuv õhk. Me teame, et iga keha teatavat ruumala täidab. Ka õhk täidab ruumi, mida teine keha samal ajal ei saa täita. Paneme laia katseklaasi kummuli vette,

siis tungib vesi osalt klaasi, aga ei täida seda mitte: õhk ei lase vett klaasi tungida (29. joon.). Võtame laia kaelaga pudeli, paneme talle tiheda kahe auguga korki peale; litsume ühte auku




29. joon. Õhk ei lase vett klaasi tungida.


klaaslehtri ja teise klaastoru, mille otsa kummtoru on kinnitatud. Pigistame sõrmedega kummtoru kinni ja valame kiiresti vett lehtrisse. Esmalt langevad mõned tilgad pudelisse, siis aga täidab vesi lehtri ja ei jookse pudelisse. Pudelis on õhk, mis takistab vett sisse voolamast. Laseme kummtoru sõrmede vahelt lahti, siis voolab vesi vabalt pudelisse; õhu asemele asub vesi.

Eespool nägime, et õhk soenemisel paisub, nagu teisedki kehad.

Õhul on veel raskus, mida järgmiste katsete abil võib tõendada. Võtame kaalud ja haagime ühe kaalukaasi külge



30. joon. Õhu kaalumine.



31. joon. Õhk tõukab vett pudelisse.

„tühja“ keedupudeli; teise kaussi puistame liiva, kuni kaunid uuesti tasakaalu jõuavad (30. joon.). Soendame keedupudelit

piirituslambil; liivaga kaalukauss hakkab langema, tähendab, soe keeduklaas on kergem. Soenedes paisub õhk ja üks osa tungib kolvist välja; õhk kolvis jääb hõredamaks, sooja õhu erikaal on vähem kui külmal. Gaasidel on tung iga ruumala, milles nad asuvad, ühetasaselt täita; seepärast täidab ka soe õhk kolbi, ainult mitte nii tihedalt.


Õhu raskuse tagajärjel rõhuvad ülemised õhukihid alumiste peale ja maapinna lähedane õhukiht on suure rõhu all. Seame kokku riista, nagu 31. joon. kujutab, ja imeme painutatud klaasitoru abil õhu pudelist välja. Teisest torust purskab vesi pudelisse: õhk rõhub veepinna peale ja tõukab vett kausist pudelisse. — Mida kõrgemal maapinnalt, seda hõredam on õhk. Umbes 10 versta kõrgusel on õhk nii hõre, et teda hingamiseks ei jätku. Kogu õhu hulka, mis maakera ümbritseb nimetatakse õhkkonnaks ehk atmosfääriks.

Ülesanded ja küsimused. 1. Võta klaasist silinder või mõõtklaas, täida ta veega ja pane kummuli veega täidetud kaussi! Kas voolab vesi mõõtklaasist välja? 2. Võta painutatud toru, aseta üks ots mõõtklaasi alla vette ja teisest otsast puhu, kuni kops „tühjaks“ saab! Mõõda, kui palju sm³ õhku korjus mõõtklaasi! 3. Võta plekknõu, milles harielikult õli müüakse (umbes 4-liitriline), kalla temasse vähe vett ja aja vesi keema! Mõne aja pärast tõrjub vee-aur õhu plekknõust välja; jäta siis soendamine järele! korgi nõu kõvasti kinni, pane ta küljeli ja vala külma vett peale! Mis sünnib nõuga? mispärast? 4. Valmista kartulipüss ja seleta, millest tuleb tema pauk.


Õhu koosseis.

Vaatlused. 1. Pane küünal põlema ja kata ta kummuli pudeliga või klaasiga kinni! Kas põleb küünal lõpuni? 2. Võta põhjata pudel (klaaskuppel) ja pooleni veega täidetud kauss! Kinnita küünal vedruks keeratud raudraadi külge, nagu 32. joon. näitab, aseta küünal veekaussi, kata ta pudeliga kinni ja mõõda vahe veepinnast kuni pudeli kaelani! Tõsta nüüd pudel pealt ära, süüta küünal põlema, kata põlev küünal uuesti pudeliga ja pane siis kiiresti kork peale (33. joon.)! (Soovitav on, et pudeli äär mitte tihedalt kausi põhja vastu ei litsuks). Kirjelda kõik, mida küünla põlemise ajal näed! Mõne aja pärast peale küünla kustumist mõõda uuesti veepinna seis pudelis märgitud kohani!

Esimesest vaatlusest selgub, et õhuga pudelis küünla põlemise ajal midagi on juhtunud. Teine vaatlus näitab, et peale põlemist on pudelis õhku vähem. Võtame nüüd korgi pealt ära ja pistame põleva peeru pudelisse; see kustub ära. Järjekult on õhuosa, mis järele jäi, teissuguste omadustega kui see, mis küünla põlemisel ära tarvitati. Nii siis leidub õhus vähemalt kaks gaasi, milledest ühes põlemine toimub, teises aga mitte. Seda gaasi, mis põlemist alal hoiab, nimetatakse hapnikuks; teist aga, mis põlemist lümmatab, milles põlemine ei toimu, nimetatakse lämmastikuks. Peale selle leidub õhus alati veee-auru. Tutvume nende gaasidega eraldi.



32. joon. Kata küünal pudeliga ja mõõda veepinna seis pudelis selle kaela suhtes.




33. joon. Peale küünla põlemist on veepind pudelis tõusnud.

Hapnik. Õhust on raske puhast hapnikku saada; kergemini saab teda hapnikurikastest kehadest, näit. elavhõbeda-hapendist või Berthollet' soolast. Elavhõbeda-hapend on raske punakaskollane pulber. Võtame seda segu katseklaasi ja seame kokku riista, nagu 34. joon. näitab (katseklaas peab õige kõva, peeneseinaline olema!). Soendame elavhõbeda-hapendit katseklaasis. Esmalt paisub õhk ja tungib veega täidetud silindrisse. Seda ei tohi aga sündida lasta, vaid me juhime õhu enne kõrvale. Kui õhumullid juba on kadunud, siis hakkavad hapnikumullid veepinnale kerkima¹⁾. Katseklaasi seintele

1) See katse läheb piirituslambil õige aeglaselt.

kogunevad elavhõbeda tilgad. Kus gaasitud käepärast ei ole, seal on hõlpsam hapnikku Berthollet' soola ja pruunkivi (mangaan-ülihapendi) segust valmistada. Võetakse üks lusikatais Berthollet' soola ja sama palju mangaan-ülihapendit, se-



34. joon. Hapniku saamine,

gatakse paberil hästi segamini, puistatakse kõvasse katseklaasi (või retorti) ja kuumutatakse. Hapniku kogumine sünnib nii kui eelmise katse puhul. Katseks võetud ained peavad

vabad olema igasugustest lisanditest¹⁾. Kogume kaks pudelit hapnikku ja tutvume tema omadustega.

Välimuse järele ei lähe hapnik õhust lahku; ta on läbipaistev, nähtamatu, tal pole ka lõhna ega maiku. Et teada saada, mille poolest ta õhust lahku läheb, pistame hõõguva peeru hapnikku: peerg lööb heleda leegiga põlema. Tähendab, puu põleb hapnikus paremini, kiiremini kui õhus. Hapnikus põlevad ka niisugused kehad, mis õhus ei põlegi, nagu näit. terastraat.




Võtame peene terastraadi või taskukella terasvedru, kinnitame selle ühe otsa külge sõe või taela, ajame sõe (taela) tules hõõguma ja pistame siis hapnikuga täidetud pudelisse: traat hakkab heledalt põlema,

35. joon. Terastraadi põlemine hapnikus.

1) Et täiesti julge olla mõnikord juhtuva plahvatuse suhtes, on vaja

heites igale poole sädemeid (35. joon.). Hapniku omadust, põlemist alal hoida, tarvitatakse tema äratundmiseks.

Lämmastik. Võrdlemisi puhast lämmastikku võime hõlpsasti õhust saada; selleks on vaja ainult hapnik õhust kõrvaldada (eraldada).



36. joon. Lämmastiku saamine.


Eespool-toodud katsete põhjal on kerge otsusele jõuda, kuidas seda toime-tada; nimelt laseme kinnises nõus mõnd keha põleda. Seks otstarbeks kõlbab kõige paremini fosfor. Võtame tükikese fosforit, paneme ta portselankausikesse ja laseme suurde kaussi veepinnale ujuma (36. joon.). Kata-me kausikese põhjata pudeliga (klaaskupliga), süütame hõõguva traadi või klaaspulga

abil fosfori põlema ja paneme korgi kiiresti peale. Peajoontes kordub sama nähtus, mida kütinla põlemisel tähele panime (33. joon.) Fosfori põlemisel tekib pudelis (kupli all) valge suits. See kaob varssi ära, langeb veepinnale ja lahustub vees. Äratarvitatud hapniku ruumi täidab vesi. Kui veepinna seis täpsalt enne ja pärast katset ära mõõta, siis leiame, et $\frac{1}{5}$ õhust on ära tarvitatud. Nii siis on $\frac{4}{5}$ õhust lämmastik. Lämmastik on, nagu hapnikki, nähtamatu, lõhnata ja maiguta gaas; kui temasse põleva kütinla laseme, siis kustub kütinla; järjelikult, lämmastik ei hoiä põlemist alal; loomad lämbuvad temas, — sellest on ta oma nimegi saanud. Nii siis, hapnik on põlemiseks ja hingamiseks tarvilik.


Süsihapu gaas. Kordame 2. vaatlust (33. joon.), paigutades kupli alla kausikese lubiveega (palju tundlikum on küll barüüt-vesi). Läbipaistev, selge lubivesi muutub katse jooksul piimjaks, läbipaistmatuks. Lubiveega on mõni muutus sündinud; selle muutuse põhjuseks on kütinla põlemisel tekkiv süsihapu gaas. Seda gaasi on lihtne saada kriidist või marmorist.

katseklaas (retort) peene vaskvõrguga ümbritseda. Kui hapniku kogumine on lõppenud, siis võetakse tuli alt ära ja toru tõmmatakse veest välja.

Marmor tuleb enne parajaiks tükkideks lõhkuda; siis pannakse tükkid (umbes 15) katsepudelisse ja valatakse soolhapet peale. (Hape peab olema lahjendatud, umbes 30%.) Tekkiva gaasi mullid panevad happe kihisema. Süsihaput gaasi kogutakse lihtsalt pudelisse: ta on raskem kui õhk ja tõrjub õhu pudelist välja. Võtame laia purgi, paneme purgi põhja kolm põlevat küünalt, mis igaüks isepikkusega. Juhime toru kaudu süsihaput gaasi purki; varssi näeme, et kõige lühem küünal kustub, mõne aja pärast kustub järgmine ja lõpuks kõige pikem küünal. Süsihapu gaas on raskem kui õhk ja tõrjub õhu purgist



37. joon. Süsihapu gaasi saamine.




38. joon. Süsihapu gaas kustutab küünlad, alumisest alates.

järk-järgult välja; ta ei hoiä põlemist alal. Loomad lämbuvad süsihapus gaasis; nii siis ei hoiä ta ka hingamist alal. Nagu eespool nägime, läheb lubivesi süsihapu gaasi mõjul piimjaks, sogaseks.

Põlemine.

Vaatlused. 1. Pane tähele põlevat küünalt! Kas on kõik tema leegi osad ühesugused? 2. Hoiä õhuke si paberiribasi põleva lambi kohal! Mis sünnib nendega? 3. Hoiä kuiv klaas põleva küünla kohal, nagu 39. joon. näitab! Mida märkad klaasi seintel mõne aja pärast?

Õhu koosseisu tundma õppides nägime, et põlemiseks on vaja hapnikku. Põlemisel näib, nagu kaoksiä kehä ja ka hapnik, mida need kehä selle juures tarvitavad. Kui fosfor kupli all




39. joon. Küünla põlemine õhus.

vee tilkumisele tõuke-
takutüki, siis näeme
peagi, et leetri küljed
kattuvad veepiiska-
dega. Põlemisel tekkiv
gaas läheb läbilubivee,
muutes seda sogaseks.

Põlemisel ei
kao kehad, vaid
ühinedes hapni-
kuga muutuvad
teissugusteks
kehadeks või ai-
neteks. Säärased
kehad, nagu küünal,

põleb, siis tekib valge aur, mis pärast
vees lahustub. Kogudes uut, tekkinud
ainet ja teda kaaludes leiame, et see just
sama palju kaalub kui põlenud fosfor ja
õhust kadunud hapnik. Nii siis ei kao
fosfor põlemisel ega ka hapnik; ainult
hapnik ühines fosforiga, tekitades uue
keha. Samuti ei kao ka küünal põledes:
ta ühineb hapnikuga ja muutub teissu-
guseiks aineiks. 3. vaatlusest teame, et
küünla põlemisel tekib vesi (klaas läheb
põleva küünla kohal niiskeks). Kui küü-
nalt lasta pudelis põleda, siis tõmbub pu-
del seest niiskeks; kallame natuke lubi-
vett pudelisse ja loksutame — lubivesi
läheb sogaseks. Tähendab, küünla põle-
misel tekib veel süsihappu gaasi.


Veel selgemini võib süsihappu gaasi
tekkimist põlemisel järgmise katse abil
näidata. Seame kokku riista, nagu 40. joon.
kujutab. Katseklaasi paneme lubivett ja
kolvi täidame puhta veega; klaastoru
ots, mis anumasse viib, olgu peene-
maks tõmmatud. Imemise abil anname
Paneme nüüd leetri alla põleva peeru või




40. joon. Põlemissaaduste kogumine.

puu, õli ja peaaegu kõik elusa looduse kehad, muutuvad põlemisel veeks ja süsihapuks gaasiks. Põlemisega kaasas käivad soojus ja valgus.

Leek. Vaatleme lähemalt kütünlaleeki. Temas võib kolme osa tähele panna (41. joon.): A — siseosa, mittehiilgav, tahti ümbritsev; B — keskosa, mis heledat kollakat valgust annab, ja C — välisosa, mis leeki õhukese koorena katab ja nõrka sinakat valgust saadab. Õpime esiteks siseosa tundma. Juhime sinna osasse painutatud klaastoru otsa ja hoiame teise otsa juures põleva tiku; kohe tekib selle otsa juures väike leek (42. joon.). Nähtavasti eralduvad klaastoru kaudu kütünlaleegist põlevad gaasid, mis siis teise otsa juures põlema löövad. Ja tõesti, seal leiamegi põlevaid gaase. Leegi kuumus sulatab kütünlarasva ehk steariini, mis tahti mööda üles tõuseb ja siis suuremas kuumuses gaasilisteks aineteks muutub. Siseosas ei ole veel põlemist, sinna ei tungi hapnik. Põlemine toimub keskosas, kus põlevad gaasid hapnikuga kokku puutuvad




41. joon. Kütünlaleegi ehitus.



42. joon. Kütünlaleegi põlemine klaasi all.

kuga kokku puutuvad ja põlevad; nad ei põle aga korraga ära, vaid neis leiduvad söe-osakesed lendlevad mõni aeg leegis, hõõgudes, heledat valgust andes. Hoiame silmapilguks valge paperilehe leegi keskosas, — ta kattub tahmaga (nõega). See tahm ehk nõgi pole muud midagi kui väikesed söe-osakesed. Lõplik gaaside põlemine toimub alles välisosas, kus nad vabalt hapnikuga saa-

vad ühineda. See leegi osa on kõige kuumem, selles ei ole enam hõõguvaid söe-osakesi, mis pärast ta ka heledat valgust ei anna.



43. joon. Lambi põlemine.

Ka muude ainete, nagu puude, turba, kivisöe ja teiste kütteinete põlemisel näeme leeki, mis ainult sellepärast ilmub, et need ained põledes põlevaid gaase tekitavad. Nii siis leegi moodustavad põlevad gaasid. Need ained, mis põledes gaasiks ei muutu, nagu terastraadi põlemine hapnikus, põlevad leegita või hõõguvad.



Vaatame nüüd, missugustes tingimustes toimub põlemine kõige paremini. Süütame küünla põlema ja katame ta lambiklaasiga (42. joon. A) kinni. Küünal hakkab suitsema ja kustub mõne

aja pärast ära. Toetame lambiklaasi kahe korgi äärtele (42. joon. B); nüüd põleb küünal lõpuni. Nii siis, selleks, et küünal klaasi all

põleks, on vaja säärased tingimused luua, mis soodustaksid tarvitatud õhu äravoolu ja puhta õhu juurdevoolu. Küünla põlemise sarnane on lambi põlemine (43. joon.). Ka siin on vaja puhta õhu juurdevoolu alal hoida. Kui põleva lambi kohale peeni paberihelbeid puistame, siis lendavad nad üles; see näitab, et soe õhk klaasist alatasa üles tõuseb. Ahju kütmisel tuleb

44. joon. Ahju küdemine.

samuti õhu juurdevoolu eest hoolt kanda (44. joon.); muidu toimub põlemine puudulikult, tekitades vingugaasi. Vingu-



45. joon. Hingamisest läheb lubivesi sogaseks.

gaas on hingamisele kahjulik. Vingu jäänud inimesed peab puhta õhu kätte viima.

Ahju kinnipanemisel peab järele vaatama, et tukkisid ahju ei jääks, sest kinnipandud ahju ei pääse vabalt õhk, kuna hõõgumine edasi toimub ja vingu tekitab.

Pikaldane põlemine. Põlemisega sarnastub hingamine. Hingamise puhul ühineb meie keha hapnikuga ja tekivad vesi ning süsihappu gaas. Puhume klaastoru läbi lubivette, vesi muutub valkjaks, sogaseks (45. joon.). Tähendab, hingamise puhul tekib süsihappu gaas. Et väljahingatud õhus on palju veeauru, seda nägime juba varemini. Nagu iga põlemisega, nii käib ka hingamisega soojus kaasas. Hingamine aitab meie keha temperatuuri alal hoida. Süsihappu gaas on, nagu vingugaaski, hingamisele väga kahjulik; teda leidub küll alati õhus, kuid väga vähesel määral. Puhtas õhus on $\frac{1}{5}$ osa hapnikku ning 3 kuni 4 osa süsihappu gaasi 10 000 õhuosa kohta; väljahingatavas õhus moodustab hapnik $\frac{1}{6}$ osa ja süsihappu gaas — $\frac{1}{20}$ osa. Tubades, kus palju inimesi koos, läheb õhk kiiresti halvaks. Nagu me lambi põlemisel puhta õhu juurdevoolu eest hoolt peame kandma, nii tuleb ka hingamise ehk pikaldase põlemise korral õhu vahetust silmas pidada. Õhu puhastamiseks peame tube tuulutama. Talvel aitab tubade tuulutamiseks ahju kütmine kaasa.

Põlemist tuletab meelde veel mädanemine. Mädanevad kehad ühinevad õhu hapnikuga ja muutuvad selle juures teisteks, lihtsamateks kehadeks. Mädanemist saadab sagedasti soojus, mis näit. sõnnikuhunnikutes väga tunduvaks võib saada. Mõnikord tekitab mädanemine ka valgust (mädanevad puutükid).

Kui teras- ehk raudtraat hapnikus põleb, siis ühineb raud ka hapnikuga; niiskes õhus ühineb hapnik aeglasemalt rauaga, tekitades rauaroostet. Kehade ühinemist hapnikuga nimetatakse hapendumiseks ehk oksüdeerumiseks. Põlemine, hingamine ja mädanemine on kehade hapendumine.

Ülesanded ja küsimused. 1. Pista igasse leegi osasse üks tule-tikk ja vaata, kus ta kõige enne põlema hakkab (46. joon.)! 2. Mis-



46. joon. Küttn-laleegi välisosa on kõige kuumem.

pärast ei teki fosfori põlemisel leeki? 3. Mis otstarve on sepalõõtsal? 4. Itaalias Neapoli lähedal on niinimetatud „Koerakoobas“, kus maa seest süsihaput gaasi voolab. Inimesed võivad koopas liikuda, aga koerad surevad kohe ära. Millega seda seletada? 5. Kas võib elavhõbe õhus hapenduda? 6. Miks kaetakse raudasju lakiga? 7. Niimeta, missugustest osadest koostub õhk.

Taimed.

Kibe tulikas.


Vaatlused. 1. Korja kibeda tulika lehti ja paku neid lamastele, kodujänestele ja kitsese kõrvuti valge emanõgesega! Kumba neist taimedest söövad nimetatud loomad himukamalt? 2. Pane tähele karjamaal kibedat tulikat ja tema lähemat ümbrust! 3. Katsu leida kibedat tulikat mitmest kohast ja märgi leiupaigad ning tulika kasvutingimused (valgus, niiskus, vari jne.) igas leiukohas oma vaatluskaustikusse! 4. Juuri üks õitsev ning teine viljaga kibe tulikas üles ja õpi tema üksikuid osasid tundma! 5. Vaatle, mitu päeva on õitsmas tulika vaadeldav õis; korda seda päikesepaistestel ja halbadel ilmadel paljude õitega! Märgi kõigi vaatluste tähelepanekud oma vaatluskaustikusse!

Karjamaal, aasal ja mujal võime kogu suve jooksul maist septembrini näha õitsmas kollaste õite ja roheliste sügavlõheliste jaguste lehtedega taime, mis üle naabruses kasvava rohu ulatub. See on kibe tulikas (47. joon.). Karjamaal, mille loomad päris paljaks on söönud, püsib kibe tulikas puutumata: loomad ei söö teda, sest tas sisalduvad mahlad on mürgised ja vihad. Heina sees kuivanult, kus need mahlad ära auranud, on kibe tulikas aga kahjuta.

Juurime kibeda tulika mullast ettevaatlikult välja. Temal on maa sees viha sarnane juurte kimp, peal maa kõrge rohtne vars, mille lehed ja õied asetsevad. Et kibedat tulikat teistest taimedest eraldada, selleks peame lähemalt tema üksikuid osiseid vaatlema.

Tulika vars läheb ülemises osas mitmeharuliseks. Varrel asuvad harvad lehed. Lehtede kinnituskohad on jämedamaks paisunud kui muud varre alad; neid nimetatakse varre sõlmedeks, kahe naabrustikku sõlme vahesid — sõlmevahedeks.

Kibeda tulika suuremad jagused lehed algavad juure lähedalt ja ümbritsevad vart oma rootsu laia toruks keeratud osaga, mida rootsu tupeks nimetatakse. Lehe laia jaotatud osa rootsu otsas nimetatakse lehelabaks. Tähelepanelikult lehelaba silmitsedes näeme seal risti-rästi võrguna sooni, mis kui sarikad või luukere lehe pehmemaid osasid tulika elule tarvilikus



47. joon. Kibe tulikas. 3 — tulika õie piki-läbilõik; 4 — tulika vilj.

ning otstarbekohases seisus hoiavad. Mida ülemal leht kibeda tulika varrel asetseb, seda lihtsam ta on. Ülemised lehed on koguni kitsa siilu laadi ja seisavad vartel ilma rootsuta. Eespool kirjeldatud lehti nimetatakse rootsuga, viimaseid — rootsuta lehtedeks.


Tuletame meelde järgmist. Toas kasvavad taimed pööravad oma lehelabad ja koguni ladvad sinnapoole, kust päikesevalgus tuleb; pimedas keldris idanevate kartulite kasvud on kahvatu-kollased ja jõuetud, — keldrisse valguse juhtimise puhul pöörduvad nad

valguse poole ja omandavad siis tumerohelise värvi ja tugevuse. Tiheda metsa all on rohelisi taimi vähe või nad puuduvad täieliselt. Tähendatud asjaolu meelde tuletades peame arvama, et päikesevalgusel on taime elus kaaluv väärtus.

Tulikas kasvab sagedasti tiheda rohu sees, mis teda varjab päikesevalguse eest. Et oma alumisi suure labaga lehti varjust välja ulatada ja nende janu päikesevalguse ja soojuse järele kustutada, on alumiste lehtede rootsud nähtavasti tarviduse järele pikaks arenenud. (Kas on noored puud metsa all lühikesed või

pikad oma vanaduse kohaselt lagedal kasvavate sama vanadega võrreldes?) Ülemisi lehti ulatavad varred juba rohu tasapinnast kõrgemale ja need seisavad varrel ilma rootsudeta ning on palju vähemad kui alumised (ei varja alumisi!).

Meie tähelepanek peatub uudishimulikult kibeda tulika kuldkollastel õitel. Õis asetseb õievarrel. Sorides õies puupulga otsa pandud nõöpnõelaga leiame sealt järgmised osised. Õie keskel on palju madalaid rohelisti väikese konksukesega varustatud topsjaid pungakesi, mida õie emakateks nimetatakse. Neid ümbritsevad paljud kollakad paisunud otsadega niidikased — tolmukad. Emakaid ja tolmukaid piiravad väljastpoolt 2 ringi nõndanimetatud õiekatteid. Sisemise ringi sünnitavad 5 kuldkollast kroonlehte, kuna välises ringis on sama palju kollakasrohelisti tupplehti. Katsume ka joonistada kirjeldatud õie plaani (48. joon.), nagu harilikult klassi plaan joonistatakse. Sääraseid plaanisid tarvitatakse selleks, et ühe ülevaatega saada asjalik pilt iga kirjeldatud taime õie ehitusest. Praegu kirjeldatud tulika õis asetseb õievarrel.



48. joon. Kibeda tulika õie plaan. Keskel emakad; nende ümber tolmukad; siis kroonlehed ja välimises ringis tupplehed.

Ülesanded ja küsimused. 1. Joonista oma vaatluskaustikusse kõik kibeda tulika üksikud osad kogupildil ja eraldi ning kata vastavate värvidega! 2. Vaatle sügisel närbunud tulikat ja leia mullapinda elama jäänud varrejätkult noor pung, millest järgmisel kevadel võrsub uus tulikas. 3. Juuri ta ettevaatlikult üles ja istuta tupp lillpotti; külva sinna ka tulika seemneid! Vaatle nende muutumist talve vältusel kuni kevadeni ja märgi tähelepanud nähted oma kaustikusse! 4. Valmista kibeda tulika varrest piki-läbilõik ja selle joonis! 5. Missuguseid nähtusi tead veel nimetada, millest selgub, et päikesevalgus on taimedele tungivalt tarvilik?

Tubakas.

Vaatlused. 1. Mõõda tubaka kõrgus, tema alumiste ja ülemiste lehtede pikkus ja laius! 2. Joonista tubaka leht ja märgi joonisele täpsalt tema soonestiku levimine! 3. Tõmba tubaka alumise lehe varrepoolsele rootsu otsale kinnitatud niit iga üle-

maljürgneva lehe kinnituskohalt üle ja jõua selgusele, missugune ring sündis tubaka ülemise lehe ni juhitud niidist. 4. Missuguses sihis sellel ringil kahaneb lehelabade suurus ja millega on lehed kaetud? 5. Vaatle, missugused on tubaka õied ja kuidas nad varrel asetsevad. 6. Joonista tubakalehtede varrel asetsemise plaan! Selleks tõmba sirkliga ühisest keskpunktist sama palju



49. joon. Tubakapõõsas.

ringe, kui tubaka varrel lehti; tähenda sisemisele ringile lühikese kumera sulgmärgiga (klambriga) ülemise lehe ase, igale järgmisele välimisele ringile samasuguse, kuid veidi pikema sulgmärgiga vastava allpool-oleva lehe ase!

Tubakas on üheaastane roht-taim. Ta kasvab peaaegu kahe meetri kõrguseks (49. joon.). Tugeval karvadega kaetud varrel asetsevad tõusvale ringile paigutatud suured sametkarvased munajad lehed. Selles asetus ei ole ülemised lehed alumistele päikese varjuks ees.

Tubakat kasvatati varemini meil ainult ilutaimena.

Sõja ajal virgutas tubakapõud meie piibumehi tubakat pinuasemel kasvatama. Nii sai siis tubakas meil kasutatavaks aiataimeks. Ta kodumaaks on Ameerika; siit töid hispaanlased ta XVI sajandil Euroopasse.

Tubakas kinnitub suure pika peajuure ja arvurikaste vähemate külguurte kaudu pehmesse mullapinda. Peente juurkeste ja nende juurnarmaste kaudu ammutab ta mullapinnast omale tarvilikke toidu- ja jõu-aineid. Kasvav tubakas tarvitab jõudsaks arenemiseks hästi rammutatud ja sügavalt läbikaevatud sooja niisket mulda. Mullast saadud niiskus aurab osaliselt taimest välja, osalt kulub tema juurdekasvuks.


Vee välja-auramine toimub peaaesjalikult lehtede kaudu. Tubakal takistab liigset vee välja-auramist lehe sametikarvane pind. Kui aga vett tarvilikul määral saada ei ole, langevad tubaka lehed longu ja kortsuvad.

Et taimed suurel hulgal vett enestesse imevad ja jälle lehtede kaudu välja aurutavad, seda võime järgmise katsega kindlaks teha.

Võtame katseklaasi, kallame sinna vett, paneme vette näiteks väheldase kapsa- või nurmenuku-lehe ja kallame nüüd klaasi veel natuke mõnda õli, näit. masinaõli, et vesi klaasist ei saaks otsekohe ära aurata (50. joon.). Märgime ära ka vee kõrguse klaasis. Mõne tunni pärast näeme, et vesi klaasis tublisti on alanenud. Kuidas pääsis vesi klaasist välja? Kõige tõenäosem on, et ta lehe kaudu välja auras. Paljude katsete ja vaatlemiste varal on kindlaks tehtud, et taimed lehtede kaudu vahet pidamata palju vett välja aurutavad.

Tubaka õied seisavad tihedalt varte ladval. Tubakas õitseb juulist hilissügiseni. Punased või kollakas-rohelisi tubaka õisi silmitsedes leiame, et õite tupplehed on oma alumises osas kokku liitunud ning moodustavad liit-lehelise kellukataolise tupe. Ka kroonlehed on liitunud ja sünnitavad samakujulise krooni. Nagu tupp koostub ka kroon viiest nähtavast iseosast. Krooni sisekülje põhjaveerule kinnituvad viis karvase alusosaga tolmukat. Õie keskel on üksik emakas.

Isesuguse parkimise teel saadakse tubaka lehtedest suitsetamis-, nuusk- ja närimitubakas. Peale healõhnalise vaigu ja õlide, mis tubaka põletamisel vabanevad, sisaldub tubakas veel kõva mürki nikotiini. Rohke tubakasuitsetamine on inimesele kahjulik, eriti noortele inimestele.




50. joon. Lehtede kaudu vee välja-auramist selgitav katse.

Ülesanded ja küsimused. 1. Joonista tubakas ja ta osad üksikult ja kata joonis vastavate värvidega! 2. Joonista tubaka õie plaan! 3. Joonista tubakavarre piki-läbilõik! 4. Korda iseseisvalt tekstis esitatud katse! 5. Millal hakati kodukülas tubakat kasvatama? 6. Mitu korda istutatakse kevadel tubakataimi ümber? 7. Kuidas korjatakse sügisel lehti ja kuidas pargitakse neid? 8. Kuidas mõjub tubaka suitsetamine esimest korda suitsetajasse? 9. Kuula kõigist koduküla taludest järele, kui palju tubakataimi on käesoleval aastal kasvamas, kui palju oli eelmisel aastal. Joonista saadud andmete najal oma kaustikusse kummagi aasta tubakakasvatuse üle diagramm järgmiselt: iga talu tubaka hulk märgi musta tulbana, mille laius pool sentimeetrit ja kõrguseks sama palju millimeetreid, kui tubakat vastavas talus kasvas; iga samba vahele jäta valgeks alaks ühe tulba laius! Võrdle selle järele, kas tubaka kasvatamine teie külas edeneb või kahaneb. Mis on selle põhjuseks?

Õie ülesanne taimede elus.

Vaatlused. 1. Haruta tulika ja tubaka õis osadeks, kleebi paberile ülevaatlikus järjekorras ja joonista kõik osad üksikult oma vaatluskaustikusse! 2. Tee tubaka emakast piki- ja rist-



51. joon. Suurekstegev klaas.

labilõik ja nende joonis! 3. Vaatle puhkeva õie ja täiel õitsel oleva tulika ja tubaka õie emakasuudme pinda! 4. Joonista tubaka puhkeva ja õitsva õie piki-läbilõik, täpsalt mõlema õie tolmuksate ja emaka ülemise osa vahet tähele pannes. 5. Misuguseid väikesi loomakesi oled tulika ja tubaka õitel näinud? Maitse keelega tubaka ja tulika õite põhja!

Vaatame lähemalt iga üksiku vaadeldud tubaka- ja tulika-õie osise ehitust, kui võimalik — suurekstegeva klaasiga (51. joon.),


ja katsume selgusele jõuda, mis ülesanne on ühel või teisel neist. Tähelepanelikul vaatlemisel leiame, et kibeda tulika kui ka tubaka emakal on järgmised osised: alumine paisunud osa — sigimik; sigimiku peal on tulikal kõver konks — emakasuude, tubakal aga emakakael ja alles selle otsal väike nupjas emakasuude (52. joon.). Valminud emakasuude läheb limaseks. Araõitsnud tu-

baka- ja tulika-õiest jääb peale teiste osade mahalangemist ainult emakas alale, mille sigimik paisuma hakkab ja pikapeale kupra laadi viljaks areneb, kus seemned asuvad. Säherdust seemnete saamise lugu võib iga vaadeldud kibeda tulika ja tubaka juures tähele panna.

— Kõik teised õie osised pu-denevad maha, kuna aga emakasõlmed edasi

kasvavad ja viljaks kujunevad. Järjekult on õie ülesanne sünitada vilja, milles seemned. Igast kibeda tulika seemnest areneb mullapinnas, kui tingimused kohased, kibe tulikas, tubaka seemnest tubakas; tähendab, õis on taime sigimise, paljunemise elund; tema ülesanne on kindlustada taimale noort järeltulevat põlve, taimede edasikestmist.

Igal tolmukal on kaks osa: alumine, peenem — tolmukaniit ja jämedam pea — tolmukott, kus kollakas tolm valmib (53. joon.). Vaatlemised on kindlaks teinud, et sigimikust seemne-




52. joon. Tubakas. 2 — õie piki-läbilõik; 3 — küps vili; 4 — õie plaan; 5 — tubaka õis üksikult.

tega vili ainult siis areneb, kui tolmuka tolm emakasuudmele satub ja kasvades emaka sisemisse osasse jõuab.

Et selgusele jõuda, mis ülesanne on õie kroonlehtedel, vaatame, kuidas sünnib tulikal tolmu edasitoimetamine tolmukalt emakasuudmele. Pealiskaudsel vaatlemisel näib, et õietolmu emakasuudmele toimetamine nii läheda maa takka, nagu seda emakasuudme ja tolmukate vahe on, väga lihtsalt sünnib: lihtsalt — pudeneb emakasuudmele. Kuid emakasuude valmib, läheb limaseks ammu enne, kui tolm sama õie tolmukates küpseb ja vabaneb. Oma tolmuga ei saa antud kibeda tulika õis tolmutatuks — seda peab teiselt tulikalt tooma, kus juba tolmukad valminud ning õietolm välja tungib. Tolmu toimetamist emakasuudmele kutsutakse tolmutamiseks.

Sagedasti võime näha õitel mitmesuguseid putukaid: mesi-



53. joon. Mitmesugused õietolmu terad.

lasi, kärkseid ja liblikaid; nad lendavad õielt õiele. Nii puutuvad nad kokku õitega, mis väga mitmes valmimisastmes.


Lennates õielt, kus tolmukad juba avanenud, tolmuga kaetud kuues õiele, milles on emakas valminud ja limane, pillab külalineputukas kaasatoodud tolmu limasele emakasuudmele. Nii on siis need väikesed loomakesed õie tolmutamise vahemeesteks otse tarvilikud. Nende loomakeste ligimeelitamiseks on kibeda tulika õitel kroonlehtede alumisel sisemisel serval väike lohk, millest magus mahl, õiemesi, imbub. See meelitab maiaid loomakesi õitele, kuna aga kollane õie, peaasjalikult kroonlehtede värv juba kaugelt putukale silma paistab ja temale kergendab õiele sattumist. (Võrdle õie värvikat krooni teemaja või kaupluse sildiga!) Kui tolmumine toimunud, siis kuivab emakasuude ära ja kõik hiljemini siia jõudvad tolmuterad puhub tuul minema.

Võtame läbilõikes kibeda tulika õie, millel parajasti asub putukas (54. joon.). Et kibedal tulikal on tupplehed kroonlehtedega vaheldumisi, näeme oma läbilõigis ühel pool kroon-, teisel pool tupplehte. Läbilõigul on kujutatud õis sel puhul, kui tol-

mukad juba valminud, välimised päris küpsed, sisemised aga on veel avamata. Õiel asuv putukas on oma noka pistnud tolmukate taha meelohku. Putuka rinna eesmine osa saab selle juures õietolmuseks (ümmargused terad), kuna teiselt õielt toodud tolm (ristikesega) emakasuudmele pudeneb.

Meie tubaka tolmumine sünnib aga teisiti. Tubaka puhkenud õites ulatub emakasuude krooni neeluni (suuni), kuna aga tolmukate pead madalamal krooni torus seisavad. Hiljemini võrsub õiekrooni alumine osa pikemaks ning tõstab endaga siia kinnituvate tolmukate tolmukotid emakasuudme kõrguseni. Nii toimub siis tubakal tolmumine otse sama õie tolmuga.

Tubaka soojal kodumaal on tema õite tolmutajateks pika nokaga liblikad ja linnukesed — koolibrid. Tubaka õitele tulevad need väikesed külalised ennast õiepõhjal leiduva õiemeege võõrustama; selle juures toimetavad nad ka tubaka tolmutamist. Meie juures käivad tubaka õitel mesilased, kuid olulist tulu nad taimetele tolmutamise suhtes ei too, ainult neile endile on siit saadud külakost enamail juhuseil surmav.



54. joon. Kibeda tulika õie piki-läbilõik. Õiel olev putukas võtab nokaga meelohust õiemett.

Halva ilmaga ja õhtuti laskuvad õievarred longu ja õied kummardavad oma avause allapoole, tupp ja kroon sulguvad ja varjavad õie sisemised osad niiskuse eest; niiskus ja vihmavesi nõrgub neilt alla, ilma et õide satuks. Nagu katsed näitavad, on tolm väga niiskusetundlik ja läheb niiskuse käes tolmutamiseks kõlbmatuks. Ka noorele õiepungale pakuvad tupp- ja kroonlehed mõnusat katet. Nii on siis need viimased õie katteiks, kaitstes kasvavaid osasid vihma, külma ja teiste vigastuste eest.

Nagu juba varemini tähendatud, areneb peale õiekatete ja tolmukate närtsimist ja mahalangemist tubaka ja tulika sigimiskust pikkamisi vili, mis valmides kuivviljaks — karbike-

seks kujuneb. Kyps vili avaneb, tuul õõtsutab pikka vart ja pillab viljast seemned välja ning kannab nad laiali. Igast kohas-tesse oludesse sattunud seemnest areneb järgmisel kevadel uus taim. Kuid suurem osa seemneist saab hukka, hävib, sattudes kuivale või kivisele pinnale, üleliia niiskesse paika, lämbub teiste taimede varjus; ka loomad söövad palju seemneid ära. Neist seemnetest aga, mis kõigiti headesse tingimustesse jõuavad ja ka ise on tugevad, elujõulised, kasvavad kevadel elujõulised tai-med, mis sügisel omakorda jälle seemneid annavad.

Ülesanded ja küsimused. 1. Tee omale õie osade harutamiseks nõel! Selleks pane ilma peata nõõpnõel ilusa ümmarguse pulga otsa! 2. Püüa kaua tubaka õitel viibinud mesilane kinni, aseta klaasi ja vaatle tema avaldusi! 3. Valmista savist või plastiliinist tulika ja tubaka emakas ja tolmukas, tulika kroonleht! 4. Õõtsuta küpse viljaga tubaka ja tulika vart ja vaata, kuidas nende vili variseb.

Liik ja perekond.


Vaatlused. Otsi heinamaalt ja aiast kibeda tulika sarnaste õite ja lehtedega taimi ja võrdle neid temaga üksikasjaliselt!

Madalal niiskel heinamaal leidub sagedasti veel üks taim, milles peagi tulika ära tunneme; kuid tähelepanelikumal vaatlemisel võib kohe märgata, et tema siiski varemini tundmaõpitud tulikast lahku läheb (55. joon.). Varemini tundmaõpitud tulikal oli püstiseisev vars, kuna selle tulika vars roomab möõda maad, ja kõõgil lehtedel on pikad rootsud, välja arvatud mõned üksikud ülemised lehed. Alumised lehed on aga veel sügavamini lõhestunud kui kibedal tulikal. Selle tulika seemneist ei arene kunagi täiesti kibeda tulika taoline taim välja. See vaadeldud taim on üks teine tulika liik — roomav tulikas. Peale kahe kirjeldatud tulika on veel terve rida tulikaid, mis ühe või teise asja poolest eelkirjeldatuist lahku lähevad, kuid üldjoontes on nad ikkagi väga nende sarnased, iseäranis õie ehituse poolest.

Kõik need üksteisest lahku minevad tulikad moodustavad igatõks isesuguse tulika-liigi. Liigi nime tähendame sõnaga k i b e , r o o m a v j n e . Vaatlemisel leidsime, et kõõgi nende tulikate vahel oli palju õhiseid sugulusjõõni. Seda sugulust tähendasime üksikuid liikisid nimetades sama sõnaga tulikas; sellega rõhu-

tame, et kõik need tulikad moodustavad ühise rühma, mida looduste aduses perekonnaks nimetatakse. Nii nimetatakse iga taime kahesõnalise nimega, millest üks tähendab perekonda, millesse taim kuulub, teine liiki.

Ülesanded ja küsimused. 1. Joonista roomava tulika õie plaan! 2. Joonista roomava tulika leht ja märgi joonisele ka selgesti nähtavad lehe sooned! 3. Kuivata terve roomav tulikas ja kõik tema lehed eraldi ära, nii et nende loomulik kuju alal püsiks. Kuivatada võib suure raamatu vahele pandud ajalehe-paberi lehtede vahel.



55. joon. Roomav tulikas.


Magun.

Vaatlused. 1. Kirjelda maguna kasvukohta ja vaatle, kas loomad teda himukalt söövad. 2. Vaata, missuguseks muutuvad tema murrukohad. 3. Pane tähele, millega on maguna lehed, vars ja kõik teised osad kaetud. 4. Kuidas pakatab tema õie-pung? 5. Missugused on paisuva õie kroonlehed? 6. Missuguseid muutusi võib õhtul õies märgata? 7. Jõua selgusele, missugused putukad viibivad maguna õiel ja mis eesmärgiga. 8. Kuidas avaneb maguna vili? kuidas külvab ta seemneid? 9. Pressi maguna seemneid paberilehtede vahel — mida leiad sa neis selle juures?

Magun on harilik põllu-umbrohi (56. joon.). Tema punased või kollakaspunased õied annavad juuli- ja augustikuul viljaväl-

jadele, kus palju magunaid kasvab, lõkendava, leetja värvi. Ise-
 äranis palju kasvab metsikult magunaid meie läänepoolsetel saar-
 tel. Sagedasti kasvatatakse aiagemunat majade iluaedades kau-
 nistustaimena. Siin esinevad nõndanimetatud „täidetud õitega“
 magunad, millel palju rohkem kroonlehti kui harilikul magunal.

Magun on üheaastane roht-taim. Pikal sirgelt mullapõue
 tungival peajuurel kasvab kõrge hargnematu vars, mis tiheda



56. joon. Aiamagun. 1 — vilja ja õiega oks; 2 ja 3 — sigi-
 miku piki- ja rist-läbilõik; 4 — küps vili; 6 — tolmukas;
 5 ja 7 — seeme.

põlluvilja varjust päikese poole tungib. Teiste kitsalehiste põllu-
 taimede seas on ka maguna kitsad lõhestunud lehed kõigiti koha-
 sed päikesevalguse kinnipidamiseks. Põllutaimestiku valguse-
 kasinast alusvööst sirutab kõrge vars oma lehti üles päikese-
 paistele, valguseküllusesse. Varju jäävad lehed koltuvad vara-
 kult ära, — nad olid varjus viibides taimetele kasutud.

Kõik maguna osad on karedate karvakestega kaetud. Karva-
 vaip takistab lehtedest vee liigset välja-auramist. Õievarred,

millel igaühel üks õis, sirguvad leherootsude kaenlast välja. Õied valmivad munakujulistes õienuppudes; õienuppusid katavad kaks lootsikutaolist tupplehte, mis õie puhkemisel maha langevad. Pakatanud õie kroonlehed sirguvad neisse tungiva vee tõttu ja paisuvad silmapaistvaks krooniks. Kollakaspunastel või punastel kroonlehtedel on must laik, mis punasel õiepinnal risti pildi kujutab.

Õitel puudub õiemesi, kuid selle eest on neis palju õietolmu, mis arvurikkail tolmukail valmib. Tolmukad piiravad suurt munajat sigimikku, mille peal avar kilbilaadiline kaheksaviiruline emakasuude, kuhu õietolm kergesti peatuma jääb.

Lühikesel õitseajal käib veel võörsil palju mesilasi, kärbsed, kumalasi ja teisi putukaid, kes kumeral emakakilbil ringi luusides ja puhates ennast peene õietolmuga puuderdavad. Siit lendavad nad tolmuses rüüs edasi, juhtuvad mõne teise maguna emakakilbile ning peatuvad siin. Juhtumisi pudeneb sellel peatusel väikese külalise kuuelt emakasuudmele tolmu, mis suudme limale kinni jääb.

Sama õie tolmuga tolmunud emakas ei kasvata seemneid. Ainult siis, kui mõne teise maguna õielt toodud tolmu on olnud tolmutamishahendiks, kujuneb sigimikust seemnetega vili. Nii saavad siis magunad putukate kaastegevusel ristamisi tolmutatuks.

Maguna vili on mitmepesaline kupar ehk kugar. Kui kupar valminud, siis kerkib tema kaas servilt üles ning nende servade all tekkinud aukude kaudu varisevad valminud mustjaspruunid seemneterad kuprast välja. Kõrge kuivetanud vars õõtsus sügisese tuule käes ning vibutab pilukestest välja varisevad seemned emataimest kaugele. Maguna seemneid tarvitatakse toitude valmistamisel maitseainena.

Vaenlaste vastu on magunal paremaks kaitsevahendiks kõigist tema osade haavadest välja imbuv valge piim, mis õhu käes tardub mustaks taignaks. See on mõjus mürk oopium. Oopiumist saadakse veel teist kanget mürki — morfiimi.

Ülesanded ja küsimused. 1. Kuivata magun ja kleebi ta paberi: tervelt ja üksikute osade kaupa! 2. Joonista maguna õienupu ristlääbilõik; samuti ka emaka piki- ja ristlääbilõik; maguna varre piki- ja ristlääbilõik! 3. Mis kasu on magunal valgest, haavadest välja imbuvast piimast ja milleks kasutab inimene sellest saadud ainet? 4. Milleks tar-

vitavad arstid oopiumi ja morfiumi? 5. Valmista plastiliinist või savist valminud magunavili: tervena ja piki-läbilõikes! 6. Missuguse ilmaga avaneb valminud vili? 7. Mis kasu on magunal õitel käivaist putukaist? Missuguseid magunale kahjulikke loomakesi oled sa temal leidnud? 8. Joonista maguna õie plaan!

Kapsas ja kaalikas.


Vaatlused. 1. Tuleta meelde kapsa-taimelava valmistamise talitusi ja taimede ümberistutamise korraldusi! 2. Missugusele mullale istutatakse kapsataimi? 3. Võrdle seemnest vast mullapinnale jõudnud taime ja istutatava taime kuju! 4. Kirjelda kapsa edaspidist arenemist suve jooksul! 5. Missuguse kujuga kapsaid ja kaalikaid olete näinud? Nende nimetused. 6. Tee ületalve keldris hoitud peakapsast kevadel piki-läbilõik ja joonista selle lõigu täppis pilt! 7. Kirjelda õitsvat kapsast ja kaalikat, eriti õisi! 8. Missuguseid loomi oled sa kapsa maapealsetel kui ka maa all olevatel osadel leidnud? 9. Kas on nad kapsale kasulikud või kahjulikud? Milles avaldub nende tegevus? 10. Kuidas hävitatakse neid kahjulikke loomi?

Harva võime siin ja seal kodumaa mererannas leida paksude, lihavate sinakate lehtedega kasvu, mille lehed meile aia noort kapsast elavalt meelde tuletavad. See on metsikult kasvav merekapsas — meie aiakapsaste esivanem.

Juba õige vanal ajal märkasid inimesed, et seda kapsast võib toiduks tarvitada, ning korjasid teda mererannalt. Aegapidi õppis inimene selle kapsa seemneid kasutama ja külvas neid oma elukoha lähedale maha. Hea maa sees kasvasid merekapsa lehed lihavamaks kui kidural mererannal.

Kui me oma aiakapsaid vaatleme ja praeguse metsiku merekapsaga võrdleme, siis näeme, kui suurel määral inimene on suutnud ja osanud sundida taime muutama oma majapidamise tarvete kohaselt. Heade tagajärgede saavutamiseks on kulunud siin palju teravat tähelepanelikkust, mis iga väiksemagi iseärasuse ära nägi, selle ajakohaselt hindas ning edasi arendas. Taime teatavas suunas arendamiseks on üks võtetest järgmine. Peenral kasvavail kapsastel on mõnesugustel põhjustel mõnel näi-

teks iseäranis lihavad maitsvad lehed. Lihavate lehtedega kapsad eraldatakse teistest ja korraldatakse nii, et õitsmise ajal nende õied tolmuksid ainult lihavate lehtedega kapsaste



a




b



3


c




d

57. joon. Kapsas. a — peakapsas; b — lillkapsas; c — brüsseli ehk rooskapsas; d — nuikapsas.


õite tolmuga. Nende seemnetest saadud kapsaste lehed on sagedasti veel paremad ja lihavamad. Seda on juba ammu tähele pandud, et paljud vanemate omadused lastele edasi antakse. Nõnda toimetatakse iga uue põlvega, senikui saadakse soovitatavate omadustega kapsad. Jääb aga sedaviisi arendatud taim oma-



58. joon. Kapsa õisik.



59. joon. Kapsa õisik ja tolmukad.



60. joon. Kapsa õie plaan.

pead teiste hulka kasvama, siis läheb ta pikkamisi jälle ürgseisukorda. Siin ei ole siis iseseisvate kapsaliikidega tegemist, vaid teatava kapsasordiga. Sordi omadused ei ole vältavalt päritavad, kuna aga liigi juures pidevalt omadused on kestva eaga. Tegevust, millega ühest taimest mitmed uued sordid välja arendatakse, mis üht või teist viisi majapidamisele kasulikumad kui endised sordid, nimetatakse sordiparanduseks. Sordiparanduse mõjuvamaks arendamisvõtteks on kunstlik valik ja muudetud kasvamistingimused.

Igas vähegi korralikus juurvilja-aias leiame mitut sorti kapsaid (57. joon.), näit. peakapsast, kus lehed lühikesel varrel üksteisele nii ligidal, et tiheda pea moodustavad, brüsseli ehk rooskapsast, lillkapsast, nuikapsast. Metsikult ei ole neid kasvamas.

Kapsa eluiga vältab kaks aastat. Esimese aasta sügisel saadakse nõndanimetatud „kapsas“, mida toiduks tarvitame, Tahetakse aga ka seemneid saada, siis istutatakse talveks kapsad ühes juurtega keldrisse või mujale jahedasse pimedasse kohta. Kevadel paigutatakse nad jälle istikutena peenrale. Esimesel aastal kogunesid lihavasest tütükasse jõuained, mille varal ületalve elanud vanal tütükal kiiresti jälle elujõuline taim kujuneb.

Istikul asuvatest pungadest kasvab palju pikki varsi välja, millel õitsmis-eas kollaste õite kogud, õisikud, rühmituvad (58. joon.). Õisikut moodustavad õied asuvad siin kõik ühisel varrel väikeste raokete otsas; seesugust õisikut nimetatakse kobaraks. Igas üksikus õies vahelduvad neli tupplehte sama palju ristina asetatud kollaste kroonlehtedega. Õietupes on kuus tolmukat, millest kaks aga lühemad ja neli pikemad (59. joon.). Sigimik on pikergune ja tema lühikesel kaelal on nupusarnane kollane emakasuude (60. joon.). Õie kroonlehtede ristina asetuse tõttu kutsume kapsast ristõieliseks.

Nagu tulikalgi, valmib ka kapsal emakas enne tolmukaid. Ka siin on tolmu õielt õiele toimetajaiks lendavad putukad (miks lendavad putukad, aga mitte maasroomavad?), kes endale tasuks saavad tolmukate alusest väljaimbuva õiemee. Seesugust tolmutamist, kui ühe õie tolmu teise õie emakasuudmele peab sattuma selleks, et korralik tolmumine võiks toimuda, nimetatakse risttolmutamiseks. Kapsal võib tolmumine toimuda ühes ja



61. joon. Kaalikas.

samas õies oma tolmuga (see on isetolmumine), kuid nagu tegelik elu näitab, ei ole sel teel kujunenud seemned küllalt elujõulised.

Kapsa vili on pikk kõder (62. joon.), milles seemned teda poolitava vaheseina külge on kinnitatud. Kui vili valmis, siis pakatavad kõdra küljeosad vaheseinalt lahti ja seemned pudenevad tuule käes laiali. Kõdra pakatamine sünnib sel teel, et tema külgede pealmine pind kiiremini kuivab kui sise-
mised osad ja siinjuures tugevasti kokku kisub.



62. joon. Ava-
nenud kõder.

Meil juurvilja-aedades ja põllul kasvatatavad naerid ja kaalikad (61. joon.) on kapsaste lähemad sugulased. Nende taimede vilja ja õite ehitus on väga kapsa sarnane.

Põllul ja heinamaal kasvavad mitmesugused umbrohud, nagu Rakvere raibe, millel õie kroonlehed samuti ristina on asetatud ja õietorus kuus tolmukat, millest neli pikemat ja kaks lühemat. Kuid muu välimuse poolest ei näi neil sel määral siduvaid jooni olevat, nagu seda kapsal ja ta lähematel sugulastel nägime. Aga üksikud ühised tunnismärgid, nagu õie ehitus j. m. m. nähtused, toonitavad nende sugulust tundmaõpitud kapsa perekonnaga. Nad on kõik ristõielised.

- Ülesanded ja küsimused.** 1. Joonista kapsa ja kaalika õieplaan! 2. Võrdle kapsa sorte! 3. Kirjelda kõdra sisemist ehitust! 4. Vaatle peakapsa kumeraid lehti ja jõua selgusele, missuguse leheosa kiirem juurdekasv on sundinud kõnesolevat lehte kahvana peale liituma. 5. Pane kapsa lehelt leitud munad ja tõugud ühes lehega purki ja vaata, mis neist pikema aja jooksul välja tuleb. 6. Valmista plastiliinist kapsapea ja -kõder! 7. Joonista tubaka kirjelduse puhul antud juhutuste järele käies kapsa ja kaalika kasvatatava hulga diagramm ja teine diagramm sellest, kui palju koduküla ise tarvitab, kui palju ta ära müüb.


Hernes.

- Vaatlused.** 1. Pane hernesemned niiskele vatile või saepurule idanema! Vaata enne idanemapanekut hoolega leotatud

- hernetera ehitust! Joonista idanev hernes iga kahe päeva takka!
2. Pane idanev hernes nõõpnõelaga nii pulga külge, et vars allapoole ja juur ülespoole seisaksid (63. joon.). Vaata tema juure ja varre seisu mõne päeva pärast!
 3. Külva kevadel sada hernesemet maha ja vaata, kui palju aega kulub nende ülestõusmiseks. Kui palju seemneid oli saja seast idanemisvõimelisi?
 4. Vaatle suvi läbi nende herneste arenemisnähtusi!
 5. Millega kinnitab hernes ennast tugeledele ja miks?
 6. Vaatle tähelepanelikult herne juuri ja nende iseärasusi!
 7. Missuguseid loomi oled hernel tähele pannud?

Hernes on meie harilik ühe-aastane külvitaim. Teda on mitmes varjundis, mis erinevad üksteisest suuruse, kuju ja vilja headuse poolest, kuid üldiselt on nad väga sarnased.

Vaatlemisel torkab kõige pealt silma herne pikk nõrk, kergesti murduv vars, mis senini tundmaõpitud taimede varrest tähelepandavalt lahku läheb. Kasvades sagedasti inimese pikkuseks, ei suuda ta lehtede ja vilja raskust iseseisvalt kanda, vaid tarvitab tugesid, mille külge ta oma lehekeste köitraokestega kinnitub (64. joon.). Kui aga hernele tugesid ei panda, siis mässuvad varred köitraagudega üksteise külge ehk naalduvad teistele lähedalolevatele taimedele. Kuid lõpuks on säherdusest toetusest vähe ja herne varred langevad mullale, kus nad peagi mädanema hakkavad.



63. joon. Katse idaneva hernaega.


Herne köitraod on suurte liit-paarissulgsete, üksikult varrele asetatud lehtede osad. Tähelepanelikul vaatlemisel võime näha igal üksikul hernel lehe arenemist algusest lõpuni. Noor leht on kokku mässitud, keeratud nagu vedru ning surutud kahe ilma rootsuta abilehe vahele. Abilehed kaitsevad noort lehte igasuguste rikete eest. Noor leht hakkab teataval arenemisastmel ennast lahti painutama ja omandab täies eas järgmise kuju. Kahel pool rootsu, mis abilehtede vahelt algab, asuvad väikesed lehekesed, mis ühes rootsuga herne lehelaba moodustavad, kuna rootsu lõpupoolses osas lehekeste paaride

asemel on köitraod. Sagedasti võib näha, kuidas mõnes köitrao paaris teine raag esineb kidura lehena; siit näeme, et köitraod

ei ole muud kui teatavate ülesannete kohaselt kujunenud liitlehe lehekesed, millest ainult peasoone on arenenud.

Herne abilehed kasvavad pärast suuremaks ja täiendavad lehelabale kaotsi läinud, köitragudeks muutunud lehekeste aset.


Herne valged või kirjud õied on väga huvitavalt ehitatud. Kui me senini tundmatud taimede, nagu tulika, kapsa jne. õie ükskõik mis suguses suunas keskelt pikuti läbi lõikaksime, saaksime alati ühesugused lõigud; seesuguseid õisi nimetatakse korrapärasteks. Herne õis nende õite hulka ei kuulu. Teda võib ainult ühes suunas nii poolitada, et lõigud täitsa ühesugused saavad. Seesugust õit nimetatakse korratuks. Õietupp on viiest kokkukasvanud lehest karikake, mille seest 5 isesugust kroonlehte välja ulatuvad (66. joon.). Ülemist, kõige suuremat tagasi-pöördud kroonlehte nimetatakse purjeks, küljepealseid — tii-




64. joon. Herne oks.

baadeks, kuna kaht alumist kokkukasvanud, laevukest meelde-tuletavat lehekest laevukeseks kutsutakse. Õiel on natuke sarnasust liblikaga, mispärast teda ka liblikõieks ja hernest liblikõieliseks nimetatakse (65. joon.). Kui kroonlehed ettevaatlikult ära tõmbame, siis avanuvad meile kümme kõverdatud tolmukat. Üheksa neist on oma alumises osas kokku kasvanud, kuna ülemine, kümnes, [on vaba. Tolmukatest moodustatud toru sisemus eraldab magusat õie-mett, mis putukaid ligi meelitab. Mõlemal pool vaba tolmukat on praod, mis allpool laienevad; see on tee õiemee juurde.

Emakas koostub sigimikust ja pikast kõverast kaelast, mille otsas emaka-



65. joon. Herne õie plaan.




66. joon. Herne õis ja avatud laevuke.
K — õietupp; Fa — puri; Fl — tiivad;
Sch — laevuke.

suude. Emakasuudme all on kaelal hulk [peenikesi karvu, mis nagu pintslid moodustavad.

Kui õis alles pungas, siis on ta sisemised osad purje hõlmade vahele litsitud. Hõlmad on tolmukatele ja emakale kattedeks tupe asemel, mis siin oma karikakujulise ehituse tõttu on õie osadele toeks ja neid koos hoiab. Tolmukad valmivad õige vara, juba pungas, ja puistavad oma tolmu laevukese ülemisse osasse. Tolmuseks saab ka emakakael, iseäranis tema karvane osa. Senini ei või aga isetolmumine toimuda, sest emakasuude ei ole tolmu vastuvõtmiseks veel

küps. Avanenud õis paistab putukatele hästi silma — viimased lendavad siia ja istuvad õiele, iseäranis suured mesilased. Mesilase raskuse all lähevad õie tiivad kahele poole, laevuke vajub allapoole



67. joon. Hernes. *C* — iduleht;
m — seemnepilu; *r* — idujuur;
f — pung lehekestega.

ja emakas tuleb õiest nähtavale. Mesilane sirutab oma noka ülemise vaba tolmu alust mööda mee järele. Selle juures hakkab tema keha alumisele poolele tolmutatelt tolm. Järgmises õies, kus emakasuude tolmu vastuvõtmiseks juba on valminud, puutub mesilase rind õit avades emakasuudmega kokku ja teeb ta oma kuue küljest tolmuks. Mesilane lendab ära ja õis läheb uuesti kokku. Kerged lühikese kärsaga putukad ei pääse seesuguse ehitusega herne-õie mee juurde. Teiseks on säärase ehitusega õies õrn õietolm halva ilma ja niiskuse eest alati kaitsitud. Siin näeme, et herne-õie tolmutamiseks erilised putukad-tolmutajad peavad olema.


Herne kodumaal, Vahemere kallastel, on palju suuri mesilasi ja herneste tolmutamine

on nende poolt seal kindlustatud. Meie kodumaal ei ole sel määral suuri mesilasi ja sellepärast on loodus siin paratamata iserada käinud, et herneste edasikestmist kindlustada — herne

ja emakas tuleb õiest nähtavale. Mesilane sirutab oma noka ülemise vaba tolmu alust mööda mee järele. Selle juures hakkab tema keha alumisele poolele tolmutatelt tolm. Järgmises õies, kus emakasuude tolmu vastuvõtmiseks juba on valminud, puutub mesilase rind õit avades emakasuudmega kokku ja teeb ta




68. joon. Hernekaun.



69. joon. Idanev hernes.

õied tolmuvad siin peajasjalikult iseene se tolmust. Selle juures saab siiski häid idanemisvõimelisi seemneid.

Tolmunud sigimikust areneb meile igapäevasest elust tuntud hernekaun (68. joon.). Kaunal on kaks õmblust, mida mööda kuiv kaun avaneb. Tugevama õmbluse külge on seemned kinnitatud. Kõdras olid aga seemned vaheseina küljes. Kaun pakatab valmimisel nagu kõdergi ja seemned puistuvad laiali.



70. joon. Liblikõielistel juurtel leiduvad mügarad: *D* — hernel, *C* — ristikeinal, *A* — lupiinil.

Herne seemned on kaetud nahaga. Võtame naha pealt ära, siis leiame seest kaks seemnepoolt, mida nimetatakse idulehtedeks (67. joon.); nende vahel on väike side ja sellega ühenduses olev idu, millest tulevane hernes hakkab kasvama. Alguses kasvab idu idulehtedesse koondatud toidu arvel (69. joon.).

Vaatame lähemalt herne juuri. Pikalt peajuurelt lähivad küljuured välja. Juurte abil saab hernes mullast toiduks tarvisminevaid aineid. Juurte küljest leiame isesuguseid rohkearvulisi mügaraid (70. joon.).

Samasuguseid mügaraid leiame ka teistelt taimedelt, mis

hernestega oma õie-ehituse poolest sugulased, nagu meie põllul kasvavalt ristikkeinalt.

Põllumehed on juba ammu tähele pannud, et ristikkeina ja teisi liblikõielisi on kasulik külvata mitte ainult rikkaliku loomatoidu saamiseks, vaid ka sellepärast, et järgmistel aastatel neile põldudele külvatud rukis, nisu ja teised viljad annavad rikkalikumat saaki kui ilma ristikkeina maas pidamata. Ristikkein nagu rikastaks põllupinda tähtsate ainetega. Aasta 30 eest selgus, et need mügarad, mis ristikkeina juurtel kasvavad, koguvad õhust lämmastikku ja korraldavad teda taimedele vastuvõetavaks ühenduseks, mida taimed harilikult peale põllus oleva lämmastiku veel põllule külvatavast tšiiilisalpeetrist saavad.


Ülesanded ja küsimused. 1. Joonista herne õie plaan! 2. Joonista herne õie üksikud osad! 3. Joonista herne leht! 4. Joonista avatud hernekaun ja valmista avatud kaun plastiliinist! 5. Missuguse saatuse osalisteks saavad tuge deta jäetud herved? 6. Miks külvatakse herneid põllule „segadisena“? 7. Missuguseid hernesortisid tead nimetada? 8. Mille poolest erinevad aias kasvatatavad hernesordid põllu omadest? 9. Mis kahju teeb sademeterikas suvi hernele? 10. Kui palju puudasid herneid saite teie tänavu põllult? Valmistage kogu oma küla aastase hernesaa gi diagramm!

Harilik kõrvits.

Vaatlused. 1. Kuidas valmistatakse kõrvitsale kohast mulda? 2. Vaatle, kuidas mõjuvad kevadised kui ka sügisesed öökülmad kõrvitsasse. 3. Vaatle tähelepanelikult kõrvitsa lehti ja nende rootsudega kõrvuti algavaid köitraage ning võrdle viimaseid lehtede jämedamate soontega! 4. Külva lillepotti kõrvitsa seemneid, sügisesi, aastasi, kahe-, kolme- ja nelja-aastasi, igaihest ühepalju! Korda seda kevadel! Missugused neist olid idanemisvõimelisemad? Mida tarvitavad kõrvitsa seemned täie idanemisvõime omandamiseks? (Kauema-aegne seismine.) 5. Vaatle, kuidas tungib noor kõrvits maa seest välja, joonista väljatuleku järjekorralised nähted! 6. Vaatle tähelepanelikult kõrvitsa õisi ja kirjelda, mille poolest nad erinevad varemini tundmaõpitud taimede õitest. Kuidas toimub nende tolmumine? 7. Kirjelda kõrvitsa vilja!

Kõrvits on harilik juurvilja-aia taim. Jõudsaks kasvamiseks armastab ta väga rammusat mulda. Sellepärast kastetakse teda veel sõnnikuveega. Meie kevadised ja sügised külmad on kõrvitsale kahjulikud — hoolas aednik idandab kõrvitsaid toas pottides või soojades lavades. Kõrvitsa sooja-armastus on meile arusaadav, kui meelde tuletame, et ta on Ameerika soojalt alalt välja-asundatud asunik.

Noorte kõrvitsate edusat kasvamist toetab umbrohtudest puhas ümbrus; aga kui ta kord jõudsasti arenema on saanud, lämmatab ta peagi teise taimestiku oma laiade lehtedega. Ainult



71. joon. Kõrvitsa õied. 1—2 — isane õis; 3 — emane õis; 4—5 — kummagi õie plaan; 6 — tolmuks; 7 — emakakael ja suudmed.

väike roosteseen, mis sagedasti tema peale asub, on talle kardetavamaks vaenlaseks.

Kõrvitsal on tugev lihav maapinnal lamav vars, mille kohale lehelabad ennast viilkatusena seavad. Leherootsud, mis igalt varreosalt algnevad, harunevad lehelabas tugevateks soonteks. Pea iga lehe alguse kõrvalt võrsub roots, millel lehelaba puudub. Tema korgitõmbajana keerdunud harud on väga tundlikud elundid. Niipea kui nad mõnesuguse toega kokku puutuvad, keerutavad nad ennast selle ümber (kõitroad).

Suurte südajate lehtede labade servad on 5—7 hõlmaks soonitud. Nagu vars, on ka kõik teised taimeosad kaetud kõvade harjastega. Karedad harjaspinnad on kõrvitsale kui pehmele

mahlakale taimetele kõige paremaks kaitsevahendiks loomade vastu. Siledat kõrvitsa vilja aga söövad aplalt sead, veised ja lambad.

Pea iga lehe kaenlast võrsuvad õienupud, mis lopsakateks kollasteks õiteks kujunevad (71. joon.). Vaatlusel märkasime, et ühtedel õitel on tupest alamal piklik munajas osa — sigimik, kuna see teistel aga puudub. Kummagi õie sisemust lähemalt silmitsedes leiame, et ka siin ühtlus puudub. Ühtedest õitest leiame, peale kokkukasvanud viielehelise tupe ja sama-arvulise krooni, viieharulise suudmega emaka. Teistes õites jälle kareda tolmuaga kaetud kollase pikliku kuuli, mis kolmele jalale toetub. See viimane ei ole muud kui tolmuak, mille pead ja niitide ülemised osad on kokku kasvanud. Lähemal vaatlusel selgub, et siin on viis tolmuak peadpidi liidus. Õie põhjal on veel kollakas nääre, mis õiemett eritab.


Õisi, milles ainult tolmuak, kutsutakse tolmuakatega ehk isasteks õiteks, teisi aga emakatega ehk emasteks. Kummadki õied on siis ühesugulised. Et mõlemat sugu õied ühel ja samal kõrvitsal kasvavad ja valmivad, siis kutsutakse kõrvitsat ühekojaliseks taimeks.

Kõrvitsa isetolmumisest ei või juttugi olla. Tolmutajaiks on siin mesilased ja kumalased. Osav aednik kannab ise tolmu isastelt õitelt emaste õite emakasuudmele ning on nii tolmutamise vahendajaks. Emaste õite rist-tolmutamist kindlustab ka see asjaolu, et isased õied varemini valmivad kui emased. Emaste õite munajas sigimik areneb peale õitsmist suureks marjaks: sagedasti leidub sügiseti aedades puudaraskusi kõrvitsaid. Selle suure marja sügavamas siseosas peitub kore mahlane liha, millesse seemned mitmelt realt põimuvad.

Kõrvitsa vilja valmimisega ühes ei saa tema seemned sigimisvõimelisteks. Järgmisel kevadel mahakülvatud seemneist lähevad ainult üksikud kasvama. Teised jäävad kaotsi. Alles paar aastat rahu ja kuivas hoitud seemned omandavad täie sigimisvõime. Järjekult tarvitavad kõrvitsa seemned peale viljast vabanemist pikemat idanemisrahu.

Mulda istutatud seeme pundub niiskuse mõjul, tema teravast otsast tungib juureka välja ja kinnitub mullale (72. joon.). Varre alusotsal olev paksendus toetub seemnekesta alumisele servale. Kiiresti kasvav vars paindub peagi selle toe najal looka

ja venitab mullale kinnitunud kestast idulehed välja. Ümmarikud idulehed ajavad ennast hea ilmaga laiali, külma ja vihmasega tõmbuvad uuesti kokku. Peale esimeste pärislehtede ilmumist



72. joon. Kõrvitsa idanev seeme. *A* — seeme; *B* — avanev seeme; *C* — idu väljatulek; *D* — seemnekest; *E* — noor taim.

langevad idulehed maha. Niipea kui kõrvits õitsema hakkab, jääb peatuma senine kiire juurdekasv. Vili valmib septembri lõpul. Kõrvitsa vili on inimesele hea toit. Tema seemnetest val-

mistatakse õli. Ühtlasi tarvitab rahvas kõrvitsa seemneid soolikast paelusside väljatõrjumiseks.

Ülesanded ja küsimused. 1. Joonista kõrvitsa isase ja emase õie plaan! 2. Joonista kõrvitsa köitraag ja leht ühes täpsa soonestiku pildiga! 3. Mille järele sa otsustasid, et kõrvitsal on viis tolmukat? 4. Valmista plastiliinist kõrvitsa vilja poolik! 5. Seleta, miks me kõrvitsat ühekojaliseks taimeks peame. 6. Mida tuleb mõista seemne idanemisharu aja all? 7. Kui palju korjati viimasel aastal teie lähemas ümbruses kõrvitsaid? 8. Mis kujul kasutatakse kõrvitsat toiduks?

Porgand.


Vaatlused. 1. Missuguseid porgandisorte tead nimetada? Mille järele eraldatakse neid üksteisest? 2. Kirjelda porgandi kasvamise käiku! 3. Vaatle, missugused putukad tolmutavad porgandi õisi. 4. Kuidas hoitakse porgandi lihavaid juuri ületalve? 5. Nimeta loomi, kes ületalve hoitavaid porgandeid rikuvad. 6. Vaatle, missugused abinõud on porgandi seemneil endi levitamiseks. 7. Kui palju aega kulub mulda pandud porgandi seemnel idu mullast välja ajamiseks? Kuidas kiirendatakse idanemist?

Sügisel leiame juurvilja-aias muude juurviljade seas ka porgandi. Maa sees on tal nüüd piklik lihav magusmaiguline juur. Mida rammusam on porgandipeenra muld, seda paksem on punaka liha kord juure kollaka südamikü ümber. Inimene kasvatab porgandit just selle magusa suhkrurikka lihava juure pärast. Jämedal peajuurel leiame hulga armisid — need on külgjuurte asemel, mis peajuure hoogsal paisumisel on närbunud. Maa peal on porgandil esimesel eluaastal väga lühike vars, millel mitmekordselt lõhestunud lehtede kimp ennast laiali laotab. Äärmistel välistel lehtedel on pikemad, keskmistel lühemad rootsud; nii puutuvad siis kõik lehed päikesevalgusega kokku.

Pikk peajuur, mis sügavale mullapõue tungib, saab sealt ka kõige kuivemal ajal küllalt niiskust. Samuti aurab ka kitsasteks siiludeks lõhestunud lehtede kaudu võrdlemisi vähe niiskust ära. Selle tõttu on porgand kuivale palju vastupidavam kui paljud teised taimed.

Esimesel aastal ei jõua porgand õitse-eani. Alles soojas

keldris või sügavas mullas ületalve elutsenud juured kasvavad järgmisel aastal seemnekandjaks taimeks. Kevadel mulda istutatud juurelt võrsuv porgand on eelmise-aastasest tublisti lahkuminev. Maa peal kujuneb tal pikk harvade lehtedega vars. Mullas



73. joon. Porgand. *A* — ladva osa; *B* — vilja sarikas; *C* — üksik õis; *stp* — nõlv; *D* — vili; *E* — vilja ristlambilõik; *F* — liitsarikas; *h* — liitsarikas.

peituv pehme juur puitub ja kortsub — ta on kasutatud kevadel toiduks kiiresti arenevatele lehtedele ja varrele.

Varre otsale ja lehe kaenaldesse kujunevad õieraod; need jagunevad paljudeks lühikesteks harudeks, millest igaüks jälle haruneb. Mõlema harunemispunkti all on lõhestunud sillehtedest ümbrik. Iga teisejärgulise haru otsal on väike valge õis. Õieraokese ots on paisunud sigimikuks, mille peal kõik teised õie

osad asetsevad. Porgandi õite rühma kutsutakse liitsarikaaks; see koostub liitsarikaist (73. joon., h ja h').

Sigimiku peal on puudulikult arenenud tupp ja viis valget südamekujulist kroonlehte sama paljude tolmukatega vaheldumisi. Kroonlehed ja tolmukad kinnituvad tühisele nõlvale, mis ka õiemett eritab. Sellel nõlval on kaks emakakaela nõõpjate suudmetega.

Iga õis üksikult on väike ja tähelepandamatu, kuid suurel hulgal sarika pinnale koondunuina paistavad nad juba kaugele. Meemaiad putukad, nagu kärbsed ja mõned teised, on siin õitel hulgakesi koos ja toimetavad õielt õiele lennates rist-tolmutamist.

Igast tolmu saanud sigimikust valmivad kaks kisude ja okastega kaetud seemet, mis valmides teineteisest lahti pakatavad, kuid esialgu siiski niitipidi kokku jäävad. Peale õite kustumist koonduvad kõik sarika osad üksteisele ligemale ja seesugune liitsarikas tuletab linnupesa meelde. Nii on siis noored seemned kaitstud enneaegse lahtirabamise eest. Samuti korraldub ka õitsev sarikas halval ilmal. Sel puhul võib temas leida palju halva ilma eest pelgu pugunud väikesi loomakesi. Saab aga porgandi vili valmiks, siis laotab sarikas enese lahti, ja kui vibav vars rabab tuule tõugetel seemned sarikalt minema.

Kisujad seemned haagivad ennast möödaminevate inimeste ja loomade külge, kes neid siis uutele asukohtadele kannavad. Eriti kasulik on see viimane seemnete laialisaatmise viis metsikult kasvavaile porganditele.

Porgandi seeme on visa idanema: sagedasti jääb ta enam kui kolmeks nädalaks mullapõue idanema. Sellepärast on soovitatav teda varakult sooja mulda, näit. tuppa lillepotti, idanema panna. Noor porgand tarvitab palju päikesevalgust; varjus jääb ta peagi kängu.

Suurimaiks porgandi vaenlasiks on rotid ja hiired, kes talvel tema magusat lihavat juurt isukalt hävitavad. Samuti kahjulik on porgandile ka üks kärbes, kes oma munad tema juurtele muneb. Munadest välja tulevad tõugud teevad porgandi juure urbseks ja hävitavad sellega kogu taime. Porgandile omase vänge lõhna sünnitavad temas sisalduvad vängelõhnalised õlid. Inimene valmistab porgandist omale ja loomadele toitu. Juurviljad nagu porgand on ülitähtsad toiduained eriti noortele kasvavatele inimestele.

Ülesanded ja küsimused. 1. Seleta, kuidas saaks metsikust porgandist sordiparandamise teel maitsev porgand arendada. 2. Mistarvis peab peenraid rohtima ja tihedalt külvatud porgandeid harvendama? 3. Vaatle, missugused loomakesed otsivad porgandi liitsarikaist peljupaika. 4. Joonista esimese aasta ja teise aasta porgandi pilt; seemne pilt! 5. Valmista plastiliinist rottide näritud porgand! 6. Missuguste toitude näol tarvitame porgandit?

Valge emanõges.

Vaatlused. 1. Vaatle, kuidas mõjub arvukas emanõgeste padrik teise taimestikku. 2. Juuri emanõges üles ja katsu igapidi vaadeldes selgitada, mis vahe on emanõgeste juurte ja nende juuresarnaste elundite vahel, mis mullapinnas levivad ja millest varred end püsti ajavad. 3. Joonista, nagu tubaka kirjelduse puhul juhatatud, emanõgese lehtede varrel asetsemise plaan! 4. Missuguses järjekorras hakkavad õitsma õied emanõgese varrel? 5. Uuri järele, kuidas töötab emanõgese õie sissesead, kui kumalane õie alumisel huulel istub ja õide mee järele tungib. Katsu ise lihtsate abinõudega seesugune õie mehhanism valmistada!

Valge emanõges on mitmeaastane umbrohi, mis aedade ääres, kraavides ja mujal varjatud kohtades kasvab ja siin hoogsalt paljunedes teise taimestiku peagi lämmatab.


Valge emanõges ilmub vara kevadel ja kasvab ning õitseb hilissügiseni. Tema varast ilmumist võimaldab mullas ületalve elutsev suur haruline juurikas, maa-alune vars, millesse juba eelmisel sügisel olid koondatud varaseks kasvamiseks kuluvad ained. Temalt sirguvad varred üles kui oksad tüvelt, kuna tema sõlmekohtadest juured mullapõue toidu järele poevad; selle tõttu paljuneb valge emanõges ootamata kiiresti.

Valge emanõgese neljakandiline karvane vars on seest õõnes ja tugevuseks on tema sõlmekohad umbsed.

Lehed asetsevad varrel paarikaupa vastamisi, mille juures iga järgmine lehepaar nii on asetunud, et ta alumisi ei kata. Seesugune lehtede asetsemine varrel võimaldab kõigile lehtedele tarvilikul määral päikesevalgusest osa saada. Peale selle on alumistel lehtedel pikad rootsud, ülemalseisjatel aga on seda

lühem roots, mida kõrgemal ta seisab, kuna ülemised päris ilma rootsuta on ja varrel istuvad.

Õied on ringidena ülemiste lehtede kaenlas, missugust õite koondust m ä n n a s e k s nimetatakse. Õietupp on liitlehe-line (arv?). Korratu kroon on valgevärviline. Kroonlehed ühinevad alumises osas toruks, kuna ülemised osad koonduvad nagu kaheks huuleks, mille tõttu ka õiele nimeks on antud kahehuuleline (tahvel I). Ülemise huule all on 4 tolmukat (74. joon.), millest kaks pikemad ja kaks lühemad. Tolmukate vahelt ulatub, nagu ussi keel, kaheharuline emakasuuude välja. Kui me õiest krooni ettevaatlikult välja tõmbame, siis tulevad temaga ühes ka



74. joon. Valge emanõgese õie plaan.

tolmukad: need on alumiste osadega krooni külge kasvanud. Õiepõhja jääb emakas, mille sigimik nagu 4 kokkuliitunud pesa näib olevat. Kui õiekrooni alumise otsa suhu pistame, siis leiame sealt magusat mett, mis kumalastele, kes tolmutamist toimetavad, tasuks määratud. Kumalane istub õie alumisele huulele pugedes pea ja rinnaga ülemise, kilbisarnase huule alla. Selle juures puudutab tema turi kõige pealt emaka-suudet ja pärast ka tolmukaid. Õielt

ära lennates viib ta oma seljale pudenenud tolmü järgmisele õiele ja avitab sedaviisi toimuda huulõie tolmumist.


Valge emanõgese vili on õietupe sees, mis peale õitsmist püsima jäi. Ta jaguneb küpseks saades neljaks iseseisvaks osaks ja tuul rabab temast seemned välja ning kannab laiali.

Seemnest õitse-ealiseks saamiseni kulub valgel emanõgesel kaks aastat.

Välimuse ja õite poolest valge emanõgese sarnane on niiskeis kohtades kasvav münt, mida temas sisalduvate lenduvate õlide tõttu arstirohuks tarvitatakse.

Sellepärast et valgel emanõgesel ja mündil nõndanimetatud huulõied on, kutsutakse neid ka huulõielisteks.

Ülesanded ja küsimused. 1. Joonista emanõgese ja mündi õie plaan! 2. Vaata tähelepanelikult valge emanõgese vilja ja seemneid! 3. Mis peab valge emanõgese sigimikku kasvama, et sellest seemneid



Valge emanõges.

1 — lehis vars; 2 ja 3 — õis; 4 — õie tolmutamine kumalase kaastegevusel;
5 ja 6 — vilii.


kandev vili arenema võiks hakata? Kuivata raamatu vahel eespoolantud juhatause järele mõned valge emanõgese lehed ära ja koputa riideharjaga nende peale! Lehe pehmed osad pudenevad ära — mis jääb püsima? (võrksoonestus.) 5. Joonista emanõgese õie piki-läbilõik, emanõgese varre läbilõik! 6. Juuri emanõgese ühe juurika peal kasvav perekond üles! 7. Loe igal üksikul varrel olevad õied: õitsel olevad, äraõitsnud ja õitsele minevad ära ja katsu arvutada, kui palju seemneid tuleb sellest perekonnast. Kui palju ruumi tarvitaks selle perekonna seemnestik järgmisel kevadel, kui vabaks arenemiseks igale seemnele kuluks ainult üks ruutjalg maad? 8. Valmista plastiliinist emanõgese vili!

Kassitapp.

Vaatlused. 1. Kirjelda kassitapu välimust ja tema kasvu-kohti! 2. Vaatle lehtede tihedust varjus ja lagedal kasvaval varrel! Tee seda paljude vartega! Mõõda kummalgi juhusel üksikute lehtede vahe! Kummal puhul on varrel lehti tihedamini? 3. Vaata, missugust mõju avaldab ühekülgne valgustus lehtede asetsemisse varrel. 4. Nimeta taimi, kelle eest kassitapp päikesevalgust varjab. 5. Vaatle, kuidas kassitapp toele naaldub. 6. Kuidas otsib noor varre ots endale tuge? (pikemat aega vaadelda!) 7. Kirjelda õisi ja joonista õie piki-läbilõik! 8. Missugused putukad viibivad tema õitel ja mis ajal? 9. Missugused muutused toimuvad õites õhtul ja halva ilmaga? 10. Kui kaua õitseb üksik õis?

Mullapinnas leiame kassitapul juurika, mis mulla peal haruneb (75. joon.). Juurikalt lähevad mullapõue pikad peened juured. Maa-aluselt varrelt võrsuvad paljud varred, mis alguses maad mõõda lebavad, kuid püüavad peagi mõne naabruses oleva asja ümber väänelda. Kassitapp väändub toele vastu päikese käiku tõusvas ringis. Peale selle on tema vars veel laus keerus nagu korrutatud lõng. Senikui varred teiste taimede varjus omale teed päikese poole otsivad, on neil ainult üksikud harvad lehekesed; niipea aga kui nende otsad valguse kätte ulatuvad, tekib sinna tihe lehestik. Lehed seaduvad harilikult valguse järele; kui taim on igast küljest ühtlaselt valgustatud, siis leiame lehti igalt varreküljelt, vastasel korral koonduvad nad ainult valgustatud küljele. Pikkadel nõrkadel leherootsuldel asetsevad

noolteravad süvalõhelised lehelabad, mille labalõhesse leheroots kinnitub. Kassitapu lehed on selle poolest iseäralikud, et nende sooned ei ulatu lehelaba servadeni.



75. joon. Kassitapp. *A* — vars toel; *B* — õie läbilõik; *C-h* — meenõlv; *D* — õitsev latv.

Kassitapu väga nõrgad varred ei suuda kasvamisel end iseisvalt püsti ajada. Et lehtedele kindlustada tarviliku valguse küllaldast saamist tiheda taimestiku seas, nagu põllul ja aia

veertel, kus ta umbrohuna kasvab, väändleb ta, nagu eespool nägime, teiste tugevama varrega taimede ümber. Sellepärast kutsutakse kassitappu v ä ä n d k a s v u k s.

Lehtede kaenlast kasvavad õite raod, millel roosakad või täisvalged õied; valge krooni välisküljel on siiski roosakad sooned. Esialgne õieraag hargneb sagedasti kaheks või koguni kolmeks. Hargnemiskohal on kaks väikest ja igal haruvarrel peaaegu tema keskpaigas veel kaks kitsast lehekest; need lehekesed on esialgu noorele õiepungakesele katteks. Õie tupp- kui ka kroonlehed on viiest iseosast kokku kasvanud. Krooni torust ulatuvad tolmukad välja; nad on oma niitide alumise otsaga tema külge kasvanud. Tolmukate keskelt pistab emakas oma kaheharulise suudme välja. Sigimiku all on kassitapu õies isesugune elund, m e e n ä ä r e, mis õiemett sõõrutab. Ainult krooni külge kasvanud kahe tolmukaniidi vahelt läheb väike toruke õiemee juurde. Kassitapu õite harilikud külalised on videviku eel lendavad pika-kärsalised putukad, kes oma pika kärsaga õiemeeni küünivad ja seda oma maiustoiduks tarvitavad. Mesilased ja teised lühikärsalised putukad, kellel raskem on õiemett kätte saada, lendavad väga harva kassitapu õitele. Kui putukad mingil põhjusel oma kaastegevust tolmumise ajal kassitapu õitele ei ole pakkunud, siis kummarduvad valminud emakasuudme harud tolmukate poole ja puutuvad nii siis õietolmuga kokku.

Kahest poolest koostuvas sigimikus valmib neli seemet. Vili on kupar. Kassitapud õitsevad suvest hilissügiseni, kuid iga üksik õis ilutseb väga lühikest aega. Arvurikastest õitest valmib peale tolmumist palju seemneid, — kuni 600.

Kassitapp on üks visamatest umbrohtudest, millega põllumehele raske on võidelda. Sügav künd ja varane vilja mahaniitmine ühes kassitappudega on ainukesed abinõud nende hävitamiseks. Kassitapu visaduse ja arvurikkuse põhjuseks on peajasjalikult tema mitmeaastane mullapõues ületalveti elutsev juurikas ja seemnerikkus. Teiseks ei armasta teda toiduna ka kariloomad. Kasvujõulised kassitapud lämmatavad sagedasti teise, tugevama taimestiku, ja vili, mille tuul väljal maha sõtkunud, hävib kassitappude võimulepääsmisel lõplikult.

Huvitav on tähele panna, kuidas kassitapp tuge otsides oma ladvaga õhus ringisid keerutab. Tuge leides surub ta ennast selle

vastu. Toele naalduv varre külg hakkab aeglasemalt, välimine aga kiiremalt kasvama; selle tõttu keerdub siis kassitapu vars tõusvas ringis tuge mööda ülespoole, surudes seda kogu oma raskusega.

Ülesanded ja küsimused. 1. Katsu ühe kassitapu juurelt arenevate juurikate ja varte kogu üles juurida! Kui palju varsi on sellel pesal, kui palju neil vartel õisi? Kui palju seemneid kannab üks pesa? Vaata, kui sügavale tungib selle pesa juur. 2. Mis teeb raskeks kassitapu vastu võitlemise? Kuidas toimetada seda võitlust? 3. Kirjelda viljapõllu osa, kus palju kassitappe kasvab. 4. Missugune kasvamisviis sunnib kassitapu vart ümber toe painduma? Mis suunas sünnib see paindumine? 5. Missugune taime osa jääb sügisel püsima ja elab ületalve? 6. Kirjelda juurika ja juure vahet! 7. Mis kasu on kassitapul juurikast? 8. Joonista kassitapu õie plaan! 9. Joonista kassitapu leht ja märgi hoolega soonestiku levimine! 10. Miks nimetame kassitappu väändkasvuks? 11. Missugust kassitapu lähemat sugulast taime tead sa nimetada?

Harilik kukehari.


Vaatlused. 1. Kirjelda kukeharja kasvukohti! 2. Iseloomusta tema juuri! 3. Jõua selgusele, kas kukehari on ühe- või mitmeaastane taim. 4. Juuri kukehari ja mõni teine taim üles ja vaata, kumb neist närtsib rutemini. 5. Vaatle lehtede kuju ja nende seisu varrel! 6. Kuidas kuivab märg hunnikusse visatud pesu üksikult ülesriputatud pesuga võrreldes? 7. Maitse kukeharja lehti! 8. Missuguseks muutuvad kukeharja lehelõikude pinnad? 9. Kirjelda tema õisi ja vaatle, kuidas toimub nende tolmumine. 10. Vaatle, missugusel ilmal avanevad kukeharja viljad, millal nad sulguvad.

Harilik kukehari kasvab kiviaedadel, porsunud kividel ja veevaesel mullapinnal (76. joon.). Tema mullakehva pinda tungivad juured on väga kidurad, peenikeste narmaste taolised. Pikki tugevaid juuri ei oleks kivisel pinnal ka kuhugi kinnitada; ühtlasi ei või neist hariliku kukeharja elukohas tarvilikku tulu olla. Olgugi et kukeharja juured on kidurad, talub see taim ometi nädalatepikkust pöuda kerge vaevaga. Maast eraldatuna õitseb ta päevade kaupa, sellest hoolimata, et juurte kaudu mingisuguseid aineid ega vett juurde ei tule.

Kukeharja vastupanevus kuivale oleneb peaasjalikult tema lehtede isesugusest ehitusest ja varrel asetsemise viisist. Tema

lehed on paksud ja lihavad. Lehtedes peitub suur vee-tagavara, mida nad iga vihmasaju puhul endasse täiendavalt imevad. Lehtedes sisalduva vee-tagavara arvel elabki harilik kukehari oma tavalise visadusega. Ühtlasi istuvad kukeharja rootsuta lehed tihedalt varrel ja katavad osaliselt üksteist soomustena. Seesuguses seisus tuulduvad lehed vähe ja neist aurab kaugelt vähem niiskust välja kui üksteisest kaugemale laotatud lehtedest. Lihavad veerikkad lehed on paksu nahaga kaetud, mis omakorda raskendab vee välja-auramist.

Võtame kaks ühtlaselt niisutatud ühesuurust riidetükki ja paneme ühe kokkurullitult ja teise laialilaotatult kuivama. Esimene vajab kuivamiseks palju rohkem aega kui teine, sest teise auramis-pind on palju suurem ja sama hulk niiskust jõuab temast kiiremini ära aurata. Kukeharja lehed on munajad ja paksud — seega on nende auramis-pind väiksem kui samamahulistel õhukestel laia-del lehtedel. Kukeharja lehtede



76. joon. Kukehari. All nurgal üksik leht.

murupinnad jäävad kauaks ajaks limakaks-niiskeks. Selle nähtuse põhjuseks arvatakse olevat lehtedes sisalduvat lima, mis hoogsat vee ära-auramist takistab.

Kukeharja lehed on küll lihavad, kuid selle peale vaatamata ei söö loomad neid, sest nad on kibedad, pipramaigulised. Sellepärast nimetatakse kukeharja saksa keeles ka kivipipraks.

Kukeharja nõrgad lühikesed varred roomavad kivisel pinnal; ainult nende ladvad ajavad end püsti. Seesugune varte seis takistab ka soovimata vee-auramist. Sagedasti lebavad varred nõnda tihedalt kiviaial, et aed pea täiesti kukeharjast vaiba alla peitu jääb. Õitseajal katab seda kollakasrohelist vaipa helekollaste õite sõba, mille kogupind on putukaile nagu märklaud sihinäitajaks.

Kullakarva õied koostuvad viielehelisest tupest, viiest kroonlehest, kümnest tolmukast ning viiest emakast. Tolmutamine sünnib putukate kaastegevusel.

Äraõitsnud õiest jääb sigimik püsima ja areneb viieharu-

liseks viljaks. Kui ilmad kuivad seisavad, siis viibib kukeharja vilja avanemine. Ainult kui suur kaste maha langeb või vihma tuleb, pakatavad ka valmid kukeharja viljad. Vihm uhab pärani avanenud viljakarbi harude pragudest väikesed pruunid seemned välja, nõrguv vihmavesi kannab nad kivipragude mullakirmesse. Kuival ilmal sulguvad kukeharja viljapraod. Mullasse sattunud seemneist areneb noor kukehari. Ka vanadest kukeharjadest jäävad sügisel kehva mullapõue juured ja varrekontsud, millest järgmisel kevadel uued võsud võrsuvad.

Kukehari on üks visama elujõuga taim. Ühtlasi on ta ka üks esimestest asunik-põllumeestest kehval kivisel pinnal.

Ülesanded ja küsimused. 1. Missugust kaitset pakub kukeharjale tema kibeda maiguga mahl? 2. Joonista kukeharja varrejätk ja sellest mulda ulatuvad juurnarmad! 3. Joonista kukeharja õie plaan ja õie piki-läbilõik! 4. Tee vaatluse najal kindlaks, mida leiavad putukad kukeharja õitelt. Missugused putukad lendavad siia? 5. Kirjelda seemnete laialilaotamise viisi!

Sügisene lehtede langemine.


Vaatlused. 1. Vaatle üksikute puude ja põõsaste lehtede värvi muutumist ja katsu koltuvaid lehti aeg-ajalt värvide varal joonistada! 2. Pane tähele metsa varjus ja lagedal karjamaal kasvavat kaske või mõnd teist puud lehtede langemise ajal: kumma lehed hakkavad varemini varisema, kumb neist on veel hiljemini lehis? 3. Vaatle lehtede oksalt varisemise järjekorda paljudel puudel ja põõsastel! 4. Vaatle, kuidas varisevad liitlehed. 5. Vaatle, kui kaua kestab ühe või teise taime lehtede varisemine? 6. Joonista paljude taimede lehtede murdekohtade täpsad pildid!

Aastast aastasse kordub sügisel meie mitmeaastastel taimedel lehtede mahaheitmine. Puudel ja põõsastel muutub lehes-tiku värv: kevadine õrnroheline leht läheb südasuvel tumeroheliseks ja lõpuks sügispäeval koltunuks. Koltunud lehed ehivad puid kui mitmevärviline kuub. Mida enam aeg talvele läheneb, seda rohkem pudeneb puude värvirikkast rüüst lehti, mida kõle sügisetuul ringmängule talutab. Peagi on puud raagus ja kattuvad valge talvevaibaga.

Ühtedel taimedel varisevad lehed mõne päeva jooksul (saar), teistel, nagu näit. tammedel, kulub selleks mitu nädalat; üks osa lehti langeb viimastel koguni talve lõpul.

Varemini pungadest ilmunud lehed varisevad lehelangul esimestena, nooremad lehed aga hiljemini. Nii on siis üheks nähtavaks langemise põhjuseks lehtede vananemine.

Taimed vabanevad lehtedest sügisel väga mitmel viisil: ühtedel algab pudenemine oksa otsalt, teistel jälle alult. Saar-



77. joon. Langevad hobukastani lehed.

tel varisevad kõige pealt oksa otsmised lehed, kuna aga paplitel ja pirnipuudel toimub see nähtus vastupidi. Sagedasti jäävad nende viimatinimetatud taimede okste otstele üksikud lehed visalt kauaks püsima, alles esimesed tuisud murravad need jõuga aluselt lahti.

Lehelangu eel rändavad lehtedest viimased toite- ja jõuained okstesse ja tüvesse talvekorterisse, kuna jälle suvise ülesehitava töö kõrval taimesse kogunenud kõlbmatud, kahjulikud

ained lehtedesse koonduvad. Seesugune ainete ümberasetamine on ka lehtede värvi muutumise tähtsamaks põhjuseks. Lehtede mahaheitmisega vabaneb taim kahjulikkudest ainetest — väljaheidetest. Mahalangenud lehed mädanevad ära, saavad mulla osadeks, kust neisse varisemisel jäänud, taimetele tarvilikud ained jälle uuesti elu ringkäiku tõmmatakse.

Langemise eel kujuneb lehe ja oksa vahel rabe korkkiht. Samasugune korkkiht moodustub ka liitlehe üksikute osade jätkukohtades. Lehed murduvad varisemisel harilikult korkkihi-vöödel (77. joon.). Murdumisvöö on igal taimel isesuguse kujuga; harilikult võib värskel murrul näha valgete täppidena ka lehesoonte jälgi, mis rootsu kaudu tüvesse ulatuvad. Korkkiht, mis langemise eel murrukohtadele kujunes, katab mahalangenud lehe armi kinni (otsi murrukohad 77. ja 83.—88. joonisel üles).

Mis on siis lehtede langemise põhjuseks? Harilikult arvatakse, et lehtede ärakülmumine. Kuid tõeliselt ei ole see nii. Esitame ühe hariliku aednikkude katse. Jahendame kõrvitsa või tubaka juure ümber mulda ligikaudu $+2^{\circ}$ kuni $+3^{\circ}$ C järele. Nagu teame, aurutavad nende taimede lehed palju vett ära. Olgugi et õhu soojus ja niiskus katse puhul taimedele endiselt sobivaks jäid, närtsivad nende taimede lehed siiski; aednikud ütlevad: lehed „külmesid“ ära, olgugi et harilik üle nulli olev soojus meie katsetaimede lehti ümbritses. Põhjuseks oli siin niiskuse hariliku juurdetuleku katkemine, sest jahedast mullast ei suuda taim juured tarvilikul määral vett saada. Antud katsel närtsisid taimed veepuuduse kätte. Maapinna ärakülmumisel lõpeb vee saamine aga täiesti.

Nii siis on sügisese lehtede langemise tähtsamaks põhjuseks puudulik niiskuse saamine või täielik ilmajääk. Külma ja kõledad tuuled ainult kiirendavad lehtede langemise ettevalmistust ja nende varisemist.

Peale lehtede langemist suiguvad puud ja põõsad, nende harilik suvine ülesheitav tegevus jääb seisma. Nad vaibuvad talvepuhkusele.

Lehtede mahaheitmine on meie kodumaa puudele ja põõsastele veel teisiti kasulik. Talvine raske lumevaip lasuks koormana laiadele lehtedele, murraks oksad katki ja laastaks nii metsa. Viimast nähtust võib sügiseti lume liiga varase tuleku puhul tähele panna (78. joon.).

Ainult okaspuude väikese auramispinnaga okaslehed jõuavad talvisele veepuudusele vastu panna ja katavad alaliselt igihalja rüüga meie okaspuid. Ka okkad vananevad, pudenevad aegapidi, tähele pandamata. Okaspuud moodustavad meie kodumaal igihaljad metsad. Kõiki teisi puid ja põõsaid kutsutakse suvihaljasteks.

Ülesanded ja küsimused. 1. Kui madalale langes öösi temperatuur, kui hommikul järgnes suurem lehtede sadu? 2. Milleks on lehe murdekohal taimel korkkiht? 3. Mida leiad suurema osa lehtede murde-



78. joon. Lumekoorma all.




asemete kõrvalt? 4. Kirjelda liiga vara tulnud lume mõju lehtkattes olevate puude okstesse! 5. Korralda omale värviliste sügislehtede kogu! 6. Kujunda plastiliinist või savist kastanipuu mahalangenud leht! 7. Joonista vara tulnud lume alla jäänud puude üldine pilt! 8. Nimeta meie igihaljaid puid ja põõsaid! 9. Kirjelda nende viimaste lehtede vahetamise viisi!

Puud ja põõsad sügisel ning talvel.

Vaatlused. 1. Vaatle üksikute puude ja põõsaste kuju peale lehtede varisemist ja joonista neid oma vaatluskaustikusse!

Korda seda silmapilkudel, mil värskelt tulnud paks lumi puid vaipab.


Kõige pealt tuleks sellel vaatlusel puu võra (krooni) üldise kuju piirjooned kindlaks teha ja paberile kanda, nagu 79. joon. näha; alles siis tähendatagu okste tüvel asetsemise kord (80. joon.)



79.—82. joon. Puud talvel.

ning lõpuks veel okste üksikosad (81. joon.). Vastjoonistatud pildi kontrollimiseks oleks soovitav samast puust ülesvõtte teha (82. joon.). Seesuguste vaatluste najal omandatakse kindel ülevaade iga üksiku puu okste seisust. Puu võra kuju vaatluse kõrval tulevad vaatlusele pungad, mis enamail juhuseil asetsevad langenud lehtede armi kõrval või okste tipul.

2. Joonista hariliku hobukastani oksa otsjätk ja vaatle, kuidas kinnituvad pungad oksale, kas lühikese varrega või varreta (83. joon.). 3. Missugust vahet märkad sa üksikute pungade suuruses? 4. Mis värvi on tema pungad? 5. Mis korraga on pungad pealt kaetud? 6. Võrdle hobukastani lehe armi suurust pungadega ja mõne teise




83. joon. Hobukastani pungad. *a, b,*
c — lehe armid.

84. joon. Saarepuu pungad.

85. joon. Vahtra pungad.

taime lehe armiga! 7. Oksa värv, tema pinna kuju, oksa läbilõigul tema südamemvorm! 8. Millega on pung kaetud? 9. Soomuste

kuju ja iseärasused. 10. Tee pungast risti-läbilõik ja katsu läbi-
 lõigu plaan võimalikult täpsalt joonistada! 11. Tee piki-
 läbilõik ja tema joonis! 12. Vaatle hobukastani vaatluseks antud



86. joon. Haava pungad.


87. joon. Punase leedripuu pungad.

küsimuste järele saare (84. joon.), vahtra (85. joon.), punase leedri-
 puu (87. joon.), paju, haava (86. joon.), õunapuu ja teiste punge
 okstel! Joonista ja kirjelda oma kaustikus vaadeldavaid nähtusi
 suure täpsusega!

On teatud hulk taimi nende pungade iseärasustega tuttavaks saanud, siis katsu juba segamini pillatud okste kogust esimene kätte juhtuv ära määrata, kasutades selleks jooniseid ja märkusi.

13. Vaatle sügisel, talvel, kevade poole talve ja kevadel sirelioksa pungade väliskuju! 14. Lõika sügisel peale lehtede langedest, südatalvel ja kevade poole talve sirelioks ja pane lõikamise silmapilgul ta lõigatud otsa pidi soojas toas vette! Vaatle, missugused

muutused toimuvad igaühega neist. Mida võid nende tähelepanekute najalotsustada? 15. Kevade poole talve murra mitmeilt puult oksija pane soojas tupp vette! Mõne aja pärast hakkavad pungad pakatama. Vaatle, kuidas olid noored lehed pungadesse kokku surutud — kortsutatud, volditud või rullitud. Missugustest pungadest ilmuvad õied?



88. joon. Hobukastani pakatav pung.

Pungades elavad taimede lehed ja õied varjelu ning ei avalda nähtavat tegevust. Talvise külma eest kaitsevad pungades peituvaid noori elundeid pungasoomused, vaigukord või tihe karvastik. Talvel on kõik punga osad tihedalt kokku surutud. Pakatamisel pudenevad katesoomused ära, lehed sirguvad ja algavad avalikku elutegevust. Pakatamine sünnib alles siis, kui maapind muutub sulaks ja soojaks.

16. Vaatle, missuguse temperatuuriga ilmadel hakkavad pungad pakatama, puud ja põõsad lehtima, missugused varemini, missugused hiljemini (88. joon.). 17. Tuleta meelde, kui palju aega peale lume maast lahkumist hakkas üks või teine puu lehtima. 18. Vaatle ja kirjelda kevadiste lehtede värvi võrreldes suvise lehestiku värviga!

Põldpaju.

Vaatlused. 1. Kirjelda põldpaju kasvukohti! 2. Pane põldpaju oksad vara kevadel vette ja vaata, mis nende pungadest välja tuleb. 3. Tee



89. joon. 1 — tolmukatega urvad; 2 — emakatega urvad; 3 — tolmukatega õis; 4 — emakaga õis.

tubaka kirjelduse puhul antud juhatuse järele paju lehtede varrelasetsemise plaan! 4. Vaatle põldpaju urbi ja kirjelda, mille pooltest erinevad nad üksteisest. 5. Missugused välised tunnismärgid on õitsvail paju urvil? 6. Külva paju seemneid õige pea peale valmimist; külva üleaastasi seemneid! Mida märkad nende idanemisel? 7. Kuidas paljundatakse harilikult pajusid? 8. Kuidas lendavad paju seemned?

Põldpaju ehk raeremmelgas kasvab meie kodumaal igal pool, peaaesjalikult niiskeis kohtades ojade ja kraavide läheduses. Harva kasvab ta suureks puuks. Enamatel juhustel on

tal palju madalaid okslisi tüvekesi, mis ühiselt juurelt välja kasvavad. Seesugust puud nimetame põõsaks.

Okstel on pikergused munakujulised lehed, mis üksteise järele tõusvale ringile on asetatud. Sedaviisi asetatud lehed ei varja üksteist päikesevalguse eest.

Põldpaju õied avanevad väga vara kevadel, juba märtsikuu lõpul (89. juun.). Esiti tulevad pungadest valged munakesed nähtavale, mida inimesed sagedasti paju „hanekesteks“ nimetavad. „Hanekestest“ sirguvad pikapeale urvad. Paju urvad on kaht seltsi: ühtedel pajudel on nad kollast värvi ning munakujulised, teistel pikemad ning hallikasrohelised. Kollastes urbades on ainult tolmukatega õied, teistes ainult emakaga; nii siis on urvad õite kogud — õisikud.

Vaadeldes lähemalt mõlemaid urbi, leiame nende keskelt pehme telje, millel tihedalt asuvad pruunid pehmete udemetega kaetud soomused. Samad udemed annavad noortele urbadele valgete munakeste välimuse ning kaitsevad noori valmivaid tolmukaid ning emakaid kevadiste öökülmade eest (võrdle kasukaga!). Tolmukate urvas on iga soomuse varjus kaks tolmukat. Igal tolmukal on peenike niit, millel asub ümmargune, kahest poolest koostuv tolmuka pea. Hallikasrohelistes emakate urbades on iga soomuse varjul üks emakas. Et pajudel tolmukatega urvad emakatega urbadele alati lahus, isepõõsastel kasvavad, nimetatakse paju kahekojaliseks taimeks, kuna varemini tundmaõpitud taimi ühekojalisteks kutsutakse. Et paju õies palju osasid puudub, nimetatakse tema õisi puudulikkudeks. (Nimeta puuduvad osad tolmukatega ja emakaga paju õies! Võrdle kõrvitsaga!)

Õied tolmuvad putukate abil. Urbadele soomuste aluselt sõõrdub magusat mahla välja, mille meelitusel mesilased siin lahkelt külas käivad. Lennates kannavad nad õietolmu tolmukatega urvalt emakatega urvale, emakasuudmele ja tolmutavad sel teel emakatega õisi. Et emakatega õied tolmukatest eraldatud, on igasugune isetolmumise võimalus kõrvaldatud.

Põldpajud jagunevad, nagu näeme, kaheks sooks. Ühe soo tunnismärgiks on õisikud, milles tolmukatega ehk isased õied, kuna teist sugu iseloomustab urb, milles ainult emakatega ehk emased õied. Nii on siis pajul täieliku õie jaotuse

ning tolmukatega ja emakatega õite isetaimedele paigutamise läbi kõrvaldatud isetolmumise võimalus, mille puhul seemned taimedel sagedasti kiduraks ja elujõuetuks jäävad.

Peale õitseaja lõppu kuivavad tolmukatega urvad ära, emakatega urvad arenevad edasi, ja igast emakasõlmest kujuneb karbik, milles palju valgete udemetega varustatud tillukesi seemneid. Karbik pakatab juba mai alul ja tuul puhub kerged lennuvõimelised seemned temast välja. Mahalangevad seemned jäävad karvakestega niiske maa külge kinni ja hakkavad heades tingimustes kasvama. Sagedasti on õhk seesuguste lendavate seemnetega täidetud. Iga kord ei ole need „lendurid“ paju seemned, vaid ka paplite ning haabade omad, mis oma õite ja seemnete poolest väga paju sarnased.

Ülesanded ja küsimused. 1. Joonista paju õie plaanid (kaks plaani)! 2. Pane hoolega tähele, missugused putukad käivad paju õitel võõrsil. 3. Mis meelitab putukaid paju õitele? 4. Missuguseid õisi nimetame puudulikkudeks? 5. Nimeta ühekojalisi taimi, millel kahe- ja kolmeõielised õied, millel ühesugulised; nimeta kahekojaline taim! 6. Kes kannab paju seemneid laiali? Kirjelda seemet! 7. Missugusel aasta-ajal on paju koor lahti? 8. Milleks seda kasutatakse? 9. Milleks tarvitab inimene paju? 10. Kas on pajupõõsad heinamaale kasulikud või kahjulikud? 11. Vaatle hoolega teisi puid ja põõsaid ning selgita, missuguseid pajude sugulasi leiad nende seas. 12. Joonista mitmesuguste pajuliikide ja paplite õitsvad ja lehis oksad!

Arukask.


Vaatlused. 1. Vaatle metsatihnikus ja lagedal heinamaal kasvavat arukaske! Kirjelda nende lahkuminevaid jooni! Joonista nende kummagi krooni pilt! Mis on selle lahkumineku põhjuseks? 2. Millega on kase koor kaetud? Tee kase tüvesse kuni puuosani küündiv haav vara kevadel, kui maa alles külmunud, ja siis, kui ta täiesti sula. Mida märkad selle juures? 3. Lõika kaks oksjätku vara kevadel ja pane üks jämedamat, teine peenemat ladva otsa pidi (ärälõigatud ladvaga) vette! Vaatle, missugused muutused sünnivad pungadega. 4. Vaatle kase tüve rist-läbilõigu otsa; mida seal märkad? Joonista selle lõigu pinna täppis pilt! 5. Iseloomusta kase urbi! Kuidas sünnib siin tolmumine? 6. Kuidas levivad seemned? 7. Vaatle, missugused

kahjulikud loomad esinevad kasel. Missuguseid ebaharilikke nähtusi oled kaskedel tähele pannud?

Kask on meie kodumaa kaunim puu. Oma valge koorega ja helerohelise värviga tõmbab see sale puu vaatleja tähelepanu juba kaugelt enda peale, eriti kevadel, kui lehestik alles hurmavalt lõhnab. Metsas kasvab ta pikemaks kui lagedal päikese ja tuule käes. Juured lähevad osalt otse alla, osalt laialduvad mullapinnas. Juured asetsevad sedavõrt kõvasti mullapõues, et tuulepuhangud ennemini kase tüve pooleks murravad, kui et tema üles juurivad. Kase koort katab pealt õhuke valge toht, mis aeg-ajalt pealt ära kestab. Tohtu kaitse all kasvab koor (90. joon.).



90. joon. Kase tüve lõik. Toht.



91. joon. Kase tüve lõik; aasta ringid.

Koore all varjul on puine tüvi. Rist-läbilõigul näeme, et tüve puuosa koostub üksikuist rõngaist. Iga aasta sünnib uus ring ning puu läheb selle võrra jämedamaks (91. joon.). Koore ja puuosa vahel on õrn mähikiht, mis puuosale igal kevadel ja suvel paksema valge ning sügisel ja talvel õhema tumeda kihiga sünnitab ning koore alla väga õhukese niinosa annab. Kui kevadel pungade paisumisel lüüa kase tüvesse puuosani ulatuv haav, siis nõrgub selle kaudu magusat mahla välja. See mahl tõuseb juurest üles paisuvatesse pungadesse ja urbadesse. Kui seda mahla palju välja voolab, siis kaotab taim hulga toitaineid,

mis juba sügisest saadik juurtes ja noortes puuosades tagavarana püsisid. See mahl sisaldab palju suhkrut.

Kase nõrgad oksad moodustavad kähara võra. Kase lehed kinnituvad okstele pikkade rootsudega tõusvas ringis. Lehelaba servad on hambulised ning nende pind õhukese vaigukorraga kaetud, et liigset vee välja-auramist takistada. On välja arvatatud, et suur kask palaval suvepäeval juurte kaudu endasse



92. joon. 1. Kase oks kevadel; A ja a — emased urvad; 3 — isane urb; 4 — tükike isast urba; 5 — tolmukas; 6 — kolme sigimikuga soomus; 7 — emase urva soomus; 8 — seeme. 2. Kase oks suvel.

kuni 30 pange vett imeb, mida ta suuremalt osalt jälle lehtede kaudu välja aurab.

Lehe- ja õiepungad pakatavad kasel kevadel ühteage. Õied on rühmitatud urbadele — tolmukad ja emakad kummadki iseurbadele. Kevadel pakatavad tolmukate urvad, mis juba eelmise suve lõpul valmisid. Nad ripuvad 2—3-mekesi okste otstel (92. joon.). Igas tolmukate urvas on palju tihedalt ühisele teljele

koondatud väikesi õiekesi. Iga üksik õis kinnitub lühikesele jalakesele. Ta koostub üksikutest pruunidest soomustest ning 6—12 tolmukast, mida esimesed katavad.

Ka emased õied on urbades, mis aga pungadest alles ühes esimeste lehtedega välja ilmuvad. Igal üksikul urva õiel on kahkjasheline kolmekordne soomus, mille sisemisele küljele kolm emakat kinnituvad. Mõlemad urvad on vaigused, nagu värsked lehedki. Vaik on paremaks kaitseks kevadise niiskuse ja külma vastu.

Kevadised kõvad tuuled kannavad arvurikastel isastel urbadel valminud tolmumassist emastele õitele. Õitsemise ajal on emakatega urvad püsti, peale õitsemist ripuvad nad alla. See seis soodustab tolmumist. Nii sünnib siis kase tolmumine tuule kaastegevusel. Ühtlasi on kase õied ilma värvita ja meeta, mis harilikult putukaid õitele meelkitab. Emased urvad paisuvad peale tolmumist väikesteks käbideks. Emakas võrsub viljaks; sigimikule kasvavad kaks läbipaistvat lennutiiba ja emakasuude muutub kaheks pisikeseks kiuks. Kase vili on väike pähkel. Juuli lõpul lendab seemneke tuule tõukel oma lennukil kaugele uuele asukohale. Aastane seemnete hulk ulatub tugeval täiskasvanud kasel üle ühe miljoni. Kase seemneist on ainult väike osa idanemisvõimelisi. Ja nendegi idanemisvõime kestab kõige kauemini järgmise kevadeni. Ainult need seemned, mis sügisel pehmesse mulda juhtuvad, arenevad nooreks kasekeseks. Noore kasetaimede lehtede vorm on teissugune kui täiskasvanud puul.

Kaski tarvitatakse tarbe-, põletus- ja tehnilise puuna.

Ülesanded ja küsimused. 1. Joonista isaste ja emaste õitega urvad! 2. Joonista lehtede oksal asetsemise plaan! 3. Lõika metsatihnikust ja lagedalt aru-heinamaalt ühejämmedused kased ja katsu ära määrata, kumb neist on vanem. 4. Millega on kase noored lehed kaetud? Mis tulu on neil sellest kattest? 5. Joonista arukase leht ja võrdle teda teiste kaseliikide lehtedega! 6. Milleks tarvitab inimene kaski (tarbe-, põletus-, tehniline puu)? 7. Millega seletada seda, et kevadel kase ja teiste puude koor väga kergesti puult ära tuleb?

Sarapuu.

Vaatlused. 1. Mis ilmuvad sarapuul varemini, kas õied või lehed? 2. Kirjelda sarapuu õisi! 3. Jõua selgusele, kas on tema tolm kleepuv või kuiv. 4. Kuidas kantakse tolm emakasuudmele?

5. Millal valmib sarapuu vili? 6. Kes kannavad sarapuu vilja laiaili? 7. Vaatle kevadel külvatud sarapuu-vilja ehitust ja idanemist! 8. Otsi sarapuult kokkurullitud lehti ja vaatle, kes seal rullis elutseb. 9. Pane ussitanud pähhel klaaspurki ja vaata, mis kujuneb pähhlis olevast tõugust.



93. joon. Sarapuu oksake õisikutega. Paremalt pool ripuvad kaks tolmukatega, üleval — emakatega õisik.

Sarapuu on üks harilikumatest alusmetsa ehk alapuistu taimedest meie kodumaal. Ta ei kasva kunagi suureks puuks, vaid esineb suurte puhmastikkudena üksteise lähedal. Et sarapuu metsa vilus kasvab, siis on ta südamekujulised ümmarikud hambuliste servadega lehtede labad laiad ning õrnad. Laiadele labadele satub kasinast metsa-alusest valgusest kiiri siiski eluks tarvilikul määral.

Sarapuu õitseb vara kevadel, enne veel kui talle lehed ilmuvad. Õied on sarapuul kahesugused. Ühed on pikad ripnevad urvad (93. joon.), mis paljudest üksikutest õitest koostuvad ja seega siis on õisikud. Iga urb kujutab endast oksakese otsa, millel üksteisele lähendatud soomuselaadilised lehekesed. Iga soomuslehekesel all on veel kaks õrnamat lehekest, mille varjus siis kaheksa tolmukat peitub (94. joon.). Et nendest õitest aga ainult tolmukaid leiame, siis on need ühesugulised ja nimelt isased, s. o. tolmukatega õied. Teised õied aga on kogukad pungad, mis lehepungadest, peale oma suuruse, õitsmise ajal väljaulatuvate punaste lindikeste viha poolest erinevad. Nende pungade sees on mõned soomusetaolised lehed, millel igaühel kaks emakat. Luubiga võime näha, et need punased lindid ei ole muud kui pikad emaka-armid, mis tolmumise ajal limaseks lähevad, et neile langevat tolmu kinni pidada. Et neis pungades on ainult emakad, siis on meil tegemist ühesugulise — just



94. joon. Pahemal pool tolmukatega, paremal pool emakatega õis.

emase õiega. Vastandiks pajule on mõlemat sugu õied ühel ja samal põõsal; seega on siis sarapuu, vastandiks pajule, nagu teisedki eespool tundmaõpitud taimed, ühekojaline. Sarapuu õied on ilma värvita ja peaaegu silmapaistmatud. See on ka arusaadav, kui me lähemalt nende tolmumisviisi tähele paneme. Tolmu edasikandjaks on siin kevadine tugev tuul, mis valminud urbadelt tolmu õhku raputab ning emaka-armidele edasi kannab. Ka tolmuterad on siin ja üldse kõigil tuule kaastegevusel tolmujatel taimedel palju vähemad kui putukate vahetalitust kasutavil ning kuivad.

Et tuul ainult kuiva tolmu kergesti edasi saab kanda, siis arenevad valminud allapoole ripnevad urvad alati ilusa ilmaga.

Pärast sugutamist närbuvad emaste õisikute emakasuuõied ära, sigimik kujuneb pähklaks ning tema lähemad katted tupeks ehk kausiks, milles pähkel asub (95. joon.).

Pähkla sees on ainult üks kahest poolest koostuv seeme (kaheiduleheline). Seepärast ei pakata valminud pähklad seemnete laalisatsiooniks. Sarapuu seemneid laotavad oravad, linnud ning inimesed laiali, kes neid toiduks ning maiustuseks tarvitavad.



95. joon. Sarapuu villi.


Ülesanded ja küsimused. 1. Vaatle suvel, kas leiad sarapuult tuleva kevade õite algeid — noori urbi. 2. Pane tähele, kes kannavad pähklaid laiali ja kuidas; kes hävitab sagedasti pähklate tuumi? 3. Määra mitmesuguste sarapuu okste vanadus lõigu pinnal nähtavate aastaringide järele! 4. Joonista paju, sarapuu ja kase lehed loomulikus suuruses ja võrdle neid isekeskis! 5. Mispärast kutsutakse sarapuud ühekojaliseks taimeks? 6. Missuguseid loomakesi leidub sarapuul? 7. Joonista tupes olev pähkel; valmista sama pähkel plastiliinist! 8. Missugune maik on sarapuu valmimata pähklatel? Kas paistavad nad lehtedest välja? 9. Kui kaua püsib sarapuu seeme idanemisvõimeline? Tee see mitmelt iseajalt pärit olevate seemnete idanemisega kindlaks!

Kollane kuldtäht.

Vaatlused. 1. Märgi oma vaatluskaustikusse, millal leidsid sa esimese kuldtähe ja kust. 2. Vaatle tema sibulat õitse alul

ja seemnete valmimisel! 3. Joonista lehesoonestik ja võrdle varemini tundmaõpitud taimelehtede soonestikuga! 4. Vaatle, kuidas toimub siin tolmumine, kas putukate või tuule kaastegevusel.

Vara kevadel võib leida igalt poolt niisketelt varjatud kraavikallastelt õitsmast mahlakate õrnade varte ning pikkade kitsaste lehtedega taime — kuldtahte: Kaevame tema õrna varre ümbert



96. joon. Kollane kuldtaht. Tema õis ja sibul.


mulla ettevaatlikult ära, siis näeme, et vars 6—9 sm sügavusel mulla all jämedaks sibulaks on moondunud (96. joon.). Tähelepanelikult vaadates näeme, et see sibul nagu paks, paisunud maa-alune leht vart ümbritseb. Taime arenemisega käsikäes kahaneb sibul vähehaaval ja läheb kortsu, kuni temast lõpuks ainult kest järele jääb. Tema kaenlas peitub pung, mis suve jooksul ainetega täitub ning sügiseks uueks sibulaks kujuneb. Talveks jääb alale ainult see uus sibul, millest järgmisel kevadel õige vara, otse peale lume kadumist, noor taim areneb. Nii kordub see aastast aastasse. Kevadel tärkav taim

tühjendab läinud sügise sibula jõuainetest, mis talle varase võrsumise ning õitsmise võimaldavad, ja sünnitab vana, ära kasutatud sibula asemele rikkalikkude tagavaradega uue — järgneva kevade taime jaoks.


Kuldtahte nõrgale varrele on toeks tema pikk juurepealne leht, mis oma alumise osaga vart ümbritseb. Sooned käivad selles lehes peaaegu rööbiti ning ühinevad ladval. Kõik sooned on ligikaudu ühejämedused. Seesuguste soontega lehti kutsutakse kaarsoonisteks, lehti aga, millel üks soon teistest jämedam ning teised võrguna asetatud, võrksoonisteks lehtedeks (97. joon.).

Kuldtähe vars kannab 4—7 kuldkollast õit, mis sarikana pikkadel õieraagudel asuvad. Kuni puhkemiseni on nad ülemiste lehtede vahel ja seega külmumise eest kaitstud.

Õiel on kuus kitsast siilu laadi tupplehte, millest välised kolm rohelised, sisemised aga kuldkollased. Kroonlehed puuduvad; nende aset täidab värvikas tupplehtede sisemine ring, mis juba kaugele paistab taime mustjaskoltunud, taimedeta ümbrusest. Tolmukaid on kuus, emakaid aga üks, emakakaela ning kolme-



1



2

97. joon. 1 — võrksoonestikuga leht; keskel jämedam peason; 2 — kaarsoonestikuga lehelaba.

kandilise armiga. Vili on karbike, mis valmides kolmest kohast pakatab. Tuul kannab tema seemned laiali. Vili valmib juba vara kevadel.


Ülesanded ja küsimused. 1. Juuri üks kuldtäht ja vaatle tema ehitust igakülgsest! 2. Pane tähele kuldtähe õitseagega ja ta kasvukoha ümbrust! Kas on siis, kui tema õitseb, juba palju teisi taimi õitsmas? 3. Joonista kuldtähe õie plaan! 4. Joonista õie piki-läbilõik! 5. Vaatle, mitu üksteisest erinevat kuldtähe liiki leiad.

Aiatulp.

Vaatlused. 1. Lõika kasvava tulbi sibulast kevadel, suvel ja peale vilja valmimist piki-läbilõigud ja vaata, mille poolest erinevad nad üksteisest. 2. Haruta tulbi sibul põhjakoonuseni üles! 3. Tambi tulbi sibula sisemised pehmed lehed katki ja tilguta sellesse segusse tilk joodi! Missuguseks muutub segu värv? Tilguta joodi kartulitärklise-kliistri peale ja vaata kliistri värvi muutumist! Selgita, kas on neil kahel nähtusel sarnasust ja mis on selle põhjuseks. 4. Missugusel mullal kasvavad tulbid lopsakamalt? 5. Vaatle õie ehitust pungas ja pakatanud õiel! Missugused osad leiad temast? 6. Kuidas toimub õite tolmumine tulbil? 7. Missugused muutused toimuvad tulbi õies õhtul? 8. Tee tulbi tolmuka rist-läbilõik ja joonista lõigu pinna joonis! 9. Arenda tulbi seemnest noor tulp ja vaata, kas hakkab ta esimesel aastal õitsma või mitte.

Aiatulp (tahvel II) on üks varasemaist kevade ilutaimist meie aedades. Varasel kevadel, kui maapind alles jahe ja paljudel teistel taimedel raske siit mullast toitu ammutada, saab tulp tarvilikke aineid mulla varjus olevast sibulast. Sibula lamedalt puitselt otsalt lähevad mulda peened juured; ülemiselt teravalt ladvalt poeb tulbi ainus vars välja. Pealt katab sibulat õhuke rasvaka ilmega pruun kuiv nahk; esimese naha all on teine ja selle all veel kolmas lihav nahk. Neid nahku kutsutakse sibula kestadeks. Viimase kesta all on ka tulbi noor vars. Kui sibula viimase kesta ära võtame, siis leiame, et peale äravõetud kestade kinnitub ka maapealne vars puisele sibula aluspõhja kuhikule. See kuhik on lühikeseks jäänud vars, mille alumised lehed sibula sünnitavad. Pealmise kuiva kesta all asetsevad osad on lihavad ja paksud. Need lihavad kestad ei ole muud midagi kui tulbi leheroheliseta lehed, mis isesugustel ülesannetel maa alla püsima jäänud. Kui me neid kevadel, enne noore tulbi maapõuest väljatulekut joodiga proovime, siis leiame neist rikkalikult tärklist. Tärklis ongi tähtsam toiduaine, mida taim kogub ületalve elavasse sibulasse. Need maa-alused lehed on toidutagavarade aidaks noorele tuldile tärkamise ajal, kui maapõuest alles raske on tarvilikke aineid ammutada.

Metsiku tulbi esialgseks kasvukohaks on rohtlaas, kus rohi suveks kuumana päikese käes ära kuivab. Tulp õitseb siin vara kevadel, kui veel küllalt niiskust.



Aiatulp.

1 — sibula piki-läbilõik; 2 — kasvav sibul; 3—5 — uue sibula kujunemine; 6 — õis; 7 — sigimiku rist-läbilõik; 8 — õis õösi; 9 — vili.

Sibula põhjale toetuv ümmargune õõnes vars kannab harilikult kolme kitsast kaarsoontega rootsuta lehte; nendest on alumine kõige suurem. Kuju järele kutsutakse neid lehti süstjateks.

Lehed ja varred on õhukese vahakorraga kaetud, mis taimel annab sinaka ilme.

Varre ladval on harilikult üks punane õis. See pakatab hommikul ja sulgub öösiti kaste eest. Õie kate moodustub kuuest punasest lehest, mis kahelt realt emaka all varre otsal asetsevad. Punaste lehekeste varjult leiame kuus tolmutat, mille suured tolmutokid lühikese jalakesega õiepõhjale kinnituvad. Õie keskelt leiame kolmekandilise emaka. Kolmekaariline emakasuude on otse sigimiku peal. Lõikame tolmupea risti läbi, siis näeme suurekstegeva klaasiga, et temas on neli torukest, milles peenikesed tolmuterad. Valminud tolmupead pakatavad välisküljel; nende pragudest tungib palju tolmu õiepõhjale. Mesilased, kes varasel kevadel igale õiele ruttavad, leiavad siit ainult õietolmu. Paksu tolmuuga võidunud kuues lendavad nad mõne teise tulbi-õie emakasuudmele; nii korraldavad mesilased tulbi-õite rist-tolmutamist. Kui tolmutamine soordub, siis areneb emaka tolmust kolmekandiline kolme peaga rohkeseemneline vili. Valminud seemned on kollakaspruunid.

Järgmisel kevadel idaneb mahakülvatud seemneist nõrk taim, mis sügiseks mullapõue väikese sibulakese kasvatab; kuid esimesel aastal ei õitse see tulp. Järgmisel kevadel tuleb sellest sibulast uus taim, mis siiski veel ei saa õitsevõimeliseks. Alles kolmandal või neljandal eluaastal õitseb seemnest arenev tulp. Peale õitsemist, kõrvuti vilja valmimisega, soordub tulbi ettevalmistus ka teises sihis edasikestmiseks. Vana sibula kesta sees valmivad uued sibulad, mille maa-alustesse lehtedesse tänavuaastase tulbi lehtede ja juurte kaudu toidumaterjali koondub, eriti tärglisaineid. Vana sibul närbub; tema põues kujunevad uued, lähevad lihavaks ja kattuvad pruuni rasvaka kestaga. Nendest uutest sibulatest võrsub järgmisel kevadel heas niiskes rammusas, liivase aluspinnaga mullas õitsevõimeline tulp. Sellepärast paljundatakse tulpisid harilikult ületalve soojas kohas hoidud sibulatega.

Kõige tähtsamaks tulbi ja teiste tema taoliste sibulatega taimede sibulate väljaveo jaoks kogu Euroopasse on üle 200 aasta olnud Hollandi riik.

Tulp on õige visa taim; kergesti elab ta suvised kuumað ajad ja talvised külmad üle. Suvise põua ajal kuivab tal maapealne osa ära; peale põuda võrsub aga uus maapealne vars. Ärakülmunud sibulad jäävad ainult siis elujõuliseks, kui nad pikkamisi jälle ära sulavad. Ainult noored tulbid on külma vastu tundlikud.

Ülesanded ja küsimused. 1. Joonista tulbi õie plaan! 2. Sigmiku rist-läbilõigu plaan! 3. Joonista tulbi leht! 4. Valmista plastiliinist tulbi emaka mudel! 5. Kirjelda tulbi vastupidavust põuale ja külmale. 6. Missugusele Euroopa riigile on tulp tuluallikaks?

Harilik nurmenukk.

Vaatlused. 1. Vaatle noori lehti, missugune vorm neil on. Missuguse tegevuse hoogsus on kahandatud tihedalt kortsutatud lehtedes? 2. Kirjelda õie sisemist erilist ehitust! 3. Vaatle, missugused putkad õitel viibivad. 4. Millega meelitatakse neid siia? 5. Kuidas juhitakse lehtedele langev vihmavesi juurte peale?

Nurmenukk on meil üks esimestest kevadel õitsma puhkevatest taimedest (98. joon.). Otsekohe peale lume äraminekut, kui maapind õieti veel ei ole sulanudki, hakkavad tema lehed arenema. Vast oistunud mullast on raske esialgu kiireks arenemiseks kuluvaid jõu-aineid koguda, kuid harilik nurmenukk saab neid siis oma paksust, mulla põues peituvast juurikast, kuhu juba mullune taim soetas tagavaru oma järeltulijale. Nii siis on nurmenukk mitmeaastane taim, kelle maapealsed osad aga igal sügisel ära näruvad ja kevadel uuesti sünnivad.

Maapealset vart nurmenukul ei ole ning lehed asetsevad juurika otsal juurepealse kobarana. Noored lehed on ülipehmed ning õrnad. Kuuma kevadise päikese käes auraks nendest palju vett välja ja nad närbuksid; kuid selle eest on need noored lehed teatava piirini kaitstud sellega, et nad peaaegu vertikaalselt seisavad ning nende servad allapoole kokku on rullitud.

Kollase krooniga õied asuvad sarikana pikal ümmargusel lehtedega õieraol. Kollast viiehõlmalist lehtri laadi õiekrooni toetab viiehambuline tupp. Krooni seintele kinnituvad lühikese- niidilised tolmukad. Tolmukad on selle poolest huvitavad, et

nad kord kõrgemale, kord madalamale on krooni torule asetatud, emakasuudmest arvates. Sellel iseärasusel on, nagu vaatlemisel tähele võib panna, suur eluline tähtsus. Nurmenuku tolmutajateks on kumalased. Need loomakesed korjavad nurmenuku õietoru põhjast õiemett, mida siin rikkalikult leidub. Selle

juures puutuvad nad, õietoru põhja mee järele koogutades, õies, kus tolmukad kõrgemal kui emakasuude, tolmukatega kokku. Osa tolmu jääb nende karvasele peakesele. Teisele õiele jõudes, kus jälle emakasuude tolmukatest kõrgemal, puutub nende tolmune pea otsekohe limase emakasuudmega kokku ja suurem osa tolmu jääb siia emakasuudmele. Vastupidi-käigu puhul puutuvad jälle tolmuga võitnud jalad emakasuudet ning taime tolmumine on jällegi kindlustatud. Tolmukate kinnitumine kahele isekohale õietorus on pandiks, et risttolmumine toimuks, mille puhul ka elujõulisemad seemned valmivad.

Nurmenuku emakas on võimlemisnuia taolise ehitusega. All on tal jäme muna-laadiline sigimik, mille pikk ümmargune kael nõõpnõela-pea moodi otsaga, emakasuudmega lõpeb.

Nurmenuku vili on kupar; ta areneb närbuva õie sigimikust püsima jääva õietupe kaitse all. Valmimata kupar on pealt kaanega kaitstud. Ka siis, kui seemned küpsed ja kaaneke juba oma servadel avanenud, sulgub kupar halva ilmaga. Pikk õieraag rabab tuule käes õõtsudes kupardest seemned välja. Nurme-




98. joon. Nurmenukk.
Kaks tolmukate iseasendiga õit. Üleval
nurgal vili — kupar.

nukuga lähedalt sarnane on kevadel niisketel aasadel kasvav lilla-õieline pääsukesesilm ehk jaanikannike.

Ülesanded ja küsimused. 1. Joonista nurmenuku ja pääsukesesilma õie plaan! 2. Joonista nurmenuku õis piki-läbilõigis! 3. Kaeva nurmenuku juurikas maa seest välja ja joonista ta! 4. Missuguseid sarikõisikutega taimi tead sa veel nimetada? 5. Joonista jaanikannikese õie plaan ja piki-läbilõik!

Taimede varred kui paljunemisevahendid.

Vaatlused. 1. Lõika harilik sibul pikuti ja risti läbi ning joonista kumbki lõik oma kaustikusse! 2. Proovi joodiga tulbi kirjelduse osas antud juhataste järele tärglisesisalduvust paljudes sibulates, juurikates ja mugulates! 3. Katsu kasvatada sibulast, juurikast ja mugulast uus taim; seks istuta nad lillepotti! 4. Kasvata oksi vees ja mullas; missugused puude ja põõsaste oksad võtavad kergesti juuri alla?



99. joon. Lumekelluke ühes oma sibulaga.

Maa-alusel varrel võib olla, nagu tulbil nägime, sibula kuju. Lõikame näiteks hariliku sibula lõhki, siis näeme, et ta on kokku lapitud paksudest lihavaist üksteist katvaist värvita lehtedest. Pealmised katelehed on pruunikaskollased ja kõvad, nahksed. Sibula põhjast kasvavad välja rohkearvulised

juurnarmad. Läbilõigul näeme, et kõik lehed ja juured kinnituvad isesugusele kannale, mis asub sibulapõhjas ja pole muud midagi kui maa-alune vars, mis aga väga lühikeseks on jäänud. Sibulate kaudu paljunevad harilikud sibulad, tulbid, liiliad, lumekellukesed (99. joon.) j. m. t.

Kui sibulate ainelist sisu joodiga proovime, nagu tulbiga tegime, siis näeme, et nad peaaegjalikult tärglist sisaldavad.

Paljudel taimedel on veel üks maa-aluse varre muudend — juurikas. Juurime vara kevadel maast ülase (100. joon.) või hiljemini mõne maikellukesega. Neil mõlemail näeme maas lebavat soomus-tega kaetud maa-alust osa, mis mullapõues ületalve elutses; kevadel areneb juurikalt uus vars ja lehed. Juurikas lamab mullas rõhtsalt, kasvab oma eesmiselt otsalt, kuna aga kaugem osa vahet pidamata kõduneb. Nii kõduneb ka ülase juurika tagu-



100. joon. Ülane.

mine ots. Eesmiselt aga kerkib kevadel ainus õrn lõhestatud leht maapinnale ja pea päris juurika otsalt õieraag. Õieraol on ainult üks õis, millest allpool kolm lõhestatud katelehte. Katelehtedeks kutsutakse nimetatud lehti sellepärast, et noor õiepung nende kaitsel mullast välja poeb. Suve jooksul valmib mullas edasikasvavale juurika otsale uus pung, millest järgmisel kevadel jälle noor ülane võrs sub. Ka juurikas sisaldab varaseks kasvamiseks tarvisminevate toitainete tagavara.

Kolmandaks varre muudendiks oleksid mugulad. Võtame

näiteks kartuli mugula. Et mugul on tõesti vars, tõestub meile järgmiselt: ta muutub päikese käes roheliseks ja võib endast pungasid arendada nagu vars kunagi. Pungad on harilikult väikestes lohkudes ja niiviisi vigastuste eest kaitstud. Meie põllumehed paljundavad kartuleid pea ainuüksi mugulate istutamise teel. Kartulite mugulad on väga tärkliiserikkad. Mugulaid leiame käppadel, jorjenitel j. t.

Taimed, mis on sibulatega, juurikatega või mugulatega varustatud, millesse eelmisel aastal suurel hulgal jõuainete tagavara koondus, võivad vara kevadel, juba siis kasvama hakata, kui mullast veel küllalt toitu pole saada.

Mõnede taimede, nagu paju, sõstarde jne. oksad hakkavad mullapõue pistetult kasvama. Mida kergemini ühe või teise taime vars uusi juurnärmaid suudab välja lasta, seda kergemini võib ta elujõuliselt kasvama hakata ja iseseisvaks taimeks sirguda. Selleks võetakse kevadel seesuguse taime üksik oks, millelt väiksemad oksakesed ära lõigatakse, ja pannakse otsapidi mulda. Nii näeme, et varred etendavad seemnete kõrval taimede paljundamisel väga tähtsat osa.


Ülesanded ja küsimused. 1. Mis tulu on sellest, et sibulad on tiheda rasvaka koorega kaetud? 2. Missuguseks muutuvad vanad sibulad ja mugulad, kui neist algav noor taim juba tugevaks elujõuliseks üksuseks on kasvanud? 3. Valmista plastiliinist sibul ja kartulimugul! 4. Nimeta senini tundma õpitud taimi, millel on juurikad. 5. Joonista kõigi nende juurikad ja võrdle neid isekeskis!

Varsakabi.

Vaatlused. 1. Kirjelda varsakabja ehk konnakapsa kasvu kohta! 2. Missugust mõju avaldab kevadine kõrgvesi varsakabja varre ja leherootsude kasvusse? 3. Kirjelda varsakabja õie ehitust ja võrdle teda varemini tundmaõpitud taimede õitega! Missugustega on tal sarnasust? 4. Vaatle, kuidas sünnib varsakabja õite tolmumine. 5. Kuidas avaneb vili?

Jõgedel ja järvedel kallastel heinamaadel, mida kevadine suurvesi üle uhab, õitseb juba vara kevadel kaunis suurte helekollaste õitega taim — varsakabi ehk konnakapsas (101. joon.).

Mida vesisem on tema kasvukoht õitseajal, seda lihavamaks kujunevad ta vars ja lehed. Kui kevadine suurvesi kaua püsib, siis kasvavad varsakabja vars ja alumiste lehtede rootsud väga pikaks. Nii ulatatakse siis lehed ja õied vee peale. Juurelt



101. joon. 1 — varsakabi. 2 — õie piki-läbilõik; 3 — tolmukas; 4 — sigimik;
5 — viljad; 6 — pakatanud vili.

võrsuvad mitmed varred; varrel olevate lehtede kaenlast algavad oksad. Varsakabja õõnsad ning siledad varred ajavad ennast ilma tuge deta püsti. Tema neerjalabaliste lehtede rootsud jäävad ülemistel okstel lühemaks, kuna nad lõpuks päriselt kaovad, ja rootsuta lehelabad kinnituvad otse varrele. Ühtlasi on ülemiste lehtede labad alumiste omadest ka hulga vähemad. Nii ei varja nad siis alumiste lehtede eest päikesevalgust. Sügisel närbuvad varred ning lehed ja mulla põue jäävad ületalve elutsema lihavad juured, juurepealne varreosa ühes oma ladva-pungaga. Järgmisel kevadel võrsub sellest juurepealsest varrepungast uus varsakabi.

Lehtede tulekuga ühteaegu pakatavad ka varsakabja õied. Nad sünnivad varte ülemistel otstel ja asetsevad üksikult lühikestel õieraagudel, mis lehe kaenlast algavad. Sündides on nad rohelised munajad pungad, mis peale pakatamist üleni kollaseks muutuvad. Varsakabja avanenud õies puuduvad tupplehed. Nende aset täitsid õie pungasolekul rohelised kroonlehed, mis alles hiljemini värvi omandasid. Nii siis on varsakabjal ainult ühekordne õiekate — kroonlehed.

Varsakabjal on harilikult viis munajat kroonlehte, milledest kõrgemal tolmukad ja emakad. Tolmukaid on palju. Emakaid on 10—15; neil puudub, nagu tulikalgi, emakakael ja selle tõttu asetseb kumer suude otse kotikese laadi sigimikul. Iga sigimiku alusel on meenääre, mis õiepõhjale nõrguvat õiemett eritab. Mesilased, kumalased, kärbsed ja teised lendavad putukad kannavad oma külaskäikudel õietolmu õielt õiele ning tolmuvad sel kombel ristamisi varsakabja õisi.

Õitsemise lõpul muutuvad emakad nahkjaks viljaks; igast sigimikust valminud vili tuletab servipidi kokkukeeratud lehte meelde. Seesugust vilja kutsume kukkurviljaks. Valminud vili pakatab õmbluselt ja kuivetu vars rabab tuule käes õõtsudes temast seemneterad välja.

Inimese majapidamisele on varsakabi kasuta taim. Ta lehtedes ja vartes leiduv kibe mahl teeb ta, nagu kibeda tulikagi, loomatoiduks kõlbmatuks.

Soopinnas peituva tiheda juurestikuga ja igal aastal maha langevate varte ning lehtedega aitab ta soo taहनemisele ja kinnikasvamisele kaasa.

Ülesanded ja küsimused. 1. Juuri varsakabi ja tulikas ja vaatle, kumb neist varemini ära närtsib. 2. Joonista varsakabja varre alumiselt ja ülemiselt osalt võetud leht! 3. Õie plaan! 4. Õie piki-läbilõik! 5. Vilja joonis! 6. Mis teeb teda loomatoiduks kõlbmatuks? 7. Kuidas mõjub ta kinnikasvaval sool oma juurte ja lehtedega soo tahtenemiseks kaasa?

Võilill.

Vaatlused. 1. Vaatle niiskel ja kuival kohal kasvavaid võililli! 2. Kirjelda võilille lehtede seisuga ja asetust juure otsal! 3. Pane võilille seemneid idanema ja kasvata noort taime pimedas kohas! Mille poolt erineb ta valguse käes arenenust? 4. Uuri järele, kas on võilille „õis“ õisik või üksik õis. 5. Missugused putukad viibivad õitseajal võilille õitel? 6. Kuidas levivad võilille seemned? Kirjelda lähemalt nende levimisvahendeid! 7. Kas võilill on ühe- või mitmeaastane taim? Millest järeldada tema eapikkust?




102. joon. Võilill.

Võilill on vähenõudlik taim, mis igal pool kuivades kohtades teedel ja tänavatel umbrohuna kasvab. Tema pikk lihav juur tungib sügavasse mulla põue ja saab sealt tarvilikul määral niiskust. Võilille vars ei ole harilikult arenenud, lehed asuvad kobaras juure peal ja laialduvad maapinnale (102. joon.). Varjatud kohal võilille lehtede all ei ole võimalik ühelgi teisel taimel varju tõttu kasvama hakata. Seesugune lehtede seis hoiab ka mulla võilille ümbruses niiske, mis võilillele eluliselt tähtis.

Võilille pikad lühikese rootsuga lehed hoiavad end juure poole langes, mille tõttu neile langev niiskus juure peale valgub

ja nii juurt otstarbekohaselt kastab. Kõigis võilille osades imbub murtud kohtadest valget piima välja, mis päikese käes kleepuvaks taignaks muutub.


Võilille „õied“ asuvad õieraagude laiadel otstel, mis õiepõhja moodustavad. Lähemal vaatlemisel näeme, et õiepõhjale palju õisi on kogunenud, ja neid ümbritseb õiepõhja servades asuv roheline kitsaste lehekeste võru. Seesugust õite kogu, õisikut nimetatakse korvõisikuks ja võilille korvõieliseks. Lapsed vaatavad kevadel naljatades suure ilusa kollase võilille „õiega“, kes rohkem võid on söönud.



103. joon. Üksik võilille õis; a — emakasõlm; b — tupe karvad; c — krooni toru; d — krooni keel; f — tolmupeade toru; g — emakasuude.

Õietupe sünnitavad siin pikad karvad, mis ülevalpool sigimikku asuvad. Kroon on korratu; tema alumine osa moodustab toru, kuna ülemist osa, mis ühele poole on pöördud, harilikult keeleks nimetatakse. Keele viiehambaline ots tunnistab, et kroon on viiest kroonilehekesest kokku kasvanud (103. joon.). Viis tolmuakat, mille niitide alumised otsad krooni torusse on kinnitatud, liituvad oma peadega ühiseks toruks. Tol-

mukate torust ulatub välja kaheharulise emakasuudmega emakas (104. joon.). Võilille õite puhkemine algab õiepõhja servalt ja laieneb keske poole. Nad tolmuavad putukate kaasabil, kes suurel määral siia õisikule magusa mahla järele lendavad, mida krooni toru põhjast välja imbub. Korvõisik avaneb harilikult hommikul, kui päike juba soojalt paistma hakkab, ja läheb õhtul jaheda tulekuga kokku. Ka niiske ilmaga on õiekroon koos.



104. joon. Võilille õie plaan.

Kui õitsmine läbi, siis langevad võilille kroon ja tolmuakad kui ka emakakaela ülemine osa ära. Püsima jääb karvatupp, mis edasi kasvab ja pikapeale tutikeseks kujuneb, millega iga võilille seeme varustatud. Kogu seemnete valmimise aja on

korvõisiku ümbrik kinni ja seemnete küpsmine edeneb tema varjul. Saavad aga seemned valmis, siis pöörduvad ka korvi ümbriku lehed alla ja terve õisiku põhi avaneb tuultele, mis kerge lennututikesega varustatud seemned kaugele uutele asukohtadele kannab.

Peale võilille on meil palju taimi, mille õied kõrvõisikusse koondatud: päevalill, mille seemneid süüakse ja taimeõli saamiseks tarvitatakse, rukkilill, ohakad, takjas ja palju teisi.

Eriti huvitav neist on mitmeaastane taim paiseleht, millel maa all tugev juurikas. Varasel kevadel on tal maa peal punakaslillade soomuselaadiliste lehekestega kaetud varred, mille rattasarnased kollased, pisut allapoole longus korvõisikud. Hiljemini, peale õitsemist, kujunevad alles laiad rohelised juurepealsed lehed. Nad on karvadega kaetud, iseäranis nende alumised pooled, mis päris valkjad, villased, vildisarnased. Üle lehe pealmise pinna käivad pruunikad sooned. Õitseb varasel kevadel kinkudel ja savistel kraavikallastel.

Ülesanded ja küsimused. 1. Lahuta varemini valmistatud nõela abil võilille üksik õis lahti ja vaata suurekstegeva klaasiga tema üksikuid osi! 2. Katsu võilille lihav juur tervelt maa seest välja juurida! Mis kasu on võilillel seesugusest pikast juurest? 3. Mida valmistavad lapsed võilille õieraagudest? 4. Joonista võilille ja paiselehe lehe täppis pilt värvides!

Õunapuu.

Vaatlused. 1. Kuidas kohendatakse mulda õunapuu ümbruses? Kohenda oma kodus õunapuude ümbrust! 2. Katsu selgitada, missugust kahjulikku mõju avaldab õunapuu koorel kasvav sammal puusse. Kuidas kõrvaldatakse sammalt? 3. Vaatle hoolega, missugused kahjulikud loomakesed elutsevad õunapuu koorel, lehtedel, õites ja viljas! Kirjelda neid! 4. Vaatle, kuhu langeb vihmavesi õunapuu lehtedelt; katsu selgusele jõuda, kas ei ole see nähtus kuidagi ühenduses juurte asetamisega! 5. Katsu juba pungade järele ära tunda, kas on õisi palju või vähe loota. 6. Vaatle mahalangenud õunu ja selgita varase mahakukkumise põhjusi!

Õunapuud leiame igal pool meie aedades haritava taimena. Metsikult kasvab ta veel praegugi siin ja seal meie kodumaa metsades.

Õunapuu on keskmise suurusega puu. Tema suured harulised juured laiutavad end igas suunas mullapinnas. Tüvi, mille kõrgus on 5—8 meetrit, haruneb juba maa lähedal suureks ümmarikuks võraks. Noorte puude hallikaspruun koor on sile. Vanemate puude koores on palju korkainet, mis puu tüve



105. joon. Õunapuu. 1 — õitega oks; 2 — õie piki-läbilõik.

jämedamakskasvamisel pakatab ja praguneb; selle tagajärjel on vanemate õunapuude koor krobeline.

Kevadel on õunapuu okstel kahesugused pungad: ühed lühikesed ja peened — pungad, millest lehed tulevad, kuna teisest, jämedamatest ja suurematest, õied arenevad. Juba talvel võib pungade järele ütelda, kas kevadel tuleb palju või vähe õisi.

Õunapuu lehed on täiskasvanult terve muna kujulise labaga millel hambulised servad. Lehelabad on okstele kinnitatud lühikeste painduvate, sitkete rootsudega, mis neile võimaldavad tuule käes serviti vastu tuult pöörduda ja sedaviisi suurest tuule rõhumisest kõrvale põikuda. Harilikus seisus

on lehelaba otsad väljapoole kallutatud. Vihmavesi ja muu niiskus, mis neile langeb, tilgub tüvest eemale maha, nimelt sinna, kus õunapuu peened juured asuvad; need võtavad palju niiskust vastu, mida kasvav puu suurel määral tarvitab.


Igast õiepungast tuleb kevadel mitu õit, mis õisiku moodustavad (105. joon.). Lõikame õie varre pikuti läbi, siis näeme, et tema ülemine osa — õiepõhi moodustab karikakese. Õie-

põhja karikakese servadel asub 5 rohelist kitsast tupplehte; nende ees on 5 valget natuke roosat värvi kroonlehte. Õie sees on ligikaudu 20 tolmukat. Sigimik on õiepõhja karika sees, temaga ühte kasvanud ja jaguneb 5 seemnepesaks. Sigimikul on 5 kaela, igal kaelal emakasuude. Õunapuu õite tolmutamist edendavad putukad, keda siia meelitatakse õiemeega ja õite kauni lõhnaga.

Õunapuu vili on meile kõigile tuntud õun. Õuna lihav, pehme osa on välja arenenud õiepõhja karikast, kuna sigimikust on tekkinud seemned ja need nahksed seinad, mis õuna sees seemneid ümbritsevad.

Õuna lihav osa on määratud looduse poolt seemnete edasikandmise vahendiks. Inimene, linnud ja loomad, kes õunu hea meelega toiduks tarvitavad, ei puutu aga õunu, senikui need ei ole veel küpsed, sest valmimata õuntel on vastik, hapukasviha maik. Olgu küll, et need õunte tarvitajad sagedasti ka seemned ära söövad, jäävad viimased selle tõttu, et neid katab tihe nahkne kest, looma kehas ometi seedimata ja satuvad ühes väljaheidetega uuesti välja mulda, kus nad idanema hakkavad.


Õunapuud on väga mitut sorti, kuid ühegi hea viljaga õunapuu seemnetest ei lähe korda aednikul saada otsekohe sama hea viljaga puud kui vana, vaid seemnest saadud puu õunad on metsikud ja söögiks kõlbmatud. Hea viljaga puu omadusi antakse noortele õunapuudele teisel teel edasi, nimelt pookimise kaudu (106. joon.). Pookimist toimetatakse mitut viisi. Võetakse mõne head sorti õunapuu oks või pung ja pannakse teataval viisil 2- — 3-aastasele või ka vanemale metsikule õunapuule külge. Oksaga poogitakse harilikult kevadel. Kui pookoks ja poogitav taim on ühejämedused, siis lõigatakse mõlemad otsad ühtlaselt viltu ja seatakse vastamisi. Pärast seotakse



106. joon. Oksaga pookimine.

roguskiga kokku ja määratakse võidega üle. Kui poogitav puu on pookoksast palju jämedam, siis pannakse viimane koore alla või selleks otstarbeks tehtud lõhesse. Joonis II kujutab koore alla pookimise juhust, kuna III näitab, kuidas seda lõhesse paneku puhul toimetatakse. Mõlemal juhusel seotakse pookimiskoht roguskiga kinni ja määratakse võidega üle.

Silmaga pookimist, mida silmitamiseks nimetatakse (107. joon.), toimetatakse harilikult suvel, kui puu koor juba kinni hakkab jääma. Hea viljaga puult võetakse pung ühes tükikese koorega, kuna poogitava puu koosse tehakse T-sarnane lõige: lõikesse pannakse pung, nagu pilt kujutab. Lõikekoht seotakse ja võitakse, nagu eespool-kirjeldatud juhustelgi. Kui silm kasvama hakkab, lõigatakse metsiku latv ära.



107. joon. Silmitamine.

Paremaiks kodumaa õunte sortideks peetakse Suislepi õunu, sügisejoonikuid, Tartu roosiõunu, antoonovkaid, serinkaid, sibulõunu.

Peale õunapuud kasvavad meie aedades veel pirnipuud, mis oma õite ja vilja poolest on õunapuud sarnased.

Ka kirsi- ja ploomipuud on oma õie ehituse ja muude nähtuste poolest õunapuuga sugulased. Kõigi samasuguste õite ja omadustega taimi, nagu õunapuud, nimetatakse roosõielisteks. Õunapuud vilja tarvitatakse toiduna. Meie aedades kasvatatakse mitut sorti õunu, mis oma maitse ja suuruse poolest erinevad.

Ülesanded ja küsimused. 1. Joonista õunapuud õie plaan! 2. Mis sugused putukad lendavad õunapuud õitele? 3. Millal õitsevad õunapuud? 4. Kui kaua vältab nende õitsmine? 5. Mistarvis tehakse külmadel kevadeõödel õierikaste õunapuude vahele suitsukat tuld? 6. Külva õuna ja pigni seemneid niiskele liivale või saepurule, ja vaata hoolega, kuidas nad idanevad ning arenevad, ja joonista nende arenemisest pildid! 7. Kuidas saadakse metsikust maitserikaste õuntega puu? 8. Kuidas on see võimalik, et ühel ja samal puul mitut sorti õunad kasvavad? 9. Kuidas toimetatakse pookimist? 10. Joonista õuna piki- ja rist-läbilõike pilt! 11. Valmista plastiliinist õun! 12. Selgita, kui palju õunu umbkaudu sai iga talu teie külas läinud aastal. Joonista saagi diagramm! 13. Joonista diagramm, millelt näha, kui palju õunu teie küla läinud aastal ära müüs, kui palju ta ise tarvitas. 14. Joonista teie küla õunapuude hulga diagramm!


Kirsipuu.

Vaatlused. 1. Korda siin õunapuu juures soovitatud vaatlused 1, 2, 3, 5 ja 6! 2. Vaatle, mis aine ilmub kirsipuu haavadele. 3. Kui suvi on väga vihmane, mida nõrgub siis kirsipuust väga suurel hulgal välja?

Metsikult esineb kirsipuu sagedasti põõsana. Aedades kasvab ta hoolsal harimisel kuni 10 meetri kõrguseks puuks. Nõrgad oksad moodustavad kähara krooni. Ümmargust tüve katab sile koor. Koore haavadest ja murdunud okste otselt imbub isesugust kollakat läbipaistvat vaiku, p i h k a, mis seesugused haavad kinni kleebib.

Nõrkadel oksakestel asetsevad peene rootsuga lehed. Lehed on terve labaga, saetud servaga ning vahakorruga kaetud. Noored munakujulised pungad on nahkjate soomuste ümbrikus. Maikuul avaneb soomusümbrik; selle järele tulevad teised soomused ja lõpuks kortsunud lehed nähtavale, mis aegapidi, tarvilikku jõudu saades, sirguvad. Ühes

lehtedega ilmuvad ka valged õied, mis õitseajal kirsipuude kroonid lumivalge vaibaga katavad. Ühest pungast tuleb harilikult mitu ühepikkuste raagudega õit, mis sarikõisiku moodustavad. Õis on üldiselt õunapuu õie sarnase ehitusega (108. joon.). Ainult sigimik ei ole karikataolise õiepõhjaga kokku kasvanud, vaid istub vabalt selle peal. Mahlakaist karika siseseintest valgub õiepõhjale õiemett. Maiad mesilased ja teised meearmastajad putukad käivad siit seda korjamas ning toimetavad selle juures endale



108. joon. 1 — kirsipuu oks; 2 — õie piki-läbilõik; 3 — mari; 4 — seeme.

teadmata, õielt õiele lennates, tolmutamist. Peale õitsmist jääb ainult sigimik püsima ja areneb kirsimarjaks. Alguses on mari roheline, siis punane ja lõpuks valminult punakaspruun. Punane mahlane mari on ainult katteks kõvale luuviljale, mis on kirsi seemne tähtsamaks osaks. Kirsimarja kutsutakse luuviljaks.

Seemnete laialikandjateks on linnud, eriti hoburästad ja varblased. Mullas arenedes pakatab kirsi luu ja idanevalt seemnelt tungivad juured sügavamale mulda, kuna aga noor varreke maa peale välja sirutub. Aasta kümne pärast saab puu viljakandjaks, kuid seesuguse puu vili on metsik ja halb, lihavaene. Tahetakse aga häid, haritud kirssisid saada, siis tuleb kirsipuuga samuti talitada, nagu noore õunapuugagi, s. o. pookida, silmata.

Kirsipuu areneb hästi liivakas lubjase aluspõhjaga aias. Samuti hästi sobib kirsi kasv kuivusega, kuid liigse niiskuse saamisel jääb ta sagedasti vaigutõppe, mis vaiguvooluna avaldub.

Kuival suvel on kirsipuule suuremaks vaenlaseks lehttäid. Täitanud lehed tõmbuvad kortsu ja kuivavad ära. Kirsimarja vartele muneb kirsikärbes oma munad, millest väljatulevad tõugud marja hävitavad. Hiljemini laskuvad nad mulda ja arenevad siin järgmiseks kevadeks kärbesteks. Arvurikaste kärbeste tekkimist võib kõige paremini ära hoida sellega, kui sügisel kirsipuude alus sügavalt läbi kaevata. Varblased ja rästad hävitavad neid kärbseid suurel hulgal. — Kirsid on parim aedvili, mida sahvti ja veini valmistamiseks kasutatakse. Kirsipuud tarvitatakse ka poleerimismaterjaliks mööblitööstuses.

Ülesanded ja küsimused. 1. Joonista kirsi leht ja võrdluseks õunapuu ja pigni lehed! 2. Mis korraga on kirsi lehed kaetud? 3. Mis kasu on kirsipuul seesugusest vahakorrast? 4. Joonista kirsi õie plaan! 5. Õie piki-läbilõik! 6. Valmista plastiliinist kirsimari! 7. Pane kirsi seeme mulda arenema! 8. Kuidas saadakse metsikust kirsipuust maitsvate marjadega puu?

Juurte tegevus.

Vaatlused. 1. Aseta idanev hernes nõelaga nii, et ta latv allapoole ja juur ülespoole kasvaksid. Vaatle, kuidas nad edasi kasvavad! 2. Juuri mõni taim üles ja katsu tema juur mullast puhastada! Joonista tema peenemate harude pilt! 3. Pane

poleeritud pae- ehk marmoritükk lillepoti põhja mulla alla (109. joon.). Vaata mõne aja pärast, missuguseks tema pind on muutunud. 4. Kinnita kevadel noore kase värskete kannule kõrge klaastoru, nii et vesi alt läbi ei pääse. Toru läbimõõt ja kasekännu jämedus olgu ühesuurused! Mida näed torus üles tõusvat? Mõõda tõusu kõrgus!


Selle peale vaatamata, kuidas idanev seeme mullas asetseb, kasvab juur allapoole. Me võime idaneva seemne, näiteks hernetera, asetada nii, et juure ots ülespoole on pöördud, kuid peagi pöördub see nii, et ta ots jälle allapoole kasvab, kuna varre latv ülespoole keerab (vaata 109. joon!).

Et kõige noorem edasikasvav juure osa mulla põue tungides viga ei saaks, on ta väikese kotikese sisse asetatud, mida juure kübaraks kutsutakse (110. joon.). Mulda puurides kuluvad aga kübara ülemised osad ära ja nende asemele tõusevad seestpoolt uued.

Peenemate kasvavate juure osade ümber, iseäranis nende lõpposas, on peened juurnarmad.

Tõmbame mõne taime noore juure maa seest välja ja vaatame tema mullaga kaetud otsa suurekstegeva klaasiga, siis võime näha, kuidas juurnarmad end mulla ja liivaterade vahele ja ümber on mässinud (111. joon.). Juurnarmad teenivad iseäralist tähelepanu, sest nende kaudu võtavad kõik juured maa seest tulevaid toitaineid vastu. Juured võivad oma juurnarmaste kaudu ainult seda toitu vastu võtta, mis lahuseks on vees.



Paljud ained, mida taimed tarvitavad, on aga mullapinnas kõvas olekus. Nad sulavad taime juurtega kokku puutudes; näiteks libedakspoleeritud marmoritüki pinnale jäävad taime juure jäljed, kui seda marmorit pikemat aega lillepoti põhjas hoida. Juurnarmastel on vee vastuvõtmisel see omadus, et nad väljast lasevad endisse vett ja selles lahustunud aineid, seest aga neid enam välja ei anna. Selle tõttu läheb rõhumine juure sees palju suuremaks kui ülemaal, teistes taime osades, ja vesi hakkab tüve mõõda



109. joon. Marmorplaat, millele oa juured jäljed on söönud (Detmer'i järele).

üles edasi liikuma. Juure sees tekkinud rõhumise mõjul tõuseb vesi ühes temas lahustunud ainetega mitme meetri kõrgusele.

Mida saab siis taim mullast toiduks? Selleks katsume selgusele jõuda, missugustest ainetest koostub iga taim. Võtame mõne taime vaatlemisele. Eraldame hoolega kõik mulla tema juure küljest ja kaalume ta siis ära. Kuivatame teda põhjalikult ja kaalume ta uuesti ära. Nüüd näeme, et ta tervelt 10 korda kergemaks on läinud: kui ta enamalt näiteks 100 loodi kaalus,



110. joon. Juure otsa kübar. 111. joon. Juure ots narmastega mullaosakeste vahel.

siis kaalub ta nüüd ainult 10 loodi ümber. Tähendab, temas oli 90 loodi vett. Paneme nüüd oma kuivatatud taime põlema, siis jääb tast ainult üks lood tuhka järele, 9 loodi põleb täiesti ära. Neid aineid, mis ära põlesid, nimetatakse orgaanilisteks, kuna tuhana järelejääv osa on tuhkind. Orgaanilistest ainetest kõige tähtsam on süsinik, mida me söena saame. Taime tuhka läbi vaadates on temas leitud kuus isesugust mineraalainet.


Harilikult arvatakse, et taimed kõik oma toidu maa seest saavad. Juba kolmesaja aasta eest tegi üks õpetlane järgmise katse. Ta pani suurde potti 200 naela ahjus ära kuivatatud mulda

ja istutas sinna viienaelase pajuoksa. Viie aasta pärast oli see paju suureks puuks kasvanud. Õpetlane kaevas paju üles, puhastas mulla ümbert ära, laskis teda natuke taheneda. Kaaludes leidis ta, et paju oks oli 4 puuda võrra raskemaks läinud. Pärast kaalus ta mulla, milles paju kasvas, ja see oli ainult 14 solotniku võrra kergemaks jäänud. Tähendab, nelja puuda juurdekasvuks tarvitas taim mullast ainult 14 solotnikku aineid. Uurimised on näidanud, et taim võtab mullast tuhk- ehk mineraalaineid. Et suurem osa taimest ära põleb ja veena ära aurub, siis järgneb siit, et ülejäänud kaalu-juurdekasvu sai ta peasjalikult õhust ja veest.

Ülesanded ja küsimused. 1. Juuri mõnede taimede juured maast üles ja joonista nende vormi iseärasused oma kaustikusse! Mis eri-ülesanne on paksudel lihavatel juurtel? 2. Katsu leida juuritud taimede juurte otstelt kübaraid! 3. Pane üks taim destileeritud ja teine kaevuvette kasvama! Kumb neist närbub, kumb kasvab edasi? Mis oli närbumise põhjuseks? 4. Kuidas kergendada taime kasvavatel juurtel mullas edasipääsmist? 5. Kuidas rikastada mulda ainetega, mida taim juurte kaudu mullast ammutab?

Lehe tegevus.


Vaatlused. 1. Korralda taimede hingamise selgitamiseks katse (112. joon.). Võta laia kaelaga pudel! Pane sinna mõned



112. joon. Katse taime hingamise selgitamiseks.

värsked herne oksad ja kalla neile natuke vett peale, et nad ära ei närtsiks. Kata pudel korgiga ja asetage ta 5—6 tunniks pimedasse kohta! Kui sa nüüd pudelisse põleva peeru pistad, mis juhtub te-

maga siis pudelis? Mida ei ole pudelis põlemiseks tarvilikul määral? Kas on aga pudelis süsihaput gaasi nüüd suuremal määral kui varemini? 2. Juhi pudelist läbi korgi käiv toru klaasi, kus selge lubivesi. Kalla nüüd letriga oma pudelisse vett juurde! Selle tagajärjel tungib pudelist väljasurutav õhk läbi lubivee. Missuguseks läheb lubivesi? Mida võib sellest järeldada? Missuguse nähtuse juures kulub hapnik ja tekib süsihapu gaas? 3. Võta mõni veetaim ja pane ta nii, nagu pilt näitab (113. joon.), katseklaasi alla valguse kätte. Proovi



113. joon. Roheline taim eraldab valguse käes hapnikku.

hõõguva peeruga järele, missugune gaas korjub katseklaasi. 4. Katsu kindlaks teha joodi abil, kas on taime lehtedes tärklis. Võta selleks värsket vahtraleht päikesepaistelt ja leota teda soojas piirituses, kuni ta kahvatuks muutub. Piiritusest välja võttes tilguta lehele kerget joodilahust! Otsusta siis värvi muutumise järele, kas on lehes tärklis. Korda seda katset kord keskpäeval puult võetud lehega, teine kord lehega, mille enne päikese tõusu oksalt võtad. Kuhu kaob tärklis lehest vastu hommikut? 5. Katsu kaalude abil näidata, kui palju vett aurab üks või teine toataim 5 tunni jooksul lehtede kaudu välja. Pane taimega

pott, mis pealt nii kaetud, et vesi otsekohe mullast ei saaks ära auruda, kaalu peale; raskus, mis kaaludelt 5 tunni pärast ära tuleb võtta, et neid uuesti tasakaalu seada, ongi lehtedest väljaaurunud vee raskus.


Juba sügisel selgitasime, et taime lehtede kaudu vett välja aurub. Vee välja-aurumine võimaldab uuele veehulgale juurte kaudu taimesse pääseda ja temas lahustunud aineil mullast toiduna taimesse tulla. Lehtede kaudu vee vahetpidamata väljaaurutamise ja juure rõhumise mõjul liigub vesi ka kõige kõrgemate puude latvadesse.

Umber 200 aastat tagasi näitas üks Hollandi õpetlane katsete varal, et taimed võivad õhku värskendada, puhastada. Ta seadis klaaskuplid nii, et väline õhk nende alla ei pääsnud. Kupli alla pandud hiired surid peagi enda väljahingamisest rikutud õhku. (Loomad hingavad sisse õhu hapnikku ja välja süsihaput gaasi.) Pärast pani ta ühe kupli alla hiirte sekka potis kasvava rohelise taime. Jällegi surid hiired ilma taimeta kupli all pea ära, kuna nad rohelise taimega kupli all, mis päikese kätte oli asetatud, vabalt edasi elasid. Siit on selge, et roheline taim päikesevalguse käes värskendab õhku. Seda kinnitasid pärastised õpetlased paremini korraldatud katsete varal. Me teame, et hingates tarvitame õhu hapnikku ja hingame välja süsihaput gaasi, mis õhku rikub. Meie katse näitas, et õhk selle kupli all, kus hiir ja roheline taim olid koos, kauaks ajaks elamiseks jäi; tähendab, ta koosseis püsib endisena, olgu küll, et hiir vähendas hapniku hulka ja rohkendas süsihaput gaasi kuplialuses õhus. Kirjeldatud tingimusi lähemalt kaaludes peame otsusele jõudma, et taim

kuidagi viisi täiendas kupli all hapniku kogu ning vähendas süsihapu gaasi hulka ja hoidis siin nii õhu koosseisu endises tasakaalus.

Tugeva suurekstegeva klaasiga vaadeldes leiame lehe alumisel pinnal väikesi augukeisi — urbeid (114. joon.). Nagu vaatlused näitavad, tungib süsihapu gaas just nende urvete kaudu lehe sisemusse ja killustatakse siin süsinikuks ning hapnikuks. Hapnik läheb urvete kaudu õhku tagasi, kuna aga süsinik hapnikust vabanedes silmapilk taimes oleva veega ühineb ja suhkrut ning tärklisist sünnitab.


Lehtedest levib tärklis toiduna üle terve taimekeha. Muist tärklisaineid, mis igapäevastest toitumise tarvidustest üle jäävad, koondub mugulatesse, seemnetesse ja mõnda



114. joon. Urbed (S) lehe alumiselt pinnalt.

muusse taime osasse tagavaradeks. Tärklis ise aga ei sula vees ja ei saa liikuda lehtedest tarvitusekohtadesse. Sellepärast muutub ta enne edasiliikumist suhkruks, mis vees lahustub, ja liigub siis suhkrulahusena edasi. Ta koondub kõige pealt lehe soontesse, mille kaudu ta nagu torusid mööda tarvitusekohtadesse edasi valgub.

Süsiniku vastuvõtmine ja tärkliseks sidumine, nõndanime-
tatud sarnastamine, toimub
rohelistes taimedes ainult päi-
kese valguse käes, kuna
ta pimedas alati seisma
jääd. Pimedasse pandud taim hä-
vib peagi. Nii siis ainult päikese-
valguse käes võib sarnastamine sün-
dida ja sedaviisi kauge päikese jõudu
kasutada ning koondada elu ülesehi-
tamiseks.



115. joon. Lõkendav peerg
kustub idanevate seemne-
tega purgis.

Eespool nägime, kuidas taimed oma lehed alati nii sea-
vad, et kõigi lehtede peale valgus ulatuks. Lehtede mitme-
viisilised okstel asetsemise nähtused on meile nüüd arusaada-
vamad kui varemini.

Kui võtame idanevad seemned (115. joon.) või leheroheliseta
taimed (seened), siis näeme, et nad saadavad enestest välja süsi-
haput gaasi ja tarvitavad hapnikku. Järjelikult hingavad
idanevad seemned. Roheliste taimede hingamist märkame
kergesti öösi, kui sarnastamine valguse puudusel seisab. Nad

Elusad olevused sünnitavad hin-
gates süsihaput gaasi, mis õhku lä-
heb; ka põlemise ja mädanemise läbi
suureneb süsihappu gaasi hulk õhus.
Kui taimed süsihaput gaasi õhust ei
vähendaks, siis võiks teda õhku
lõpuks sel määral korjuda, et loomad
temas lämbuksid ja ka põlemine
ega mädanemine võimalik ei oleks.
Taimed võimaldavad oma õhupuhastuse
tegevusega üldist elu maa peal. Metsa
all on õhk alati värske ja puhas. (Miks
nimetatakse parkisid linna kopsudeks?)

hingavad ka päeval, kuid siis on vastupidine tegevus, süsihappu gaasi vastuvõtmine, 20 korda kiirem ja varjab hingamisetevõime täiesti. (Magamisruumides ärgu olgu öösi taimi!)

Ülesanded ja küsimused. 1. Missuguseks muutuvad taimede lehed, kui taimi kaua pole kastetud? Millest oleneb see muutus? 2. Mis juhtub teiste taimede varju jäänud taimedega? 3. Missuguseks muutuvad alumised varju jäänud lehed? 4. Missugustel põhjustel võime parkisid suurlinna kopsudeks nimetada? 5. Pane mõne taime seemned purki niiskele saepurule! Lase neid pimedas sooja kohas mõni päev idaneda! Pane nüüd põlev peerg purki! Mida leiad sa selle katse puhul? Miks ei ole soovitatav magamisruumis öösi taimi pidada?

Varre ülesanne.

Vaatlused. 1. Vaatle üht ja sama liiki kasvavat taime laagedal ja teiste taimede varjus! Mis põhjusel on üks vartest harilikult kõrgem? 2. Võta lepa oks; koori temalt kevadel koore rõngas ja pane ta otsapidi vette! Vaatle nüüd, kas närub oks või püsib kargena. Kui ta kargeks jääb, missugust varreosa kaudu saavad siis lehed välja-auramiseks vett? 3. Mõõda mõne pikema puu kõrgus ja jämedus! 4. Võta pajuoksa-lõik ja vaata, mitmeks isesuguseks nähtavaks osaks ta pealt südame poole langeb.

Varre ülesanded on kahesugused. Nad küünitavad lehti tarviliku valguse kätte ja nende kaudu liigub vesi ühes toitainetega üles lehtedesse, kus neid orgaanilisteks aineteks ümber töötatakse; ka valmis saadused lähevad vart mööda alla tarvituskohtadesse.


Vars kasvab alati ülespoole, selle peale vaatamata, kuhu poole meie teda kasvamise ajal ka seaksime. Varrest hargnevad oksad sünnivad harilikult lehtede kaenlas asuvate pungadena.

Oma suuruse poolest on paljude taimede varred, näiteks puude tüved, tähelepanemisväärt. Meie männi tüve kõrgus on sagedasti kuni 30 meetrit, tema ümbermõõt 3—4 meetrit. On aga taime vars nõrk ja ei suuda ise püsti püsida, siis tarvitavad nad mitmel viisil tugesid selleks, et oma lehti valguse kätte upitada (hernes, kassitapp).

Varre tegevusega lähemaks tutvumiseks vaatleme mõnd

puud. Igapäevases elus oleme harjunud puu tüve jaotama järgmiselt: koor, puuosa ja süda. Puu tüve südaosa jääb terveks puu elueaks enam-vähem ühesuuruseks. Puu tüve puuosa on kõige suurem ja silmapaistvam osa kogu tüvest. Puuosa kasvab aga iseäranis kiiresti ja täidab endaga kogu puutüve. Puuosa peal on alati mähiring, mis koort puuosast lahutab. Kõige välimise osa puutüvest moodustab koor.

Mähikiht jagab endast kogu puu elu vältusel ühele poole niinosasid ja teisele poole puuosasid, viimaseid iseäranis



116. joon. Ainete liikumise teed varres.

suurel määral. Puu paisub vahet pidamata jämedamaks just kiiresti kasvava puuosa õlul. Kevadel ja suvel, kui ehitusmaterjalide juurdetulek puus on elav, sünnivad puuosa ringis koredad heledad rakud, kuna sügisel selles ringis ainete vähese juurdetuleku tõttu väikesed ja tumedamad rakud tekivad. Sellepärast on puu aastase juurdekasvu ring, nagu kase juures nägime, kahejärguline.

Eespool tähendasime, et taime vart mööda liiguvad kõik taime eluks tarvisminevad ained. Vaatame, missuguseid varre osasid mööda tõuseb vesi, mis juurtest

ühes toitainetega ühes tuleb, ja kust kaudu lähevad lehtedes valmistatud saadused mugulatesse ning muudesse taime osadesse.

Olgu küll, et lepa oksaga tehtud katse juures vesi ainult altpoolt vigastatud oksaosast võib sisse pääseda, püsib oks vees ometi kargena. Nähtavasti liigub vesi harilikult mööda puuosa või südame kaudu. Südame kaudu ei või aga vesi liikuda, sest elujõulistel vanematel puudel on südaosa paljudel juhustel täiesti ära kõdunenud. Nii siis liigub vesi kõigi temas leiduvate ainetega mööda puuosa ja peajasjalikult tema nooremat osa — n. n. maltspuud kaudu üles.

Et selgusele jõuda lehtedest tulevate ainete liikumisteede

üle, võtame kaks pajuoksa. Ühe pealt koorime ainult pealmise kooreosa ringina ettevaatlikult ära, kuna teiselt koore kuni puuosani ringina eraldame. Kui me nad nüüd vette paneme, nii et vigastatud osad pealvee jäävad, siis ajavad mõlemad oksad nädala 2—3 pärast enestest juurekesed välja. Esimesel on juured tekkinud alumisel otsal, teisel ülevalpool koore väljalõiku. Nähtavasti ei pääsenud teises oksas toitained kooritud kohast kuni otsani edasi, nagu esimese oksa juures. Sellest katsest järeldame, et lehtedest tulevad ained liiguvad niinosa mööda (116. joon.).

Ülesanded ja küsimused. 1. Katsu paljude lehtpuude vanadus nende tüve lõigul nähtavate ringide järele ära määrata! 2. Leia ringilt osad, mis kevadel ja mis sügisel ning talvel sündinud. 3. Kas on taimele koore mahavõtmine kasulik või kahjulik? 4. Mille eest kaitseb koor taime tüve? 5. Korda pärna oksaga viimane paju oksaga tehtud katse!

Inimene ja loomad.

Inimese luukere.

- Vaatlused.** 1. Vaatle sea küljeluid nende kõvaduse ja värvi järele ja pane tähele, mille poolest erineb selgmine ots rindmisest!
2. Põleta luud tüki aega tules! Missuguseks muutub ta tules?
3. Leota luud mõni nädal lahjas soolhappes! Missuguseks ta muutub ja missuguse ennemiini vaadeldud luuosaga on tal sarnasust?

Inimese keha on mitmesugustest osadest koostunud. Kogu meie keha toeks on luusard ehk luukere (117. joon.): keha vajuks nagu tühi kott kokku, kui tal luid toeks ei oleks. Luud peavad kõvad olema, et kogu keha püsti hoida, seda kõvadust annavad luule luusoolad. Ühtlasi peavad luud ka vetruvad ja painduvad olema, et rõhumise ja põrutamise all mitte kokku vajuda. Luud on mitmesugused: pikad torusarnased, lapikud laiad ja väikesed kandilised. Luu välimised osad on kõvast luust, mille sees asub pehme luusäsi. (Vaatle looma luid!)

Terve luukere võime kolme osasse jaotada: pea luud, kere luud ja jäsme luud (käed ja jalad).


Luud on üksteisega mitut moodi ühendatud: liikuvalt või liikumata. Kui üks luu teisega liikumata ühineb, nagu pea luud, siis kutsutakse seesugust ühendust palistuseks.

Vabamat ühendust kutsutakse liigeseks: seal on ühendes olevate luude otsad kaetud krõmpsluuga ehk kõhrega ja väljastpoolt katab seda ühenduskohta sidekoest liigeseümbrik. Ümbriku sees on vedelik, mis luude otsi võiab, et nad teineteist ei hõõruks (118. joon.).

Lapse-eas on luud alles pehmed, krõmpsluu sarnased. Halbadel hoidmise ja kasvamise tingimustel võivad kujuneda sel ajal kõverad seljad ja jalad. Vanas põlves koguneb rohkesti luusoolasid luudesse ja siis juhtub ka nende murdumisi sagedamini.


Pealuu (119. joon.) on kumeraist lapi-kuist luist koostunud; temas on varjul meie tähtsam elund — pea-aju. Pea luude hulka arvatakse ka näo-luud ja hambad (piimahambad, pärishambad).

Kogumeie luukere keskkohaks ja kõigele kehale toeks ning ilmeandjaks on üksikutest rõngasarnastest (120. joon.) lülidest koostunud selgroog. Selgroo lülid asetsevad üksteise peal ja nende rõngasarnased augud sünnitavad ühise toru, kus asub tähtis erkude keskkoh — selgrooüdi. Rinnakorvi sünnitavad küljeluud, mis eespool rinnaluuga ja tagapool selgroo rinnalülidega ühinevad. Rinnakorvis on varjul tähtsad elundid — süda ja kops.



117. joon. Inimese luukere. 1 — viimane kaelalüli; 2 — viimane rinnalüli; 3 — viimane nimeslüli; 4 — ristluu sabaluuga; 5 — küljeluud; 6 — rinnaluud; 7 — abaluud (seestpoolt); 8 — rangluud; 9 — ülema käevarre luud; 10 — tiirluud; 11 — küünarluud; 12 — randmeluud; 13 — kämbaluud; 14 — sõrmeluud; 15 — niue; 16 — reieluud; 17 — põlvekeder; 18 — sääreluud; 19 — pindluud; 20 — põialuud; 21 — labajaluud; 22 — varbaluud.

Käed on rinnakorviga abaluu ja rangluu kaudu ühendatud. Käte luustik koostub õlaluuust ehk ülemisest käe-




118. joon. Õla liiges. 1 — liiges ümbrikus, 2 — läbilõikes.

varre-luust, kahest alumisest käevarre-luust, randme-, kämbla ja sõrmeluist.

Jala luude hulka kuuluvad: reieluu, kaks sääreluud,

jalapõid ja labajala-luud ühes varvastega. Jalad ühinevad kehaga niudevöödi kaudu. Niude luud liituvad seljapoolses osas kindlasti selgroo ristluu-alaga ja eespool isekeskis. Niude luud sünnitavad kausi, mis ülevalpool kõhukoo- pas asuvatele elunditele on toeks ja aluseks.




119. joon. Peakau.


lauda! Hoiä kaustik ja raamat otse enese ees Ära istu ega käi küürus! Raamatuid ära kannä mitte alati ühe ja sama

Tervishoiulised kä- sud. Istu sirgelt! Ära vajuta rinda vastu

käega! Parem on neid juba seljas kanda! Ära pigista oma keha kitsaste rõivaste ja väikeste jalanõudega! (121. joon.)




120. joon. Üksik selgroo-lüli.



121. joon. Inimese labajalg.
1 — loomulik jalakuju ja talla õige vorm; 2 — moodipäraste jalanõudega rikutud jalg.


Küsimused. 1. Milleks on inimese keha nii paljudest luudest kokku seatud? 2. Milleks on meie kehale luukere tarvis? 3. Mispärast on lastel tihti kõverad jalad? 4. Millal hakkasid piimahambad sul suust ära tulema? Millal tuli neist viimane ära?



122. joon. Käevarre kahe kõõlusega lihastegevuses.

Lihased.

Vaatlused. 1. Katsu käega, missuguse kuju omandab lihas, kui liiget kokku tõmbad või välja sirutad, näit. ülema käevarre seespoolne lihas. 2. Haruta keedetud taigliha üksikuteksiududeks! Pehmet punakavärvilist liha, mis luid katab, kutsutakse li-



123. joon. Inimese lihased.

hasteks (123. joon.). Lihaskoostub üksikutest kiududest; teda ümbritseb sitke kate, mis kiudude otstel valkjaks kõõluseks moondub. Kõõlustega kinnituvad lihased luude külge. Lihased on mitmekujulised: pikad ja peened, lühikesed ja laiad. Lihase talitus avaldub tema kokkutõmbumises. Kokku tõmbudes läheb lihas paksemaks ning lühemaks ja tõmbab selle juures neid luid, mille külge ta kinnitub, teineteisele lähemale. Kui keegi näiteks kätt üles tõstab, siis tõmbub suur kahe kõõlusega õlale ja ühe kõõlusega käevarrele kinnituv lihas kokku ja lähendab käevarre luid õlaluule. Et kätt jälle sirgeks ajada, peab teine vastas olev lihas kokku tõmbuma. See on siis väljasirutamine (122. joon.). Kõiki lihaseid, mida me omal tahtejõul tegevusse rakendame, nimetatakse tahtealle alluvaiks.

Lihastes peitub suur jõud; selle jõu ammuvad nad toidust ja

hapnikust, mida veri neile kätte toob. Lihaste jõud ja osavus kasvab harjutuse tagajärjel. Lihased tarvitavad oma arenemiseks ja korrashoidmiseks parajat tööd ja puhkust.

Tervishoiuline käsk. Arenda oma lihaseid kehalise tööga, mängu ja võimlemise varal!

Ülesanded ja küsimused. 1. Mis mõju avaldab see lapse lihastesse, et ta palju jookseb ja mängib? 2. Missugune töö arendab lihaseid? 3. Missuguse töö juures jäävad lihased kängu?

Seedimisorganid ja toitumine.

Vaatlused. 1. Katsu järele, missugusest toidust saab kõht ennemini täis. 2. Millal sööb inimene rohkem: kas suvel või talvel?

Meie keha tarvitab enese ülesehitamiseks, jõu valmistamiseks ja oma soojust alalhoidmiseks vahet pidamata mitmesuguseid toitaineid. Ta on nagu jõumasingi, mida alati peab kütma, kui tahetakse, et ta töötaks. See, mis masinale kütteaine, on inimesele toit.

Enam kui ühtki teist ainet on meie kehas vett; nimelt ligi $\frac{3}{4}$ tervest keha raskusest tuleb vee peale (124. joon.). Janusse sureb inimene palju rutemini kui nälga. Keha saab vett puhta joogiveena ja veerikastest toitudest.


Järgmine tähtis toitaine on *munavalge*, mida meie keha ülesehitamiseks tarvis läheb. Munavalget saame meie munast, lihast, juustust ja piimast.

Tähtlis ja rasv on kehale jõuallikaks ja soojusteandjaks. Nad võivad kergesti teineteise aset täita. Tähtsaineid saame kartulitest, teraviljust, kaunviljust, piimast ja meest. Rasva saame või näol, loomade rasvana ja taimedest õlidenäit. kanepiõli).

Peale nimetatud ainete peab meie toit sisaldama soolaid, näiteks keedusoola.

Inimese toit peab segatoit olema ja kõige suuremal määral tähtsaineid kui jõu- ja soojusteandjaid sisaldama.

Toit peab hästi peendatud ja vedel olema: ainult sel kujul on ta kehale vastuvõetav. Toidu ümbertöötamine algab juba suus; siin jahvatatakse ta hammastega peeneks. Peenekspuretud toitu segab keel süljega, mida isesugused elundid — sülje-




124. joon. $\frac{3}{4}$ on inimese kehas vett, $\frac{1}{4}$ kuiv-ainet.

Tervishoiulised käsud. Hoia oma hambaid! Puhasta neid pehme harjaga! Hoia, et sa liiga kiires vahelduses kuuma ja külma suhu ei võta! Et toit hästi seeditavaks saaks, seks pead teda kaua suus mäluma ja ilaga segama. Söömise ajal ei pea jooma, sest see lahjendab maolima seedimise edustamise võimet. Veel kahjulikum on söögi-isu ärritamiseks toidu alla alkoholi tarvitada. Sage alkoholi maitsmine sünnitab mitmesugu-


näärmed valmistavad. Süljes ligunedes muutub toidus leiduv tärklis suhkruks.

Suust läheb toit söögikõri kaudu makku. Magu on paksude lihaserikaste seintega kott ja asub kõhukoopa ülemises osas. Maos lahustub munavalge — liha, piim, juust jne. Siit läheb maolimaga segatud toit peensoolde, siis jämesoolde ja sealt saadetakse viimased toidujätised pärasoole kaudu välja (126. joon.). Jämesoole alguses on üks suurem sopp, mis väikese ussjätkuga lõpeb. Seda jämesoole sopiosa nimetatakse umb- ehk pimesooleks. Ussjätkusse võivad sattuda toiduga ühes läinud kivikesed; siia pimesoolde peatumata jäädes võivad nad põletikku sünnitada. (125. joon.).

Soolde korjub kahest näärmest lima: mao-süljenäärme — lima, mis kõigi toiduosade munavalge, rasva ja tärklise peale mõjub ümbertöötavalt, ja maksast — sappi, mis rasvaineid peeneks teeb. Nõnda omandavad toidus leiduvad kõlblikud ained säärase kuju (lahustuvad), et nad läbi soolte seinte veresse pääsevad. Veri kannab saadud toidu üle kogu keha laiali.



125. joon. Umbsool ussjätkuga. *D* — peensoole lõpposa; *Dd* — jämesoole algus; *B* — umbsool ühes ussjätkuga (*W*).




126. joon. Sisemised organid. 1 — kõrisõlm; 2 — hingekõri; 3 — südame ümbrik; 4 — vaheliha; 5 — jämesool; 6 — kusepõis; 7 — kopsu veresooned; 8 — läbilõigatud küljeluud; 9 — sapipõis; 10 — maks; 11 — jämesool; 12 — pimesool; 13 — ussjätk; 14 — ülemine õõnes tõmbsoon; 15 — suur tuiksoon (aort); 16 — kopsu tuiksoon; 17 — parem südame eeskoda; 18 — parem südamekamber; 19 — magu; 20 — peensool; 11 — kopsu pahem pool.

seid põletikke ning mõjub raskelt ergukavva ja kogu meie organismi.

Ülesanded ja küsimused. 1. Missuguse maigu omandab suus kaua mälutav leib? 2. Miks peab inimene iga päev korduvalt sööma ja jooma? 3. Missuguse toiduga võib inimene kauemini elada: veerikka või kuivaga?

Vere-ringvool ja veri.

Vaatlused. 1. Missugune on veri, kui ta haavast välja jookseb? 2. Missuguseks muutub veri õhu käes? 3. Mis tähtsus on vere hüübumisel?




127. joon. Süda — läbilõikes (lihtsustatult). Nooled näitavad vere voolusihhti. 1 — pahem eeskoda; 2 — pahem kambri; 3 — parem eeskoda; 4 — parem kambri; 5 — suur tuiksoon; 6–7 — tuiksooned, mis verd kätte ja pähe viivad; 8 — kopsu tuiksooned; 9 — kopsu tõmbsooned; 10 — alumine õõnes tõmbsoon; 11 — ülemine õõnes tõmbsoon. Pahema südamepoole vere-sooned on risti-kriipsudega.

Veri on punane, soe, soolase maiguga vedelik; ta liigub vahet pidamata suure kiirusega isesuguseid torusid — veresooni mööda läbi kogu keha. Veri saab seedimisorganitelt kehale tarvilikke toitaineid ja kopsust hapnikku, mida ta siis igale poole laiali kannab.

Süda paneb vere liikuma. Ta töötab järjekindlalt kui pump. Südame kokkutõmbumine surub vere soontesse ja ajab seda neis edasi. Süda asub rinnakoopas keskkohast natuke pahemal pool; ta on umbes rusika suurune lihastest kott. Piki-vahesein jaotab ta kaheks pooleks, mis iseseisvalt töötavad: pahemaks, mis kogu keha verrega varustab, ja paremaks, mis verd kopsu ajab, kus ta hapnikuga ühineb. Kumbki südamepool on vaheseina läbi jaotatud e e s k o j a k s j a k a m b r i k s. Pahemast südamekambrist (127. joon.) tuleb suur veresoon välja, mis enesest

järjest harusid välja saadab. Ta kannab heledat hapnikurikast verd üle kogu keha laiali. Neid sooni, mis verd südamest välja viivad, kutsutakse tuiksoonteks.

Peenemad tuiksooned hargnevad juussoonteks (128. joon.); need tungivad kõige kaugematesse keha osadesse; iga väiksempi keha osa on nendega läbi põimitud. Juussoontes on verevool aeglane ja nende seinte kaudu toimubki keha varustamine toiduolluste ja hapnikuga. Selle juures tulevad kehast veresse äratarvitatud ained ja süsihapu gaas, mille veri kopsu, neerude ja naha kaudu välja peab toimetama. Juussooned koonduvad jälle omakorda jämedamateks soonteks, mida tõmbsoonteks kutsutakse. Nende kaudu voolabki äratarvitatud tumesinakas süsihapu gaasi rikas veri südame paremasse eeskambrisse tagasi. Siit läheb ta südamekambrisse. Paremast südamekambrist liigub tume süsihapu gaasi rikas veri kopsu tuiksoonte kaudu kopsudesse. Seal vahetab ta süsihapu gaasi hapniku vastu ja pöörduv südame pahemasse ees-



128. joon. Vere-ringvoolu kava.



129. joon. Punased ja valged verelibled. *b* — punased, *a* — valged.

kotta. Viimasest läheb ta pahemasse kambrisse edasi.


Veri koostub kollakast läbi-
paistvast vedelikust ja väikes-
test punastest ja valgetest
verelibledest (129. joon.), mida
küll ainult tugeva suurendamise
varal näha võime. Punased vere-
libled ühinevad ahnelt hapnikuga.
Kopsus hapnikuga ühinenud veri
on helepunane ja teda kutsutakse
tuiksoone vereks; veri aga, mis on
hapniku kehale ära annud ja sealt
süsihaput gaasi asemele saanud,

on tumedavärviline ja teda nimetatakse tõmbsoone-vereks. Süsihapu gaas on kehale kahjulik; teda peab kopsu kaudu kiiresti välja toimetama.

Ülesanded ja küsimused. 1. Kus kohal tulevad veresse kahjulikud ollused ja kus puhastatakse veri? 2. Joonista südame ja vere ringvoolu pilt!

Hingamine.

Vaatlused. 1. Vaata, missuguseks muutub lubivesi, kui temast väljahingatavat õhku läbi puhuda. Mis on vee muutmise põhjuseks? 2. Hinga külma klaasi peale! Mida näed seal? 3. Mõõda rinna ümbermõõt tasase ja sügava hingamise puhul.



130. joon. Hingekõri hingamise ja neelamise ajal.


Hingamisorgan algab ninaga. Nina käigud on mitmejärgulised ja sopilised; seal soeneb sissehingatatav õhk enne kopsu jõudmist. Nina käigud on limanahaga kaetud, mis tolmu- ja bakterid kinni püüab. Siit läheb õhk krõmpsluu-rõngastest ehitatud torusse — hingekõrisse. Hingekõri ülemist osa kutsutakse kõrisõlmeks. Kõrisõlmes on limanaha voldid, mis sünnitavad häälepaelad. Kui pinguletõmmatud päalepaelte vahelt õhk läbi rõhutakse, siis hakkavad need liikuma ja tekitavad hääle.

Hingekõri asub söögikõri ees. Söömise ajal peab söök üle hingekõri minema; et ta sinna sisse ei satuks, kattub hingekõri neelamise ajaks isesuguse kaanega (130. joon.). Kui söömise


Et elada, on meil tarvis puhas õhku, niisama kui sööki ja jooki. Õhk, mis meid ümbritseb, koostub lämmastikust, hapnikust ja süsihappesgaasist. Hapnikuta on elu võimatu. Juba rikutud õhus edenevad kõik olevused viisalt.

ajal rääkida, siis võib toit kergesti hingekõrisesse sattuda. Hingekõri jaguneb all kaheks õõnsaks toruks, mis jälle mitmele korrale hargnevad (131. joon.), kuni nad viimaks väikeste mullikestega lõpevad. Kõik see peente torukeste kogu ühes lõpumullikestega sünnitab suure vetruva, pehme elundi, mida kopsudeks nimetatakse (132. joon.).

Kops asub rinnakorvis ja jaguneb kaheks: paremaks ja pahemaks pooleks. Iga väikest kopsumullikest ümbritseb peenike



131. Kõrisõlm ja hingekõri, mis kaheks toruks hargneb.




132. joon. Parem ja pahem kopsupool ja süda nende vahel.

vere-juussoonte võrk. Neist soontest voolab läbi südamest tulev süsihapu gaasiga täidetud veri. Läbi mullikeste õhukeste seinte annab veri endast süsihaput gaasi ära ja saab mullikestest hapnikku vastu. Väljahingatud õhus on palju rohkem süsihaput gaasi kui sissehingatavas.

Hapnikul on suur tung paljude ainetega nobedasti ühineda. Seesugust ühinemist kutsutakse põlemiseks. Põlemisel tekitavad süsihapu gaas, vesi ja vabaneb soojus. Niisugune hapnikuga ühinemine — „põlemine“ — sünnib vahet pidamata meie kehas

133. joon.). Tema kaasnähtusteks on meie keha alaline soojus. Inimese keha soojus on $36-37^{\circ}$ C. Haiguse tagajärjel võib ta



133. joon. Hingav inimene ja põlev lamp. Inimese kehas toimub samasugune põlemine, mille tõttu soojus ja süsihapu gaas tekib, nagu lambiski.

kerkida; kui ta üle 41° tõuseb, siis võib inimene ära surra; alaneb ta mõne kraadi võrra, siis on sama lõpp.

Tervishoiulised käsud. Kui sa oled tüki aega rikutud õhuga ruumis tööl olnud, siis mine välja puhtasse õhku jalutama ja hinga sügavasti! Hoia enast sirgelt! Et kops hästi saaks

paisuda, ära pigista oma rinda kitsaste rõivastega (krae, korsett)!

Ülesanded ja küsimused. 1. Loe ära, mitu korda hingad sa minutis rahulises olekus. 2. Mitu korda hingad sa pikema jooksmise järel? Mispärast hingab inimene jooksmise järel kiiremini?

Väljaheite-organid.

Siin ja seal keha organites tekib mitmesuguseid kahjulikke kõlbmata aineid, mida kehast välja peab toimetama. Kopsude kaudu tuleb süsihapu gaas ja pärasoolika kaudu seedimisest tarvitamata jäänud osad välja. Teised kõlbmata ained lahkuvad kehast higinäärmete ja neerude kaudu.


Nahk. Higinäärmed asuvad nahas (134. joon.). Nahk katab üleni inimese keha ja moondub loomulikkude avauste juures limanahaks. Nahk on kehale kaitseks väliste kahjulikkude mõjude eest. Naha pealmist kihti kutsutakse marrask-

nahaks. Temast võrsuvad ka juuksed ja küüned. Mar-
rasknaha all on pärisnahk, mis pikkamisi rasvakoos-
tikuks üle lä-
heb. Pärisnahas
asuvad veresoo-
ned, mis nahka toi-
davad, ergud, higi-
ja rasvanäär-
med. Higinäär-
med nõristavad
kahjulikke aineid
verest higinavälja.

**Tervishoiuli-
sed käsud.** Ka-
rasta oma nahka
vee, päikese ja
õhuga! Vaheta
sagedasti ihupesu
ning kannu ker-
geid, õhku läbi-
laskvaid rõivaid!

Neerud. Suu-
rema osa kahju-
likke aineid kurna-
vad neerud välja.
Neerud on oa-
kujulised paaris

elundid ja asuvad kõhukoopas vastu selgroogu. Neerud eritavad
verest kahjulikku kusiainet ja toimetavad seda kusepõide; sealt
heidetakse ta kusetoru kaudu aeg-ajalt välja (135. joon.).




134. joon. Naha läbilõik. 1 — sarvnahk; 2 — juus;
3 — rasvanääre; 4 — higinääre.

Ergud ja ergukava.


Inimese keha elundid on vahet pidamata tegevuses. Nende
talituses valitseb alati kindel kokkukõla. See on võimalik, kui
üksikute elundite vahel on katkestamata teadeteandmise ühendus.
Seda võimaldab ergukava.

Inimese keha ergu-keskkohaks on pea-aju ja seljaüdi,

kuhu erkude kaudu kõik teated tulevad ja kust nad ka välja lähevad. Meie võime ergukava tegevust telegraafivõrguga võrrelda; pea-aju oleks peajaam ja seljaüdi — abijaam, ergud aga oleksid telegraafijuhtmed. Ergu-keskkohti ühes kõigi erkudega kutsume ergukavaks (136. joon.).



135. joon. Neerud 1 — neerud;
2 — kusejuhid; 3 — kusepõis;
4 — kusetoru; 5 — neeru tõmb-
soon; 6 — neeru triksoon.




136. joon. Ergukava.

Pea-aju (137. joon.) on suur hallikasvalge ergukogu, mis asub pealuu-koopas. Pea-aju on mõistuse, arusaamise, tahtejõu algekoht ja tähtsamate meelériistade keskkoht. Seljaüdi täidab kaht ülesannet: esiteks lähevad kõik kehast tulevad tunded tema kaudu pea-ajusse, ja tema kaudu saadetakse tegevusekäsud ajust elunditesse. Peened valged niidikesed, mis kogu keha läbi põimivad, ongi ergud. Nad jagunevad liigutus- ja tunde-

erkudeks; need viimased viivad teateid meeleriistadelt pea-ajusse ja liigutusergud jälle peajust käskusid lihastele.

Tervishoiulised käsud. Katsu palju puhtas õhus viibida! Vaimline töö vaheldugu kehalise tööga! Magamise aegu puhkab pea-aju; sellepärast mine aegsasti magama! Täiskasvanud inimene peab 7—8 tundi magama, lapsed aga rohkem! Hoidu alkoholi, kanget teed, kohvi ja tubakat tarvitamast, sellepärast et need kõik pea-ajusse halvavalt mõjuvad.


Ülesanded ja küsimused. 1. Seleta, kuidas mõjub alkohol joodiku liikumiserkudesse. 2. Millal jäävad ülesanded ennemini pähe: kui oled hästi maganud või kui oled vähe puhunud?



137. joon. Pea-aju altpoolt.

Meeleriistad.

Pea-ajust lähevad ergud silmadesse, kõrvadesse, haistmis-, maitsmiselunditesse ja nahasse. Kõiki neid elundeid kutsutakse meeleriistadeks. Meeleriistade kaudu saame teateid välisilmast.




138. joon. Keel. Pealmisel pinnal on näha käsnakesed, kus maitsmisergud asuvad.

Nahatunne. Kogu meie ihu nahka võime pidada üheks suureks meeleriistaks — nahatundmis-riistaks, sest naha kaudu saame meie palju tundeid vastu võtta: valu, sooja, külma ja ka katsutava asja pinna vormi üle otsusele jõuda.

Ülesanded ja küsimused. 1. Kuidas katsutakse lapse vannitusvee soojust, kui kraadiklaasi ei ole? 2. Mis sugune meeleriist on pimedatel kõige rohkem arenenud? 3. Mis tähtsus on huultel toidu söömisel?

Maitsmine. Maitsmisriist on keel (138. joon.), mis meile teateid annab, kas meie magusat või mõru, soolast või haput toitu sööme. Kuid tunda võime ainult nende asjade maiku, mis on vedelad või mis süljes lahustuvad.



139. joon. Nina läbilõik. *a* — kõrkmad. Ülemal on näha hargnev haistmiserk.

Haistmine. Haistmisriist on nina (139. joon.). Ninakoopa ülemises osas lõpeb haistmiserk, mis peaaugusse teateid viib, kas me head või paha lõhna haistame. Kõige paremini tunneme siis lõhna, kui kõvasti hingame.


Ülesanded ja küsimused. 1. Mis tähtsus on ninal hingamise juures? 2. Mis tähtsus on sellel, et nina suu kohal seisab?

Kuulmine.

Vaatlus.

Katsu järele, kuidas kuuled paremini: lahtise või kinnise suuga.

Kuulmisriist on kõrv. Kõrva kaudu saavad igasugused hääletsused meile teatavaks. Väliskõrv — kõrvaleht võtab hääle vastu ja juhib kõrvatoru kaudu kuulmenaha



140. joon. Kõrv. 1, 2 — kõrvaleht; 3 — kõrvatoru; 4 — kuulmenahk; 5 — keskkõrv; 6 — sisekõrv.

juurde, mis värisema hakkab. Kuulmenahk annab seda liikumist edasi kuulmeluudele keskkõrva. Siit juhitakse see sisekõrva kuulmisergu juurde ja tema kaudu ajusse. Keskkõrv on kurguga kõrva-kurgu toru kaudu ühendatud (140. joon.). Selle toru kaudu pääseb õhk keskkõrva, mille tõttu kuulmenaha peal rõhumine on mõlemalt poolt ühesugune.


Tervishoiulised käsud. Hoiä kõrva suurte põrutuste eest ja ära torgi teda kunagi terava asjaga! Paukude ajal hoiä suu lahti!

Ülesanded ja küsimused. 1. Mis teevad halva kuulmisega inimesed, et paremini kuulda? 2. Kuidas kaitseb suu lahtiolek kuulmenahka paugutamise ajal?

Nägemine. Nägemisriist on silm (141. joon.). Silmamuna on sügaval silmakoopas varjul. Eestpoolt kaitsevad teda silmalaud ripsmetega ja kulmud. Silmavesi niisutab silmamuna. Silmamuna on kolmekihiline. Väliskiht, silma valgkile, läheb eespool läbipaistvaks sarvkileks üle.

Kesk-kihi sünnitab tihe veresoonte võrk, soonkile, mis läbi sarvnaha kirjukilena nähtavale tuleb. Igal inimesel on kirjukile isevärvi ja tema järele kutsutakse inimesi halli-, sõstra- (pruuni-) ja sinisilmalisteks. Kirjukilel on keskel väike auk, silmatera, mille kaudu läbi silmaläätse valgus silma juhitakse. Sisemise õhukese võrkkile ehk ergukile peale tekib pilt silma ees seisvaist asjust. Nägemiserk viib selle nägemismulje-pildi pea-ajusse.

Silmahaigusi tuleb sagedasti ette; tähtsam neist on lühike nägemine, mille tekkimises tihti ise süüdi ollakse. Enamail juhuse-



141. joon. Silm. Inimese silma piki-läbilõik. 1 — otsa- ja 2 — põseluu, mis silmakoobast aitavad moodustada; 3 — ülemine ja 4 — alumine laug ripsmetega; 5 — silmamuna; 6 — nägemiserk.

tel tekib lühike nägemine selle tõttu, et peenikesel töö silmi liiga töö lähedal hoitakse.

Tervishoiulised käsud. Kirjatöö kui ka näputöö ei tohi ligemal olla 25—30 sm. Ära tööta kunagi videvikus ega halv valguse juures! Sea raamat või töö nii, et valgus pahemalt poolt töö peale paistab. Hoi silmi ka liig heleda valguse eest! Oled silmadega tüki aega töötanud, siis vaata kaugele, anna neile puhkust! Hoi silmi tolmu ja suitsu eest!

Ülesanded ja küsimused. 1. Missugused silma osad kaitsevad silma? 2. Missugune elukutse edendab lühikest nägemist, missugune kauget nägemist? 3. Mis kasu on silmale silmaveest?

Veis.


Vaatlused. 1. Mõõda lehma pikkus ja kõrgus! 2. Kuula järele, kui raske on ta umbkaudu. 3. Millega on veis kaetud? tema värv, sarvede kuju? 4. Mitu korda päevas ja millega toidetakse veiseid? 5. Vaatle, kui palju toitu veis päevas tarvitab ja kuidas ta sööb. 6. Missugust seedimise iseärasust leiad veisel inimesega võrreldes? 7. Vaatle tähelepanelikult veise hambaid ja joonista kõik hambarühmade isevormid! 8. Vaatle, mitme varbaga on veise jalad. Vaatle, mille peale toetub ta astudes. 9. Kuidas kutsutakse noort veist ja kuidas ta toitub? 10. Kui palju piima annab teie lehm päevas? Kas ta aasta läbi nõnda palju annab? 11. Missugusesse tõugu ta kuulub?

Juba väliselt veise kehaehitust silmitsedes leiame samad keha osad, mis inimeselgi. Tüse kere toetub eesmistele ja tagumistele tugevatele jalgadele — j ä s e m e t e l e (neljajalgne). Iga jalg toetub maa peale kahe varbaga, mille viimased liikmed sõrgadega kaetud. Kaks ülemist varvast ei puutu maa külge, nad on arenemata.

Pikergune suur pea, mis toitumise puhul ka osa käte ülesannetest oma peale peab võtma, ühineb keskmise, õhukese kaela abil kere eesmise otsaga. Peas on tugevad sarved, millega veis end kaitseb. Veise kere lõpeb pika sabaga, mis karvatutti kannab, millega veis tülitavaid kärbeid tõrjub.

Kui me süveneme veise keha sisemisse ehitusse, siis leiame tema kehast tugeva luukere (142. joon.). Luukere kandvaks

osaks on, nagu inimeselgi, selgroog, mille külge kõik teised luud kinnituvad, nagu paljud masina hoovad ja rattad peavõlvile. Lähemalt üksikuid luud vaadeldes leiame igal pool samasuguse ehitusega ja välimusega luud kui inimesegi luukeres. Ainult oma suuruse ja pikkuse poolest erinevad nad; näiteks on ka veise kaelas 7 lüli, nagu inimese omas, kuid nad on pikemad, mille tõttu veise kael ongi palju pikem. Üksikute




142. joon. Veise luukere. *sz* — sarvenutid; *hw* — kaelalülid; *sb* — abaluud; *rw* — rinnalülid; *lw* — nimesülid; *b* — niuded; *o* — reieluu; *sk* — põlvekeder; *su* — sääreluu; *mf* — põialuu; *wf* — kannaluud.

luude pikkus oleneb nähtavasti neist ülesandeist, mida vastav kehaosa peab täitma.

Veise vereringvoolu-kava ja süda on samasuguse sisemise ja välimise ehitusega kui inimese omad. Veised hingavad kopsudega, mille ehitus jällegi vastab varemini vaadeldud inimese hingamiselditele. Lihased erinevad oma välimuse ja kohaliste ülesannete poolest teatava piirini inimese omadest selle tõttu, et veised toetuvad neljale jalale ja liiguvad nende abil edasi, kuna inimene ainult kahele jalale toetub.

Veise toit on taimed. Terve seedimisorganite kava on kujunenud selle toidu kohaselt. Alumise lõua eesmisel pool on kuus labidasarnast eesmist hammast ja kaks väikest kihva, mis on oma kuju poolest eesmist hammaste sarnased. Ülemises

lõuas puuduvad eesmised hambad kui ka kihvad ja ige on kaetud kareda käsnaalse nahaga. Keelega rapsib lehm rohtu suhu ja tõmbab pea väänava ülestõstmisega rohu juurelt lahti. Suured lamedad voldilise närimispinnaga purihambad jahvatavad rohu peeneks. Et taimtoit on vähe toitev, tuleb lehmale palju rohtu ära süüa. Suure hulga toidu korjamisel puudub tal aeg toidu peeneksnärimiseks. Karjamaal neelab ta rohu ilma närimata alla ja alles puhkusel rõhitab ta selle tagasi ja närib lõplikult peeneks. Toidu tagasirõhitamist võimaldab temale sellekohane mao ehitus (143. joon.).




143. joon. Veise magu *S* — söögikõri; *P* — vats; *N* — kuningakübar
B — kordmago; *L* — libesool; *O* — peensool.

Maol on neli osa. Toit läheb toidukõrist kõige pealt esimesse kotisarnasesse makku, mille nimi on vats. Siin niiskub ta mõne aja. Siit liigub ta edasi teise, võrgusarnasesse ossa, mida kuningakübaraks kutsutakse. Kuningakübarast rändab toit pehmendatud kujul suhu tagasi, kus ta lõplikult läbi mälutakse. Suust läheb ta ilaga segatult mao kolmandasse ossa — kordmaku ehk sajakordsesse ja sealt mao neljandasse ossa — voldilisse libesoolde, kus lõplikult ära seeditakse.

Et veis end rohust elatab, mis liha ja teradega võrreldes on vähem toitvad, peab ta seda toitu endale suurel hulgal hankima. Et sellest toidust kõiki kõlvulisi osi välja kurnata, on ta magu suur ja soolikad õige pikad.

Isast veist nimetatakse härjaks (pulliks), emast — lehmaks (144. joon.) Täiskasvanud lehmad sünnitavad elusaid poegi — vasikaid. Vasikad võivad peale sündimist kohe emaga ühes edasi liikuda. Alguses toidab, imetab, lehm oma vasikat piimaga, mida tema piimanäärmed sõrutavad (metsikus olekus). Piimanäärmed asuvad udaras. Vasika toitmisviisi järele nimetatakse lehma imetajaks.

Juba vanal hallil ajal märkas inimene, et lehma piima, mis udarasse sõordus, maitstva joogina võib tarvitada. Ta harjutas lehmad oma eluaseme lähedal elama ja hakkas nende piimaandmis-võimet arendama sel määral, et lehm ka pärast imeva vasika toitmist piima veel inimesegi elutarveteks andis. Praegu on



144. joon. Lehm ja härg.

veised paljud endised metslooma omadused kaotanud; ainult hea haistmine on alal püsinud, mis neile võimaldab toitu valida. Seesuguse arendamise viljana on meil palju veiste tõugusid. See arendamine kestab vahet pidamata tõuväärindamise nime all edasi.


Toitumisviisi ja osalt ka kehaehituse poolest on lehma sarnane lammas, kelle inimene ta pehme villa pärast koduloomaks on harjutanud.

Ülesanded ja küsimused. 1. Mis kasu on veisel karvatutiga lõppevast sabast? 2. Kuidas liiguvad veise lõuad mälumisel? 3. Missugustesse osadesse jaguneb veise magu? 4. Missugused meeled on veisel teravalt arenenud? 5. Mitmesõraliseks kutsutakse veist? 6. Niimetage koduloomade seast teisi sama palju sõrgadega ja samuti maale

toetuvaid loomi! 7. Mida saadakse lehma piimast? 8. Kui palju maksab toop piima, nael võid, nael juustu? 9. Kui palju piima kulub ühe naela või valmistamiseks? 10. Valmista piimasaagi ja lehmade hulga diagramm oma koduküla jaoks teatud aasta-ajal! 11. Valmista plastiliinist veise purihammas! 12. Kas lastakse lehma ennast oma vasikat toita või toidetakse viimast muul viisil? 13. Kus elutsevad veised ja lambad praegu veel metsikult?

Siga.

Vaatlused. 1. Veise juures tehtud 1., 2., 3. ja 4. vaatluse kordamine. 2. Vaatle eriti sea pea vormi ja tema kärsas! 3. Jalgade kuju karjaseal ja sulu nuumseal? Millega lõpevad sea varbad? Mitmesõraliste hulka kuulub siga? 4. Mille



145. joon. Sõraliste ja päris-kabjaliste eesmistest jäsemetest luud. *t* — sääreluu; *k* — küünarluu; *n* — randmeluud; *nn* — kämbaluud; *II* — *V* — varbad; 1, 2, 3 — varbaluud.

poolest erinevad sea hambad veise omadest? 5. Kuidas liiguvad sea lõuad söömisel? 6. Selgita, millega on siga külma vastu kaitstud. 7. Kuidas kutsutakse siga toitumise järele? 8. Kuidas paljuneb siga ja millega toidab ta oma poegi? 9. Vaatle lahtimisel sea sisemust, tema elundeid ja pane tähele, missugusteks kaheks

pooleks jaguneb sea sisemus vaheliha läbi! 10. Missuguseid haigusi võib inimene keetmata sealihast saada?

Metssead elutsevad soistes pehmetes kohtades. Pehmet maad mööda liikudes vajuvad jalad kergesti sookamarasse. Sügavasse kamarasse vajumast takistab nende jalgu tagumine paar sõrgadega varustatud varbaid, mis eesmistest kõrgemal seisavad ja veidi tahapoole hoiduvad (145. joon.).


Seal on suur kiilu laadi pea (146. joon.) ja pikk, külgedelt tugevasti kokkusurutud kere. Seesuguse kehavormiga loomal on kerge põõsatihnikust läbi pugeda; vaevalt pääseb ükski teine loom sääraseist tihnikuist läbi kui metssiga. Seal on paks nahk, mida okstel ja risul tõsiselt raske kriimustada.

Nahka katavad hõredad jämedad ning tugevad karvad — harjased. Sooja seesugune karvkate ei hoia. Seda pole seale vajagi, sest naha all olev paks rasvakiht täidab juba ise hea kasuka aset.

Metsseal tuleb toitu otsides palju käia; sellepärast on tema lühikesed jalad hästi tugevad. Koduseal (147. joon.)

aga, kes on tihti kogu eluaja väikeses sulus ehk aedikus kinni, jäävad nad sagedasti vähese liikumise tõttu nii nõrgaks, et siga neile kuigi kaua ei või toetuda ja suurema osa ajast lamab. See on selgeks näiteks, kuidas eluviis mõjub teatava organi arengusse. Jäsemete varvaste otsad on, nagu veistelgi, sõrgadega kaetud. Veiseid ning sigu kutsutakse sõralisteks.

Siga toidab ennast väga mitmekesise toiduga. Ta sööb rohtu, taimede juuri ja juurikaid, nende vilja, putukaid, hiiri, raibet ja mitmesuguseid jäänuseid. Siga on kõiksööja loom. Lõike- ehk eesmisi hambaid tarvitab ta toidu küljest suutäite lõikamiseks. Oma suuri kihvu, mis metskultidel eriti




146. joon. Metssea (1) ja kodusea (2) pealuu.

suured, tarvitab ta enesekaitse ja kallaletungimise sõjariistadeks. Nendega käristab ta mullast puujuuri, mis tuhnimist ehk songimist takistavad. Purihambad jahvatavad niihästi taimtoitu kui peendavad ka liha.

Mullast toitu otsides tuhnivad sead maad oma pika koonuga, mis lõpeb ümmarguse vetruva kärsaga.

Siga on juba ammust ajast inimese koduloomaks, kuid sai selleks siiski hiljemini kui veis. Et siga toitu vähe valib, siis kasvatatakse sigu igas talus, ka linnas. Neid toidetakse toidujäänustega, millele vähesel määral, eriti nuumamise ajal, vilja lisatakse. Seast saab inimene liha, rasva ja harjaseid.



147. joon. Kodusead. 1 — saksa tõugu; 2 — inglise tõugu; 3 — ungari tõugu.

Sagedasti elavad sea lihastes mõnesugused kahjulikud söödikussid, nagu paeluss, oma varjuelu. Kui inimene seesugust liha keetmata või pooltoorelt sööb, siis tekivad tema sooletorus paelussid. Need tarvitavad inimese toitu soole torus ja kurnavad inimese jõudu.

Emane siga, emis, sünnitab aasta jooksul kahel korral ning kummalgi puhul kuni 10—12 pörsast, keda ta alguses oma piimanäärmetes valmiva piimaga imetab.

Ülesanded ja küsimused. 1. Millega toidetakse pörssaid peale imetamise lõppu? 2. Kirjelda sea maatuhnimis-viisi! 3. Miks vaadatakse müügile toodavad sead arstlikult läbi? 4. Kuidas hoitakse sealihad alal? 5. Missugust tulu saadakse sigadest? 6. On teile nüüd arusaadav miks metssiga kodustati? 7. Mis tõugu sigu kasvatatakse teie pool ja mille poolest erinevad nad üksteisest? 8. Valmista sea jalg ja

hambad plastiliinist! 9. Valmista kuldi vastamisi käivate kihvade mudel!
10. Kui palju puudasid sealiha on teie külast tänavu aastal linna viidud,
kui palju kodus ära tarvitatud?

Hobune.

Vaatlused. 1. Vaatle hobuse suurust, pea vormi ja selle pikkust, värvi, kehakatet ja eriti kaela ja jalgade ehitust! 2. Näita hobuse reit, säärt, põlve ja kanda! 3. Millega on hobuse jala ots kaetud? 4. Missugused jäsemed on hobustel tugevamad? 5. Katsu joonisel tabada hobuse keha seisu veol, kergel sõidul, ratsutusel ja seisul! 6. Mida sööb hobune ja kuidas närib ta toitu? 7. Missuguseid loomi oled sa hobusel leidnud? Millega tõrjub hobune neid loomi ära? 8. Miks rautatakse hobuseid? 9. Kuidas toidab hobune oma varssa?

Inimene kodustas metshobuse juba iidsetel aegadel. Inimene hindas hobuses tema jõudu, vastupanevust ja jooksu kiirust. Ta püüdis koguni neid


omadusi koduhobustel arendada ja täiendada. Selle töö tagajärjel on praegu meil iga suguste ülesannete kohaselt kujunenud hobuste tõud olemas, nagu mitmesugused veo-, kergesõidu- ja ratsahobused. Veohobused on õige raskepärased kehaehitusega,



148. joon. Hobune.

sega, kuna aga ratsa- ja kergesõidu-loomad on oma liigutustes väga saledad ja painduvad (148. joon.). Hea ratsahobune kihutab kümned verstad tunnis. Seesugune haruldane kiirus on seletatav selle hobuse kehaehitusega, mis kõigiti on kohenenud kiireks jooksuks. Kõrgeil jalul võib ta suuri hüppeid teha. Peenike

sale kere tungib jooksul kergesti läbi õhu. Kuid eriti tähelepan-
davad selle kohanemise seisukohalt on ta jalad. Nad on sirged,
peened ja lõpevad ühe varbaga. Inimesel on jala põias ja labas
hulk väikesi luukesi, mis jala alumise osa hästi painduvaks teevad.
Hobusel on kõik need luukesed ühte sulanud ja sünnitavad ühise
tugeva jooksuluu, millega ka ainus tugev varvas liigendub.
Varvast katab, nagu king jalga, vetruv kõva sarv — kabi. Sarv-
aine, millest on hobuse kabi, moodustab ka veiste sarved, loo-
made ihukarvad ja küüned. Sarvaine ei ole erkudega varustatud
ja on seega peaaegu tundetu. Seda asjaolu kasutatakse hobuse
rautamisel, kui kabjale naeltega raud kinnitatakse. Hobust kut-



149. joon. Hobuse pea. *L* — lõikehambad; *K* — kihva alged; *P* ja *C* —
purihambad.

sutakse kabjaliseks. Hobuse keha katab samast sarvainest
karvastik, mis söönud hobusel läikiv ja puhas, nälginud loomal
aga takerdunud ja korratu.

Hobune on taimtoitlane. Toiduks tarvitab ta heinu ja
vilja. Väljas karjamaal ulatub ta oma pika kaela ja pea varal
huultega maast rohtu rapsima. Suhuhaaratud rohu lõikab ta
lõikehammastega juurtelt lahti. Kihvad puuduvad
hobusel. Suurte laiade purihammastega (149. joon.) jahvatab
ta lõugu kahele poole liigutades rikkalikus süljes niisutatud
toidu peeneks.

Et toiduvaene hein ja rohi seedimiseks palju aega tarvitab,
on ka hobuse sooletoru võrdlemisi pikk. Eriti suur on tema
umbsool, mis on hobusele nagu teiseks maoks.

Metsikuilt esivanemailt on hobune pärinud hea nägemise ja

kuulmise. Meie hobuse nägemine nürineb pimedates tallides elamisel. Suure liikumisega harjumata hobusele pannakse silmaklapid ette, et ta vähem kõrvale näeks; siis liigub seesugune hobune juhitavas suunas julgemini edasi. Söekaevandustes jäävad hobused tolmu käes päris pimedaks.

Vabaduses elavad hobused karjadena. Karja juhiks on harilikult vanem isane loom — täkk. Karjas on hobustel ühine valve ja ühiselt kaitsevad nad end vaenlaste vastu. Hädaohu korral asuvad hobused, pead vastamisi, ringi; ringi keskele koondatakse varsad; pealetungijale raiutakse tagumiste jäsemetega vastu. Palju tüli teevad hobustele väikesed vaenlased, nagu kärbsed ja parmud.

Emane hobune — mära sünnitab ühe varsa aastas. Vars on sündides nii tugev, et ta vana loomaga juba esimesel päeval ühes edasi võib liikuda. Alguses toitub ta ema nisast saadava piimaga. Ema hoiab ja kaitseb varssa suure õrnusega. Noort sälgu ei ole kohane enne kolmeaastast vanadust tööle rakendada.

Teistest kabjalistest oleks meil nimetada eesel.


Ülesanded ja küsimused. 1. Joonista vedava, kergelt sõitva ja ratsa-kihitava hobuse jälgede rida! 2. Millest otsustad sa, et kabi on sarvainest? 3. Kuidas mõjub see hobuse jalasse, kui mõni nael sügavamale on löödud? 4. Miks antakse hobustele töö ajal suurendatud osemed (portsjonid) kaeru? 5. Kuidas määratakse hobuse vanadust? Kas on lubatav hobuse saba ära lõigata? 6. Valmista plastiliinist hobuse hambad ja eesmine ning tagumine jalg! 7. Mis tõugu hobuseid kasvatatakse teie kodukülas? 8. Katsu võimalikult täielikult kirjeldada hobuse tulusust kultuurelus!

Kass.

Vaatlused. 1. Mõõda oma kassi pikkus ja kõrgus! 2. Vaatle, kui palju on ta eesmistel ja tagumistel jäsemetel küüsi ja kuidas hoiab ta neid mitmesugustel olukordadel. 3. Vaatle kassi pea vormi ja tema hambaid! 4. Vaatle kassi silmatera heleda valguse ja videviku ajal ning joonista see mõlemal silmapilgul! 5. Vaatle, kuidas varitseb kass oma saaki, ja joonista ta keha seis järjekorralistel varitsemomentidel! 6. Vaatle, kuidas kass puude otsa ja katustele küttima ning pelgu ronib. 7. Kuidas sööb kass oma saaki? Missugune on kassi keel (puuduta)? 8. Missugusel jalaosal kõnnib kass? 9. Mille tõttu on kassi kõnnak salajane,

kuuldamatu? 10. Kuidas toidab kass oma poegi? 11. Kui kaua on kassipojad pimedad?


Kass tarvitab toiduks hiiri ja teisi väikesi loomi ning lina-



150. joon. Kass hiirepüügil.

saagile õige lähedale hiilinud, kargab ta hoogsa hüppega tema peale ja haarab ta küünite vahele (150. joon.). Viisates on tal vaja salamahti ja tasa saagile läheneda, — vastasel korral peletaks ta varitse-

tava enneaegu minema. Tasaseks juurdehiilimiseks on kassil käpad nii ehitatud, et ta ainult pehmete varbapadjakeste — mõhnade peale astub (151. joon.). Kõndimise ajal on varvaste teravad haaramisküüned tagasi tõmmatud ja ei puutu maa külge; nii on kõrvaldatud nende nürimise võimalus (151. joon). Peale tungides ja ennast



151. joon. Majakassi labakäsi.


kaitstes sirutab kass lihaste ja kõõluste abil oma nõelterasid küüned välja ja tarvitab neid tapariistadena. Küüntega kinni hoides ronib ta tagaajajate eest puude otsa pelgu, samuti sealt ka lindusid ja linnupesi röövima.

Et saaki hüppe pealt trehvata, peavad püüdja keha ja jalad ülipainduvad olema. Ja tõesti, kass on üks osavamaist ja paindu-

vamaist loomadest oma keha liigutuste poolest. Iseäranis osavad on need eesmistest käppade liigutused, mida ta haaramisel teeb. Tagumised jalad on tugevad ja töötavad hüpetel kui hoovad. Varitsemisel on tagumised jalad konksus ja selg vibuna koolutatud. Niipea kui saak juba tabamiskauguses ja hüppe tugevus kindel, surutakse järsku tagumised jalad ja selg sirgeks ning

kass lendab kui nool saagi peale. Hüppamisel on saba kassile tüüriks. Mida kaugemale tuleb hüpata, seda enam kisub kass ennast hüppele valmistades küüru.

Et kass enamasti öösi saaki püüab, siis on tema silmad nii ehitatud, et nad ka ööhämaruses saaki näevad; päevavalgel pikergune silmatera auk läheb kassinas valguses ümmarguseks ja laseb rohkem valgust silma (kirjelda silmade ehitust!). Püües pimedas ei näe kass, silmatera laienemise peale vaatamata, ja siis juhivad teda saagile ainuüksi terav kuulmine ja peenike nahatunne. Liikuvate kõrvalestadega püüab ta vähemagi krõbina kinni ja püüab sagedasti hiirekese peale, ilma et seda näekski.



152. joon. Kassi konksküüs tagasitõmmatult ja väljasirutatult.



153. joon. Kassi lõualuud ühes hammastega.

Naha tundmine on iseäranis terav ülemisel mokal asetsevais pikkades karvades — nurrugarvades.

Varemini, kui kass aina metsikult elas, toitis ta end, nagu praegusedki metskassid, üksnes lihatoiduga, mille kohaselt ka kogu seedimisorganite kava on ehitatud. Kassil on ülemises kui ka alumises lõualuus kuus väheldast teravat lõikehammast. Nende taga on kummaski lõualuu pooltes üks terav kihv, mida ta saagi surmamiseks ja kontide peendamiseks tarvitab. Kihvadest tagapool on ülemistes lõualuu pooltes 4 ja alumistes 3 purihammast. Purihambad on teravakühmuliste otstega. Nad lõikavad kokkulitsumisel liha nagu teravad käärid (152. joon.), tähendab, nad ei käi vastamisi, vaid üksteisest mööda. Sedaviisi lahtilõigatud lihatükid neelab kass närimata alla. Kõht on väheldane ja ka soolikas keha suurusega võrreldes palju lühem kui veise

ja hobuse või mõne muu taimtoitlase oma. Kass on väga verejanuline: ta murrab ka siis, kui kõht on täis.

Teiste sisemiste organite, näiteks hingamise, vere-ringvoolu ja nõristusorganite ehitus on ligikaudu samasugune kui veise vastavail organeil.

Kass sünnitab elusaid poegi, kuid need on alguses üheksa päeva pimedad. Neid toidab ema, oma piimaga imetades. Kassi pojad on väga liikuvad ning ema õpetab neile juba aegsasti mängudes püüdmissosavust ja kavalust.

Nagu kirjeldusest näeme, on kassid oma eluavalduste loomu poolest kiskjad loomad.

Ülesanded ja küsimused. 1. Loe, kui palju on kassil kummaski lõualuus lõikehambaid, kihvu ja purihambaid. 2. Valmista plastiliinist kassi purihammas ja võrdle seda lehma, sea ja hobuse omaga! 3. Uuri hoolega kassi küüne tegevust ning katsu tema ehitust joonistada ning seletada! 4. Mida teevad kassid vast kinnipüütud hiirega? 5. Vaatle noorte kasside mängusid! 6. Joonista jäljed, mis kass tasasel käigul, jooksul ja hüpetel teinud, oma kaustikusse ja võrdle neid lehma, sea ja hobuse ning teiste loomade omadega! 7. Kus armastab kass magada? 8. Miks ei jäeta kassi toalindude juurde? 9. Kas kass on must või puhas loom? Millest sa seda järeldad?


Koer.

Vaatlused. 1. Korda kassi kirjelduse puhul antud 1., 2., 3. ja 4. vaatlus! 2. Vaatle koera keelt ja pane tähele, kuidas ta joob. 3. Vaatle koera kondi närimisel! 4. Kuidas leiab koer oma peremehe üles? 5. Kuidas mõjub suur lärm koerasse? 6. Milleks tarvitatakse politseis koeri? 7. Mis kasu on karjasel ja kütil koertest? 8. Vaatle, kuidas jookseb koer, kuidas ta ujub. 9. Kuidas paljuneb koer ja missugused on alguses tema pojad? 10. Missugust tõugu koeri oled sa näinud?

Koer on inimesele mitmekülgsest kasulik seltsiline. Seda võimaldab esiteks ta tarkus ja arusaamine. Teiseks on tal meeled, nagu kuulmine ning haistmine, õige teravad. Need meeled olid ka siis koeral hästi arenenud, kui ta alles iseseisvat elu metsas elas. Eriti terav on haistmine jahikoortel ehk hagiail

(154. joon.), näit. hurdal ja voostril, ning karjakoeral. Hagijas tunneb kõige kasinama lõhna järele metslooma või linnu jälgi ja jookseb hiilides jälgi mööda viimase peidukohale; karjakoer

haistab juba kaugelt kiskjate lähenemist. Väga tähtsa abilise esineb koer põhjamaadel, kus teda sõiduloomana laiadel lumelagendikudel kasutatakse.



154. joon. Jahikoer põldpüüd silmates.

Koera kere ja jalad on kiireks jooksuks kõigiti kohastunud.

Et kõnnak oleks kerge, toetub ta käies ainult oma varvaste mõhnadele (155. joon.). Kõndimisel ja jooksul ei ole ta küüned üles tõstetud. Küüned on tal nürid ja ta ei kasuta neid nagu kass.



155. joon. Koera eesmine jalg. D—jädemeline põial.

Koer toidab ennast mitmesuguste ainetega, kuid kõige armsam on talle siiski liha. Hambad on ligikaudu samasuguse ehitusega kui kassilgi; ülemise lõua purihambad käivad alumistest nagu kääri terad teineteisest löikamisel mööda. Väljapaistvalt suured on koera kihvad, mida ta kaitse ja pealetungimise puhul tarvitab. Saaki püüab koer taga ajades ja sellepärast on ta palju väledam jooksja kui saaki varitsev kass.


Koer on kõige vanem koduloom. Inimene kodustas ta juba siis, kui ise alles küttimise arenemisjärgus elas.

Koera esi-isa on vististi praegu veel meie kodumaalgi elutsev hunt. Hunt on paraja suure koera suurune halli karvaga loom. Nagu koergi, püüab ta oma saaki taga ajades. Ta elab metsatihnikutes, kus oma halli kuuega ümbrusest silmapaistvalt ei eraldu. Siit käib hunt vahete-vahel karjamaal

koduloomi murdmas. Hundid armastavad karjana saagile minna eriti talvel, kui toitu raske saada (156. joon.). Enne väsitavad nad saagi tublisti ära ja alles siis asuvad tema murdmisele. Nad murravad sel teel sagedasti endast suuremaid loomi, näiteks hobused maha.

Koer ja hunt tarvitavad oma peatoiduks murtavate loomade liha — nad on kiskjad.

Koerad paljunevad elusaid poegi sünnitades. Alguses imetab



156. joon. Hundid põdra jälil.


ema poegi oma piimaga, sest lihatoidu seedimine käib noorele loomale üle jõu. Kui pojad alla nelja kuu emalt ära võõrutatakse, siis surevad nad enamatel juhusel. Sagedamate tõugudena esinevad meie juures karjakoer, taks, hagi ja hundikoer.

Ülesanded ja küsimused. 1. Vaatle koera hambaid ja nende seisu kinnises suus! 2. Mida oled kuulnud hundi verejanust, koera tarkusest? 3. Miks kutsutakse kassi ja koera kiskjateks? 4. Võrdle koera ja kassi küüsi! 5. Näita, kus on koera tagumises jäsemes põlv. 6. Mille poolest

erineb koera jala alumine ots sellest luust, mida me hobusel jooksuluuks nimetame? 7. Joonista oma kaustikusse koera jäljed mitmesugustel liikumis-silmapilkudel! 8. Valmista plastiliinist kõigi koera hambaliikide mudelid!

Mutt.

Vaatlused. 1. Vaatle muti suurust, värvi, kehakatet, pea ja keha vormi, silmi ja kõrvu ning hambaid! 2. Kirjelda muti liigutusi maapealsel liikumisel! 3. Joonista muti eesmised jäsemed oma kaustikusse! 4. Viibi õhtu eel kauemat aega mõne värskel mutimulla-hunniku juures ja pane hoolega kõiki muutusi selle hunniku läheduses tähele! 5. Millega kaevab mutt oma käikusi? 6. Pane muti käiku aeg-ajalt suuremaid putukaid ning surnud



157. joon. Mutt.


hiiri ja vaata, mis mutt nendega teeb. 7. Kirjelda siili 1., 2., 3. vaatluse juhatare järele. 8. Kuidas kaitseb siil ennast pealetungijate vastu? 9. Kuidas surmab ta mürgiseid usse?

Mutt on väike loomake, kelle keha kuni 14 sm pikk. Tema tegevuseavaldustena leiame sagedasti aiast ja heinamaal värskel mullahunnikuid; teda ennast saame aga üliharva näha.

Muti keha on igapidi kohastunud maa all elamiseks (157. joon.). Tema ovaalne, pikergune kere läheb pikkamisi peaaegu ilma kaelata kuhikulaadiliseks peaks. Seesugune keha kuju võimaldab mulla all kiiresti liikuda. Keha katab sametiline süsimust karv, mis edas- kui tagaspidi liikumist ei takista ega ka niiskust nahale ligi lase.

Muti jäsemed on lühikesed. Eesmised käpad on peaaegu

lihastesse peidetud. Välja ulatub neist ainult lühike väljapoole pöördud labakäpp, millega mutt osavasti mulda kaevab. Eesmistest käppadest välisel serval on isesugune kumer küünteluu, mis mulla kaevamisel kui puulabida raudots töötab (158. joon.). Muti eesmised jäsemed on õige tugevad; nende abil võib ta




158. joon. Muti käpp.

enese mõne minuti jooksul mulla sisse kaevata; ta puurib nendega muldas nii kiiresti edasi, nagu ujaks vees. Kohedas mullas tuhnib mutt ka peaga maad ja loobib temaga mulda kui labidaga üles, mille tagajärjel maapinnale mullakuhikud tekivad.

Tundemeeltest on mutil hästi arenenud nahatunne, haistmine ja kuulmine. Silmad on närbunud, maa all pimedas elades, ja on ainult veel väikeste terakestena nahapinnal karvade vahel, mis neid mulla eest kaitsevad. Iseäranis tundlik on muti nina kärss ja ülemine moka (159. joon.). Kuulmine on erk, olgugi et välimine kõrvaleht puudub.

Mutt toidab end putukatega ja nende tõukudega, keda ta oma terava haistmise ja nahatunde abil mullast leiab. Ta sööb ka vihmausse, konni, hiiri ja omavahelises kakluses otsasaanud



159. joon. Muti luukere.

suguvendi. Muti hambad on kohastunud putukate kõvade koorikute purustamiseks (159. joon.). Ka purihambad ja kihvad on teravad, nagu kassilgi. Nagu nägime, saab ta oma hammastega jagu ka suurematest loomadest, kes juhtumisi tema käikudesse sattunud. Toitu otsides kaevab ta vahet pidamata uusi käikusid ja kulutab selle peale palju jõudu. Oma jõu tasakaalus hoidmiseks peab ta hästi ja palju sööma. Mutt sööb öö-päeva jooksul

enam kui ta keha kaalub. Soolikas on tal lühike nagu kas-silgi; ka sellest lühikesest soolikast läbi käies jõuab rammus lihatoit ära seedida ja kehale tarvisminevaid aineid anda. Mutt võib vaevalt 12 tundi ilma söömata olla.

Puhkamiseks ehitab mutt endale koopa ehk pesa, mille ta rohuga, sammaldega ja muude peh-mete asjadega seest vooderdab. Pesast viivad teed kahte ringkäiku, nagu seda 160. joonisel näeme. Ringkäikudest lähe-vad pikad maa-alused teed välja. Neid teesid mööda jookseb mutt päevas mitu korda ja püüab siit toitu. Leidub neis toitu vähe, siis kaevab ta uusi teid juurde. Talvel poeb mutt külma eest ära sügavale maa sisse ja kütib siin edasi külma eest ärapäogenenud tõuke.


Harilikult elavad mutid üksikult ja ainult kevadel isane ja emane mutt paarikaupa. Suve alguses sünnitab emamutt 4—5 abitut, karvadeta poega, keda ta alguses oma piimaga imetab. Nelja-viie nädala jooksul hoolitsevad ema ja isa noorte muttide eest ja siis algavad noored iseseisvat elu. Terve muti-perekond läheb siis jälle laiali.

Mutid hävitavad hulga mitmesuguseid kahjulikke putukaid ja nende tõuke kui ka põldhiiri. Selle läbi on nad põllupidajale kasu-likud. Juurvilja-aias peenraid ja hei-namaid aga rikub mutt oma mulla-hunnikutega; siin sünnitab ta kahju. Kuid juurvilja-aias ei pea teda mitte hävitama, vaid ainult eemale pele-tatama.


Muti tähtsamaiks vaenlasiks on

kullid ja väike nirk.

Muti sugulastest oleks nimetada siil (161. joon.). Ta elut-seb aia ja põllu taga pöösastes. Päeval magab ta kuskil tiheda lehestiku varjul. Öösel läheb ta saagile. Siil murrab putukaid, hiiri, konni, usse ja teisi loomi. Ussil haarab ta keskelt kinni, tõmbab enda kerasse ja laseb seesugusel kardetaval saagil, nagu on mürgised ussid, enda terava okaskuue otsas surnuks rabelda




159. joon. Muti nina kärss.



160. joon. Muti pesa.

Samuti tõmbub siil ka hädaohu lähenemisel kerrasse ja seab okkalise pinna pealetungijale vastu.

Talvel ei ole siilil võimalusi tarvilikul määral toitu saada. Suve jooksul on rikkalikust toidust temale naha alla paks rasvakord korjunud. Hilissügisel poeb siil külma eest pelgu ja suigub pool-unetaolisse olukorda. Tema eluavaldused jäävad ka õige tagasihoidlikuks ja aeglaseks. Selleks aeglaseks tegevuseks saab tema organism jõudu naha-aluselt rasvakorralt, mis keva-



161. joon. Siil.

deks päriselt ära kaob. Lume kadumise järele virgub siil ja algab jälle usinat tegevust. Kevadel sünnitab ta 4—6 peaaegu paljast poega, keda ema piimaga toidab.


Ülesanded ja küsimused. 1. Kuidas peletatakse muttisid aiast eemale? 2. Sea kõik muti keha iseärasused eluviisiga ühendusse! 3. Miks armastab mutt pehmes üleskaevatud mullas liikuda? 4. Kui palju liha peaksid sa päevas ära sööma, kui sul oleks muti isu? 5. Mistarvis peab mutt nii palju sööma? 6. Mispärast läheb mutt talvel sügavamatesse käikudesse? 7. Mille peale toetuvad mutt ja siil kõndides, kas varvastele või päkale? 8. Joonista muti ja siili kärss ja nina oma kaustikusse!

Nahkhiir ja talveuni.

Vaatlused. 1. Vaatle, missugusel päeva-ajal lendavad nahkhiired! 2. Kirjelda nahkhiire suurust, värvi ning üksikuid liikmeid ja vaatle, kuis on nad nahkhiire liikumisviisile kohastunud. 3. Kus veedab nahkhiir päeva valge aja? 4. Kuidas

toetub ta seinale ja tugele peatusajal? 5. Kuhu peidavad nahkhiired end talveks? 6. Kirjelda nahkhiirte talvekorterit! 7. Otsusta nahkhiire hammaste ehituse järele, missugust toitu nahkhiir tarvitab.

Nahkhiir on nime oma välimuselt saanud, mis tõesti teatava piirini hiirt meelde tuletab. Lendamist võimaldab temale kere ja




162. joon. Suurte kõrvadega nahkhiir. Üleval vasemal pool magav, paremal pool istuv, all lendav.

eesmise ning tagumise jäsemetepaari vahele tõmmatud elastiline nahk, mida loom sagedasti võiab. Nahkhiir võib lennunaha abil vabalt lennata. Ta on, nagu linnudki, täielik õhuelanik (162. joon.). Ta kehaehituses peegeldub see eluviisi pea-avaldus. Maad mööda on nahkhiirel peaaegu võimatu liikuda. Siin lohistab

ta ennast tagumiste jalgade najale toetudes edasi. Samuti võimatu on tal maas oma tiibu laiali laotada ning lendu tõusta. Sellepärast ei lasku nahkhiir peaaegu kunagi maa peale maha, vaid puhkab kõrgetel karniisidel, palkidel, müüriservadel ja mujal, kust ta ennast otsekohe võib õhku heita, et lennunahka lennuks laiali sirutada. Siia kinnitub ta tagumiste jalgadega ja kõlgutab oma keha allapoole rippuma.

Kõik tema luud ja kogu kere on kerged ja ei tee raskusi lennuks. Eesmistele jäsemetele luud on selle tõttu, et nende külge kõige tugevam elund — lennunahk kinnitub, väga pikaks



163. joon. Nahkhiire luukere. 1, 2, 3 — esimene, teine ja kolmas sõrmeluu; 4 — abaluu; 5 — rangluu; 6 — õlavarre-luu; 7 — küünarluu; 8 — kodarluu; 9 niudevöö; 10 — reieluu; 11 — sääreluu.

sirgunud. Lennunahk moodustab eesmistele jäsemetele varvaste toetusel sirmitaolised pinnad — tiivad (163. joon.).

Nahkhiir lendab saagipütügile öösiti. Ta on öise eluviisiga loom. Päeval puhkab ta õõnsais puudes, mahajäetud ehitustes, pöninguil ja mujal eraldatud hämarais kohtades. Heaks kaitseks on talle siin hallikas, ümbruse sarnane naha värv, mis teda keskusest ei eralda. Seesugust ümbrusega kokkusulavat looma värvi kutsutakse kaitsevärviks.

Et nahkhiir ainult õhus viibides täiesti vabalt võib liikuda, siis ei korja ta endale maast toitu, vaid püüab seda lennul. Ta toiduks on lendavad putukad. Lennul püüab ta neid ammuli suuga või selle lennunaha-osaga, mis on saba ja tagumiste jalgade vahel. Hambad on tal nõelteravad ja nendega võib ta ka kõige kõvemad putukate osad ära murida (164. joon.).

Nägemine on nahkhiirel tõnts ja püügil juhib teda peaaesjalikult üliterav puutumistunne ning ülierk kuulmine. Et see nii on, võime lihtsast katsest näha. Katame tema kidurad silmad kinni ja laseme lahti toas, kus palju risti-rästi tõmmatud nõöre. Selle peale vaatamata, et tal võimatu on näha, ei pörka ta siiski ühegi nõöri vastu, olgugi et ta õige kiiresti edasi-tagasi lendab. Puutumistunne on eriti terav karvadeta lennunahas ning suurtes kõrvalestades.

Lendamiseks kulub palju rohkem jõudu kui maad mööda roomamiseks. Selle jõu ammutab nahkhiir toidust, mida ta õõ jooksul suurel hulgal korjab. Ta on õige ablas loom.

Suvel, kui putukaid palju, toitub ka nahkhiir rikkalikult. Ta sööb rohkem, kui otsekohe kulutatava jõu loomiseks tarvis läheb. Toidust saadud liigseist aineist korjub naha alla rikkalik rasvakiht — loom läheb rasva. Talve lähenemisega kaovad putukad ja nahkhiirel on võimatu toitu saada. Tal jääb siis üle kas surra või lennata sinna, kus ka talvel ilmad soojad ja putukaid külluses. Kuid kumbagi teed ei tarvita nahkhiir. Kui putukad ära kaovad, kaovad ka nahkhiired. Ekslik oleks arvata, et nad ära surid, sest kevadel, niipea kui putukad ilmuvad, tulevad ka nahkhiired välja. Nad on aga siis väga kõhnad. Kus olid need loomad talvel?



164. joon. Suurte kõrvadega nahkhiire pealuu (suurend.).

Sügisel otsis nahkhiir endale varjatud, tuult eest kaitstud koha, nagu puuõõne, koopa, keldri, riputas enda sinna tagumisi jalgu pidi üles ja suikus kestvadele unele. Tihe karvkuub ja lennunahk, millesse ta end mässis, kaitsevad keha liigse jahtumise eest.

Elutoimetusi kahandatakse suikumisel viimase võimaluseni; süda tuksatleb väga harvalt, umbes kolme minuti jooksul ühe korra keha temperatuur langeb 35° pealt 14° C. järele. Selle tõttu väheneb ka jõu-ainete pruukimine. Kogu aeglane elutegevus toimub suve jooksul naha alla koondatud rasva-tagavarade kulul. See on üldiselt tuntud seadus: mida vähem me tegevad oleme, seda vähem tarvitame toitu — jõu-aineid. Looma ajutist pike-

maks ajaks unele suikumist ja sellega ühenduses elutegevuse kahandamist kutsutakse looma talveuneks. Talveuni on külma talvega maade loomadel harilik nähtus.

Suvel sünnitab ema-nahkhiir ühe poja, keda ta oma rinna all kaasas kannab. Ta toidab poega oma piimaga.

Nahkhiir toob putukate hävitamisega inimesele palju kasu. Meie kodumaal elab mitu liiki nahkhiiri.

Kõik senini vaadeldud loomad sünnitavad, nagu nägime, elusaid poegi ning toidavad neid oma piimanäärmetes valmiva piimaga — imetavad. Seesuguse poegade toitmise viisi järele kutsutakse neid imetajateks loomadeks. Ka inimene kuulub imetajate loomade hulka.

Ülesanded ja küsimused. 1. Vaata, mitu varvast on nahkhiire jalgadel, missugused on nende küüned. 2. Kata nahkhiire silmad kinni ning lase ta toas lahti, kuhu niidid risti-rästi tõmmatud, ja pane tähele, kuidas ta niitide vahelt läbi põimub. 3. Vaata, kuidas nahkhiir maad mööda edasi liigub. 4. Joonista nahkhiir laialisirutatud tiibadega seisukorras! 5. Mispärast suigub nahkhiir talveunile? 6. Kuidas mõjub seesugune pikk uni rasvase loomana uinunud nahkhiiresse?

Tuvi.


Vaatlused. 1. Vaatle kodutuvi kuju, suurust, värvi, noka ehitust, laialilaotatud tiibu ja jalgade ehitust! 2. Selgita, mis-suguse hobusejala osaga võiks tuvi jala alumist siledat osa võrrelda. 3. Vaatle surmatud tuvi rinnaluud ja sellele kinnituvaid lihaseid; samuti ka tema sooleтору kogu ulatuses, kopsusid ja muid hingamisvahendeid! 4. Selgita, mida sööb tuvi. 5. Joonista tuvi sulgede iserühmade pildid! Mille poolest erinevad nad? Vaatle neid suurekstegeva klaasiga! 6. Vaatle tuvi mune, tema pesa ja noori poegi! 7. Kuidas toidavad vanemad neid? 8. Mitu korda aastas hauvad tuvid? 9. Nimeta tuvide vaenlasi!

Tuvi pea-iseärasuseks on, nagu lindudel üldse, õhus lendamiseks kohastunud kehaehitus. Tema kere on täiskedratud pooli kujuline. Seesugune kogu võimaldab linnule lennates kergesti õhust läbi tungida (165. joon.).

Tuvi keha on, nagu kõigil lindudel, sulgedega kaetud.

Suled on ülikerged ja seepärast on tuvi oma suurusega võrreldes ka kerge.

Sulel on kaks osa: tüvik ja lai latv. Sule latv on hulgast sarvpladikestest — suleudemetest — kokku seatud (165. joon.). Suleudemed liituvad üksteise külge väikeste konksukeste abil. Tuvi keha katjaid sulgi nimetatakse katesulgedeks. Pikki tiivasulgi kutsutakse hoosulgedeks. Nende pikkusest oleneb tiibade pikkus ja ühtlasi ka linnu lendamiskiirus. Saba pikad suled on tuntud tüürsulgede nime all, sest sabaga peab lind lennu-




165. joon. Tuvi.

suunda. Katesulgede all keha pinnal on veel pehmed udemelised suled — udusuled, mis keha soojust kasukana kokku hoiavad.

Linnu luukerelgi on teatavad iseärasused, mis õhus lendamisest tingitud. Kõik luud on tugevasti kokku kasvanud ja seepärast on luukere vähe või pole peaaegu sugugi paindub. Ainult pikk kael küünitab pead igasse keha ossa. Luud on õõnsad, õhuga täidetud; sellest tulebki, et terve luukere on väga kerge.

Eesmist jäsemete sõrmedest on arenenud ainult kolm, mille külge ka suured tugevad hoosuled kinnituvad. Tiibade tavaline ülesanne on

lindu õhus kanda. Selleks on tiivad õige tugevate tiivaliigutajate lihastega varustatud. Rinnaluu, mille külge need lendamisel vahet pidamata tegevuses olevad lihased kinnituvad, on selle tagajärjel



166. joon. Tükike sulge suurendatult.


suureks ja tugevaks kasvanud ja nimelt tema peal asuv kiil ehk *a n d u r*. See kiil on suurem ja kõrgem lindudel, kes kaua ja hästi võivad lennata, kuna ta neil, kes harva lendavad või koguni ei lenda, peaaegu täiesti puudub. Käimiseks tarvitavad tuvid, nagu teisedki linnud, ainult tagumisi jäsemeid.

Tuvidel ja teistel lindudel on tähelepanemise väärt üks varvaste-

konksutaja lihas, mis ülevalt niudeluilt algab ja üle põlve ja kannaluu tagant kõõlusena varvastesse läheb (167. joon.). Kui lind jala kõverasse tõmbab, siis läheb see lihas ja tema kõõlus pingule ja kisub ühtlasi ka varbad konksu. Mida sügavamini lind magab, seda tugevamini vajutab keha raskus jalgu põlvist konksu ja seda kindlamini hoiavad varbad oksast kinni. Sellega seletatakse, miks uinuv lind oksalt maha ei kuku.

Kodu- kui ka metstuvi toit on viljaterad ja taimede seemned.

Nokk, mis kahest poolest — pealiskast ja aluskast — koostub, on paksu sarvekorruga kaetud. Nokk on tavaliselt pikk ning nõrk ja kohane terade korjamiseks. Hambaid tavaliselt ei ole, nagu teistelgi lindudel. Seepärast läheb närimata toit esialgu pugusse, kus ta niiskub ja pehmeks muutub. Siit valgub ta söögikõri kaudu edasi lihasterikaste seintega kotti — liivapugusse (168. joon.), kus ta seedimisliima ja pugu sarvnahksete seinte kokkutõmbumise kui ka liivaterakeste kaastegevusel lõplikult peendatakse, vastuvõtte-kõlvuliseks tehakse.




167. joon. Varvastekonksutaja lihas.

Lennul töötab kogu linnu organism väga usinasti. Seepärast peab ka gaaside vahetus — hingamine — sellekohaselt korraldatud olema. Hingamisorgan algab ninasõõrmetega, mis noka tagumises osas asuvad. Häälepaelad asuvad tuvil hingekõri alumises osas, kus see kaheks kopsupooleks haruneb. Kopsudest lähevad välja õhukesed õhukotikesed (169. joon.). Need kotikesed asuvad osalt kehakoopas, osalt ulatuvad luudesse. Kui linnu luud murduvad ja õhk murdunud kohast otsekohe õhukottidesse pääseb, siis on see sagedasti linnule surmav. Nendel kotikestel on kaks ülesannet täita: nad teevad linnu kergemaks ja teiseks hingavad linnud lennul kotikeste kaastegevusel. Kui lind tiivab üles tõstab, siis tungib õhk läbi kopsu kotikestesse; tiibade allalaskmisel voolab ta kottidest uuesti läbi kopsu minnes välja. Selle juures sünnib hingamine tõhtsalt ja linnud ei hakka kiirel lennul kunagi hingeldama.

Vere-ringvoolu organite korraldus ja ehitus on samasugune kui imetajailgi loomadel; ka püsib vere temperatuur alati ühesugusel kõrgusel, ainult südame kiirema tegevuse ja tõhtsa hingamise tõttu on lindude vere soojus kõrgem kui imetajail loomadel, näit. 40° — 42° C.

Välistest meeltest on tuvil nägemine hästi arenenud. Silmi katab peale laugude veel isesugune pilknahk, mille harilik asukoht silma nurgas. Tuvi kuulmine on terav, nagu kõigil muilgi lindudel; kõrva-auk on silmade taga sulgede vahel. Teised meeleriistad on arenemata.


Tuvid paljunevad, nagu kõik linnud, muna kaudu. Muna



168. joon. Linnu sooletoru. *Oe* — söögikõri; *K* — pugu; *Km* — liivapugu; *D* — kesksool; *P* — kõhu suljenääre; *H* — maks; *C* — pimesool; *Ad* — jämesool; *U* — kusejuht; *Ov* — munajuht.

toimub kanal rinna-aluse sulestikuga haudumise ajal? 9. Kuidas kutsub ta oma poegi söögile?

Juba väga vanast ajast peale on kanad kodulindudeks (170. joon.). Isalind kukk on emalinnust tunduvalt suurem ja ilusam. Mõlemil on peas punane lihav hari ja kurgu all lokutid. Pea on väike ja teravaservalise kõva nokaga varustatud. Pealiskokal avanevad ninasõõrmed. Sabasuled moodus-



170. joon. Kodukanad.

tavad tugeva viilkatuse taolise saba. Kukel uhkeldavad sabal isesugused läikivad suled. Tugevail soomustatud jalgel on neli tõmpide küüntega lõppevat varvast, kukel peale selle veel suur kannus.

Nüride küüntega siblib kana toitu otsides mulda. Ta toiduks on mitmesugused putukad, nende tõugud, ussikesed, rohi ja terad. Siblimisel ei pääse ükski toiduks kõlblik pala kana teravalt nägija pilgu eest. Toidu peendamine sünnib, nagu

tuvilgi, lihamaos. Kana ei vali palju toitu — ta on kõiksööja lind. Et kanal ninasõõrmed alaliselt avatult seisavad, ei saa ta tuvi kombel, kelle ninasõõrmed joomisel sulutud, vett juua. Ta rüübib vett alumise nokapoolega, iga kord selle juures pead tõstes.

Kana on halb lendaja; selle tõttu ei püüa ta õhus kunagi pikalt toeta viibida. Kui tema tiibu tuvi omadega võrrelda, siis näeme, et nad viimasel keha suurusega võrreldes tublisti pikemad on ning teravad. Pikkade teravate tiibadega linnud võivad kiiresti lennata. Sellevastu jookseb ja kõnnib kana maa peal väga usinasti.

Kana muneb aastas umbes 150 muna. Nendest haub ta kevadel viimastena munetuist 15—18 poega välja, kui teda selles ei takistata. Haudumiseks kulub umbes kolm nädalat. Haudumise ajal on kana nagu haige: ta sööb vähe, käib harva pesalt ära ja rinna-alune läheb sulituks. Paljas rinna- ja kõhualune soendab mune tõhtsamalt kui sulekord. Et munad ühtlaselt soojust saaksid, liigutab kana neid aeg-ajalt oma nokaga. Munade väljahaudumist toimetatakse ka kunstlikult, nn. h a u d u m i s k a s t i d e s. Kui poeg munas juba küllalt tugev, siis rõhub ta oma nokal oleva terava lubjaka kühmaga muna koore katki ja tuleb sellest välja. Kana pojad on munast väljatulekul udusulgedega kaetud ja võivad otsekohe kanaga ühes minna. Kana poegi kutsutakse selle tõttu p e s a p õ g e n e j a t e k s. Peale munast väljatulekut vajavad pojad veel erakorralist sooja. Vana kana soendab neid tiiva all. Varakult ema juurest äravõetud pojad jäävad kasvus kängu.


Kana poegade suurimaiks vaenlasiks on kullid, varesed ja kassid.

Inimene kasvatab kanu munade ja liha saamiseks. Munade munemise usinuse ja keha välimuse järele on meil mitu tõugu kanu.

Ülesanded ja küsimused. 1. Vaatle, kui kaua kestab ühe muna idanemisvõime; miks pannakse haudujale kanale värsked munad pessa? 2. Selgita, kui palju munevad teie kodukanad aastas igaüks üksikult ja ühtekokku. 3. Missugusel aasta-ajal munevad nad rohkem? 4. Kui palju mune te ise aastas ära sööte, kui palju te ära müüte? 5. Joonista teie küla aastase munadesaagi diagramm! 6. Kui suur sissetulek oli teie külal müüdüd munadest?

Pääsuke.

Vaatlused. 1. Vaatle pääsukest lennul! 2. Kirjelda tema tiibu ja saba lennul! 3. Vaatle tema keha üldist vormi, värvi, katesulgede seisu, tema jalgu ning varbaid! 4. Vaatle pääsukest pesamaterjali korjamisel ja pesa ehitamisel! 5. Kuidas toidab ta oma poegi? 6. Kirjelda poegade esimest lennuproovi! 7. Kuidas



171. joon. Suitsupääsuke.

valmistavad pääsukesed end äralennuks? 8. Missuguseid pääsukeste liikisid võid nimetada?

Pääsuke viibib suurema osa päevast õhus lennul (171. joon.). Ta on eht lendur — õhuelanik. Seda tunnustavad pikad tugevad tiivad ja samuti pikk kaheharuline saba, mis temale lennul on tüürriks. Sulestik hoidub tihedalt vastu ihu ja ei vähenda nii siis lennu kiirust. Maha ehk oksale laskub pääsuke väga harva, peaaesjalikult siis, kui ta oma pesa ehitamiseks materjali korjab.

Maas liigub ta abitult ja õige kohmakalt, sest tema lühikesed nõrgad jalad ei ole kõndimiseks sugugi kohastunud. Nad on tugevate teravate küüntega varustatud. Küüntega võib pääsuke õige kindlasti seinast ja karniisidest kinni hoiduda sel puhul, kui ta pesa ehitab või poegi üle pesa serva toidab.

Pääsuke kui alaline õhuelanik korjab lennul ka oma toidu. Tema toiduks on putukad, keda ta ainult lennult püüab. Et ta ülikiiresti lendab, siis ei pääse ükski märgatud putukas tema käest, — väike võnk kõrvale — ja putukas ongi avara ammuli oleva noka vahele kadunud.

Pesa ehitab pääsuke katuseräästa alla, ehituste karniisidele ja mujale. Pesa teeb pääsuke mudast ja savist, mille ta oma liimitaolise ilaga kokku liidab. Pesad on poolkera kujulised; külje pealt viib neisse lennuauk. Seestpidi vooderdab pääsukeste paar pesa pehmete karvadega ning sulgedega.

Maikuus muneb emalind 5—6 muna, millest kahenädalase haudumise järele abitud sulgedeta pojad välja tulevad, kes vanemate usina hoole ja toitmise läbi nädala kolme pärast pesast juba välja lendavad.

Pääsukesed on üliskasulikud linnud, sest nad hävitavad lõpmata palju majapidamisele kahjulikke putukaid.

Ülesanded ja küsimused. 1. Miks lendavad pääsukesed hea ilmaga kõrgel, halva ilma eel madalal? 2. Kirjelda maa peal viibiva pääsukese liigutusi! 3. Miks pesitseb suitsupääsuke hea meelega tallides? 4. Missugune imetaja loom püüdis putukaid lennult? 5. Missugune lind omandab sagedasti vägivaldselt pääsukeste pesad?

Rändlindude minek ja tagasitulek.


Vaatlused. 1. Vaatle, mis ajal lendavad meilt pääsukesed, muusträstad, kured ja teised linnud ära! 2. Kirjelda nende ettevalmistusi äralennuks! 3. Kirjelda lindude rühmitusi äralennul! 4. Märgi üles, millal üks või teine lindude liik meile tagasi jõuab.

Sügisel, kui putukad pelgu poevad, läheb pääsukestel õige raskeks tarvilikul määral toitu saada. Nad märkavad lähenevat nälja-aega aegsasti ning hakkavad valmistuma meilt äralennuks sinna, kus soem ja putukaid jällegi külluses. Nad kogunevad suur-

tesse kahludesse. Samuti toimetavad ka paljud teised linnud, keda sügisel meie juures toidu kahanemine ja lõpuks koguni selle otsasaamine hakkab ähvardama.

Nii kogunevad kured, kuldnokad, lõokesed, käod ja paljud teised parvedesse, rändavad mõni aeg veel meie juures hulgaviisi ringi ning lendavadki viimaks minema.


Iga linnuliik lendab omapäraselt rühmitatud parves, näit. kured kolmnurgas jne. Väiksemad linnud püüavad sagedasti suuremate seltsi heita, et viimastelt kaudset kaitset leida (172. joon.).



172. joon. Linnud rändamisel: *a* — pardid; *b* — metshaned; *c* — kured; *d* — väikesed laululinnud.

Suurtes parvedes on harilikult vanemad, palju kordi rännanud linnud teejuhtideks. Parvedes liikumisel on oma head küljed. Peale ühiste teejuhtide on siin veel ühine valve, mille aegu teised valvekorrast vabad linnud muretult võivad puhata või toitu otsida. Kõik linnud ei lenda ühte kaugusesse. Paljud jäävad peatuma Lõuna-Venemaa Kaspia mere äärde, teised mujale Lõuna-Euroopasse; kuid on rohkesti ka neid, kes kaugemale üle Vahemere lendavad, nagu pääsuke. Lindusid, kes meilt talveks „soojale maale“ lendavad, kutsutakse rändlindudeks. Uutes asukohtades ei ehita need linnud pesi ega lase lahket laulu kuulda. Nad on seal ainult toidumuredega koormatud.

Linnud rändavad harilikult enam-vähem kindlaid teid mööda. Meie maalt käib kaks seesugust lindude rändamisteed läbi: üks üle Soome lahe ning ranna saari mööda Lääne-Euroopa poole, teine üle Peipsi järve lõunasse. Sügiseste tormide kätte löpeb merede kohal kohutavalt palju väikesi rändureid (173. joon.). Pikk tee väsitab neid väga ja sagedasti langevad nad väsi-



173. joon. Pääsukesed mere kohal.

löövad, tulevad meie armsad laulikud üksteise järele jälle tagasi ning asuvad pesitsemisele. Kuidas linnud oma endistele asukohtadele teed leiavad, on alles selgitamata ning tume küsimus. Kevadiste tulijate kohta ütleb rahvas maal: „Pääsuke toob päevasooja, ööbik öösooja.“ Kevadel tuleb alati vähem lindusid tagasi kui sügisel lahkus.

nult alla maha (174. joon.) ja saavad siin mitmesuguste varitsejate läbi hukka. Ka röövpüük hävitab palju linde nende talvistel puhkuskohtadel. Rändamisel lendavad linnud, pika lennu väsitavuse peale vaatamata, ülikii-
rest. Kuhu linnud talvitama jäävad, sinna koguneb neid nii palju, et seesugustest talvekorteris olijatest määratu suured lindude asundused kujunevad, nagu näit. Volga jõe suus.

Kevadel, kui meie aasad ja metsad haljendama

Kevadiste tagasituliijate seas on üks varasematest meile jõudjatest mustakuue-meese kuldnokk (176. joon.). Kevadel pesitamise ajal on ta värvirikkama kuuega kui suvel.

Usinasti liigub ta künnil põllumehe järele ja korjab tõuke ja ussikesi. Sügisel püüab ta maiustada kirsiaias valminud kirssidega. Et ta on kasulik ja meeldiv laululind, siis hoiame teda ka igal pool inimese parema kaitse all. Kevadel paigutatakse temale puude otsa ja varrastele pesituskaste. Linnades korralda-



175. joon. Peatusele jõudmas.



176. joon. Kuldnokk.


vad kooliõpilased kastide panekut suure pidulikkusega rongikäigul ja muusika saatel.

Ülesanded ja küsimused. 1. Missuguseid rändlindusid tead sa nimetada? 2. Mis põhjus sunnib lindusid meilt ära lendama? 3. Miks peame lindusid kaitsma? — Ära lõhu linnupesti! 4. Missuguseid nähtusi tead jutustada lindude rändamisest lahtisel merel? 5. Milleks kasu-

tavad linnud rändamisel merel viibivaid laevu ja majakaid? 6. Kuidas mõjuvad tormised ilmad nende rändurite peale merel? 7. Kuhu ehitab kuldnokk oma pesa? 8. Missugused peavad ülesseatavad kastid olema: kas hõõveldatud või hõõveldamata, karedad? 9. Vaatle, kust korjab kuldnokk omale toitu. 10. Vaatle, kui palju putukaid ja tõukusid kannavad kuldnokad päeva jooksul oma poegadele pesasse. Selle selgitamiseks vaatle, mitu korda nad päevä jooksul pesasse lendavad. 11. Missugust kahju ja kasu sünnitab kuldnokk viljapuu-aedadele? 12. Kumb võiks suurem olla, kas temalt saadud tulu või kahju?

Koduvarblane.

Vaatlused. 1. Vaatle varblase keha vormi, värvi, tiibade ja saba kuju, jalgade ja noka ehitust! 2. Vaatle, kunas ja kuhu ehitab varblane oma pesa. Kirjelda varblase pesa, tema mune, nende arvu ja värvi! 3. Kuidas avaldab varblane ennast toiduplatsil teiste lindude seas? 4. Kirjelda, kuis kutsub isavarblane emalindu, kuidas häälitseb ta siis, kui hädaoht tulemas, ja siis, kui nad isekeskis põõsastes tülitsevad. 5. Mida tarvitavad varblased toiduks?



177. joon. Koduvarblane.

Varblane on väheldane jõntsaka kehaga lind (177. joon.). Tema kehaehitusse ei näi ükski elutingimus pealetungivalt mõjunud olevat. Ta lendab rahuldavalt, kuid ainult lühikeste järkudena, ronib puudel ning liigub maad mööda mitte kõndides, nagu tuvi, vaid hüpetega. Suurema osa päevast on ta jalul ja sellega on seletatav tema jalgade tugevus.

Varblase toiduks on mitmesugused taimede viljad, nagu terad, marjad, aga ka paljud putukad ja nende tõugud. See-

suguse toidu pruukimiseks on tema lühike koonusekujuline nokk kõigiti kohane.

Ta sünnitab taimede vilja hävitamisega põllule ja aiale palju kahju; kuid selle kahju teeb ta peaaegu täiel määral tasa seega, et oma poegade toitmise ajal lugemata hulga tõukusid ära hävitab, kes õunapuud ning teised aiapuud oma röövtegevusega viljata jätaksid.

Kevadel valib varblastepaar omale katuse räästa alla rahulise koha pesitamiseks. Sagedasti võtavad nad omale pesad pääsukestelt või kuldnokkadelt. Emalind muneb 5—6 muna, mille haudumiseks kaks nädalat ära kulub. Hoolikal toitmisel kasvavad abitud pojad õige usinasti ja lendavad peagi pesast välja. Mõnel suvel kasvatab varblastepaar kuni neli kurna ehk pesakonda poegi.

Nagu nägime, on varblased segatoidu tarvitajad, mida nad oma tavalises elukohas inimeste elamute lähedal läbi aasta tarvilikul määral leiavad. Talveks ei sunni toidu kahanemine neid meilt mitte ära lendama; külmad päevad veedavad varblased peaaegu järjepannu oma räästa-alustes soojalt vooderdatud pesades. Lindusid, kes meil talve mööda saadavad, kutsutakse seisulindudeks.

Peale varblaste võiksime inimese elamute lähedal elutsevaist seisulindudest nimetada varest, harakät, tihast ja tuvi.

Ülesanded ja küsimused. 1. Kui sagedasti pesitavad varblased? 2. Millega vooderdavad varblased oma pesi? 3. Kas on varblased pesahoidjad või pesapõgenejad? 4. Millega peletatakse varblasi sügisel marjaaiast eemale? 5. Kuidas elutsevad varblased talvel suurte külmade ajal? 6. Miks ei lenda seisulinnud meilt talvel ära?


Sisalik.

Vaatlused. 1. Vaatle sisaliku kehavormi, suurust, selgmise ja kõhtmise poole värvi, suud, silmi ja silmatagust plekki! 2. Misugune on sisaliku suust väljasirutatud keel? 3. Kirjelda sisaliku jalgu! 4. Kuidas liigutab end sisalik? 5. Vaatle sisaliku liikumise kiirust päikesepaistelisel ja jahedal ilmal! 6. Vaatle, mida sööb sisalik. 7. Nimeta tema vaenlasi! 8. Joonista sisaliku naha pilt!

Sisalikke on hea vaadelda suvisel päikesepaistelisel päeval. Siis vilksatavad nad rohus, pütides siin putukaid. Pikkade var-

vaste ja kõverate küünte abil ronivad nad putukaid küttides kerge vaevaga kivide ja kändude vahel ja nende otsa (178. joon.). Esimese hädaohu lähenemise juhusel peidavad sisalikud end kändude ja kivide varju. Sisaliku jalad on nõrgad ja ei suuda tema keha liikumisel kanda. Ta keha lohiseb mööda maad, ja sisalik liigub vingerdades edasi — ta roomab.

Sisaliku nahk on väikeste sarvsoomustega ja kilbikestega kaetud. Soomustatud nahk on alati kuiv ja läigib päikese käes.



Naha värv tuletab kuivunud okste ja lehtede värvi meelde. Emastel on soomuste värv hallikas ja tumepruunide täppidega, isastel rohekas. Ümb-ruse karva soomusnahk võimaldab sisalikul en-nast varjata rohkearvu-liste vaenlaste eest. Peale värvi on tal veel teine kaitse-abinõu. Kui sisa-likul jooksu peal sabast kinni haarata, siis mur-dub ta saba lihaste ise-sugusel kramplikul kok-kutõmbumisel otsast ära; sisalik poeb, saba püüdja kätte jättes, ise pelgu. Äratulnud saba asemele


178. joon. Sisalikud: üleval isane, all emane.

kasvab peagi uus, kuid vähem kui endine. Säherdune enese vigastamine on tähtis enesekaitse-võtte loomade juures.

Sisaliku toit on mitmesugused putukad ja nende tõugud kui ka vihmaussid ämblikud jne. Saaki haarab ta suuga ja hoiab kinni hammastega. Hambad on tal väikesed ja kasvavad ainult lõualuude peal, aga mitte juurtpidi nende sees, nagu varemini imetajate juures nägime; ka suulaes on, nagu lõualuu-delgi, kisu laadi hambad.

Sisalik hingab kopsudega, kuid hingamine on väga aeglane, aeglasem kui imetajail loomadel ja lindudel. Selle tagajärjel on ka vere varustamine hapnikuga puudulik. Samuti on vere-ring-

vool aeglane, ja südamekambrite puuduliku vaheseina tõttu segub tuiksoone hapnikurikas veri tõmbsoone rikutud verega ja läheb seesugusel poolpuhtal kujul üle keha laiali. Keha koed saavad selle juures piiratud hulgal hapnikku ja selle tagajärjel tekib kehas ka vähe soojust. Vähese sisemise soojuse juurde-tuleku ja katmata, palja naha pärast on sisaliku kehasoojus vahelduv ja muutub ühes välise ilma soojuse teisenemisega: soojal päeval on sisalik liikuv ja vilgas, kuna ta sügisel uniseks jääb ja talveks koguni talveunele suigub. Ka toitu ei ole sisalikul talvel kuskilt saada. Talve saadab ta puujuurte all augus mööda ja ärkab kevadel alles siis, kui päike tardunud maa ära sulatab. Ajutine une-aeg võimaldab loomakesele halvad, toiduvaesed külmad ajajärgud üle elada. Sel puhul kahaneb elutegevus, nagu nahkhiire juures nägime, viimase võimaluseni; elu alalhoidvateks aeglasteks avaldusteks, kuluvad ained ammutab ta oma keha rasvataagavaradelt.



179. joon. Vaskuss

Sisalikku ja teisi loomi, kelle kehatemperatuur välise temperatuuriga käsikäes muutub, nimetatakse külmaverelisteks.

Sisaliku meeltest on nägemine ja kuulmine hästi arenenud. Sisaliku silmad on samasuguse ehitusega kui lindudegi omad. Kõrvad on silmade taga. Nahatunde organiks on keel, mida ta ette välja sirutab.

Juunikuus muneb emasisalik liiva peale 5—10 nahkset muna ja jätab nende soendamise — väljahaudumise — päikese hoolteks. Munast väljatulnud sisalikupojad algavad kohe iseseisvat elu.


Meil elab veel vasekarva jalutu sisalik, keda rahvas ussiks peab, teda vaskussiks nimetades, kuid ka tema on sisalik ja nagu vast-vaadeldugi, ilma mürgita (179. joon.).

Ülesanded ja küsimused. 1. Vaata tähelepanelikult sisaliku silma ehitust ja katsu silma joonistada! 2. Vaatle kõrva välimust! 3. Kirjelda

sisaliku elukohti lähemalt! Pane kevadel tähele, millal tulevad sisalikud talvekorterist välja. Millal poevad nad sügisel peitu? 4. Kirjelda juhtumisi nähtud vaskussi! Mille poolest läheb ta harilikust sisalikust lahku? 5. Võrdle sisaliku ja kana muna! 6. Miks jätab sisalik oma munad päikesele haududa? 7. Kirjelda, kuidas ajavad sisalikud nahka. 8. On sisaliku nahk kuiv või niiske?

Rohukonn.

Vaatlused. 1. Jõua otsusele konna elukohtade üle ja iseloomusta neid! 2. Vaatle konna värvi, keha vormi, tema nahka, silmi, kõrvu, jalgade ehitust! 3. Võrdle konna keha värvi



180. joon. Rohukonn. W — ema-, M — isaloom.

ümbruse värviga! 4. Missugune on konna naha pind? 5. Vaatle ja kuula häälitsevat konna! 6. Jää pikemaks ajaks tiigi äärde peatuma ja vaatle, kuidas konna oma ümbrust silmitseb. Mida tarvitab ta toiduks? 7. Kuidas püüab ta kärbsed ja teisi lendavaid putukaid? 8. Too kevadel konna kudu suure klaaskausiga

koju! Pane kauss servani vett täis, istuta temasse ka veetaimi! Vaatle, missugused muutused sünnivad toasoojuses konna munadega. Joonista ja kirjelda neid nähtusi! Toida noori munadest ilmunud poegi keedetud munakollase puruga! 9. Miks poevad konnad talveks peitu ja suiguvad unele?

Rohukonn elab niiskeis kohtades, nagu soos, tiikide ja jõgede lähedal. Tema keha on lühike ja lai, kolmenurgeline pea suur ja lame. Saba puudub (180. joon.). Keha katab limane nahk, milles palju limaeritajaid näärmeid. Naha värv tuletab väga elavalt meelde kõdunevate mineva-aastaste lehtede karva ja pakub konnale seega head kaitset rohkearvuliste vaenlaste, nagu: siilide, madude ja lindude vastu (kaitsevärv).

Konn liigub maa peal hüpates oma tagumiste tugevate jäsemete varal. Tagumiste jälgade viis pikka varvast on ujumisestaga ühendatud: tagumised lestjalad on kohased ka vees ujumiseks. Konn ujub nendega, sõudes õige kiiresti. Eesmised jalad on lühemad ja nende neli varvast ilma vahenahkadeta.

Konna toit on mitmesugused putukad, keda ta oma limase harulise keelega püüab (181. joon.). Konnal on keele eesmine ots suu põhja külge kasvanud; putukat püüdes viskab ta keele kurgupoolse otsa püütava looma järele. Suulaes on väikesed kisu- lised hambad, millega ta rabelevat putukat kinni hoiab.


Täiskasvanud konn hingab kopsudega. Kopsudel on kahe kõrvuti asetatud põie kaju. Kopsud avanevad otsekohe kurku. Kui konn hingab, siis tõuseb ja vajub tema lõua-alune; lõua- aluse naha liikumise abil tõmbab konn läbi nina õhku kopsu ja sealt jälle välja. Peale kopsu on konnal ka nahk tähtsaks hingamisorganiks. Limases nahas on palju peenikesi veresoone; õhukese limase naha kaudu sünnib, nagu kopsuski, verest tuleva süsihappu gaasi ja õhust saadava hapniku vahetus. Kui konna nahk ära kuivab, siis sureb konn (läbi kuiva naha ei toimu



181. joon. Konna keel kärbest püüdes.

hingamine ja siis aurab ka palju niiskust konna kehast välja). Kopsudega võib ainult lahtisest õhust hingamiseks hapnikku tarvilikul määral saada.

Konna südamel on kaks eeskoda ja üks kamber. Paremasse eeskotta voolab kehast tõmbsoone veri. Pahemasse — tuiksoone veri kopsust ja naha alt. Et südame eeskojad korda-



182. joon. Konna moondumine.

tõttu muutub konna keha soojus käsikäes välise õhu temperatuuriga.

Talve saadab konn allikates, kraavides ja jõgedes talveunes mööda. Aeglane hingamine sünnib siin ainult naha kaudu. Kui ta väga madalasse vette talvitama on jäänud ja siin kangeks külmunud, tõuseb ta siiski jää pikaldase ärasulamise kannul uuesti elusse.

Nägemine ja kuulmine on konnal arenenud. Kõrvade kuulmenahk asub rattakesena silmade taga.

misi kokku tõmbuvad, tuleb südamekambrisse esmalt tõmbsoone veri ja see tõugatakse siit hingamisorganeisse. Selle järele tuleb südamekambrisse tuiksoone veri ja see surutakse siit üle keha laiali. Kuid selle peale vaatamata segub südamekambris tõmbsoone ja tuiksoone veri, ja kehasse läheb laiali segane veri. Kirjeldatud vere-ringvoolu korralduse tagajärjel, aeglase hingamise ja katmata õhukese naha välise õhu tempe-

Konn paljuneb munakestega — marjaga, mida emaloom maikuu alguses vette heidab (182. joon.). Limaga ümbritsetud marjade kogu nimetatakse konnakuduks. Mõne aja pärast tulevad päikese soendamise mõjul kudust noored loomad välja, mis täiskasvanutest igapidi lahku lähevad. Neil puuduvad jalad; nad hingavad alguses väliste lõpustega ja pärastpoole, kui välised lõpused ära kaovad, sisemistega (lõpused on vees hingamise organ) ja on varustatud sabaga (kelle laadi on konna noored pojad?). Neid kutsutakse kullesteks. Peagi ilmuvad neile tagumised, siis eesmised jalad. Ka saba imbub aegapidi keha sisse. Lõpused kaovad ära ja loomakesed hakkavad kopsudega hingama. Nüüd tulevad nad veest välja ja lähevad põldudele laiali.

Siin nägime, et noored, munast väljatulnud loomad sugugi vanade sarnased ei olnud. Alles pika muutumise ja ümberkujunemise järele omandavad nad vanade kuju ja sarnasuse. See-suguseid vanematest lahkuminevaid poegi nimetame vastseteks ja nende saamist vanemate sarnasteks — moondu-miseks.

Nagu nägime, elab konn maismaal kui ka vees. Sellekohaselt on tema organidki kujunenud. Konna nimetatakse tema eluviisi pärast kahepaikseks.

Ülesanded ja küsimused. 1. Kuhu läheb konn talveks külma eest pelgu? Missuguses seisukorras on ta talvekorteris? Mille kaudu hingab konn talvel vees? 2. Miks poevad konnad kuival ajal pelgu? 3. Millal koevad konnad? 4. Joonista munakesest arenevaid konnapoegi mitmesuguses vanaduses ja sea joonised arenemisjärjekorda! 5. Valmista konna luukere ning leia temast inimese kehas tundmaõpitud luud! 6. Mille tõttu on konnal võimalik vees ja kuival maal elutseda?

Sitasitikas.

Vaatlused. 1. Vaatle, kunas tulevad kevadel sitasitikad nähtavale. 2. Kirjelda nende välimust! 3. Vaatle tähelepanelikult nende tiibu ja jalgu! Mil viisil võib sitasitikas edasi liikuda? 4. Kirjelda sitasitika sagedamat leiukohta! Mis eesmärgiga viibib ta seal? 5. Võta sitasitikas pihku ja pane tähele, kui suure jõuga ta sealt välja tungib. Milleks on suur pugemisjõud talle

kasulik? 6. Vaatle, kas on sitasitikal sisemist luukere. 7. Vaatle neid väikesi loomakesi, kes tema tagakehal elutsevad!

Sitasitikaid leidub meil suvel väga sagedasti; iseäranis armastavad nad teedel loomade roojahunnikute lähedal liikuda. Nad toidavad end loomade väljaheidetega.

Sitasitika kehas puudub sisemine luukere, mis kõigil varemini vaadeldud loomadel oli keha toeks (183. joon.). Selle eest katab tema keha kõva, isesugusest ainest, kitiinist, koorik. Koorik on sitasitikate väliseks „luukereks“, mis sisemisi elundeid katab ja lihastele on kinnituskohaks. Sitasitika keha jaguneb väliselt kolmeks nähtavaks osaks: peaks, rinnaks ja tagakehaks. Viimased kaks jagunevad omakorda üksikuteks vähemateks rõngasteks. Loomi, kelle keha koorik samasugusteks aladeks jaguneb kui sitasitikalgi, kutsutakse putukateks.



183. joon. Sitasitikas.

Kahel pool sitasitika väikest pead on suured silmad ja nende ees on üks paar lühikesi tundesarvi, mille kaudu ta kompimistundeid saab. Pea allpoolses osas on suu. Suud piiravad ülemine ja alumine huul ja kaks paari lõugu, mis vastamisi hõõrdudes toitu peeneks purevad.

Iga rinnalüli külge kinnitub lüliliste jalgade paar. Iseäranis tugevad on eesmised jalad, millega sitasitikas maad ja roojahunnikuid kaevab. Viimaste rinnalülide külge kinnituvad kaks paari tiibu. Ülemised tiivad on kõvad kitiinkoorikud ja katavad alumisi, õhukesti tiibu, millega putukas lendab. Tiivad liiguvad lennu ajal väga kiiresti ja sünnitavad kõigile tuntud komedat sitasitika põrisemist. Tagakeha on sitasitikal maasroomamisel tiibade all ja ei paista välja. Ta koostub üksikutest rõngastest, mis sabapoolses otsas järk-järgult ahtamaks lähevad. Sitasitika keha värv on sinakasmust.

Sitasitika hingamine sünnib isesuguste torukeste (traheede) kaudu, mis kõigisse keha osadesse ulatuvad. Need torukesed avanevad putuka tagakeha külgedel. Sinna torukestesse tungib õhk ja nende läbi sünnib vere puhastumine — hingamine. Selgesti võib näha, kuidas maasroomava sitika tagakeha paisub ja kokku tõmbub, mille tõttu sünnib torukeste õhuvahetus. Sitasitika veri on värvita ja ei ole mitte, nagu varemini tundmaõpi-

tud loomad, kindlasse veresoonestikku koondatud, vaid täidab kõik putuka kehaosade vahekohad.

Sitasitika ergukava koostub üksikutest ergusõlmedest, mis isekeskis ühenduses.


Silmad näivad lähemal vaatlemisel väikesteks ruudukesteks jaotatud olevat. Need ruudukesed ei ole muud kui üksikud pisi-kesed silmakesed, millest sitika suur silm kokku pandud. Nii on siis sitikal kokkupandud silmad (184. joon.).

Teiseks tähtsaks meeleriistaks on sitasitikal tundesarved. Nendega saab sitikas kompi- mis- ja haistmistundeid ja kogu ni kuulebki nendega.

Kesksuvel puurivad sitasitikad roojahunnikute alla oma eesmistele jalgadega sügavad augud, kuhu emaloom oma munad muneb. Munadest tulevad vastsed — tõugud välja, kes sugugi sitasitika sarnased ei ole. Tõugud toidavad end sellest loomaroojast, mis emane sitasitikas pealt maa juba munemise ajal auku munade juurde töö. Tõugud elavad mõni aeg maa sees roojahunniku all ja muutuvad viimaks n. n. tupeks. Väliselt näib tupp täiesti surnud olevat, kuid tema sees kujuneb viimaks täiskasvanud sitasitikas, kes tupe purustab ja maa peale välja roo- mab. Seesugust putuka arenemist esiti tõuguks, seepeale tupeks ja alles siis täiskasvanud putukaks kutsume moon- dumiseks.

Sagedasti võib sitasitika tagakehalt väikesi valgeid looma- keski leida, keda tema poegadeks peetakse. Need on aga väike- sed ämblikukesed, kes siin söödikutena elavad ja sitasitikat kurnavad.

Ülesanded ja küsimused. 1. Vaata iseseisvalt kõiki üksikuid sitasitika keha osasid ja tee kindlaks igas osas leiduvate rõngaste ehk lülide arv! 2. Kaeva roojahunniku alt mõned sitasitika tõugud ja




184. joon. Mesilase (lese) pea eest- poolt. On näha kokkupandud silmade ruudukesed. Eespool kokkupandud silmi — kolm lihtsilma, nendest allpool tundesarved. (Suurendatud.)

tuped välja! Pane tuped sooja kaetud nõusse ja vaata, kes neist pika-peale välja tulevad. 3. Vaata suurekstegeva klaasiga sitasitika silma! 4. Kas sitasitikad on kasulikud loomad?

Kapsaliblikas.

Vaatlused. 1. Vaata, mis teevad valged liblikad kapsa lehtedel; kirjelda nende kehaehitust igakülgselt ja võrdle sitasitika ehitusega! 2. Vaatle neid lennul; kuidas hoiavad nad tiibu lehel istudes? 3. Vaatle kapsaliblika nokka õiel tarvitamisel ja rahulises olekus! 4. Vaatle suvel kapsalehtede aluskülgi! Murra üks liblika

munadega kaetud leht ja pane otsapidi klaas-purki vette! Vaatle soojas ruumis mõni aeg mune lehel! Kes tulevad neist välja? 5. Vaatle, kuidas söövad tõugud kapsa lehti. 6. Vaatle lindusid, kes käivad kapsaid tõukudest puhastamas.




185. joon. Kapsaliblikas. 1 — isaliblikas; 2 — emaliblikas; 3 — noored ja täiskasvanud tõuk; 4 — tupp.


Kapsaliblikas on meil sagedamini leiduv liblikas — suurem kapsa-aia vaenlane (185. joon.). Tema keha jaguneb, nagu sitasitikalgi, peaks, rinnaks ja tagakehaks, millest pea ja rind liikumata teineteise külge on kasvanud. Pealpool on tal kaks pikka nuiasarnast tundesarve, mis temale on haistmis- ja kompimisriistadeks, ja allpool vedruna kokkukeritud nokk. Laseb

liblikas õiele maha, siis ajab ta noka siin sirgeks ja imeb sellega õiepõhjust mett, millega ta ennast toidabki. Nokk on kohane ainult vedela toidu vastuvõtmiseks. Kahel pool pead on samasugused kokkupandud silmad nagu sitasitikalgi.

Rinna külge kinnituvad kaks paari tiibu. Tiivad on pealt valged, ainult eesmistest tiibade otstel on suured mustad lapid. Lennul paistab liblikas hästi silma, aga niipea kui ta maha laskub ja rahulikult paigal asub, pole teda suurt märgatagi. Paigal asumise puhul on tema tiivad üleval selja peal koos ja tiibade võidunudroheliste alumiste külgedega on ta väga rohu värvi.



186. joon. Liblika tiiva soomused. 1 — osa soomustega kaetud liblikatiiba, nõrgalt suurendatud; 2 — üksik soomus, tugevasti suurendatud.



187. joon. 1 — muneja liblikas 2 — munad (suurendatud).

Puudutame näppudega liblika tiibu, siis jäävad sinna näppude jäljed ja näppudele tolmukord. Tiibu mikroskoobiga vaadeldes leiame, et tolm, mis tiibadelt meie näppudele jäi, on väikesed soomusekesed, mis katusekivide taoliselt tiibu katavad (186. joon.).

Kesksuvel muneb emaliblikas oma kuldkollased väikesed munakesed kapsalehtede alumisele poolele, neid siia väheldaste rühmadena kinnitades (187. joon.). Kapsalehe varjus on niihästi muneja liblikas kui ka munakesed oma rohkearvuliste vaenlaste eest peidetud. Kõige hiljemini kahe nädala pärast tulevad munadest noored loomakesed välja, kes jällegi, nagu sitasitikalgi, sugugi vanade loomade sarnased ei ole. Neid nimetatakse ka

siin t õ u k u d e k s , sagedasti aga r ö ö v i k u t e k s . Väikesed tõugud on tüki aega veel üksteise lähedal ja alles mitmekordse nahaajamise ehk kestamise järele sirguvad nad tugevasti suuremaks ja lähevad üle kapsapea laiali. Nad on apjad söödikud ja hävitavad tihti lühikese aja jooksul terve kapsapea ära. Peast jäävad järele ainult lehtede „raad“. Kapsaliblika tõugud on rohelist värvi, mis neid rohelistelt lehtedelt ei eralda. Nende suu on kohane närimiseks. Peale kolme paari pärisjalgade on neil veel 5 paari ebajalgu keha tagumistel rõngastel. Nende varal võib tõugu pikk keha libedatel lehtedel kindlasti seista.

Täisealine tõuk rändab kapsaste lähedale aiale või puutüvedele ja kinnitab end ilast tekkiva kiukese abil nende asjade külge. Tõugu nahk pakatab nüüd kukla pealt, tõuk ajab viimast korda nahka ja moonduv kollakasrohelisteks mustade täppidega t u p e k s . Tupp jääb siia kuni järgmise kevadeni liikumata rippuma. Olgugi et ta välimisi elumärke ei avalda, siiski sünnivad temas tähtsad muutused: tõugu organitest kujunevad täiskasvanud liblika elundid. Kui sügisel varased külmad tulid või talv väga külm oli, siis on järgmisel kevadel vähe kapsaliblikaid. Kevadised liblikad munevad peagi ja neist munadest tuleb juba juulikuus uus liblikate põlv, mis sagedasti väga arvurikas. Kapsaliblika eluiga on väga lühike — nädalat kaks. Ta sureb harilikult peagi peale munemist.

Liblikaid on väga palju liikisid. Nende kehaehituse järele peame ka neid putukateks.

Ülesanded ja küsimused. 1. Võrdle liblikat sitasitikaga! 2. Miks paneb liblikas oma munad lehtede alumisele poolele? 3. Võrdle liblikat tema tõuguga! 4. Missuguse moonumise teeb kapsaliblikas oma elu algusest lõpuni läbi? 5. Missugust kahju teevad kapsaliblika tõugud? 6. Joonista tõukudest puretud lehe pilt! Kuidas võitlevad inimesed nende kahjulikkude söödikute vastu? 7. Katsu leida kapsaliblikate tuppiesid; pane nad purki ja vaatle, mis neist välja tuleb.

Mesilane.

Vaatlused. 1. Vaatle surnud mesilastel noka, tiibade ja tagumise jala jämedama liikme ehitust! 2. Pane tähele, missuguste taimede õitel armastab mesilane viibida. 3. Kuidas kinnitab ta

ennast õiele ja kuidas ammutab ta siit mett? 4. Vaatle, kuidas mesilane õietolmu oma tagumiste jalgade „korvikesse“ paneb; mis värvi on tema „püksid“, kui ta reseeda-õitelt mesipuuusse lendab? Maitse mesilaselt saadud „mesileiba“! Miks langevad mesilased lennult sagedasti maha? 5. Vaatle mesilasi tarus



188. joon. Mesilased. 1 — tööline; 2 — ema; 3 — lesk.

kärgedel! Joonista kärgede üldine pilt! 6. Kirjelda mesilaste pereheitmise nähtusi!


Õierikkalt pärnade puisteelt kostab palaval suvepäeval juba kaugele isesugune mahe sumin. Selle kaugeleekostva sumina sünnitajad on mesilaste hulgas, kes siin mett ja õietolmu kogudes õielt õiele lendavad. Tähelepanelikult mõnda siin lendlevat mesilast vaadeldes näeme, kuidas ta karvane keha on peene õietolmuga kaetud. Aeg-ajalt kõrjab mesilane endalt selle tolmu kokku ja paneb saadud tolmuterakese jalaga osavasti vastasjala lohku „korvikesse“. Õitest imeb ta mett pika nokaga, mis seejuures nagu pump töötab. Mesilase nokk ei ole aga kuigi pikk ja ulatub mee juurde ainult nendes õites, millel võrdlemisi madal õiekroon (188. joon.). Olgu küll, et punase ristikkeina õites on palju mett, ei saa mesilased teda sealt ometi kätte, sest õiekrooni toru on pikem kui mesilase nokk; ainult valge ristikkeina väikestest õitest saavad nad rikkalikku saaki.



189. joon. Mesilase nõel. 1 ja 2 — nõel; 3 — mürginääre; 4 — mürgipõis.

Juhtute aga õiel mesilast tema töös segama, siis püüab ta nõelata. Ta nõelab tagakeha otsas asuva nõelaga, mis rahulises olekus tagasi on tõmmatud ja kehas varjul. Nõel on ühenduses

mürginäärmeega. Peale nõelamist püüab mesilane oma nõela välja tõmmata, kuid enamatel juhustel jääb see ihu sisse, sest et ta otsal tagasipööratud kisud asuvad (189. joon.). Nõela kaotamine toob loomakesele surma. Oma väikeste vaenlaste, teiste putukate vastu võideldes on see nõel kohutav võitlusriist. Rabadast putuka kehast tuleb nõel ilma vigastamata välja.



190. joon. Mesilaste kärg. 1 — kaanetatud emakann; 2 — kann, kust ema juba välja tulnud; 3 — tööliste tõugud mitmesugusel arenemisastmel; 4 — kaanetatud tuppdekann; 5 — kaanetatud meekannud; 6 — õietolmuga kannud; 7 — leskede kannud.

Neid mesilasi, kes väljas mett korjamas käivad, tuntakse tööliste nime all. Mesilased on ühiskondlikud loomad: nad elavad suurtes ühingutes, sagedasti kuni 50 tuhat mesilast koos. Metsmesilased ehk kumalased elavad õnnsates puudes ja mujal varjatud lõhedes. Kodumesilased on mesipuudes, tarudes. Peale tööliste, kes mesilastepere (s ü l e m e) liikmete suurema hulga sünnitavad, on seal veel väikesearvuline leskede ehk isaste kogu ja üks ema. Lesed on töölistest suuremad ja ilma nõelata. Ema on kõige suurem mesilane

peres. Isased tööd osa ei võta ja söövad valmis mett. Sügisel surmatakse nad ära.

Üldistes joontes on mesilase keha samuti jaotatud, nagu sitasitikal ja liblikalgi. Mesilased on putukad.


Asudes uude tarusse hakkavad töölised seda puhastama ja pragusid, kust tuul sisse võib tungida, kinni kleepima. Kui taru sisemus korda seatud, siis asutakse kärgede valmistamisele (190. joon.). Kärjed valmistatakse vahast, mis tarvidust mööda tagakeha alumise poole lülide vahelt eritumissaadusena õhukeste kildudena ära tuleb. Kärjed on kuuekandilised karbikesed ja ühesuurused. Kärjetahvlid ripuvad mesipuu laes loodsihis.

Ühe osa kargi täidavad mesilased meega, mida nad õitest toovad ja oma pugus teataval viisil ümber töötavad. Täidetud kärjed kaanetatakse vahaga pealt kinni. Teistesse kärgedesse pannakse õietolmu ja ülejäänutesse muneb ema munad.

Munadest sündivad valgeid abituid ning pimedaid tõukusid toidavad jällegi töölised. Nad panevad neile suhu toitu oma suust. Tõuke toidetakse mee ja õietolmuga. Tõugud kasvavad head toitu saades jõudsasti.

Täiskasvanud tõuk müüritakse jällegi vahakarpi, kusta, nagu liblikagi tõuk, tuppe heidab. Tupest tuleb noor mesilane välja. Mõnda suuremas kärjekannus olevat tõuku toidetakse iseäranis rikkalikult. Sellest areneb uus ema.

Kui mesipuu noor ema ilmub, siis püüab vana teda ära surmata, kuid töölised takistavad teda selles. Siis läheb vana ema oma poolehoidjatega puust välja omale uut eluaset otsima. Seda nähtust nimetatakse mesilaste pereheitmiseks. Pereheitmise ajal jäävad tööd harilikult seisma ja mesipuu kuulub rahutu, erutatud sumin, senikui üks pere välja lendab. Ema laskub hari-



191. joon. Mesilasepere.


likult kuhugi läheda puu oksa külge ja tema juurde kinnituvad vanast mesipuust väljalennanud mesilased. Mesinik hoolitseb selle eest, et see pere peagi uude mesipuisse paigutataks. Heal suvel heidab tugev mesipuu paar peret (191. joon.).

Talveks matavad mesilased taru augud korralikult kinni, et külm sisse ei pääseks. End tugevasti meega toites ja üks-teise ligidale surudes hoiavad nad mesipuu sisemise soojuse 10°C . ümber. Aeg-ajalt vahetavad nad oma kohta: välised poevad sügavamale teiste sekka, kuna sisemised külmetanud seltsiliste asemele asuvad. Kuid siiski on meie talved sedavõrt külmad, et mesipuid talveks ikkagi varju alla peab toimetama.

Ülesanded ja küsimused. 1. Kirjelda mesilase nõela tegevuses ja nõelamise tagajärgi! 2. Kirjelda mitmesuguste nähtud tarude ehitust! 3. Kuidas saadakse pakk-puudest mett kätte? 4. Kuidas kaitseb mesinik ennast nõelamise eest? 5. Võrdle mesilasi sitasitikuga ja liblikaga!

Toakärbes.

Vaatlused. 1. Vaatle toakärbe ehitust üldse ja eriti tema nokka ja jalgu; vaata suurekstegeva klaasiga jala „käpa“ ehitust! 2. Pane tähele, kuidas liigub kärbes seintel ja lael! 3. Lähenda




192. joon. Kärbes. *a* — munad; *b* — tõuk; *c* — tupp; *d* — nokk (tugevasti suurendatud).

kärbele selja tagant ettevaatlikult näppu; kas märkab ta seda? 4. Vaatle kärbest lennul ja kuulata, missugust häält ta teeb. 5. Vaatle, kuidas kärbes ennast puhastab. 6. Jäta värsket liha tükike päikese-
paistele kärbeste kätte! Vaatle, mida asetavad kärbsed lihale.

Mis tuleb neist kollakasvalgetest munadest 24 tunni jooksul välja? Pane need loomakesed ühes lihatükiga niiskesse pimedasse paika! Mis kujuneb neist ühe kuu jooksul?

Toakärbse keha on tuhkjashall ja vähe karvane (192. joon.). Ümmargune pea võib pöörduda kahele poole. Kummalgi pea küljel on hiiglasuured võrksilmad, millega ta igale poole vabalt võib näha. Suu on tal kujunenud pikaks imemisnokaks, mida ta toiduvõtmisel välja sirutab ja pärast toitumist jälle tagasi tõmbab. Kõva toitu niisutab kärbes ilaga; kui see toit tema ilas lahustub, siis imeb ta seda nagu vedelat. Keskrinnale kinnituvad kaks suurt võrktiiba; nende all on rinna tagaserval kaks lühikest soonekest, mis lendamisel iseloomulikku suminat sünnitavad. Kärbse käpp, s. o. jala viimane lüli, lõpeb kahe terava küünekesega (193. joon.), mida ta ronimisel tarvitab. Peale selle on käpa otsa all kleepivad mõhnad, mis temale võimaldavad vabalt joosta mööda siledat ristloodis pinda, näiteks aknaruudul. Kärbsed ronivad ja lendavad tolmustel asjadel; selle juures saab nende karvane keha tolmuseks. Oma tolmunud liikmeid puhastab kärbes jalgadega nagu harjaga: kasimise lõpul puhastab ta üht jalga teisega.



193. joon. Toakärbse käpa ots. K — küüneke; A — mõhnad.

Vara kevadel muneb emakärbes 60—70 valget muna, kas lihale või sõnnikule, või mõnele muule mädanevale asjale. Hea haistmise varal leiab ta need asjad kergesti üles. 24 tunni jooksul kujunevad munadest jalutud tõugud, kes tõtse peale sündimist toitainet sisse tungivad. Teraval keha otsal on kaks pruunikasmusta konksu, millega nad sõnnikut söövad ja selles edasi poevad.

Tõukudest kujuneb neljateistkümne päeva pärast tupp ja sellest sama pika aja jooksul noor kärbes. Kärbsed munevad suve jooksul mitmel korral. Nad on sedavõrt viljakad, et ühest ületalve elanud kärbsepaarist suve jooksul tervelt kaks pangetäit kärbseid võib kasvada. Sügisel sureb suurem osa kärbseid isesuguse seenhaiguse kätte. Nende tagakeha pundub suureks ja katkipigistamisel tuleb sellest piimataolist putru välja. Surnud kärbsed jäävad jalgupidi siia ja sinna rippuma. Peaaegu kõik

kärbsed hävivad sügisel. Ainult üksikud terveksjäänud poevad tuule eest kaitstud kohtadesse pelgu ja elavad suikudes ületalve. Kevadel ärkavad nad jälle elusse. Kui tahetakse kärbestest lahti saada, siis tuleb nende hävitamisega juba kevadel varakult algust teha.

Suurimaiks kärbeste vaenlasiks on linnud, sisalikud, konnad ja ämblikud, kes neid oma võrkudega püüavad. Kärbes on üks kahjulikumaist putukaist. Sellega, et kärbes väga mitmesuguste asjadega, eriti roojaga kokku puutub, võib ta oma jalgadega mitmesuguste haiguste idusid inimese toidule edasi kanda. Toiduga ühes tungivad haiguseidud inimese kehasse. Sellega on siis arusaadav, miks nõutakse kauplustelt toitude hoolsat katmist. Pealegi roojastab kärbes katmata toitused ja asju oma sagedate väljaheidetega.

Kärbeste hävitamiseks tarvitatakse mitmesuguseid mürgitatud pabereid, mida vees üles leotatakse, kleepivaid linte ja kärbseklaasi.

Sügisel ilmub isesugune kärbseliik, kellel on väga terav nokk, millega ta naha vabalt võib läbi puurida. Toakärbsel on aga nüri nokk, millega ta asju ainult saab ilatseda.

Ülesanded ja küsimused. 1. Selgita, miks on loomalautade juures palju kärbsed. 2. Kuidas hävitatakse elumajas kärbsed ja kuidas kaitsakse suvel nende eest asju? 3. Võrdle kärbse, sitasitika ja mesilase tõuku! 4. Katsu leida kärbsed nende talvekorterist! 5. Võrdle toakärbest nõelaja kärbsega!


Ristiga ämblik.

Vaatlused. 1. Vaatle ämbliku keha ehitust ja iseärasusi ja joonista ta seljapoleelt! 2. Vaatle eriti tema suu ja jalgade ehitust! 3. Mõõda tema võrgu laius ning pikkus ja üksikute niitide vahe! Joonista võrgu täppis pilt! 4. Pane tähele, kas mõned niidid ämblikuvõrgul ei ole kleepivad. 5. Vaatle, missuguseid elusaid loomakesi leiad võrku sattunud olevat; missuguste riismeid leiad võrgult? 6. Katkesta natuke ämblikuvõrku ja vaata, kuidas see ämblikusse mõjub ja mida ta ette võtab. 7. Vaatle, missuguseid avaldusi märkad võrgul oleval ämblikul, kui lased kärbest võrgu lähedal oma käes piriseda.

Ristiga ämbliku kollakaspruunil tagakehal on ristina suured valged lapid. Võrreldes ämblikku putukatega näeme siin tundu-
vaid lahkumineku-jooni. Keha jaguneb tal ainult kaheks osaks;
eesmist, millel on neli paari lülijalgu, silmad ja suu, kutsu-
takse paarinnaks, tagumist ümmarikku paunas osa tagake-
haks, nagu putukatelgi (194. joon.).

Pearinna eesmisel serval on neli paari silmi, mida suureks-
tegeva klaasiga kergesti võime näha.

Ämblik toidab ennast putukatega, keda ta ülemiste lõuga-
dega surmab. Neil lõugadel on terav liikuv konksküüs. Rahu-



194. joon. Ristiga ämblik.




195. joon. Ämbliku jala ots.
1 — kammisarnased küüne-
kesed; 2 — kõver küüneke.

lises olekus on see konksküüs vastu lõuga tõmmatud, nagu
kokkupandud liigesnoa tera peasse. Kui ämblik aga saagi
kallale tormab, siis surub ta need teravad konksküüned suure
jõuga püütavasse looma. Tema saak on sagedamini kärbsed ja
sääsed. Konksküüne otsas on väike avaus, millest surumisel tilk
mürki välja tuleb ja haava läheb. Mürk tekib paarinnas olevas
kaunis suures mürginäarmes. Teiste suu osadega imeb ämblik
surmatud putukast vere ja pehme lihastiku välja.

Ämbliku jalad on nii ehitatud, et ta vabalt, ilma takista-
mata oma võrku mööda võib joosta (195. joon.). Viimase jala-
paari küüned võtavad osa ka võrgu kudumisest.

Kõige huvitavamad ämbliku elundid on võrgunõre näärmed. Nende näärmete nõre tuleb veniva vedelikuna ämbliku tagakeha alumises osas isesugustest torukestest välja. Selle veniva vedeliku sadadest peenikestest niidikestest sünnibki tardumisel ämbliku võrk, mille ehituses kindel reeglipärasus avaldub. Võrgu põhiraami peale tõmbab ämblik spiraalselt asetatud kleepivate tilkadega kaetud võrguniidi. See viimane ongi putukate püüdmiseks määratud. Võrguniidile sattunud putukas mässub, püüdes rabeldes



196. joon. Ristiga ämblik võrku kudumas. *R* — raam; *H* — ajutine spiraalniit; *F* — püügivõrk; *Sf* — signaalniit.

vabaneda, ikka kindlamini võrku. Kui kleepivad tilgad spiraalsel niidil ära kuivavad, siis tõmbab ämblik põhivõrgule uue spiraalina asetatud niidi. Ristiga ämbliku võrke võib suvel pöösaste vahelt ja teede äärest okstelt õige sagedasti leida (196. joon.).

Saaki varitseb ristiga ämblik kas oma võrgu keskel või kuskil varjatud kohas. Iga vähematki võrgu liikumist paneb ta tähele ja ruttab vaatama. Kui võrgus on väike putukas, siis

mässib ämblik ta ettevaatlikult kindlamini võrku ja läheneb alles siis talle, surmab ta ja hakkab teda tühjaks imema. On aga mõni suur, ämblikule üle jõu käiv putukas, nagu maamesilane, võrku juhtunud, siis katsub ämblik igapidi kaasa aidata, et see rutemini minema saaks ja võrk rikkumata jääks.

Ämblik hingab, nagu putukadki, hingamistorukestega; kuid peale torukeste on tal veel kaks hingamiskotikest, mis pearinna all avanevad.

Isaämblik on palju vähem emaämblikust. Viimane muneb hilja sügisel hulga väikesi munakesi ja katab nad pealt tiheda võrguga kinni, mis neid niiskuse ja mitmesuguste vaenlaste silma eest varjavad. Vara kevadel tulevad munadest väikesed ämblikukesed välja, kes igapidi vanade sarnased.

Mõned ämblikud kannavad oma poegi seljas.


Ülesanded ja küsimused. 1. Vaata, missuguste asjade külge kinnitub ristiga ämbliku võrk. 2. Katsu selgusele jõuda, kus elavad hari-likult ristiga ämblikud. 3. Katsu vaadelda ämbliku talitusi võrku sattunud loomakese ümber! 4. Kuidas laseb ämblik ennast ülevalt alla? 5. Võta sügisel ämbliku pesa, pane ta klaaspurki ja vaata, missugused pojad munadest välja tulevad; võrdle neid vanematega! 6. Miks tuleb ämbli- kul nälgida, kui tema võrk on ära hävitatud?

Aiatigu.

Vaatlused. 1. Vaatle, kus kohas leiad sa tigused! 2. Korja mitmesuguste tigude tühje karpisid ja joonista nende väliskuju oma kaustikusse! 3. Võrdle leitud tigude karpide värvi nende lähema ümbruse omaga! 4. Vaatle, kuidas liigub tigu ja mis- suguse jälje ta liikumisel maha jätab; lase teda klaasi pinda mööda liikuda, riputa sellele klaasile peenikest kuiva liiva ja vaata, kuidas ta siis edasi jõuab. 5. Vaatle teo keelt; pane tähele, kuidas ta lehti pureb. 6. Joonista mõni leht, mille tigu on ära purenud. 7. Millega kaitsevad taimed ennast tigude eest? 8. Pane aiatigu klaasi, mille põhjale kord mulda on raputatud. Vaatle, missugused loomakesed kujunevad tema munadest. Toida neid noori loomi rukkitaimedega või mõne muu taime pehmetele lehtedega!

Märja ilmaga võime sagedasti puude ja põõsaste okstel ja tüvedel näha isesugust aeglast roomavat looma. See on aia- tigu (197. joon.). Iseäranis palju on neid tigused meil Saaremaal.

Suurem osa teo kehast on peidus n. n. koj as ehk karbis, mida ta alati seljas kannab. Roomates sirutab ta koja serva alt ainult pea ja laia tallasarnase jala välja. Teol puudub niihästi sisemine kui ka välimine luukere; ainult kõva lubjarikas koda pakub temale head kaitset. Jala lainelise kokkutõmbamise varal liigub ta aeglaselt edasi. Limane jalg liitub tihedalt nagu imedes liikumis-



197. joon. Aiatigu.

pinna külge. Seepärast võib tigu ka kõige libedamat ja järsemat teed mööda liikuda.

Teo koja alusel kehaosal on isesugune nahavolt, n. n. mantel; see sõõrutab lubjarikast nõret, mis kaitsvaks kojaks tardub. Kojas peal on näha ringid, mille võrra koda aasta jooksul suuremaks on kasvanud. Nende ringide järele võib ka teo vanadust ära ütelda.

Peas on kaks paari tundesarvi. Pikeimate otsas asetsevad mustad silmakesed. Need tundesarved on huvitavad selle poolest, et nad seest õõnsad on ja loom hädaohu lähenemisel neid tagasitõmmates sisse saab soppida, nagu meie kindi sõrme pahempidi pööramisel sisse tõmbame.

Teo toit on taimede lehed. Suu asub pea allpoolses osas: ta tähtsamad osad on tugev ülemine lõug ja kisuline, viilitaoline keel. Lõua ja keele abil, mille kisud sissepoole hoiduvad, kraabib ta taimede lehtedelt ühe killukese teise järele lahti (198. joon.). Ta võib suurel hulgal lehti ära hävitada. Ta soolikas on lühike ja pära-a uk avaneb koja parempoolses koopa osas.



198. joon. a — teo keel viiliga; b — teo ülemine lõug. (Suurendatud.)

Tigu hingab kopsuga. Tema kops on aga õige lihtne. See on väikene kotike, mille seintes tihe vere-juussoonte võrk. Ta on koja sisemuses, kehas, ja avaneb parempoolsel küljel koja all. Ergukavaks on üksikud närvisõlmed. Peale kopsuhingamise on teol võimalik veel läbi oma libeda naha hingata. Kuiva ilmaga ei ole palju tigusid näha, sest kuiva käes kuivaks nende nahk kergesti ära. Märjal suvel on palju tigusid.

Suvel kaevab aiatigu, kes on ühteaegu isane ja emane (võrdle teda õitega, kus tolmukad ja emakad), oma jalaga kobedasse mulda augu, kuhu ta tükki 30 valget muna muneb. Mõne nädala pärast tulevad munadest noored teod välja, kes igapidi vanade sarnased. Tigu muneb mitu korda suve jooksul.

Talve saadavad teod talveunes mööda. Sügisel kaevavad nad end sügavale mullapõue ja matavad oma karbi suu mantli isesugusest lubjarikkast nõrest tekkiva kaanega kinni.


Ülesanded ja küsimused. 1. Katsu teo koja ringide järele otsustada, kui vana on tigu. 2. Korja mitmesuguseid tigusid ja vaatle, kuidas nad edasi liiguvad. 3. Miks langevad teod talveunele. 4. Katsu hilja sügisel leida talvekorterisse peitunud tigu ja vaatle tema koda! 5. Valmista teo koda plastiliinist! 6. Arvuta, kui palju maad jõuab aiatigu vahet pidamata roomates tunnis edasi.

Vihmauss.

Vaatlused. 1. Pane vihmauss klaasi, kuhu sa varemini juba niisket mulda oled raputanud, ja vaatle seal tema avaldusi ning välist keha ehitust! 2. Vaatle, missuguse ilmaga ja missugusel öö-päeva momendil tulevad vihmaussid maa peale. 3. Kaeva mullapinda vihmade ja põua ajal! Pane tähele, kus peatuvad kummalgi juhusel vihmaussid. 4. Katsu võimalikult paljudest kohtadest vihmausse leida; iseloomusta vihmaussi asukohta! 5. Joonista värske mulla profiil ja selles leiduvad vihmaussi augud! 6. Lase vihmaussi läbi kergesti kokkusurutud peo pugeda; mida tunned selle juures? 7. Vaatle, kuidas jõuab vihmauss libedat klaaspinda mööda edasi, kuidas karedal paberil. 8. Juhi hele valgusekiir vihmaussi peale; mida paned sa tähele?

Vihmauss ehk liimukas elab huumuserikkas mullas (199. joon.). Liivamaas leidub teda väga harva. Oma nime on ta sellest saanud, et ta öö niiskuses ja vihma ajal maast välja tuleb. Ka soo-

maas ei leidu vihmausse, sest suur niiskus on neile sama kahjulik kui kuivuski. Liigniiskuse ja kuiva põlgamine oleneb vihmaussi hingamisviisist, — ta hingab ainult kogu kehapiinna nahaga. Nahas on limanäärmed, mis naha libedakshoidmiseks lima eritavad, sest ainult niiske limase naha kaudu sünnib hapniku ja süsihapu gaasi vahetus. Kuivas läheb nahapind päris kuivaks ja gaaside vahetus jääb seisma. Vees on jälle kasinalt õhku ja hingamist takistab õhu puudus. Kui kestva põua ajal maapind tublisti ära kuivab, siis otsime vihmausse asjata fülemistest mullakihtidest — nad on sügavamale, niiske-matesse maa-aladesse põgenenud. Igal õngitsejal on teada, missugust vaeva maksab põua ajal õnge otsa söödaks vihmausse leida.



199. joon. Vihmauss.

Vihmaussi kehas puudub igasugune luukere. Ta keha jaguneb üksikuteks lihasrõngasteks, mille tõttu vihmaussi ka rõngasussiks kutsutakse. Naha all on kahesugused lihased: ühed käivad piki, teised risti keha. Risti keha käivad lihased ümbritsevad rõngaid ringidena. Lihaste kokkutõmbamise ja väljasirutamise kui ka igal lülil asuvate nelja harjasepaari abil liigub vihmauss loogeldes edasi — roomab. Harjastega, tagumist kehaosa vastu maad toetades, tõukab ta eesmist lihaste tegevusega edasi. Kui suurem osa vihmaussi kehast on mulla sees, siis takistavad harjased vihmaussi mullast välja tõmmata; selle juures katkeb vihmauss sagedasti kaheks. Vihmaussi kehaehituse lihtsuse tõttu võivad mõlemad pooled iseseisvate vihmaussidena edasi elada, sellejuures arendades kaotsiläinud kehaosade asemele uued.

Peapoolses, jämedamas otsas on vihmaussil suu, kuna vastupoolne ots pära-auguga lõpeb. Läbi keha ulatub sooletoru. Keha

õõs, mis sooleтору ümbritseb, jaguneb rõngaste vaheseinte läbi sama paljudeks kambriteks, kui palju rõngaid naha pinnal on näha. Vihmauss toidab end mädanevate ainetega ja peaasjalikult taimede lehtedega, mida ta õõsiti oma auku veab. Ta sööb mädanevad ained ühes mullaga enda sisse. Keha võtab sellest segust toiduks kohased ained vastu, kuna ta mulla jälle välja heidab. Sügisehommikutel teedel leiduvad väikesed mullahunnikukesed ongi vihmaussi kehas läbi lastud mustmuld. Oma keha mulda puurides ajavad nad tee peal ees oleva mulla kehas läbi. Toitu otsides ja mädanevaid aineid ümber töötades teevad nad mulla kohedamaks ja rikastavad huumuse poolest, mis nende seedimise saadusena tekib. Nad on mädanevate ainete ja mulla läbitöötamisega põllumeestele väga kasulikud kaastöölised. Talveks poevad nad sügavamale mulla alla.

Vere-ringvool käib selgmist ja kõhualust soont mööda, mis isekeskis rõngassoonte kaudu ühenduses. Nahk on peale hingamise ka veel tundeorganiks. Valguse ärrituste vastu on nahk peapoolisel otsal iseäranis tundlik; juhime ereda valguse vihmaussi pähe, siis katsub ta kohe maa sisse pugeda.

Vihmauss sigib munade kaudu, mida ta isesugusesse keha pinnal tekkinud tuppe muneb. Vihmaussid ei ole kaheks sugupooleks jagunenud nagu mitmed varemini vaadeldud loomad. Nemad on kõik ühesuguse kehaehitusega ja selle tõttu võivad igaüks mune valmistada oma elundites. Meie võime neid võrrelda takistamatult õitega, millel nii tolmukad kui ka emakad ühes ja samas õies on (hernes), vastandina niisugustele õitele, kus ainult kas tolmukad või emakad (sarapuu). Munadega täidetud tupid jäävad mulda, ja munadest arenevad siis noored vihmaussid. Noored loomad on täiesti vanade sarnased.

Ülesanded ja küsimused. 1. Vaata vara hommikul teedel vihmaussi mullahunnikuid, ta aukudesse tõmmatud lehti ja rohuliblesid! 2. Mispärast on savipõhjaga maas vähe vihmausse? 3. Mis kasu on põllumehel vihmaussist? 4. Arva vihmaussi liikumise kiirus! 5. Valmista roomav vihmauss plastiliinist!

The first part of the book is devoted to a general history of the...
the second part is devoted to a detailed description of the...
the third part is devoted to a description of the...
the fourth part is devoted to a description of the...
the fifth part is devoted to a description of the...
the sixth part is devoted to a description of the...
the seventh part is devoted to a description of the...
the eighth part is devoted to a description of the...
the ninth part is devoted to a description of the...
the tenth part is devoted to a description of the...


The first part of the book is devoted to a general history of the...
the second part is devoted to a detailed description of the...
the third part is devoted to a description of the...
the fourth part is devoted to a description of the...
the fifth part is devoted to a description of the...
the sixth part is devoted to a description of the...
the seventh part is devoted to a description of the...
the eighth part is devoted to a description of the...
the ninth part is devoted to a description of the...
the tenth part is devoted to a description of the...

The first part of the book is devoted to a general history of the...
the second part is devoted to a detailed description of the...
the third part is devoted to a description of the...
the fourth part is devoted to a description of the...
the fifth part is devoted to a description of the...
the sixth part is devoted to a description of the...
the seventh part is devoted to a description of the...
the eighth part is devoted to a description of the...
the ninth part is devoted to a description of the...
the tenth part is devoted to a description of the...

Sisu.

	Lk.		Lk.
Eessõna	3	Harilik nurmenukk	102
Eluta loodus.		Taimede varred kui paljunemis-	
Maapind		vahendid	104
Muld	5	Varsakabi	106
Liiv	6	Võilill	109
Savi	9	Õunapuu	111
Vesi:		Kirsipuu	115
Vesi looduses	10	Juurte tegevus	116
Lahustuvus vees	15	Lehe tegevus	119
Vee kurnamine	15	Varre ülesanne	123
Kõva ja pehme vesi	17		
Vee keemine	18	Inimene ja loomad.	
Auramine	19	Inimese luukere	126
Kehad:	22	Lihased	129
Erikaalude tabel	26	Seedimisorganid ja toitumine	131
Soojus	27	Vere-ringvool ja veri	134
Soojuse levimine	31	Hingamine	136
Õhk:	34	Väljaheite-organid	138
Õhu koosseis	36	Ergud ja ergukava	139
Põlemine	40	Meeleristad	141
Taimed.		Veis	144
Kibe tulikas	45	Siga	148
Tubakas	47	Hobune	151
Õie ülesanne taimede elus	50	Kass	153
Liik ja perekond	54	Koer	156
Magun	55	Mutt	159
Kapsas ja kaalikas	58	Nahkhiir ja talveuni	162
Hernes	62	Tuvi	166
Harilik kõrvits	68	Kanad	170
Porgand	72	Pääsuke	173
Valge emanõges	75	Rändlindude minek ja tagasitulek	174
Kassitapp	77	Koduvarblane	178
Harilik kukehari	80	Sisalik	179
Sügisene lehtede langemine	82	Rohukonn	182
Puud ja põõsad sügisel ning talvel	85	Sitasitikas	185
Põldpaju	90	Kapsaliblikas	188
Arukask	92	Mesilane	190
Sarapuu	95	Toakärbes	194
Kollane kuldtaht	97	Ristiga ämblik	196
Aiatulp	100	Aiatigu	199
		Vihmauss	201

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several columns and appears to be a formal document or report.



A A

5783

58093

Hind 165 marka.