

TARTU RIIKLIK ÜLIKOOL

**Kõrva-, nina- ja
kurguhaigete
uurimise
metoodika**

TARTU 1969

Tartu Riiklik Ülikool

Otorinolarüngoloogia ja oftalmoloogia kateeder

KÕRVA-, NINA-, KURGUHAIGETE
UURIMISE METOODIKA

Tartu 1969

2

Tartu Riikliku Olikooli

Raamatukogu

74039

KÕRVA-, NINA- JA KURGUHAIGETE UURIMISE TINGIMUSED.

Kõrva, nina, kurku ja kõri vaadeldakse endoskoopilise (endoscopia - sisevaatlus) uurimismeetodiga, mis võimaldab näha nendesse õõnesorganitesse. Endoskoopiline vaatlus osutub võimalikuks reflekteeritud valguse abil. Selleks kasutatakse kunstlikku valgusallikat (elektripirn, gaasilamp, küünlaleek; päikesevalgus on liiga ere), mille valgus suunatakse otsmikureflektori abil uuritavale organile (ninasse, neelu, kõrisse, kuulmekilele). Et päevavalgus ei segaks, on soovitatav vaatlust teostada pimendatud ruumis.

Valgusallikas asub patsiendist paremal pool pea kõrgusel. Arst istub haige vastas nii, et valgusallikas jääb arstist vasakule. Arsti ja haige vahemaa peade kõrgusel on 20-25 cm. Arst juhib oma põlved haige põlvedest mööda kas paremalt või vasakult poolt.

Reflektor on nõgus peegel, mille tsentrumis leiduva ava läbi vaatab arst uuritavat organit. Arst asetab reflektori vasaku silma ette nii, et arsti pilk ja reflektoriga suunatav valguslaik ühtiksid uuritava organil. Uurimine toimub ühe, s. o. vasaku silmaga; parema silma sulgemine pole vajalik. Võib vaadata ka parema silmaga, kuid siis peab valgusallikas olema arstist ka paremal pool.

Arst kandku haigete läbivaatamisel näolappi, et kaitsta end piisknakkuse eest.

NINA UURIMINE.

Anamnees.

Anamneesi koostamisel ninahaiguste puhul tuleb küsitleda haiget nohu kestuse ja iseloomu kohta; tuleb selgitada ninahingamise, lõhnatunde ja ninaeritise iseloomu ning valude esinemine.

Püsiv ninahingamise takistus võib olla tingitud anatoomilistest põhjustest (nina vaheseina kõverdus, polüübid, nina limaskesta hüpertroofia, pahaloomuline kasvaja, lastel - adenoidid).

Ninahingamise ajutise takistuse põhjuseks võib olla limaskesta turse, mis esineb ägeda nohu puhul. Vahel on ninahingamise takistus ajutise iseloomuga või esineb vahelduvalt kord ühel, kord teisel pool (näiteks sellel poolel, millel haige magab). Ajutine ninahingamise takistus on iseloomulik vasomotoorsete häirete puhul nina limaskestas, nagu seda näeme vasomotoorse ja allergilise riniidi puhul.

Lõhnatunde nõrgenemine (hyposmia) võib olla tingitud mehhaanilistest põhjustest (õhk ei pääse turse tõttu haistmispilusse) või degeneratiivsetest protsessidest haistmispiteelis, tsentraalsetest asjaoludest. Täielik lõhnatunde puudumine (anosmia) vihjab närviaparaadi kahjustusele.

Limane või mädane eritis vihjavad nina kõrvalkoobaste põletikule, vesine eritis ninast, on iseloomulik vasomotoorsele ja allergilisele nohule. Viimasele nohuvormile on iseloomulik ka aevastushoogude esinemine (aevastamine isegi kuni 10 korda järjest). Valud ninajuure piirkonnas annavad põhjuse kahtlustada põletikuprotsessi otsmikukoopas, valud kulmukaare keskosa piirkonnas - nervus supraorbitalis'est tingitud valulikkust.

Valud põse piirkonnas võivad olla nii põsekoopapõletikust kui ka hammaste patoloogiast. Viimasel juhul puudub nohu.

Nina välisvaatlus.

Nina kuju võib olla muutunud patoloogiliste protsesside tagajärjel. Ninaots võib suurenda mügarlikult punakas-lilla värvusega rinofüümi (rhinophyma) puhul. Ninaotsa kuju võivad moonutada ka spetsiifilised protsessid (tuberkuloos, luupus, skleroom, vähk, sarkoom). Luupuse puhul võib ninaots osaliselt puududa või olla hävinud kuni luulise osani. Nina-selg võib lameneda harva polüüpide puhul, tihti aga ninaõõn-te pahaloomuliste kasvajate puhul, mis ekspansiivse kasvu ja survega kergitavad ninaselga.

Ninaselg võib olla sisse langenud, nn. sadulnina (nasus selliformis). Sadulnina esineb luulise või kõhrelise toestiku hävimise järel. Pikkamööda tekkiv sadulnina lapseeas alates võib olla oseena (ozaena) puhul, mil nina luulise toestiku kasv ei pea sammu näokolju normaalse arenguga. Järsku tekkinud sadulnina võib olla trauma tagajärjel ninaluude fraktuuri või rusustumise tulemuseks. Vigastuse järel võib nina nāo telje suhtes asetseda ka viltusena, Väikese ulatusega kummuutusi on võimalik kindlaks teha kohe pärast traumat, hiljem, paari päeva möödudes võib tekkinud turse varjata muutust, mis tuleb uuesti nähtavale turse kadumise järel. Sel juhul on luud fikseerunud valesse asendisse ja nende paigaldamine nõuab juba omaette kirurgilist vahelesegamist (rhinoplastica).

Ninaselg võib sisse langeda nina vaheseina abstsesside järel (kõhrelise osa nekroos), samuti gummade lagunemisest, mis lokaliseeruvad nina vaheseina luulises osas.

Nina piirkonna palpatsioon.

Põse väline valulikkus rõhumisel võib esineda põsekoopa ägeda põletiku puhul. Diferentsiaaldiagnostiliselt peab mõtlema ka nervus infraorbitalis'e neuralgiale ja ülemiste hammaste patoloogiale. Valulikkus palpeerimisel ninajuure piirkonnas vihjab otsmikukoopa põletikule, kulmukaare piirkonnas - nervus supraorbitalis'e neuralgiale.

Nina sisevaatlus.

Ninaõõne uurimiseks ehk sisevaatluseks (endoscopia) kasutatakse kolme moodust: eesmist rinoskoopiat, keskmist rinoskoopiat ja tagumist rinoskoopiat.

Eesmine rinoskoopia (rhinoscopia anterior). Eesmiseks rinoskoopiaks on vajalik ninasõõrmeid laiendav instrument - ninapeegel (speculum nasi); neid on mitmesuguseid mudelid ja erinevaid suurusi, vastavalt lastele ja täiskasvanutele. Kõige sagedamini kasutatakse Hartmanni mudelit. Imikutel võib samaks otstarbeks kasutada ka kõrvapeeglit.

Ninaesiku vaatlemist eelnevalt ninaõõne uurimisele võib teostada ka selliselt, et põidlagi surutakse ninaots ülespoole, mis võimaldab paremini jälgida naha seisundit ja karvu ninasõõrmetes.

Eesmise rinoskoopia teostamiseks võetakse ninapeegel (laiendaja) vasakusse kätte ja parem käsi asetatakse kas uuritava laubale, pealaele või kuklale. Ninapeegli harud viiakse sõõrmetesse (ainult esikusse) kokkusurutult ja laiendatakse siis ettevaatlikult, et hoiduda valu ja vigastuse tekitamisest. Peegel eemaldatakse ninast avatud harudega, et sõõrme karvad ei jääks harude vahele, kuna nende rebimine tekitab haigele valu. Arsti käsi on uuritava peale asetatud selleks, et arst saaks haige pead pöörata soovitud suunas, ning nii ninaõõnest paremat ülevaadet saada.

Kõigepealt jälgitakse ninaõõne limaskestast värvust. Terve nina limaskestast on roosakaspunase tooniga, nagu see on oma limaskestadele suuõõnes ja neelus.

Intensiivsem punetus (hüperemia) viitab põletikulisele seisundile. Tuleb jälgida ka veresoonte joonist ja laiendeid, eriti septumi eesosas (locus Kiesselbachii), kust sageli tekib ninaverejooks. Nina limaskestast võib olla ka kahvatuhall (liviidne), mis viitab paisu (staasi) nähtudele, s. t. funktsionaalsetele häiretele veresoonte toonuses. Kahvatuhall värvus võib esineda mõnikord piirdunult (Vojatšeki laigud), mis

on iseloomulik vasomotoorse rinidi, eriti allergilise rino-
paatia puhul.

Esmise rinoskoopiaga muutub meile nähtavaks ninaõõne
põhi, vahesein, alumine ja keskmine karbik eesmisel osal
ning viimaste all olevad keskmine ja alumine ninakäik. Üle-
mine ninakarbik ja ülemine ninakäik ei ole nähtavad. Kui
arst painutab patsiendi pea allapoole, siis on paremini näh-
tav ninapõhi, kui pea painutada tahapoole (kuklasse), siis
on hästi nähtav ninaõõne ülemine osa, kui haige suhtes pare-
male - siis on nähtav rohkem vahesein ja vasakule pöördes -
lateraalne sein. Kliinilises mõttes on kõige tähtsam just
ninaõõne lateraalne sein, sest siin kajastub nina kõrvalkoo-
baste patoloogia.

Alati tuleb vaadelda keskmist ninakäiku, kus võib leidu-
da sekreeti, mäda ja polüüpe. Mäda keskmises käigus võib pä-
rineda põsekoopast, otsmikukoopast ja eesmistest sõelluurak-
kudest. Kui mäda leidub keskmise karbiku ja vaheseina vahel,
siis võib see tulla tagumistest sõelluurakkudest või ka põ-
hiluukoopast.

Olenevalt ninaõõne avarusest on võimalik näha läbi ühis-
käigu (meatus nasi communis) ka ninaneelu; see on hästi näh-
tav nina limaskestast atroofia puhul. Kui limaskestast on turses,
siis on kavgemale, eriti neelu vaatamine takistatud. Limas-
kestast turset on võimalik vähendada dikaini- (Sol. dicaini
2 %) ja adrenaliini- või efedriinilahusega (Sol. adrenalini
hydrochl. 1:1000, või Sol. ephedriini hydrochl. 2 % - 3 %)
määrides. Selleks otstarbeks keerutatakse peene traatsondi
otsa vatti, niisutatakse nimetatud lahustega ja kergelt puu-
dutades nina limaskestast viiakse sondiga ninaneelu välja; sa-
mal viisil toimub ka ninalimaskestast anesteseerimine. Paari-
minutilise ootamise järel muutub nina limaskestast kahvatuks ja
turse väheneb. Nii võetakse ninaeritist äigepreparaatide
jaoks ja mikrobioloogilisteks uurimisteks. Viimasel juhul ka-
sutatakse steriilselt katsutist võetud puutikku, mille otsa
on keerutatud vatti. Et veenduda selles, kas on nähtav nina-
neelu tagumine sein, selleks võib uuritava lasta öelda hää-

likut "o", sel puhul liigub pehme suulagi ja me võime veenduda, et oleme pilguga tagapool koaane.

Keskmine rinoskoopia (rhinoscopia media). Keskmiseks rinoskoopiaks kasutatakse pikkade harudega laiendajat (Kiliani ninapeegel). Nina limaskestast, eriti keskmist ninakäiku tuimastatakse eelnevalt dikaiini- ja adrenaliinilahusega. Ülesandeks on keskmise ninakäigu avardamine. Selleks viiakse laiendaja pikad harud keskmise karbiku alla ja see lukseeritakse mediaalsemale. Praktiliselt tuleb see tehing arvesse siis, kui näiteks tahetakse soodustada mäda väljapääsu ahenenud käigu puhul. Sama peegliga on võimalik avardada ka nina ühiskäiku, kui keskmist karbikut suruda lateraalsemale; sel viisil on võimalik juurdepääs põhiluukoopani. Keskmine rinoskoopia kuulub rinoloogi kompetentsi.

Tagumine rinoskoopia (rhinoscopia posterior). Vaatluse ülesandeks on jälgida tagasõõrmete piirkonda ja ninaõõne tagumist osa, mis on nähtav läbi tagasõõrmete.

Suu kaudu viiakse ninaneelupeegel (0,5 - 1,0 cm läbimõõduga ümmargune peegel, mis on fikseeritud peene metallvarre külge), ninaneelu. Arst surub vasaku käega spaatli abil patsiendi keele alla, parema käega viib peegli ninaneelu kas ühelt või teiselt poolt uvula't. Peeglit tuleb eelnevalt soojendada (piirituslambil, kuumas vees, tikutulel), et peeglipind ei hägustuks. Vaatlusel ei tohi neelü tagumist seina puudutada, see põhjustab okserefleksi ja takistab uurimist. Isikutel, kel on väga elavad neelurefleksid, võib neelu limaskestast eelnevalt tuimastada dikaiini- ja adrenaliinilahusega. Peegel tuleb asetada nii, et ta peegeldaks ühepoolset tagasõõret, samuti pehme suulae ülemist pinda. Läbi koani on näha alumise ja keskmise karbiku tagumised osad ning alumine, keskmine ja ninaühiskäik tagumises osas. Ülemine karbik ja ülemine ninakäik ei ole nähtavad. Saadud peegelpilt oleneb peeglipinna suurusest. Peeglit nihutades ühelt poolt teisele poole, möödudes uvulast, saame rekonstrueerida teravikliku pildi uuritavast piirkonnast ninaõõne tagumises osas.

Kui peeglipinda pöörata külgmisele, siis on vahel võimalik näha ka kuulmetõrve neelupoolset avaust.

Nina funktsiooni uurimine.

Nina läbitavuse ehk ninahingamise kindlakstegemiseks jälgitakse uuritava nägu: avatud suu (suu lahti) on takistatud ninahingamise tunnuseks - esineb nn. suuhingamine. Täpsemaks ninahingamise jälgimiseks lastakse hingata nina all olevale arsti sõrmele, kord üht, kord teist ninasõõret kinni vajutades. Samuti võib jälgida ka udusule, niidiotsa või siidpabeririba liikumist, kui neid hoida ninasõõrme all. Ninahingamise jälgimiseks kvantitatiivses mõttes kasutatakse peeglit või poleeritud metallplaati (Glatzeli peegel), kui seda ninasõõrmete all hoida. Sellele sadeneb väljahingatava sooja õhu niiskus udulaiguna. Viimase suuruse või puudumise järgi otsustatakse ninahingamise takistuste üle. Täpseks õhu läbitavuse kindlakstegemiseks kasutatakse teaduslike tööde puhul rinoanemomeetriat: sel puhul kasutatakse manomeetreid, mis teevad kindlaks õhurõhu ninas ja neelus hingamisakti ajal.

Tuleb jälgida ka väljahingatava õhu lõhna. Terve nina puhul puudub väljahingatud õhul lõhn. Kui on aga ninas patoloogilisi protsesse, siis lisandub õhule vina. Ainult ninast tuleva õhu vina viitab haigusprotsessile ninas või nina-neelus. Kui suust väljahingataval õhul on sama vina, siis tuleb see alumistest õhuteedest või kopsust (kopsuabstsess, -gangreen). Tüüpiline imal-läage vina esineb väljahingataval õhul oseena puhul; putriidne vina võib vahel esineda nina kõrvalkoobaste krooniliste mädapõletike puhul, eriti aga la-gunevate pahaloomuliste kasvajate puhul ninas.

Haistmise kindlakstegemiseks antakse uuritavale nuusutada mitmesuguseid lõhnu. Eelduseks on see, et lõhnad peavad uuritavale olema tuntud ja need ei tohi avaldada ärritavat toimet nina limaskestale. Alustatakse nõrgematest lõhnadest.

Vojatseki järgi kasutatakse järgmisi aineid: vett, 0,5 %

äädikhapet, piiritust, palderjanitinktuuri ja 3%-list ammooniaagilahust. Peale nimetatute võib kasutada ka muid üldtuntud lõhnu.

Nõrgenenud lõhnatundmist (hyposmia) on võimalik kindlaks teha kvantitatiivses mõttes instrumendiga - olfaktomeetriga: sellega antakse uuritavale lõhnainet (näit. palderjani) erinevates hulkades ja jälgitakse, missuguse hulga juures tekib lõhnaaisting. Ehituselt kõige lihtsam on Medvedovski mudel, mille printsiip on järgmine. Purk, milles on palderjanitinktuur, on varustatud kahe toruga; üks neist on oliiviga fikseeritud sõõrmesse, teise kaudu surutakse süstlaga õhku purki. Jälgitakse, mitme kuubiku õhu surumisel tekib lõhnaaisting; kui 20 cm^3 õhu süstimisel lõhnaaistingut ei teki, on tegemist lõhnatunde puudumisega (anosmia).

Haistmise kindlakstegemine on subjektiivse iseloomuga ja põhineb usaldusele haige vastu. Üheks lõhnaaistingu objektiivsemaks näitajaks on hingamisliigutuste rütmi muutus, mida on võimalik registreerida pneumograafiliselt.

Nina kõrvalkoobaste uurimine.

Nina kõrvalkoobaste patoloogilisi protsesse võib kaudselt kindlaks teha palpatsiooniga valulikkuse suhtes põse ja otsmikukoopa piirkonnas. Nervus supraorbitalis'e tüve valutundlikkus vihjab neuriidile või neuralgiale, millega diferentsiaaldiagnostiliselt tuleb arvestada otsmikuvalude puhul.

Usaldusväärsemaid andmeid nina kõrvalkoobaste seisundi kohta saadakse kas diafanoskoopia või röntgenograafia näol.

Diafanoskoopia (diaphanoscoopia) teostamiseks asetatakse pimendatud ruumis uuritavale suhu elektripirn, mis on varustatud metallümbrisega (diafanoskoop). Muutusi põsekoopas jälgitakse valguse läbikumendusega põsel. Terve põsekoopa puhul tekib süüdatud pirnist põse helendus, ühtlasi on ka valguse kuma nähtav silmapupillist.

Patoloogiliste protsesside puhul põsekoopas (limaskes-

ta paksenemine, polüübid, mäda, kasvaja) on valguse kumendus nõrk või puudub, puudub ka kumendus pupillis. Läbikumenduse vahe on märgatav eriti põsekoopa ühepoolse patoloogia puhul.

Otsmikukoopa diafanoskoopiaks surutakse elektripirn välisesse silmanurka ninajuure kõrgusel otsmikukoopa põhja alla; jälgitakse valguse kumendumist otsmikukoopa eesmise seinna läbi.

Diafanoskoopia tuleb arvesse seal, kus röntgeniga pole võimalik vaadata.

Röntgenülesvõtteid nina kõrvalkoobastest tehakse näokoljust otse- ja külgvaates. Soovitav on teha ülesvõtted mõlemas projektsioonis, et võrdlusandmed oleksid täielikumad. Röntgenülesvõttel on täiendav väärtus muude kliiniliste andmete kõrval, sest ülesvõttel olevad varjustused võivad olla ka füsioloogilist laadi. Patoloogiliste muutuste diagnoosimisel nina kõrvalkoobastes ei saa aluseks võtta ainult röntgenülesvõtet. Täpsema ülevaate põse- ja otsmikukoopa patoloogilistest muutustest annavad röntgenülesvõtted kontrastainega, mida süstitakse nendesse õõntesse enne ülesvõtte tegemist; samal otstarbel võib teha ka tomograafia.

Nina kõrvalkoobaste patoloogilise sisu kindlakstegemiseks võib kasutada ka proovipunktsiooni ja loputust; kõige sagedamini kasutatakse põsekoopa, vähem otsmikukoopa ja harva põhiluukoopa loputamist.

Põsekoobast punkteeritakse ja loputatakse alumise ninakäigu kaudu. Varemalt tehti seda loomuliku avause kaudu, mis on aga tehniliselt raskem ning orbita suhtes ohtlik. Ka läbi hambaalveoli on võimalik loputada, kuid selleks tuleb eelnevalt hammas eemaldada. Dikaiini- või adrenaliinilahusega tuleb alumist ninakäiku tuimastada, siis surutakse läbi luu Kulikovski jäme nõel või mandrääniga varustatud troakaar. Läbi nõela on võimalik aspireerida mäda bakterioloogiliseks uurimiseks. Aspireeritav kollakas seroosne vedelik on tsüsti tõenäoliselt. Läbi nõela või troakaari surutakse sisse sooja vett kas kummiballoonist või 200 ml süstlast. Vesi eraldub loomuliku avause kaudu ning toob ühes mäda või lima, mis esineb põse-

koopas. Selliseid korduvald loputusi kasutatakse konservatiivse ravivõttena (nn. loputusravi). Ühekordseks loputamiseks kasutatakse umbes pool liitrit vett. Sama nõela kaudu on võimalik süstida põsekoopasse kontrastainet ja medikamentide lahuseid.

Otsmikukoopa loputamist tehakse ductus nasofrontalis'e kaudu nüri nõelaga. Et viimasesse pääseda, tuleb eelnevalt resetseerida keskmise karbiku eesmine ots. Otsmikukoobast on võimalik loputada ka läbi koopa välise seina, selleks tehakse kulmukaare sisse väike lõige ja trepaneeritakse luu, mille kaudu tehakse loputamist või süstitakse kontrastainet.

Põhiluukoobast on võimalik loputada nüri nõelaga meatus nasi communis'e kaudu, seda eelnevalt laiendades Killiani peegliga.

SUUÕONE UURIMINE.

Kaebused ja anamnees.

Sageli kaebavad patsiendid halba maitset suus. Seda tuleb seostada hammaste (pyorrhoea alveolaris) kui ka seedeorganite haigestumisega. Maitsetundehäired esinevad iseseisvalt või tihti koos lõhnatundehäiretega. Põhjuseks võib olla ninahingamise takistus, kuid ka chorda tympan'i kahjustus keskkõrvahaiguste ja keskkõrva piirkonnas tehtud operatsioonide puhul. Maitseretseptorite kahjustuse põhjuseks võib olla ka gripp ning teised nakkushaigused. Süljekivide puhul kaebavad patsiendid turse tekkimist süljenäärmete piirkonnas söömise ajal. See on tingitud söömisel rohkelt tekkiva sülje paisust. Sülje väljavoolusel turse kaob.

Kõnehäired võivad olla neil patsientidel, kel esineb suulae lõhe, pehme suulae halvatus (neil tekib kõnekõla muutus) ja liiga lühike keelekida (võib harvadel juhtudel põhjustada üksikute häälkute ebaõiget hääldamist).

Välisvaatlus.

Juba välisvaatlusel võivad silma torgata arenguhäired nagu lõhikhuul ("jänesemokk" - labium fissum s. labium leporinum), etteulatav ülalõualuu koos hammaste kaarega (prognathia), etteulatav alalõualuu (progenia). Kahe viimase põhjuseks peetakse muuhulgas ka ninahingamise häireid. Tähelepanu tuleb pöörata huulte värvusele (aneemilised, hüperemilised, tsüanootilised), herpes'e esinemisele, ragaadidele jne.

Välisvaatluse ajal tuleb ühtlasi jälgida ka kaela välist leidu. Siin võib kõige sagedamini kohata kaasasündinud fistuleid. Kaela keskjoonel esinevad tsüstid või fistulid on ductus thyreoglossus'e, külgmised fistulid aga ductus thymopharyngeus'e või teise lõuspilu rudimendid. Üldiselt kannavad need nimetust - fistulae colli congenita. Samuti tehakse kindlaks lõuaaluste ja kaela mahlasõlmede suurus ja konsistents.

Suuõõne vaatlus (oroscopya s. stomatoscopya).

Uuringuks kasutatakse peale otsmikureflektori ja valgusallika spaatlit. Sellega surutakse alla keel, samuti tuuakse nähtavale suuõõne üksikud varjatud osad. Väikesed lapsed ei taha sageli suud avada. Sel juhul tuleb kinni suruda ninasõõrmed, mis tingib suu avamise hingamiseks. Spaatli võib viia ka suunurgast hammaste tagant neelu. Tekkiva okserefleksi tõttu on laps sunnitud suu avama. Suuõõne pikemaagsete vaatluste ja ka manipulatsioonide puhul võib laste juures kasutada suuavajat. Kui laps vaatluse ja manipulatsioonide ajal rabeleb, toimub tema fikseerimine nii: sanitar võtab lapse süle, hoiab oma põlvede vahel tema jalgu,

parema käega fikseerib lapse käed ja vasemaga lapse pea. Samuti fikseeritakse laps ka neelu vaatluse ja palpatsiooni ajal.

Suuõõne vaatlus algab vestibulum oris'e limaskestast seisundi kindlakstegemisest. Vaadeldakse glandula parotis'e juha avasid, mis asuvad teise ülemise purihamba kõrgusel mõlemal pool ja on nähtavad väikeste kühmudena. Seejärel teostatakse hammaste vaatlus. Karioossed ülemised premolaarid (2) ning molaarid (1. ja 2) võivad olla põsekoopa dentogeense põletiku põhjuseks. Karioossed hambad, mandlikõrgid, kuid ka seedehäired võivad põhjustada halba lõhna suus (foetor ex ore), millele tuleb suuõõne uurimisel samuti tähelepanu pöörata. Edasi vaadeldakse suupõhja ja keelt. Jälgitakse keele värvust, katte keele pinnal, keele liikumist jne. Papillae filiformes'te hüperkeratoosi tagajärjel võib tekkida nn. lingua nigra; keel omandab pruuni või musta värvuse. Nn. lingua geographica puhul on keel laiguline ja meenutab maakaarti, see on tingitud epiteeli ebaühtlasest paksenemisest. Lingua geographica ei ole patoloogilise tähendusega, lingua nigra võib olla allergia väljenduseks. Väljasirutatud keel võib keskjoonest kõrvale kalduda, mille põhjuseks on sageli n. hypoglossus'e halvatus.

Suupõhja vaatlusel lastakse patsiendil keeleots üles tõsta ja spaatliga tõstetakse üles keele servad. Mõnikord on keele liikuvus takistatud liiga lühikese keelekida (frenulum linguae) tõttu. Sellist seisundit nimetatakse ankyloglossum s. ankyloglossia. Edasi tehakse kindlaks lõuaaluste süljenäärmete (glandulae submandibulares) juhade avade seisund. Need avanevad vahetult keelekida kõrvale mõlemal pool kühmukestena (carunculae sublinguales). Nendest lateraalsemale keele alla jäävad plicae sublinguales, mille moodustavad keelealused süljenäärmed (glandulae sublinguales). Viimased avanevad mitme väikese juhaga plicae sublinguales'tes. Suuremad juhad suubuvad ductus submandibularis'tesse või avanevad tema läheduses caruncula'l. Põletike puhul, samuti süljekivide (sialolithes) olemasolul esineb süljenäärmete turse ja valu. Sülje väljapääsu takistusest tingituna tekib mõni-

kord süljenäärmete juhade umbumise puhul näärme turse söömise ajal.

Edasi tehakse kindlaks pehme ja kõva suulae seisund.

Arenguhäiretest võib siin esineda lõhiksuulagi ("hundi-kurk" - palatum fissum s. faux lupina). Uvula võib olla lõhestunud (uvula bifida s. bicornis). Bulbaarparalüüsi puhul, samuti sarlakite, difteeria ja poliomüeliidi tüsistusena võib esineda pehme suulae halvatus. Sel juhul satub söömisel toit ninasse ja esineb kõnekõla muutus - rhinolalia aperta.

Palpatsioon.

Suuõõne vaatlusele järgneb tarviduse korral palpatsioon. Sellega tehakse kindlaks suuõõnes esinevad tursed, nende konsistents, fluktuatsiooni esinevus jne. Süljenäärmete ja juhade palpatsioonil on võimalik sedastada süljekive. Soovitatav on bimanuaalne palpatsioon, kusjuures komplektsõrm on suuõõnes, kuna väljast avaldatakse vastusurvet teise käega.

Maitsetunde uurimine.

Suuõõne uurimise juurde kuulub maitsefunktsiooni kindlakstegemine. Maitseretseptorid asetsevad peamiselt keelel, kuid ka neelu tagumisel seinal jm. Erinevad maitseretseptorid asetsevad keele erinevates piirkondades. Nii tunneb keeleots kõige enam magusat, eesmised külgmised piirkonnad soolast, tagumised külgmised piirkonnad haput, keelepära mõru. Maitsefunktsiooni uurimiseks viiakse keelele klaaspulgaga või vatisondiga erineva maitsega (mõru, soolane, magus, hapu) lahuseid. Enne iga järgmise lahuse kasutamist tuleb suu veega loputada. Maitsetunde proovimiseks võib kasutada järgmist lahuste komplekti: 2 %-line kiniinilahus, 40 %-line suhkrulahus, 20 %-line keedusoolalahus, 0,2 %-line soolhappelahus. Maitsetundlikkust uuritakse suletud ninasõõrmete ja seisatatud hingamisega. Uuritakse eraldi igat maitsetsooni nii paremal kui ka vasemal pool keele servadel kui ka keele otsal.

NEELU UURIMINE.

Anamnees.

Tuleb meeles pidada, et neel on oma asendi tõttu seoses paljude nii lähedal kui ka kaugel asetsevate organitega. Sageli sõltub neelu patoloogia naaberpiirkondade seisundist; ta võib ka põhjustada teiste organite haigestumist (süda, liigesed jne.). Neelu innerveerib rida kraniaalnärve (n. trigeminus, n. glossopharyngeus, n. vagus). Neel on reflektorses seoses mitmete siseorganitega. See kõik kajastub neelu patoloogias, mille selgitamisel tuleb suurt tähelepanu osutada organismi üldseisundile.

Peamiste kaebustena esineb neelamise valulikkus ühel või mõlemal pool neelus (põletikuliste seisundite puhul), kratsimis- ja pigistustunne, sageli tükitunne kurgus jne. Põletikud neelu piirkonnas võivad omakorda põhjustada reflektorset valulikkust kõrvades. Eritise valgumine neelu viitab sageli nina haigestumisele. Ninahingamise häirete põhjuseks võivad olla ninaneelus esinevad adenoidid. Suu kaudu hingamine võib omakorda põhjustada kuivustunnet neelus ja olla ka neelupõletike põhjuseks. Lastel võivad tugevalt suurenenud mandlid põhjustada neelamise ja hingamise häireid, samuti kõnekõla muutust - tekib ninakõla ehk nasalsus (häiritud palatum molle liikumisest). Kui patsient kaebab toidu ninasse sattumist söömisel, siis võivad seda põhjustada lõhiksuulagi ja pehme suulae halvatus. Neelamisakti ajal tekki kõha viitab toidu sattumisele hingamisteedesse. Kaevata võidakse ka fonatsioonihäireid. Põhjusena võivad tulla arvesse pehme suulae halvatused, lõhiksuulagi jt.

Tuleb selgitada kaebuste pidevus või perioodilisus, seos töö- ja elutingimustega, teha kindlaks tundlikkus mitmesuguste ainete, toitude vastu (allergia) jne.

Omaette lõigu anamneesis moodustab angliinide, kroonilise tonsilliidi ja nendega seoses olevate haigestumiste (nn.

seostatud haigestumiste) kindlakstegemine. Mitte iga neelamise valulikkust ei tohi võtta angiinina, haiged seda sageli teevad. Anamnestiliselt tuleb välja selgitada tõeliste angiinide (kõrge temperatuuri, tugeva neelamise valulikkusega) põdemine: mis ajast alates ja kui sageli esinevad. Samuti tuleb kindlaks teha, kas on esinenud mandliümbruse koe põletikke ja mädanikke (paratonsillitis et abscessus paratonsillaribus). Paratonsillaarse abstsessi (nn. kurgupaise) puhul esineb tavaliselt mädajooks kurgust või teeb arst intsisiooni. Sagedased angiinid ja paratonsillaarsed abstsessid on ka kroonilise tonsilliidi diagnoosimise üheks pidepunktiks. Patsiendi tuleb samuti käsitleda mandlikorkide, angiinidega seoses tekkivate liigesevalude, südame ja neeruhaiguste olemasolu või põdemise kohta. Anamneesil on suur tähtsus kroonilise tonsilliidi diagnoosimisel ja on otsustav õige ravi määramisel.

Neelu vaatlus (pharyngoscopia).

Neelu vaatlus jaguneb mesofarüngooskoopiks, hüpofarüngooskoopiks ja epi- ehk rinofarüngooskoopiks. Viimast nimetatakse ka tagumiseks rinoskoopiks ja käsitletakse vastavas peatükis.

Mesofarüngooskoopia (mesopharyngoscopia). Suuõõne vaatlusele järgneb kohe mesofarüngooskoopia. Selleks on vaja spaatlit, otsmikureflektorit ja valgusallikat, kuid võib teha ka loomulikus valguses, kui valgus langeb otseselt suhu ja neelu. Spaatliga surutakse keel ette ja alla, viies spaatli keele keskmise ja tagumise kolmandiku piirini. Keel surutakse alla ettevaatlikult, kusjuures patsient peab rahulikult hingama; keelt ei tohi suust välja tuua. Nüüd tuleb nähtavale kurgu kitsus (isthmus faucium). See on piiratud alt keelepära (radix linguae), külgedelt kurgumandlite (tonsillae palatinae) ja ülalt pehme suulae (palatum molle) ning kurgunibuga (uvula). Kurgumandlid asetsevad mõlemal pool

eesmise ja tagumise kurgukaare (arcus palatoglossus ja arcus palatopharyngeus) vahel. Suuruse poolest jaotatakse mandlid kolme järku. Väikesi mandleid varjavad kurgukaared; keskmise suurusega mandlid ulatuvad kurgukaarteni ja nende välispind on hästi nähtav; suured mandlid ulatuvad kurgukaarte vahelt tunduvalt välja, puutuvad keskjoonel peaaegu kokku. Kaarte vahel asetsevad mandlid ei tähenda aga alati, et on tegemist väikeste mandlitega. Nad võivad oma suuremas osas olla peidetud mandliloozidesse. Vaatlusel jälgitakse mandlite pinna iseloomu, krüptide ehk lakuunide hulka ja suurust, tehakse kindlaks mandlikorkide olemasolu. Viimaseid leidub mandli-krüptides. Nad koosnevad lümfotsüütidest, lümfist, leukotsüütidest, bakteritest ja toiduosistest ning on üheks kroonilise tonsilliidi tunnuseks. Vajutades spaatliga eesmisele kurgukaarele või mandli ülemisele poolusele väljuvad korgid ja krüptide sekreet.

Mandliümbruse koe põletike, eriti aga paratonsillaarse-
te abstsesside puhul, on eesmine kurgukaar ette võlvunud, mandel on surutud mediaalsele. Vaatlusel esineb kurgukitsuse asümmeetria. Seenhaiguse, nn. farüngomükoosi puhul on mandlid kui ka keelepära kaetud valgete ogajate moodustistega. Tehakse kindlaks haavandite olemasolu mandlitel ja kurgukaartel (kasvajate, tuberkuloosi puhul) jne.

Kurgukitsuse vaatlusele järgneb neelu tagumise seinavaatlus. Tehakse kindlaks limaskestast seisund, armide ja haavandite olemasolu. Hüperemia, lima esinemine on ägedate põletike tunnuseks. Atroofia puhul on limaskest kuiv pergamenttaoline, kaetud rohekate koorikutega. Kroonilise farüngiidi hüpertroofiliste vormide puhul on lümfoidilise koe folliikulid neelu tagaseinas suurenenud, moodustades hüperemilisi graanuleid (pharyngitis granulosa) või on hüpertrooferunud lümfoidiline kude neelu tagaseina külgmistes piirkondades kurgukaarte taga (pharyngitis lateralis). Vanade luuetiliste protsesside puhul (gumma järel) võib pehme suulagi olla kokku kasvanud neelu tagumise seinaga või moodustada kiirjaid arme.

Neelust, eriti aga hypopharynx'ist parema ülevaate saamiseks võib patsiendil lasta hääldada häälikut "a". Sel juhul tõuseb pehme suulagi, neel avardub ning keelepära vajub alla. Keelepära allavajutamiseks võib kasutada ka nurga all painutatud spaatlit. Täielikult tuleb aga hypopharynx nähtavale kaudse larüngoskoopia puhul, mis on kirjeldatud vastavas peatükis.

Palpatsioon.

Selleks võtab arst patsiendi pea oma vasakusse kaenlase ja parema käe teise või kolmanda sõrmega palpeerib neelus esinevate tursete, tuumorite ja teiste moodustiste suurst, konsistentsi; teeb kindlaks valulikkuse ja fluktuatsiooni olemasolu. Ninaneelus tehakse digitaalse palpatsiooniga kindlaks polüüptide, fibroomide ja teiste tuumorite, lastel ka adenoidide olemasolu. Digitaalset palpatsiooni lastel tehakse metallist sõrmekaitsega või surutakse lapse põse lihaskest hammaste vahele. Viimase puhul kardab laps enesele valu teha ja ei hammusta.

Sageli on neelu tagaseinalt või mandlitelt tarvilik võtta lima mikrofloora uurimiseks ja selle tundlikkuse määramiseks antibiootikumide suhtes. Selleks surutakse spaatliga keel alla ning puupulga otsa asetatud steriilne vatt niisutatakse neelu või mandlieritiseiga. Võetud proov asetatakse steriilsesse katsutisse.

KÕRI, TRAHHEA, BRONHIDE JA SÖÖGITORU UURIMINE.

Anamnees.

Kõrihaiguste puhul on kõige tüüpilisemaks sümptoomiks häälehäire ehk düsfoonia (dysphonia), mis tekib seoses häälepilu mittetäieliku sulgusega. Selle põhjuseks võivad olla

funktsionaalsed ja orgaanilised häired (kõripõletikud, kõrihalvatused, -kasvajad jne.).

Häälehäirete järsul tekkimisel on põhjuseks tavaliselt põletikulised nähud kõris. Kui düsfoonia areneb pikkaööda, süvenedes, on tegemist tavaliselt kõri orgaaniliste muutustega (kasvajad, tuberkuloos jne.). Ebapüsiva düsfoonia puhul on häirete põhjuseks tavaliselt häälepaeltele kogunenud sitke lima, mille eemaldamisel kõhatamise tagajärjel muutub hääel selgemaks. Selline sekreedi kogunemine iseloomustab põletikulisi protsesse.

Hääle täielikku puudumist nimetatakse afooniaks (aphonia).

Anamneesi võtmisel tuleb tähelepanu osutada ka harjumuslikele intoksikatsioonidele (alkohol, nikotiin) ja professionaalsetele kahjustustele (tolm, gaasid, hääle ülepingutus jt.). Küsitluse puhul avalduv kõrgeenenud erutuvus, paljusõnalised ebaselged kaebused lubavad teatud ettevaatlikkusega oletada haiguse endogeenset, neurootilist iseloomu.

Rögaeritusega kõha on iseloomulik ägeda põletiku lahenemise perioodil, kroonilisele katarraalsele või hüpertroofilisele protsessile. Kuiv kõha esineb aga sageli ägedate või atroofiliste larüngiitide ja neurasteenia puhul. Viimase puhul esineb "kõhatamine", kõha tugevnemine või nõrgenemine emotsioonide ajal ja selle lakkamine une ajal. Haukuva iseloomuga kõha täheldatakse subglottilise ruumi põletike puhul. Kui on andmeid järsku tekkinud kõhahoo, lämbuse ja tsüanoosi esinemise kohta, tuleb kahtlustada võõrkeha aspiratsiooni, mida veel rohkem kinnitavad edaspidi selliste hoogude retsiidivid. Eriti tähtis on anamnees, kui on vaja diagnoosida söögitorru või hingamisteedesse võõrkeha sattumist. Kõri välisringi haavandumiste (tuberkuloos, vähk) ja põletikkude puhul võivad haiged kaevata neelamisvalulikkust, tükitunnet; neelamisel valud võivad kiirguda kõrva. Kõri luumeni kitsenemisel, näiteks, ödeemide, põletikkude, tuumorite, halvatuste jne. korral, võib esineda hingamistakistus kuni asfüksiani.

Välisvaatlus ja palpatsioon.

Välisvaatlust ja palpatsiooni peame tähtsaks ainult siis, kui protsess on levinud kõriskeletile või sellest väljaspoole. Näiteks võib palpeerida väljaspoole kõri levinud tuumoreid, samuti õnnestub traumade puhul palpatsiooni teel mõnikord kindlaks teha kõhre murdu. Kuid peab meeles pidama, et ka normaalse kilpkõhre nihutamisel lateraalsele tekib tihti kerge ragisemine. Seda nähtust seletatakse sörmus- ja kilpkõhre liigese pindade hõõrumisega teineteise vastu, mis siimuleerib mõnikord murdu. Real juhtudel on patoloogilised protsessid kaela piirkonnas kõris tekkinud muutuste põhjuseks seoses vereringehäiretega või mehhaanilise survega, näiteks struuma, tuberkuloosse lümfadeniidi puhul kaelalümfisõlmedes jne. Teistel juhtudel on nad seotud haigusprotsessiga kõris. Siia kuuluvad kaela nahaalune emfüseem kõri või trahhea trauma puhul, kaela flegmoon, regionaarsete lümfisõlmede põletik kõri perikondriidi puhul või metastaasid kaela lümfisõlmedes kõri pahaloomuliste kasvajate puhul jne.

Kõri sondeeritakse fistuli olemasolu puhul nupuga sondi abil tema suuruse ja suuna määramiseks. Uuris võib tekkida nekrootilise protsessi tagajärjel (kõri väline perikondriit). Sisseviidud sondi abil võib sügavuses tunda ebasiledat kõhrepinda. Sondeerida tuleb ettevaatlikult, et vältida veresoonte ja kõri limaskesta kahjustust. Värske trauma puhul on sondeerimine vastunäidustatud infektsiooni sisseviimise ohu tõttu.

Kõri endoskoopiline uurimine.

Kõri sisemist vaatlust ehk larüngoskoopiat (laryngoscopia) võib teostada kahel viisil:

- 1) kaudne larüngoskoopia (laryngoscopia indirecta),
- 2) otsene larüngoskoopia (laryngoscopia directa).

Peale selle kasutatakse täiendava uurimismeetodina stroboskoopiat (stroboscopia).

Kaudne larüngooskoopia (laryngoscopia indirecta).

Valgusallikas asetseb haige suhtes samuti nagu rinoskoopia puhul (valgus reflektorilt suunatakse kõripeeglile). Kõripeegliks on 45°-se nurga all metallvarva külge kinnitatud ümmargune peeglike. Peeglikesed valmistatakse erineva läbimõõduga (1 - 4 cm). Enne vaatlust soojendatakse kõripeeglit, et pind ei udustuks vaatluse ajal. Soojendatakse peeglipoolset pinda ja kontrollitakse käeseljal, kas see ei ole liialt kuum. Soojendamiseks võib kasutada piirituslampi, kuumat vett, petrooleumlampi jm.

Vaatluse juures võetakse kõripeegel sulepeataoliselt paremasse kätte, vasaku käe kahe esimese sõrmega haaratakse marlilapi abil keeleotsast kinni ja tõmmatakse keel välja ja veidi allapoole. Seejärel viiakse soojendatud kõripeegel (peegli pinnaga allapoole) neelu ja pehme suulaagi ning uvula surutakse taha ja ülespoole. Vaatluse juures peab kõripeegel asetsema 45°-se nurga all kõritelje suhtes, alles siis tuleb peeglil nähtavale kõri peegelpilt. Peegli ülemisel serval on nähtavad kõri eesmised osad (epiglottis, commissura anterior, kõri eesmine sein), peegli alumises osas on nähtavad kõri tagumised osad (kõri tagumine sein, plica aryepiglottica).

Kaudse larüngooskoopia puhul on nähtavad kõigepealt häälepaelad oma valkja värvuse tõttu limaskesta roosal foonil. Häälepaeltel allpool vaadeldakse regio subglottica't ja trahhea limaskesta koos risti kulgevate kollakate trahheaalrõngastega. Üksikjuhtudel on sügaval sissehingamisel nähtav trahhea bifurkatsioon. Häälepaeltel ülevalpool ja veidi lateraalsemal on näha roosa värvusega kurrud - need on valehäälepaelad (plicae ventriculares). Häälepaela ja valehäälepaela vahele jääb kõrivatsake (ventriculus laryngis s. ventriculus Morgagni), mis larüngooskoopiaga pole nähtav. Epiglottis'e alumises osas, kõripoolisel pinnal on väike kõbruke - petiolus.

Pööratakse tähelepanu epiglottis'e seisundile, tema serva kujule, keele- ja kõripoolsele pinnale. Mõnel isikul asetseb epiglottis vertikaalselt, teistel on ta kaldunud taha kõri suunas ja katab kõri sissekäigu.

Edasi palutakse uuritavat häälada häälikut "e". Sellejuures pehme suulagi ja uvula tõusevad üles ja tahapoole, epiglottis läheneb keelepärale, seoses sellega paraneb kõri nähtavus. Fonatsiooni ajal lähenevad häälepaelad teineteisele, häälepilu (rima glottidis) sulgub. Hingamise ajal on häälepaelad teineteisest eemal ja moodustavad kolmnurkse häälepilu, mille tipp on suunatud epiglottis'e poole. Paludes uuritavat kordamööda hingata ja foneerida võime jälgida häälepaelu rahulikus seisundis ja liikumise momendil.

Epiglottis'est tahapoole suunduvad plica aryepiglottica'd. Nendel on mõlemal pool nähtavad kaks kõbrukest: cartilago aryaenoidea kohal asetsevast cartilago corniculata'st tingitud kõbruke ning sellest lateraalsemal asetsev tuberculum cuneiforme, mis on tingitud samanimelisest väikesest kõhrest. Õige larüngoskoopia peab andma täieliku ettekujutuse kõri kõikidest detailidest.

Kõri ühe või teise seina detailsemaks vaatluseks kasutatakse mõningaid kaudse larüngoskoopia modifikatsioone. Kõri tagumise seina täpsemaks vaatluseks kasutatakse kaudset larüngoskoopiat Killiani meetodil: haige seisab, painutades pea veidi ette ja allapoole, arst larüngoskopeerib istudes või põlvitades.

Vajadusel saada täpsemat ettekujutust eesmisest komissuurist ja epiglottis'e sisepinnast (eriti kui viimane on liialt taha painutatud), jääb haige istuvasse asendisse, painutades pea veidi taha, arst aga teostab larüngoskoopiat seistes.

Enamikul patsientidel õnnestub kaudne larüngoskoopia kergesti, mõnedel on aga vaatlus raskendatud seoses neelu hüpersteesiaga, mille tõttu peegli sisseviimine neelu põhjustab okserefleksi. Sellistel juhtudel tuimastatakse eelnevalt neelu limaskestast kokaiinilahusega (lastel 3 - 5 %-line, täiskasvanutel 10 - 20 %-line) või 1 - 2 %-lise dikaiinilahusega.

Vahel esineb larüngoskopeerimisel raskusi keele väljatoomisega (lõualuude ja keele vigastuste puhul, glossiidide, suupõhja flegmoonide jm. puhul). Nendel juhtudel surutakse

keel spaatliga vastu suupõhja ja kõripeegel viiakse vastu uvulat. Kõige parem on arstil vaatlust läbi viia siis, kui patsiendi pea on kõrgemal arsti peast. Kuna nendel haigetel esineb tavaliselt tugev salivatsioon, kõha, limaskesta kõrgeenenud tundlikkus, on kõri ja neelu tuimastamine vastunäidustatud või teostatamatu. Sel juhul vaatluse läbiviimiseks süstitakse morfiini ja atropiini ning otseselt neelu või nina kaudu tilgutatakse 10 - 15 tilka 1 %-list dikaiinilahust.

Analoogilised raskused tekivad mõnikord ka väikelaste kõri vaatlusel, sest laps võib karta arsti, keelduda suud avamast, tekivad kõrispasimid ja sülje rohke kogunemine. Nendel juhtudel kasutatakse samuti spaatlit. Kõri on nähtav tavaliselt spasmi ja karjumise momendil või sissehingamisel.

Otsene larüngoskoopia (laryngoscopia directa).

Kui kaudne larüngoskoopia ei õnnestu (anatoomiliste iseärasuste, kõrgeenenud reflekside tõttu), samuti enamikul väikestel lastel, kellel kõri kaudne vaatlus pole läbiviidav, rakendatakse otsest larüngoskoopiat. Selle meetodi abil teostatakse ka kirurgilisi manipulatsioone.

Otseseks larüngoskopeerimiseks kasutatakse spetsiaalset seadeldist - larüngoskoopi, mille sisseviimiseks on vaja kaotada normaalselt esinev anatoomiline 90°-ne nurk suukoo- pa ja kõritelje vahel, selleks painutatakse pea maksimaalselt taha.

Oma ehituselt on larüngoskoobid erinevad. Valguseallikas võib olla väljaspool larüngoskoopi või ka monteeritud tema proksimaalsesse või distaalsesse osasse. Laialdasemalt kasutatakse järgmisi larüngoskoope:

1. Tihhomirovi spaatel, koosneb spaatlist ja käepidemest, mis on ühendatud täisnurga all. Spaatel on rennikujuline, külje peal pilu, ots veidi ümmardatud. Üleval on spaatlil plaadike, mis toetub larüngoskoopia ajal vastu haige ülemisi hambaid. Plaat on lame, pealt sooneline, et spaatlit ei saaks välja lükata. Komplektis on 2 spaatlit: üks väikelaste, teine suuremate laste ning täiskasvanute jaoks.

Erinevad on need sellepolest, et täiskasvanute spaatlis on plaadike liikuv ning seda võib pikendada vajaduse korral. Valgustus saadakse otsmikurefleksorilt.

2. Undritsa universaalsel direktoskoobil on 3 äravõetavat spaatlit: laste, täiskasvanute ja intubatsiooni jaoks silma kontrolli all. Spaatlid lükatakse massiivsesse pide-
messe. Valgustus saadakse elektripirnikesest, mis asetseb spaatli distaalses otsas.

Undritsa spaatli külgmine pilu on laiem kui Tihhomirovi spaatlil. See võimaldab paremini manipuleerida kõris, samuti võimaldab sisse viia bronhoskoobi toru.

Larüngoskoobi sisseviimise tehnika on järgmine. Haige lamab laual selili ilma padjata, pea asetseb üle laua serva. Abiline painutab uuritava pea taha. Endoskoopiat teostav arst, seistes haige pea juures, viib spaatli libistades mööda keele pinda neelu. Kui spaatli ots libiseb keelepärale, tuleb nähtavale epiglottis'e serv - see on larüngoskoopia esimene moment. Teine moment - epiglottis'e fikseerimine ja tõstmine. Selleks viiakse spaatli ots epiglottis'e alla ja surutakse epiglottis koos keelepäraga ülespoole - tulevad nähtavale arükõhred ja häälepaelad. Kuna kõri on väga tundlik elund, on vaja enne otsest larüngoskoopiat seda korralikult tuimastada. Sellega välditakse kõha, valu ja kõrispasmide tekkimist larüngoskoobi sisseviimisel, samuti šoki teket. Kasutatakse lokaalset ja juhteanesteesiast. Lokaalseks anesteesiaks kasutatakse täiskasvanutel 5 - 10 %-list kokaïnilahust, lastel - kokaiini väiksemaid kontsentratsioone. Anesteetikume manustatakse kas määrimise või insuffleerimise teel. Tuimastamine toimub kindlas järjekorras 1-2 minutiliste intervallidega. Algul tuimastatakse neelu tagumine sein ja keelepära, siis kõri väline ring ja häälepaelad. Juhteanesteesia puhul süstitakse n. laryngeus superior'i ümber 2 - 3 ml 0,5 %-list novokainilahust.

Vastunäidustused otseseks larüngoskoopiks on samad, mis trahheobronhoskoopia puhul (vt. allpool).

Stroboskoopia (stroboscopia). Stroboskoopia on häälepaelte liikumise jälgimine kaudse larüngoskoopia ja katkendliku valguse kasutamise abil. Sel teel saadakse näiline häälepaelte liikumise aeglustumine, võimaldades jälgida liikumise üksikuid faase, mis ei ole nähtavad kõri tavalisel vaatlusel. Selleks protseduuriks kasutatakse stroboskoopi.

Stroboskoopia põhineb järgmisel optilisel nähtusel. Seoses silma võrkkesta katkendlike ärritustega, mis on ruumiliselt üksteisest eraldatud, tekib liikumise tunne; näiva liikumise kiirus sõltub ärrituse resp. vilkumise sagedusest.

Stroboskoopiaks on vajalikud: valgusallikas, otsmikurefleksor, kõripeegel ja valguse katkestaja. Otsmikurefleksori ja kõripeegli abil suunatakse katkendlik valgus kõrri.

Stroboskoopia puhul võivad häälepaelad näida paigalseisvatena (seisev pilt) või aeglaselt liikuvatena. Häälepaelte näiv liikumatus saavutatakse häälepaelte võnkumise perioodi ja valguse katkestamise sageduse täielikul kokkulangemisel, aeglasti võnkumisi täheldatakse aga väikese vahe tekkimisel valguse katkestamise sageduse ja häälepaelte võnkumiste perioodi vahel. Kui näiteks häälepaelte võnkumise sagedus on 200 korda, valguse katkestamise sagedus aga 201 korda sekundis, siis vaatlusel tekib mulje, nagu teeks häälepael ühe võnkumise sekundis. Stroboskoopiliselt jälgitava objekti seisvat pilti või näivat aeglast liikumist võib seletada järgnevalt. Objekti võnkumise kiiruse ja valguse katkestamise sageduse kokkulangemisel langeb valgus alati ühele ja samale objekti võnkumise faasile ja viimane tundub paigalseisvana. Kui aga samas ajavahemikus valguse katkestamise sagedus erineb objekti võnkumise sagedusest, siis tekib objekti aeglase liikumise tunne, näiteks, kui ühes sekundis toimub 10 valguse katkestamist ja 11 objekti võnkumist, siis langeb valgus järjekordse objekti liikumise erinevatele faasidele ja tekib objekti aeglase võnkumise mulje.

On olemas 2 tüüpi stroboskoopi: mehhaaniline ja elektronstroboskoop. Mehhaanilises stroboskoobis asetseb valgusallika ees ketas, mille sees on üksteisest võrdsete vahekaugustega pi-

lud (valguse läbimiseks). Ketas pannakse tiirlema soovitava kiirusega mootori abil, millega saadakse katkendlikku valgust. Pöörlev ketas tekitab üheaegselt heli, mis oma kõrguse poolest vastab ketta pöörlemise kiirusele. Uuritav peab kordama seda tooni, mida kogu aeg täpselt teha on võimatu, samuti on voolupinge ebahütlane, selle tõttu valguse katkestamise kiirus veidi muutub ja häälepaelte liikumine näib aeglasena.

Elektronstroboskoop häälestub mikrofoni abil automaatselt uuritava hääle järgi vastavale sagedusele ja saadab neoon- või ksenoonlambilt katkendlikku valgust.

Stroboskoopiat kasutatakse kõri funktsionaalsete ja orgaaniliste muutuste määramiseks. Stroboskoopia võimaldab määrata hääleaparaadi seisundit lauljatel, lauluõpilastel ja professionaalsete häälehäiretega isikutel. Kõripõletiku puhul lubab stroboskoopia määrata kahjustuse suurust, häälepaelte halvatusnähte ja orgaanilisi muutusi, sellepärast võib stroboskoopiat kasutada kõrituumorite varaseks diagnostikaks.

Kõri röntgenograafia.

Kõri röntgenograafiat kasutatakse kui täiendavat uurimismeetodit. See on näidustatud eriti neil juhtudel, kui otsene või kaudne larüngoskoopia teostamine on võimatu või on piiratult võimalik. Ainult röntgenogrammi alusel võib otsustada kõri kõhrede konfiguratsiooni (peamiselt täiskasvanutel) ja nende luustumise astme üle, subglotilise ruumi ja kõrivatsakeste seisundi üle. Röntgenograafia tähtsus on eriti suur röntgen-kontrastsete võõrkehade kindlakstegemisel, kõri- kasvajate (eriti subglotiliste) puhul, kui on vaja määrata kasvaja ulatus ja kõhre kahjustus, kaelafistulite ulatuse ja käigu määramisel kontrastainega jne. Eriti suure tähtsusega on mainitud juhtudel kõri tomograafia, mis võimaldab detailsemalt uurida kõri ja eriti täpselt määrata kõrivatsakeste ja subglotilise ruumi seisundit, kuna just nende piirkondade endoskoopiline uurimine ei võimalda täit ülevaadet. Tomograafia võimaldab määrata samuti patoloogilise protsessi (näiteks vähi) ulatust jne.

Trahhea ja bronhide uurimine.

Trahheobronhoskoopia (tracheobronchosopia).

See meetod on trahhea ja bronhide otseseks vaatluseks spetsiaalsele elektroskoobi abil. Larüngoskoopia puhul õnnestub tihti näha esimesi trahhea rõngaid, mõnikord isegi teres ulatuses kuni bifurkatsioonini. Kuid taolise uurimisega ei saa piirduda, vaid tuleb kasutada keerulisemat meetodit - trahheobronhoskoopiat.

Trahheobronhoskoopia näidustuseks on võõrkehade, kasvaja, infektsioossed granuloomid ja teised protsessid trahheobronhiaalpuus. Trahheobronhoskoopiat kasutatakse samuti rea bronhopulmonaalsete haiguste diagnostikaks ja teraapiaks.

Trahheobronhoskoopiaks kasutatakse spetsiaalset elektroskoopi, mis koosneb valgustusseadeldisest, vaatlustorudest ja abiinstrumentaariumist.

Laialdast kasutamist on leidnud Brüningsi trahheobronhoskoop. Selles bronhoskoobis on revolvrilaolise pideme horisontaalsesse osasse monteeritud elektripiirnik, mida katab valgust koondav lääts. Viimase kohal on vaatepiluga kate, selle seesmisel pinnal asetseb peeglike, mille pinnalt valgus peegeldub eespool asetsevasse vaatlustorusse. Vaatlustorud on kahekordsed (välimine ja sisemine), erineva läbimõõduga ja pikkusega. Kõige suurem toru pikkus on 25 cm, vajadusel võib seda pikendada lisatoru abil (sisemine toru), mis viiakse välimise toru sisse. Välimise toru distaalne ots on ära lõigatud kühvilaoliselt. Sisemiste torude ülemisel otsal on vedru, mis satub välimises torus olevasse renni ning selle kaudu lükatakse edasi vajaliku sügavuseni. Kaugust määratakse ülemistest hammastest sentimeeterskaala abil, mis asetseb sisemise toru vedrul. Sisemiste (pikendus-) torude alumistel otstel on avakesed õhu läbipääsemiseks. Abiinstrumentaariumis on vaatihoidjad, pump lima äravõtmiseks ja näpitsad äravõetavate otsikutega. Otsikud on mitmesuguse kujuga erinevate võõrkehade eemaldamiseks ja biopsia tegemiseks.

Trahheobronhoskoopia eel on vajalik koguda täpne anamnees, uurida üldseisundit, eriti südame-veresoonkonna seisundit ja uurida rindkeret röntgenoloogiliselt. See kõik on vajalik vastunäidustuste väljaülitamiseks. Vastunäidustusteks trahheobronhoskoopiale on: üldine raske seisund, südame dekompensatsioon, ateroskleroos, hüpertoonia, aordi aneurüsm. Trahheobronhoskoopiat tehakse siis, kui patsient on söömatu.

Väikestele lastele tehakse trahheobronhoskoopiat ilma anesteesiata; neid ainult mähitakse korralikult linasse ja fikseeritakse. Suurematele lastele ja täiskasvanutele on tingimata vajalik anesteesia. Üldise tundlikkuse vähendamiseks süstitakse 1/2-1 tund enne manipulatsiooni 1 ml 1%-list morfiinilahust, 1 ml 2%-list pantopooni või antakse 0,1-0,2 g barbamüüli. Limaskesta sekretsiooni vähendamiseks süstitakse 1,0 ml Sol. atropini hydrochlorici 1:1000. Neel ja kõri tuimastatakse analoogiliselt otsese larüngoskoopia anesteesiale. Sügavamale, trahheasse ja bronhidesse viiakse anesteetikum (5-10%-line kokaiinilahus, 1-2%-line dikaiinilahus, 10-20%-line novokaiinilahus) kas kõrisüstla abil süstides või pikkamööda bronhoskoobi toru sügavamale viies ja ühtlasi insufleerides tuimastusvahendit.

Peale anesteesia on väga tähtis ka haige psühhoprofülaktiline ettevalmistus.

Trahheobronhoskoopiat saab teha nii istuvale kui ka lamavale haigele. Esimesel juhul arst seisab ja patsient istub madalal pingil tema ees. Patsient kallutab keha ettepoole, assistent painutab tema pea tahapoole. Teisel juhul lamab haige laual kas selili, kõhuli või külili.

Eksisteerib kaks trahheobronhoskoopia moodust: ülemine (tracheobronchosopia superior) ja alumine (tracheobronchosopia inferior). Esimesel juhul viiakse toru suu ja kõri kaudu, teisel - trahheotoomia ava kaudu.

Valuaistingute, ebameeldiva tunde (tingitud toru survest hammastele), okserefleksi ja hirmu kõrvaldamiseks võib trahheobronhoskoopia puhul kasutada üldnarkoosi. Üheaegne relax-

santide rakendamine põhjustab lihaste lõõgastumise ja kergendab toru sisseviimise trahheasse ja bronhidesse. Selleks tarvitatakse spetsiaalset, nn. hingamisbronhoskoopi, millel on vastav seadeldis hapnikuballooniga ühendamiseks, ning mille kaudu saab teha juhitavat hingamist.

Endoskoopiline uurimine üldnarkoosis nõuab ettevaatlikkust ja suuri kogemusi.

Tehnika arenemisega täiustuvad ka bronhoskoobid. Praegu tuntakse juba optilisi teleskoobe, millega on palju parem bronhiaalpuud vaadelda. Optilise bronhoskoobi abil õnnestub vaadelda segmentaarseid bronhe, mis eespool kirjeldatud tavaliise bronhoskoobiga ei ole nähtavad.

Röntgenograafia.

Trahhea ja bronhide haigestumiste puhul kasutatakse laialdaselt röntgendiagnostikat. Ülesvõtteil on võimalik sedastada trahhea ja bronhide õhusammast, mille kitsenemine näitab stenoosi kohta (kasvaja, aordi aneurüsm jne.). Võõrkehade satumisel hingamisteedesse võimaldab röntgenoloogiline uurimine kas otseselt (röntgenkontrastne) või kaudselt (kopsu atelektaasi järgi) avastada võõrkeha.

Väga tähtis on aga bronhiaalpuu uurimine kontrastainega - bronhograafia, mil bronhidesse viiakse kontrastaine, sagedamini jodolipool. Viimast võib teha mitmel viisil: süstida otseselt trahheasse läbi membrana cricothyreoidea bronhoskoobi abil või sondiga nina kaudu. Enne jodolipooli sisseviimist on vajalik anesteseerimine.

Kontrastainega täidetud bronhid annavad röntgenogrammil kindla pildi, patoloogilistel juhtudel võib avastada bronhide läbimatust, täitumisdefekti jne. Andes kehale vastava asendi võib valikuliselt täita teatud sagara bronhe. Seda on parem teha röntgen-kontrolli all ning siis pildistada.

Viimasel ajal kasutatakse bronhofluorograafiat. Uuringu vältel tehakse 12-20 ülesvõtet - bronhofluorogrammi. See võimaldab detailselt jälgida bronhide täitumist kontrastainega.

Kontrastaine evakueerimine bronhiaalpuust toimub rips-epiteeli tegevuse ja kõharefleksi abil. Bronhid vabanevad jodolipoolist 1 - 2 ööpäeva jooksul; alveoolidest aga evakueerub kontrastaine mitme nädala kuni mitme kuu ja isegi aasta vältel.

S ö ö g i t o r u u u r i m i n e .

Ösofagoskoopia (oesophagoscopia).

Söögitoru endoskoopiline uurimine võimaldab söögitoru terviklikult vaadelda vahetult silmaga. Kasutatakse sama elektroskoopi nagu bronhoskoopia puhul, ainult söögitoru uurimiseks võetakse vastavad torud. Nihutades ösofagoskoobitoru edasi-tagasi võib kindlaks teha muutusi söögitoru seintes, avastada ja eemaldada võõrkehi, teostada biopsiat. Söögitoru limaskest ei ole valutundlik, kuid vaatamata sellele on anesteesia vajalik selleks, et maha suruda neelu limaskesta tundlikkust ja okserefleksi ning vähendada hirmu protseduuri ees. Anesteseeritakse lokaalselt samade vahenditega nagu trahheobronhoskoopia puhul, ühtlasi rakendatakse baasisnarkoosi, s.t. süstitakse narkootilisi vahendeid. Ösofagoskoopia on operatsioon, sellepärast peab olema eelnevalt uuritud haige südame-veresoonkonda ja söögitoru röntgenoloogiliselt.

Vastunäidustused ösofagoskoopiaks on samad mis trahheobronhoskoopia puhul.

Ösofagoskoopiat saab teha ainult siis, kui patsiendi kõht on võimalikult tühi. Täis kõhuga vallanduvad kergesti okserefleksid, mis segavad menetlust.

Haige asend ösofagoskoopia ajal on sama mis trahheobronhoskoopia puhul.

Retrograadne ösofagoskoopia - söögitoru uurimise meetod, mis on võimalik ainult gastrostooma olemasolul, mida näiteks tehakse armkoe stenoosi või tuumorite puhul, kui söögitoru ei ole enam toidule läbitav. Sellistel juhtudel viiakse ösofagoskoobi toru gastrostooma kaudu makku ja sealt retrograadselt söögitorusse.

Söögitoru sondeerimine.

Sondeerimiseks kasutatakse pehmeid ja poolkõvu sonde, mis on erineva läbimõõduga. Vastava sondi läbimõõt, mis antud juhul läbib stenoseerunud söögitoru, annab ettekujutuse tema luumeni läbimõõdust. Poolkõvu sonde kasutatakse ka terapeutiliseks otstarbeks - söögitoru luumeni laiendamiseks stenooside puhul.

Sondeerimist kasutatakse põhiliselt armkoe stenooside laiendamiseks. Seda tehakse mitmel viisil:

1) Poolkõvad sondid viiakse iga päev 0,5 - 1 tunniks söögitorusse, püüdes sondeerimise vältel kasutada järjest suurema läbimõõduga sonde, et laiendada söögitoru luumenit. Seda moodust kasutatakse nii varase kui ka hilissondeerimise puhul.

2) Püsisondi kasutatakse tavaliselt varaseks sondeerimiseks. Ösofagusse viiakse sisse pehme maosond (7.-10. päeval peale söövitust), mis vahetatakse välja 8 - 10 päeva järel. Söögitoru küllaldase luumeni säilitamiseks kestab taoline drenaažravi 25 - 30 päeva.

3) Hilissondeerimiste hulka kuulub sondeerimine gastrostooma vahendusel. Kui söögitoru striktuur on väga tugev, siis tehakse toitlustamise eesmärgil gastrostoomia. Taolistel juhtudel haige neelab alla siidniidi, mille ots tuuakse maost välja ning kinnitatakse kõhunahale leukoplastiga, teine ots aga fikseeritakse põsele. Sondeerimiseks kinnitatakse niidi otsa külge elastne buzi ja tõmmates niidist, viiakse see söögitorust läbi. Sondeerida võib ka retrograadselt, alustades sondi läbitõmbamist gastrostooma kaudu.

Röntgenoloogiline uurimine.

Söögitoru röntgenoloogilisel uurimisel kasutatakse kontrastainet - barium sulfuricum'i. Söögitoru röntgenoloogiline uurimine annab ettekujutuse pinna reljeefist ja valendiku seisundist, võimaldab avastada röntgen-kontrastseid võõrkehi. Võõrkehi võib kindlaks teha ka kontrastainega immutatud vatitüki allaneelamisega, röntgeniga läbivalgustusel jääb nähtamatu võõrkeha puhul vatitükk sellele kohale peatuma.

KÕRVA UURIMINE.

Anamnees.

Hoolikalt võetud anamnees kergendab sageli diagnoosimist, samuti haige seisundi hindamist ja haiguse kulu prognoosimist. Üldiste anamnestiliste andmete kõrval (varem läbipõetud ja praegused haigused, elukutse jne.) tuleb eriti selgitada, millised häired esinevad haige kõrvades, millal ja millistel põhjustel on need tekkinud ja millises suunas arenenud.

Arst peab selgitama, kas ei ole eest põhjustatud häireid, nagu aterosklerootilised ja klimakteerilised kuul-

mishäired või otoskleroos jt., või elukutsest tingitud müra-
kahjustused katelseppadel, motoristidel, mitmesuguste toksii-
liste ainete toime sisekõrvadele (arseen, plumbum, elavhõ-
be jt.).

Eriti peab tähele panema järgnevalt toodud kaebusi.

Kuulmisvõime normaalne või nõrgenenud (nõrgenemise as-
te). Kuulmishäire teke: järsk või pikaldane, selle dünaami-
ka, kestus. Kõrges eas esineb aterosklerootiline kuulmis-
nõrkus - presbyacsis. Otoskleroos algab tavaliselt noo-
remas eas, 20 - 30 - 40 a. vahel, esineb rohkem naistel,
seostub sageli rasedusega. Lapseeas esineb sageli adenoidi-
dest tingitud kuulmetõrve sulgus, mis põhjustab kuulmishäi-
reid jne.

Teiselt poolt tuleb silmas pidada kuulmishäirete puhul
elukutsega seotud ja elukondlikke momente, nagu põetud hai-
gused, müra- ja vibratsioonitraumad, toksilised sisekõrva
ja kuulmisnärvi kahjustused (mitmesugused tööstuslikud ain-
ned, alkohol, nikotiin, arstirohud - kiniin, salitsüül,
mõned antibiootikumid, nagu neomütsiin, kolimütsiin, mütse-
riin, kanamütsiin, monomütsiin, streptomütsiin jt., pisiku-
te toksiinid - sarlakid, leetrid, meningiit - eriti epi-
deemiline ja tuberkuloosne, gripp, tüüfus, mumps, difteeria,
luues jt.), koljutraumad, hüpertoonia jne.

Kõrvakohinad - tekkeag, kas esinevad pidevalt või
perioodiliselt, kohina iseloom - sarnaneb tasasele metsa-
või veekohinale, putukapirinale, telefonitratide undamise-
le, vilele, vahel võib olla pulseeriva iseloomuga. Heli juh-
teaparaadi kahjustustest tingituna (välis- ja keskkõrv) esi-
nevad tavaliselt madalad, sisekõrvast - kõrgema iseloomuga
kõrvakohinad. Tavaliselt kaasub kõrvade kohisemisele ka kuul-
mise nõrgenemine, vahel võib kuulmisvõime sellejuures olla
aga täiesti normaalne. Kõrvakohinast tuleb eraldada peako-
hin, mis esineb vahel hüpertoonia ja ateroskleroosi puhul.

Kõrvavalu - teke, kestus, iseloom (terav, torkav, pul-
seeriv, tume). Kõrvavalud esinevad peamiselt ägedate kesk-
kõrvapõletikkude puhul enne perforatsiooni teket, olles selle-
juures tavaliselt pulseeriva iseloomuga, samuti väliskõrva-

põletikkude, mastoidiidi, vigastuste puhul jne. Mädaste komplikatsioonideta otitiide puhul kõrvavalud puuduvad või on väga tagasihoidlikud. Sageli võivad kõrvavalud olla reflektorset laadi, irradieeruda kõrvadesse naaberelundeist. Põhjusena võivad arvesse tulla põletikulised protsessid nina-kõrvalkoobastes, neelus (angiin ja selle tüsistused), mandibulaarliigeses, kaela piirkonnas, kõris, hambavalud, ülemiste hingamisteede tuberkuloos, kasvajak, oksipitaal- ja trigeminusneuralgia jne.

Eritus kõrvadest - algus, kestus, hulk, iseloom. Ägeda mädase otitiidi puhul on eritus kõrvast tavaliselt limajas-mädane, väliskõrvafurunklite puhul limajas iseloom puudub. Ägeda otitiidi puhul ei ole kõrvamäda erilise lõhnaga, kuid kroonilise protsessi puhul, eriti kui esineb kolesteatoomne protsess ja luukahjustus, võib tulla kõrvast vinavat eritist. Verine eritis kõrvast võib esineda vigastuste, müringiidi (gripiotiit) ja kroonilise polüpoosse või granulatatsioonidega otitiidi puhul.

Tasakaaluhäired - peapööritus, iiveldus, oksendamine, kukkumiskalduvus - teke, iseloom, kestus, perioodilisus. Sisekõrvast tingitud tasakaaluhäirete puhul esineb kindlasuunaline pearinglemine, haige tajub, et esemed tema ümber pöörlevad kindlas suunas, või et ta ise tiirleb. Kõrvalekaldu mine kõndimisel ja kukumine on samuti kindlasuunalised.

Käesolevale haigusele kaasuvad, eelnenud ja varempõetud haigused, arvatavad haiguse põhjused - nohu, angiin, ülemiste hingamisteede põletikud, nakkushaigused: sarlakid, leetrid, gripp, difteeria, tüüfus, tuberkuloos, luues, malaaria, traumad, kontusioonid, võõrkehad, plahvatused, õnnetusjuhtumid, suplemise, kratsimise tagajärjed, professionaalsed tegurid, ravimid (salitsülaadid, streptomütsiin, kiinaalsed tegurid, ravimid).

Lõpuks tuleb võtta perekonnaanamnees ning selgitada läbiviidud ravi, selle kestus, tulemused.

Kõrva objektiivne uurimine.

Eristatakse füüsikalisi (vaaflus, palpatsioon, otoskopia jne.) ja funktsionaalseid (kuulmis- ja tasakaalufunktsioon) kõrva uurimise meetodeid.

Füüsikalised uurimismeetodid.

Välisvaatlus (inspeksioon). Jälgitakse kõrvalesta kuju, suurust, asendit, kuulmekäigu välisava, nibujätke piirkonda, kõrva ümbrust, mahlasõlmi. Patoloogiliste protsesside puhul võib märgata turset kõrvalestal (perikondriit, othematoom), kuulmekäigu välisava või tragus'e piirkonnas (väliskõrvapõletik), nibujätkel (mastoidiit), kõrvaümbruse lümfisõlmede piirkonnas, gl. parotis'el (parotiit) jne. Kõrvalesta kuju muutused võivad olla tingitud arenguhäiretest (anotia, microtia, macrotia) või patoloogilistest protsessidest (traumad, perikondriit, othematoom). Mastoidiidi puhul võib kõrvalest olla peast eemale surutud.

Palpatsioon. Kõrvaldatakse sõrmede abil kõrvalesta, tragus'e piirkonda (valulikkus ja turse väliskõrvapõletiku puhul). Nibujätkel esineb valulikkus palpeerimisel või klopimisel mastoidiidi puhul, vahel ka ägeda otitiidi algjärgus (mastoidism). Mastoidiidi puhul võib nibujätke piirkonnas esineda infiltraat, subperiostaalse abstsessi puhul on tunda mäda fluktuatsiooni. Mastoidiidi erivormide puhul võib turse ulatuda kõrvalestast üles- ja ettepoole sarnajätke piirkonda (tsügomatitsiit) või nibujätkest allapoole (Bezoldi mastoidiit). Palpeeritakse samuti kõrvaümbruse lümfisõlmi, mandibulaarliigest, gl. parotis'e piirkonda.

Otoskopia (otoscopia) on endoskoopiline meetod kuulmekäigu, kuulmekile ja selle defektide puhul ka trummiõõne uurimiseks. Otoskopiaks kasutatakse reflekteeritud valgust ja kõrvapeeglit. Selleks on erineva kaliibriga koonusekujulised metalltorukesed vastavalt kuulmekäigu avarusele.

Kuna kuulmekäik on S-kujuliselt kõver, osutub otoskoopia-

rimisel vajalikuks see kõverus õgvendada. Selleks tõmmatakse kõrvalest üles- ja tahapoole; väline, kõhrelises osas asuv kõverus kaob ega esine enam takistust otoskopeerimisel. Väikelastel puudub luuline kuulmekäik, nendel tõmmatakse kõrvalest alla- ja tahapoole.

Otoskoopia ajal istub patsient otse arsti ees, valgusallikas asub paremal pool umbes kõrva kõrgusel. Pea pööramisega viiakse uuritav kõrv arsti poole, otsmikureflektori abil juhitakse valgus soovitud kohta.

Parema kõrva uurimisel haaratakse kõrvalest vasaku käe esimeste sõrmedega, kõrvapeegel võetakse parema käe esimeste sõrmede vahele ning viiakse ettevaatlikult kergete pöörlevate liigutustega kuulmekäigu kõhrelisse ossa umbes 1 sm sügavusele kuulmekäigu telje suunas. Edasi fikseeritakse kõrvapeegel vasaku käega, parem käsi jääb vabaks instrumentide käsitsemiseks ja pea paigalhoidmiseks ning liigutamiseks. Kõrvapeegli sisseviimisel lükatakse kõrvale kuulmekäigu välises osas leiduvad karvad, samuti väikesed vaigukübemekesed. Kõrvapeegel viiakse ainult kuulmekäigu välimisesse, mobiilsesse ossa, hoidudes sattumast luulisse ossa, kuna see on valus. Otoskopeerimisel võib tekkida reflektorne kõha ramus auricularis n. vagi ärritusest, samuti refekshüperemia kuulmekilel.

Vasaku kõrva uurimisel haaratakse kõrvalest parema, peegel vasaku käega. Hiljem jääb parem käsi jällegi vabaks, kõrvapeegel hoitakse kuulmekäigus vasaku käe esimese ja teise sõrme vahel, kuna väikesed sõrmed on fikseeritud vastu koljut.

Neljast kuni viiest eri suurusega kõrvapeeglist kasutatakse võimalikult suurt, et saada laialdasemat vaatevälja. Väikese kõrvapeegli abil näeme korraka ainult osa kuulmekilest. Selleks et saada täielikku ülevaadet, on vaja peegli asendit muuta. Kõigepealt jälgitakse kuulmekäiku, siis kuulmekilet (olulisem osa otoskopeerimisel). Selleks, et saada õiget ülevaadet, on vaja uurida mõlemat kõrva ja nende seisundit omavahel võrrelda. Reeglina otoskopeeritakse enne tervet, siis haiget kõrva.

Üsna tihti on otoskopeerimisel takistuseks kuulmekäigus leiduv kõrva vaik, epidermisemassid, sekreet, vahel ka võõrkehad. Kõrva puhastatakse vati ja sondi, vaigukonksu või kõrvaloputuse abil. Kõrva loputamiseks kasutatakse suurt tavaliselt 100 ml mahuga metallist või klaasist kõrvasüstalt, mis on varustatud küllalt pika, tõmbi otsikuga vedeliku juhtimiseks kuulmekäiku. Loputuseks kasutatakse sooja, umbes kehatemperatuuriga vett, et hoiduda labürindi ärritusest. Süstal hoitakse paremas käes, kõrvalest tõmmatakse vasaku käe esimese ja teise sõrme vahel taha- ning ülespoole, samuti nagu otoskopeerimisel. Väikeste sõrmedega fikseeritakse süstla ots, et vältida kuulmekäigu või kuulmekile vigastust. Loputamisel juhitakse veejuga kuulmekäigu tagumise seina suunas. Vesi satub kuulmekile ja vaigukorgi vahele. Viimane surutakse kuulmekäigust välja. Kõvaks kuivanud vaigukork ei eemaldu alati ühekordsel loputamisel. Sellistel juhtudel tuleb kõrva loputada korduvalt 1 - 2 päevaste vahedega, tarbe korral enne vaigukorki pehmendades soodalahuse, vesinikülihapendi või õli abil.

Loputusvedelikku ei või viia kuulmekäiku liiga tugeva surve all, vastasel korral võib tekkida kuulmekile rebend.

Kuulmekäigust väljuv loputusvedelik kogutakse kõrva alla asetatud neerukaussi. Kompaktse vaigukorgi puhul on loputusvedelik puhas. Põletikuline sekreet muudab vedeliku kergelt häguseks või esineb väikeste klumbikestena. Kolesteatoomse protsessi puhul võime näha veepinnal ujumas väikesi valkjaid helbekesi.

Sellistel juhtudel, kui kahtlustame, et kuulmekiles võib esineda kuiv perforatsioon (anamnestiliselt varem kesk-kõrvapõletik, kõrvatrauma), tuleb kõrvaloputusest loobuda, kuna sel teel võime viia infektsiooni trummiõõnde ja soodustada keskkõrvapõletiku teket. Sellistel juhtudel võime vaigukorgi kuulmekäigust eemaldada kõrva pintsettide, kõrvalusika, vaigukonksu või kõrvasondi abil. Kõrvasond on umbes 15-20 cm pikkune metalltraadike, mille ühes otsas on käepide või aas hoidmiseks, teine ots on varustatud vindiga vati kinnitami-

seks. Väike vatitükike keeratakse sõrmede vahel tugevalt sondi külge selliselt, et metallots välja ei ulatuks. Son-di ja vati abil võime kuulmekäigust eemaldada väikesi vaigu-tükikesi, epidermiseosakesi ja sekreeti.

Normaalne otoskoopiline pilt.

Normaalselt on väliskulmekäigu seinad siledad ja tava-lise naha värvusega. Kuulmekäigus võib leiduda vähesel mää-ral vaigukübemeid. Karvakesed leiduvad kuulmekäigu välises osas, kõrvapeegli abil saavad need tavaliselt kõrvale suru-tud. Naha muutused (turse, punetus), kuulmekäigu ahenemine, ülemise seina allalangemine, sekreedi, koorikute leidumine ja vaikumistus kuulmekäigus on patoloogilised nähud.

Otoskopeerimisel on kõige olulisem kuulmekile vaatlus, selle seisundi ja muutuste hindamine. Normaalselt on kuulme-kile nähtav peaaegu tervikuna, välja arvatud õige väheldane eesmine serv, mille tavaliselt katab kuulmekäigu kõverus. Kuulmekile on veidi ovaalse kujuga, läbimõõt ühes suunas 8-10 mm, teises suunas 9-11 mm. Kuulmekile ei asetse kuulme-käigu telje suhtes risti, vaid nurga all selliselt, et üle-mine ja tagumine osa kuulmekilest on kehapinnale lähemal kui alumine ja eesmine. Sellejuures on kuulmekile keskmine osa lehtrikujuliselt sisse tõmbunud, moodustades naba (umbo).

Kuulmekile on normaalselt valkjashall, pärlmutrivär-viline, kergelt läbikumenduv. Kuulmekile ülemises eesmises osas võime eristada väikest väljaulatuvat kõbrukest - vasa-
ra lühike jätke (processus brevis mallei), sellest kulgeb põiki taha ja allapoole lai veidi kollakas joon - vasara-pide (manubrium mallei), mis lõpeb tsentraalselt laieneva vasarapideme otsaga - naba (umbo). Siit kulgeb ette ja al-lapoole kolmnurkne läikiv valgusrefleks, mis on tingitud val-guskiirte tagasipeegeldumisest selles piirkonnas. Proc. bre-vis mallei'st lähtuvad eesmine ja tagumine vasarakurd (plica malleolaris ant. et post).

Juhtudel, kui kuulmekile on sisse tõmbunud, võib eelni-

metatud orienteerimispunktide kuju ja asend muutuda. Valgusrefleks lüheneb, kitseneb, võib isegi täiesti kaduda. Proc. brevis mallei ulatub kuulmekilest tunduvalt rohkem väljapoole kui tavaliselt, manubrium mallei näib lühemana.

Seega orienteerumispunktid võimaldavad eraldada kuulmekilet ümbritsevast kuulmekäigu nahast ning nende abil on võimalik otsustada ka kuulmekile seisundi ja keskkõrvas asetleidvate muutuste üle. Kuulmekile võib olla armistunud, deformeerunud, sisaldada lubilaigukesti. Kuulmekile terviklikkus võib olla häiritud, selles esinevad avad - perforatsioonid. Nende suurus võib olla väga varieeruv - punkti-taolisest mulgustusest kuni kuulmekile täieliku puudumiseni. Suurte perforatsioonide puhul on hästi näha trummiõõs ja selle mediaalne sein, ka promontoorium. Patoloogilistel juhtudel võib trummiõõnes leida granulatsioone, polüüpe, kolesteatoommassi.

Asukoha järgi jaotatakse perforatsioonid tsentraalseteks ja servapidisteks. Tsentraalsed perforatsioonid asuvad pars tensa osas (mesotümpanaalsed perforatsioonid), suuruse poolest võivad olla varieeruvad, perforatsiooni serva ja kuulmekäigu luulise seina vahele jääb aga ikka kitsam või laiem kuulmekile ribake. Seinapidised perforatsioonid asetsevad peamiselt membrana Shrapnelli osas, sellepärast nimetatakse neid ka epitümpanaalseteks. Jälgida tuleb ka perforatsiooni servade seisundit. Vahele võib esineda mitu perforatsiooni. Erituse puhul kõrvast tuleb jälgida selle hulka ja omadusi.

Kuulmekile seisund ja selle muutused tulevad täpselt kirjeldada. Muutuste asukoha täpsemaks määramiseks jaotatakse kuulmekile nelja kvadranti. Manubrium mallei ja selle pikenduse abil jaotub kuulmekile eesmise ja tagumiseks osaks, sellele ristiasetseva mõttelise joone abil, mis läbib umbot, ülemiseks ja alumiseks osaks. Nii saame eesmise ülemise, eesmise alumise, tagumise ülemise ja tagumise alumise kvadranti. Anatoomiliselt eraldatakse pingul osa (pars tensa) ja lõtv osa (pars flaccida).

Otoskopeerimisel on oluline ka kuulmekile liikuvuse mää-

ramine, mis mõningatel juhtudel (armistumine, liited) võib väheneda või täielikult puududa. Tavalisel vaatlusel ei saa kuulmekile liikuvuse üle otsustada. Selleks kasutatakse pneumaatilist kõrvapeeglit (Siegler), mis on varustatud kummballooniga, välisava on suletud luubiga. Pneumaatilise kõrvapeegli abil kuulmekäigus õhurõhku muutes (tõstes või langetades) saame määrata kuulmekile liikuvust. Kuulmekile perforatsioonil puhul rõhudiferentsi trummiõone ja kuulmekäigu vahel ei teki ja kuulmekile pole seetõttu liikuv.

Pneumaatilise kõrvapeegli ava ette asetatud luup võimaldab detailsemalt uurida kuulmekile üksikuid osi. Tarbe korral võime kasutada ka tavalist luupi, asetades selle kõrvapeegli ava ette.

Kuulmetõrve (tuba auditiva) uurimine.

Normaalses olekus on kuulmetõri suletud, avaneb tavaliselt neelamise ajal, võimaldades õhu ventilatsiooni trummiõones. Kuulmetõrve läbitavust uuritakse õhusurve abil. Kui viia õhku tuba auditiva kaudu cavum tympani'sse, võime näha selle tagajärjel kuulmekile liikumist, samal ajal auskulteerides kuuleme kahinat. Selle kuulamiseks kasutatakse otoskoopi - kummitoru, mille kumbki ots on varustatud oliiviga; üks neist asetatakse haige, teine arsti kõrva. Kui kuulmetõrve läbitavus on normaalne, kuuleme tasast vesikulaarset kahinat. Valendiku ahenemisel on õhu läbitavus kuulmetõrvest takistatud, kohin muutub teravamaks vihinaks, vahel isegi viletaoliseks, võib olla katkestatud. Täielikult tuba auditiva sulgumisel ei läbi õhk seda ka intensiivse surve puhul ja mingisugust kahinat ei ole kuulda.

Kuulmetõrve läbitavuse määramiseks kasutatakse järgmisi katse:

Toynbee kats. Neelamisel suletud nina ja suuga tekib ninaneelus ja selle tagajärjel kuulmetõrvedes ning trummiõones rõhu muutus, mis põhjustab kuulmekile liikumise. Haige tunneb sel puhul kõrvas plõksumist, otoskopeerimisel on nähtav kuulmekile liikumine.

Valsalva kats. Suu ja ninasõõrmed suletakse, puhutakse tugevasti õhku väljapoole. Ülemistes hingamisteedes õhurõhk tõuseb, kuulmetõrved avanevad ja õhk surutakse trummiõõnde. Kuna rõhu tõus on suhteliselt väike, siis kuulmetõrve avanemine toimub ainult suhteliselt hea läbitavuse puhul. Kuulmetõrve sulguse all kannatavad haiged teostavad sageli ise sel teel kõrvade läbipuhumist. Liiga tugeval pressimisel võib aga armistunud kuulmekile rebeneda ja tekkida perforatsioon. Nohu puhul on Valsalva ja samuti teiste kuulmetõrve läbipuhumise katsude teostamine vastunäidustatud, kuna sel teel võime vliia põletikulist sekreeti ninaneelust trummiõõnde ja soodustada keskkõrvapõletiku teket.

Kuulmetõrvede läbipuhumine ballooniga (Poltzeri kats). Kasutatakse oliiviga varustatud kummiballooni. See võetakse paremasse kätte, oliiv asetatakse ninasõõrmesse. Vasaku käe pöidla ja nimetissõrmega surutakse ninasõõrmed kinni. Haiget lastakse öelda "k" tähte sisaldavat sõna (šokolaad, ku-ku, üks-kaks) või neelata ja surutakse balloonist õhku ninasse. Neelamisel ja "k" hääldamisel tõuseb pehme suulagi üles vastu neelu tagumist seina ja ülemine neeluosa isoleeritakse; õhu läbipääs on takistatud. Suulaelihased (musc. tensor et levator veli palatini) avavad kuulmetõrve. Õhk satub surve all läbi kuulmetõrve trummiõõnde.

Kuulmetõrve kateteriseerimine. See toimub painutatud otsaga peene metallkateetri abil, mille väline ots on lehtrikujuliselt laiem ja varustatud konksuga kõvera otsa suuna määramiseks. Eelnevalt tuimastatakse ninalimaskestast 2 %-lise dikaiinilahusega. Kateeter viiakse sisse läbi nina kõvera otsaga vastu nina põhja kuni vastu neelu tagumist seina. Edasi teostatakse pööre 90° mediaalsele ja tõmmatakse kateeter tagasi kuni kõver ots jääb peatuma vastu septum nasi tagumist serva. Nüüd sooritatakse 180° - 200° pööre alt lateraalsele. Nii viiakse kateetri konksutaoline ots kuulmetõrve avasse. Ballooni abil surutakse õhk läbi kateetri kuulmetõrve kaudu trummiõõnde. Otoskoobi abil kuulatakse õhu läbitavust kuulmetõrvest.

Kuulmetõrve kateteriseerimisel tuleb olla ettevaatlik, et mitte vigastada neelu limaskestast kateetri otsaga. Õhu sattumisel limaskestast alla tekib valu, õhkemfüseem. Kui haige kaebab valu, tuleb läbipuhumine katkestada.

Kui kateteriseerimisel puhutakse läbi korruga üks, siis eelmiste katsude puhul (Valsalva, Politzeri kats) korruga mõlemad kuulmetõrved.

Kuulmetõrve funktsioonihäire puhul reguleeritakse läbipuhumisega õhurõhku trummiõõnes, mille läbi kuulmine paraneb. Seega võib kuulmetõrvede läbipuhumist kasutada nii diagnostilisel kui ka terapeutilisel eesmärgil.

Kuulmetõrve kateetri abil on võimalik ka tuba auditiva bušeerimine peene elastse buzi abil.

Auskulteerimise kõrval on kuulmetõrve läbitavust võimalik hinnata veel kõrvamanomeetri abil. Vojatšeki manomeeter koosneb Y-kujulisest kolmeharalisest metalltorukesest, mille kuulmekäiku asetatav ots on ümbritsetud kummikapsliga, teine on ühendatud klaaskapillaariga, kolmas toruke on eelmistest eraldatud ja ühendab kummikapslit kummiballooniga. Kuulmekäiku asetatud kummikapsel surutakse ballooni abil õhku täis, kuulmekäik suletakse hermeetiliselt. Klaaskapillaari sisse võetakse piiritusetilk. Õhu tungimisel kuulmetõrve kaudu trummiõõnde (neelamine, Toynbee, Valsalva kats, läbipuhumine ballooni abil) toimub siin rõhu muutus, mis kandub kuulmekile vahendusel edasi kuulmekäiku ja põhjustab piiritusetilga liikumise klaaskapillaaris.

Gerassimovi manomeeter on lihtsam, kujutab endast plastmassist kapillaari, mille üks ots on varustatud oliiviga ja asetatakse kuulmekäiku. Kapillaaris leiduva piiritusetilga liikumine toimub analoogiliselt eelmisele.

Kõrva röntgenoloogiline uurimine toimub röntgeniülevõtete abil, mis võimaldavad jälgida nibujätke rakkude struktuuri, pneumatisatsioonist, sisekõrva, püramiidi, antrumi piirkonda, trummiõõnt, kuulmekäiku jne.

Kasutatakse järgmisi põhilisi projektsioone:

Schülleri projektsioon toob hästi nähtavale nibujätke

rakustiku ja kasutatakse muutuste jälgimiseks selles piirkonnas.

Mayeri projektsiooni puhul on ülevaade antrumi piirkonnast ja trummiõõnest ning seda rakendatakse peamiselt kroonilise otiidi puhul. Valades trummiõõnde kontrastvahendit tulevad röntgenipildis paremini nähtavale luulised muutused, samuti on sel teel võimalik jälgida kuulmetõrve läbitavust.

Stenversi projektsioon võimaldab hinnata sisekõrva ja püramiidi seisundit.

Ginsburgi projektsiooni kasutatakse imikutel antrumi nähtavale toomiseks. Ülesvõtte tehakse mõlemast kõrvast, et nende seisundit võrrelda.

Kuulmisanalüsaatori funktsiooni uurimine.

Kuulmisfunktsiooni uurimise eesmärgiks on kindlaks teha kuulmisteravus, selle languse aste, iseloom, ülelääveliste kuulmise omaduste hindamine jne.

Eristatakse põhiliselt kaht liiki kuulmishäireid:

Heli juhteparaadi (kesk- ja väliskõrv) kahjustus - põhjustab eeskätt madalamate helide kuuldavuse languse.

Heli vastuvõtuaparaadi (sisekõrv) kahjustus - langenud on eelkõige kõrgete helide kuuldavus.

Kuulmise määramiseks kasutatakse järgmisi heliärritusi: 1) kõne, 2) helid (heliargid, audiomeeter, muusikalised instrumendid), 3) mürad.

Ruum, kus kuulmist määratakse, peab olema vaikne, kõlavaba. Tingimused ruumis mõjustavad suuresti uurimistulemusi.

Kuulmise uurimine kõne abil on kuulmisanalüsaatori funktsioonivõime hindamisel põhiluseks, kuna kõne tajumine osutub kuulmisprotsessis kõige tähtsamaks. Pealegi on seda väga lihtne läbi viia, ei ole vaja erilisi abivahendeid.

Enne kuulmise kontrollimist teostatakse kõrva läbivaatus, kusjuures vajaduse korral kuulmekäik puhastatakse. Uuritakse mõlemat kõrva eraldi. Teise kõrva väljalülitamiseks suletakse kuulmekäik sõrmega vajutades tragus'ele või vati-tropi abil. Suult lugemise vältimiseks peab nägu olema ära

pööratud või silmad kinni. Viimane on eriti tarvilik simu-
latsioon- või agravatsioonikahtluse puhul.

Kõigepealt toimub uurimine sosinkõne abil. Ühtlase hell-
tugevuse saamiseks kasutatakse sosistamiseks reservõhku pä-
rast rahulikku väljahingamist. Ideaalsetes tingimustes on
sosinkõne kuuldav 20 - 25 m kauguselt. Kuna igapäevases
elus sellist ruumi pole, samuti ka mitte täielikku vaikust,
loetakse praktiliselt normaalseks sosinkõne kuuldavuseks 6 -
8 m. Kuulmisteravus määratakse meetrites, kusjuures alustat-
akse uurimist kaugemalt ja lähenetakse uuritavale, kuni ta
kordab õigesti kõik etteöeldud sõnad. Tavaliselt kasutatakse
se kahekohalisi numbreid või selleks otstarbeks eriti vali-
tud sõnu. Kui uuritav kuuleb kõnet ainult kõrvalesta juu-
res, kasutatakse selleks väljendust "ad concham".

Harilikku ehk tavalist kõnet kasutatakse tugevakuju-
liste kuulmishäirete puhul, kui uuritav sosinkõnet ei kuule
või kuuleb seda ainult väga väikeselt distantsilt. Teise
kõrva väljalülitamiseks ei piisa traguse'le surumisest. Sel-
leks kasutatakse Bárány lärmikarpi, korrektofoni või tehak-
se pneumomassaži.

Tavalise kõne mittekuulmisel proovitakse veel vali-
kõne kuuldavust.

Kõne koosneb toonidest ja ületoonidest, sisaldades he-
lidiapasooni 16 - 8000 Hz. Kõnest arusaamine on võimalik aga
ka siis, kui kõrgete ja madalate helide kuulmine on välja-
lülitatud. Kõne tajumiseks vajalik toonskaala ulatus on um-
bes 250 kuni 3000 - 4000 Hz, sealjuures on kõige olulisem
500 - 2000 Hz vaheline ala.

Üksikud häälikud ja sõnad on omavahel akustiliselt eri-
nevad. Tehakse vahet madala- ja kõrgeheliliste häälikute ja
sõnade vahel.

Foneetiliselt eraldatakse: a) kõrgehelilised häälikud
(s, i, e, õ, a) ja sõnad (sai, seitse, viisteist, see, seis,
siis, ei jne.), mis haaravad peamiselt toonskaala kõrgema
osa, b) keskmisehelilised häälikud (p, t, k, ü, ö) ja sõnad
(auk, töö, kütt, tük, tükk jne.) - haaravad peamiselt toon-
skaala keskmise osa, c) madalatelilised häälikud (l, m, n,

r, v, o, u) ja sõnad (moor, moon, ruum, on, kolm, noor, onu jne.).

Vastavalt kõrgete või madalate helide kuuldavuse langusele võime kindlaks teha sise- või keskkõrvakahjustuse. Heli-juhteaparaadi (keskkõrv) kahjustuste puhul on langenud rohkem madalate, helivastuvõtuaparaadi (sisekõrv) kahjustuste puhul rohkem kõrgete helide kuuldavus. Esimesel juhul on halvasti kuuldavad madalahelilised sõnad ("33"), paremini kõrgehelilised sõnad ("55"), teisel juhul ümberpöörduvalt.

Kuulmise uurimine helidega.

Kuulmise uurimiseks helidega võib kasutada muusikalisi instrumente, monohordi, heliharki, audiomeetrit. Muusika-instrumentide tekitatud helides on põhitooni kõrval rohkesti ületoone, mis annavad igale muusikariistale iseloomuliku tämbri. Spetsiaalsed kuulmise vahendid (helihargid, monohord, audiomeeter) tekitavad puhtaid toone, mis on ületoonidest vabad.

Inimene kuuleb helisid 16 - 20 000 Hz. Toonskaala on jaotatud oktaavideks. Iga oktaav koosneb 7 toonist:

c d e f g a h

ehk

do re mi fa sol la si

Oktaave tähistatakse järgmiselt:

C_2	C_1	C	c	c^1	c^2	c^3	c^4	c^5	c^6	c^7
16	32	64	128	256	512	1024	2048	4096	8192	16384 Hz
sub-	kont-	suur	väi-	I	II	III	IV	V	VI	VII oktaav
kont-	ra		ke							
ra										

Helid alla 16 Hz (infrahelid) pole kuuldavad, samuti üle 20000 Hz (ultrahelid).

Heliharke kasutatakse oktaaviliste vahedega, tavaliselt iga oktaavi c: C_2 (16 võnget sekundis), C_1 (32 võnget), C (64 võnget), c (128 võnget), c^1 (256 võnget), c^2 (512 võnget),

c^3 (1024 võnget), c^4 (2048 võnget), c^5 (4096 võnget). Kõrgemaid heliharke ei valmistata. Kõrgemate helide saamiseks võib kasutada Galtoni vile.

Varem tekitati helisid ka monohordiga, milleks on ühekeeleline reguleeritava helikõrgusega instrument.

Helihargiga on võimalik kuulmisteravust määrata sel teel, et võrreldakse terve ja haige kõrva kuulmisvõimet. Võime määrata maksimaalselt võnkuma pandud helihargi kuuldavuse aja sekundites terve ja haige kõrva juures ja neid andmeid omavahel võrrelda. Sel teel pole võimalik saada väga täpseid andmeid kuulmisteravuse suhtes. Kasutatakse tavaliselt üht madalamat (c või c^1) ja üht kõrgemat heliharki (c^4 või c^5).

Hoopis olulisemad kui kuulmisteravuse määramine heliharkidega on helihargikatsud, mida kasutatakse kuulmishäirete diferentsiaaldiagnostikas. Need põhinevad suurel määral luukuuldavusele. Helihargikatsudeks kasutatakse madalaid heliharke (c , c^1), kõrgemad helihargid pole selleks sobivad, kuna nad annavad heli luu kaudu halvasti edasi. Liiga madalate heliharkide puhul (c_{64} ja madalamad) esineb tugev vibratsioon, mida võib segada kuulmisaistinguga.

Helihargikatsud.

Weberi kats e. heli lateralisatsioonikats. Võrreldakse heli edasikandumist luu kaudu kõrvadele. Undav helihark asetatakse kolju keskjoonele (otsmikule või pealaele). Normaalselt kuuldakse heli mõlema kõrvaga ühtlaselt ("Weber peas", s. t. heli ei lateraliseeru).

Sisekõrva (heli vastuvõtuaparaadi) kahjustuse puhul kuuleb uuritav heli paremini tervema kõrvaga - heli lateraliseerub tervesse (tervemasse) kõrva.

Keskkõrva (helijuhteaparaadi) kahjustuse puhul kandub heli haigesse (haigemasse) kõrva - heli lateraliseerub haigesse kõrva.

Heli lateralisatsiooni võime kunstlikult esile kutsuda sel teel, et suleme ühe kuulemekäigu (lateralisatsioon toimub suletud kõrva). Seda võtet võime kasutada ka ühepoolse kurtuse simulatsiooni avastamiseks.

Heli lateralisatsioonil tervesse kõrva sisekõrvahäirete puhul on lihtne seletada. Mõlemasse kõrva satub ühtlase tugevusega heliärritus, kuna haige kõrva helivastuvõtvõime on langenud, kuuldakse heli terve kõrvaga.

Heli lateralisatsioonil haigesse kõrva keskkõrvahaiguste puhul seletatakse järgmiselt. Normaalselt hajub osa luu kaudu kõrva saabuvalt helilaineid kuulmeluukeste, kuulekile ja kuulmekäigu kaudu välja, vastassuunas normaalsele õhujuhtivusele. Takistuse puhul kesk- või väliskõrvas (keskkõrvapõletik, vaigukork jne.) osa nendest helidest reflekteeruvad tagasi sisekõrva. Seega saab haige poole sisekõrv rohkem heliärritusi kui terve kõrv, heli kuuldakse haiges kõrvas.

Arvesse tuleb ka välise müra maskeeriva mõju ärajäämine sisekõrvale helijuhte takistuse tõttu.

Rinne katsuga teostatakse aerotümpanaalse ja ossaalse, s.o. õhu- ja luukuuldavuse võrdlemist. Madal võnkuv helihark (c, c¹) asetatakse varrega vastu nibujätket ja hoitakse seal, kuni haige enam ei kuule. Siis viiakse võnkuvate harudega helihark kõrva ette, kuulmekäigu ava lähedale. Kui uuritav nüüd veel heli kuuleb, on Rinne kats positiivne (+). Sellisel juhul, kui uuritav kuuleb heli luu kaudu (nibujätkel) kauem, kui õhu kaudu (kõrva ees) on Rinne kats negatiivne (-).

Rinne kats võib modifitseerida selliselt, et võnkuv helihark asetatakse vahelduvalt nibujätkele ja kõrva ette ja lastakse võrrelda, kust kaudu on heli paremini kuuldav.

Normaalse kuulmise puhul on Rinne kats positiivne, õhujuhtivus prevaleerub luujuhtivuse üle. Helitajuaparaadi (sisekõrv) kahjustuse puhul on Rinne kats samuti positiivne, kuna halveneb kuulmine nii õhu kui ka luu kaudu, õhu- ja luukuuldavuse suhe jääb aga endiseks.

Heli juhteaparaadi (välis- ja keskkõrv) kahjustuse puhul on Rinne kats negatiivne - õhukuuldavus halveneb, luukuuldavus aga jääb endiseks või on normaalsega võrreldes isegi pikenenud.

Vahel võivad õhu- ja luukuuldavus olla võrdsed, sel puhul on Rinne kats $\bar{+}$ (vahel otidijärgsete seisundite puhul).

Schwabachi katsu puhul võrreldakse uuritava (haige) ja terve (arsti) kõrva luukuuldavust. Undav helihark asetatakse haige nibujätkele ja hoitakse seal seni, kuni heli pole enam kuuldav. Siis asetab arst helihargi oma nibujätkele. Kui heli on veel kuuldav, on haige luukuuldavus l ü h e n e n u d (Schwabach negatiivne). Sellisel juhul on tegemist sisekõrva kahjustusega. Haige kõrva luukuuldavus on normaalsega võrreldes p i k e n e n u d heli juhteaparaadi (kesk-kõrva) kahjustuste puhul (Schwabach positiivne).

Gellé katsu abil on võimalik määrata peamiselt otoskleeroosi puhul esinevat jaluseplaadi anküloosi ovaalses aknas. Võnkuv helihark asetatakse nibujätkele või pealaele ja kumiballooni abil tihendatakse ja hõrendatakse kuulmekäigus vahelduvalt õhku. Rõhu tõusul surutakse stapes normaalselt sügavamale ovaalsesse aknasse, labürindisisene rõhk tõuseb ja kuulmine halveneb. Õhu hõrendamisel kuulmekäigus toimub labürindisisese rõhu langus ja kuulmine paraneb. Seega normaalselt helitugevus muutub - Gellé kats on positiivne. Jaluse liikumatuse puhul kuulmekäigu rõhu muutused ei kandu edasi labürindivedelikule; labürindisisest rõhu muutust ei teki ja helihargi undamine on ühtlaselt kuuldav (Gellé kats negatiivne).

Tsõtovitši kats kujutab endast eelmise modifikatsiooni, mispuhul labürindisisest rõhu muutust tekitatakse sondiga vajutamisel proc. brevis'ele. Seejuures antakse rõhk edasi ainult ovaalsele aknale, kuna Gellé katsu puhul võivad õhuyõnked sisekõrva sattuda ka ümarakna kaudu.

Kuulmise uurimine audiomeetri abil.

Audiomeeter on elektriline heligeneraator, mille abil on võimalik saada puhtaid toone alates 64 - 8192 Hz või 125 - 10 000 Hz, tavaliselt oktaaviliste vahedega. Heli tugevus on reguleeritav, alates vaevast kuuldavast helist (0 db) kuni väga suure intensiivsuseni (100 - 110 db).

Audiomeetrid on selliselt gradueeritud, et normaalne kuulmislävi kõikide tsoonide osas tähistatakse 0 db-ga. Kuul-

mise nõrgenemisel kuulmislävi (heli intensiivsus, kus uuritav hakkab vastavat tooni kuulma) vastavalt suureneb (näit. 40, 60, 80 db jne.).

Helide kõrva juhtimiseks kasutatakse telefone: õhukuuldavuse määramiseks õhu-, luukuuldavuse kindlakstegemiseks luutelefoni. Kumbagi kõrva uuritakse eraldi, tarbe korral on võimalik teist kõrva maskeerida.


Uurimise andmed kujutatakse graafiliselt audiogrammil. Õhukuulmise andmete märkimiseks kasutatakse pidevat, luukuuldavuse puhul katkendlikku joont. Parema ja vasaku kõrva eristamiseks kasutatakse väikesi ringikesi (sõõrikesi) ja ristikesi või eri värve.

Helijuhteaparaadi (keskkõrva) kahjustuste puhul esineb audiomeetriliselt õhukuuldavuse langus kuni 50 - 60 db, sellejuures madalate toonide kuuldavus on sageli rohkem häiritud, luukuuldavus on normaalne või vähe langenud (0-15db) (joon. 1).

Heli vastuvõtuaparaadi (sisekõrva) kahjustuste puhul on õhu- ja luukuuldavus enam-vähem ühtlaselt nõrgenenud, kuulmise languse aste võib ulatuda kuni täieliku kurtuseni. Sageli on kõrgete toonide kuuldavus rohkem häiritud kui madalate toonide kuuldavus (joon. 2).


Sageli esineb segatüüpi kuulmishäireid, kus helijuhetetakistusega kaasneb ka sisekõrvakahjustus. Õhukuuldavuse languse kõrval esineb ka luukuuldavuse nõrgenemine, kuid siiski vähemal määral kui puhtakujuliste sisekõrvakahjustuste puhul (joon. 2).

Audiomeeter võimaldab täpselt kuulmisteravuse hindamist kogu toonskaala ulatuses ja on hädatarvilikuks vahendiks tänapäeval kuulmishäirete diagnoosimisel, kuulmist taastavate operatsioonide näidustuste määramisel ja nende resultaatide hindamisel, kuulmisaparaatide valikul jne. Üleläävelise kuulmisfunktsiooni hindamisel kasutatakse rida täiendavaid uurimisvõtteid (kiirenenud helivaljuse kasvu fenomen, adaptiooni- ja väsimusnähtude, heli tugevuse diferentsi läve määramine, müraaudiomeetria jne.).



Joon. 1. Toonaudiogramm keskkõrva ja segatüüpi kahjustuse puhul.

o - keskkõrva kahjustus (otoskleroos),
 x - segatüüpi kahjustus (adhesiivne seisund),
 — — — — — luujuhtivus (----), õhujuhtivus (—).



Joon. 2. Toonaudiogramm sisekõrva kahjustuse puhul.


o - parem kõrv (pankholeearne kahjustus),
 x - vasak kõrv (kõhlebasaalne kahjustus),
 — — — — — luujuhtivus (----), õhujuhtivus (—).

Toonaudiomeetria kõrval kasutatakse kõnetaju hindamiseks kõneaudiomeetriat. Kõneaudiomeetriaks kasutatakse diktori poolt magnetofonilindile loetud spetsiaalseid kõneteste, mis reprodutseeritakse, võimendatakse ja juhitakse telefoni abil uuritavasse kõrva. Kõne valjus on reguleeritav alates vaevalt kuuldavast helist kuni suure intensiivsuseni (100-110 db). Loomuliku kõne abil pole selline lai valjuse diapason saavutatav.

Normaalse kuulmise puhul algab kõnetaju umbes 10 db üle kuulmisläve (tajutakse üksikuid testsõnu). Kõne intensiivsust tõstes taju paraneb, 40 - 50 - db kõnetugevuse juures saavutatakse 100%-line sõnade tajumine. Kuulmishäirete puhul on selleks vaja hoopis suuremat intensiivsust, tugevate kuulmishäirete puhul sageli ei saavutatagi 100%-list kõnetaju. Peale maksimaalse taseme saavutamist (näit. 80%-line kõnetaju 90 db juures) ulatuslikkude sisekõrva kahjustuste puhul kõnetugevust veelgi tõstes ei järgne oodatud kõnetaju paranemist, vaid hoopis vastuoksa - kõnetaju hakkab uuesti langema. Kuulmise väga tugeva nõrgenemise puhul (70 - 80 db või rohkem) pole kõne tavaliselt enam üldse tajutav (joon. 3).

Kuulmise hindamine müradega. Seda moodust kasutatakse kuulmise umbkaudseks hindamiseks. Müra allikaks võib olla käteplaksutamine, kellatiksumine jne. Viimast moodust kasutavad sageli haiged ise oma kuulmisteravuse uurimiseks. Kellatiksumist meenutab ka akumeeter, mille tiksumine on normaalselt kuuldav 10 - 16 m kauguselt.

Käsi plaksutatakse uuritavatele märkamatu (selja tagant), mitte liiga lähedal, et välja lülitada õhu liikumise ja vibratsiooni mõju. Jälgitakse patsiendi reageerimist ootamatu heliärrituse taajärjel (võpatamine, pöördumine heliallika suunas, auropalpebraalne ja auropupillaarne refleks).



Joon. 3. Kõneaudiogramm.

1 - normaalne kõnetaju kõver, 2 - kõnetaju kõver keskkõrva kahjustuse puhul, 3 ja 4 - kõnetaju kõver sisekõrva kahjustuse puhul. Tugevakujulise kuulmise languse puhul kõnetaju ei saavuta 100%-list taset ja võib intensiivsuse edasisel tõstmisel hakata uuesti langema (4). Mõnikord tugevakujulise segatüüpi kuulmishäire puhul algab kõnetaju suure intensiivsuse juures (näit. 80 db) ja tõuseb kuni audiomeetri võimenduse piirini (120 db) (5).

Objektiivsed kuulmise määramise meetodid.

Kuulmise uurimise senikäsitletud meetodite puhul hinnatakse kuulmisteravust uuritava vastuse põhjal. Väikeste laste puhul pole need rakendatavad, vahel võib uuritav anda mitte tõenäoseid (simulatsioon, agravatsioon) vastuseid. Sellistel juhtudel kasutatakse objektiivseid kuulmise uurimise meetodeid, kus hindamiseks kasutatakse mitmesuguste reaktsioonide või reflekside jälgimist, mis tekivad heliärrituse tagajärjel (reflektorne audiomeetria).

Tugeva äkilise heliärrituse tagajärjel tekib silmapilgu-

T a b e l 1 .

Kuulmishäirete diferentsiaaldiagnostika.

Kuulmis- häire liik	Helibargikatsused		Kõne	Toonaudiomeetria		Kõneaudiomeetria						
	Weber	Rinne		Schwa- bach	Õhukuuldavus		Luu- kuuldavus					
Heli juhte- kahjustus (keskkõrv)	Haiges- se kõr- va	Nega- tiiv- ne	Pike- nenud	Häiritud rohkem ma- dalaheli- liste sõ- nade kuul- davus	Häiritud rohkem kõrgsheli- liste sõ- nade kuul- davus	Häiritud rohkem kõrgete toonide kuuldavus rohkem häiritud	Langus kuni 50- 60 db, sageli rohkem välja ku- junenud madalate toonide piirkon- nas	Languse aste kergest kuni täieliku kur- tuseni. Sageli kõrgete toonide kuuldavus rohkem häiritud	Normaalne või vähe langenud (kuni 15 db)	Langenud ühtlaselt õhukuulda- vusega	Kõnetaju kõver enam- vähem paralleelne nor- maalsega, intensiiv- suse aste kuni 50-60 db suurem	Kõnetaju kõver enam- vähem paralleelne nor- maalsega, intensiiv- suse aste kuni 50-60 db suurem
Heli vastu- võtuaparaa- di (sise- kõrva) kah- justus	Terves- se kõr- va	Posi- tiiv- ne	Lühe- nenud	Häiritud rohkem kõrgsheli- liste sõ- nade kuul- davus	Häiritud rohkem kõrgsheli- liste sõ- nade kuul- davus	Häiritud rohkem kõrgete toonide kuuldavus rohkem häiritud	Languse aste kergest kuni täieliku kur- tuseni. Sageli kõrgete toonide kuuldavus rohkem häiritud	Languse aste kergest kuni täieliku kur- tuseni. Sageli kõrgete toonide kuuldavus rohkem häiritud	Languse aste kergest kuni täieliku kur- tuseni. Sageli kõrgete toonide kuuldavus rohkem häiritud	Languse aste kergest kuni täieliku kur- tuseni. Sageli kõrgete toonide kuuldavus rohkem häiritud	Tugevakujulise kah- justuse puhul ei saa- vutata 100 %-list kõ- netaju. Kõnetaju mak- simaalsele tasemele võib intensiivsuse tõusul kaasuda taju langus	Tugevakujulise kah- justuse puhul ei saa- vutata 100 %-list kõ- netaju. Kõnetaju mak- simaalsele tasemele võib intensiivsuse tõusul kaasuda taju langus

tamine - kohleopalpebraalne refleks (V.M. Behterev), samuti kohleopupillaarne refleks (V.V. Šurõgin) - kiire papilli ahenemine ja sellele järgnev aeglane laienemine. Heliärrituse tagajärjel tekib nahaveresoonte spasm, mida on võimalik kindlaks teha pletüsmograafi abil. Pneumograafi abil on fikseeritavad muutused hingamisrütmis, Heliärritus põhjustab naha elektriliste potentsiaalide muutusi, mida on võimalik registreerida tundliku galvanomeetri abil (naha galvaniline reaktsioon). Samuti tekivad muutused aju biovooludes, mis on kindlaks tehtavad elektroentsefalograafi abil. Kuulmise hindamiseks on võimalik kasutada ka mitmesuguseid tingreflekse (näit. imikutel imemis- ja süljerefleks jne.).

Simulatsioonikatsud.

Simulatsiooni ja agravatsiooni avastamiseks kuulmise osas võib kasutada lisaks eeltoodud objektiivsetele kuulmise uurimise meetoditele mitmeid simulatsiooniteste.

Lombardi kats põhineb asjaolul, et kõne allub kuulmise kontrollile. Kui kuulmine äkitselt välja lülitada, kaob kontroll kõne üle ja hääle tugevus suureneb. Lugemise ajal juhitakse uuritava isiku mõlemasse või ühte kõrva (vastavalt sellele, kas simuleeritakse täielikku või ühepoolset kurtust) tugevat müra lärmikarbi või korrektofoni abil. Kui selle juures hääle tugevus ei tõuse, on tegemist tõeliselt kurdiga.

Govsejevi harjakats põhineb kurtide suurenenud taktilisel tundlikkusel. Arst silitab uuritava selga vaheldumisi harjaga või käega, samaaegselt teise käega oma riideid. Kurt teeb eksimatult vahet harja ja käe vahel, kuulja isik aga mitte, kuna ta käesilitamisega samaaegselt kuuleb harja kahtinat.

Katse tingitud refleksiga (N.A. Pautov). Samaaegselt heliga tekitatakse valuärritus. Pärast refleksi väljakujundamist põhjustab juba ainuüksi helisignaal kaitsereaktsiooni.

Ühepoolse kurtuse kindlakstegemiseks võime kasutada katsu kahe helihargiga (Stengeri kats). Kaks sama kõrgusega võnkuvat heliharki asetatakse üks ühe, teine teise kõrva juurde. Normaalselt kuuleb isik heli ainult ühe kõrvaga, mis on helihargile lähemal. Kui üks võnkuv helihark asetada selle kõrva ligidale, millest uuritav kurtust simuleerib, teine teise kõrva juurde veidi kaugemale, kuuleb simulant heli "kurdi" kõrvaga ja vastab, et ta ei kuule heli üldse. Tegelikult ühest kõrvast kurt isik kuuleb heli heli heli heli terve kõrvaga. Seda katsu võib teostada ka audiomeetri abil.

Kasutatakse ka simulatsioonitoru, mille abil juhitakse kõnet kord ühte, kord teise kõrva. Ühest kõrvast kurtust simuleeriv isik kordab ka neid sõnu, mida ta kuuleb "kurdi" kõrvaga.

Simulatsiooni kindlakstegemisel on oluline jälgida ka haige käitumist, tema reageerimist ootamatutele heliärritustele, kõnele jne. Kurtidele on iseloomulik omapärane motoonne kõne, nad saavad tavaliselt aru suuliigutustest jne.

Helisuuna määramine (ototoopika) põhineb binauraalsel kuulmisel ja teostatakse suletud silmadega. Normaalselt toimub helisuuna määramine suure täpsusega, ühe kõrva kurtuse või tunduva kuulmise languse puhul pole aga uuritav suuteline heli suunda kindlaks tegema. Samuti on ototoopika häiritud tsentraalsete kuulmishäirete puhul.

VESTIBULAARANALÜSAATORI FUNKTSIOONI UURIMINE.

Kui kuulmise uurimine põhiliselt on subjektiivset laadi, siis tasakaaluaparaadi funktsiooni uurimine põhineb objektiivsetele reaktsioonidele (nästagn), millega võivad kaasned osaliselt ka subjektiivsed nähud (pearinglemine, iiveldus).

Sellest tulenevalt jagatakse tasakaaluaparaadi uurimismeetodid kahte rühma:

I. Vestibulaaraparaadi subjektiivsete ja objektiivsete spontaansümptomide uurimine.

II. Vestibulaaraparaadi ärritatavuse eksperimentaalne uurimine.

V e s t i b u l a a r a p a r a a d i u u r i m i n e
s u b j e k t i i v s e t e j a o b j e k t i i v -
s e t e s p o n t a a n s ü m p t o o m i d e
s u h t e s .

Vestibulaaraparaadi uurimine subjektiivsete
spontaansümptomide suhtes.

Vestibulaarsed spontaansümptomid vihjavad vestibulaaraparaadi orgaanilisele kahjustusele. Olenevalt vestibulaarsüsteemi kahjustuse alast ja kahjustuse iseloomust tekivad mitmesugused aistingud, nagu ümbritsevate esemete tiirlemine, harvem esineb haigel tunne, et ta ise tiirleb ruumis, vahel esineb vaarumistunne. Mõnikord tekivad reaktiivsed liigutused kukkumise vältimiseks. Mõnel juhul võib tasakaaluhäire viia kukkumiseni. Vestibulaaraparaadi funktsiooni häiretega kaasnevad sageli ka vegetatiivsed nähud (iiveldus, oksendamine, külm higi, pulsi kiirenemine või aeglustumine, näo kahvatumine).

Anamnees.

Anamneesis on põhiliseks kaebuseks pearinglemine, tasakaaluhäired, iiveldus, oksendamine. Otolitiilise aparaadi häire puhul kaebavad haiged ka langemis- või õhku tõusmise tunnet.

Pearinglemine tekib tasakaalu regulatsioonist osavõtivate organite (labürint, tasakaaluergu juhteteed ja tuumad ning sekundaarsed seosed) koostöö häirest.

Kuid ka kesknärvisüsteemi haigestumine (eriti väikeaju ja ajutüvi) ja funktsionaalsed häired võivad mõjustada vestibulaartsentrumeid. Vestibulaarsed nähud on peaaajutuumorite puhul sagedasemad kui kuulmishäired. Vestibulaarne pearinglemine peaaajukahjustusel võib olla mitmesuguse iseloomuga, tugevusega ja sageli on täheledatav ainult haiguse ühes etapis, siis kaob. Pearinglemine on ajutuumorite puhul sümptoomiks, mis väljendab koljusisese rõhu tõusu. Mittevestibulaarne pearinglemine võib olla psühhogeenset, vasomotoorset või optilist laadi. Enamikul juhtudel on pearinglemine tingitud vestibulaaraparaadi perifeerse osa (labürindi) erutusest või tema väljalangemisest. Seda võib põhjustada kesk-kõrvapõletiku tagajärjel tekkinud labürindi kahjustus, sisekõrva trauma järgne kahjustus või muud tegurid, samuti keerutamine, kõikumine (laeval), liftisõit.


Anamneesis on vajalik hoolikalt selgitada pearinglemise iseloom, kestus, tugevus, sagedus ning kas pearinglemine tekib teatud olukorras (kindla liigutuse või asendi puhul), samuti kas pearinglemisega käib kaasas ümbritsevate esemete näiv liikumine. Viimane on iseloomulik vestibulaarsele pearinglemisele. Vestibulaaraparaadi funktsiooni selgitamine on väga tähtis rea elukutsete puhul, kus toimub keha aktiivne või passiivne ümberpaigutus ruumis (lendurid, kosmonautid, alpinistid, meremehed, langevarjurid, ehitajad, kõrgehituste monteeri- ja baleriinid, elektriliinide monteeri- ja tuletõrjujad, korstnapühkijad jne.).

Vestibulaaraparaadi uurimisest objektiivsete
spontaansümptomide suhtes.

Vestibulaaraparaadi objektiivsel uurimisel selgitatakse kõigepealt spontaansümptomide esinemist; mis on vestibulaaraparaadi kahjustuse väljenduseks. Vestibulaaraparaadi kahjustuse spontaansümptomideks on nüstagm, tasakaaluhäire seismisel ja käimisel ning näitamiskats, millega selgitatakse käte toonuse häire ning kõrvalekaldumine otsejoo-
nest.

Nüstagm.

Nüstagmi all mõistetakse mõlema silmamuna sümmeetrilisi ja rütmilisi liigutusi, mis toimuvad teatud järjekindlusega ja võivad tekkida mitmesugustes tasapindades. Spontaannüstagmi põhjustab nii vestibulaarretseptori ja tema tuumade ärritus kui ka vestibulaarokulomotorsete seoste kahjustus, samuti asümmeetriline vestibulaarkahjustus. Nüstagm ei




Joon. 4. Tasakaaluergu retseptori paiknemine
ampullis ning vestibulumis.

1 - crista ampullaris, 2 - cupula terminalis,
3 - poolringkanali ampullaarne osa, 4 - ramus
ampullaris n. vestibularis, 5 - vestibulum,
6 - otoliitiline membraan, 7 - ramus utricula-
ris n. vestibularis.

T a b e l 2 .

Pearinglemise aistingute skaala Frenzeli järgi.



Vestibulaarne pearinglemine

difuusne (vasomotoorne) ajast tingitud (minestusetaoline) pearinglemine

1. Pearinglemise hoog: Meniere'i tüüpi
2. Pearinglemise kestus:
 - a) labürindi väljalangemistüüpi
 - b) sageli periooditi või tugevus vahelduv
3. Pearinglemine seoses asendi ja liikumisega

juurdevõttev või lõõgastuv, esiletulev koormuse ja enesekaitse pearinglemine

allu tahtele. Normaalses seisundis saadavad mõlemad labürin- did toonilisi impulsse silma liigutavate lihaste erkude tuu- madele, vestibulaarergu tuumadele (Deitersi ja Behterevi) ja väikeajule. Sellest koordineeritakse keha normaalne toonus. Vestibulaarergu tuumad on vahetus läheduses pilku pööravate silmalihaste erkude tuumadega, mida cupula aktsioonvoolud ühepoolsest tugevasti ärritavad, põhjustades seega silma lii- gutavate lihaste toonuse häiret. Selle tulemusena ei ole enam võimalik pilku säilitada. Tekib nüstagm - aeglane sil- made kõrvalekalduvus ning sellele järgnev silmamuna kiire tagasitoomine endisesse asendisse (tsentraalne reaktsioon).

Spontaannüstagmi uurimine.

Spontaannüstagmi kindlakstegemisel lastakse haigel (is- tudes või lāmades) fikseerida pilguga arsti nimetissõrme, mi- da arst hoiab 40 - 50 - 60 cm kaugusel haige silmadest. Uuri- tav jälgib silmadega sõrme liikumist ühele ja teisele poole- le, siis üles ja alla. Sõrme liikumist tuleb lasta uuritaval jälgida mitu korda, sest ühekordse liikumise puhul võib jää- da nüstagm tabamata, (nn. "varjatud" ehk "latentne"). Sellie- ne nüstagm tuleb hästi nähtavale, kui lasta uuritaval pead raputada. Vältima peab väga ekstreemset silmade külgasen- dit, selle puhul võib ka normaalselt mõni sekund täheldada nüstagmi (nn. asendinüstagmi).

Spontaannüstagmi uurimisel tuleb selgitada nüstagmi suund, amplituud, intensiivsus, faas (aeglane ja kiire) ja rütm, tasapind bin- või monokulaarsus (nn. dissotseeritud nüstagm) ning kas nüstagmi kindlaksmääratud suund on püsiv.

Nüstagmi suund. Vestibulaarnüstagmil on 2 faasi ehk komponenti, s. o. aeglane ja kiire. Nüstagmi suund määratak- se kiire komponendi (faasi) järgi. Spontaannüstagm tugevneb pilgu pööramisega küljele kiire komponendi suunas, mis on silmalihastele täiendavaks koormuseks.

Spontaannüstagm võib olla kas horisontaalne, vertikaal- ne, diagonaalne või rotatoorne. Nüstagmi tasapind vastab se-

da vallandava poolringkanali tasapinnale. Vestibulaaraparaadi kahjustusel esineb kõige sagedamini horisontaalne nüstagm, mille tekkimist soodustavad kõige enam anatoomilised eeldused.

Vertikaal- ja diagonaalnüstagm on tsentraalse lähtega. Rotatoorne ja diagonaalne spontaannüstagm esineb sageli tagumise koljukoopa tuumorite puhul. Spontaannüstagm muudab aju-tuumorite korral oma suunda, tugevust ja amplituudi, olenevalt tuumori arengustaadiumist.

Nüstagmi amplituud (võnke ulatus) võib olla väike, keskmine või suur. Väikese võnkeulatusega nüstagmi juures on silmamuna liikumine vaevalt märgatav, s. o. 1 - 2 mm. Nüstagmi suure võnkeulatuse juures on silmamuna liikumine 8 - 10 mm. Vestibulaarnüstagm on harva suure amplituudiga, sagedamini keskmise võnkeulatusega. Küll aga näiteks VIII kraniaalnärv neurinoomide puhul on spontaannüstagm tuumori poolel suure amplituudiga ja aeglasem kui tervel poolel. Nüstagmi amplituud on pöördvärdeline tema rütmi ja intensiivsusega, näiteks väikese võnkeulatusega nüstagm on aga suure intensiivsusega (optiline nüstagm). Nüstagmi amplituud on seotud aeglase komponendiga (faasiga).

Nüstagmi intensiivsuses eristatakse 3 astet: I aste - nüstagm tekib vaatamisel kiire komponendi suunas, II aste - nüstagm tekib vaatamisel ette, III aste - nüstagm vallandub ka vaatamisel aeglase komponendi suunas. Viimane vihjab tugevale vestibulaaraparaadi kahjustusele.

Nüstagmi faasid (ehk komponendid). Vestibulaarnüstagmil on 2 faasi (komponenti) - aeglane ja kiire. Peale selle on vestibulaarnüstagmil rütmiline iseloom, kusjuures aeglane komponent (faas) vaheldub kiirega. Nüstagmi suund määratakse kiire komponendi järgi, mis on tsentraalse päritoluga. Aeglane komponent (väljendab cupula karvakeste kõrvalekaldumise suunda ja kestust) on tingitud labürindist.

Monokulaarne nüstagm. Tavaliselt on vestibulaarnüstagm binokulaarne. Monokulaarne nüstagm esineb ajutüve tuumorite

puhul, samuti kui on kahjustatud ühepoolset silma liigutavaid närvid.

Mittevestibulaarnüstagm võib esineda kurnatud isikutel. Ka tervetel isikutel võib tekkida mittevestibulaarnüstagm silmalihaste väsimisest seoses pilgu kestva fikseerimisega, näiteks raudteenüstagm või eriti tugeval pilgu kõrvaesuunamisel, samuti silmalihaste nõrkuse ning nõrga nägemise ja tähelepanuhäirete korral (isikud, kellel on muutunud psüühika ja väikestel lastel).

Väikeaju kahjustuse korral esineb aga unduleeruv nüstagm (mõlemad nüstagmi komponendid on ühesuguse kiirusega, s. o. aeglased). Väikeaju kahjustuse (abstsess, tuumor) puhul nüstagm süveneb aja jooksul. Peale selle esinevad ka koordinatsioonihäired, nagu adiadohhokinees (haige ei ole võimeline käsi ühesuguse kiirusega pro- ja supineerima). Sõrme-ninaotsa katsu puhul ei saa haige kinniste silmadega nimetissõrme asetada ninaotsale. Optilise aparadi häirete korral on nüstagmi mõlemad komponendid kiired.

Nüstagmi saab paremini nähtavaks teha, kui kasutada Bartelsi prille (+ 20 dioptrit), millega uuritav ei saa pilku fikseerida. Võib kasutada ka Frenzeli prille, mis on varustatud mikrolampidega. Täpsemaks nüstagmi uurimiseks kasutatakse nüstagmograafiat: kas elektrograafilist meetodit, mis põhineb silmalihaste või võrkkesta biopotensiaalide registreerimisel või kasutatakse nüstagmograafiat koos fotograafilise meetodiga.

Staatilis-kineetilise funktsiooni uurimine.

Staatilis-kineetilise funktsiooni häire korral on raskestatud seismine ja käimine nii lahtiste kui kinniste silmadega.

Seismist uuritakse Rombergi katsu abil. Haige seisab, labajalad tihedalt teineteise kõrval, suletud silmadega ning ettesirutatud kätega. Labürindi haigestumisel kukub haige

Vestibulaar- (perifeerse) ja tsentraal-(ajutüve piirkonna)
nüstagmi diferentsiaaldiagnostikast.

Tunnus	N ü s t a g m	
	Vestibulaarne (perifeerne)	Tsentraalne (ajutüve piirk.)
Kahjustuse koht	labürint või VIII närvi perifeerne osa	vestibulaarergu tuumad
Tasapind	horisontaalne, horisontaal-rotatoorne, harvem rotatoorne	horisontaalne ja rotatoorse kõrval vertikaalne, diagonaalne ja konvergeeruv
Amplituud	väike, keskmine	suur, keskmine, harva väike
Suund	tervele poolele (kiire komponendi poole)	mitmesugune (horisontaalnüstagm mõlemale poolele või vertikaalne üles ja alla)
Aste	I	II või III
Iseloom, faas	tavaliselt klooniline, reeglipärane faaside (komponentide, s. o. aeglase ja kiire) vaheldumine	sageli tooniline, kiire komponendi nõrgenenud, ülekaalus aeglane komponent
Okulaarsus	alati binokulaarne	võib olla monokulaarne või monokulaarsuse elementidega
Asend	ei muuda	harva muudab
Vestibulaar-somaatiline reaktsioon	keha ja jäsemete kõrvalekalduv dumdine aeglase komponendi suunas	keha ja jäsemete kõrvalekalduv dumdine ei vasta alati nüstagmi aeglasele komponendile (vestibulaarne disharmonia)
Pearinglemine	sageli	enamasti puudub
Vegetatiivsed reaktsioonid	sageli	ei ole elavnenud
Kestus	2-3 nädalat	võib kesta kaua, mõnikord kogu eluaeg
Kuulmine	kuulmishäired sageli (kohin, kuulmise langus)	harva kuulmishäired

nüstagmi aeglase komponendi (s. o. haige kõrva) suunas, peaasendi muutus kutsub esile ka kukkumise suuna muutumise.

Sensibiliseeritud Rombergi kats. Sel puhul seisab uuritav suletud silmadega üks jalg teise ees; see proov on suurema tundlikkusega ja võib anda kõrvalekaldumise, kui tavaline Rombergi kats jäi negatiivseks.

Vestibulaarsüsteemi tsentraalse osa kahjustusel ei sõltu kukkumine mingil määral nüstagmi suunast, kuid pea asendi muutmine ei mõjuta harilikult kukkumise suunda. Kiire kukkumine (olenemata pea asendist) vihjab tsentraalsele kahjustusele (väikeaju, ajutüve, medulla).

Käimine. Algul lastakse uuritaval (haigel) käia lahtiste silmadega otsejoones edasi ja tagurpidi. Siis lastakse uuritaval käia kinniste silmadega kindlas suunas 5 sammu edasi ja 5 sammu tagurpidi (Well-Babinski kats). Labürindi kahjustuse korral ilmneb ettevaatlikkus vahelduva kiirusega edasiliikumises ning samaaegses kõrvalekaldumises otsejoonest haigele poolele (nüstagmi aeglase komponendi suunas). Seega ilmneb teataval määral "möödanäitamine" jalgadega. Tulemus loetakse positiivseks, kui kõrvalekaldumine lähtepunktist on vähemalt 45° . Vestibulaaraparaadi häire korral on käimine raskendatud ka pimedas, ilmneb kukkumiskalduvus haigele poolele, s. o. nüstagmi aeglase komponendi suunas. Silmade sulgemine lasab selgemalt esile tulla vestibulaaraparaadi häire. Tsentraalse kahjustuse korral on käimine ataktilist laadi.

Käimist kaldpinnal (Steini kats) uuritakse avatud ja suletud silmade juures. Kaldpinna nurk on muudetav, samuti kaldpinna suund, kas ette, taha, paremale või vasakule küljele. Normaalselt on võimalik seista ja käia 30° kaldpinnal, vestibulaaraparaadi häire korral ei ole see võimalik. Tekib kalduumine haigele poolele. Tasakaal on neil juhtudel häiritud mäkke tõusmisel ja mäest laskumisel.

Ümberlükkamise kats. Arst muudab uuritaval aktiivselt keha tasakaalu. Vestibulaaraparaat aga säilitab reflektorselt tasakaalu, muutes jäsemete ja kerelihaste toonust ning liigutusi.

Näitamiskats. Haige istub arsti vastas ja hoiab väljasirutatud käed põlvel, kõik sõrmed painutatud rusikasse, välja arvatud nimetissõrm; selle järel tõstab uuritav käe ilma küünarnukist painutamata ja püüab puudutada nimetissõrmega arsti väljasirutatud käe nimetissõrme. Algul teostatakse näitamiskats avatud silmadega ning edasi suletud silmadega. Näitamiskats tehakse nii sagitaalses kui ka horisontaalses tasapinnas. Haige (pärast proovimist parema käega paremale või vasakule) peab viima käe tagasi ja tabama oma nimetissõrmega uurija nimetissõrme. Normaalse tasakaaluaparaadi puhul saab uuritav nimetissõrmega puudutada arsti sõrme. Vestibulaaraparaadi kahjustuse korral aga ilmneb möödanäitamine, kas sisse- või väljapoole, üles või alla.

Lihaste toonuse uurimine (Wodak-Fischeri kats). Kui terve inimene tõstab mõlemad käed suletud silmadega ette, peopesad vastakuti, ei teki mingit kõrvalekaldumist, Vestibulaaraparaadi kahjustuse korral võib tekkida mõlema või ühe käe kõrvalekaldumine. Mõnel haigel võib aga ilmnedu ühe käe allalangemine. Seda nimetatakse käe toonuse spontaanreaktsiooniks.

Perifeerse vestibulaaraparaadi kahjustuse korral tekib spontaanne mõlema käe kõrvalekaldumine. Patoloogilise kolde olemasolu vestibulaarsüsteemi tsentraalses osas põhjustab ainult ühe käe kõrvalekaldumise kahjustuse poolele.

Näitamiskats (käte toonuse ja nende kõrvalekaldumise reaktsioon) annab ettekujutuse keha toonust reguleeriva vestibulaaraparaadi olukorrast või väikeajust.

Otoliitilise aparaadi funktsiooni uurimine.

Sel puhul uuritakse nüstagmi pea ja keha kindla asendi juures ning otoliitilist reaktsiooni V.I. Vojatšeki järgi. Kõigepealt lamab uuritav seljal, siis lastakse tal pöörata keha, pea vasakule või paremale küljele. Sama lastakse teha ka kõhuli asendist. Otoliitilise aparaadi haigestumise korral tekib nüstagm ja pearinglemine juba ainult pea ja keha asendi muutumisel.

Eksperimentaalne vestibulaar- aparaadi ärritatavuse uurimine.

Eksperimentaalselt uuritakse vestibulaaraparaadi ärritatavust keerutamise, kaloorilise proovi, mehaanilise (fis-
tuli sümptom) ning elektrilise ärrituse abil.

Enne labürindi ärritamist on vajalik välja selgitada, kas uuritav kannatab kiikumist, auto-, lennuki- ja meresõitu ning keerutamist tantsimisel. Kas ilmneb pearinglemine peasendi muutmisel või mõne muu välise ärrituse (tugevad lõhnad, järsk heliärritus) puhul.

Nendel juhtudel tuleb loobuda vestibulaaraparaadi ärritamisest, kuni pole selgitatud haigestumise iseloom.

Keerutuskats.

Uuritav istub Barany pöördtoolile, suleb silmad ja painutab pea kas ette, taha või küljele (vt. tabel 4) vastavalt sellele, missugust poolringkanalit tahame ärritada. Näiteks, kui uuritav painutab pea 30° ette, siis on horisontaalsed poolringkanalid keerutamise tasapinnas. Edasi tehakse 10 tiiru 20 sekundi jooksul ümber vertikaaltelje (1 tiir 2 sekundi jooksul). Tooli järsul seiskamisel tekib horisontaalnüstagn, mille kiire komponent on vastupidi keerutamise suunale, aeglane komponent on keerutamise suunas, seepärast lastakse nüstagnmi kindlakstegemiseks uuritava vaadata küljele keerutamise vastassuunas. Nüstagnmi suund seletub endolümfi tõekega poolringkanali cupula karvakeste tasakaalule, mis tekib tooli seiskumise momendil. Keerutamisega viime endolümfi liikvele. Keerutamise algul jääb endolümf luulisest labürindist maha, sellega viiakse tasakaalust välja karvakesed crista ampullaris'es. Keerutamise keskel jõuab endolümf luulisele labürindile järele, kuid tooli järsul seiskamisel jääb luuline labürint seisma, kuna endolümf liigub inertsil mõjul edasi ning viib karvakesed uuesti tasakaalust välja.

Ewaldi klassikaline kats tuvidega näitas, et endolümfivool ampulli poole (ampullofugaalne voolus) kutsub välja horisontaalses poolringkanalis nüstagmi ärritatud kanali poole, aga endolümfivool ampullist lihtsääre suunas (ampullofugaalne voolus) - vastassuunalise nüstagmi.

T a b e l 4 .

Nüstagmi iseloom olenevalt poolringkanali ärritusest.

Poolringkanal Pea asend	Nüstagmi iseloom	
	pärast keerutamist paremale	pärast keerutamist vasakule
horisontaalne a) pea 30° ette painutatud	→ vasakule	paremale ←
frontaalne a) pea 90° ette painutatud b) pea taha painutatud	vasakule paremale	paremale vasakule
sagitaalne a) pea painutatud 90° paremale õlale b) pea painutatud 90° vasakule õlale	alla ↓ üles ↑	alla ↓ üles ↑

Nüstagmi tasapind: ⇔ horisontaalne, ↻ rotatoorne,
↑↓ vertikaalne.

Pärast keerutamise lõpetamist paremale liigub endolümfiparemas horisontaalses poolringkanalis (olenevalt keerutamise tasapinnast) ampullofugaalselt, selle tulemuseks on nüstagm vasakule (vastupidine keerutussuunale). Aeglane nüstagmi komponent ja kaitseliigutused (jäsemete ja keha kõrvalekaldumine) satuvad kokku endolümfivoolu suunaga, s. o. keerutussuunaga.

Pärast keerutamist tuleb labürintaarset nüstagmi uurida 3 tasapinnas (horisontaalses, frontaalses ja sagitaalses). Kui keerutamisel on pea painutatud 90° ette (frontaalses tasapinnas), tekib rotatoorne nüstagm. Painutades aga pea 90° õlale (keerutamine toimub sagitaalses tasapinnas) tekib vertikaalnüstagm (tabel 4).

Nüstagmi kestus on pärast keerutamist horisontaalses tasapinnas 20 - 30 sek. (nüstagmi-prillidega uurimisel - 40 sek.). Vestibulaaraparaadi tundlikkust ei saa määrata ainult vestibulaarretseptori erutuse kestuse järgi, s. o. nüstagmi kestuse järgi, sest nüstagm tekib mööda keerukat refleksikaart: labürint (retseptor), vestibulaarergu tuumad, silma liigutavate lihaste erkude tuumad, silma liigutavad närvid, silmalihased. Nüstagmi tugevusest ja kestusest võib rääkida ainult kui normaalsest, hüpo- või hüperrefleksist.

Nüstagmi kestus ei iseloomusta täielikult reaktsiooni tugevust. Mitte vähema tähtsusega ei ole nüstagmi rütm, löögi amplituud ja sagedus, eriti oluline on aeglase komponendi kiirus.

Keerutusproovi hindamisel tekib raskus seoses sellega, et nurgakiirenduse positiivne mõju ei lakka mitte täielikult 20 sekundi pärast, seepärast peatuse stiimul (negatiivne kiirendus) ei lange kokku täielikult kustumisprotsessiga analüsaatoris. Sest reaktsioon ei toimu mitte ainult perifeerses retseptoris (cupula's), vaid ka tsentris. Lõplik resultaat oleneb ikka teatud määral närviprotsessist tsentris. Sellest lähtudes on vaja alata keerutamist väga aeglaselt (Fischer) alalävisel kiirendusega, mis järk-järgult jõuab kuni nurgakiirenduseni 180° sekundis. Tool tuleb peatada äkki, siis ei saa toimida negatiivne nurgakiirendus ja kahe stiimuli summatsoon.

Nüstagmi võib kindlaks teha ka silmamuna palpeerimisel.

Eksperimentaalse nüstagmi põhjal võime teha järgmisi järeldusi: kui esineb spontaanlabürintaar-nüstagm näiteks paremale poole, sealjuures puuduvad patoloogilised muutused vestibulaarsüsteemi tsentraalses

osas, siis tuleb mõelda kas rõhu tõusule või vasaku ampullaarse retseptori funktsiooni väljalangemisele või parema labürindi erutusseisundile. Nüstagmi puudumine mõlemal pool pärast keerutamist näitab täielikku mõlemapoolse vestibulaarfunktsiooni väljalangemist adekvaatse ärrituse suhtes.

Nüstagmi erineva kestuse korral peab mõtlema ühepoolse labürindi funktsiooni väljalangemisele, näiteks kui järelnüstagm kestis 5 sekundit pärast vasakule keerutamist ja 15 sekundit pärast paremale keerutamist, siis näitab see, et parema labürindi funktsioon on välja langenud. Kui järelnüstagm on mõlemapoolselt tugevasti lühenenud (näiteks 10 sek.), siis peab mõtlema tsentraalsele kompensatsioonile, mis tekib pärast pikemat ühepoolse vestibulaaranalüsaatori väljalangemist. Pärast vasakule keerutamist tekib vastavalt keerutussuunale kehapööre ja vasaku käe suurem kõrvalekaldu mine ning allalangemine (Fischeri "ketteheitja poos").

Näitamiskats keerutamise järel. Uuritav istub keerdtoolis käed põlvedel, silmad suletud. Tehakse 10 tiiru 20 sekundi jooksul, siis jäetakse tool järsku seisma. Uuritav tõstab käed rinna kõrgusele sagitaalsesse tasapinda, püüdes puudutada nimetissõrmega uuri ja omi. Seejuures tekib mõlema käega möödanäitamine nüstagmi aeglase komponendi suunas.

Väikeaju haigestumisel esineb spontaanne möödanäitamine haigusprotsessi lokalisatsioonile vastava käega.

Vestibulaarvegetatiivsed reaktsioonid. Vegetatiivsed refleksid tekivad vestibulaaraparaadi ärritamisel. Labürindi ärritamise (keerutamise) järel muutub pulsisagedus, vererõhk (arteriaalne). Ilmneb naha veresoonte spasm, sellest naha kahvatus, muutused EKG-s.

Keerutamise järel muutub ka nina limaskesta veresoonte verega täitumine. Muutused ilmnevad ka hingamise rütmis ja ulatuses. Higistamine suureneb. Mõjustatud saab ka seedetrakt: tekib iiveldus, peristaltika elavneb, võib järgneda oksendamine. Suureneb süljeeritus, ühtlasi muutub sülje koostis. Muutused ilmnevad ka ainevahetusprotsessides (näit.: suhkruaine vahetus).

Keerutamise järel suureneb erütrotsüütide arv. Väga tugeval vestibulaaraparaadi ärritamisel tekib nn. "merehaigus" sümptoomkompleks - kahvatumine, külm higi, iiveldus, oksendamine, muutused südame-veresoonkoona tegevuses ning hingamise rütmis.

Ärritusseisundis võib olla nii sümpaatiline kui ka parasümpaatiline närvisüsteem.

Ajukoore võib vahetult mõju avaldada vestibulaartsentrumitele sel teel, et pidurdab reaktsiooni esiletulekut.

Tingitud sidemete esinemine avaldub suurel määral "merehaiguse" patogeneesis. Näiteks, reisija hakkab ennast halvasti tundma juba lainetava mere nägemisel või ka teate juures, et peab sõitma merel.

Ajukoore pidurdava osaga on seletatav keerutusjärgse nüstagmi puudumine mõnel tervel isikul.

Kalooriline (termiline) proov.

Selle proovi abii uuritakse eraldi vasaku ja parema labürindi reaktsiooni (peamiselt horisontaalse poolringkanali cupula erutatavust) pärast külma või sooja vee viimist kuulmekäiku (kuulmekile peab olema terve). Kuiva perforatsiooni korral proovitakse kalooriliselt külma või sooja õhuga Aspissovi järgi.

Uuritav istub toolil, pea 60° tahapoole, lamades aga 30° ettepoole painutatud. Sellega viime horisontaalse poolringkanali vertikaalsesse asendisse - ampull on üleval ning lihtsäär allpool. Väliskuulmekäiku viiakse kõrvasüstla abil külma vett (keha temperatuurist madalam), mille temperatuur on +15° - +30° või sooja vett (üle keha temperatuuri), näiteks +44°. Termilis-füüsikalise reaktsiooni mõjul tekib pärast külma või sooja vee süstimist välise kuulmekäigu kaudu temperatuuri diferents lähedal asuva horisontaalse poolringkanali ampullaarses sääres. Tehakse mõlemale kõrvale kalooriline proov külma (+30°) ja sooja (+44°) veega, seega vee temperatuuri vahel on ±7° keha temperatuuri suhtes. Sellega

on reaktsioonid omavahel võrreldavad. Nüstagm tekib alati ühele poolele, mis on tingitud endolümf ampullopetaalset liikumissuunast.

Külma vee puhul jahtunud endolümf molekuliid langevad füüsika seaduse põhjal allapoole lihtsääre suunas (ampullofugaalselt). Sellega viiakse karvakesed crista ampullaris'es tasakaalust välja, mille tulemuseks on horisontaalnüstagm. Külma vee puhul tekib nüstagm vastaspoolele, sooja vee korral aga samale poolele. Sama kehtib ka operatiivselt vabastatud poolringkanali kohta direktse külmaärrituse puhul (näiteks viies vatiga eetrit poolringkanalile). Ka tekib narkoosi ajal silmade aeglane kõrvalekaldumine (nüstagm). See lubab täpselt kindlaks määrata, kas poolringkanalite funktsioon on olemas või puudub. Haigetel, kellel vestibulaarreaktsioon on välja langenud, ei õnnestu ka kaloorilise prooviga reaktsiooni esile kutsuda. Vaatamata suure hulga külma vee süstimisele (100 - 200 ml) saadakse nõrk ärritus, millega määratakse kindlaks vestibulaaraparaadi erutuslävi.

Vestibulaaraparaadi uurimiseks viiakse 5 - 10 ml 36° vett väliskuulmekäiku ja kui reaktsioon puudub, siis järkjärgult alandatakse süstitava vee temperatuuri, kuni tekib nüstagm. Kui 1 l külma vee süstimise järel nüstagmi ei teki, siis on labürint kustunud.


Kui kuulmekile on perforeerunud, siis ei ole lubatud vettehüpped, sukeldumine, allveesport, kuna külma vee sattumine keskkõrvaruumi võib põhjustada labürindi tugeva ärrituse, millele võib järgneda tasakaaluhäire ja uppumine.

Galvaaniline proov.

Vestibulaaranalüsaatori elektriliseks ärritamiseks kasutatakse alalisvoolu (galvaanilist). Tavaliselt 2 - 5 mA alalisvoolu puhul tekib horisontaal-rotatoorne nüstagm, mille kiire komponent on suunatud katoodile.

Galvaanilist proovi kasutatakse nendel juhtudel, kui keerutus- ja kalooriline proov jäid negatiivseks.

Monoauraalne (monopolaarne) proovi puhul pannakse aktiivne elektrood (katood) väliskuulmekäiku, indiferentne elektrood rinnale või seljale. Voolu tugevus 10 - 20 mA. Nüstagn tekib ärritatud kõrva suunas (katoodi suunas).



Joon. 5. Vestibulaarparaadi reaktsioon seoses galvaanilise ärritusega.

- | | | |
|----------------------------|-----------------------|--|
| 1 - binauraalne bipolaarne | 2 - monauraalne | 3 - binauraalne monopolaarne |
| nüstagn katoodi poole | nüstagn katoodi poole | sümmeetriline ärritus, nüstagni ei teki. |

Binauraalse ja bipolaarse proovi puhul on mõlemad elektroodid aktiivsed, millest üks asetatakse tragus'e ette või nibujätkele, teine teise kõrva. Voolu (2 - 4 mA) sisselülitamisel tekib pea kõrvalekaldumine anoodi suunas, nüstagn aga katoodi küljele.

Binauraalne ja monopolaarne proov. Mõlemad aktiivsed elektroodid on omavahel ühendatud ja asetatud kõrvade ette, indiferentne elektrood asetatakse keha rinna keskjoonele. Vestibulaaranalüsaatori ühesugusel erutuvusel ei teki keha kõrvalekaldumist ega nüstagni. Erineva vestibulaarparaadi erutuse korral tekib kõrvalekaldumine tugevama ärritaja poolele.

Galvaaniline vool ei ärrita mitte ainult ampulaarselt ja otoliitilist retseptorit, vaid ka vestibulaarnärvi, vestibulaarganglioni ning mõnede autorite järgi ka vestibulaarergu- tuumi ajus.

Galvaaniline proov on vajalik retrolabürintaarse erutus- seisundi kindlakstegemiseks. Galvaanilise prooviga on võimalik

diferentseerida labürintaarset kahjustust retrolabürintaar-
sest.

Pressoorne proov ehk fistuli sümptoom.

Fistuli sümptoomi kindlakstegemiseks tihendatakse või hõrendatakse õhku väliskuulmekäigus (Politzeri) kummiballoo-
niga. Fistuli olemasolul horisontaalses poolringkanalis, mis on kõige lähemal cavum tympani'le, võib saada nüstagm uuri-
tava kõrva poolele õhu tihendamisel ja vastasküljele õhu hõ-
rendamisel kuulmekäigus. Fistuli olemasolul tekib õhkärrita-
vuse tulemusena (fistuli sümptoom) ampullopetaalne või am-
pullofugaalne endolümfi liikumine. Sellel proovil ei ole
siiski absoluutset tähendust, sest mõningate haiguste puhul
(kaasasündinud luues, äge keskkõrvapõletik) saadakse vahel
ka fistuli puudumisel pressoorne nüstagm (fistuli sümptoom
ilma fistulita).

Optokineetiline nüstagm tekib, kui vaadatakse silmade
ees kiiresti vilkuvatele esemetele (näiteks rongis sõitmisel).
Optokineetiline nüstagm võib olla horisontaalne või verti-
kaalne. Kui vestibulaarnüstagm ilmub tingimata koos ajutüve
refleksiga, siis optokineetiline nüstagm realiseerub ajukoo-
re nivool. Optokineetilise nüstagmi juures tekib nägemisret-
septori ärritus, vestibulaarnüstagmi puhul aga poolringkana-
lite ärritus, ühine on neil osaliselt refleksi anatoomiline
tee - vestibulaartuumad ja pilku pööravate silmalihaste er-
kude tuumad.

Optokineetilise proovi jaoks kasutatakse keerle-
vat trumlit (10 tiiru 20 sekundi jooskul), millele on klee-
bitud vahelduvalt valged ja mustad ribad. Uuritav istub 50 cm
kaugusel trumlist ja jälgib trumli liikumist. Normaalselt te-
kib optokineetiline nüstagm trumli keerutamisele vastassuu-
nas. Vahel täheldatakse atüüpilist reaktsiooni, kus nüstagmi
ei teki või tekib trumli tiirlemise suunas. See spontaannüs-
tagm ei ole vestibulaarset päritolu, vaid tekib optomotoor-
se tee kahjustusest ajus (kolju tagumise koopa tuumorid).

Optokineetilist nüstagmi iseloomustab tema suuna, amplituudi, sage faaside ja rütmi vaheldumine, bin- või monokulaarsus, kui on kahjustatud optomotoorne juhtetee.

Otoliiitilise aparaadi (OA) uurimine.

Otoliiitilise aparaadi haigestumine võib tekkida seoses kolju traumaga, mürgistuste, infektsioonhaiguste (gripp, puugi entsefaliit), ajutuumorite (kolju tagumises koopas), kuulmisnärvi tuumori ja neuriidi ning ka Morbus Ménière'i puhul. Mere- ja õhuhaigus võivad samuti põhjustada otoliiitilise aparaadi düsfunktsiooni, mille tagajärjel vallanduvad vestibulaarvegetatiivsed refleksid.

Anamnees.

Haiged kaebavad ootamatult tekkivat pearinglemist, iiveldust, oksendamist, vahel ka õhnutõusmise või kukkumise, langemise tunnet.

Objektiivselt täheldatakse nüstagmi, mis tekib pea teatud asendi juures, näiteks pea painutamisel taha või ette jne., kaob peasendi muutumisel. Nii subjektiivsete kui ka objektiivsete sümptomide kestus on erinev - mõnest tunnist mõne kuuni. Utriculus'e kahjustuse puhul tekib lühiaegne, kuid tugev pearinglemise atakk nüstagmiga pea taha ja küljele kallutamisel. Valmidus nüstagmiks paremal silmal võib ole- neda vastaspoolse (vasaku) utriculus'e kahjustusest.

Otoliiitilise aparaadi objektiivselt uurimisest.

Otoliiitilise aparaadi (OA) funktsioon on tihedalt seotud poolringkanalite funktsiooniga, sellepärast annab otoliiitilise aparaadi uurimine ainult osalise ettekujutuse tema funktsioonist.

Otoliiitilise aparaadi funktsiooni uuritakse professio-

naasel valikul, hinnates otoliitilise reaktsiooni väljendusastet sõltuvuses vegetatiivse ja somaatilise reflekside intensiivsusega, mis tekivad katse lõpus.

V.I. Vojatšeki kahekordne keerutuskats.

1. Uuritav istub pöördtoolil, pea koos kehaga (pea põlvedel) painutatud 90° ette. Sellejuures toimub utriculus'e otoliitide paigalt nihkumine.

2. Keerutatakse 5 tiiru paremale 10 sekundi jooksul. Tekib poolringkanalite ja otoliitide ärritus.

3. Pärast keerutamise lõppu hoiab uuritav pead veel 5 sekundit 90° painutatult ette. V.I. Vojatšeki arvates siis taandub poolringkanalite reaktsioon tagaplaanile.

4. Uuritaval lastakse pea tõsta, sellejuures peab jälle ilmne otoliitide paigalt nihkumine utriculus'es, nad lähevad tagasi oma tavalisse asendisse. See vallandab somaatilise ja vegetatiivse reaktsiooni, mille tugevuste on erinev. 5 minuti pärast, kui on kadunud nähud, mis tekkisid seoses reaktsiooniga, korratakse keerutamist vasakule. See võimaldab eraldi uurida vasakut ja paremat kõrva.

Otoliitilise reaktsiooni tugevust hindab V.I. Vojatšek vegetatiivsete nähtude järgi:

1. Vegetatiivsed nähud puuduvad, siis reaktsioon võrdub nulliga (VR - 0).

2. Näo kahvatumine, pulsi sagemine või aeglustumine võrdub VR-I (vegetatiivse reaktsiooni esimene aste).

3. VR - 2 aste kui eelmistele sümptomidele lisandub veel higistamine.

4. VR - 3 aste, kui tekib iiveldus, oksendamine, poolnõrkenud seisund.

Somaatilist reaktsiooni hindab V.I. Vojatšek järgmiselt:

1. 0-ga, kui puudub keha kõrvalekaldumine, nüstagm ei ole elav ega kaua kestev;

2. I aste, kui ilmneb keha kerge kõrvalekaldumine pärast pea ülestõstmist ($0 - 5^\circ$).

3. II aste, esineb keha kõrvalekaldumine $5 - 30^\circ$, mille uuritav raskustega likvideerib.

4. III aste, asendi stabiilsus on selgesti häiritud, tekib tugev keha kõrvalekaldumine, tasakaalu kadumine, kukkumine.

S.M. Kompanejetsi kats ehk silmade vastupööramise nurga uurimine.

Silmade vastupööramise nurk oleneb sagitta (s. o. sacculus'e otoliidid, mis asuvad peaaegu sagitaalses tasapinnas) funktsioonist. Seda saab jälgida pea aeglasel painutamisel õlale, siis silmad pöörduvad tagasi algseisu (toimub peapainutusele vastassuunaline liikumine). Seega säilitavad silmad pilgu ruumis otoliitilise aparadi normaalse funktsiooni puhul. Sel korral on ka silmade vastupööramise nurgad ühesugused. S. M. Kompanejetsi järgi silmade vastupööramise nurk on $10 - 11^\circ$, kui pea on painutatud 60° võrra õlale (normaalse otoliitilise aparadi puhul). Otoliitilise aparadi haigestumisel ei suuda silmad säilitada pilku ruumis (puudub silmade vastassuunaline liikumine pea painutamisel).

Kumulatsioonireaktsioon.

Kumulatsioonireaktsiooni uurimine viiakse läbi K.L. Hilovi 4-kangilisel kiigel. See proov põhineb sirgjoonelisele kiirendusele, mis tekib kiige liikumisel. Kui 5-minutilise kiikumise jooksul ilmuvad vegetatiivsed nähud, siis on tegemist kiikumise reaktsiooni III astmega (K III). Kui vegetatiivsed nähud ilmuvad 5 - 10 kiikumise minuti vahel, siis on K II aste. Ja kui vegetatiivsed reaktsioonid vallanduvad 10-15 kiikumise minuti vahemikus, siis on kiikumise I aste (KI). Kui pärast 15-minutilist kiikumist vegetatiivsed refleksid puuduvad, märgitakse reaktsioon - KO. Kiikumist uuritakse elukutse valikul (lenduritel).

Otoliitilise kõnnaku uurimine.

Uuritav kallutab aeglaselt pead (kinniste silmadega!) 10 korda paremale ja vasakule õlale minuti jooksul. Sellejärel kõnnib uuritav kiiresti paremale või vasakule õlale painutatud peaga ettepoole. Sellejuures märkab enamik inimesi tõuget painutatud pea suunas, mis sõltub kõrgeenenud sagitta erutuvusest. Tekib sakulaarne kõnnak.

Kui aga teha 10 aeglast peapainutust ette ja taha suletud silmadega ning pärast kiiresti kõndida edasi, kusjuures pea on painutatud 90° alla, tekib nn. kukekõnnak - põlveliigeste painutus ja jalgade tõstmine (utrikulaarne käik). Kui otoliitiline kõnnak ilmub 2 - 3 sammu järel, siis on tegemist lapilli (utriculus'e otoliidid, asuvad peaaegu horisontaalses tasapinnas) ja sagitta (sacculus'e otoliidid) suurenenud erutusega.

Asendinüstagmi uurimine.

Asendinüstagmi all mõistetakse nüstagmi, mis tekib sees peasendi muutumisega.

Asendinüstagmi määramisel (Cawthorne kats) istub uuritav kušetil, arst hoiab tema pead oma käte vahel ning asetab siis uuritava selili 3 sekundi jooksul, kusjuures pea on pööratud küljele. Haige silmad on sel ajal lahti ja ta vaatab otse ette. Kui 10 sekundi jooksul ei teki nüstagmi, tõuseb uuritav istuli. 10 sekundi möödudes asetab arst haige jälle selili, pea pööratud teisele poolele. Kui 10 sekundi möödudes ei teki ka selles asendis nüstagmi, siis tõuseb haige uuesti istuli. Arst jälgib jälle nüstagmi teket ning asetab nüüd uuritava selili otse taha painutatud peaga (kuid mitte liiga rippuva peaga!) ja jälgib 10 sekundi jooksul nüstagmi teket.

Asendinüstagm, mis tekib teatud kindla peasendi juures ja kaob asendi muutmisel, on otoliitilise aparaaadi kahjustuse väljenduseks. Perifeerse päritoluga asendinüstagm on too-

niline, s. t. ta kestab nii kaua, kui pea on teatud kindlas asendis. Samaaegselt koos asendinüstagmiga või ilma võib esineda pearinglemine, mis tekib kindla peasendi juures. Seda peetakse ka otoliitilise aparadi haigestumise sümptomiks.

Otoliitilise aparadi uurimismeetodite oluliseks puuduseks on, et nad ei võimalda uurida otoliitilist aparati isoleeritult. Asendinüstagmi tekkemehhanismi on vähe uuritud. Asendinüstagm võib tekkida otoliitilise aparadi kui ka kesknärvisüsteemi düsfunktsiooni tulemusena.

FUNKTSIONAALSETE HÄÄLE- JA KÕNEHÄIRETE DIAGNOOSIMISEST.

Foniaatria.

Foniaatria ehk õpetus funktsionaalseist häälehäireist käsitleb neid häälehäireid, mis sugenevad hääleorgani ebaõigest või liigsest kasutamisest. Patsientideks on lauljad, näitlejad, pedagoogid ja teised isikud, kel oma igapäevases töös tuleb rohkesti häält kasutada. Neil isikuil tekib hääle väsimus (phonasthenia), mis avaldub hääle kvaliteedi muutuses (hääle käheduses - dysphonia) või vahel isegi hääletus (aphonia). Häälehäire põhjuseks on häälepilu mittetäielik sulgus, mis enamasti on tingitud kõrisiseste lihaste jõuetusest ja häälepaelte ebaühtlasest pingest. Niisugused häälehäired kujunevad välja pikkamööda. Mõnikord võib häälehäire, s. o. sosinal rääkimine jääda püsima pärast kõripõletiku möödumist, kui põletikulised nähud on kadunud. Harvem võib neurasteenikuil ja hüsteerikuil neuroosina esineda järsku tekkiv afoonia. Lastel võib hääle kähedus esineda liiga valjust ja

rohkest kõri kasutamisest väga elava iseloomu tõttu. Reegli-
päraselt tekivad hääle muutused lastel ka puberteedieas -
poistel ekstreemsemalt kui tüdrukutel. Kui hääle kõrgus sta-
biliseerub, kujuneb tütarlastel välja kas alt või sopran,
poistel - bass, bariton või tenor.

Funktsionaalsete häälehäirete puhul larüngoskopeerimi-
sel puuduvad kõris põletikulised nähud; vahel võib häälepil-
lu sulgumatus põhjusena leida nn. laulja-sõlmekesi. Tuleb
jälgida häälepilu sulguse tihedust; funktsionaalsete hääle-
häirete puhul võib näha, et häälepilu ei sulgu kas kogu ula-
tuses või selle eesmises või tagumises osas. Täpsemaks hääle-
paelte liikumise häirete jälgimiseks tuleb kasutada strobos-
koopiat. Stroboskopeerimisel jälgitakse häälepaelte lii-
kumist üksikasjus: näiteks üks häälepael jääb liikumise ula-
tuselt teisest maha, liikumise erinevust võib täheldada hää-
lepaelte üksikosades (eesmises, keskmises või tagumises kol-
mandikus); samuti tuleb jälgida häälepaelte servade liikumist
vertikaaltasapinnas (häälepaela serva "lainetus").

Funktsionaalsete häälehäirete puhul võib esineda ka vale-
häälepaelte kokkusurumist, mis takistab häälepaelte nähtavust.

Funktsionaalsete häälehäirete diagnoosimiseks kasuta-
takse ka kunsttehislikku kurtust (Lombardi kats): hääl võib
momentaalselt selgineda mõlemapoolse kuulmise väljalülitami-
se puhul.

Hääl võib taastuda, kui puudutada kõrisonidiga häälepae-
lu (kerakats) - tekib kuuldav kõharefleks, mis taastab
hääle.

Võimalike hingamishäirete kindlakstegemiseks võib hinga-
misliigutusi registreerida rindkerelt ja kõhu piirkonnast
pneumograafilisel meetodil.

Funktsionaalsete häälehäirete ravimine kuulub arst-fo-
niaatrile ja pedagoogile (fonopeedile), kes rakendades hääle
füsioloogia õigeid aluseid taastavad kõri normaalse funktsi-
ooni.

Logopeedia ehk õpetus kõnehäiretest käsitleb neid kõne-defekte, mis tulenevad nii orgaanilistest muutustest kui ka funktsionaalsetest põhjustest. Orgaanilisteks põhjusteks võivad olla hambumuse häired (prognathia, progenia), lõhikuulagi, lõhikhuul ja deformatsioonid neelus spetsiifiliste protsesside (tuberkuloos, gümma) tagajärjel.

Kõne-defektiks võib olla ka üksikute kaashäälikute vales-
ti hääldamine, mil hääliku moodustumine ei toimu õiges kohas:
"s" (sigmatismus), "r" (rhotacismus), "g" (gammacismus), "k"
("kappacismus), "l" (lambdacismus), "d" (deltacismus) jt. Lõ-
hike keelekida (frenulum linguae) ja keeleotsa vähene liiku-
vus (ankyloglossum) harilikult ei ole kõnehäirete põhjuseks,
see võib arvesse tulla ainult üksikjuhtudel. Kuulmise nõrge-
nemine võib olla üksikute häälikute (kõige sagedamini "s")
või sõnalõppude vales-
ti hääldamise põhjuseks (nürikuulja
agrammatism).

Kõige raskemaks kõnehäireks on kogelemine (balbuties),
mis avaldub kõne tõkestuses. Tõkestusi põhjustavad krampid
kõneorganite lihastes. Tõkestus võib olla spastilist (toonil-
list) laadi või kloonilist laadi. Kõnetõkestust suurendab
erutus, mida tuleb silmas pidada patsiendiga vesteldes. Ko-
gelemise nähtavad sümptoomid võivad avalduda suu-, miimika-
ja kaelalihaste kokkutõmbes (näo grimassides). Vahel võib
esineda nn. kaasliigutusi, mis avalduvad käte, jalgade või
kogu keha liigutustes kõne tõkestuse ajal. Hingamisliigutus-
te pneumograafilisel registreerimisel võib samuti kindlaks
teha mitmesuguseid spastilisi ja kloonilisi avaldusi hinga-
mislihaste funktsioonis.

Et kogelemine on üldist laadi vegetatiivne närvisüste-
mi häire, siis tuleb otsida ka sümptoome selles sfääris. Nii
võib kogelejail olla elav dermografism ja külmad niisked peo-
pesad. Selles osas on soovitatav neuroloogi ja psühhiaatri kon-
sultatsiooni. Kui kogelejaga rääkida julgustavalt ja rahuli-
kult, jättes tähele panemata tema kõne-defekti, vähenevad ko-

gelemisnähud märgatavalt ja ladus kõne võib taastuda. Seda seletatakse tähelepanu kõrvalejuhtimisega kõneaktilt. Tähelepanu kõrvalejuhtimiseks oma kõnelt võib kogelejat lasta laulda, mil kõnetõkestusi ei esine. Samuti kuulmise väljalülitamine kunsttehisliku kurtusega (Lombardi kats), kõnetõkestused võivad kaduda ja kõne muutuda ladusaks. Funktsionaalsed hääle- ja kõnehäired kaovad ka joove-narkoosis (eetriga, klooretüüliga, CO₂-ga), mida võib kasutada diagnostiliseks otstarbeks ja raviks. Nimetatud faktid räägivad kogelemise funktsionaalse päritolu poolt.

Ravi kogelemise puhul peab toimuma üldtugevdavate, närvisüsteemi tasakaalustavate vahenditega ja kõneorganite õige rakendamisega arst-logopeedi ja pedagoogi juhendamisel.

A k a d e e m i l i s e h a i g u s l o o
s k e e m .

Haige nimi

Vanus

Elukutse

Elukoht

Ravile saabumise aeg

Haige uurimise aeg

Diagnoos:

Haigusloo koostaja

..... kursus rühm

1. Anamnesis.

Anamnesis communis (elu-, perekonna-, epid. anamnees, varem põetud haigused).

Anamnesis morbi (kaebused, haiguse käik).

2. Status otorhinolaryngologicus.

Nina (nasus)

Väline leid (välisvaatlus, palpatsioon).

Rhinoscopia anterior.

Ninaesiku, nina vaheseina, nina limaskestast seisund, ninakäigud, karbikud. Ninaeritise iseloom ja lokaliseerimine.



Joon. 6.

Nina funktsioon.

Ninahingamine (paremal ja vasakul).

Haistmine (paremal, vasakul).

Röntgeniülesvõtte nina kõrvalkoobastest.

Ninaeritise bakterioloogiline leid, eosinofiilsete leukotsüütide esinemine nina veres ja eritises.


Põsekoopa loputuse andmed.

Põsekoopa eritise bakterioloogiline leid.

Rhinoscopia posterior.

Ninaneeluvõlv, ninaneelumandel, koanid, kuulmetõrve avad, eritis, koorikud, tuumor.

Digitaalne palpatsioon.



Joon. 7.

Oroscopia.

Suu limaskest, hambad, igemed, keel, kõva suulagi, süljenäärmed, suupõhi.

(Meso)pharyngoscopia.

Pehme suulagi, kurgukaared (värvus, turse).

Kurgumandlid (suurus, värvus, lakuunid, nende sisu, katud).

Neelu tagumine sein.

Neelurefleks.

Neelueritise bakterioloogiline leid.



Joon. 8.

Hypopharyngoscopia.

Keelepära leid.

Digitaalne palpatsioon.

Kael.

Välisvaatlus ja palpatsioon (lümfisõlmed, kilpnäärre).


Kõri (larynx).

Välisvaatlus ja palpatsioon.

Laryngoscopia indirecta.

Kõriesik (sissekäik).

Keelemandel, valleeikulid, recessus piriformis'ed, kõripealis, plica ary-epiglottica. Häälepaelad, valehäälepaelad, häälepilu, subglotiline ruum.



Joon. 9.

Kõri funktsioon.

Hääl, hingamine.

Trahhea ja bronhid (trachea et bronchi).

Trahhea nähtavus kaudse larüngoskoopia puhul.

Tracheo- ja bronchoscoopia.

Söögitoru e. (oesophagus).

Toidu läbitavus.

Röntgenoloogiline uurimine.

Oesophagoscoopia.


Kõrvad (aures).

Välisvaatlus (eraldi vasak ja parem).

Kõrvalest, nibujätke, proc. zygomaticus. Regionaarsed lümfisõlmed.

Otoscoopia.

Väliskuulmekäik. Vaik.Eritis (hulk, konsistents, lõhn, värvus). Kuulmekile leid, perforatsioonid, granulatsioonid, kolesteatomass. Cavum tympani limaskest (perforatsiooni korral).



Joon.10.

Kuulmetõrve läbitavus.

Toynbee, Valsalva kats, läbipuhumine Politzeri järgi, kate-
teriseerimine.

Kõrvaeritise bakterioloogiline leid.


Patoloogilis-histoloogiline kõrvagranulatsioonide leid.

Röntgeniülesvõte nibujätkest.

Kuulmisfunktsioon.

	Parem kõrv	Vasak kõrv
Sosinkõne		
Tavaline kõne		
Weberi kats		
Rinne kats		
Schwabachi kats		
Gellé kats		
c ⁵ kuuldavus		

Audiogramm (toon- ja kõneaudiogramm).




KÕNEAUDIOGRAMM

NIMI.....

VANUS..... KUUPÄEV.....

DIAGNOOS.....



Vestibulaaraparaadi uurimine.

Pearinglemine. Spontaanne nüstagm (iseloom), näitamiskats, sõrme-ninaotsa kats, adiadohhokinees. Rombergi kats, kukkumise suuna muutumine pea pööramisel. Käimine suletud ja avatud silmadega. Kõrvalekaldumine. Kõnnak. Fistuli sümptoom.

Vestibulaaraparaadi eksperimentaalne uurimine.

Keerutuskats (keerutusjärgne nüstagm pärast paremale keerutamist sek., pärast vasakule keerutamist sek.). Kaitseliigutused pärast keerutamist, kukkumise kalduvus, vegetatiivne reaktsioon.

3. Diagnoosimine.

4. Diferentsiaaldiagnoos.

5. Etiopatogenees.

6. Raviskeem.

7. Prognoos.

Elule, funktsiooni taastumise osas.

8. Profülaktika.

9. Epikriis.

Kuupäev.

Allkiri.

K i r j a n d u s .

1. Воячек В.И., Основы оториноларингологии, Л., 1953.
2. Воячек В.И., Военная оториноларингология, 1946.
3. Преображенский Б.С., Темкин Я.С., Лихачев А.Г., Болезни уха, носа и горла, М., 1960.
4. Ундриц В.Ф., Хиллов К.Л., Лозанов Н.Н. и Супрунов В.К., Болезни уха, горла и носа, Л., 1960.
5. Фельдман А.И. и Вульфсон С.И., Болезни уха и верхних дыхательных путей в детском возрасте, М., 1964.
6. Многотомное руководство по оториноларингологии. Общая оториноларингология, под ред. И.А.Лопотко и Я.С.Темкина, том I, М., 1960.
7. Eckert-Möbius, A., Lehrbuch der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Leipzig 1964.

S i s u k o r d .

Kõrva-, nina- ja kurguhaigete uurimise tingimused. (E. Siirde)	3
Nina uurimine. (E. Siirde).	4
Suuõõne uurimine. (A. Jents).	12
Neelu uurimine. (A. Jents).	16
Kõri, trahhea, bronhide ja söögitoru uurimine. (K. Gerassimova)	19
Kõrva uurimine. (V. Särgava).	33
Vestibulaaranalüsaatori funktsiooni uurimine. (S. Sibul)	57
Funktsionaalsete hääle- ja kõnehäirete diagnoosimisest. (E. Siirde)	79
Akadeemilise haigusloo skeem.(S. Sibul)	83
Kirjandus	88

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
УШНЫХ, НОСОВЫХ И ГОРЛОВЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Издание второе, дополненное
На эстонском языке

Тартуский государственный университет
СССР, г. Тарту, ул. Иннокентия, 18

Vastutav toimetaja E. Siirde
Korrektor A. Nerberg

TRÜ rotaprint 1968. Paljundamisele antud 19. XII 1968.
Trükipoognaid 5,6. Tingtrükipoognaid 5,5. Arvestus-
poognaid 4,8. Trükiaru 800. Paber 30 x 42. 1/4.
MB 09294. Tell. nr. 774.
Hind 15 kop.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

Hind 15 kop.

A-

29 713

74 039

TÜ RAAMATUKOGU



1 0300 00403245 6