

Est. A- 17134



# СИФИЛИСЪ

ПОПУЛЯРНЫЙ ОЧЕРКЪ

доктора Э. Заленскаго.

---

ИЗДАНИЕ ПЕЧЕРСКОЙ УЪЗДНОЙ УПРАВЫ.

---

1 9 2 7

Типографія „Тяхть“ — Печеры.

TARTU ÜLIKOOLI  
RAAMATUKOGU

47 97 1575

# СИФИЛИСЪ.

ПОПУЛЯРНЫЙ ОЧЕРКЪ  
ДОКТОРА Э. ЗАЛЕНСКАГО.

Изъ разнаго рода безчисленныхъ болѣзней, которыми страдаетъ человѣкъ, нѣтъ ни одной такой изнурительной и ужасной для него болѣзни, какъ сифилисъ. Болѣзнь эта изнурительна потому, что она тянется годами, и ужасна потому, что отъ больныхъ имъ родителей она передается дѣтямъ, то-есть, по наслѣдству. Отъ родителей сифилитиковъ дѣти рождаются хилыми и они настолько маложизнеспособны, что или умираютъ вскорѣ послѣ рожденія, или доживаютъ не долѣе 20—21 года, причѣмъ они бываютъ малаго роста, скелетъ у нихъ неправильный, мѣстами на костяхъ замѣчаются утолщенія, зубы неправильны, особенно рѣзцы, на одномъ или обоихъ глазахъ выпячивается синеватый рубецъ и бываетъ глухота на одно или оба уха. У такихъ дѣтей достаточно малѣйшей причины, напримеръ, простуды, чтобы вызвать опасное заболѣваніе внутреннихъ органовъ и смерть. Сифилисъ, значить, болѣзнь, вырождающая человѣчество, и не можетъ поэтому не ужасать его.

Нѣтъ ни одного мѣста, ни одной отдѣльной части, то-есть, органа нашего тѣла, которыхъ бы не тронула эта болѣзнь. Она безъ разбора поражаетъ какъ корень волосъ, такъ и самую существенную часть нашего организма — мозгъ. Значить, сифилисъ есть еще болѣзнь всего нашего тѣла, всего нашего тѣлосложенія или, какъ его иначе называютъ, конституціи. Поэтому эту болѣзнь причисляютъ еще къ болѣзнямъ конституціональнымъ.

Долгое время ученые не могли точно узнать, отчего именно происходятъ заразные болѣзни. Теперь уже достовѣрно доказано, что большинство болѣзней происходитъ отъ невидимыхъ для нашего глаза мельчайшихъ живыхъ тѣлецъ, которыя названы микроорганизмами или микробами. Этыхъ микробовъ можно видѣть только посредствомъ микроскопа. Микроскопъ это такой приборъ, въ которомъ въ одной металлической трубкѣ искусно соединено нѣсколько сильно увеличительныхъ стеколъ. Вотъ посредствомъ этого увеличительнаго прибора учеными и найдены были микробы большинства заразныхъ болѣзней. Такъ въ 1850 г. открыты были микробы сибирской язвы, въ 1871 г. — проказы, въ 1873 г. — возвратной горячки или тифа, въ 1880 г. — болотной лихорадки, въ 1880 г. — брюшного тифа, въ 1883 г. — холеры, въ 1890 г. — чахотки. Въ 1906 году

одновременно двумя учеными Шаудиномъ и Гоффманномъ, послѣ многолѣтнихъ и тщетныхъ поисковъ, наконецъ, были открыты и микробы сифилиса.

Эти микробы оказались въ видѣ спирально-изогнутыхъ, бѣлаго цвѣта палочекъ и названы были блѣдными спирохетами. Чтобы произвести болѣзнь, микробы должны проникнуть въ наше тѣло. Черезъ неповрежденную кожу проникнуть они не могутъ. А вотъ, если на кожѣ есть царапина или даже еле замѣтная какая-нибудь ссадина, микробы проникаютъ въ наше тѣло безъ всякаго затрудненія. Мѣсто ихъ входа въ наше тѣло называется воротами. Простой народъ называетъ сифились „дурной болѣзнью“ или „дурницею“ и полагаетъ, что она бываетъ только у людей, ведущихъ распутный образъ жизни. Но это только народный предрассудокъ, такъ-какъ сифилисомъ нерѣдко болѣютъ и ни въ чемъ неповинныя дѣти и грудные младенцы. Теперь сифились не причисляется къ венерическимъ болѣзнямъ, то-есть къ такимъ, которые происходятъ отъ зараженія половымъ путемъ — отъ женщинъ распутнаго образа жизни. Сифились теперь считается только заразительною болѣзнью. А заразиться сифилисомъ очень легко. Заражаются имъ или непосредственно отъ самого больного, на примѣръ, при поцѣлуѣ, или отъ предметовъ и вещей, которые онъ лично употреблялъ, на примѣръ, отъ его гребенки. Чаще всего заражаются отъ сношеній съ нездоровыми публичными женщинами, при поцѣлуяхъ, въ банѣ, чайныхъ (отъ стакановъ) и парикмахерскихъ (отъ бритвъ). У простого народа есть и до сего времени очень скверная привычка просить докурить чужую папиросу или „цыгарку“. Вотъ, и при этомъ случаѣ можно легко схватить эту болѣзнь. Заразитъ грудного ребенка можетъ и больная сифилисомъ мамка. Были случаи зараженія сифилисомъ отъ пассажирскихъ билетовъ и монетъ, которые при занятыхъ рукахъ брали въ ротъ торопливые пассажиры.

Если кто заразился сифилисомъ, то онъ проявляется не вдругъ. Черезъ 2—3 недѣли и даже 40 дней на томъ мѣстѣ, гдѣ проникла зараза, то-есть, въ воротахъ появляется затвердѣнiе. Оно можетъ безслѣдно пропасть иногда даже черезъ 1 недѣлю. Въ другихъ случаяхъ это затвердѣнiе, если оно будетъ подвергаться раздраженію, на примѣръ, тренію или смачиванію, изъязвляется и получается язва съ затвердѣнiемъ по краямъ. Вотъ эта язва и называется твердымъ шанкромъ. Шанкръ при правильномъ леченіи заживаетъ скоро. Но иногда, особенно у пьяницъ или у людей, которые живутъ скученно (у рабочихъ) или питающихся не свежою пищею (у матросовъ) шанкерныя язвы сильно распространяются и углубляются. Заживаютъ онѣ очень не скоро и оставляютъ по себѣ обширный рубецъ. Приблизительно черезъ 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> недѣли послѣ появленія твердаго шанкра начинаютъ припухать ближайшія железы.

Напримѣръ, если шанкръ былъ на половомъ членѣ, то припухаютъ железы въ паху; если шанкръ помѣщался на верхней губѣ, то прежде всего припухаютъ железы, лежащія впереди уха. Эти железы рѣдко вообще припухаютъ и поэтому припуханіе этихъ железъ хороший опозновательный признакъ сифилиса. Припухающія при сфилисѣ железы малоболезненны и рѣдко нагнаиваются, то есть, превращаются въ такъ называемыя бубоны. Спустя 5—6 мѣсяцевъ, даже и безъ леченія, всѣ железы пропадаютъ; но могутъ иногда держаться 1—1½ и даже 2 года. Твердый шанкръ можетъ появляться вездѣ: на боку, спинѣ, нижнихъ конечностяхъ, волосистой части головы, на губахъ, кончикѣ языка, въ углахъ рта, зѣвѣ, заднемъ проходѣ и даже на пальцахъ рукъ. Шанкръ на пальцахъ рукъ бываетъ чаще всего у акушеровъ и очень болѣзненъ, при чемъ обыкновенно сходитъ ноготь. Исчезновеніемъ твердаго шанкра, произвольнымъ или наступившимъ послѣ леченія, еще далеко не оканчивается сифились.

Время, во все теченіе котораго продолжается то или другое однородное явленіе, называется періодомъ. И вотъ за первымъ періодомъ, то есть, за періодомъ твердаго шанкра, наступаетъ второй періодъ сифилиса.

Этотъ второй періодъ сифилиса проявляется въ формѣ высыпи на кожѣ разнаго вида сыпей, которыя въ наукѣ называются сифилидами. Появленіе на кожѣ высыпи означаетъ, что сифились проникъ въ кровь и начинаетъ весь организмъ отравлять своимъ ядомъ. Сифилиды или кожныя сифилитическія сыпи появляются по всему тѣлу между 9—12 недѣлями отъ появленія шанкра. Онѣ бываютъ самаго разнообразнаго вида и появляются то въ видѣ: пятенъ, узелковъ, пузырьковъ, гнойничковъ и бугорковъ, то въ видѣ язвъ. Еще до высыпи между 7—9 недѣлями больной уже чувствуетъ не по себѣ: у него появляются: усталость, слабость, неспособность къ работѣ, отвращеніе къ физическому и умственному труду и въ это-же время, особенно по ночамъ болятъ всѣ кости и припухаютъ всѣ поверхностныя железы. А за 3—4 дня до высыпи появляется ознобъ, который къ утру заканчивается сильнѣйшимъ потомъ. Лихорадка продолжается иногда до 7 дней. Обильнѣе всего сыпь появляется на мѣстахъ, подвергающихся какому-либо раздраженію; на поясѣ, лопаткахъ, шеѣ, гдѣ третъ воротъ рубахи, на тѣхъ мѣстахъ лба, гдѣ сидитъ шляпа, а у рабочихъ, которые работаютъ при высокой температурѣ, на рукахъ. На границѣ волосистой части головы отдѣльныя сифилитическія сыпки, вскорѣ послѣ своего появленія, быстро ширятся, сливаются другъ съ другомъ и загнаиваются, отчего образуется въ верхней части лба покрытый гнойными корочками вѣнчикъ, который называется короною Венеры (у древнихъ римлянъ такъ называлась богиня любви).

Въ полости рта, заднемъ проходѣ и на половыхъ частяхъ, вслѣдствіе постояннаго смачиванія пищею, слізью и другими выдѣленіями этихъ органовъ, сифилитическія сыпи имѣютъ нѣсколько другой видъ, чѣмъ на кожѣ тѣла. Здѣсь сифилитическія сыпинки скоро слизнуть и покрываются непрозрачнымъ опаловаго цвѣта налетомъ. Затѣмъ онѣ вслѣдствіе сліянія другъ съ другомъ становятся сплошными и могутъ разрастаться въ видѣ малинки или гриба. Серьезнѣе всего страдаетъ носъ. Онъ часто измѣняетъ свою форму до неузнаваемости. Если въ носу появилась сыпь, то носъ закупоривается и ребенокъ можетъ даже умереть. Насморкъ, который при этомъ всегда бываетъ, сильно зловонный. Изъ сыпи въ носу можетъ образоваться язва, которую, если своевременно ее не лечитъ, можетъ разрушить весь скелетъ носа. И вотъ послѣ заживленія такой носовой язвы носъ получается или бараній, или сѣдловидный. Надъ такимъ сѣдловиднымъ носомъ въ деревняхъ трунчатъ, называя его „носомъ въ талью“. Бараній носъ образуется тогда, когда язва разрушаетъ переднія части перегородки носа и идетъ впередъ. Образующійся послѣ заживленія язвы рубецъ притягиваетъ кончикъ носа книзу. Если язва идетъ въ глубь полости носа и разрушаетъ глубокія части его перегородки, то рубецъ притягиваетъ верхушку носа кверху — носъ смотритъ вверхъ.

Всѣ сифилиды отличаются отъ простыхъ сыпей тѣмъ, что онѣ не зудятъ. Кромѣ того ихъ особенность еще въ томъ, что онѣ возвращаются или какъ иначе говорятъ, рецидивируютъ. Каждая нелеченная сыпинка проходитъ сама собою черезъ 3—4 недѣли, а затѣмъ опять повторяется. Такая повторяемость является въ теченіи 6 мѣсяцевъ, но можетъ затягиваться на 3—5 лѣтъ.

За вторымъ періодомъ сифилиса идетъ третичный, называемый иначе гуммознымъ. Этотъ періодъ появляется черезъ 15—20 даже черезъ 40 лѣтъ послѣ зараженія. Болѣзнь въ этотъ періодъ поддается излеченію мало и обнаруживается въ появленіи бугорковъ. Бугорки (гуммы) большею частью развиваются въ толще кожи, величиною въ горошину, увеличиваются медленно и срастаются съ кожей, которая тогда становится неподвижною и имѣетъ мѣдно-красный цвѣтъ. Затѣмъ изъ твердыхъ эти горошинки дѣлаются мягкими. Когда кожа надъ ними лопнетъ, вытекаетъ гуммозная матерія, одноформенная, безъ тноя и очень похожая на растворъ мѣди, отчего и получила названіе „гуммозная жидкость“. Послѣ вскрытія горошины или гуммы получается глубокая язва. Эта язва можетъ распространяться въ глубь и въ ширь. Если она заживаетъ, то образуется вдавленный рубецъ. Гуммы развиваются на туловищѣ, ягодицахъ, спинѣ и нижнихъ конечностяхъ; рѣдко на лицѣ, щекахъ и губахъ.

Нѣтъ, какъ уже сказано, ни одной части человѣческаго тѣла, которая могла бы не страдать отъ этого бича рода человѣческаго. Ужаснѣе всего, когда она поражаетъ спинной или головной мозгъ. Если она свила свое гнѣздо въ спинномъ мозгѣ, то образуется спинная сухотка; а если въ головномъ мозгѣ, то нарастающій или прогрессивный параличъ. Какъ та, такъ и другая болѣзнь незлѣчимы. Спинная сухотка можетъ тянуться 10—25 лѣтъ, а прогрессивный параличъ сводить больного въ могилу в теченіи 2—5 лѣтъ. При спинной сухоткѣ сначала появляются стрѣляющія боли въ ногахъ, затѣмъ больной не можетъ самопроизвольно задерживать мочу, далѣе являюся: нечувствительность ногъ, неподвижность зрачковъ и неувѣренная походка. Съ появленіемъ полной слабости въ рукахъ больной уже совершенно приковывается къ постели и каждый слѣдующій день грозитъ ему смертью.

При прогрессивномъ параличѣ съ медленно наступающими у больного параличами идетъ одновременно разрушеніе духовныхъ способностей, то есть, у него медленно наступаетъ сумасшествіе. У больного отъ паралича можетъ закрыться глазъ и одновременно онъ начинаетъ затрудняться въ произношеніи трудныхъ словъ—спотыкаться въ словахъ. Съ нарастаніемъ параличей больной не можетъ ничего говорить или говорить только одно слово, понимая все, что говорятъ другіе. Можетъ быть и такъ, что больной все слышитъ, но не понимаетъ того, что говорятъ. Въ такомъ случаѣ онъ чувствуетъ себя какъ-бы попавшимъ въ чужую страну, гдѣ говорятъ на непонятномъ для него языкѣ. У такихъ больныхъ можетъ появляться полное сумасшествіе, требующее помѣщенія ихъ въ специальное для душевно-больныхъ лечебное заведеніе, егдѣ они погибаютъ во время одного изъ паралитическихъ припадковъ.

## Л Е Ч Е Н І Е .

Изъ всего вышеприведеннаго видно, что сифились имѣтъ длительное теченіе и, значитъ, болѣзнь эта длительная или, что все равно, хроническая. Для излеченія всѣхъ такихъ хроническихъ болѣзней требуется по этому продолжительное леченіе. Сифились въ настоящее время излечить можно окончательно новыми, найденными противъ нея средствами, изъ которыхъ на первомъ мѣстѣ стоитъ средство салъварсанъ. До введенія въ леченіе сифилиса салъварсана лечили эту болѣзнь средствами, въ которыя входило всегда живое серебро или какъ оно правильно называется, ртуть. Раньше лечили сифились ртутными средствами отъ 3 до 5 лѣтъ и леченіе, на примѣръ, втираніями сѣрой ртутной мази, было при этомъ хлопотливое и грязное. Теперь-же найденными новыми средствами излечить сифились окончательно можно въ срокъ отъ одного до полтора года.

Необходимо только, чтобы сифилитикъ крайне серьезно относился къ своей болѣзни, начиналъ леченіе въ самомъ началѣ заболѣванія, то есть, сейчасъ же при появленіи твердаго шанкра и посѣщалъ врача аккуратно въ тѣ сроки, которые онъ ему укажетъ. Въ первый годъ болѣзни сифилитикъ долженъ лечиться подрядъ 12 недѣль, являясь къ врачу 2 раза въ недѣлю. Отъ такого курса леченія сифились можетъ быть излеченъ.

Но вѣрнѣе будетъ продѣлать въ первомъ же году еще два такихъ курса леченія, дѣлая между ними перерывъ или отдыхъ на 6 или 8 недѣль. При примѣненіи новыхъ противосифилитическихъ лекарствъ наружныя проявленія сифилиса, какъ-то: твердый шанкръ и разнаго вида кожныя сыпи, могутъ на первыхъ же порахъ леченія окончательно исчезнуть. Но это еще не означаетъ, что болѣзнь окончательно уничтожена. Нѣкоторая часть ея еще можетъ задержаться въ глубинѣ какого либо внутренняго органа тѣла. Объ этомъ долженъ не забывать при своемъ леченіи сифилитикъ и не переставать ходить къ лечащему его врачу до тѣхъ поръ, пока тотъ не скажетъ, что дѣйствительно болѣзнь прошла. Узнать, прошла-ли эта болѣзнь въ настоящее время легко. Для этого стоитъ только врачу взять немного крови отъ болѣющаго сифилисомъ и послать ее для изслѣдованія въ одну изъ такъ называемыхъ лабораторій, гдѣ производится изслѣдованіе не только крови, но и другихъ соковъ и выдѣленій больнаго тѣла.

Сифились болѣзнь не только серьезная для самого больного, но и опасная для общества, такъ какъ легко можетъ передаваться многимъ и вести къ вырожденію населенія.

Каждый сифилитикъ по этому нравственно обязанъ тщательно слѣдить за собою, своевременно лечиться до полного излеченія и лечиться научно-медицинскими средствами, а не скрывать болѣзнь и втихомолку не ѣздить по разнаго рода знахарямъ и бабкамъ, которые „ворожатъ“ ее окуриваніемъ „курительнаго камешка“ или назначеніемъ питья растворенной въ спиртѣ сулемы. Такое леченіе безсмысленное. Оно не только не излечитъ сифилиса, но къ нему можетъ прибавить еще другую болѣзнь—отравленіе ртутью, которая содержится какъ въ курительномъ камешкѣ такъ и въ сулемѣ.

**Во всѣхъ больницахъ и врачебныхъ пунктахъ Печерскаго Уѣзднаго Самоуправленія леченіе всѣхъ періодовъ сифилиса въ полномъ его современномъ объемѣ мѣстному населенію Печерскаго уѣзда производится бесплатно.**

---