



SUNDEKSEMPLA

Duplum

# RETSEPTUURI KÄSIRAAMAT

6170 31581

ENSV Tervishoiu Rahvakomissariaadi  
Apteegi Peavalitsuse väljaanne.

---

Tallinn, 1941. a.



10029  
A-12552

Vastutav toimetaja: K. Puusepp. Tehniline toimetaja H. Salasoo. Ladumisele antud 21. 04. 41; trükkimisele antud 21. 05. 41. Paberi formaat 44×63. Trükipoognas 28.800. trükitähe ruumi; Trükipoognaid 6; arvutuspoognaid 3. Trükitud „Edu“ trükikojas, Tallinnas. Tellimise nr. 1221. Tiraaž 2000. MB-5548.

„Рецептурный справочник“ на эстонском языке.

## E e s s õ n a.

Retseptuuri käsiraamat on mõeldud abistajaks arstlikule ja farmatseutilisele tervishoiu-personaalile nende kutsetöös. Enamikule haigeile määratakse arsti poolt ikka mingi ravim, mida saadakse retsepti järgi. Suure tähtsusega on retsepti korralik väljakirjutamine, kuna vastasel korral võib tekkida raskusi nii haigele, arstile kui ka farmatseudile, kes retsepti järgi peab valmistama ravimi. Ebaõieti ja hooletult kirjutatud retseptid võivad põhjustada vigu ravimite valmistamisel ning tekitada õnnetusjuhte. Eriti on see kehtiv retseptide kohta, milledega on määratud mürgiseid või kangetoimelisi aineid. Sääraste juhtude vältimiseks on kehtimas üksikasjalikud juhised retseptide kirjutamiseks, nende järgi ravimite valmistamiseks ning ravimite apteekidest väljastamiseks. Need juhised retseptide kirjutamise korra kohta, mürgiste ja kangetoimeliste ainete väljakirjutamise, säilitamise ja väljastamise kohta koos suurimate annuste tabeliga on käesolevas käsiraamatus ära toodud.

Peale nende juhiste leidub käsiraamatus veel andmeid ravimpreparaatide kohta ning standard-retseptide loetelu. Senini oli meie ravimiteturul rohkesti Lääne-Euroopa ravimpreparaate, millede asemel nüüd tarvitusele tulevad NSVL-s ja ENSV-s valmistatud ravimid. Paljude järgi endistest importravimeist ei ole üldse tarvidust, kuna nad on asendatavad lihtsamate ja odavamate ravimitega, osale neist

on aga olemas asepreparaadid NSVL ja ENSV toodangust. Vastav nimestik annab juhiseid senini tarvitusel olnud preparaatide asendamiseks teistega. Nimestikus on esimesel kohal toodud asendatava preparaadi nimetus, sellele järgneb ravimi nimi, millega on võimalik saavutada sama terapeutilist toimet. NSVL ja ENSV ravimpreparaatide kohta on toodud lühidalt kõige vajalikumad andmed koostise, olulisemate omaduste, müügivormi, indikatsiooniala ja tarvitamisviisi kohta, kusjuures kõikjal, kus see eriti pole mainitud, on annused arvatud täisealistele.

Standard-retseptid on välja töötatud elanikkonna ravimitega varustamise paremaks ja kiiremaks muutmiseks. Arstidel on soovitatav vastavate raviainete väljakirjutamisel võimalikult kinni pidada esitatud retseptidest, et kiirendada ravimite apteegist kättesaamist. Kuna ainete hulk ja annuste mitmekesisus esitatud standard-retseptides on suur, võimaldab see arstidel küllaldast individualiseerimist vajaliku ravi teostamisel.

Retseptide kooskõlastamine allpool toodud eeskirjadega peale ravimite valmistamiseaja lühendamise vähendab ka vigade võimalusi retseptidel ning väldib ebaratsionaalsete ravimsegude väljakirjutamist. Täheke s e g a märgitud retseptid selles nimestikus sisaldavad aineid, milledega varustamises võib tekkida aeg-ajalt vahesid ja millised võivad ajuti apteekides puududa. Säärasteks aineteks on, näiteks, antipüriin, atofaan, bromuraal, diuretiin, mõned kaltsiumiühendid, kiniin, kofeiinisoolad, püramidoon, salitsüülhappeühendid, tiokool, vismutiühendid jne.

Neid retsepte tuleb välja kirjutada vaid äärmise vajaduse korral.

## J U H I S E D

### retseptide kirjutamise kohta arstide poolt.

(ENSV T 1941, 44, 688.)

1. Kõik retseptid peavad olema kirjutatud loetavalt ja täpselt.

2. Peale ravimi koostise ja ainete hulga, peab igal retseptil olema märgitud:

- a) ravimi otstarb ja tarvitamise õpetus;
- b) patsiendi eesnime tähed ja perekonnanimi;
- c) arsti eesnimetähed ja perekonnanimi;
- d) arsti aadress ja telefoni nr. (kui see on olemas);

e) raviasutise nurgatempel (kui retsept on kirjutatud raviasutise arsti poolt);

f) retseptile, mis on määratud kuni 14-ne aastasele lapsele, peab olema kirjutatud: „..... aastasele lapsele“;

g) retseptid, mis pole kirjutatud raviasutise planketile, nende hulgas ka eraarstide retseptid, tõendatakse arsti isikliku pitsatiga;

h) nimede poolest sarnaste ainete lühendatud märkimine, mis ei võimalda kindlaks teha, milline vahend on nimelt väljakirjutatud, ei ole lubatud. Näiteks pole lubatud kirjutada: „Natr. arsenic.“ või „Bar. sulfur.“, vaid tuleb kirjutada: „Natr. arsenicicum“, „Natr. arsenicosum“ või „Bar. sulfuricum“;

i) tarvitamisõpetuse märkimisel retseptile pole lubatud piirduda üldiste väljendustega nagu „seesmine“, „tarvitada õpetuse järgi“ jne., vaid tuleb nimetada sissevõtmise aeg, annus (näiteks: „kolm korda päevas supilusika täis enne sööki“ jne.).

3. Valesti kirjutatud retsepti järgi (vale annus, mitteloetavus) ravimit ei valmistata; arst, kes selle välja andnud, on kohustatud viivitamata kirjutama teise retsepti. Kui raviasutises sel silmapilgul ei ole arsti, kes nimetatud retsepti kirjutab, on raviasutise peaarst kohustatud hoolitsema õigeaegse uue retsepti muretsemise eest haigele.

Ühtlasi peab apteek eriraamatus pidama valesti väljakirjutatud retseptide arvestust alljärgneva vormi järgi:

Nr.	Kuupäev	Retsepti puudused (ärakirjutada annus, kui see on vale või näidata, mis pole loetav)	Vale retsepti väljakirjutanud arsti perekonnanimi	Asutise nimetus, kus töötab või arsti aadress	Märkus abinõude kohta

Ühtlasi tulevad sääraste retseptide ärakirjad saata selle raviasutise peaarstile, kust need retseptid on saabunud; juhul, kui retseptid on välja antud eraarstide poolt, saadetakse retseptide ärakirjad rajooni tervishoiuosakonda nende arstide suhtes vastavate abinõude tarvitusele võtmiseks.

4) Raviasutiste peaarstid on kohustatud igal juhul, kui on kirjutatud vale retsept, rakendama tarvilikke mõjutusabinõusid (suulisest hoiatusest kuni asja andmiseni vastavatel juhtudel prokuröridele).

5. Vastutust retseptide valesti kirjutamise eest kannab retsepti kirjutanud arst, kui ka vastava ravi-profülaktilise asutise direktor või peaarst.

## J U H I S E D

ravimite väljakirjutamise kohta velskrite ja ämmaemandate poolt.

(ENSV T 1941, 44, 688.)

1. Velskrid, kes juhatavad iseseisvaid meditsiinilisi punkte, on õigustatud teenistuskohuste täitmisel välja kirjutama oma allkirja vastu, märkides üles oma ameti ja meditsiinilise astme ja silmas pidades juhiseid retseptide kirjutamise kohta arstide poolt ning mürgiste ja kangetoimeliste ravimite säilitamise ja väljastamise kohta apteekidest, kõiki haigele vajalikke ravimeid, nende hulgas ka mürgiseid ja kangetoimelisi aineid sisaldavaid ravimeid annustes, mis ei ületa suurimat annust.

2. Kõik teised velskrid ja ämmaemandad on õigustatud välja kirjutama apteegist oma allkirja vastu erakordseks abistamiseks ravimeid, mis sisaldavad alljärgnevat mürgiseid ja kangetoimelisi aineid:

- 1) põrgukivilahust, mitte kangemat kui 1%;
- 2) kofeiini ja selle soolasid;
- 3) sublimaadilahust, mitte kangemat kui 1 : 1000 (0,1%);
- 4) oopiumitinktuuri, mitte üle 5,0 retsepti kohta;
- 5) stüptitsiini;
- 6) vasesulfaati;
- 7) paksu ja vedelat tungalteraekstrakti;
- 8) tungaltera;
- 9) santoniintablette;
- 10) maikellukesetinktuuri;
- 11) tablette kodeiini sisaldavusega, mitte üle 0,015 annuse kohta.

# HAMBAARSTIDE ÕIGUSED RAVIMITE VÄLJAKIRJUTAMISEKS NING SÄILITAMISEKS.

## I. Ravimite väljakirjutamine.

1. Hambaarstidel on õigus nende ravimisel olevaile haigeile välja kirjutada järgmisi mürgiseid ning kangetoimelisi ravimeid:

Järjekorra nr	Ravimi nimi	Millisel kujul	Hulk grammides, mis on tihel hambaarstil lubatud säilitada hambaravi kabinetis
1	Arseenishape	Pastades sisaldusega kuni 50%	5,0
2	Lämmastikhape	Puhtal kujul	10,0
3	Väävelhape	" "	10,0
4	Triklooräädikhape	" "	5,0
5	Triklooräädikhape	Lahustena	20,0
6	Adrenaliin 1 : 1000	Originaalpakendis	1 pudel
7	Adrenaliin 1 : 1000	Ampullides	25 tk.
8	Etüüleeter	Puhtal kujul	100,0
9	Kuningvesi	" "	20,0
10	Amüülnitriit	Ampullides	10 tk.
11	Höbenitraat	Kristallidena	5,0
12	Höbenitraat	Pulkadena	3 tk.
13	Höbenitraat	Lahustena	20,0
14	Klooretüül	Ampullides	3 tk.
15	Klooretüül	Puhtal kujul	30,0

Järjekorra nr.	Ravimi nimi	Millisel kujul	Hulk grammi- des, misjon ühel hambaarstil lu- batud säilitada hambaravi kabinetis
16	Novokaiin	Lahustes kuni 4%	60,0
17	Novokaiin	Ampullides	Piirama- ta hulgal
18	Novokaiin	Puhtal kujul	1,0
19	Kokaiin	" "	0,25
20	Kofeiin	20% lahustes või ampullides	20,0
21	Elavhõbe	Puhtal kujul	30,0
22	Jodoform	Pulbrina	30,0
23	Jodoform	Pastades, emul- sioonides jne. kuni 50%	50,0
24	Fenool, vedel	Puhtal kujul	20,0
25	Fenool, vedel	Segus kampriga ja teiste ainete- ga kuni 50%	30,0
26	Tsinkkloriid	Lahustes kuni 15%	30,0

2. Nimekirjas märgitud mürgiseid ja kange-  
toimelisi aineid on hambaarstidel lubatud tarvi-  
tada patsientide vastuvõtmisel hambaravikabi-  
netis ega tohi neid milgi tingimusel välja anda  
patsientide kätte.

3. Peale nimekirjas märgitud ravimite on  
hambaarstidel õigus välja kirjutada kõiki teisi  
mittemürgiseid ja mittekangetoimelisi ravimeid,  
see on neid, mis Farmakopöas pole A ja B nime-  
kirjas, kusjuures neid võib määrata haigele mää-  
rimiseks, loputuseks jne., ravimiseks nendega  
kodus.

4. Tarviduse korral haiguste sümptomite kupeerimisel, tekkinud verevoolu tõkestamisel jne. võivad hambaarstid määrata oma patsientidele sisemiseks tarvitamiseks järgmisi ravimeid:

- a) fenatsetiini, antipüriini, püramidooni 0,25—0,3 annuse kohta puhtal kujul või koos kofeiiniga (0,1 annuse kohta);
- b) veronaali, luminaali ja bromuraali üldtarvitusel olevate eeskirjade kohaselt mitte rohkem, kui kolmeks päevaks;
- c) kaltsiumkloriidi ja kaltsiumlaktaati üldtarvitusel olevate eeskirjade kohaselt;
- d) aspiriini 0,25—0,5 annuse kohta.

5. Südamenõrkuse puhul võivad hambaarstid süstida nahaalusi 20% kampriõli või 20% kofeiinilahust, milliseid nad on kohustatud varuks pidama oma kabinetis ampullides.

6. Igas hambaravikabinetis peab varuks pidama amüülnitriiti ampullides, kui vastumürki kokaiinile või viimasega analoogsetele ravimitele.

7. Arstid-stomatoloogid, kes on selle kutse omandanud lühiajalise ümberkvalifikatsiooni teel (1 — 1½ aastased kursused), evivad ravimite väljakirjutamiseks võrdsed õigused hambaarstidega.

8. Hambaraviasutistes töötavad arstid, kes on lõpetanud stomatoloogilised või meditsiinilised instituudid, evivad õiguse ravimeid välja kirjutada kabineti tööde jaoks ja määrata neid patsientidele võrdselt teiste erialade arstidega.

9. Retseptide kirjutamisel on hambaarstid kohustatud rangelt kinni pidama kehtivaist reegleist retseptide kirjutamise kohta arstide poolt.

## II. Ravimite säilitamine.

1. Hambaarsti poolt tarvitatavaid ravimeid peab säilitama erilises kapis, eraldi instrumentidest ja teistest esemetest. Ravimid peavad ole-

ma pakitud nii, et nad oleks puhtad ega ei rikneks.

2. Kõik ravimid peavad olema varustatud selgete pealkirjadega, milles on loetletud nende koostis ja annus. Kui töötamisel pealkiri tuhmunub, tuleb see aegsasti uuendada.

3. Süstimislahused säilitatakse klaaskorgiga purkides, mis kindlustavad nende steriilsuse ja on eraldatud teistest ravimitest ning tühjadest anumatest.

4. Mürgiste ja kangetoimeliste ravimite hulk hambaravikabinetis ei tohi ületada nimekirjas loetletud hulka.

5. Nimekirjas loetletud ravimeid peab säilitama lukustatult ja eraldi teistest ravimitest; haigete vastuvõtu ajal võivad need ravimid paikneda hambaarsti töölaual; peale vastuvõttu peab need paigutama kappi, mis lukustatakse.

6. Ravimid, mis evivad lagunemise tunnuseid (värvuse muutus, sademe tekkimine jm.) tuleb viivitamata hävitada.

7. Igal hambaravikabinetil (jaoskonnal) peab olema nööriamat ravimite väljakirjutamiseks, millesse jäetakse väljakirjutatud retseptidest ära kirjad.

Erapraktiseerijatel hambaarstidel peab selleks otstarbeks olema nööriamat, mis on kinnitatud ringkonna tervishoiu osakonna poolt.

8. Korrapärase retsepti väljakirjutamise kui ka ravimite säilitamise eest on vastutav nii retsepti kirjutanud arst, kui ka asutise juhataja.

## J U H E N D

ravimite väljakirjutamise ning valmistamise korra kohta raviasutiste apteekides ja ravimite väljastamise kohta haigetele haiglate jaoskondades (ENSV T 1941, 44, 688.)

1. Ravimeid raviasutiste jaoskondades viibivatele haigetele võetakse apteekidest retseptidega, mis on varustatud vastava jaoskonna juhataja (arsti) allkirjaga.

2. Retseptid kirjutatakse iga haigla jaoskonna jaoks erilistele osakonna nimetusega üldplankettidele. Sellele üldplanketile kirjutatakse retsept iga üksiku haige kohta.

3. Retseptid peab kirjutama selgesti, loetavalt ja õieti, koostisaine nimetust lühendamata. Ravimite väljakirjutamisel nahaalusi või veenisisesi süstimiseks, samuti silmatilkadeks, mis vajavad eriliselt hoolsat valmistamist, peab retseptile märkima „nahaalusi“, „veenisisesi“, „silmatilgad“ jne.

4. Väljakirjutatud retseptid antakse õigel ajal apteeki. Peale nende kontrollimist korralliku väljakirjutamise kui ka annuse suhtes võetakse retsept apteegis valmistamisele.

5. Retseptide kirjutamise juhiste rikkumise korral on apteegi juhataja kohustatud läbi rääkima arstiga ja peale puuduste kõrvaldamist andma retsept valmistamisele. Retsepti alla kirjutanud arsti äraolekul peab apteek lahendama kõik arusaamatused valvearsti või peaarstiga.

6. Apteegis kirjutatakse retseptid ümber pühalt, täpselt ja selgesti loetavalt vastava värvusega signatuurile või etiketile, märkides täpselt

kõik originaalil leiduvad andmed. Kirjutatud signatuurid või etiketid võrreldakse algkirjaga ja alles peale seda antakse assistendile ravimi valmistamiseks apteegi juhataja, tema asetäitja või kontrolöri järelevalve all.

Valmistatud ravimeid peab hoolikalt kontrollima ja igasuguse kahtluse puhul nende õigsuse suhtes andma assistendile taasvalmistamiseks.

7. Apteegist haigla jaoskonda saadetud ravimid antakse üle valvelolevale velskrile või vastava jaoskonna õele.

8. Kõik haigla jaoskondadesse vastuvõetud ravimid säilitatakse erilistes lukustatud kappides.

Nahaalusi ja veenisisesi süstimiseks määratud ravimid säilitatakse eraldi välispidistest.

9. Ravimeid, mis sisaldavad mürgiseid või kangetoimelisi aineid, säilitatakse ja tarvitatakse NSVL Tervishoiu Rahvakomissari käskkirja Nr. 1025 4. oktoobrist 1937. a. juhis Nr. 2 alusel.

Ravimite kappide võtmed säilitatakse meditsiinilise valversonaali (arsti, õe) juures.

10. Ravimite kappide võtmete usaldamine meditsiinilise abipersonaali hoolde on keelatud.

11. Keskmine meditsiiniline personaal, andes haigele õpetuse järgi ravimit, on kohustatud enne hoolikalt läbi lugema etiketi ja vastavalt haiguse lehele, kontrollima ravimi otstarvet ja tarvitamise õpetust.

12. Ravimite korrapärase säilitamise eest kappides vastutab jaoskonna juhataja.

## J U H I S E D

**mürgiste ja kangetoimeliste vahendite säilitamise ning väljastamise kohta apteekidest.**

(ENSV T 1941, 44, 688.)

1. Käesolevad mürgiste ja kangetoimeliste vahendite säilitamise ning väljastamise juhised kohaldatakse käesolevale lisatud nimestikes A ja B loetletud ainetele.

2. Nimestikus A loetletud mürgised raviained säilitatakse retseptuuritoas kui ka teistes apteegiruumes lukustatult eraldi teistest ravimitest. Peale selle nende vahendite tagavarade säilituskapid apteegi materjalitoas pitseeritakse töö lõpul.

Väljastamiseks valmis ravimid, millised sisaldavad mürgiseid vahendeid (nimestik A), säilitatakse retseptuuri vastutusel eraldi teistest ravimitest lukustatud kapis (või kinnises ruumis).

Kapid ja laekad, millistes säilitatakse nimestikus A loetletud aineid, peavad olema tähistatud pealkirjaga „Venena A Mürgid“. Neis kappides peavad leiduma kaalud ning vihid, uhmrid, lehtrid ja silindrid mürgiste vahendite kaalumiseks, segamiseks ja lahustamiseks. Nende esemete pesemine peab toimuma eraldi teistest nõudest apteegi juhataja või tema poolt volitatud isiku järelevalve all.

Apteekides, kus öövalvet ei ole, pitseeritakse mürgiste vahendite säilituskapid ööseks lakk-pitساتiga või plommitakse.

Alljärgnevad mürgised ained: arseenhapend, arseenishapend, sublimaas, fosfor, brutsiin, niko-

tiin, strühniin, tsinhoniin, sinihape ja selle preparaadid säilitatakse materjalitoas mürgiste vahendite A kapis neile eraldatud seesmises lukustatavas kapikeses.

3. Kappide võtmed ja pitsat hoitakse apteegi juhataja või tema poolt selleks volitatud farmatseudi käes.

4. Alljärgnevate mürgiste ja kangetoimeliste ainete kohta: arseenhapend, arseenishapend, sublimaad, fosfor, brutsiin, nikotiin, strühniin, tsinhoniin, sinihape (kõik selle preparaadid), kloorpikriin, väävelsüsinik, oopium, oopiumitinktuur, oopiumiekstrakt, dioniin, kokaiin ning selle soolad, morfiin, heroiin ja omnopoon (pantopoon), peetakse apteekides arvestust iga aine kohta eraldi, jättes apteeki tõendavad dokumendid. Dokumentide algkirjad säilitatakse lukustatud kappides, millede võtmed hoitakse apteegi juhataja või tema poolt selleks volitatud farmatseudi käes.

Valmis ravimid, millised sisaldavad käesolevas paragrahvis loetletud vahendeid ühekordset ülimat annust mitte ületavates annustes, ei kuulu kvantitatiivsele arvestusele.

5. Apteegis retsepte vastuvõttev isik (juhataja või retseptaar) on kohustatud mürgist vahendit sisaldava retsepti vastuvõtmisel kontrollima kirjutatud teksti õigsust, alla kriipsutama värvilise pliatsiga mürgise aine nimetuse ja vajaduse korral andma vastavaid näpunäiteid ravimit valmistavale isikule (kas otseselt või kontrolöri kaudu).

6. Nimestikus B loetletud kangetoimelised vahendid tuleb säilitada retseptuuritoas kui ka teistes apteegi ruumes eraldi teistest ravimitest erilistes kappides või laegastes, pealkirjaga „Heroica B — Kangetoimelised vahendid“, millised töö lõpul tuleb lukustada.

7. Ravimid, millised sisaldavad mürgiseid või

kangetoimelisi aineid, väljastatakse apteekidest eranditult arstiretsepti järgi. Iseseisvate ravipunktide juhatajatel-velskritel, kui ka arstijaoskondade juhatajatel või jaoskonnaarstide asemikudel on õigus välja kirjutada kõiki haige abistamiseks vajalikke ravimeid, mis sisaldavad mürgiseid ja kangetoimelisi aineid suurimat annust mitteületavates annustes, võttes juhtnööriks NSVL Tervishoiu Rahvakomissari käskkirja 2. VIII 1938. a. Nr. 1009.

Retseptid kirjutatakse täpses kooskõlas juhisteiga, mis seatud NSVL Tervishoiu Rahvakomissari käskkirjaga Nr. 686, 16. VIII 1937. a. Mürgiseid ja kangetoimelisi aineid sisaldavad retseptid, mis on loetletud käesolevate juhiste p. 4-as, peavad olema varustatud peale stambi ka pitsatiga.

8. Arst, kirjutades välja mürgist või kangetoimelist vahendit suurimat annust ületavas hulgas, on kohustatud selle vahendi hulka väljendama tähtedega, lisades hüüumärgi. Selle nõude mittetäitmise korral peab farmatseut toimima riikliku farmakopöa näpunäite kohaselt, ühendusse astuma arstiga ja alles peale vastuse saamist väljastama ravimi vastavas annuses, vastupidisel korral aga väljastama ettekirjutatud ravimi suurima annuse pooles suuruses.

9. Hapete väljakirjutamise korral puhtal kujul kui ka segudes, märkimata retseptil kangust, väljastatakse lahjendatud hape.

10. Arsti retseptita on lubatud väljastada alljärgnevaid mürgiseid ning kangetoimelisi aineid sisaldavaid ravimeid:

a) farmakopöas loetletud ja nimestikesse A ning B mittepaigutatud, nagu averiinisalv, valge elavhõbeda salv jne.

b) farmakopöas loetlemata, kuid neile analoogsed, kui need on valmistatud farmakopöa

eeskirju mitteületavas kontsentratsioonis, nagu salvid või lahused 10%-ise joodisisaldusega, 2%-ine kollane elavhõbeda salv jne.

c) valmis standard vormes:

- 1) antipüriin annustes kuni 0,3 g;
- 2) salipüriin annustes kuni 0,5 g;
- 3) kloroform segudes väliseks tarvitamiseks;
- 4) kodeiin puhas annustes kuni 0,015 g;
- 5) kodeiinfosfaat annustes kuni 0,03 g;
- 6) kofeiin puhas annustes kuni 0,05 g;
- 7) kofeiinsoolad annustes kuni 0,1 g;
- 8) diuretiin annustes kuni 0,5 g;
- 9) karumustikaekstrakt (Extr. Belladonnae) annustes kuni 0,015 g;
- 10) Doveri pulber annustes kuni 0,3 g;
- 11) santoniin annustes kuni 0,025 g;
- 12) tsinksulfaat  $\frac{1}{4}$  % vesilahusena.

11. Ravimeid, millised sisaldavad nimestikus A loetletud mürgiseid aineid, kui ka sõrmkübara (Digitalis) lehti või selle preparaate, oopiumi, oopiumitinktuuri, oopiumiekstrakti, veronaali ja dioniini, on keelatud väljastada arsti kordamisallkirjata, kui retseptil pole märkust, mitu korda tuleb ravimit korrata.

**M ä r k u s :** Arsti kordamisallkirjata on lubatud väljastada pille või tablette, millised sisaldavad arseenishapendit mitte üle 0,001 g annuse kohta ja dioniini, pilokarpiini ning eseriini vesilahuseid silmatilkadena.

12. Ravimeid, millised sisaldavad kangetoimelisi aineid (nimestik B), välja arvatud oopium, oopiumitinktuur, oopiumiekstrakt, dioniin, veronaal, sõrmkübaralehed (fol. Digitalis) ning selle preparaadid, kui nad on välja kirjutatud annuses alla poole suurimast ühekordsest annusest, võib väljastada arsti kordamisallkirjata, kui retseptil pole pealkirja „mitte korrata“.

Samuti on lubatud väljastada korduvalt ravi-

meid, millised sisaldavad kangetoimelisi aineid (nimestik B) ja millised on välja kirjutatud väliseks tarvitamiseks (salvid, küünlad, hõõrutised, kompressivedelikud).

13. Ühele haigele on lubatud korraga apteegist väljastada segus või lahuses maksimaalselt: oopiumi pool grammi (0,5), morfiini, heroini, dioniini, omnopooni ja kokaiini — kolm detsigrammi (0,3).

Loomade raviks on loomaarsti retsepti järgi lubatud väljastada: oopiumi kuni kümme grammi (10,0), morfiini, heroini, dioniini ja kokaiini kuni üks gramm (1,0).

14. Mürgiseid aineid (nimestik A) sisaldavad ravimid pitseeritakse apteekidest väljastamisel lakiga, plommiga või erilise pitsatoblaadiga.

15. Raviasutistele väljastatakse apteekidest mürgiseid ja uimastavaid aineid asutise juhataja või tema asetäitja poolt allakirjutatud ja asutise ümmarguse pitsatiga kinnitatud nõudmiste järgi, kusjuures väljastamist toimetatakse eranditult isikule, kellel on selleks eriline raviasutise juhataja või tema asemiku poolt allakirjutatud ja asutise ümmarguse pitsatiga varustatud volitus.

16. Käsimüügis on lubatud retseptita väljastada fenoolilahust mitte üle 5% sisaldusega.

17. Süstimiseks määratud ravimite ampullid peavad olema varustatud igaüks pealkirjaga, millel on näidatud ampulli sisu. Süstimiseks määratud ravimite väljastamisel apteekidest, vaatamata nende koosseisule, tuleb klaasidele tingimata liimida sinised etiketid pealkirjaga: veeni süstimiseks või injektsiooniks jne.

18. Sublimaadi tabletid, tsinkkloriidilahused, elavhõbedasoolade lahused ja fenool puhtal kujul või lahustes (fenooli juures üle 5%) väliseks tarvitamiseks või desinfektsiooniks tuleb väljastada

apteegist pakitult, pealkirjaga anumal „mürk“, „ettevaatust“, ja vastavate etikettidega mürgi nimega kohalikus keeles, nagu: „sublimaati“, „klooritsink“, „elavhõbeda tsüaniid“, „karboolhape“.

Sublimaati ja selle lahuseid sisaldavaile pudelitele peavad olema liimitud etiketid sublimaadi sisaldusprotsendiga ja ristiasetatud luude ning kolba kujutlusega.

19. Sublimaadilahuseid desinfektsiooni otstarbeks peab apteegis enne väljastamist värvima kireva värviga, lisades eosiini või fuksiini, metüleensinist j.m.s., kusjuures etiketile (signatuurile) tuleb märkida, millega on lahus värvitud.

20. Sublimaaditabletid väljastatakse apteekidest raviajutistele ja üksikisikutele individuaalretseptide järgi pitseeritult.

### Mürgiste ravimite nimestik „A“.

- Acidum arsenicosum
- Apomorphinum hydrochloricum
- Arcolinum hydrobromicum
- Atropinum sulfuricum
- Cocainum hydrochloricum
- Diacetylmorphinum hydrochloricum (Heroin)
- Homatropinum hydrobromicum
- Hydrargyrum bichloratum corrosivum (Sublimat)
- Hydrargyrum bijodatum
- Hydrargyrum cyanatum
- Hydrargyrum oxycyanatum
- Hydrargyrum salicylicum
- Liquor arsenicalis Fowleri
- Morphium hydrochloricum
- Morphium hydrochloricum solutum 1% ja 2%
- Natrium arsenicum
- Natrium kakodylicum
- Novarsenol (Neosalvarsan)

Oleum Crotonis  
Omnopon (Pantopon)  
Osarsol (Spirocid)  
Phosphorus  
Physostigminum salicylicum  
Pilocarpinum hydrochloricum  
Scopolaminum hydrobromicum  
Strychninum nitricum  
Tabulettae Sublimati  
Veratrinum

Farmakopöas puuduvad, kuid apteegis leiduvad mürgised vahendid, kui ka need, mis nimetatud NSVL Rahvakomissaride Nõukogu määruses Nr. 78, 26. I 1938. a., säilitatakse samade juhiste kohaselt, kui A nimestikus loetletud vahendid.

**Kangetoimeliste ravimite nimestik „B“,**  
millised tulevad säilitada ettevaatusega, teistest ravimitest eraldi.

Acetanilidum  
Acidum chromicum  
Acidum diaethylbarbituricum (Veronal)  
Acidum hydrochloricum concentratum  
Acidum nitricum fumans  
Acidum nitricum  
Acidum phenylaethylbarbituricum (Luminal)  
Acidum sulfuricum  
Acidum trichloroaceticum  
Adrenalinum solutum 1 : 1000  
Aether  
Aether pro narcosi  
Aethylmorphinum hydrochloricum (Dionin)  
Aethylum bromatum  
Aethylum chloratum (Chloroethyl)  
Amygdalinum  
Amylium nitrosum  
Antipyrinum  
Antipyrinum salicylicum

Argentum nitricum  
Argentum colloidalē (Collargol)  
Cantharides  
Chloralum hydratum  
Chloroformium  
Chloroformium pro narcosi  
Codeinum  
Codeinum phosphoricum  
Coffeino-Natrium benzoicum  
Coffeino-Natrium salicylicum  
Coffeinum  
Collodium cantharidatum  
Colloxylin  
Cuprum sulfuricum  
Diuretin  
Euphorbium  
Extractum Belladonnae  
Extractum Cannabis Indicae  
Extractum Hyoscyami  
Extractum Filicis maris  
Extractum Nucis vomicae  
Extractum Opii  
Extractum Secalis cornuti  
Extractum Secalis cornuti fluidum  
Folia Belladonnae  
Folia Digitalis  
Folia Hyoscyami  
Folia Stramonii  
Hedonal  
Herba Adonidis vernalis  
Herba Cannabis Indicae  
Hydrargyrum amidato-bichloratum  
Hydrargyrum chloratum  
Hydrargyrum chloratum vapore paratum  
Hydrargyrum oxydatum flavum  
Hydrargyrum oxydatum rubrum  
Infusum Ipecacuanhae concentratum  
Insulin  
Jodoformium

Jodum  
Kalium causticum fusum  
Kreosotum  
Nitroglycerinum 1%  
Novocainum  
Oleum Sinapis aethereum  
Opium  
Orthoform  
Paraldehydum  
Phenolum purum  
Phenolum purum liquefactum  
Pituitrin  
Podophyllum  
Pulvis Doveri  
Radix Ipecacuanhae  
Resina Jalapae  
Rhizoma Veratri albi  
Santoninum  
Santoninum in tabl.  
Secale cornutum  
Semen Sabadillae  
Semen Strophanthi  
Semen Strychni  
Stibio-Kalium tartaricum  
Stypticinum  
Sulfonalum  
Tabulettae acidi diaethylbarbiturici  
Tabulettae Codeini c. Natr. bicarbonico  
Tabulettae Coffeino-Natr. benzoici  
Tabulettae Diuretini  
Tabulettae Nitroglycerini  
Tabulettae Opii  
Tabulettae Opii c. radice Ipecacuanhae  
Tabulettae Santonini  
Thyreoidinum  
Tinctura Aconiti  
Tinctura Belladonnae  
Tinctura Cannabis Indicae

Tinctura Cantharidis  
Tinctura Digitalis  
Tinctura Ipecacuanhae  
Tinctura Nucis vomicae  
Tinctura Opii  
Tinctura Strophanthi  
Tinctura Veratri albi  
Tuber Aconiti  
Zincum chloratum  
Zincum sulfophenolicum  
Zincum sulfuricum  
Zincum valerianicum

M ä r k u s nimekirja B juurde: Teised farma-  
kopöas puuduvad, kuid apteegis leiduvad  
kangetoimelised ravimid säilitatakse sa-  
made juhiste kohaselt, kui B nimestikus  
loetletud ravimid.

## J U H I S E D

mürgiste ja kangetoimeliste ravimpreparaatide vastuvõtmise, säilitamise, kasutamise ning väljastamise kohta instituutide kliinikutes, haiglate jaoskondades ja kabinetides ning teistes raviasutistes.

(ENSV T 1941, 44, 688.)

1. Mürgiste (nimestik A) ja kangetoimeliste (nimestik B) ravimite säilitamise ning haigetele andmise eest on vastutav raviasutise jaoskonna või kabineti juhataja — arst.

2. Kõik raviasutiste jaoskondadesse või kabinetidesse saabuvad mürgised ja kangetoimelised ravimid võtab vastu ja säilitab vanem õde erikappides:

1) „A“ — mürgiste ravimite jaoks ja 2) „B“ — kangetoimeliste ravimite jaoks.

Need kapid peavad olema üleni puust ilma klaasita ja nende seinad peavad olema märgitud väljastpoolt vastava tähega ning seestpoolt nendes säilitatavate ravimite nimestikuga.

Vanem õde annab valvel olevale keskmisele meditsiinilisele personaalile allkirja vastu välja mürgiseid ja kangetoimelisi aineid sisaldavad ravimid ööpäeva tarviduse ulatuses.

Valvelolev personaal säilitab need ravimid väikestes kapikestes, mis on valmistatud vanema õe kapi eeskujul.

3. „A“ kapis säilitatakse sublimate mitte ainult tablettides ja pulbris, vaid ka igasuguse kontsentratsiooniga lahustes.

4. Ravimid, millede koostisse kuuluvad kangetoimelised nimestiku „B“ ained väikestes hul-

lkades, välja arvatud dioniin, veronaal ja oopium pulbris, säilitatakse üldises korras, s. o. mitte „B“ kapis.

5. Keskmise meditsiiniline personaal, võttes jaoskonda või kabinetti mürgiseid ja kangetoimelisi aineid, on kohustatud saabunud ravimeid kontrollima võrdlemisel nõudmistega, milledega need on välja kirjutatud.

6. Nõudmised apteekidesse mürgiste ja kangetoimeliste ainete saamiseks peavad olema varustatud jaoskonna juhataja (arsti) allkirjaga, viimase äraolekul aga valvel oleva arsti allkirjaga, silmaspidades juhiseid retseptide kirjutamise kohta arstide poolt ning mürgiste ja kangetoimeliste vahendite säilitamise ning väljastamise kohta apteekides.

7. Ravimid, mis sisaldavad mürgiseid aineid ja mis määratud seesmiseks tarvitamiseks, kui ka desinfektsiooniks ja muuks otstarbeks, peavad olema varustatud etiketiga pakendil pealkirjaga „Mürk“, „ettevaatust“ ja veel lisaetiketiga, millel ristiasetatud luude ning kolba kujutus.

8. Kappides, milledes säilitatakse mürgiseid ja kangetoimelisi ravimeid, on keelatud säilitada teisi ravimeid või aineid.

9. Enne mürgiste või kangetoimeliste ainete (sublimaat jne.) tarvitamist jaoskonnas või kabinettis, peab nende annust hoolikalt kontrollima võrdlemisel etiketil või signatuuril leiduva vasta-va tekstiga.

10. Mürgised ravimid kirjutatakse välja jaoskondade või kabinetide poolt individuaal-retseptide alusel üksikult ja väljastatakse apteekidest pitseeritult.

11. Keskmise meditsiiniline personaal annab haigetele ravimeid vastavalt haiguslehes ettenähtud korraldusele õigel ajal ja ei tohi seda usal-

dada nooremale meditsiinilisele abipersonaalile ega ka haigele endale.

Sama kord kehtib kabinettides nende ravimite tarvitamise puhul erilisteks toiminguteks, nagu süstimiseks, võieteks, ühekordseks sissevõtmiseks jne.

12. Igas jaoskonnas või kabinetis peavad olema välja pandud tabelid mürgiste ning kangetoimeliste preparaatide ühekordsete kui ka päevaste suurimate annuste kohta (grammides).

13. Mürgiste ainete arvestust (sissetulek ja väljaminek) peetakse haiglate jaoskondades ja kabinettides, instituutide kliinikutes ja teistes raviasutistes erilistes vihkudes, mis nõõritatud ja kinnitatud peaarsti või instituudi direktori, kellele jaoskond, kabinett, kliinik või mõni teine raviasutis allub, lakkpitsatiga.

Tõendavad dokumendid (sissetulek ja väljaminek) säilitatakse tingimuis, mis tagavad nende säilumist.

## NSVL Farmakopöa

mürgiste ja kangetoimeliste ainete suurimad ühekordsed ja ööpäevased annused (grammides) täisealistele.

	Suurim annus	
	ühekordne	ööpäevane
Acetanilidum . . . . .	0,3	1,0
Acidum arsenicosum . . . . .	0,003	0,01
Acidum diaethylbarbituricum (Veronal) . . . . .	0,75	1,5
Acidum hydrochloratum purum dilutum . . . . .	0,5	4,0
Acidum nitricum purum dilutum . . . . .	1,0	3,0
Acidum phenylaethylbarbituricum (Luminal) . . . . .	0,3	0,6
Acidum phosphoricum dilutum	1,0	3,0
Acidum salicylicum . . . . .	1,0	4,0
Acidum sulfuricum purum dilutum . . . . .	1,0	3,0
Adrenalinum hydrochloricum solutum 1 : 1000 (nahaalusi)	1,0	—
Aether . . . . .	1,0	—
Aethylmorphinum hydrochloricum . . . . .	0,03	0,1
Aethylum bromatum . . . . .	0,6	—
Amygdalinum . . . . .	0,02	0,06
Amylium nitrosum . . . . .	0,2	—
Antipyrinum . . . . .	1,0	3,0
Antipyrinum salicylicum . . . . .	1,0	3,0
Apomorphinum hydrochloricum . . . . .	0,01	—
Apomorphinum hydrochloricum (nahaalusi)	0,005	—

	Suurim annus	
	ühe- kordne	öö- päevane
Aqua Amygdalarum amara- rum . . . . .	2,0	6,0
Arecolinum hydrobromicum .	0,0005	0,0015
Argentum colloidalē (veeni- sisesi) . . . . .	0,25	0,5
Argentum nitricum . . . . .	0,03	0,1
Atropinum sulfuricum . . . .	0,001	0,003
Bismutum salicylicum basicum	1,0	3,0
Bromuralum . . . . .	0,6	1,0
Chloralum hydratum . . . . .	2,0	6,0
Chloroformium . . . . .	0,5	1,0
Cocainum hydrochloricum . .	0,03	—
Codeinum . . . . .	0,05	0,2
Codeinum phosphoricum . . .	0,1	0,3
Coffeino-Natrium benzoicum .	0,5	2,0
Coffeino-Natrium salicylicum	0,5	2,0
Coffeinum . . . . .	0,3	1,0
Cuprum sulfuricum (okseva- hendina) . . . . .	0,5	—
Diacetylmorphinum hydrochlo- ricum . . . . .	0,005	0,015
Diuretinum . . . . .	1,0	6,0
Extr. Belladonnae . . . . .	0,05	0,15
Extr. Cannabis Indicae . . . .	0,1	0,3
Extr. Filicis maris . . . . .	8,0	—
Extr. Hyoscyami . . . . .	0,06	0,3
Extr. Opii . . . . .	0,05	0,3
Extr. Secalis cornuti spissum	0,3	1,0
Extr. Secalis cornuti fluidum	1,0	3,0

	Suurim annus	
	ühe- kordne	öö- päevane
Extr. Strychni . . . . .	0,03	0,1
Fol. Belladonnae . . . . .	0,2	0,6
Fol. Digitalis . . . . .	0,2	1,0
Fol. Hyoscyami . . . . .	0,4	1,2
Fol. Stramonii . . . . .	0,2	0,6
Hedonalum . . . . .	1,5	3,0
Herba Adonidis vernalis . . . . .	0,8	10,0
Herba Cannabis Indicae . . . . .	0,2	0,6
Homatropinum hydrobromi- cum . . . . .	0,001	0,003
Hydrargyrum bichloratum . . . . .	0,02	0,06
Hydrargyrum bijodatum . . . . .	0,02	0,06
Hydrargyrum chloratum mite	0,6	1,8
Hydrargyrum chloratum va- pore paratum . . . . .	0,6	1,8
Hydrargyrum cyanatum . . . . .	0,01	0,03
Hydrargyrum oxycyanatum . . . . .	0,01	0,03
Hydrargyrum oxydatum fla- vum . . . . .	0,02	0,06
Hydrargyrum oxydatum rub- rum . . . . .	0,02	0,06
Hydrargyrum salicylicum . . . . .	0,02	0,06
Inf. Ipecacuanhae concentra- tum . . . . .	2,0	4,0
Jodoformium . . . . .	0,2	0,6
Jodum . . . . .	0,02	0,06]
Kreosotum . . . . .	0,5	1,5
Liq. Kalii arsenicosi . . . . .	0,2	0,6

	Suurim annus	
	ühe- kordne	öö- päevane
Morphinum hydrochloricum . . . . .	0,03	0,1
Natrium arsenicicum . . . . .	0,003	0,01
Natrium kakodylicum . . . . .	0,06	0,2
Neosalvarsanum (veenisisesi)	0,6	—
Nitroglycerinum solutum . . . . .	0,1	0,3
Novocainum (nahaalusi) . . . . .	0,2	—
Ol. Crotonis . . . . .	0,05	—
Opium . . . . .	0,1	0,3
Orthoformium . . . . .	1,0	3,0
Osarsol . . . . .	0,25	1,0
Pantopon . . . . .	0,03	0,1
Paraldehydum . . . . .	5,0	10,0
Phenacetinum . . . . .	0,5	2,0
Phenolum purum (Acidum car- bolicum) . . . . .	0,1	0,3
Phosphorus . . . . .	0,001	0,003
Physostigminum salicylicum . . . . .	0,001	0,003
Pilocarpinum hydrochloricum . . . . .	0,02	0,04
Pituitrin (nahaalusi) . . . . .	1,0	—
Podophyllum . . . . .	0,1	0,3
Pulv. Ipecacuanhae opiatu . . . . .	1,0	4,0
Pyramidonum . . . . .	0,5	1,5
Rad. Ipecacuanhae (okseva- hendina) . . . . .	1,0	—
Resina Jalapae . . . . .	0,15	0,5
Santoninum . . . . .	0,1	0,3
Scopolaminum hydrobromi- cum . . . . .	0,0005	0,0015

	Suurim annus	
	ühe- kordne	öö- päevane
Secale cornutum . . . . .	1,0	5,0
Semen Strychni . . . . .	0,1	0,3
Stibio-Kalium tartaricum . . . . .	0,1	0,3
Strychninum nitricum . . . . .	0,002	0,005
Stypticinum . . . . .	0,1	0,3
Sulfonalum . . . . .	2,0	—
Tabulettae Nitroglycerini (a 0,0005) . . . . .	2 tk.	6 tk.
Thyreoidinum . . . . .	0,3	1,0
T-ra Aconiti . . . . .	0,5	1,5
T-ra Belladonnae . . . . .	0,5	1,5
T-ra Cannabis Indicae . . . . .	1,25	3,75
T-ra Cantharidis . . . . .	0,2	0,6
T-ra Convallariae majalis . . . . .	1,25	3,75
T-ra Digitalis . . . . .	1,0	3,0
T-ra Ipecacuanhae . . . . .	2,0	4,0
T-ra Jodi . . . . .	0,2	0,6
T-ra Opii simplex . . . . .	1,0	3,0
T-ra Strophanthi . . . . .	0,5	1,5
T-ra Strychni . . . . .	1,0	3,0
T-ra Veratri albi . . . . .	1,0	3,0
Zincum sulfuricum (okseva- hendina) . . . . .	1,0	—
Zincum valerianicum . . . . .	0,1	0,3

1. Nimestikus toodud suurimad annused on arvatud täisealistele 25 a. vanuses. Alaealistele ja lastele on suurimad annused sõltuvalt vanusest väiksemad, ligikaudu järgmised:

vanus	18	aastat	$\frac{3}{4}$	täisealise	annusest
„	14	„	$\frac{1}{2}$	„	„
„	7	„	$\frac{1}{3}$	„	„
„	6	„	$\frac{1}{4}$	„	„
„	4	„	$\frac{1}{6}$	„	„
„	2	„	$\frac{1}{8}$	„	„
„	1	„	$\frac{1}{12}$	„	„
„ kuni	1	„	$\frac{1}{12}$ — $\frac{1}{24}$	„	„
„ „	$\frac{1}{2}$	„	$\frac{1}{40}$	„	„

2 Suurimad annused üle 60 aasta vanadele vähenevad  $\frac{3}{4}$  või  $\frac{1}{2}$  annuseni täisealise annusest.

3. Kui mürgine või kangetoimeline aine on retseptil välja kirjutatud annuses, mis ületab nimestikus märgitud annuse ja ei ole kirjutatud sõnadega ning puudub hüüumärk, peab apteegi juhataja või tema asetäitja pöörduma arsti poole suusõnal (ka telefoni teel) või kirjalikult (pitseeritud ümbrikus) ja alles peale vastuse saamist väljastama ravimi vastavas annuses. Kui milgi põhjusel pole võimalik arstiga asja selgitada, väljastab apteegi juhataja või tema asetäitja kirjutatud aine poolles selles annuses, mis märgitud nimestikus suurima annusena.

## IMPORT-RAVIMITE ASENDAMISVÕIMALUSI.

Nimestikus on esimesel kohal toodud asendatava preparaadi nimetus, sellele järgneb ravim nimi, millega on võimalik saavutada sama terapeutilist toimet.

- Abasin — Bromural
- Abrodil — Sergosin
- Acedicon — Morphin, Heroin
- Acetannin — Tannalbin
- Acetopyrin — Salipyrin
- Acetparaminosalol — Acesal, Atophan, Salipyrin
- Acetylarsan — Osarsol
- Acidol — Acid. hydrochl. dilut.
- Acidol-Pepsin — Pepsin-Acid
- Acidolamin — Urotropin
- Acykal — Albargin, Hydrarg. cyanat., Hydrarg. oxycyanat.
- Adamon — Bromural
- Adonidin — Adonilen
- Adovern — Adonilen
- Adsorgan — Carbo
- Afenil — Calcium chloratum, Calcium gluconicum
- Agitanol — Acesal, Aspirin
- Agobilin — Chologon
- Agurin — Diuretin
- Airol — Bismut. subgallicum
- Albucid — Streptocid album, Sulfidin
- Allonal — Bromural, Amital-Natrium, Verodon
- Alucol — Acidosan
- Alumnol — Alumin. subacet. solut., Rivanol
- Alypin — Cocain, Dicain, Novocain, Sovcain

Amphotropin — Urotropin  
 Androstin — Orchicrin, Spermocrin  
 Angiolymph — Angiotrophin  
 Anthrasol — Albichtol  
 Anticomman — Insulin; Triprotamin-Zinc-Insulin  
 Antileprol — Chaulmogrol, Moogrol  
 Antinervin — Antifebrin + Aspirin + Ammon.  
     bromat.  
 Antiphlogistine — Termogen  
 Antisclerosin — Hypersol, Jod-Hypersol  
 Antispasmin — Bromural, Papaverin  
 Antithyreoidin — Antithyreoidin  
 Aolan — Lactoproteosan  
 Aperitol — Purgen, Phenopurgen  
 Arcanol — Acesal  
 Argentamin — Ammargen  
 Argochrom — Bacteriocid, Streptocid  
 Argonin — Albargin, Protargol  
 Argyrol — Albargin, Protargol  
 Arheol — Ol. Santali  
 Arhovin — Salol, Urotropin  
 Aristochin — Chinin, Euchinin  
 Aristol — Bismut. subgallicum  
 Arsacetin — Osarsol  
 Arsentriferrin — Ferratin + As  
 Arsylen — Osarsol  
 Arthigon — Gonokokkide vaktsiin  
 Askaridol — Hexylresorcin  
 Asparagin — Diuretin  
 Asparol — Acesal  
 Asthmacid — Antiasthmocrin  
 Astonin — Fosfarsin, Pantocrin  
 Asurol — Bijochinol, Bismoverol, Novoarsenol  
 Atebrin — Acrichin  
 Atochinol — Atophan  
 Atophanyl — Salitropin  
 Aulinogen — Sulfolan  
 Avertin — Narcolan

Balnacid — Pix Betulae  
 Barbipyrin — Pyramidon + Veronal, Verodon  
 Bellafolin — Extr. Belladonnae, Atropin  
 Benzosol — Guajacolum carbonicum  
 Benzyl-benzoat — Opium, Papaverin  
 Betabion — Torulin  
 Betaxin — Torulin  
 Betol — Acesal  
 Bilival — Chologon + Lecithin  
 Binaemon — Hepatocrin  
 Bismogenol — Bismoverol, Bijochinol, Bismutin  
 Bisuspen — Bismoverol, Bijochinol, Bismutin  
 Borohexamin — Urotropin  
 Bromalin — Natrium bromatum  
 Bromipin — Ammon. + Kal. + Natr. bromatum,  
     Albro  
 Butolan — Naphtalin pur., Alumin. subacet.  
     solut.  
 Cadechol — Corasol  
 Camphogen — Ol. camphoratum  
 Camphochol — Chologon  
 Campolon — Hepalon  
 Candiolin — Phytin  
 Cantan — Acid. ascorbinicum, Vitamin „C“  
     (vedelik)  
 Captol — Acid. tannicum + Chloralhydrat  
 Cardiazol — Corasol  
 Casbis — Bismoverol, Bijochinol  
 Cascara Sagrada — Purgen, Phenopurgen,  
     Frangula  
 Caseosan — Lactan  
 Catamin — Sulfolan  
 Causyth — Salipyrin, Pyramidon  
 Cebion — Acid. ascorbinicum, Vitamin „C“  
     (vedelik)  
 Cehasol — Ichthyol  
 Chineonal — Bromural, Luminal  
 Chinidin — Chinin

Chinoidin — Chinin  
 Chinosol — Bactericid  
 Chloramin — Pantocid, Dichloramin  
 Choleflavin — Chologon  
 Cholelysin — Chologon  
 Choleval — Albargin, Protargol, Ellargol  
 Chologon — Chologon  
 Chrysarobin — Sulfolan  
 Cibalgin — Pyramidon + Malyl  
 Citarin — Urotropin  
 Citrophen — Antipyrin, Phenacetin, Pyramidon  
 Citobarium — Urotropin  
 Clauden — Stypticin, Secalen  
 Clavipurin — Ergotin, Secalen  
 Coagulen — Extr. Polygoni hydropiperis  
 Codeonal — Codein + Medinal  
 Coffetylin — Aspirin + Coffein, Ascophen  
 Compral — Pyramidon  
 Coramin — Cordiamin  
 Cotarnin — Stypticin  
 Creosotal — Creosot, Guajacol, carbonicum  
 Crurin — Bismutum tribromphenylicum  
 Curcumen — Chologon  
 Cusylol — Cuprum citricum  
 Cycloform — Anaesthesin  
 Cylotropin — Salitropin  
 Decamin — Ol. Jecoris, Ol. Jecoris vitaminisatum  
     Vitaminol, Arachitol  
 Decholin — Chologon  
 Degalol — Chologon  
 Degrasin — Endoxicrin, Thyreoidin  
 Desencin — Salsolin  
 Desitin — Ungt. olei Jecoris, Ungt. Derma  
 Devegan — Trichosan  
 Dextropur — Saccharum uvicum  
 Dial — Malyl  
 Dicodid — Codein, Heroin, Morphin  
 Digalen — Digalen-Neo

Digifolin — Digalen-Neo, Gitalen, Diginorm  
 Digipurat — Digalen-Neo, Diginorm  
 Digitaline — Digalen-Neo, Gitalen  
 Digitalysat — Diginorm  
 Dijodyl — Kalium jodatum, Lipojodol  
 Dilaudid — Codein, Heroin, Morphin  
 Dimenformon — Folliculin, Folliculol,  
     Novoovaricrin  
 Diplosal — Acesal  
 Diuretysat — Diuretin  
 Doralgin — Pyramidon + Veronal  
 Drosithym — Pertussin  
 Ecobol — Extr. Filicis, Carboneum tetrachlo-  
     raturum  
 Ektebin — Dermatebin  
 Ekzemyl — Sulfolan  
 Eldoform — Tannalbin  
 Electrargol — Ellargol  
 Elityran — Thyreoidin, Endoxicrin  
 Embarin — Mercusal, Novoarsenol  
 Embial — Bismoverol, Bijochinol  
 Empyroform — Sulfolan  
 Enesol — Osarsol  
 Ephetonin — Ephedrin  
 Epicarin — Sulfolan  
 Erugon — Orchicrin, Spermocrin  
 Eucain — Cocain, Novocain, Sovcain  
 Eucalyptol — Oleum Eucalypti  
 Eucerin. anhydric. — Adeps Lanae  
 Eukodal — Codein, Morphin  
 Euguform — Bismut. subgallic.  
 Eulatin — Väävli preparaadid  
 Eumenol — Folliculin, Folliculol  
 Eumydrin — Atropin  
 Eunatrol — Chologon  
 Eupaverin — Papaverin  
 Eupthalmin — Atropin  
 Euphyllin — Diuretin, Digitalis

Euresol — Resorcin  
 Europhen — Bismutum subgallicum  
 Evipan-Natrium — Hexenal, Pronarcon  
 Ferroglidin — Zymoferrophytol  
 Fantan — Atophan  
 Exalgin — Antifebrin  
 Ferropyrin — Antipyrin  
 Ferrophytin — Zymoferrophytol  
 Ferrostabil — Tinct. Ferri pomati  
 Filmaron-öli — Extr. Filicis  
 Folliculin-Menformon — Folliculin, Folliculol,  
     Novoovaricrin  
 Fulmargin — Ellargol  
 Gardan — Analgin + Pyramidon  
 Gardenal — Luminal  
 Gelonida Alumin. subacet. — Alumin. subacet.  
     solut.  
 Glycocoll — Diuretin, Fol. Uvae ursi  
 Gonocystol — Sulfidin  
 Gonosan — Sulfidin  
 Granugenol — Ol. Vaselini purum, Ol. Jecoris  
 Granugenpasta — Ungt. olei Jecoris  
 Guacamphol — Guajacolum carbonicum  
 Guarana — Coffein  
 Gyneclorina — Pantocid  
 Gynergen — Ergotin, Secalen  
 Haemogallol — Haematogen  
 Haemol — Haematogen  
 Hegonon — Albargin, Protargol  
 Heliobrom — Sulfolan, Natr. salicylic, Bism.  
     subgallic, etc.  
 Helmitol — Urotropin  
 Helminal — Naphthalin. puriss., Hexylresorcin  
 Helpin — Lecithin, Hepalon, Hepatocrin  
 Hepracton — Hepalon, Hepatocrin, Hepatolysat  
 Hetol — Calcit  
 Hetralin — Urotropin  
 Hexal — Urotropin

Hexophan — Atophan  
 Hexeton — Digitalis, Papaverin  
 Hopogan — Magnesium-Perhydrol  
 Hydrastin — Stypticin  
 Hydronal — Acidosan  
 Hypnal — Amital-Natrium, Chloralhydrat  
 Hypnon — Amital-Natrium, Chloralhydrat  
 Hyrgol — Novarsenol, Bismoverol etc.  
 Hypobolan — Pituicrin A  
 Hypophysin — Pituicrin T, Pituicrin P,  
     Adiurecrin  
  
 Ichtalbin — Salol, Tannalbin  
 Ichtargan — Albargin  
 Ichtiform — Salol, Tannalbin  
 Idozan — Ferratol, Haematogen  
 Iminol — Antiasthmocrin  
 Impletol — Novocain + Coffein  
 Iriphan — Atophan  
 Isacen — Isaphenin  
 Isapogen — Liniment. saponato-camph.  
 Iso-Arheol — Urotropin  
 Isticin — Isaphenin  
 Jod-Calcium-Theobromsal — Diuretin + Kalium  
     jodatum  
  
 Jodipin — Jodolipol  
 Jodocitin — Lecithin + Kalium jodatum  
 Jodoformin—Jodoform, Bismut. tribromphenylic.  
 Jodoformogen — Jodoform  
 Jodol — Jodoform, Kalium jodatum  
 Jodostarin — Kalium jodatum  
 Jodothyryn — Thyreoidin  
 Jodtetragnost — Jodognost  
 Jothion — Darminol  
 Jubol — Purgen, Phenopurgen, Frangula  
 Juvenin — Zymoferrophytol, Fosfarsin  
 Kalzan — Calcium lacticum  
 Kamala — Extr. Filicis

Kephaldol — Pyramidon, Atophan, Phenacetin  
 Verodon  
 Klimakton — Klimaktodin, Ovaricrin, Ovario-  
 panhormon  
 Klimasan — Klimaktodin, Ovaricrin, Ovario-  
 panhormon  
 Kryofin — Antipyrin, Pyramidon  
 Kola-Astier — Kola-tabletid, Coffein  
 Kombetin — Convalen  
 Kresival — Kalium sulfogujacolic.  
 Lacarnol — Myol, Myolysat  
 Lacteol — Lactan, Lacteoprotosan  
 Lactobacilline — Lactoproteosan  
 Lactophenin — Antipyrin, Phenacetin, Pyramidon  
 Larocain — Cocain, Novocain, Sovcain  
 Larosan — Calcium lacticum  
 Laudanon — Morphin, Opium  
 Lecithol — Lecithin  
 Lenicet — Alumin. subacetic. solut.  
 Lenigallol — Sulfolan, Ungt. Naphtalani  
 Leukichtol — Albichtol  
 Liantral — Pix Betulae  
 Lipatren — Lipocerebrin  
 Lipojodin — Jodolipol  
 Liquitalis — Diginorm  
 Loretin — Yatren  
 Luteoglandol — Extr. Corpus lutei (Luteolysin)  
 Luteocyclin — Extr. Corpus lutei (Luteolysin)  
 Lutren — Extr. Corpus lutei (Luteolysin)  
 Luteotransannon — Extr. Corpus lutei  
 (Luteolysin)  
 Lækkerol — Pertussin, Pectus, Eu-Ment  
 Maretin — Pyramidon, Verodon  
 Melubrin — Atophan, Pyramidon, Verodon  
 Menformon — Folliculin, Folliculol  
 Menolysin — Folliculin, Folliculol  
 Mergal — Novoarsenol  
 Mesotan — Aethylum salicylicum

Mesurool — Bismoverol, Bijochinol  
Mitigal — Solutio Vlemingkxi, Sulfolan  
Mitin — Lanolin  
Moronal — Bactericid  
Myosalvarsan — Myoarsenol  
Narcein — Morphin, Narcolan  
Narcophin — Morphin, Narcolan  
Narcotin — Morphin  
Nateina — Acid. ascorbinicum, Vitaminol,  
Carotol, Caroton  
Nealpon — Pantopon  
Necaron — Hydrarg. cyanat., Albargin,  
Protargol  
Neobornyval — Bromural  
Neodorm — Bromural, Amital-Natrium  
Neohexal — Di-Hexin, Urotropin  
Neoreargon — Albargin, Protargol  
Neosalvarsan — Novarsenol  
Neosilbersalvarsan — Novarsenol  
Neotropin — Streptocid  
Neuronal — Amital-Natrium, Veronal  
Neutralon — Acidosan  
Nitroscleran — Hypersol  
Noctal — Bromural, Amital-Natrium  
Normacol — Frangula, Purgen, Phenopurgen  
Normolactol — Pantocid  
Nosophen — Jodoform, Salol  
Novalgin — Analgin  
Novargan — Albargin, Protargol  
Novaspirin — Aspirin  
Novasurool — Mercusal  
Novatophan — Atophan  
Noviform — Jodoform, Bismut. tribromphenylic.  
Novonal — Bromural, Malyl  
Novozon — Magnesium-Perhydrol  
Nujol — Ol. Vaselini puriss.  
Octin — Papaverin  
Odylen — Sulfolan, Ungt. Naphthalani

Oktyron — Papaverin + Pyramidon  
Omnadin — Reactogen  
Opsonogen — Stafülokokkide vaktsiin  
Oophorin — Ovarin, Ovaricrin  
Optannin — Tannalbin  
Optarson — Osarsol, Strychnin, nitricum  
Optochin — Streptocid  
Orphol — Bismut. subnitricum  
Orexin. tannicum — Aeron  
Orthoform — Anaesthesin, Cocain  
Ouabain — Convalen  
Ovaraden — Ovarin, Ovaricrin  
Ovarial — Ovarin  
Ovogal — Chologon  
Ovomaltine — Vivomalt  
Ovo-Sedicyl — Ovarin, Ovaricrin  
Ovotransannon. — Extr. Corpus lutei (Luteolysat)  
Pageol — Urotropin  
Pancreon — Pankreatin  
Pacyl — Salsolin  
Padutin — Sympatomimetin  
Pandigal — Diginorm  
Panflavin — Trypasol, Flavosol  
Pantocain — Dicain  
Paracodin — Codein  
Paraldehyd — Chloralhydrat  
Parathyreoid — Parathyreocrin  
Pavopin — Pantopon  
Pellidol — Ungt. olei Jecoris  
Perabrodil — Sergosin  
Perandren — Orchicrin, Spermocrin  
Percain — Sovcain  
Pergenol — Perhydrol  
Perichol — Camphora + Papaverin  
Peristaltin — Frangula, Eserin  
Perlatan — Folliculin, Folliculol  
Pernocton — Narcolan  
Peronin — Morphin, Heroin

Peruol — Sulfolan  
 Phanodorm — Amital-Natrium  
 Phenocoll — Atophan, Pyramidon  
 Phenylurethan — Acesal  
 Phosphytin — Phytin  
 Pittylen — Sulfolan  
 Pituglandol — Pituitrin „P“  
 Plasmon — Lactan  
 Podophyllin — Calomel, Frangula  
 Praephyson — Praephysocrin  
 Probilin — Chologon  
 Progestin — Praephysocrin  
 Progynon — Folliculin, Folliculol  
 Prolan — Praephysocrin, Parathyreocrin  
 Proluton — Extr. Corpus lutei  
 Prominal — Amital-Natrium  
 Prontosil — Streptocid, Streptyl  
 Propaesin — Anaesthesin  
 Prostigmin — Eserin  
 Protylin — Phytin  
 Psicain — Cocain, Sovcain, Thiocain  
 Pulmoserum — Pertussin  
 Pyocyanase — Streptocid  
 Pyoctaninum aureum — Rivanol  
 Pyrenol — Natr. benzoicum + Natr. salicyl. +  
     Thymol  
 Pyridium — Streptocid, Urotropin  
 Pyrocol — Coli-valktsiin  
 Quinisal — Chinin, Acesal  
 Racedrin — Ephedrin  
 Radiosclerin — Hypersol  
 Reargon — Albargin, Protargol  
 Recresal — Natr. phosphoric., Natr.  
     glycerophosphoric.  
 Redoxon — Acid. ascorbinicum  
 Regulin — Frangula, Purgen  
 Renoform — Adrenalin  
 Resorbin — Adeps Lanae

Rhodan-Calcium-Theobromsal — Diuretin  
Rhodapurin — Diuretin  
Rhodarsan — Novarsenol  
Riodine — Jodolipol  
Rodagen — Antithyreoidin  
Sagrotan — Lysol  
Salacetol — Atophan, Salol, Acesal  
Salen — Darminol  
Salicain — Anaesthesin  
Salit — Darminol  
Salophen — Acesal, Atophan, Pyramidon  
Salyrgan — Mercusal  
Scillaren — Convalen, Diginorm, Adonilen  
Secacornin — Secalen  
Secalysat — Secalen  
Sedobrol — Natrium bromatum  
Sedormid — Bromural  
Selectan — Streptocid, Sulfidin  
Selvoral — Calcium gluconicum  
Sidonal — Atophan, Acesal  
Solveol — Lysol  
Sophol — Argentum nitricum  
Sparteïn — Adonilen, Diginorm, Diuretin  
Spermin — Spermocrin, Spermol  
Spirosal — Darminol  
Stovain — Cocain, Sovcain  
Strophanthin — Convalen  
Styptol — Stypticin  
Styracol — Guajacolum carbonicum  
Subcutin — Anaesthesin  
Sulfidal — Sulfur ppt., Sulfolan  
Sulfoderm — Sulfur ppt., Sulfolan  
Sulfoform — Sulfur ppt., Sulfolan  
Sulfonal — Amital-Natrium, Chloralhydrat  
Suprarenin — Adrenalin  
Sympatol — Adrenalin  
Syrgol — Albargin, Protargol

Tannigen — Tannalbin, Bism. subnitr., Acid.  
     tannic.  
 Tannismut — Tannalbin, Bismut. subnitr.  
 Tannobromin — Tannoform, Formalin, Ungt.  
     camphoratum  
 Tannyl — Tannalbin  
 Targesin — Protargol, Collargol  
 Terpichin — Terechin  
 Theacylon — Diuretin  
 Theocin — Diuretin  
 Theophyllin — Diuretin, Coffein  
 Thigenol — Ichthyol, Albichtol  
 Thioform — Bismut. subnitr., Bismut subgallic.  
 Thiol — Ichthyol, Albichtol  
 Thyraden — Thyreoidin  
 Transargan — Albargin, Protargol  
 Transpulmin — Pulmosan  
 Triferrin — Ferratin  
 Trigemin — Pyramidon  
 Tropacocain — Cocain, Dicain, Sovcain  
 Tumenol-Ammonium — Ichthyol, Albichtol  
 Tussol — Antipyrin, Kalium guajacolsulfonicum  
 Tutocain — Cocain, Dicain, Sovcain, Thiocain  
 Uliron — Streptocid album, Sulfidin  
 Urazine — Urotropin  
 Ureabromin — Natr. bromat., Bromural  
 Uricedin — Natr. citricum + Natr. sulfuric.  
 Uropherin — Diuretin  
 Uzara — Opium, Papaverin  
 Vasano — Aeron  
 Veramon — Pyramidon + Veronal, Verodon  
 Vigantol — Vitaminol, Arachitol  
 Vioform — Jodoform, Bismut. subgallic.  
 Vogan — Carotol, Caroton  
 Yohimbin — Orchicrin

## NSVL JA ENSV RAVIMPREPARAADID.

### **Acesal.**

Atsetüülsalitsüül-salitsüülhape (Acetyl-Diplosal). Valge kristalne pulber, lõhnata, mõru maiguga, vees ei lahustu. Antipyreticum ja anti-rheumaticum, eriti toimiv ägeda liigesereuma puhul. 0,3-0,5-1,0 korruga kuni 8 korda päevas.

### **Acidosan.**

Aluminium hydrooxydatum colloidal (Alucol). Valge, lõhnata ja maiguta, vees mittelahustuv pulber. Hyperaciditas, hypersecretio. 0,5—1 g enne ja peale sööki.

### **Acrichin.**

Metoksükloordietüülamiinometüül - butüülamiinoakriidiin - dikloorhüdraat. Intensiivselt kollane kristalne pulber, väga mõru maiguga, lahustub vees 1 : 24. Lahused fluorestseerivad roheliselt. On tugevate värvivate omadustega, värvib koed ja naha intensiivselt kollaseks. Naha värvumine võib püsida nädalaid, kuid kaob erilise ravita. Malaariavastane vahend. Toimib spetsiifiliselt malaariatekitaja kõigile vormidele, välja arvatud troopilise malaaria gametotsüüdid, millelele akrihiin, nagu kiniingi, otseselt ei toimi. Malaariaravi toimub erieskirja järgi. Tarvitakse seespidiselt tabl. 0,1 korruga 3 korda päevas (0,1 g toimib tugevamini kui 0,3 g kiniini).

### **Adonilen.**

Kõrvalainetest vabastatud standarditud adonise vesiekstrakt, konservitud 20% alkoholi ja 0,5% kloretooniga. Toimeainena sisaldab glüko-

siidi adonidiini. 1 ccm=25 konnaühik., 0,6 ccm=1 supilusika täie adooniseinfuusile 4,0 : 200. Cardiacum ja diureticum. Ei oma seedetraktile ärritavat toimet ega ka kumulatiivset toimet, ei suurenda vererõhku. Südametegevust reguleeriv toime ilmneb 10—15 min. peale tarvitamist. Diureetikumina ületab digitaalise toime. Koos bromiididega tarvitatakse epilepsia puhul. Tarvitatakse 3—4 korda päevas 15—20 tilka sissevõetuna.

### **Adrecaïn.**

Adrenaliin-novokaiin amp. à 1,1 ja 2,2 ccm. 1 ccm = 0,02 g novokaiini, 0,5 adrenaliini 1 : 1000 0,002 g naatriumkloriidi ja 0,004 g kaaliumsulfaati. Lokaalanestetikum, eriti juhtivusanesteesiaks, nahaalusi ja muskulisisesi.

### **Aeron.**

Tabletid, sisaldavad 0,0001 g hüostsüamiinkamforaati ja 0,0004 g skopolamiinkamforaati. Merehaiguse raviks 1—3 tabletti. Profülaktiliselt 1—2 tabl. üks tund enne sõidule asumist või otsekohe esimeste haigusnähtude ilmnemisel. Kõrvalnähtude (janu, kuivus suus ja kurgus) kõrvaldamiseks tuleb juua kohvi. Toime kestab kuni 24 tundi.

### **Albichtin.**

Vt. Albichtol.

### **Albichtol.**

Värvuseta ihtüool, koosneb tiofeeni homologide segust neutraalsete süsivesinikega. 9—12% S. Selge, värvuseta või kollakas, omapärase nõrga aroomse lõhnaga vedelik. Õhu käes värvub kollaseks kuni punaseks. Lahustub rasvõlides, eetris ja alkoholis kõigis vahekordades, ei lahustu vees. Glütseriiniga annab ebapüsiva emulsiooni. Tarvitatakse ihtüooli asendajana, kuna ei evi ebameeldivat lõhna ega ei määri pesu. Prepa-

raadid: Albichtin — 2-5-10-15% salv vase-  
liini ja lanoliini segus. Globalbin' — 5%  
glütseriin-želatiin-gloobulid. Olalbichtol —  
5% steriilne albihtooli-lahus oliivõlis, amp. 2 ccm.  
Süstimiseks nahaalusi ägeda liigesereuma puhul.  
Pastalbin — 10% pasta tragagant-glütseriin-  
limas, klaastorudes. Anticoncipiens. Recalbin  
— suposiidid à 0,15 g albihtooli, 0,02 g karu-  
mustikaekstrakti ja 0,03 g papaveriini.

### **Albro.**

Natr. bromati 5 g, Acid. citric., Acid. tartaric.,  
Natr. bicarbonic. q. s. ad 70 g. Granulaat. Seda-  
tivum. 2—3 korda päevas 1 teelusika täis klaasi  
veega.

### **Alilsat.**

Tinct. Allii sativi 100,0 g, Ol. Menthae, Ol.  
Foeniculi, Ol. Carvi aa 0,25 g. Vedelik pudeleis  
30,0 g. Üldise arterioskleroosi puhul ja kõhukin-  
nisusse kalduvate koliitide puhul.

### **Anaemin.**

Ferripürofosfaadi ja ammooniumtsitraadi kak-  
sikühendit (16% rauasisaldisega) 6,0, Aquae  
200,0, Sacch. albi 50,0, Sacchar. tosti 12,5, Spirit.  
vini 95% 25,0 Ol. Aurant. cort. 0,0125, Ol. Cinna-  
momi 0,005, Tinct. aromatic. 0,25, Vanillini 0,001.  
Tumepunakaspruun vedelik, sisaldab 0,4% Fe.  
Kehvveresuse ja kloroosi ning närvinõrkuse pu-  
hul. 3 korda päevas 1 supilusika täis.

### **Anaesthesol.**

Anaesthesini 0,05, Zinc. oxydat. 0,013, Extr.  
Hydrast. canad. 0,05, Carb. adsorb. 0,0085, Buty-  
roli q. s. ad 2,35. Kõünlad hemorroidide ja pä-  
rasoole põletike vastu. 1—2 korda päevas 1  
küünal.

### **Anethym.**

Anaesthesini 0,03, Phenacetini 0,08, Mentholi,

01. Eucalypti, Thymoli aa 0,0015. Past. 1 g. Ülemiste hingamisteede haiguste puhul 4—5 pastilli päevas suus aeglaselt imeda.

### **Anusol (NSVL)**

Dermatoli (seu Xeroformi) 0,1, Zinc. sulfuric. 0,05, Extr. Belladonn. 0,02, Glycerini 0,15, Butyroli q. s. ad 2,35. Küünlad hemorroidide raviks.

### **Amital-Natrium.**

Natr. aethylisoamylbarbituricum. Valge, lõhnata, vähe mõru, väga kergesti vees ja alkoholis lahustuv hügrokoopne pulber. Hypnoticum ja narcoticum. Tarvitatakse unepuuduse puhul psühhiaatrias ja raviks kestva unega, sünnitusabis valude vaigistamiseks ning strühniini vastumürgina seepidiselt, nahaalusi ja veenisisesi, samuti rektaalselt. Annus 10—20 mg 1 kg haige kehakaalu kohta 10% värskelt valmistatud vesilahusena; veenisisesi põhinarcoosiks suurim ühekordne annus 1,6 g.; seepidiselt 0,2—0,5 g, suurim annus 1,0 g.

### **Ammargen.**

Höbenitraat ammoniakaalses vesilahuses, sisaldab 2,5 % höbenitraati. Selge, ammoniaagi lõhnaga vedelik. Antiseptikum põletikuliste ja septiliste protsesside puhul kirurgias, günekoloogias, veneroloogias, dermatoloogias, vesilahusena 1 : 10 000 kuni 1 : 40 000 pesemiseks, loputamiseks ja infusiooniks veenisisesi ning rektaalselt.

### **Analgin.**

Monometüül - amiinoantipüriin - naatriummetüleensulfonaat (Novalgin). Vees kergesti, alkoholis raskesti lahustuv valge, kristalne pulber. Vesilahus säilitamisel muutub kollakaks, kuid sellest toimivus ei vähene. Antirheumaticum, analgeticum ja antipyreticum. Ületab toimivuselt antipüriini, melubriini ja püramidooni. Tarvita-

takse ägeda liigesereuma, samuti nakkushaigusile kaasuva liigesepõletiku ja lihasereuma puhul. Toimib valuvaigistavalt peavalude, iäsiase, lumbago, neuralgiliste valude, kõhu-, neeru- ja operatsioonijärgsete valude puhul. Pneumonia, gripi, tüüfuse jne. puhul toimib palavikku alandavalt. Toime ilmneb kiiresti, 5—20 min. vältel. Tarvitatakse seespidiselt 0,5 g 2—3 korda päevas, naaalusi või muskklisisesi 1—2 ccm 50% lahust.

#### **Antiasthmocrin.**

Adrenaliini ja Pituitrin P segu. Asendab Asthmacid'i. Asthma bronchiale vastu 1 amp. enne ataaki või selle ajal .

#### **Arachitol.**

(Vitaminol, Vigantol-õli). D-vitamiini õlilahu, 1 ccm sisaldab 10000 rü D-vitamiini. Rahhiit, skrofuloos, kondikava kasvuhäired, laste tetaania ja spasmofiilia, luutiisikus, mitmesugused nakkushaigused. Raviannus imikuile ja väikelastele 2—3 tilka päevas, suuremaile lastele 5—10 tilka teelusika täie sooja piimaga. Profülaktiliselt 2—3 tilka või 3—5 tilka päevas. Täiskasvanuile 5—10 tilka päevas.

#### **Ascophen.**

Aspirini 0,2, Phenacetini 0,2, Coffeini 0,04 g. Tabl. reumaatil. ja neuralgil. valude vastu. 1—2 tabletti päevas.

#### **Asphen.**

Aspirini 0,3, Coffeini 0,03. Tabletid peavalu vastu. 1—3 tabl. päevas.

#### **Astma-sigaretid.**

Sisaldavad toimeainena Folium Stramonii. Asthma bronchiale hoo alul suitsetada 1—2 sigaretti.

#### **Asthmatol.**

Droogide segu karbis: Fol. Stramonii 40,0,

Fol. Belladonnae 35,0, Fol. Digitalis. 10,0,  
Fol. Menthae 5,0, Fol. Salviae 3,0, Kal. nitric.  
15,0. Asthma bronchiale hoo puhul suitsetada  
paberossina.

### **Bactericid.**

Lõhnata, maiguta kollakas pulber, lahustuv  
vees. Antisepticum. Tarvitatakse lahusena  
1 : 1000 — 1 : 10 000 operatsioonidel, instrumen-  
tide steriilimiseks, pneumopleuriidi j. t. mädane-  
misprotsesside puhul. Käte desinfitseerimiseks  
1 : 2000, haavade ja kehaõõnte loputamiseks  
1 : 3000 — 5000.

### **Baume Bengue.**

Mentholi 4 g, Methyl. salicylic. 21 g, Vaselini  
75 g. Salv tuubis, sissehõõrumiseks reuma ja  
neuralgiliste valude puhul.

### **Betiol.**

Extr. Belladonn. 0,015, Ichthyoli 0,2, Butyroli  
q. s. ad 1,5 g. Küünlad valuvaigistamiseks he-  
morroidide ja analoogsete haiguste puhul.

### **Bijochinol.**

Vismuthüdrojodiidhappe kiniinsool. Peen,  
amorfne, telliskivipunane, vees lahustumatu pul-  
ber, sisaldab 25% kiniini, 20% vismuti, 48% joodi.  
Tarvitatakse antisüfiliitikumina, 10% suspen-  
sioonina virsikutuumaõlis. 1ccm suspensiooni si-  
saldab 0,02 g Bi, 0,025 g kiniini ja 0,048 g joodi.  
Tarvitatakse musklisisesi 3—4 ccm korruga üle  
3—4 päeva. Kogu raviks süstitakse 40—50 ccm  
suspensiooni. Tarbekorral ravi korratakse, kuid  
mitte enne 1,5—2 kuud.

### **Biresol.**

Bism. diresorcinsulfon. 6,5, Bism. subgallic. 6,5  
Zinc. oxyd. 3,25, Balsam. Peruvian. 3,25, Lano-  
lin. anhydr. 1,5, Ol. Cacao 79,0. Küünlad hemor-

roidide ning pärasoole ja tupe limanahkade põletike raviks, 1—3 küünalt päevas.

### **Bismoverol.**

Vismuti ja viinhappe kompleksühendi 10% suspensioon oliivõlis. 6,8% Bi. Antisyphiliticum (asendab Bismogenol'i ja Bisuspen'i). Musklisesi luesi kõigi vormide puhul 1 ccm iga 3 päeva järele. Koguraviks 15—20 ccm.

### **Bismusol.**

Resorcini 2,5, Bism. oxyjodogallic. 6,5, Zinc. oxydat. 13,0, Ol. Cacao 78,0. Küünlad hemorroidide ning pärasoole ja tupe limanaha põletike raviks, 1—3 küünalt päevas.

### **Bismutin.**

10% vismutsubnitraadi suspensioon happevabas oliivõlis anesteetikumi lisandiga. Valuta intramuskulaarseks vismutraviks kõigi luesi vormide puhul. Täiskasvanuile üheks raviks 12—15 süstet, 1—1,5 ccm korruga intragluteaalselt 2—5 päevaste vaheaegadega. Lastele, olenedes üldseisundist, ca 0,1 ccm iga vanuseaasta kohta.

### **Bismutogvi.**

Vismutipreparaat süstimiseks. Antisyphiliticum.

### **Brilliantgrün.**

Viride nitens. Tetraetüül-diamiinofenüülkarbinooli väävelhapu või oblikhapu sool. Rohelised kuldläikega kristallid, kergesti lahustuvad alkoholis ja vees, andes tumerohelise lahuse. Evib tugevat bakteritsiidset toimet ja tarvitatakse antiseptikumina haavade raviks kirurgilises ja silmapraksises, vesi- või vesialkoholilahusena (0,05—0,1 : 100) või lahusena parafiinõlis (0,05 : 100) või 1—2% salvina. Tarvitatakse operatsioonivälja, käte ning infitseeritud haavade raviks.

### **Calcex.**

Urotropini, Calcii chlorati sicci aa 0,25. Tabl. profülaktikumina ja raviks gripi puhul, 1—3 korda päevas 1 tablett.

### **Capsicin.**

Türgipipratinktuur kampri, lavendli- ja rosmariiniõli, kaneeli- ja tindipähklitinktuuri, amoniaagi ja seebi lisandiga. Antirheumaticum sissehõõrumiseks.

### **Capsin.**

Aethyl. salicylic. 20 g, Tinct. Capsici 40 g, Ol. Hyoscyami 40 g. Antirheumaticum sissehõõrumiseks.

### **Carballax.**

Bulb. Allii sativi rec. 0,5, Carb. medicinal. 0,25, Aloes 0,025. Tabl. Kõhukinnisus, käärimiskatarid, meteorism, alimentaarse roiskumise intoksikatsioonid ja allergiad, ainetevahetusehäired, podagra, migreen, reuma, skleroos; anthelminthicum, tonicum, kerge aphrodisiacum. 2—6 tabl. päevas.

### **Carbo-Allium.**

Bulb. Allii sativ. rec. + Carbo medicinal. Tabl. 0,3 g. (= 0,5 g värsket küüslauku ja 0,2 g sütt). Antidiarrhoicum, antidüspticum, reuma, podagra, arteriosclerosis. 3 korda päevas 1—2 tabletti.

### **Carotol.**

A-vitamiini preparaat, kristalse karotiini (provitamiin — A) õlilahus ampullides 1 ccm = 1 mg kristalset karotiini. Profülaktikumina ja raviks mitmesuguste A-avitaminoosi ja A-hüpoavitaminoosi nähete puhul. Nahaalusi 1—2 ccm korraga.

## **Caroton.**

A-vitamiini preparaat, kolloidne karotiini (provitamiin — A) vesilahus. Silmahaiguste, ülemiste hingamisteede ja mitmesuguste epiteelide haigestumiste puhul, tilkadena haigesse silma või ninasse või kompressina igemeile ja nahale, mitu korda päevas. Vedelik ampullides ja pudelis.

## **Cholestin.**

Cholesterini 0,6, Ol. Ricini 3,0, Carbon. tetrachlorat. 2,0, Terpeneoli 3,0, Extr. Cinchonae 0,1, Spirit. 75,0, Aquae 14,0, Ol. aether. comp. 2,3. Alopecia. Sissehõõrumiseks.

## **Chologon.**

Acidum dehydrocholicum (Decholin). Värvusetu, lõhnata, mõru kristalne pulber, raskesti lahustuv külmas, kergesti kuumas vees. Sapieritumist ergutav vahend. Toimib sapiteede infektsioonide puhul bakteritsiidset ja evib samuti tugevat diureetilist toimet. Tarvit. seepidisel ja veenisisesi (naatriumiühendina). Tabl. 0,25 ja amp. 10 ccm (5% lahus) ning 5 ccm (20% naatriumiühendi lahus). Annus sapieritina 3 korda päevas 1 tabl.

## **Citosein.**

Citosein I: 2,5% naatrium-joodoksükinooliinsulfohape ja 2,5% kaseiini vesilahus. C. II: 2,5% naatrium-joodoksükinooliinsulfohapet ja 5% kaseiini. Pruunikaskollane vedelik ampullides 1 ja 2 ccm ja pud. Mittespetsiifiliseks ärritusraviks liigese- ja muskltreuma, vaagnaorganite põletike, bronhiidi, silmahaiguste, furunkuloosi, abstsesside, lapsevoodipalaviku, septilise üldinfektsiooni puhul. Profülaktiliselt kirurgiliste ja günekoloogiliste operatsioonide puhul. 1—5 ccm muskli või veenisisesi.

## **Citramon.**

Aspirini 0,24, Phenacetini 0,18, Coffeini 0,03,

Cacao plv. 0,03, Acid. citric. 0,02, Vanillini 0,01, Sacchari 0,5. Pulbrid 1 g. Peavalu vastu.

### **Citrosal.**

Salipyrini 0,3, Coffeini 0,03, Cacao pulv. 0,03, Vanillini 0,01, Acid. citrici 0,02, Sacchari 0,1. Tabl. 0,5 g. Peavalu vastu.

### **Codterpin.**

Codeini 0,01. Terpinhydrati 0,3, Natrii bicarbonici 0,3. Tabl. köha vastu, 3 korda päevas 1 tablett.

### **Convalen.**

Standarditud maikellukese preparaad, mille toime vastab strofantiini toimele.

### **Contraceptin.**

Chinosoli 0,003, Acid. borici 0,1, Butyroli q. s. ad 1,8 g. Gloobulid rasedusest hoidumiseks.

### **Corasol.**

Pentametüleentetrasool (Cardiazol). Südamevahend, mis ergutab hingamiskeskust. Tarvitatakse vereringehäirete puhul. Amp. 1,1 ja 3,3 ccm. Tabl. 0,1 g. Südamenõrkuse, kopsupõletiku, nakkushaiguste puhul 3—4 korda päevas või iga 1—2 tunni järel 1 tabl. või muskli- või veenisisesi 1 ccm, poole kuni ühetunniste vahedega.

### **Cordiamin.**

Dietüülamiidnikotiinhappe 25% vesilahus (Coramin). Cardiacum, toimiv ergutavalt keskergukavale, südamele ja veresoontele. Toime on lähedane kampri ja kofeiini toimele. Tarvitatakse mürgistuste puhul narkootiliste vahenditega (morfiin), vingugaasiga, raskete nakkushaiguste puhul, 2—5 ccm aeglaselt veenisisesi; vastsündinute hingetuse puhul 1 ccm nabaveeni või nahaalusi — annab tulemuse  $\frac{1}{2}$ —1 min. vältel. Krooniliste südamehaiguste puhul, ka paranemisele ras-

keist haigusist 20—50 tilka seespidiselt või nahaalusi, muskli- või veenisisesi 1—1,5 ccm 2—3 korda päevas.

### **Cortin.**

Neerupealise kooreosast valmistatud hormoonpreparaat ampullides 1 ccm. Addissoni haiguse ja lihassenõrkuse puhul 2—3—5 ccm päevas nahaalusi.

### **Darminol.**

Artemisia cina'st saadud eeterlik õli (Cineol, Eucalyptol), kollakas, aroomne vedelik. Tarvitatakse per se või segus piirituse, kloroformi ja teistega, välispidise antidoloroosumina sissehõõrumiseks.

### **Derma puuder.**

Ol. Jecoris chlorati 10,0, Zinci oxydati 10,0, Talci 80,0. Haudunud kohale, põletishaavale punetuse ja villijärgus, sügelemise, päikesepõletuse, lamatise, ulcus cruris, vulvovaginiidi jne. puhul.

### **Derma salv.**

Ol. Jecoris chlorati 16%, Zinc. oxydat. 45%, Bolus albae steril. 5%, Lanolini, Vaselin, Ol. Vaselini, Terpeneoli ad 100. Põletishaavade, päikesepõletuse, kõigi kirurgiliste haigestumiste, kemikaalidega tekitatud nahaärrituste, lamatiste, ekseemide, ulcus cruris, haudunud kohtade raviks.

### **Dicain.**

Dimetüülamiinoetüül-parabutüülamiinobensoehappe kloorhüdraat (analoogne Pantocain'ile). Valge või veidi kollakas kristalne pulber, lõhnata, mõru maiguga. Lokaalanesteetikum kokaiini asendamiseks, ületab kokaiini toime mitmekordselt. 1% lahus toimib võrdselt 10% kokaiinilahusele ja 3% lahus vastab 20—35% kokaiinilahusele. Kokaiinist 2 korda mürgisem. Ei lagune keetmisel. Tarvitatakse oftalmoloogias (0,25—

0,5—1% lahuse), oto-larüngoloogias (1—2—3% lahuse), kirurgias 1 : 1000, füsioloogilises lahuses.

### **Dichloramin B.**

N-dikloorbensosulfamiid. Valge peeneteraline pulber, nõrga kloori lõhnaga, sisaldab aktiivset kloori mitte alla 60%. Vees ei lahustu, lahustub naatriumleelises, andes naatriumiühendi (kloramiin B); soolhappe toimet eritab vaba kloori. Lahustub rasvades ja rasv- ning eeterlikes õlides. Tarvitatakse antiseptikumina 0,2—2% lahusega eukalüpti- või vaseliiniõlis. Bakteritsiidne toime vastab sublimaadi toimele.

### **Digalen-Neo.**

Standarditud, ballastainevaba digitaalielehe alkoholi väljatõmme, valmistatud Gruusias kasvava roostepuuni sõrmkübara (*Digitalis ferruginea*) lehtedest. Värvusetu, selge, loksutamisel vahutav, mõru vedelik, konservitud 30% glütseriini lisandiga. Toimelt vastab Digalen'ile, sisaldades glükosiide digitoksiini, gitaliini ja digitaliini. Amp. 1,1 ccm; 1 ccm = 0,05 g Fol. Digital. titr. Cardiotonicum 1—2 ccm päevas, eriti kompensatsioonihäirete, kroonilise müokardiidi ja lapseea pneumonia puhul.

### **Diginorm.**

Analoogne digipuraadile. Standarditud preparaat, valmistatud digitaalielehe alkoholi väljatõmbest. Sisaldab digitoksiini ja anhüdrogitaliini. 1 ccm = 0,1 g Fol. Digital. Cardiotonicum. 3 korda päevas 15—25—40 tilka.

### **Di-Hexin.**

Urotropinum sulfosalicylicum. Tabl. 0,5 g. Siseantiseptikum põie- ja kuseteede haiguste, gripi jne. puhul. 4—6 korda päevas 1 tabl.

### **Ellargol.**

Kolloidhõbe (Electrargol). Antiseptiline vahend ampullides süstimiseks veeni- või muskli-sisesi septiliste haigestumiste puhul.

### **Elsulin.**

Mentholi 0,75, Ol. Andromedae, Terpeneoli ana 1,5, Paraffini liq. ad 15,0, Chlorophylli q. s. ad colorem. Antirheumaticum, antineuralgicum. Sissehõõrumiseks.

### **Endoxicrin.**

Embrüonaalsete kudede hormoone sisaldav preparaat rasvumise vastu ja saledusraviks. Sisaldab hormoone, mis evivad energilist hapendavat toimet ja suurendavad organismis põlemisprotsesse. Tabl. 0,3 g. Tarvitatakse 2 korda päevas 2 tabletti pikemat aega, suurendades annust kuni 5 × päevas 2—3 tabletti.

### **Ernes Testament.**

Cort. Condurango, Cinchonae, Aurantii, Cascar. sagraadae, Cinnamomi, Rad. Gentianae, Sarsaparillae, Rhiz. Rhei, Calami, Lign. Santali rubr. Caryophylli, Aloe. Roborans.

### **Eu-Ment.**

Mentholi 10 g, Thymoli 0,2 g, Terpeneoli 0,5 g, Eucalyptoli 5 g ad 1000 pastill. a 1 g. Ülemiste hingamisteede põletikulised haigestumised. 1—2 pastilli aeglaselt suus laguneda lasta.

### **Ferrolin.**

Rauaalbuminaati, hemoglobiini, letsitiini, vanilliini, rauaoksüüdi ja suhkrut sisaldavad tabletid 0,5 või 0,8 g. F. vedel: ferratiini, rauaalbuminaati, hemoglobiini, ovoletsitiini, rauaoksüüdi, alkoholi, suhkrut ja maitse- ning lõhnaineid sisaldav vedelik. 3—4 korda päevas 1 tabl. või 1 supilusika täis.

### **Flavacridin.**

Diamiinoakridiini ja diamiinometüülakridiini kloorhüdraatide segu. Analoozne trüpaflaviinile. Punakaspruun, vees lahustuv pulber. Antiseptiline ja bakteritsiidne vahend haavade pesemiseks ja loputuseks (1 : 1000), veenisisesi septiliste haiguste, nagu entsefaliidi, meningiidi, lapsevoodipalaviku, endokardiidi, gonorröa jne. puhul  $\frac{1}{2}$ —2% lahuseks 5—10 ccm päevas. Veterinaarpraktikas lammaste, sigade, hobuste ja veiste piroplasmoosi puhul veenisisesi 1% lahuseks 0,003—0,005 ühe kg looma kaalu kohta.

### **Flavosol.**

Diamiinometüülakridiinkloriidi 0,003 g, urotropiini 0,1 g. Tabl. 0,5 g kakao ja maitseainete lisandiga. Suukoopa ja kurgu desinfitseerimiseks haiguste puhul ja profülaktiliselt difteeria, gripi, sarlaki ja angiina vastu. 1—2 tabl. tunnis aeglaselt suus imeda.

### **Folliculin.**

Ovariaal-hormoon ampullides a 1 ccm. Tarvitatakse munasarjade puuduliku tegevuse ja sellest oleneva üldise ja sugulise arenematus, menstruatsioonikorratuste ja klimakteeriliste vaevuste puhul. 1 ccm = 200 ü. 1—2 amp. päevas kuni haigusnähtude kõrvaldamiseni või korraldatakse 3—4 nädalalisi igapäevaseid süstimisi.

### **Formintol.**

Paraformii 0,01, Mentholi 0,0025 ad tabl. 1 g. Suukoopa ja kurgu desinfitseerimiseks. 10—15 tabl. päevas imeda, lastele  $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$  tabl. korraga.

### **Gitalen.**

Ballastaineist vabastatud standarditud prepraat, valmistatud digitaalse vesiväljatõmbest, konservitud alkoholi ja kloretooniga. Sisaldab gitaliini muutmatul kujul. Digitoksiini puudumise

tõttu ei evi toksilist toimet (kõhulahtisus, oksendamise, peapööritus), ka kumulatiivne toime on väike. 1 ccm = 5 konnaühikut. Tarvitatakse vereringehäirete puhul südamehaiguste tõttu, nakkushaiguste puhul ja südame arütmia puhul, 20—30 tilka korraga.

### **Globalbin.**

Vt. Albichtol

**Glycerophosphat tabl. c. Haemoglobino et Lecithino.**

Calc. glycerophosph. 0,1, Haemoglobini 0,2, Lecithini 0,02. Tabl. 0,3 g. Neurasteenia, asteenia, vaimline ja kehaline liigväsimumus, kehvveresus, taastoibumine. Täiskasvanuile 3—6 tabl. päevas, lastele vastavalt vähem.

### **Glycerophosphat tabl. c. Lecithino.**

Calc. glycerophosphor., Ferri glycerophosphor. aa 0,15, Lecithini 0,02. Tabl. 0,3 g. Neurasteenia, asteenia, vaimline ja kehaline liigväsimumus, kehvveresus, taastoibumine. Täiskasvanuile 3—6 tabl. päevas, lastele vastavalt vähem.

### **Gravidan.**

Polühormoon-preparaat, saadud tervete, 3 kuud rasedate naiste värskest kusest. Sisaldab prolaani A ja B, follikuliini ja mitmesuguseid kuse koostisaineid. Amp. 1 ccm. Tarvitatakse toonikumina naistel seksuaalsüsteemi üldise haigestumise puhul (amenorrhea, klimakteerium), sugulise nõrkuse ja ergukava häirete puhul ka meestele. Nahaalusi 15—30 süstimist igapäev või ülepäeviti.

### **Haematogen.**

Värskest defibriinitud ja eetriga puhastatud loomaverest valmistatud magustatud preparaat. Roborans. 3 korda päevas 1 süpilusika täis. Ka tabletid 0,3 g.

### **Haemoferrose.**

0,4% rauda sisaldav loomaverest ja rauaoksiidhüdraadist valmistatud, magustatud ja aroomistatud punakaspruun vedelik. **H. c. Arseno:** 0,5% Fe, 0,005% As naatriumiühendina; **c. Jodo:** 0,4% Fe, 0,4% J; **c. Calce:** 0,4% Fe, 1,1% Calc. 0,004%  $As_2O_3$ , 1,1% Calc. glyceroph. Kehvveresuse ja üldise nõrkuse puhul. 3 korda päevas 1 supilusika täis.

### **Hepalon.**

Standarditud maksaekstrakt (vastab Camponon'ile). Amp. 1 ccm. Tarvitatakse süstimiseks muskulisese pahaloomulise kehvveresuse puhul 1—2 ccm päevas, andes samaaegselt seespidiselt lahjendatud soolhapet. Hepalon annab tulemusi ka hepatiidi, maksa tsirroosi, atroofiliste gastriitide, rasedate intoksikooside jne. puhul.

### **Heparex.**

Erilisel menetsel valmistatud maksaekstrakt. 1 g = 10 g värsket maksa. Kehvveresuse puhul. 3—4 korda päevas 40 tilka korraga.

### **Hepatocrin.**

Vedel maksapreparaat, mille 30,0 = 250,0 värsket maksa. Tarvitatakse pahaloomulise kehvveresuse raviks, 30,0 päevas.

### **Hexenal.**

(Evipan-Natrium). Valge kristalne pulber nõrga mõru maiguga, kergesti lahustub vees. Öhu käes laguneb süsihappe toimel. Tarvitatakse 15—40 minutit kestva narkoosi tekitamiseks süstimisel aeglaselt veenisese 10% lahusega 3—10 ccm korraga. Sünnitusvalude tuimastamiseks klistiirina 1—2,5 g veega.

### **Hexin.**

Urotropinum sulfosalicylicum. Tabl. 0,5 g.

Valge, hapu maiguga kristalne pulber, lahustub vees. Põieantiseptikum. 3—6 korda päevas 1 g veega peale sööki.

### **Hexylresorcin.**

Dioksuheksüülbensool. Valge või vähe roosakas kristalne pulber või lehtjad kristallid, mis õhu käes muutuvad roosaks. St. 67—69°. Lahustub alkoholis ja eetris, raskesti lahustub vees. Anthelminthicum askariidide ja ankülostoma raviks. Glutiniseeritud või kõvades želatiinkapsleis või pillides täiskasvanuile 1—1,5 g, lastele kuni 10 a. iga aasta kohta 0,1 g ühekorraga üheks raviks. Ravi võib korrata 15—20 päeva pärast.

### **Hypersol.**

Inimese vereplasmas sisalduvate anorgaaniliste soolade segu tablettides ja lahusena. *Natr. chlorati* 5, *Natr. sulfuric.* 1, *Natr. phosphoric. bibasic.* 0,5, *Natr. bicarbonic.* 0,4, *Kal. chlorati* 0,35. 2 tabletti vastavad 1 supilusika täie hypersooli normaal-lahusele, kui eespool antud hulk lahustatakse 100 g vees. Tarvitatakse vere reaktsiooni leelisemaks muutmiseks arterioskleroosi ja erguhaiguste puhul, mis sõltuvad üliväsimusest või ainevahetusehäireist või nakkushaiguste järelalusena. Tarvitatakse 2 korda päevas 2 tabletti enne sööki, 2—3 kuud järgimööda, siis pidada vahet 6 kuud. Tarvitamiseks lahustatakse tabletid veerand klaasis keedetud vees.

### **Insulin.**

Pankreasnäärmest valmistatud hormoonpreparaat. Pud. 5 ccm, 1 ccm = 20 rahvusvah. üh. Suhkruhaiguse puhul nahaalusi või veenisisesi.

### **Isaphenin.**

Diatsetüüldioksüfenüülsatiin (*Isacen*). Valge, lõhnatu, maiguta pulber, vees ei lahustu. Lahtis-

taja spetsiifilise jämesoole toimega. Annus täiskasvanuile 0,1—0,02 g, lastele 0,0025—0,005 g päevas.

### **Jod-Hypersol.**

Natr. chlorati 5, Natr. sulfuric. 1, Natr. phosphoric. bibasic. 0,5, Natr. jodati 0,25, Natr. bicarbonici 0,4, Kalii chlorati 0,35. Tarvitatakse arterioskleroosi ravimiseks, millistes organeis see ka ei esineks, samuti haiguste puhul, mis seotud vere atsidoosiga. Eelistatuna tavalise hüpersolile määratakse veresoontelupjumise, süüfilise, kollatõve, lümfinäärmete põletike, kroonilise reuma, bronhiaalastma, Basedovi haiguse, klimakteeriumi, hüpertooniat ning elavhõbeda- ja tinamürgistuste puhul. Profülaktiliselt arterioskleroosi ärahoidmiseks. Seepidiselt 1 lusika täis veerand klaasi keedetud ja jahtunud veega enne sööki 2—3 korda päevas 3—4 kuu vältel.

### **Jodognost.**

Tetrajoodefenoolftaleiin-naatriumi 16% vesilahus (vastab Jodtetragnost'ile). Tarvitatakse seepidiselt koletsüstograafias.

### **Jodolipol.**

Jodeeritud õli (30% J). Ampullid 10 ccm. Bronhoskoopiaaks, emaka ja selgrookanali röntgenograafiaaks.

### **Kaskar-Agar.**

Agar-agari 47,0 Extr. Cascar. sagrad. sicc. examarat. 3,0. Lahtistav vahend. 1—3 korda päevas 1 teelusika täis või öhtuti 1—2 teelusika täit.

### **Klimaktodin.**

Ovar. siccata. 0,03 g, Thyreoid. sicc. 0,006 g, Bromurali 0,15 g, Calcium-Diuretini 0,15 g. Tabl. 0,5 g. Klimakteeriliste vaevuste puhul 3 korda päevas 1 tablett.

### **Kola tabletid.**

Nucis Colae 0,5 g tabletis. **Kola tabl. c. Lecithino:** Nuc. Colae 0,5 g, Lecithini 0,05 g. Neuras-teenia, asteenia, vaiml. ja füüsiline liigväsimum, närvilised depressiivseisundid, taastoibumine. 3—6 tabletti päevas.

### **Lactocalc.**

Calc. lactic. 0,25, Calc. phosphoric. 0,01 g. Tabl. 2,5 g. Toidulisana imikuile, ravitoiduna kunstlikult toidetavaile imikuile toitumushäirete puhul. Tarvitatakse erieeskirjade järgi, mis igale pakendile lisatud.

### **Laxo pillid nr. 1.**

Podophyllini, Extr. Rhei comp. aa 0,01 g, Aloes 0,05 g, Cort. Frangulae 0,025 igas tabletis. Vegetabiilne lahtistaja. Hommikul ja õhtul üks tablett.

### **Laxo pillid nr. 2.**

Extr. Belladonnae 0,005 g, Podophyllini, Saponis medicati aa 0,015 g, Aloes 0,05 g, Cort. Frangulae 0,025 g igas tabletis. Vegetabiilne lah-  
tistaja. Hommikul ja õhtul üks tablett.

### **Lienol.**

Põrnast valmistatud organopreparaat. Vedelik ja amp. 1 ccm. Põrna hüpertroofia, kroonilise malaaria ja soolte kroonilise atoonia puhul. Seespidiselt 30—40 tilka 3 korda päevas enne sööki, nahaalusi 0,5—1 ccm arsti määramisel.

### **Lipocerebrin.**

Preparaat veiseaju lipoididest (vastab Lipa-tren'ile). Ampullid ja tabletid. Paralysis progres-siva, tuberkuloosi, neurasteenia puhul seespidi-selt 3 korda päevas 1 tablett, muskklisisesi 2 ccm 10% emulsioonina.

### **Malyl.**

Diallülbarbituurhape (Dial). Hypnoticum, toi-

mib veronaalist tugevamini. 3 korda päevas 0,05—0,3 g korruga.

### **Mammin.**

Piimäärmeist valmistatud preparaat. Tabl. 0,3 g ja vedelik. Tarvitatakse emaka verejooksude, müoomide, fibromüoomide, menorrhagia ja piimapuuduse puhul. 2—3 korda päevas 1 tablett või 25—40 tilka korruga.

### **Manol.**

Türgipipratinktuur kampri, punase sandlipuu, salitsüülhappe, metüülsalitsülaadi, sinepi- ja teiste eeterlike õlide ning seebi lisandiga. Antirheumaticum sissehõõrumiseks.

### **Mercusal.**

Elavhõbedaatsetaadi ja allüülamiid-naatrium-salitsülaadi kompleksühend (Salyrgan). Valge kristalne pulber, lahustuv vees ja alkoholis. 10% lahus ampullides 1 ja 2 ccm. Tarvitatakse luesi, astsiidi, hingeldamise, kopsuhaiguste, korduva kopsupõletiku ja ödeemi puhul tugeva diureetikumina. Ei sobi tarvitamiseks nefriidi, raske kehveresuse ja kahheksia puhul. Veenisisesi või intragluteaalselt 0,5—1 ccm iga 2—3 päeva järel, suurendades annust kuni 2 ccm-ni korruga.

### **Migrenervin.**

Pyramidoni 0,325 g, Guaranae 0,25 g, Nuc. Colae 0,05 g, Bromurali 0,1 g, Corrigent. q. s. Pulb. 1 g. Antineuralgicum, antidolorosum. 1 pulber tarviduse korral.

### **Narcolan.**

Tribroometüülalkohol (Avertin). Rektaalseks narkoosiks 0,1 g ühe kg kehakaalu kohta.

### **Nasalgan.**

Aristoli 0,5 g, Novocaini hydrochloric. 0,2 g, Ephedrini hydrochloric. 0,15 g, Mentholi 0,08 g,

Eucalyptoli 0,1 g, Paraffini liq. 4 g, Lanolini 5 g. Nohuraviks, 1—3 korda päevas ninasse.

### **Neo-Anusol.**

Bolus albae 0,15, Tannini 0,1, Jodi puri 0,005, Resorcini 0,005, Zinc. oxydat. 0,2, Methylen. coerulei 0,003, Butyrolī q. s. ad 2,45 g. Küünlad hemorroidide vastu.

### **Novo-Ovaricrin.**

Suurte loomade munasarjast valmistatud ja puhastatud hormoon. Näidustused ja tarvitamine vt. Ovarin.

### **Olalbichtol.**

Vt. Albichtol.

### **Orchicrin.**

Seemnenäärmete ekstrakt. Tabl. 0,3 g, vedelik või amp. 1 ccm. Aphrodisiacum. 2—3 korda päevas 1—2 tabletti või 20—40 tilka või 1 amp. korraga.

### **Osarsol.**

Acidum oxyacetylamino-phenylarsinicum (Spirocid, Stovarsol). Valge kristalne pulber, raskesti lahustuv vees. Tabl. 0,25 g. Tarvitatakse seepidiselt profülaktilise ja ravivahendina luesi puhul, ja korduva tüüfuse, amööbse düsenteeria, spirohetoosi, helmintioosi, malaaria raviks. Profülaktiliselt süüfilisse nakatumise ärahoidmiseks 2—10 tundi peale võimalikku nakatumist 4 korda päevas 5 päeva järgimööda 1 tablett korraga, tehes siis 3—5 päevase vaheaja. Raviks tarvitatakse üldse 20—40 g osarsooli.

### **Ovarin (Ovaricrin).**

Suurte loomade munasarjade ekstrakt, sisaldab hormooni follikuliini. Vedelik pudeleis ja tabl. 0,3 g. Tarvitatakse munasarjade arenematus, infantilismi, menstruatsioonikorratuste, klimakteeriliste vaevuste jne. puhul. 30—40 tilka või 1—2 tabl. päevas.

### **Pain-Expeller.**

Türgipipra liit-liniment eeterlike õlide lisandiga. Antirheumaticum sissehõõrumiseks.

### **Pantocid.**

Diklooramiidsulfobensoehape (vastab Panto-sept'ile). Antiseptikum välispidiseks otstarbeks, haavade desinfitseerimiseks ja joogivee puhastamiseks. Tabletid soodaga või naatriumkloriidiga, igas tabletis 3 mg aktiivset kloori.

### **Pantocrin.**

Mõnede põdraliikide noortest, luustumata sarvedest (pantidest) valmistatud ekstrakt, vedelik pudeleis ja amp. 1 ccm. Tarvitatakse organismi üldise toonuse tõstmiseks, neurasteenia, haiglase ärritatavuse, liigväsimumuse, suguvõimetuse, vereringehäirete, seedeorganite alafunktsioonide jne. puhul. Seespidiselt 2 korda päevas pool tundi enne sööki 30—45 tilka veega, süstimiseks nahaalusi või muskklisisi 1 ccm korraga.

### **Pastalbin.**

Vt. Albichtol.

### **Pectorol.**

Extr. Thymi fluid. 1 g, Elix. Paregoric. 10 g, Spir. vini 40 g, Ol. Anisi, Ol. Eucalypti aa 0,1 g, Extr. Liquirit. sicc. 0,5 g. Köharavim. 3—4 korda päevas 25—35 tilka.

### **Pepsin-Acid.**

(Acidol-Pepsin). Betaini hydrochlorici 0,5 g, Pepsini 0,1 g. Iga tablett vastab 8 tilga lahjendatud soolhappele. Maotegevuse häirete puhul.

### **Peroxy tabletid.**

Hyperoli 50 g (Hyperol =  $H_2O_2$  ja karbamiidi ühend, ca. 35%  $H_2O_2$ ), Mentholi 0,5 g, Amyli ad 56 g. Tabl. 0,3 g. Suu- ja kurguhaiguste puhul vesinikuülihapendi asendajana. 1—2 tabletti poole klaasi vega loputamiseks ja kuristamiseks.

### **Peroxyi vannid.**

Natr. peroxydat. 50 g, Natr. pyroboric. 100 g, Kal. hypermangan. q. s. Hapnikku eritava vanni valmistamiseks. Tarvitatakse erieeskirja järgi.

### **Phenopurgen.**

Phenolphthaleini 0,1 g, Sacchari, Cacao q. s. Tabletid. Lahtistava vahendina 1—3 tabletti öhtul.

### **Phospharsin.**

Phospharsin I: Natr. glycerophosphoric. 0,1 g, Natr. monomethylarsenicici 0,05 g, Strychnini nitrici 0,0005 g, Aq. bidestillat. ad 1,0. Phospharsin II: Samu aineid vastavalt 0,15 g, 0,075 g, 0,00075 g ad 1,0. Amp. 1 ccm. Nõrkus, taastoibumine, tbc, neurasteenia, funktsionaalne impotents, vaimline ja kehaline liigväsimumus, kehveresus. Üheks raviks süstitakse nahaalusi 10 korda 1 ccm Ph. I 1 või 2 päevaste vaheaegadega, siis 10 süstet Ph. II, 1—2 päevaste vaheaegadega ja siis jälle 10 süstet Ph. I.

### **Phytoferrolactol.**

Phytini 0,2 g, Ferri lactici 0,2 g. Tabl. Kehveresus, neurasteenia. 1—3 tabletti päevas peale sööki.

### **Phytoglyceroferrol.**

Phytini 0,25 g, Ferri glycerophosphorici 0,15 g. Tabl. Nõrkus, taastoibumine, neurasteenia, kehveresus. 1—3 tabletti päevas peale sööki.

### **Pituitrin (Pituicrin).**

Pituitrin A. Ajuripatsi esisagara ekstrakt. Ampullides 1 ccm. Tarvitatakse füüsilise arenematuse, infantilismi j. m. s. puhul 1—3 ccm päevas nahaalusi. Pituitrin P. Ajuripatsi tagumise sagara vedelekstrakt. Amp. 1 ccm. = 2—3 ü. Sünnitusabiiks emakalõtvuse (atoonia) puhul, verejooksu sulgemiseks, peristaltika ergu-

tamiseks seedetrakti lõtvuse korral, suhkruta liigkusesuse (diabetes insipidus) jne. juures 0,3—1 ccm korraga nahaalusi. Pituitrin T. Kogu ajuripatsi ekstrakt. Rasvumise, diabetes insipidus'e, kasvuhäirete jne. puhul nahaalusi 1—2 ccm päevas.

### **Plasmocid.**

Metoksüdietüülamiinokinoliin (Plasmochin). Oranž kristalne pulber, vees ei lahustu. Tarvitatakse malaaria puhul 0,02—0,035 g korraga 3—5 korda päevas 3 päeva, mille järele tehakse 3—4 päevane vahe. Kogu ravi koosneb 5—6 säärasest perioodist.

### **Preconsol.**

4% tragakandilima 88,5, glütseriini 10, piimhapet 1, kinosooli 0,5. Želeetaoline mass klaasitorus. Anticoncipiens.

### **Proallon.**

Pyramidonum allylisopropylbarbituricum. Tabl. 0,16 g. Analgeticum, sedativum. 1—4 tabletti päevas.

### **Prostatin.**

Prostata-näärme valmistatud preparaat, tabl. 0,3, vedelik ja amp. 1 ccm. Eesnäärme hüpertroofia ja sellest olenevate seksuaalhäirete puhul. 3—4 korda päevas 1 tablett või 20—30 tilka või 1 amp., 4—6 nädala vältel.

### **Purgen.**

Phenolphthaleini 0,1 g, Sacchari 0,15 g. Tabl. lahtistava vahendina. 1—3 tabletti öhtul.

### **Recalbin.**

Vt. Albichtol.

### **Rinol.**

Camphorae 0,094, Eucalyptoli, Mentholi aa 0,126, Trichlorbutylalcoholi 0,2, Paraffini liq. 20,0,

Alcannini q. s. Rhinitis, laryngitis, pharyngitis.  
Instillatsiooniks.

### **Saliniment.**

Methyl (või Aethyl.) salicylici 20,0, Ol. Hyoscyami 60,0, Chloroformii 20,0. Antirheumaticum sissehõõrumiseks.

### **Salophthol.**

Extr. Belladon. 0,01, Saloli 0,3, Benzonapht-holi 0,3. Tabl. seedeorganite haiguste puhul valu-vaigistamiseks.

### **Salsolin.**

Salsola Richteri'st valmistatud alkaloid. Vahend vererõhu alandamiseks healoomuliku hüpertoonia puhul. Tunduvalt vähendab liigse vererõhuga kaasuvaid sümptomeid — peavalu, raskust peas, peapööritust, väsimust jne. Seespidi-selt 0,03 g korraga 3—5 korda päevas, 8—10 päeva järgimööda. Nahaalusi 1% vesilahusena 1ccm 1—2 korda päevas.

### **Secalen.**

Ballastaineist vabastatud standarditud tungaltera vedelekstrakt. Vedelik ja amp. 1 ccm. Tarvitatakse emaka verejooksude puhul 15—25 tilka korraga või 1 ccm nahaalusi.

### **Sergosin.**

Natrium monojodmethansulfonicum (Abrodil). Valge, kristalne pulber, kergesti lahustuv vees. 52% J. Tarvitatakse kliismana või veenisisesi kuni 20 g korraga, 20—30% lahusena kontrastvahendina.

### **Sovcain.**

Dietüülamiinoetüülamiid - butoksütsinhoniin-happe kloorhüdraat. (Analoogne Percain'ile). Anesteetikum lokaal- ja selgrooüdi anesteesiaks. Lokaalanesteetikumina 0,3—1,0 ccm, 1% lahu-

sena. Suurim annus 0,004 g/kg. Ampullides 0,5%—2 ccm ja 1%—1 ccm.

### **Spermin (Spermocrin, Spermol).**

Sarvloomade testes-ekstrakt. Vedelik, tabletid 0,05 ja amp. 1 ccm. Südame tegevust ja ergustiku toniseeriv vahend neurasteenia, arterioskleroosi, kehvveresuse, suguvõimetuse, taastoibumise, üldise ja vanadusnõrkuse puhul. Tarvitakse 20—40 tilka või 1—2 tabletti enne sööki või 1—2 ccm nahaalusi päevas, 4—6 nädala jooksul.

### **Streptocid album.**

Sulfaniilhappe amiid (Prontosil album). Valge kristalne pulber, vees lahustub kuni 0,8%. Gonokokkide, meningokokkide ning streptokokkide infektsioonide puhul. 3 korda päevas 0,3 g korraga.

### **Streptocid rubrum.**

Sulfoonamiidodiamiinoasobensoolkloorhüdraat (Prontosil, Septosan). Punane, vees raskesti (kuni 0,25%) lahustuv pulber. Tarvitatakse streptokokkide infektsioonide puhul: roos, sünnitusjärgsed infektsioonid, lapsevoodipalavik, veremürgitus, tonsillitis, angina, laryngitis phlegmosa jne. Mitu korda päevas 0,3 g korraga seespidiselt, või veenisisesi 20 ccm 0,25% lahust 2—3 korda päevas.

### **Streptyl.**

P-amiinofenüülsulfoonamiid. Tabl. 0,4 g. Kemoterapeutikum strepto-, stafülo ja meningokokkide ning bact. coli nakkuste puhul: erysipelas, angina, cystitis, pyelitis, sepsis post partum et post abortum, meningitis, polyarthritits jne. 3 korda päevas 1—2 tabletti peale sööki veega.

### **Sulfazol.**

Para-amiinobensool-sulfamiidometüülthiasool. Valge või vähe kollakas, lõhnata ja maiguta,

kristalne pulber. Väga vähe lahustub vees (1:2000) ja alkoholis, kergesti lahustub lahjendatud leelistes ja lahjendatud mineraalhapetes. St. 235—240°. Toimib analoogselt sulfidiinile, olles viimasest paremini talutav ja andes vähem kõrvalnähte. Tarvitatakse krupoose pneumonia, meningiidi ja eriti gonorrhöa puhul, samuti bronhopneumonia ja stafülokkide-sepsise puhul, samades annustes, nagu sulfidiini.

### **Sulfidin.**

P-amiinobensoolsulfoonamiidopüridiin (Sulfo-pyridin). Asendab Albucid'i ja Uliron'i. Valge, kristalne, lõhnata pulber, vees väga vähe lahustuv (1 : 1000), kergesti lahustuv leelistes. Tarvitatakse pneumo-, meningo-, strepto-, stafülo- ja gonokokkide infektsioonide raviks (pneumonia crouposa, laste bronhopneumonia, meningitis cerebrospinalis, gonorrhoea, blenorrhoea, düsenteeria jne.). Toimivam ja mürgitum kui Streptocid album. Tarvitatakse 0,5 g korraga võrdsete vaheaegadega. Pneumonia crouposa puhul ravi kestab 5—6 päeva, millise aja jooksul antakse 21—22 g sulfidiini. Gonorrhoea raviks antakse kahel esimesel päeval à 4 g, järgmisel kolmel päeval à 3 g, üldse 17 g kogu ravi aja kohta. Sulfidiin-ravi ajal tuleb hoiduda väävelpreparaatide tarvitamisest sulfhemoglobiini tekkimise vältimiseks.

### **Sulfolan.**

Kollakas salv, analoogne Catamin'ile. Sisaldab 5% kolloidväävlit, 10% tsinkoksüüdi ja 85% lanoliini. Väävliraviks sügeliste, furunkuloosi, ekseemide jne. puhul.

### **Sügelin.**

Salv, sisaldab 0,5% salitsüülhapet, 2,5% naptaliini, 2% kreoliini, 5% väävlit ja kasetõrva. Sügeliste raviks.

### **Tansal.**

Saloli 0,3, Tannalbiini 0,3. Tabl. 0,6 g. Seedeorganite haigestumise puhul kõhukinnistamiseks.

### **Terechin.**

Ol. Terebinth. bisrectific. 15%, Chinini 0,5%, Anaesthesini 0,5%, Ol. Olivar. 84%. Amp. 1 ccm. Nakkuseliste nahahaiguste, näärmepõletike, furunkuloosi, gonorrhoea jne. puhul intragluteaalselt, ärritusterapiaks, Terpichin'i asendajana.

### **Termogen.**

Cataplasma antiphlogisticum (Antiphlogistin): Bol. alb. steril. Glycerini aa 500,0, Aq. dest. 50,0, Acid. salicyl. 1,0, Acid. boric. 1,5, Tinct. Jodi 5,0, Methyl. salicyl. 1,0, Ol. Eucalypti, Ol. Menthae aa 0,5. Igasuguste põletikuliste haiguste: hingamisteede põletikkude, kurgu-, kopsu-, kopsukelme-, kõrva-, rinnanäärme-, munandite-, munasarja-, põie-, kõhukelmepõletiku, jooksja, išiaase, luupõletiku, paisete, roosi, angiina jne. puhul. Kuumade mähistena erieskirja kohaselt. Jahedate mähistena põletushaavade ja päikesepõletuse puhul.

### **Thiocain.**

Dietüülamiinoetüül - p - amiinotiobensoehappe kloorhüdraat. Lokaalanesteetikum. Kokaiinist kaks korda tugevama toimega, kuid poolteist kuni kaks korda vähem mürgine. Tarvitatakse limanahkade anesteesiaks, oftalmoloogias ja ninakurgu operatsioonide puhul, 1—2% lahusena.

### **Thymoferrol.**

Gland. Thymi sicc. 0,1, Calc. glycerophosph. 0,1, Ferri jodati 0,02, Ferr. lactic. 0,1. Tabl. 0,32 g. Üldine vaimline ja füüsiline kängujäämine, loodus ja apaatia lastel, skrofuloos, rahhiit, nõrkus, kehvveresus. 6 kuu kuni 1 aasta vanustele lastele  $\frac{1}{4}$  tabletti, 1—8 a.  $\frac{1}{2}$  tabl., üle 8 a. 1 tabl. 3—4 korda päevas piimaga.

### **Togal.**

Acid. acetylosalicyl. 71,25, Acid. citric. 1,02, Chinin. tannic. 2,65, Lith. salicylic. 10,9, Amyli 10,49. Tabl. 0,33 g. Antineuralgicum, antipyreticum, antirheumaticum. 1—3 tabletti 3 korda päevas.

### **Tonicum.**

Nuc. Colae 4 g, Cort. Cinchonae 1 g, Extr. Maltis 5 g, Calc. glycerophosph. 4 g, Natr. glycerophosph. 1 g, Extr. Strychni spir. 0,06 g, Liq. Fowleri 0,04 g, Mangani 0,02 g, Corrigent. et Sirup. ad 120 g. Tonicum. 3 korda päevas 1 teelusika täis.

### **Trichosan.**

Acid. oxyacetylaminophenylarsenicic. 0,25, Natr. bicarbonic. 0,36, Acid. tartar. 0,3, Sacchar. Lactis 0,1. Tabl. ca 1,0. Fluor vaginalis, trichomonas-kolpitis jne. 4—6 korda nädalas 1 tablett öhtuti võimalikult sügavale tuppe.

### **Triomalt.**

Nisu- ja rukkipüülist erilisel menetlusel valmistatud diastaasitud jahu, millele lisatud anorgaanilisi sooli. Sisaldab rasva 0,73%, süsivesikuid 77%, valku 10%, tselluloosi 0,21%, vett 7,85%,  $P_2O_5$  0,53%. Dieteetiline vahend imikuile ja väikelastele. Tarvitatakse erieeskirja järgi.

### **Trypasol.**

Trypaflavini 0,003 g, Borovertini 0,05 g, Mentholi 0,0002 g, Eucalyptoli 0,00005 g, massa ad tabl. 0,5 g. Kurgu ja suukoopa desinfitseerimiseks nakkushaiguste ajal ja profülaktiliselt. Iga 1—2 tunni järele 1 tablett aeglaselt suus imeda.

### **Uresan.**

Piperazinum citrosalicylicum. Tabl. 0,3 g. Antirheumaticum. 3 korda päevas 1 tablett veega.

### **Urolith.**

Piperazini 0,5 g, Lith. carbonic. 1,25 g, Natr.

phosphoric. 5 g, Urotropini 2,5 g, Acid. tartaric., Natr. bicarbonic. aa 20 g. Granulaat. Reuma, išias, hüperatsiditeet, põie-, neeru- ja sapikivid. 3—4 korda päevas 1 teelusika täis ühe klaasi veega.

### **Urosal.**

Urotropini, Saloli aa 0,3 g. Tabl. Sapipõie ja kuseteede põletikuliste haigestumiste puhul. 3 korda päevas 1—2 tabletti.

### **Verodon.**

Pyramidoni 0,3, Veronali 0,1. Tabl. 0,4 g (Barbipyrin, Veramon). Peavalu, hambavalu jts. valu- de puhul 1 tablett korraga .

### **Vitacol.**

40% kalamaksaõli-emulsioon 0,5% kaltsium- glütserofosfaadi lisandiga. Skrofuloos, rahhiit, osteomalaatsia, kehveresus, lümfadeniit. 3 korda päevas 1 supilusika täis, lastele 1 teelusika täis peale sööki.

### **Vitaderm.**

Salvi konsistentsiga parafiinmass, sisaldav karotiini õlilahust ja antiseptilisi aineid — beeta-naftooli ja eukalüptiõli. Tarvitatakse põletishaa- vade, külmumise ja raskesti paranevate haavade raviks. Enne tarvitamist soojendada 100°-ni mitte üle 5—6 minuti vältel.

### **Vitamin „C“.**

Kibuvitsamarjadest valmistatud kontsentraat, punakaspruun püdel vedelik. Pudelik 110 ccm, iga ccm sisaldab 24,28 mg askorbiinhapet (C-vitamiini). C-vitamiini puudusest tingitud haigus- ed, nagu skorbuut, imikute skorbuut (Möller- Barlov-tõbi) ja imikute preskorbuutilised seisun- did (aneemiad, düstroofiad), laste ja täiskasva- nute veritsustõbi, veresülitamine, hemorraagili- ne diatees ja eksanteemid, mineraalainevahetuse

häired, hambahaigused (paradentoos, caries, alveolaarpüorröa), hingamisteede katarrilised haigestumised, soolte autointoksikatsioonid, kevadväsimus. Vastupanuvõime tõstmiseks nakkushaiguste puhul ja varasünnituste üleskasvatamiseks. Tarvitatakse  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  teelusika täit päevas, mis vastab 20—50 mg askorbiinhappele.

### **Vitaminol.**

Antirahhiitilise D-vitamiini õlilahus, sisaldab 1 ccm-is 10 000 antirahhiitilist D-vitamiini ühikut (vastab Vigantol-õlile). Tarvitatakse rahhiidi profülaktikaks ja raviiks, kondikava kasvuhäirete, laste tetaania ja spasmofiilia, skrofuloosi, luutiisikuse, mitmesuguste nakkushaiguste jne. puhul. Profülaktiliselt imikuile ja väikelastele 2—3 tilka, vanemaile lastele 3—5 tilka päevas teelusika täie sooja piimaga. Raviannused imikuile ja väikelastele 2—10 tilka, vanemaile lastele ja täiskasvanuile 5—15 tilka päevas piimaga.

### **Vivomalt.**

Sisaldab linnaste, piima, kanamunade vääruslikke koostisaineid vähese kakao lisandiga. Pruun sõmer pulber, sisaldab suhkruid (arvutatud maltoosina) 46%, valku 14%, rasva 8,5%, tuhka 2,5%, niiskust 6%, dekstriini, tärklist ja muid 23%. Jõutoiduna taastoibumisel ja igasuguste nõrkusseisundite puhul mitu korda päevas. 2—3 teelusika täit klaasitäie leige piimaga.

### **Ära köhi.**

Sirupus Thymi compositus: 1% Extr. Thymi, 0,04% Ol. Anisi, Foeniculi, Eucalypti ja Serpylli. Köha ja hingamisteede haiguste puhul 3 korda päevas 1—2 teelusika täit.

## STANDARD-RETSEPTIDE EESKIRJAD.

Tähekesega märgitud retseptid allpool toodud nimestikus sisaldavad aineid, milledega varustamises võib tekkida aeg-ajalt vahesid ja millised võivad ajuti apteekides puududa. Neid retsepte tuleb välja kirjutada vaid äärmise vajaduse korral.

### Pulbrid, tabletid, pillid.

1. Acrichini 0,1  
Dtd. nr. VI—XII
- \* 2. Antipyrini 0,5  
Dtd. nr. VI—XII
3. Aspirini 0,3  
Dtd. nr. VI—XII
4. Aspirini 0,5  
Dtd. nr. VI—XII
- \* 5. Aspirini 0,25  
Coffeino-Natr. benzoici 0,05  
Dtd. nr. VI—XII
- \* 6. Aspirini 0,3  
Coffeino-Natr. benzoici 0,1  
Dtd. nr. VI—XII
- \* 7. Aspirini 0,3  
Coffeino-Natr. benzoici 0,2  
Dtd. nr. VI—XII
- \* 8. Aspirini 0,5  
Coffeino-Natr. benzoici 0,1  
Dtd. nr. VI—XII

- \* 9. Aspirini 0,5  
Coffeino-Natr. benzoici 0,2  
Dtd. nr. VI—XII
- \* 10. Aspirini  
Phenacetini aa 0,25  
Coffeino-Natr. benzoici 0,1  
Codein. phosph. 0,015  
Dtd. nr. VI—XII
- \* 11. Aspirini  
Phenacetini aa 0,3  
Coffeino-Natr. benzoici 0,1  
Dtd. nr. VI—XII
- 12. Aspirini 0,3  
Antifebrini 0,1  
Coffeini puri 0,03  
Dtd. nr. VI—XII
- \* 13. Atophani 0,5  
Natr. bicarbonic. 0,5  
Dtd. nr. VI—XII
- \* 14. Barbipyrini 0,4  
Dtd. nr. VI—XII
- 15. Benzonaphtoli 0,5  
Dtd. nr. VI—XII
- 16. Benzonaphtoli 0,25  
Extr. Belladonnae 0,015  
Dtd. nr. VI—XII
- 17. Benzonaphtoli 0,5  
Extr. Belladonnae 0,015  
Dtd. nr. VI—XII
- 18. Benzonaphtoli  
Saloli aa 0,3  
Dtd. nr. VI—XII
- 19. Benzonaphtoli  
Saloli aa 0,5  
Dtd. nr. VI—XII

20. Benzonaphtoli  
Saloli aa 0,25  
Extr. Belladonnae 0,015  
Dtd. nr. VI—XII
21. Benzonaphtoli  
Saloli aa 0,5  
Extr. Belladonnae 0,015  
Dtd. nr. VI—XII
- \* 22. Bismuti subnitrici 0,5  
Dtd. nr. VI—XII
- \* 23. Bismuti subnitrici 0,5  
Tannalbini 0,2  
Opii plv. 0,01  
Dtd. nr. VI
- \* 24. Bismuti subnitrici 0,5  
Extr. Belladonnae 0,015  
Dtd. nr. VI—XII
- \* 25. Bismuti subnitrici  
Saloli aa 0,5  
Dtd. nr. VI—XII
- \* 26. Bismuti subnitrici  
Saloli aa 0,25  
Extr. Belladonnae 0,015  
Dtd. nr. VI—XII
- \* 27. Bismuti subnitrici  
Saloli aa 0,5  
Extr. Belladonnae 0,015  
Dtd. nr. VI—XII
- \* 28. Bromurali 0,3—0,5  
Dtd. nr. X
- \* 29. Calcii glycerophosphorici 0,5  
Dtd. nr. XII—XXIV
- \* 30. Calcii glycerophosphorici  
Ferri glycerophosphorici aa 0,3—0,5  
Dtd. nr. XII—XXIV

- \* 31. Calcii glycerophosphorici  
Phytini aa 0,3  
Dtd. nr. VI—XII
- 32. Carbo medic. 0,3—0,5  
Dtd. nr. X
- \* 33. Chinin. hydrochl. 0,3  
Dtd. nr. VI
- 34. Codeini 0,01  
Natrii bicarbonici 0,25  
Dtd. nr. VI—XII
- 35. Codeini 0,015  
Natrii bicarbonici 0,25  
Dtd. nr. VI—XII
- 36. Codeini phosphorici 0,015  
Natrii bicarbonici 0,25  
Dtd. nr. VI—XII
- 37. Codeini 0,01  
Sacchari albi 0,25  
Dtd. nr. VI—XII
- 38. Codeini 0,015  
Sacchari albi 0,25  
Dtd. nr. VI—XII
- 39. Codeini phosphorici 0,015  
Sacchari albi 0,25  
Dtd. nr. VI—XII
- 40. Codeini 0,015  
Natrii bicarbonici  
Terpini hydrati aa 0,25  
Dtd. nr. VI—XII
- 41. Codeini 0,015  
Terpini hydrati 0,3  
Dtd. nr. VI—XII
- \* 42. Codeini 0,015  
Thiocoli 0,3  
Dtd. nr. VI—XII

- \* 43. Codeini 0,015  
Thiocoli 0,5  
Dtd. nr. VI—XII
- 44. Coffeino-Natr. benzoici 0,2  
Dtd. nr. VI—XII
- 45. Diali 0,1  
Dtd. nr. VI—XII
- 46. Diuretini 0,5  
Dtd. nr. VI—XII
- \* 47. Diuretini 0,3  
Luminali 0,03  
Dtd. nr. VI—XII
- \* 48. Diuretini 0,3  
Luminali 0,03  
Papaverini 0,02  
Dtd. nr. VI—XII
- \* 49. Diuretini 0,5  
Luminali 0,05  
Papaverini 0,03  
Dtd. nr. VI—XII
- \* 50. Euchinini 0,1—0,3  
Dtd. nr. VI
- 51. Extr. Belladonnae 0,015  
Natrii bicarbonici 0,25  
Dtd. nr. VI—XII
- 52. Ferri lactici 0,25  
Dtd. nr. XII
- 53. Ferri glycerophosporici  
Phytini aa 0,25  
Dtd. nr. XII—XXIV
- 54. Luminali  
Sacchari albi 0,25  
Dtd. nr. VI—XII

55. Luminali 0,03  
Sacchari albi 0,25  
Dtd. nr. VI—XII
56. Luminali 0,05  
Sacchari albi 0,25  
Dtd. nr. VI—XII
57. Luminali 0,1  
Sacchari albi 0,25  
Dtd. nr. VI—XII
58. Medinali 0,3—0,5  
Dtd. nr. VI—XII
59. Natrii bicarbonici  
Natrii biborici  
Natrii chlorati aa 10,0
60. Natrii bicarbonici  
Natrii biborici  
Natrii chlorati aa 20,0  
Ol. Menthae gtt. VIII
- \* 61. Natr. bromat. 0,6  
Kal. bromat. 0,4  
Ammon. bromat. 0,4  
Dtd. nr. VI—XII
- \* 62. Natrii salicylici 0,5  
Dtd. nr. VI—XII
- \* 63. Natrii salicylici 0,5  
Coffeino-Natr. benzoici 0,1  
Dtd. nr. VI—XII
- \* 64. Natrii salicylici 0,3  
Coffeino-Natr. benzoici 0,1  
Dtd. nr. VI—XII
- \* 65. Natrii salicylici 0,5  
Coffeino-Natr. benzoici 0,2  
Dtd. nr. VI—XII

66. Osarsoli 0,25  
Dtd. nr. VI—XII
67. Pancreatini 0,3—0,5  
Dtd. nr. XII—XXIV
- \* 68. Phenacetini 0,3—0,5  
Dtd. nr. VI—XII
- \* 69. Phenacetini 0,3  
Coffeino-Natr. benzoici 0,1  
Dtd. nr. VI—XII
- \* 70. Phenacetini 0,3  
Coffeino-Natr. benzoici 0,2  
Dtd. nr. VI—XII
71. Phytini 0,25  
Dtd. nr. XL
72. Pulv. Doveri 0,3  
Dtd. nr. VI—XII
73. Pulv. Doveri  
Natrii bicarbonici aa 0,25  
Dtd. nr. VI—XII
74. Pulv. Doveri  
Natr. bicarbon. aa 0,3  
Codein. phosphoric. 0,015  
Dtd. nr. VI
- \* 75. Pyramidoni 0,3  
Dtd. nr. VI
- \* 76. Pyramidoni 0,25  
Coffeino-Natr. benzoici 0,05  
Dtd. nr. VI
- \* 77. Pyramidoni 0,3  
Coffeino-Natr. benzoici 0,1  
Dtd. nr. VI—XII
- \* 78. Pyramidoni  
Phenacetini aa 0,3  
Coffeino-Natr. benzoici 0,1  
Dtd. nr. VI

- \* 79. Pyramidoni  
Phenacetini aa 0,3  
Coff.-Natr. benz. 0,1  
Codein. phosp. 0,015  
Dtd. nr. VI
  
- \* 80. Pyramidoni  
Antipyrini aa 0,3  
Coffein. pur. 0,1  
Codein. phosp. 0,02  
Dtd. nr. VI
  
- \* 81. Rhiz. Rhei 0,5  
Dtd. nr. VI—XII
  
- \* 82. Salipyrini 0,5  
Dtd. nr. VI—XII
  
- 83. Saloli 0,3—0,5  
Dtd. nr. VI—XII
  
- 84. Saloli 0,3  
Extr. Belladonnae 0,015  
Dtd. nr. VI—XII
  
- 85. Saloli 0,5  
Extr. Belladonnae 0,015  
Dtd. nr. VI—XII
  
- 86. Saloli  
Urotropini aa 0,3  
Dtd. nr. VI—XII
  
- 87. Saloli  
Urotropini aa 0,5  
Dtd. nr. VI—XII
  
- 88. Saloli  
Urotropini aa 0,3  
Extr. Belladonnae 0,015  
Dtd. nr. VI—XII

89. Saloli  
Urotropini aa 0,5  
Extr. Belladonnae 0,015  
Dtd. nr. VI—XII
90. Santonini 0,01  
Sacchari albi 0,25  
Dtd. nr. IX
91. Santonini 0,015  
Sacchari albi 0,25  
Dtd. nr. IX
92. Santonini 0,02  
Sacchari albi 0,25  
Dtd. nr. IX
93. Santonini 0,03  
Sacchari albi 0,25  
Dtd. nr. IX
94. Santonini 0,04  
Sacchari albi 0,25  
Dtd. nr. IX
95. Santonini 0,05  
Sacchari albi 0,25  
Dtd. nr. IX
96. Santonini 0,06  
Sacchari albi 0,25  
Dtd. nr. IX
97. Santonini 0,1  
Sacchari albi 0,25  
Dtd. nr. IX
98. Stib. sulfurat. aur. 0,03  
Natr. bicarbon. 0,3  
Pulv. Doveri 0,2  
Elaeosacchar. Anis. 0,2  
Dtd. nr. VI—XII
99. Streptocidi albi 0,3  
Dtd. nr. VI—XII—XXIV

100. Streptocidi rubri 0,3  
Dtd. nr. VI—XII
- \* 101. Tannalbini  
Bismuti subnitrici aa 0,25  
Dtd. nr. VI—XII
- \* 102. Tannalbini  
Bismuti subnitrici aa 0,5  
Extr. Belladonnae 0,015  
Dtd. nr. VI—XII
103. Terpinhydrati 0,25  
Natr. bicarbonic. 0,2  
Rad. Liquirit. plv. 0,1  
Dtd. nr. VI—XII
104. Urotropini 0,5  
Dtd. nr. VI—XII
- \* 105. Urotropini 0,25  
Coffeino-Natr. benzoici 0,05  
Dtd. nr. VI—XII
- \* 106. Urotropini 0,3  
Coffeino-Natr. benzoici 0,1  
Dtd. nr. VI—XII
- \* 107. Urotropini 0,5  
Coffeino-Natr. benzoici 0,1  
Dtd. nr. VI—XII
- \* 108. Urotropini 0,5  
Coffeino-Natr. benzoici 0,2  
Dtd. nr. VI—XII
109. Urotropini 0,5  
Extr. Belladonnae 0,015  
Dtd. nr. VI—XII
- \* 110. Veronali 0,3—0,5  
Dtd. nr. VI—XII
111. Zinci sulfurici  
Aluminis aa 50,0

112. Pil. asiaticarum  
Dtd. nr. LX
113. Pil. Blaudi  
Dtd. nr. LX
114. Pil. Blaudi c. Ac. arsenicoso  
Dtd. nr. LX

**Vedelad ravimid seespideks tarvitamiseks.**

115. Adonileni 15,0
116. Diginormi 15,0
117. Gitaleni 15,0
118. Extr. Polygoni hydropiperis 15,0
119. Extr. Secalis cornuti fluidi 10,0
120. Inf. Ipecacuanhae ex 0,5—200,0  
Liq. Ammonii anisati  
Natrii bicarbonici aa 4,0
- \* 121. Sol. Calcii chlorati 5% 200,0
- \* 122. Sol. Calcii chlorati 10% 200,0
123. Sol. Codeini phosphorici 2% 10,0
- \* 124. Sol. Coffeino-Natr. benzoici (salicylici)  
10%—10,0
125. Sol. Ephedrini hydrochlorici 5%—10,0
126. Sol. Kalii jodati 3% 200,0
127. T-rae Belladonnae 10,0
128. T-rae Cannabis indicae 10,0
129. T-rae Opii 5,0
130. T-rae Strophanthi 10,0
131. T-rae Strychni 10,0
132. T-rae Valerianae aethereae 10,0  
Camphorae 1,0
133. T-rae Valerianae simpl. 10,0  
Camphorae 1,0

134. T-rae Valerianae simpl. 10,0  
T-rae Strychni 5,0
- \* 135. T-rae Valerianae aethereae 10,0  
T-rae Strophanthi 5,0
- \* 136. T-rae Valerianae simpl. 10,0  
T-rae Strophanthi 5,0
137. T-rae Valerianae aethereae  
T-rae Convallariae majalis aa 7,5
138. T-rae Valerianae simpl.  
T-rae Convallariae majalis aa 7,5

**Vedelad ravimid välispidiseks tarvitamiseks.**

139. Acidi borici 0,5  
Spiritus vini 10,0
- \* 140. Acidi salicylici  
Acidi lactici aa 10,0  
Collodii 10,0
141. Glycerini boraxati 20% 20,0
142. Glycerini puri 30,0  
Ichthyoli 3,0
143. Glycerini puri 50,0  
Ichthyoli 5,0
144. Glycerini carbolisati 3% 10,0
145. Glycerini carbolisati 5% 10,0
146. Ol. Hyoscyami  
Chloroformii  
Aethylii salicylici aa 10,0
147. Ol. Hyoscyami 20,0  
Chloroformii 10,0
148. Ol. Mentholi 1% 10,0
149. Ol. Mentholi 2% 10,0
150. Sol. Hydrargyri cyanati 1 : 5000 200,0
151. Sol. Hydrargyri cyanati 1 : 6000 200,0

152. Sol. Hydrargyri cyanati 1 : 8000 200,0  
 153. Sol. Hydrargyri oxycyanati 1 : 5000 200,0  
 154. Sol. Hydrargyri oxycyanati 1 : 6000 200,0  
 155. Sol. Hydrargyri oxycyanati 1 : 8000 200,0  
 156. Sol. Protargoli 1% 10,0  
 157. Sol. Protargoli 2% 10,0  
 158. Sol. Rivanoli 1 : 1000 10,0—50,0—100,0  
 159. Sol. Zinci sulfurici 0,025 : 10,0  
 160. Sol. Zinci sulfurici 0,025 : 10,0  
 Acidi borici 0,2  
 161. Sol. Zinci sulfurici 0,05 : 10,0  
 162. Sol. Zinci sulfurici 0,05 : 10,0  
 Acidi borici 0,2  
 \* 163. Spiritus salicylatus 1% 100,0  
 \* 164. Spiritus salicylatus 2% 50,0—100,0

**Salvid, plaastrid, suposiidid, jne.**

165. Acidi salicylici  
 Empl. Meliloti aa 5,0  
 166. Extr. Belladonnae 0,015  
 But. Cacao 1,0  
 M. f. suppos.  
 Dtd. nr. VI—XII  
 167. Ung. Hydr. praecipitati albi 10% 10,0  
 168. Ung. Hydr. praecipitati albi 2% 15,0  
 169. Ung. Hydr. praecipitati albi 5% 15,0  
 170. Ung. Hydr. oxydati flavi 1% 5,0—10,0  
 171. Ung. Hydr. oxydati flavi 2% 5,0  
 172. Ung. Ichthyoli 10% 25,0  
 173. Pastae Zinci sine Acido salicylico 25,0  
 \* 174. Acidi salicylici 2,0  
 Naphtalani 98,0  
 \* 175. Zinci oxydati  
 Naphtalani  
 Amyli Triticici aa 10,0

- \* 176. Zinci oxydati  
Amyli Triticici aa 10,0  
Sulfuris ppt. 5,0  
Naphtalani 20,0
- \* 177. Zinci oxydati  
Amyli Triticici aa 10,0  
Picis liquidae 5,0  
Naphtalani 20,0
- \* 178. Acidi borici 2,0  
Zinci oxydati  
Amyli aa 10,0  
Naphtalani 18,0
- 179. Saponis viridis 30,0  
Sulfuris ppt. 15,0  
Picis liquidae 15,0  
Naphtalani 40,0
- 180. Naphtalani 2,0  
Talci veneti 100,0
- 181. Plumbi acetici  
Sulfuris sublimati  
Ammonii chlorati aa 3,0  
Glycerini puri  
Spiritus vini aa 25,0  
Aq. destillatae 150,0

### Ampullid.

- 182. Adrenalin 1:1000 1 ccm
- 183. Aq. bidestillata 5 ja 10-ccm
- 184. Atropin. sulfuric. à 0,0005 ja 0,001 1 ccm
- \* 185. Calc. bromat. 10% 10 ccm
- \* 186. Calc. chlorat. 10% 5 ja 10 ccm
- 187. Calc. gluconic. 10% 5 ja 10 ccm
- \* 188. Chinin. dihydrochlor. 25% 2 ccm; 50%  
1 ccm
- \* 189. Coffeino-Natr. benz. 10% 1 ccm
- \* 190. " " " 20% 1 "

- \* 191. Coffeino-Natr. salicyl. 10% 1 ccm
- \* 192. " " " 20% 1 "
- \* 193. Cocain. muriat. 1% 1 ccm
- \* 194. " " 2% 1 "
- \* 195. " " 3% 1 "
- \* 196. " " 5% 1 "
- 197. Extr. Secal. cornut. 5% 1 ccm
- 198. " " " 10% 1 "
- 199. Morphinum muriat. 1% 1 ccm
- 200. " " 2% 1 "
- 201. " " 3% 1 "
- 202. Natr. chloratum 20% 10 ccm
- 203. Natr. kakodylic. 5% ja 10% 1 ccm
- 204. Novocaini 0,01 Natr. chlorati 0,05 1 ccm
- 205. Ol. camphor. 10% 1, 2 ja 5 ccm
- 206. " " 20% 1, 2 ja 5 ccm
- \* 207. Pepsini 10% 1 ccm
- \* 208. " 20% 1 "
- 209. Sacchar. uvic. 10% 10 ccm
- 210. " " 25% 20 "
- 211. " " 30% 10 "
- 212. " " 50% 5 ja 10 ccm
- 213. " " 60% 5 ja 10 "
- 214. " " 66% 10 ccm
- 215. Scopolamin. hydrobrom. 0,0003 1 ccm
- 216. Scopolamin. hydrobrom. 0,0005 1 ccm
- 217. Scopolamini hydrobrom. 0,0003  
Morph. muriat. 0,01 1 ccm
- 218. Strychn. nitr. 0,1% 1 ccm
- 219. Morph. muriat. 2% Atropin sulf. 0,1%  
1 ccm
- 220. Pantoponi 0,022  
Aq. destillat ad 1,1 ccm
- 221. Scopolamini hydrobromic. 0,0005—0,001  
Ephedrini 0,025  
Eucodali 0,02  
Aq. dest. 1,2

222. Chinin. bihydrochloric. 0,6  
Urethani 1,0  
Aq. bidestillat. 4,4
223. Natr. salicyl. 1,0  
Melubrini 1,0  
Aq. destillat. 10,0
224. Chinini 3%  
Camphor. 20%  
Eucalyptoli 10% 1 ja 2 ccm (Transpul-  
mini asemel)
225. Urotropin 40% 5 ja 10 ccm

## SISU.

Eessõna . . . . .	3
Juhised retseptide väljakirjutamise kohta arstide poolt . . . . .	5
Juhised ravimite väljakirjutamise kohta velskrite ja ämmaemandate poolt . . . .	7
Hambaarstide õigused ravimite väljakirju- tamiseks . . . . .	8
Juhend ravimite väljakirjutamise ning val- mistamise korra kohta raviasutiste aptee- kides ja ravimite väljaandmise kohta haiglate jaoskondades . . . . .	12
Juhised mürgiste ja kangetoimeliste vahen- dite säilitamise ning väljastamise kohta apteekidest . . . . .	14
Mürgiste ravimite nimestik „A“ . . . . .	19
Kangetoimeliste ravimite nimestik „B“ . . .	20
Juhised mürgiste ja kangetoimeliste ravimite kohta raviasutistes . . . . .	24
Mürgiste ja kangetoimeliste ainete suurimad annused . . . . .	27
Import-ravimite asendamisevõimalusi . . . .	33
Andmed NSVL ja ENSV ravimpreparaatide kohta . . . . .	46
Standard-retseptide eeskirjad . . . . .	77

A-12552