

**RETSEPTIDE
KOGUMIK**

EESTI RIIKLIK KIRJASTUS



A-21852

RETSEPTIDE KOGUMIK

KOOSTANUD

G. KINGISEPP, O. RAJAVEE, H. KURVITS



EESTI RIIKLIK KIRJASTUS

TALLINN 1957

N

Tartu Riikliku Ülikooli
Raamatukogu

45969

TARTU ÜLIKOO LI
RAAMATUKOGU


EESSÕNA

Käesolev retseptide kogumik on mõeldud abilisena nii menetluspraktikat sooritavatele üliõpilastele kui ka arstidele ravimite koostamisel ja väljakirjutamisel apteegist. Peale retseptide on raamatus toodud enamkasutatavate ravimite ladinakeelne nimestik ja haiguste loetelu tähestikulises järjekorras viidetega retseptidele. Käesolev retseptide kogumik ei ole mõeldud täpse ja paindumatu ravimite rakendamise eeskirjana ega taha piirata arsti vabadust haiguse iseloomule enam vastava raviskeemi koostamisel.

Koostajad on tänulikud sisuliste märkuste ja parandusettepanekute eest, mis palutakse saata Tartu Riikliku Ülikooli farmakoloogia katedrile.

Tartus 7. veebr. 1957.

Koostajad



I. KESKNÄRVISÜSTEEMI VAHENDID

Ergutavad vahendid

1. Rp.

Coffeini 0,1

Sacchari 0,3

M. f. pulvis. D. t. d. N. 6

S. 3 korda päevas 1 pulber

2. Rp.

Methylcoffeini 0,1

Sacchari 0,3

M. f. pulvis. D. t. d. N. 6

S. 3 korda päevas 1 pulber

3. Rp.

Solutionis coffeini natrio-
benzoici 10% 1,0

D. t. d. N. 6 in ampullis

S. 3 korda päevas naha
alla 1 ml

4. Rp.

Coffeini natrio-benzoici 5,0

Aquae destillatae 120,0

Sirupi simplicis ad 150,0

M. D. S. 3 korda päevas

1 supilusikatäis

5. Rp.

Pervitini 0,003

D. t. d. N. 10 in tabulettis

S. 2 korda päevas 1 tablett

6. Rp.

Phenamini 0,01

D. t. d. N. 10 in tabulettis

S. 2 korda päevas 1 tablett

7. Rp.

Phenamini 0,01
Coffeini natrio-benzoici 0,1
Sacchari 0,3
M. f. pulvis. D. t. d. N. 10
S. 2 korda päevas 1 pulber

8. Rp.

Phenatini 0,05
Sacchari 0,3
M. f. pulvis. D. t. d. N. 10
S. 2 korda päevas 1 pulber

9. Rp.

Solutionis corazoli 10% —
1,0
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. 3 korda päevas 1 ml
naha alla

10. Rp.

Cordiamini 1,0
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. 3 korda päevas 1 ml
naha alla

11. Rp.

Cordiamini 15,0
D. S. 3 korda päevas
20—25 tilka

12. Rp.

Pulveris Schizandrae chi-
nensis 0,5
D. t. d. N. 12
S. 3 korda päevas 1 pulber

13. Rp.

Tincturae Schizandrae chi-
nensis 25,0
D. S. 3 korda päevas 20—
30 tilka

14. Rp.

Solutionis strychnini nit-
rici 0,1% 1,0
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. 3 korda päevas 1 ml

15. Rp.

Strychnini nitrici 0,03
Massae pilularum q. s.
ut fiant pilulae N. 30
D. S. 3 korda päevas 1—
2 pilli

16. Rp.

Tincturae Ginsengi 50,0
D. S. 3 korda päevas 25
tilka pool tundi enne
sööki

17. Rp.

Solutionis lobelini hydrochlorici 1% 1,0
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. 2 korda päevas 0,3—0,5 ml aeglaselt (1—2 minuti jooksul) veeni

18. Rp.

Cytitoni 1,0
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. 1 ml veeni

Pärssivad vahendid

Inhalatsioon-narkootikumid

19. Rp.

Aetheris pro narcosi 100,0
D. t. d. N. 2
S. Narkoosiks

20. Rp.

Chloroformii pro narcosi 50,0
D. t. d. N. 3
S. Narkoosiks

21. Rp.

Aethylii chlorati 30,0
D. t. d. N. 3 in ampullis
S. Narkoosiks

Mitteinhalatsioon-narkootikumid

22. Rp.

Hexenali 1,0
D. t. d. N. 3 in ampullis
S. Narkoosiks veeni

23. Rp.

Aquae bidestillatae 10,0
D. t. d. N. 3 in ampullis
S. Heksenaali lahustamiseks

kuiv ampull.

24. Rp.

Barbamyli 1,0
Aquaе destillatae ad 10,0
M. f. solutio. Sterilisa
D. S. 5 ml lihasesse

R a h u s t i d

25. Rp.

Scopolamini hydrobromici
0,01
Atropini sulfurici 0,02
Aquaе destillatae ad 10,0
M. D. S. 2—3 korda päe-
vas 3—5 tilka

26. Rp.

Camphorae monobromatae
0,15
Luminali 0,05
M. f. pulvis
D. t. d. N. 10 in capsulis
gelatinosis
S. 3 korda päevas 1 kapsel

29. Rp.

Infusi radices Valerianae
5,0:150,0 (2,5:100,0)
(Natrii bromati 2,0)
(M.) D. S. 3 korda päevas
1 supilusikatäis (lastele
3—4 korda päevas 1 tee-
lusikatäis)

27. Rp.

Kalii bromati
Natrii bromati ää 2,0
Ammonii bromati 1,0
Aquaе destillatae ad 150,0
M. D. S. 3 korda päevas
1 supilusikatäis

28. Rp.

Infusi herbae Adonidis
vernalis 5,0:150,0
Natrii bromati 5,0
Codeini phosphorici 0,15
M. f. mixtura Bechterewi
D. S. 3 korda päevas 1
supilusikatäis

30. Rp.

Infusi radicis Valerianae
5,0:150,0
Adonisidi
Natrii bromati āā 5,0
Codeini phosphorici 0,15
M. D. S. 3 korda päevas
1 supilusikatäis

31. Rp.

Natrii bromati 2,0
Coffeini natrio-benzoici 1,0
Aquae destillatae 100,0
M. f. mixtura Pavlovi
D. S. 3 korda päevas 1 tee-
lusikatäis

Uinutid

32. Rp.

Barbamyli 0,3
D. t. d. N. 6
S. 1 pulber pool tundi enne
magamaheitmist

35. Rp.

Veronali 0,25 (või 0,5)
D. t. d. N. 6 in tabulettis
S. 1 tablett 1 tund enne
magamaheitmist

33. Rp.

Bromurali 0,3
D. t. d. N. 6 in tabulettis
S. 1 tablett pool tundi
enne magamaheitmist

36. Rp.

Veronali 0,3
Luminali 0,05
M. f. pulvis. D. t. d. N. 6
S. 1 pulber 1 tund enne
magamaheitmist

34. Rp.

Luminali 0,1
D. t. d. N. 6 in tabulettis
S. 1 tablett 1 tund enne
magamaheitmist

37. Rp.

Chlorali hydrati 6,0 (1,0)
Mucilaginis amyli (15,0)
Aquae destillatae āā 50,0
(ad 100,0)
M. D. S. 1—2 supilusika-
täit korruga (50 ml klis-
tiiriks lastele õhtul)

38. Rp.

Diphenini 0,1
D. t. d. N. 6 in tabulettis
S. 2—3 korda päevas 1
tablett

39. Rp.

Tropacini 0,01
D. t. d. N. 10 in tabulettis
S. 2 korda päevas 1 tablett

II. VALUVAIGISTAVAD VAHENDID

40. Rp.

Morphini hydrochlorici 0,01
D. t. d. N. 6 in tabulettis
S. 3 korda päevas 1 tablett

43. Rp.

Solutionis morphini hydro-
chlorici 1% 1,0
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. 3 korda päevas 1 ml
naha alla

41. Rp.

Morphini hydrochlorici 0,2
Aquae Amygdalae amarae
ad 10,0
M. D. S. 3 korda päevas
20 tilka

44. Rp.

Solutionis omnoponi 1%
(või 2%) — 1,0
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. 2 korda päevas 1 ml
naha alla

42. Rp.

Morphini hydrochlorici 0,2
Atropini sulfurici 0,01
Aquae destillatae ad 10,0
M. f. solutio. Sterilisa
D. S. 3 korda päevas 1 ml
naha alla

45. Rp.

Extracti Belladonnae 0,015

Extracti opii 0,02

Olei cacao 2,0

M. f. suppositorium. D. t. d. N. 6

S. 3 korda päevas 1 küünal pärasoolde

46. Rp.

Tabulettae opii N. 6

D. S. 3 korda päevas 1 tablett

47. Rp.

Opii pulverati 0,015

Sacchari 0,2

M. f. pulvis. D. t. d. N. 6

S. 2 korda päevas 1 pulber

48. Rp.

Tincturae opii simplicis 5,0

D. S. 3 korda päevas 10 tilka

49. Rp.

Tincturae opii benzoicae 10,0

D. S. 3 korda päevas 25 tilka

50. Rp.

Thecodini 0,005

Sacchari 0,3

M. f. pulvis. D. t. d. N. 6

S. 2 korda päevas 1 pulber

51. Rp.

Scopolamini hydrobromici 0,005

Thecodini 0,1

Ephedrini hydrochlorici 0,25

Aquae destillatae ad 10,0

M. f. solutio. Sterilisa

S. 1 ml korrage naha alla (enne operatsiooni)

52. Rp.

Promedoli 0,025

Sacchari 0,3

M. f. pulvis. D. t. d. N. 10

S. 3 korda päevas 1 pulber

53. Rp.

Promedoli 0,025

Tipheni 0,03

Sacchari 0,2

M. f. pulvis. D. t. d. N. 10

S. 2 korda päevas 1 pulber

54. Rp.

Solutionis promedoli 2%
— 1,0

D. t. d. N. 6 in ampullis
S. 2 korda päevas 1 ml
naha alla

55. Rp.

Tabulettae pyramidoni 0,25
D. t. d. N. 6
S. 3 korda päevas 1—2
tabletti

56. Rp.

Tabulettae verodoni
D. t. d. N. 6
S. 3 korda päevas 1 tab-
lett

57. Rp.

Pachycarpini hydrojodici
0,1
Sacchari 0,2
M. f. pulvis. D. t. d. N. 20
S. 2 korda päevas 1 pulber

58. Rp.

Analgini 0,5
D. t. d. N. 10
S. 3 korda päevas 1 pulber

59. Rp.

Solutionis proserini 0.05%
—1,0

D. t. d. N. 6 in ampullis
S. 1—2 korda päevas 1 ml
naha alla

60. Rp.

Solutionis analgini 50%—
10,0
Sterilisa
D. S. 3 korda päevas
1 ml lihasesse

61. Rp.

Aspirini 0,25 (või 0,5)
D. t. d. N. 6 in tabulettis
S. 3 korda päevas 1 tab-
lett

62. Rp.

Coffeini natrio-benzoici 0,2
Antipyrini
Phenacetini āā 0,3
M. f. pulvis. D. t. d. N. 10
S. 3 korda päevas 1 pul-
ber

63. Rp.

Codeini phosphorici 0,02
 Coffeini natrio-benzoici 0,2
 Pyramidoni
 Phenacetini āā 0,3
 M. f. pulvis. D. t. d. N. 10
 S. 3 korda päevas 1 pul-
 ber

64. Rp.

Natrii salicylici 1,0
 D. t. d. N. 30
 S. 4—10 pulbrit päevas

65. Rp.

Natrii salicylici 20,0
 Spiritus vini 96% 50,0
 Aquae destillatae ad 300,0
 M. D. S. 4—10 korda päe-
 vas 1 supilusikatäis

66. Rp.

Methylii salicylici 10,0
 Tincturae Capsici 40,0
 Spiritus camphorati 150,0
 M. D. S. Nahasse hõõru-
 miseks

67. Rp.

Solutionis natrii salicylici
 10%—100,0
 Sterilisa
 D. S. 10—20 ml veeni

68. Rp.

Salipyrini 1,0
 D. t. d. N. 20
 S. 3 korda päevas 1 pul-
 ber sisse võtta

69. Rp.

Tabulettae atophani 0,5
 D. t. d. N. 20
 S. 3 korda päevas 1 tablett

III. PERIFEERSE NÄRVISÜSTEEMI VAHENDID**Tundenärvilõpmeid ergutavad vahendid****70. Rp.**

Liquoris ammonii caustici
 10% 50,0
 D. S. Välistpidine

71. Rp.

Linimenti ammoniati 50,0
 D. S. Nahasse hõõrumi-
 seks

72. Rp.

Spiritus camphorati 50,0
D. S. Nahasse hõõrumiseks

73. Rp.

Methylii salicylici 10,0
Olei terebinthinae
Chloroformii āā 15,0
Olei camphorati 20,0
M. D. S. Nahasse hõõrumiseks

74. Rp.

Tincturae Capsici 50,0
D. S. Nahasse hõõrumiseks

75. Rp.

Spiritus formicici artificialis 80,0
D. S. Nahasse hõõrumiseks

Tundenärvilõpmeid halvavad vahendid

76. Rp.

Anaesthesini 0,3
D. t. d. N. 6 in oblatibus
S. 2 korda päevas 1 oblaati enne sööki

77. Rp.

Anaesthesini 0,1
Dermatoli 0,2
Butyri cacao q. s.
M. f. suppositorium
D. t. d. N. 10
S. 2 korda päevas 1 küünal

78. Rp.

Anaesthesini 3,0
Vasellini
Lanolini āā 15,0
M. f. unguentum
D. S. Nahale määrada

79. Rp.

Anaesthesini 5,0
Amyli Tritici 45,0
M. f. pulvis
D. S. Puistepulber

80. Rp.

Solutionis novocaini 0,25—
5,0 (10,0)

D. t. d. N. 10 in ampullis

S. Naha alla süstimiseks

81. Rp.

Solutionis novocaini 2%—
1,0

Solutionis adrenalini hydrochlorici 1:1000 gtt. I

D. t. d. N. 6 in ampullis

S. Juhteanesteesiaks

82. Rp.

Novocaini 0,5

Solutionis natrii chlorati
isotonicae 200,0

M. Sterilisa

D. S. Infiltratsioon-
anesteesiaks

83. Rp.

Solutionis cocaini hydrochlorici 5% 5,0

Solutionis adrenalini hydrochlorici 1:1000 gtt. V

M. D. S. Nina ja kurgu
tuimastamiseks

84. Rp.

Adrecaini 2,0

D. t. d. N. 10 in ampullis

S. Lokaalanesteesiaks

IV. SILMAVAHENDID

Silmaava laiendavad vahendid

85. Rp.

Atropini sulfurici 0,1 (0,01)

Aquae destillatae 10,0
(10,0)

M. D. S. Silmatilgad

(2—3 korda päevas 10—20
tilka)

86. Rp.

Atropini sulfurici 0,1
Cocaini hydrochlorici 0,1
Aquae destillatae 10,0
M. D. S. Silmatilgad

87. Rp.

Scopolamini hydrobromici
0,02
Aquae destillatae 10,0
M. D. S. Silmatilgad

88. Rp.

Platyphyllini bitartarici 0,1
Aquae destillatae 10,0
M. D. S. Silmatilgad

Silmaava ahendavad vahendid

89. Rp.

Pilocarpini hydrochlorici
0,1
Aquae destillatae 10,0
M. D. S. Silmatilgad

91. Rp.

Eserini salicylici 0,02
Aquae destillatae 10,0
M. D. S. Silmatilgad

90. Rp.

Furamoni 0,5
Aquae destillatae 10,0
M. D. S. Silmatilgad

92. Rp.

Pilocarpini hydrochlorici
0,1
Eserini salicylici 0,01
Aquae destillatae 10,0
M. D. S. Silmatilgad

Desinfitseerivad ja adstringeerivad vahendid

93. Rp.

Dionini 0,5
Aquaе destillatae 10,0
M. D. S. Silmatilgad

94. Rp.

Solutionis resorcini puri
1%—10,0
Zinci sulfurici 0,025
Acidi borici 0,25
Solutionis adrenalini hydrochlorici 0,1% gtt. X
M. D. S. Silmatilgad

95. Rp.

Xeroformii 0,5
Vaselini 10,0
M. f. unguentum
D. S. Silmasalv

96. Rp.

Penicillini crystallisati
100 000, tü
Aquaе bidestillatae 10,0
M. f. guttae
D. S. Silmatilgad

97. Rp.

Scopolamini hydrobromici
0,02
Dionini
Dicaini ää 0,05
Vaselini 10,0
M. f. unguentum
D. S. Silmasalv

98. Rp.

Xeroformii
Picis liquidae ää 3,0
Olei Ricini ad 100,0
M. f. unguentum
D. S. Višnevski salv

99. Rp.

Hydrargyri oxydati flavi
0,05
Vaselini 5,0
M. f. unguentum
D. S. Silmasalv

100. Rp.

Hydrargyri oxydati flavi
Dionini ää 0,05
Vaselini 5,0
M. f. unguentum
D. S. Silmasalv

101. Rp.

Collargoli 0,5
Vaselini 10,0
M. f. unguentum
D. S. Silmasalv

102. Rp.

Ichthyoli
Zinci oxydati āā 5,0
Vaselini
Lanolini āā 15,0
M. f. unguentum
D. S. Silmasalv

103. Rp.

Jodi puri 0,01
Olei vaselini 10,0
M. f. unguentum
D. S. Silmasalv

104. Rp.

Kalii jodati 1,0
Natrii bicarbonici 0,5
Vaselini 10,0
M. f. unguentum
D. S. Silmasalv

105. Rp.

Sulfacyli solubilis 3,0
Vaselini albi 10,0
M. f. unguentum
D. S. Silmasalv

Silmalaugude vahendid

106. Rp.

Hydrargyri praecipitati al-
bi 0,05 (0,5)
Vaselini 5,0 (50,0)
M. f. unguentum
D. S. Laugude (naha)
salv

107. Rp.

Hydrargyri cyanati 0,01
Aquae destillatae q. s.
Vaselini 10,0
M. f. unguentum
D. S. Laugude salv

108. Rp.

Noviformi 0,5
Paraffini liquidi 2,0
Vaselini 8,0
M. f. unguentum
D. S. Laugude salv

109. Rp.

Acidi salicylici 0,5
Zinci oxydati
Amyli āā 5,0
Vaselini 10,0
M. f. unguentum
D. S. Laugude (naha) salv

110. Rp.

Norsulfazoli 1,0
Vaselini 10,0
M. f. unguentum
D. S. Laugude salv

111. Rp.

Albucidi 1,0
Vaselini 10,0
M. f. unguentum
D. S. Laugude salv

112. Rp.

Penicillini 50 000 tü
Solutionis natrii chlorati
0,85% q. s.
Vaselini
Lanolini āā 5,0
M. f. unguentum
D. S. Laugude salv

113. Rp.

Olei jecoris aselli
Olei Persicorum āā 5,0
M. D. S. Laugude määri-
miseks

114 Rp.

Olei jecoris aselli 10,0
Streptocidi albi 0,3
M. D. S. Laugude määri-
miseks

115. Rp.

Zinci sulfurici 0,1
Acidi borici 0,25
Dicaini 0,05
Solutionis adrenalini hyd-
rochlorici 0,1% gtt. X
M. D. S. Silmatilgad

116. Rp.

Calcii chlorati 0,3
 Aquae destillatae 10,0
 M. D. S. Silmatilgad

117. Rp.

Cupri citrici 0,2—1,0
 Unguenti glycerini 10,0
 M. f. unguentum
 D. S. Silmasalv

V. NINA-, KURGU- JA KÖRVAVAHENDID**118. Rp.**

Protargoli 1,0
 Glycerini 5,0
 Aquae destillatae 25,0
 M. D. S. 1—2 korda päe-
 vas 3—4 tilka ninna til-
 gutada

120. Rp.

Solutionis adrenalini hydro-
 chlorici 1:1000
 Streptocidi albi ää 1,0
 Lanolini
 Paraffini liquidi ää 5,0
 M. f. unguentum
 D. S. Ninasalv

119. Rp.

Dicaini 0,05
 Mentholi 0,1
 Solutionis adrenalini hydro-
 chlorici 1:1000
 Streptocidi albi ää 1,0
 Lanolini
 Paraffini liquidi ää 5,0
 M. f. unguentum
 D. S. Ninasalv

121. Rp.

Solutionis ephedrini hydro-
 chlorici 2%—20,0
 D. S. 1—2 tilka kummas-
 segi sõõrmesse

122. Rp.

Penicillini 100 000 tü
 Vaselini 10,0
 M. f. unguentum
 D. S. Ninasalv

123. Rp.

Penicillini 100 000 tü
Aquae destillatae 10,0
M. D. S. Ninatilgad

124. Rp.

Solutionis trypaflavini 1%
—10,0
D. S. 10—15 tilka klaasi
vee kohta kuristamiseks

125. Rp.

Mentholi 1,0
Paraffini liquidi 25,0
M. D. S. Kurgu määrimi-
seks

126. Rp.

Acidi tannici 3,0
Glycerini 30,0
M. D. S. Kurgu määrimi-
seks

127. Rp.

Mentholi 1,0
Olei Eucalypti 10,0
M. D. S. 10—15 tilka
1 klaasi keeva vee koh-
ta auru sissehingami-
seks

128. Rp.

Phenoli 0,5
Glycerini 10,0
M. D. S. 2—3 tilka kõrva
tilgutada

129. Rp.

Cocaini hydrochlorici
Mentholi
Phenoli
Solutionis adrenalini hydro-
chlorici 1:1000 ää 1,0
Aquae destillatae 10,0
M. D. S. Kuulmekile tui-
masti paratsenteesi te-
gemiseks

130. Rp.

Solutionis hydrogenii per-
oxydati 3% — 50,0
D. S. 10—15 tilka soojen-
datult kõrva tilgutada

131. Rp.

Acidi borici 1,0
Spiritus vini 96% — 25,0
M. D. S. 1—2 korda päe-
vas 3—4 tilka kõrva til-
gutada

132. Rp.

Dibazoli 0,005
 Sacchari 0,3
 M. f. pulvis. D. t. d. N. 20
 S. 1—2 korda päevas
 1 pulber

133. Rp.

Jodi puri 0,03
 Kalii jodati 0,3
 Glycerini 30,0
 Olei Menthae piperitae
 gtt. III
 M. D. S. 2 korda päevas
 5 tilka

134. Rp.

Spiritus vini 5,0
 Liquoris aluminii acetici
 Aquae destillatae āā 10,0
 M. D. S. Lahusega niisu-
 tatud vatt kuulmekäiku
 asetada

135. Rp.

Solutionis furacilini spiri-
 tuosae 1:1500 — 20,0
 D. S. 1—2 korda päevas
 3—4 tilka kõrva tilgu-
 tada

VI. HINGAMISVAHENDID**Köhavastased vahendid****136. Rp.**

Tabulettae codeini 0,015
 D. t. d. N. 6
 S. 3 korda päevas 1 tab-
 lett

137. Rp.

Tabulettae codeini phos-
 phorici 0,015
 D. t. d. N. 6
 S. 3 korda päevas 1 tab-
 lett

138. Rp.

Tabulettae codeini 0,015
cum natrio bicarbonico
0,25

D. t. d. N. 6

S. 3 korda päevas 1 tab-
lett

139. Rp.

Tabulettae codeini 0,01
cum terpino hydrato et
natrio bicarbonico āā 0,25

D. t. d. N. 6

S. 3 korda päevas 1 tab-
lett

140. Rp.

Codeini phosphorici 0,4
Aquae destillatae ad 10,0

M. D. S. 3 korda päevas
10 tilka

141. Rp.

Dionini 0,01

Natrii bicarbonici 0,3

M. f. pulvis. D. t. d. N. 10

S. 3 korda päevas 1 pul-
ber

142. Rp.

Dionini 0,15

Aquae Amygdalae amarae
10,0

M. D. S. 2—3 korda päe-
vas 10—15 tilka

143. Rp.

Dionini 0,15

Aquae destillatae 135,0

Sirupi Althaeae ad 150,0

M. D. S. 3 korda päevas
1 supilusikatäis

144. Rp.

Pulveris Doveri 0,3

D. t. d. N. 6

S. 3 korda päevas 1 pul-
ber

145. Rp.

Tincturae opii benzoicae
15,0

D. S. 3 korda päevas
20—40 tilka

146. Rp.

Tabulettae paregorici

D. t. d. N. 10

S. 3 korda päevas 1 tab-
lett

147. Rp.

Tabulettae pectoli

D. t. d. N. 10

S. 2—3 korda päevas

1 tablett

Ekspektoreerivad vahendid

148. Rp.

Infusi herbae Thermopsidis 0,5:150,0 (0,2:100,0)

Liquoris ammonii anisati

Natrii benzoici āā 3,0

(āā 1,0)

(Sirupi simplicis 20,0)

M. D. S. 3 korda päevas

1 supilusikatäis (lastele

1 teelusikatäis iga nelja tunni järel)

149. Rp.

Opii pulverati 0,005

Pulveris herbae Thermopsidis 0,01

Natrii bicarbonici 0,25

M. f. pulvis. D. t. d. N. 10

S. 3 korda päevas 1 pulber

150. Rp.

Infusi radice Ipecacuanhae 0,3:135,0

Liquoris ammonii anisati 2,0

Sirupi Althaeae ad 150,0

M. D. S. 3 korda päevas

1 supilusikatäis

151. Rp.

Decocti radice Primulae 5,0:135,0 (2,0:100,0)

Liquoris ammonii anisati 2,0 (1,0)

Sirupi Althaeae ad 150,0

M. D. S. 3 korda päevas

1 supilusikatäis (lastele

1 teelusikatäis iga 4 tunni järel)

152. Rp.

Guajacoli carbonici 0,3
 D. t. d. N. 12 in capsulis
 amylaceis
 S. 3 korda päevas 1 kap-
 sel

153. Rp.

Decocti radices Senegae
 10,0:270,0
 Liquoris ammonii anisati
 5,0
 Natrii benzoici 3,0
 Sirupi Althaeae ad 300,0
 M. D. S. 3—6 korda päe-
 vas 1 supilusikatäis

154. Rp.

Kalii jodati 5,0
 Aquae destillatae ad 150,0
 M. D. S. 3 korda päevas
 1 supilusikatäis

Astmavastased vahendid**155. Rp.**

Ephedrini hydrochlorici
 0,025
 D. t. d. N. 10 in tabulettis
 S. 3—6 korda päevas
 1 tablett

156. Rp.

Ephedrini hydrochlorici
 0,025
 Coffeini natrio-benzoici 0,2
 Pyramidoni 0,3
 Luminali 0,03
 M. f. pulvis. D. t. d. N. 10
 S. 3 korda päevas 1 pul-
 ber

157. Rp.

Ephedrini hydrochlorici
0,025
Luminali 0,05
Theophyllini 0,2
Sacchari 0,3
M. f. pulvis. D. t. d. N. 10
S. 3 korda päevas 1 pul-
ber

158. Rp.

Solutionis ephedrini hyd-
rochlorici 5% — 1,0
D. t. d. N. 5 in ampullis
S. $\frac{1}{2}$ —1 ml naha alla

159. Rp.

Tabulettae theophedrini
D. t. d. N. 10
S. 3 korda päevas 1 tab-
lett

160. Rp.

Solutionis adrenalini hyd-
rochlorici 0,1% — 1,0
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. $\frac{1}{2}$ —1 ml naha alla

161. Rp.

Atropini sulfurici 0,015
Papaverini hydrochlorici
0,6
Extracti et pulveris radi-
cis Liquiritiae q. s.
ut fiant pilulae N. 30
D. S. 3 korda päevas 1 pill

162. Rp.

Neobenzinoli 0,4
D. t. d. N. 2 in ampullis
S. 0,6—0,8 ml 1 kord 2—3
nädala jooksul lihasesse

163. Rp.

Tincturae Stramonii
Tincturae Lobeliae
Tincturae opii simplicis
Liquoris ammonii anisati
āā 5,0
M. D. S. 3 korda päevas
20 tilka

164. Rp.

Antiasthmocrini 1,0
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. $\frac{1}{2}$ —1 ml naha alla

165. Rp.

Asthmatoli 50,0

D. S. 2—5 grammi põleta-
da ja inhaleerida

VII. MAO- JA SOOLEVAHENDID

Maosekretsiooni soodustavad vahendid

166. Rp.

Tincturae Absinthii 15,0
D. S. 3 korda päevas
15—25 tilka enne sööki

167. Rp.

Tincturae amarae 15,0
D. S. 3 korda päevas
15—25 tilka enne sööki

168. Rp.

Acidi hydrochlorici diluti
5,0

Tincturae Rhei amarae
spirituosae

Tincturae Chinae composi-
tae āā 10,0

M. D. S. 3 korda päevas
15—20 tilka

169. Rp.

Decocti corticis Chinae
10,0:170,0

Acidi hydrochlorici diluti
2,0

Tincturae Aurantii 5,0

Sirupi simplicis ad 200,0

M. D. S. 1 supilusikatäis
iga 2 tunni järel

Seedenõret asendavad vahendid

170. Rp.

Acidi hydrochlorici diluti
25,0
D. S. 3 korda päevas
20 tilka $\frac{1}{2}$ klaasi veega
söögi ajal või peale söö-
ki

171. Rp.

Pepsini 0,3
D. t. d. N. 15
S. 3 korda päevas 1 pul-
ber söögi ajal

172. Rp.

Pepsini 2,0
Acidi hydrochlorici diluti
5,0 (ää 2,5)
Aquae destillatae ad 150,0
M. D. S. 3 korda päevas
1 supilusikatäis peale
sööki (lastele teelusika-
täis enne sööki)

173. Rp.

Succi gastrici naturalis
150,0
D. S. 3 korda päevas
1 supilusikatäis enne
sööki

174. Rp.

Succi gastrici artificialis
250,0
D. S. 3 korda päevas 1 su-
pilusikatäis enne sööki

175. Rp.

Pancreatini 0,5 (0,2)
D. t. d. N. 20 in tabuiettis
S. 3 korda päevas 1 tab-
lett peale sööki (lastele
1 tablett 1 tund peale
sööki)

Maosekretsiooni pärssivad vahendid

176. Rp.

Tabulettae natrii bicarbonici 0,5

D. t. d. N. 20

S. 3 korda päevas 1 tablett peale sööki

177. Rp.

Tabulettae natrii bicarbonici 0,3

cum extracto Belladonnae 0,015

D. t. d. N. 6

S. 3 korda päevas 1 tablett peale sööki

178. Rp.

Magnesii oxydati 0,5

D. t. d. N. 10

S. 3—4 korda päevas 1 pulber

179. Rp.

Natrii bicarbonici

Magnesii oxydati ää 0,5

M. f. pulvis. D. t. d. N. 10

S. 3 korda päevas 1 pulber

Oksendamisvahendid

180. Rp.

Solutionis apomorphini hydrochlorici 1% — 5,0

Sterilisa

D. in vitro nigro

S. 0,5 ml naha alla

181. Rp.

Cupri sulfurici 0,5

D. t. d. N. 5

S. 1 pulber lahustada 1/2 klaasis vees ja aeglaselt ära juua

Oksendamisvastased vahendid

182. Rp.

Tabulettae aëroni 0,1
D. t. d. N. 10
S. 3 korda päevas 1 tab-
lett

183. Rp.

Aquae chloroformii 0,5%—
150,0
D. S. 3 korda päevas 1 su-
pilusikatäis

184. Rp.

Anaesthesini 0,3
D. t. d. N. 12
S. 3 korda päevas 1 pulber

185. Rp.

Tincturae Menthae piperi-
tae 25,0
D. S. 3 korda päevas
20 tilka

Sapiteket ja -voolust soodustavad vahendid

186. Rp.

Chologoni 0,25
D. t. d. N. 20 in tabulettis
S. 3 korda päevas 1 tab-
lett

187. Rp.

Atophani 0,25
Sacchari 0,3
M. f. pulvis. D. t. d. N. 12
S. 3 korda päevas 1 pul-
ber

188. Rp.

Extracti Belladonnae 0,45
Papaverini hydrochlorici
0,6
Chologoni 6,0
Massae pilularum q. s.
ut fiant pilulae N. 30
D. S. 3 korda päevas 1 pill
peale sööki

189. Rp.

Tabulettae allocholi 0,3
 D. t. d. N. 50.
 S. 3 korda päevas 1 tablett
 peale sööki

190. Rp.

Decocti floris Helichrysii
 arenarii 4,5 — 150,0
 D. S. 3 korda päevas
 $\frac{1}{2}$ teeklaasitäit

191. Rp.

Extracti stigmatis Maydis
 fluidi 10,0
 D. S. 2—3 korda päevas
 30—40 tilka enne sööki

Lahtistid**192. Rp.**

Natrii sulfurici crystalli-
 sati 50,0
 D. S. 1—2 supilusikatäit
 1 klaasitäies vees lahus-
 tada ja juua hommikul
 enne einet

194. Rp.

Salis carolini factitii 125,0
 D. S. 1 dessertlusikatäis
 lahustada $\frac{1}{2}$ klaasis vees
 ja juua hommikul enne
 einet

193. Rp.

Magnesii sulfurici crystal-
 lisati 50,0
 D. S. 1—2 supilusikatäit
 1 klaasitäies vees lahus-
 tada ja juua hommikul
 enne einet

195. Rp.

Olei Ricini 50,0
 D. S. 1—2 supilusikatäit
 korruga sisse võtta

196. Rp.

Olei Ricini 2,0
D. t. d. N. 8 in capsulis
gelatinosis elasticis
S. 8 kapslit korrage sisse
võtta

197. Rp.

Olei Ricini 20,0
Gummi arabici 10,0
Aquae destillatae 150,0
Aquae Menthae ad 200,0
M. f. emulsio
D. S. 2—3 supilusikatäit
iga tunni järel kuni toi-
meni

198. Rp.

Hydrargyri chlorati
Sacchari āā 0,3
M. f. pulvis. D. t. d. N. 5
S. 3 korda päevas 1 pulber

199. Rp.

Paraffini liquidi 50,0
D. S. Mitu korda päevas
1—2 teelusikatäit

200. Rp.

Tabulettae radiceis Rhei 0,5
D. t. d. N. 6
S. 3 korda päevas 1 tablett

201. Rp.

Phenolphthaleini 0,1
Sacchari 0,2
M. f. pulvis. D. t. d. N. 6
S. 2 korda päevas 1 pulber

202. Rp.

Purgeni 0,1
D. t. d. N. 10 in tabulettis
S. 2 korda päevas 1 tablett

203. Rp.

Folii Sennae 50,0
D. S. 1 supilusikatäis
1 tassi tee valmistami-
seks, juua õhtul

204. Rp.

Infusi Sennae compositi
30,0
D. S. Õhtul korrage sisse
võtta

205. Rp.

Extracti Aloës 1,0
 Extracti Rhei 3,0
 Extracti Belladonnae 0,45
 Massae pilularum q. s.
 ut fiant pilulae N. 30
 D. S. 1 pill hommikul ja
 õhtul

206. Rp.

Extracti Frangulae spissi
 4,0
 Pulveris radices Rhei 3,0
 Extracti Belladonnae 0,1
 Massae pilularum q. s.
 ut fiant pilulae N. 30
 D. S. 1—2 pilli õhtul

207. Rp.

Extracti Frangulae 0,2
 D. t. d. N. 50 in tabulettis
 S. 1 tablett päevas

208. Rp.

Extracti Frangulae fluidi
 50,0
 D. S. 20—40 tilka hommi-
 kul ja õhtul

209. Rp.

Infusi radices Rhei 7,5:
 :120,0
 Natrii bicarbonici
 Natrii sulfurici $\bar{a}\bar{a}$ 7,5
 Olei Menthae piperitae
 gtt. V
 Sirupi simplicis ad 150,0
 M. f. mixtura
 D. S. 3—5 korda päevas
 1 supilusikatäis

210. Rp.

Pulveris magnesiae cum
 Rheo 30,0
 D. S. $\frac{1}{2}$ —1 teelusikatäis
 piimaga sisse võtta

211. Rp.

Pulveris Liquiritiae com-
 positi 50,0
 D. S. Mitu korda päevas
 1 teelusikatäis

212. Rp.

Speciei laxantes 100,0
 D. S. 1—2 teelusikatäit
 1 klaasi tee valmistami-
 seks

Kinnistid ja spasme lõõgastavad vahendid

213. Rp.

Atropini sulfurici 0,001
Luminali 0,05
Sacchari 0,3
M. f. pulvis. D. t. d. N. 10
S. 3 korda päevas 1 pulber

214. Rp.

Extracti Belladonnae 0,3
Extracti Opii 0,6
Massae pilularum q. s.
ut fiant pilulae N. 30
S. 3—5 korda päevas
1 pill

215. Rp.

Opii pulverati 0,03
Bismuthi subnitrici 0,5
M. f. pulvis. D. t. d. N. 10
S. 3 korda päevas 1 pulber

216. Rp.

Tincturae opii 2,0
Aquae Cinnamomi 50,0
Mucilaginis Salep 100,0
M. f. mixtura
D. S. 1 supilusikatäis iga
2 tunni järel

217. Rp.

Extracti Belladonnae
Extracti Hyoscyami
Novocaini āā 0,01
Extracti opii 0,02
Olei cacao q. s.
M. f. suppositorium
D. t. d. N. 6
S. 1 küünal päevas pära-
soolde

218. Rp.

Tannalbini 0,25 (0,5)
D. t. d. N. 15
S. 3 korda päevas 1 pulber

219. Rp.

Bismuthi nitrici basici 0,25
(0,5)
S. 3 korda päevas 1 pulber

220. Rp.

Bismuthi nitrici basici 0,25
Saloli 0,25
Opii 0,01
M. f. pulvis. D. t. d. N. 6
S. 3 korda päevas 1 pulber

221. Rp.

Bismuthi nitrici basici 0,5
Extracti Belladonnae 0,015
D. t. d. N. 6 in tabulettis
S. 3 korda päevas 1 tablett

222. Rp.

Solutionis atropini sulfu-
rici 0,1% — 1,0
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. 1—2 korda päevas 0,5—
1 ml naha alla

223. Rp.

Decocti rhizomatis Tor-
mentillae 7,5:135,0
Sirupi Althaeae ad 150,0
M. D. S. 3 korda päevas
1 supilusikatäis

224. Rp.

Tincturae Belladonnae
Tincturae opii simplicis
ää 5,0
Tincturae Tormentillae 10,0
M. D. S. 3 korda päevas
10—12 tilka

225. Rp.

Carboleni 0,5
D. t. d. N. 10 in tabulettis
S. Mitu korda päevas
1 tablett

226. Rp.

Floris Chamomillae 30,0
D. S. 1 supilusikatäis
1 liitri tee valmistami-
seks

227. Rp.

Rhizomatis Calami
Radice Valerianae ää 10,0
Folii Menthae piperitae
20,0
Folii Urticae dioicae
Corticis Frangulae ää 30,0
M. f. species
D. S. 1 supilusikatäis
1 klaasi tee valmistami-
seks

VIII. VERESOOKONNA- JA SÜDAMEVAHENDID

Veresoonkonda laiendavad vahendid

228. Rp.

Amylii nitrosi 0,5
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. 5—10 korda päevas
3 tilka sissehingamiseks
taskurätilt

229. Rp.

Natrii nitrosi 0,03
Papaverini hydrochlorici
0,04
Luminali 0,02
Diuretini 0,3
M. f. pulvis. D. t. d. N. 6
S. 3 korda päevas 1 pulber

230. Rp.

Natrii nitrosi 2,0
Aeuae Menthae piperitae
ad 10,0
M. D. S. 3 korda päevas
10 tilka

231. Rp.

Tabulettae nitroglycerini
0,0005
D. t. d. N. 40 in tabulettis
S. 3 korda päevas 1 tablett
keele alla

232. Rp.

Solutionis nitroglycerini
spirituosae 1% — 5,0
D. S. 3 korda päevas 1—3
tilka keelele

233. Rp.

Tipheni 0,03
Coffeini natrio-benzoici
0,05
Codeini phosphorici 0,015
Analginini 0,25
M. f. pulvis. D. t. d. N. 15
S. 3 korda päevas 1 pulber
sisse võtta

234. Rp.

Euphyllini 0,1

D. t. d. N. 10 in tabulettis

S. 3 korda päevas 2 tab-
letti

235. Rp.

Solutionis euphyllini 2,4%

— 10,0

D. t. d. N. 3 in ampullis

S. 5—10 ml lahjendada
40%-lise glükoosilahuse-
ga kuni 20 ml-ni ja süs-
tida aeglaselt veeni

236. Rp.

Solutionis redergami 0,1%

— 30,0

D. S. 2 korda päevas 5—
30 tilka

237. Rp.

Dibazoli

Papaverini hydrochlorici

Luminali ää 0,025

M. f. pulvis. D. t. d. N. 15

S. 3 korda päevas 1 pulber

238. Rp.

Spasmolytini 0,15

Sacchari 0,3

M. f. pulvis. D. t. d. N. 10

S. 2—3 korda päevas
1 pulber

239. Rp.

Angiotrophini 1,0

D. t. d. N. 10 in ampullis

S. 1 ml päevas naha alla
või lihasesse

240. Rp.

Salsolini hydrochlorici 0,03

Sacchari 0,2

M. f. pulvis. D. t. d. N. 12

S. 3 korda päevas 1 pulber

241. Rp.

Salsolini hydrochlorici

Luminali ää 0,02

Diuretini 0,5

M. f. pulvis. D. t. d. N. 12

S. 3 korda päevas 1 pulber

242. Rp.

Luminali 0,05
Papaverini hydrochlorici
0,025

Camphorae monobromatae
0,25

Diuretini 0,5

M. f. pulvis

D. t. d. N. 15 in capsulis
amylaceis

S. 3 korda päevas 1 kap-
sel

243. Rp.

Sajodini 0,5

D. t. d. N. 20 in tabulettis

S. 2—3 korda päevas 1 tab-
lett peale sööki

244. Rp.

Jod-hypersoli 30,0

D. S. 2—3 korda päevas
1 noaotsatäis $\frac{1}{4}$ klaasis
külmas vees lahustatuna
enne sööki

245. Rp.

Reserpini (Serpasili)
0,00025

D. t. d. N. 100 in tabulet-
tis

S. 3 korda päevas 1 tablett

246. Rp.

Rutini 0,02

D. t. d. N. 50 in tabulettis

S. 3 korda päevas 1 tab-
lett koos C-vitamiiniga

Südamenõrkuse vastased vahendid

247. Rp.

Infusi herbae Adonidis ver-
nalis 6,0:150,0

D. S. 4—6 korda päevas
1 supilusikatäis

248. Rp.

Adonisidi 15,0

D. S. 3 korda päevas 15—
20 tilka

249. Rp.

Adonisidi 1,0
D. t. d. N. 10 in ampullis
S. 0,5 ml 1 kord päevas
veeni (10 ml-s 5%-lises
glükoosilahuses)

250. Rp.

Tincturae Convallariae ma-
jalis 15,0
D. S. 3 korda päevas
15 tilka

251. Rp.

Tincturae Convallariae ma-
jalis
Tincturae Valerianae
ää 15,0
M. D. S. 3 korda päevas
30 tilka

252. Rp.

Convalleni 15,0
D. S. 3 korda päevas 15—
20 tilka

253. Rp.

Convasidi 1,0
D. t. d. N. 10 in tablettis
S. 3 korda päevas 1 tablett

254. Rp.

Solutionis corglyconi
0,06% — 1,0
D. t. d. N. 10 in ampullis
S. 1 ml korraga veeni
(10 ml-s isotoonilises kee-
dusoolalahuses või 5%-
lises glükoosilahuses)

255. Rp.

Pulveris folii Digitalis 0,1
Diuretini 0,6
M. f. pulvis. D. t. d. N. 12
S. 3 korda päevas 1 pulber

256. Rp.

Infusi folii Digitalis 1,5:
:120,0
Spiritus vini diluti ad 150,0
M. D. S. 3 korda päevas
1 supilusikatäis

257. Rp.

Tincturae Digitalis 15,0
D. S. 3 korda päevas 15
tilka

258. Rp.

Diginormi 15,0
D. S. 3 korda päevas 20
tilka

259. Rp.

Pulveris folii Digitalis
 Chinini hydrochlorici
 āā 1,5
 Papaverini hydrochlorici
 0,6
 Massae pilularum q. s.
 ut fiant pilulae N. 30
 D. S. 3 korda pāevas
 2 pilli

260. Rp.

Erysidi 1,0
 D. t. d. N. 10 in ampullis
 S. 0,5—1 ml veeni (20 ml-s
 40%-lises glūkoosilahu-
 ses)

261. Rp.

Solutionis Erysimini
 0,033% — 1,0
 D. t. d. N. 10 in ampul-
 lis
 S. 0,5—1 ml naha alla vōi
 veeni (20 ml-s isotooni-
 lises keedusoolalahuses
 vōi 5%-lises glūkoosi-
 lahuses)

262. Rp.

Kendosidi 1,0
 D. t. d. N. 10
 S. 1 kord pāevas 0,5—1
 ml veeni (20 ml-s 10—
 20%-lises glūkoosilahu-
 ses)

263. Rp.

Solutionis periplocini
 0,025% — 1,0
 D. t. d. N. 10 in ampullis
 S. 1 kord pāevas 0,5—1 ml
 veeni (20 ml-s 10—20%-
 lises glūkoosilahuses)

264. Rp.

Solutionis strophanthini
 0,05% — 1,0
 D. t. d. N. 10 in ampullis
 S. 0,5—1 ml veeni (20
 ml-s 20%-lises glūkoosi-
 lahuses) 1 kord pāevas

265. Rp.

Tincturae Strophanthi 5,0
 Tincturae Valerianae 10,0
 M. D. S. 3 korda pāevas
 15 tilka

266. Rp.

Neriolini 0,0001
D. t. d. N. 20 in tabulettis
S. 3 korda päevas 1 tab-
lett

267. Rp.

Tabulettae chinini sulfurici
0,25
D. t. d. N. 10
S. 2 korda päevas 1 tablett

268. Rp.

Pulveris folii Digitalis 0,1
Theophyllini 0,2
Olei cacao 1,8
M. f. suppositorium. D. t. d.
N. 12
S. 3 korda päevas 1 küü-
nal pärasoolde

269. Rp.

Olei camphorati 20% —
1,0
D. t. d. N. 10 in ampullis
S. 1 ml naha alla

270. Rp.

Solutionis glucosi 40% —
20,0
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. Süstimiseks veeni

271. Rp.

Acidi ascorbinici 0,02
Glucosi 8,0
Aquae destillatae ad 20,0
M. f. solutio. Sterilisa
D. t. d. N. 10 in ampullis
S. Süstimiseks veeni

IX. VEREVAHENDID

Vereteket soodustavad vahendid

272. Rp.

Ferri reducti 0,3
D. t. d. N. 15 in capsulis
amylaceis
S. 3 korda päevas 1 kapsel

273. Rp.

Acidi ferro-ascorbinici 0,5
D. t. d. N. 20 in capsulis
amylaceis
S. 3 korda päevas 1 kap-
sel

274. Rp.

Campoloni 2,0
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. 2—4 ml lihasesse

275. Rp.

Antianaemini 2,0
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. 2—4 ml lihasesse

276. Rp.

Acidi folici 0,03
Sacchari 0,3
M. f. pulvis. D. t. d. N. 10
S. 2 korda päevas 1 pulber

277. Rp.

Solutionis acidi folici 1%
— 1,0
D. t. d. N. 10 in ampullis
S. 1—2 korda päevas 1 ml
lihasesse

281. Rp.

Pentoxyli 0,2
D. t. d. N. 12
S. 3 korda päevas 1 pulber

278. Rp.

Solutionis vitamini B₁₂
0,0015% (või 0,003%) —
1,0

D. t. d. N. 10

S. Iga 2—3 päeva järel
1 ml naha alla või liha-
sesse

279. Rp.

Thesani 0,01
Sacchari 0,2
M. f. pulvis. D. t. d. N. 20
S. 3—4 korda päevas
1 pulber

280. Rp.

Solutionis thesani 0,1% —
1,0
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. 3—4 korda ööpäevas
1—2 ml lihasesse

Vere hüübimist soodustavad vahendid

282. Rp.

Solutionis calcii chlorati
10% — 150,0

(Acidi hydrochlorici diluti
1,5)

D. S. 3—4 korda päevas
1 supilusikatäis (lastele
mitu korda päevas 1 tee-
lusikatäis)

283. Rp.

Solutionis calcii chlorati
10% — 10,0

D. t. d. N. 10 in ampullis
S. 1 ampull veeni

284. Rp.

Vicasoli 0,015

D. t. d. N. 25 in tabulettis
S. 2 korda päevas 1 tablett

285. Rp.

Solutionis Vicasoli 0,3% —
5,0

D. t. d. N. 10

S. 5,0 ml päevas lihasesse

Vere hüübimist pärssivad vahendid

286. Rp.

Dicumarini 0,05

Sacchari 0,3

M. f. pulvis. D. t. d. N. 15

S. 3 korda päevas 1 pulber

287. Rp.

Neodicumarini 0,05 (või
0,1)

D. t. d. N. 10 in tabulettis

S. 3 korda päevas 1 tablett

288. Rp.

Natrii citrici 5,0
Aquaе destillatae ad 100,0
M. f. solutio. Sterilisa
D. S. Kasutamiseks otse-
sel vereülekan-
del

X. NEERUVAHENDID

289. Rp.

Kalii acetici soluti 30,0
Aquaе destillatae 200,0
M. D. S. 4—5 korda päe-
vas 1 teelusikatäis

290. Rp.

Diuretini 0,5
D. t. d. N. 10 in tabulettis
S. 3 korda päevas 1 tablett

291. Rp.

Mercusali 1,0
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. 1 kord päevas $\frac{1}{2}$ —1
ml naha alla

292. Rp.

Decocti folii Uvae ursi
15,0:150,0
D. S. Iga 2 tunni järel
1 supilusikatäis

293. Rp.

Extracti Belladonnae 0,015
Saloli 0,5
D. t. d. N. 6 in tabulettis
S. 3 korda päevas 1 tablett

294. Rp.

Saloli
Urotropini āā 0,5
D. t. d. N. 6 in tabulettis
S. 3—4 korda päevas 1
tablett

295. Rp.

Acidi phosphorici diluti 5,0
 Sirupi Rubi idaei 15,0
 Aquae destillatae ad 150,0
 M. D. S. 3 korda päevas
 1 supilusikatäis

296. Rp.

Ammonii chlorati 25,0
 Da in charta cerata
 S. Iga 2 tunni järel 1 noa-
 otsatäis suhkruveega sis-
 se võtta

XI. EMAKAVAHENDID**297. Rp.**

Pulveris Secalis cornuti
 0,5
 D. t. d. N. 12 in charta
 cerata
 S. 3 korda päevas 1 pulber

300. Rp.

Solutionis sphaerophysini
 benzoici 1% — 10,0
 Sterilisa
 D. S. 1—2 korda päevas
 1 ml lihasesse

298. Rp.

Infusi Secalis cornuti 5,0:
 :135,0
 Sirupi simplicis ad 150,0
 M. D. S. 3 korda päevas
 1 supilusikatäis

301. Rp.

Ergotini 1,3
 D. t. d. N. 6 in ampullis
 S. 3 korda päevas 1 ml
 naha alla

299. Rp.

Extracti Secalis cornuti
 fluidi 20,0
 D. S. 3 korda päevas
 15 tilka

302. Rp.

Pituitrini P 1,0
 D. t. d. N. 6 in ampullis
 S. Iga 2—3 tunni järel
 1 ml naha alla

303. Rp.

Chinini hydrochlorici 0,25
D. t. d. N. 6 in capsulis
amylaceis
S. Iga 1—2 tunni järel
1 pulber

304. Rp.

Stypticini 0,05
D. t. d. N. 20 in tabulettis
S. 3 korda päevas 1 tablett

305. Rp.

Extracti Hydrastidis cana-
densis fluidi 15,0
D. S. 3 korda päevas 20
tilka

306. Rp.

Extracti Polygoni hydro-
piperis fluidi 20,0
D. S. 3 korda päevas 30—
40 tilka

307. Rp.

Extracti Viburni fluidi 2,0
D. S. 3 korda päevas
30—40 tilka

XII. HORMOONID JA INHIBIITORID**Kilpnääre****308. Rp.**

Thyreoidini 0,2
D. t. d. N. 10 in tabulettis
S. 3 korda päevas 1 tablett

309. Rp.

Thyreoidini liquidi 10,0
D. S. 2 korda päevas 15—
20 tilka enne sööki

310. Rp.

Thyreoidini liquidi 1,0
D. t. d. N. 10 in ampullis
S. 2 korda päevas 1 ampull
naha alla

Kilpnäärme inhibiitorid

311. Rp.

Dijodthyrosini 0,05
D. t. d. N. 20 in tabulettis
S. 3 korda päevas 1 tab-
lett

312. Rp.

Methylthiourazili 0,25
D. t. d. N. 20 in tabulettis
S. 2 korda päevas 1 tab-
lett peale sööki

313. Rp.

Jodi puri 0,02
Kalii jodati 0,2
Luminali 0,4
Pulveris folii Digitalis 1,0
Extracti Valerianae 4,0
Extracti Taraxaci q. s.
ut fiant pilulae N. 40
D. S. 2 korda päevas 1 pill

314. Rp.

Jodi puri 0,02
Kalii jodati 0,2
Luminali 0,4
Pulveris folii Digitalis 1,0
Methylthiourazili 4,0
Extracti Taraxaci q. s.
ut fiant pilulae N. 40
D. S. 2 korda päevas 1 pill

Parathyreoidea

315. Rp.

Parathyreoidini 1,0
D. t. d. N. 5 in ampullis

S. 2 korda päevas 1 ml
naha alla

Hüpfüüs

316. Rp.

Adiurecrini 0,05

D. t. d. N. 30

S. 2—3 korda päevas

1 pulber nina limaskes-
tale

317. Rp.

Hormoni adreno-cortico-
tropini 20 tü

D. t. d. N. 6 in ampullis

S. 4 korda päevas liha-
sesse 1 ampull, lahusta-
tuna 2 ml-s steriilses
destilleeritud vees

318. Rp.

Prolactini 5,0

D. t. d. N. 2

S. 2 korda päevas 1 ml
(=5 tü) naha alla

Pankreas

319. Rp.

Insulini 5,0

D. t. d. N. 3 in ampullis

S. 0,1—1 ml (= 4—40 tü)
naha alla

320. Rp.

Triprotamin-zinc-insulini
10,0

D. t. d. N. 3 in ampullis

S. 0,5—1 ml (= 20—40 tü)
naha alla

Neerupealis

321. Rp.

Cortini 1,0
D. t. d. N. 10 in ampullis
S. 2 korda päevas 1 ml
(=10 tü) naha alla

322. Rp.

Solutionis desoxycortico-
steroni acetici oleosae
0,5% — 1,0
D. t. d. N. 10 in ampullis
S. 1 ml üle päeva lihasesse

Naissuguhormoonid

323. Rp.

Solutionis folliculini oleo-
sae 1,0
D. t. d. N. 20 in ampullis
S. 1 ml (=5000 tü) liha-
sesse

325. Rp.

Synöestrolü 0,001
D. t. d. N. 10 in tabulettis
S. 1 tablett (= 10 000 tü),
päevas

324. Rp.

Solutionis oestradioli di-
propionici oleosae 0,1%
— 1,0
D. t. d. N. 3 in ampul-
lis
S. 2 korda nädalas 1 ml
(=10 000 ü) lihasesse

326. Rp.

Diaethylstilboestrolü 0,001
D. t. d. N. 20 in tabulettis
S. 1 tablett (=20 000 tü)
päevas

327. Rp.

Solutionis diaethylstilb-
oestrolü oleosae 0,1% —
1,0
D. t. d. N. 10 in ampullis
S. 1 ml päevas lihasesse

328. Rp.

Pregnini 0,005
D. t. d. N. 20 in tabulettis
S. 3 korda päevas 2 tab-
letti

329. Rp.

Solutionis progesteroni
oleosae 0,5% — 1,0
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. 1 ml lihasesse

Meessuguhormoonid

330. Rp.

Methyltestosteroni 0,005
D. t. d. N. 40 in tabulettis
S. 2 korda päevas 2 tab-
letti keele alla

331. Rp.

Solutionis testosteroni pro-
pionici oleosae 5% — 1,0
D. t. d. N. 3 in ampullis
S. 1 ml üle päeva liha-
sesse

XIII. VITAMIINID

332. Rp.

Dragetae vitamini A 1,0
D. t. d. N. 50
S. 1 dražee päevas

334. Rp.

Solutionis citrali 1% —
15,0
D. S. 10—20 tilka päevas

333. Rp.

Solutionis carotini oleosae
100,0
D. S. 10—15 tilka päevas

335. Rp.

Tabulettae vitamini B₁
0,002
D. t. d. N. 10
S. 2 korda päevas 1 tablett

336. Rp.

Solutionis vitamini B₁ 5%
— 1,0
D. t. d. N. 10 in ampullis
S. 1 ml lihasesse

337. Rp.

Riboflavini 0,01
Sacchari 0,25
M. f. pulvis. D. t. d. N. 30
S. 3 korda päevas 1 pulber

338. Rp.

Riboflavini 0,001
Acidi ascorbinici 0,1
Aquae destillatae 10,0
M. D. S. Silmatilgad

339. Rp.

Acidi ascorbinici 0,05
D. t. d. N. 10 in tabulettis
S. 2—3 korda päevas 1
tablett

340. Rp.

Solutionis acidi ascorbi-
nici 5% — 1,0
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. 1 ml veeni

341. Rp.

Solutionis vitamini D
oleosae 35,0
D. S. 4 tilka päevas

342. Rp.

Olei jecoris aselli 100,0
D. S. 1—2 teelusikatäit
päevas

343. Rp.

Tabulettae acidi nicotini-
ci 0,03
D. t. d. N. 10
S. 3—4 korda päevas 1
tablett

344. Rp.

Solutionis acidi nicotini-
ci 5% — 1,0
D. t. d. N. 5 in ampullis
S. Süstimiseks veeni

345. Rp.

Solutionis acidi nicotini-
ci 1% — 20,0
Sterilisa
D. S. 3—5 ml lihasesse või
veeni

346. Rp.

Drageetae polyvitamini 1,0

D. t. d. N. 50

S. 3 korda päevas 1—2 dra-
žeed

XIV. ROBOREERIVAD VAHENDID

347. Rp.

Acidi arsenicosi 0,03

Extracti et pulveris radi-
cis Liquiritiae q. s.

ut fiant pilulae N. 30

D. S. 2—3 korda päevas
1—2 pilli

348. Rp.

Acidi arsenicosi 0,1

Camphorae monobromatae

Calcii glycerophosphorici
āā 10,0

Extracti Valerianae q. s.
ut fiant pilulae N. 100

D. S. 2 korda päevas 2
pilli

349. Rp.

Solutionis arsenicalis Fow-
leri 5,0

Tincturae ferri pomati 15,0

M. D. S. 2—3 korda päevas
6—15 tilka peale sööki

350. Rp.

Tabulettae Blaudi N. 50

D. S. 3 korda päevas 1 pill
peale sööki

351. Rp.

Solutionis natrii arsenicici
1% — 1,0

D. t. d. N. 10 in ampullis
S. 0,2—1 ml naha alla

352. Rp.

Phytini 0,25

D. t. d. N. 12 in tabulettis

S. 3 korda päevas 1—2 tab-
letti

XV. MIKROOBIDE VASTASED VAHENDID

Bakteritsiidsed vahendid

353. Rp.

Solutionis hydrogenii per-
oxydati 3% — 50,0

D. S. Loputuseks

354. Rp.

Solutionis kalii hyper-
manganici 0,1% —
500,0

D. S. Haava (limaskesta)
loputamiseks

355. Rp.

Chloramini B 20,0

D. S. 0,5 — 2%-lise lahu-
sena naha (haavade)
desinfitseerimiseks

356. Rp.

Tincturae jodi 5% (10%)
— 20,0

D. S. Naha (vähemate
haavade) desinfitseeri-
miseks

357. Rp.

Jodi puri 5,0

Kalii jodati 10,0

Aquae destillatae ad 100,0

M. D. S. Kurgu määrimi-
seks (lastele 3 korda
päevas 2—5 tilka)

358. Rp.

Tabulettae pantocidi 0,12

D. t. d. N. 20

S. 0,5%-lise lahusega haa-
vade desinfitseerimiseks,
1—1,5%-lise lahusega
naha desinfitseerimiseks,
1 tablett 1 liitri joogi-
vee desinfitseerimiseks

359. Rp.

Acidi borici 20,0

D. S. 1 teelusikatäis 1
klaasis vees lahustada,
loputamiseks

360. Rp.

Boracis 5,0
Glycerini 25,0
M. D. S. Limaskesta mää-
rimiseks

361. Rp.

Acidi lactici 50,0
D. S. 1 teelusikatäis 1 liit-
ri vee kohta tupe lopu-
tamiseks

362. Rp.

Acidi salicylici 1,0
Spiritus vini 70% — 50,0
M. D. S. Naha desinfitsee-
rimiseks

363. Rp.

Resorcini 1,5
Spiritus vini 30,0
M. D. S. Haiguskollete
pintseldamiseks

364. Rp.

Solutionis argenti nitrici
1—2% — 20,0
D. S. Silmatilgad

365. Rp.

Collargoli 0,2 (0,3)
Aquae destillatae 10,0
Solutionis adrenalini hyd-
rochlorici 0,1% gtt. X
M. D. S. Silmatilgad

366. Rp.

Protargoli 0,2 (0,3)
Aquae destillatae 10,0
M. D. S. Limaskestade des-
infitseerimiseks

367. Rp.

Cupri sulfurici 30,0
D. S. 1/2 teelusikatäit 1 liit-
ri vee kohta, tupe lopu-
tamiseks

368. Rp.

Zinci sulfurici
Aquae destillatae ää 100,0
M. D. S. 1 teelusikatäis 1
liitri vee kohta, tupe
loputamiseks

369. Rp.

Solutionis hydrargyri bi-
chlorati 0,1%—500,0
D. S. Naha desinfitseeri-
miseks, loputusteks

370. Rp.

Solutionis hydrargyri bichlorati 0,02% — 300,0
D. S. Silmade loputamiseks

371. Rp.

Tabulettae rivanoli 0,1
D. t. d. N. 20
S. 1 tablett 1 klaasis vees lahustada, desinfitseerimiseks

372. Rp.

Solutionis rivanoli 0,1% — 100,0
D. S. Naha desinfitseerimiseks, mähisteks

373. Rp.

Solutionis methyleni coerulei spirituosae 1% — 100,0
D. S. Desinfitseerimiseks

374. Rp.

Viridis nitentis 0,5
Spiritus vini 70% — 50,0
M. D. S. Haiguskollete määrimiseks

375. Rp.

Chinosoli 0,2
Aquae destillatae 200,0
M. D. S. Haavade loputamiseks

376. Rp.

Solutionis furacilini 0,02% — 500,0
D. S. Haavade loputamiseks

377. Rp.

Furacilini 0,1
Lanolini 20,0
Vaselini 30,0
M. f. unguentum
D. S. Nahasalv

378. Rp.

Urotropini 0,5
D. t. d. N. 10 in tabulettis
S. 4—5 korda päevas 1 tablett sisse võtta

379. Rp.

Solutionis urotropini 40% — 10,0
D. t. d. N. 10 in ampullis
S. 10 ml veeni

380. Rp.

Solutionis phenoli

2% (3%) — 200,0

D. S. Desinfitseerimiseks

Protozoade ja spirillide vastased vahendid

381. Rp.

Acrichini 0,1

D. t. d. N. 15 in tabulettis

S. 3 korda päevas 1 tab-
lett

382. Rp.

Acrichini 0,1

Plasmocidi 0,02

D. t. d. N. 10 in tabulettis

S. 3 korda päevas 1 tab-
lett

383. Rp.

Bigumali 0,1

D. t. d. N. 6 in tabulettis

S. 3 korda päevas 1 tab-
lett

384. Rp.

Chinini hydrochlorici 0,25
(0,5)

D. t. d. N. 10 in tabulettis

S. 3 korda päevas 1 tab-
lett

385. Rp.

Solutionis emetini hydro-
chlorici 1% — 1,0

D. t. d. N. 10 in ampullis

S. 1—2 ml 2 korda päevas
naha alla

386. Rp.

Osarsoli 0,25

D. t. d. N. 10 in tabulettis

S. 3—4 korda päevas
1 tablett

387. Rp.

Osarsoli 0,25

Acidi borici 0,3

Streptocidi albi 0,5

M. f. pulvis. D. t. d. N. 10

S. Tuppe

388. Rp.

Osarsoli
Streptocidi albi $\bar{a}\bar{a}$ 0,5
M. f. pulvis. D. t. d. N. 10
S. Tuppe

389. Rp.

Osarsoli 10,0
Acidi borici 6,0
Glucosi 40,0
M. f. pulvis
D. S. Puistepulber

390. Rp.

Osarsoli 0,3
Aluminis
Acidi lactici $\bar{a}\bar{a}$ 0,05
Glucosi ad 2,0
Butyri cacao q. s.
M. f. globulus vaginalis
D. t. d. N. 6
S. 1 gloobul päevas

391. Rp.

Osarsoli 0,25
Acidi borici 0,3
Streptocidi albi 0,5
Butyri cacao 1,0
M. f. globulus vaginalis
D. t. d. N. 10
S. 1 gloobul päevas

392. Rp.

Novarsenoli 0,15 (0,3—
0,45—0,6)
D. t. d. N. 1 in ampullis
S. 1 ampull korraga, la-
hustatuna destilleeritud
vees, veeni

393. Rp.

Myarsenoli 0,15 (0,3—0,45
—0,6)
D. t. d. N. 1 in ampullis
S. 1 ampull korraga, la-
hustatuna destilleeritud
vees, lihasesse

394. Rp.

Bijochinoli 20,0
D. S. Süstimiseks liha-
sesse

Tuberkuloosivastased vahendid

395. Rp.

Natrii paraaminosalicylici
0,5

D. t. d. N. 50 in tabulettis

S. 4 korda päevas 6 tab-
letti $\frac{1}{2}$ tundi enne sööki

396. Rp.

Phthivazidi 0,1 (0,2—0,25—
0,3—0,5)

D. t. d. N. 20 (50) in ta-
bulettis

S. 3 korda päevas 1 tab-
lett

Sulfaniilamiidid

397. Rp.

Aethazoli 0,5

D. t. d. N. 24 in tabulettis

S. Iga 4 tunni järel 2 tab-
letti

400. Rp.

Unguenti streptocidi 10%
— 25,0

D. S. Haiguskoldele mää-
rimiseks

398. Rp.

Streptocidi albi 0,5

D. t. d. N. 10 in tabulettis

S. 4—6 korda päevas
2 tabletti

401. Rp.

Emulsionis streptocidi 50,0

D. S. Haavadele määrimi-
seks

399. Rp.

Streptocidi albi solubilis 5,0

Solutionis glucosi 1% —
100,0

M. Sterilisa

D. S. 20 ml korruga veeni

402. Rp.

Solutionis sulfacyli solu-
bilis 20% (30%) —
10,0

D. S. Silmatilgad

403. Rp.

Norsulfazoli 0,5
D. t. d. N. 10 in tabulettis
S. Iga 4 tunni järel 2 tab-
letti

405. Rp.

Phthalazoli 0,5
D. t. d. N. 10 in tabulettis
S. 5 korda päevas 2 tab-
letti

404. Rp.

Sulfodimezini 0,5
D. t. d. N. 10 in tabulettis
S. Iga 4 tunni järel 4 tab-
letti

406. Rp.

Sulgini 0,5
D. t. d. N. 12 in tabulettis
S. Iga 4 tunni järel 2 tab-
letti

Antibiootikumid

407. Rp.

Albomycini 100 000 tü
D. t. d. N. 2 in ampullis
S. 1 ampull lahustada
2 ml-s bidestilleeritud
vees, 1 ml 2 korda päe-
vas naha alla

409. Rp.

Penicillini crystallisati pro
injectionibus 200 000 tü
D. t. d. N. 5 in ampullis
S. 1 ampull süstida liha-
sesse

408. Rp.

Biomycini hydrochlorici
100 000 tü
D. t. d. N. 20 in tabulettis
S. 1—3 tabletti iga 4 tun-
ni järel

410. Rp.

Penicillini 50 000 tü
D. t. d. N. 10 in tabulettis
S. Mitu korda päevas 1—2
tabletti

411. Rp.

Penicillini 100 000 tü
Lanolini 1,0
Vaselini ad 10,0
M. f. unguentum
S. Haavale määrimiseks

412. Rp.

Novocillini 300 000 tü
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. Süstimiseks lihasesse

413. Rp.

Penicillini 25 000 tü
Ecmolini 0,0025
D. t. d. N. 20 in tabulettis
S. Mitu korda päevas
1—2 tabletti

414. Rp.

Solutionis ecmolini 0,5%
— 10,0
D. t. d. N. 1 in ampullis
S. 3 korda päevas 4—6
tilka ninasõrmesse

415. Rp.

Laevomycetini 0,5
D. t. d. N. 12
S. 3—4 korda päevas
1 pulber

416. Rp.

Synthomycini 0,5
D. t. d. N. 10 in tabulettis
S. 4 korda päevas 2 tab-
letti

417. Rp.

Emulsionis synthomycini
10% (1%) — 10,0
D. S. Haiguskoldele mää-
rimiseks

418. Rp.

Streptomycini crystallisati
200 000 tü
D. t. d. N. 10 in ampullis
S. Süstimiseks lihasesse

419. Rp.

Solutionis gramicidini 2%
— 2,0
D. t. d. N. 5 in ampullis
S. 2 ml lahustada 200
ml-s destilleeritud vees,
mädapõletikulisele kol-
dele asetamiseks

420. Rp.

Solutionis sanasini 0,2%—
100,0
Sterilisa
D. S. Liigeseõone loputa-
miseks

XVI. PARASIITIDE VASTASED VAHENDID

421. Rp.

Extracti Filicis maris
aetherei 1,0
D. t. d. N. 6 in capsulis
gelatinosis
S. Iga 5—10 minuti järel
1 kapsel

422. Rp.

Santonini 0,05
D. t. d. N. 10 in tabulettis
S. 3 korda päevas 1 tab-
lett

423. Rp.

Tabulettae sancapheni
D. t. d. N. 6
S. 3 korda päevas 1 tablett

424. Rp.

Phenothiazini 1,0
D. t. d. N. 15
S. 3 korda päevas 1 pul-
ber enne sööki

425. Rp.

Heptylresorcini 0,1
D. t. d. N. 10 in tabulettis
S. 3 korda päevas 1 tab-
lett

426. Rp.

Carbonei tetrachlorati 0,5
D. t. d. N. 5 in capsulis
gelatinosis
S. 5 kapslit korraga 2 tun-
di peale sööki piimaga
sisse võtta

XVII. NAHAHAHENDID

Naha mädapõletiku vastased vahendid

427. Rp.

Argenti nitrici 0,3
 Balsami Schostakowskii 3,0
 Vaselini ad 30,0
 M. f. unguentum
 D. S. Väline, halvasti granuleeruvale haavandile asetamiseks

428. Rp.

Sulfuris praecipitati 20,0
 Acidi salicylici 5,0
 Adipis suilli ad 100,0
 M. f. unguentum
 D. S. Nahale määrimiseks

429. Rp.

Acidi lactici 6,0
 Acidi salicylici 12,0
 Vaselini ad 100,0
 M. f. unguentum
 D. S. Väline, 24—48 tunniks haiguskoldele asetamiseks (Arijevitši salv)

430. Rp.

Olei Rusci
 Sulfuris praecipitati
 āā 3,0
 Vaselini 24,0
 M. f. unguentum
 D. S. Väline, haiguskoldele asetamiseks

431. Rp.

Boracis
 Streptocidi albi āā 3,0
 Acidi salicylici 1,0
 Zinci oxydati
 Talci veneti āā 15,0
 M. f. pulvis
 D. S. Puistepulber

Ekseemi- ja dermatiidivastased vahendid

432. Rp.

Talci veneti
Zinci oxydati āā 10,0
M. D. S. Väline, naha
puuderdamiseks

433. Rp.

Acidi borici 1,0
Zinci oxydati
Talci veneti āā 25,0
Glycerini
Aquaë calcis āā 25,0
M. D. S. Väline, nahale
asetamiseks

434. Rp.

Talci veneti
Zinci oxydati
Amyli āā 15,0
Glycerini
Spiritus vini 95% āā 10,0
Aquaë calcis ad 100,0
M. D. S. Väline, naha
pintseldamiseks

435. Rp.

Solutionis argenti nitrici
0,25% — 50,0
D. S. Väline, mähisteks

436. Rp.

Solutionis resorcini 2%
— 200,0
D. S. Väline, mähisteks

437. Rp.

Naphthalani 5,0
Pastae zinci ad 50,0
M. D. S. Nahale määrimi-
seks

438. Rp.

Olei Rusci 3,0
Zinci oxydati 20,0—50,0
Acidi borici 2,0
Olei Helianthi ad 100,0
M. D. S. Väline, haigus-
kolletele asetamiseks

439. Rp.

Sulfuris praecipitati
Olei Rusci āā 5,0
Pastae zinci ad 100,0
M. D. S. Nahale määrimi-
seks

440. Rp.

Ichthyoli

Sulfuris praecipitati āā 2,0

Pastae zinci 20,0

M. f. pasta

D. S. Nahale määrimiseks

Naha sügelemise vastased vahendid

441. Rp.

Dimedroli 0,03

Sacchari 0,3

M. f. pulvis. D. t. d. N. 30

S. 3 korda päevas 1 pulber

442. Rp.

Mentholi 0,5

Spiritus vini 50,0

M. D. S. Nahale määrimiseks

443. Rp.

Anaesthesini 3,0

Unguenti zinci 30,0

M. D. S. Väline, nahale määrimiseks

Kõõmavastased vahendid

444. Rp.

Riboflavini 0,01

Acidi nicotinici 0,05

Acidi ascorbinici 0,1

M. f. pulvis. D. t. d. N. L

S. 3 korda päevas 1 pulber

445. Rp.

Acidi salicylici 2,5

Spiritus vini 50,0

M. D. S. Naha puhastamiseks

446. Rp.

Acidi salicylici 1,0
 Sulfuris praecipitati 4,0
 Solutionis acidi borici 2%
 — 15,0
 Spiritus vini ad 50,0
 M. D. S. Väline, juustega
 kaetud peanahale aseta-
 miseks

447. Rp.

Acidi salicylici 1,5
 Sulfuris praecipitati 3,0
 Adipis suilli ad 30,0
 M. f. unguentum
 D. S. Väline, juustega
 kaetud peanahale aseta-
 miseks

Desensibiliseerivad vahendid**448. Rp.**

Solutionis natrii bromati
 6,0:200,0
 D. S. 3 korda päevas 1
 supilusikatäis

449. Rp.

Solutionis novocaini 0,25%
 — 10,0
 D. t. d. N. 5 in ampullis
 S. 1 kord päevas 1—10 ml
 veeni

Konnasilmavastased vahendid**450. Rp.**

Acidi salicylici
 Acidi lactici aã 1,0
 Collodii elastici ad 10,0
 M. D. S. Konnasilmavede-
 lik

Sügelisvastased vahendid

451. Rp.

Natrii hyposulfurosi 80,0
Aquaе destillatae 120,0
M. D. S. Lahus nr. 1, nahale määrimiseks (Demjanovitši meetod)

452. Rp.

Acidi hydrochlorici puri 12,0
Aquaе destillatae 200,0
M. D. S. Lahus nr. 2, nahale määrimiseks (Demjanovitši meetod)

453. Rp.

Unguenti Wilkinsoni 100,0
D. S. Nahale määrimiseks

454. Rp.

Kalii carbonici 10,0
Sulfuris praecipitati 10—20,0
Vaselini ad 100,0
M. f. unguentum
D. S. Väline, nahale määrimiseks

455. Rp.

Saponis K 10,0
Aquaе destillatae 200,0
M. f. emulsio
D. S. Nahale määrimiseks

456. Rp.

Sulfuris praecipitati 3,0
Unguenti zinci 50,0
M. D. S. Nahale määrimiseks (dermatiidi nähtude esinemisel)

XVIII. SEERUMID

457. Rp.

Seri antitotulinici 500 000 tü

D. t. d. N. 2 in ampullis
S. 10 000—60 000 tü lihasse või naha alla

458. Rp.

Seri antidiphtherici 200 000
tü

D. t. d. N. 1 in ampullis

S. 1000—30 000 tü lihasse
või naha alla

459. Rp.

Seri antitetanici 1500—
200 000 tü

D. t. d. N. 2 in ampullis

S. 1500—3000 tü profülak-
tiliselt, 50 000—100 000
tü terapeutiliselt naha
alla või lihasesse

460. Rp.

Seri antipertussici titrati
1:3200—1:6400

D. t. d. N. 5 in ampullis

S. 20—30 ml lihasesse
3—5 päeva jooksul

RAVIMITE INDEKS

Acidum arsenicosum	347 348 349
— ascorbinicum	271 338 339 340 444
— boricum	94 115 131 359 387 389 391 433 438
— ferro-ascorbinicum	273
— folicum	276 277
— hydrochloricum dilu- tum	168 169 170 172 452
— lacticum	361 390 429 450
— nicotinicum	343 344 345 444
— phosphoricum dilutum	295
— salicylicum	109 362 428 429 431 445 446 447 450
— tannicum	126
Acrichinum	381 382
Adiurecrinum	316
Adonis vernalis	28 247
Adonisidum	30 248 249
Adrecainum	84
Adrenalinum hydrochloricum	81 83 94 120 129 160
Aëronum	182
Aethazolum	397
Aethylum chloratum	21

Aether pro narcosi	19
Albomycinum	407
Albucidum	vt. Sulfacylum
Allocholium	189
Aloë	205
Alumen	390
Ammonium bromatum	27
— causticum	70
— chloratum	296
— sulfoichthyolicum	102
Amylium nitrosum	228
Anaesthesinum	76 77 78 79 184 443
Analginum	58 60 233
Angiotrophinum	239
Antianaeminum	275
Antiasthmocrinum	164
Antipyrinum	62
Apomorphinum hydrochlori- cum	180
Argentum nitricum	364 427 435
Aspirinum	61
Asthmatholum	165
Atophanum	69 187
Atropa Belladonna	45 177 188 189 205 206 214 217 221 293
Atropinum sulfuricum	25 42 85 86 161 213 222
Aqua bidestillata	23
Balsamum Schostakowskii	427
Barbamylum	24 32

Bigumalum	383
Bijochinolum	394
Biomycinum	408
Bismuthum subnitricum	215 219 220 221
Borax	360 431
Bromuralum	33
Calami rhizoma	227
Calcium chloratum	116 282 283
Calcium glycerophosphori- cum	348
Camphora	73 269
— monobromata	26 242 348
Campolonum	274
Carbolenum	225
Carboneum tetrachloratum	426
Carotinum	333
Chamomillae flos	226
Chinae cortex	169
Chininum hydrochloricum	259 303 384
— sulfuricum	267
Chinosolum	375
Chloralum hydratum	37
Chloraminum B	355
Chloroformium	73 183
— pro narcosi	20
Chologonum	186 188
Citralum	334
Cocainum hydrochloricum	83 86 129
Codeinum	136 138 139

Codeinum phosphoricum	28 30 63 137 140 233
Coffeinum	1
— natrio-benzoicum	3 4 7 62 63 156 233
Collargolum	101 365
Collodium elasticum	450
Convallenum	252
Convasidum	253
Corazolium	9
Cordiaminum	10 11
Corglyconum	254
Cortinum	321
Cuprum citricum	117
— sulfuricum	181 367
Cytitonum	18
Desoxycorticosteronum aceticum	322
Diaethylstilboestrolum	326 327
Dibazolium	132 237
Dicainum	97 115 119
Dicumarinum	285
Diginormum	258
Digitalis	255 256 257 259 268 313 314
Dijodthyrosinum	311
Dimedrolum	441
Dipheninum	38
Ecmolinum	413 414
Emetinum hydrochloricum	385
Ephedrinum hydrochloricum	121 155 156 157 158

Ergotinum	301
Erysidum	260
Erysiminum	261
Eserinum salicylicum	91 92
Euphyllinum	234 235
Ferrum reductum	272
Filicis maris extractum	421
Folliculinum	323
Frangula	206 207 208 227
Furacilinum	135 376 377
Furamonum	90
Glucosum	270 271
Gramicidinum	419
Guajacolum carbonicum	152
Helichrysum arenarium	190
Heptylresorcinum	425
Hexenalum	22
Hormonum adreno-corticotro- pinum	317
Hydrargyrum bichloratum	369 370
— chloratum	198
— cyanatum	107
— oxydatum flavum	99 100
— praecipitatum album	106
Hydrastidis canadensis ex- tractum	305
Hydrogenium peroxydatum	130 353

Hyoscyami extractum	217
Ichthyolum	440
Infusum Sennae compositum	204
Insulinum	319
Ipecacuanhae radix	150
Jodum	103 133 313 314 356 357
Jod-hypersolum	244
Kalium aceticum solutum	289
— bromatum	27
— carbonicum	454
— hypermanganicum	354
— jodatum	104 133 154 313 314 357
Kendosidum	262
Laevomycesinum	415
Linimentum ammoniatum	71
Liquor aluminium acetici	134
— ammonii anisatus	148 150 151 153 163
Lobelinum hydrochloricum	17
Luminalum	34 156 157 213 229 237 241 242 313 314
Magnesium oxydatum	178 179
— sulfuricum crystalli- satum	193
Maydis extractum	191
Menthae piperitae folium	227
Mentholum	119 125 127 129 442
Mercusalum	291

Methylcoffeinum	2
Methylenum coeruleum	373
Methylum salicylicum	66 73
Methyltestosteronum	330
Methylthiourazilum	312 314
Mixtura Bechterewi	28
— Pavlovi	31
Morphinum hydrochloricum	40 41 42 43
Myarsenolum	393
Naphthalanum	437
Natrium arsenicicum	351
— benzoicum	148 153
— bicarbonicum	104 176 177 179
— bromatum	27 28 30 448
— chloratum	82
— citricum	288
— hyposulfurosum	451
— nitrosum	229 230
— paraaminosalicylicum	395
— salicylicum	64 65 67
— sulfuricum crystalli-	
satum	192 209
Neobenzinolum	162
Neodicumarinum	287
Neriolinum	266
Nitroglycerinum	231 232
Norsulfazolum	110 403
Novarsenolum	392

Noviformum	108
Novocainum	80 81 82 217 449
Novocillinum	412
O estradiolum dipropionicum	324
Oleum Eucalypti	127
— jecoris aselli	113 114 342
— Ricini	195 196 197
— Rusci	430 438 439
— terebinthinae rectifi- cati	73
Omnoponum	44
Opium	45 145 217 220
Osarsolum	386 387 388 389 390 391
P achycarpinum hydrojodicum	57
Pancreatinum	175
Pantocidum	358
Papaverinum hydrochlori- cum	161 188 189 229 237 242 259
Paraffinum liquidum	199
Parathyreoidinum	315
Paregoricum	146
Pasta zinci	437 439 440
Pectolum	147
Penicillinum	96 112 122 123 409 410 411 413
Pentoxylum	281
Pepsinum	171 172
Periplocinum	263

Pervitinum	5
Phenacetinum	62 63
Phenaminum	6 7
Phenatinum	8
Phenolphthaleinum	201
Phenolum	128 129 380
Phenothiazinum	424
Phthalazolum	405
Phthivazidum	396
Phytinum	352
Pilocarpinum hydrochloricum	89 92
Pituitrinum P	302
Pix liquida	98
Platyphyllinum bitartaricum	88
Polygoni hydropiperis ex- tractum	306
Pregninum	328
Primulae radix	151
Progesteronum	329
Prolactinum	318
Promedolum	52 53 54
Proserinum	59
Protargolum	118 366
Pulvis Doveri	144
— Liquiritiae compositi	211
— magnesia cum Rheo	210
Pyramidonum	55 63 156
Redergam	236
Reserpinum	245

Resorcinum	94 363 436
Rhei radix	200 205 206 209
Riboflavinum	337 338 444
Rivanolum	371 372
Rutinum	246
Sajodinum	243
Sal carolinum factitium	194
Salipyrinum	68
Salolum	220 293 294
Salsolinum hydrochloricum	240 241
Sanasinum	420
Sancapheni tabulettae	423
Santoninum	422
Sapo K	455
Schizandra chinensis	12 13
Scopolaminum hydrobromi- cum	25 87 97
Secale cornutum	297 298 299
Senegae radix	153
Sennae folium	203 204
Serum antitbotulinicum	457
— antidiphthericum	458
— antipertussicum	460
— antitetanicum	459
Solutio arsenicalis Fowleri	349
Spasmolytinum	238
Species laxantes	212
Sphaerophysinum benzoicum	300
Spiritus camphoratus	66 72

Spiritus formicicus	75
— vini 96%	65
Streptocidum album	114 120 387 388 391 398 399 400 401 431
Streptomycinum	418
Strophanthinum	264
Strychninum nitricum	14 15
Stypticinum	304
Succus gastricus artificialis	174
— — naturalis	173
Sulfacylum (Albucidum)	105 111 402
Sulfodimezinum	404
Sulfur praecipitatum	428 430 439 440 446 447 454 456
Sulginum	406
Synoestrolum	325
Synthomycinum	416 417
Tabulettae Blaudi	350
Tannalbinum	218
Terpinum hydratum	139
Testosteronum propionicum	331
Theophedrinum	159
Theopyllinum	157 268
Thermopsidis herba	148 149
Thesanum	279 280
Thyreoidinum	308 309 310
Tinctura Absinthii	166
— amarae	167
— Aurantii	169

Tinctura Belladonnae	224
— Capsici	66 74
— Chinae compositae	168
— Convallariae majalis	250 251
— Digitalis	257
— ferri pomati	349
— Ginseng	16
— jodi	356
— Lobeliae	163
— Menthae	185
— opii benzoica	49 145
— — simplex	163 216 224
— Rhei amara spirituosa	168
— Stramonii	163
— Strophanthi	265
— Tormentillae	224
— Valerianae	251 265
Tiphenum	233
Tormentillae rhizoma	223
Triprotamin-zinc-insulinum	320
Tropacinum	39
Trypaflavinum	124
Unguentum Wilkinsoni	453
— zinci	443 456
Urotropinum	189 294 378 379
Urtica dioica	227
Uvae ursi folium	292
Valerianae radix	29 30 227 313

Verodonum	56
Veronalum	35 36
Viburni extractum	307
Vicasolum	284 285
Viride nitens	374
Vitaminum A	332
— B ₁	335 336
— B ₁₂	278
— D	341
— poly-	346
Xeroformium	95 98
Zincum oxydatum	102 431—434 438
— sulfuricum	94 115 368

HAIGUSTE INDEKS

Abortus	27 48 270 301 329 409
Abscessus	270 403 404 409
Achylia gastrica	170—175
Acne vulgaris	211 337 338 344 440
Adipositas	290 291 308 309 310
Adnexitis (gonorrhoeica)	335 346 403 408 409
Agranulocytosis	274 275 279 280 281 409
Agrypnia	32—37
Aktinomycosis	154 409
Alopecia	428 451 452
Amenorrhoea	323—327 329
Amoebiasis	385 386 408
Anaemia alimentaria	170 272—275 346
— perniciosa	274 278 346
Angina	124 334 357 376 404 408—410
— pectoris s. Stenocardia	28 44 228—233
Angiocholitis (Cholangitis)	186—190 404 408 409
Angulus infectiosus	373 408 417 435
Ankylostomatosis	193 422 426
Anthraxis maxillaris	63 83 403 404 409
Anuria	vt. Nephritis acuta
Aphthae epizooticae	354 372 392 404 435
Apoplexia cerebri	193

Arrhythmia absoluta (Fibrillatio; tachysystolia atriorum)	30 259 267
Arteriosclerosis	133 243 244
Arthritis (polyarthritis) infec- tiosa	55 317 420
— rheumatica	55 64—67 322
— urica s. Podagra	69 317
Ascariidosis	193 422 423 425
Asphyxia	3 9 10 17 18 217
Asthma bronchiale	155—165 317
— cardiale	vt. Insufficiëntia cardio- vascularis
Atonia ventriculi	319 347—349
Balanitis	98 354 435
Blastomycosis cutis	362 363 374 437
Blepharitis	106—114
Botulismus	457
Bronchadenitis tuberculosa	vt. Tuberculosis pulmonum
Bronchiectasia	139 148 152 154 156 157 409
Bronchitis	136—154 409
Bronchopneumonia	148 403 404 409
Brucellosis	408 416
Bursitis acuta	409
Cachexia	270 319 347—352
— hypophysaria	270 308—310 317 323—327 330 331
Cancer ventriculi	40—44 52

Carbunculus	98 403 404 409
Cataracta s. Katarakta	271 337 338
Causalgia	73—75
Cephalgia	55 56 58 61—63
Cholelithiasis	42 45 50 52—54 191 193 194 403 404 409
Cholecystitis acuta, chronica	vt. Cholelithiasis
Chorea minor	64 67 317 349 378 379 403 404 409
Cirrhosis hepatis	vt. Hepatitis chronica
Claudicatio intermittens	57 335 336 343—345
Clavus	450
Climax	323—327 330 331
Colica hepatica	vt. Cholelithiasis
Colitis acuta, chronica	145 192—194 196 197 217 222 405 406 408 415
Coma diabeticum	319
Comedones	445
Commotio cerebri	6—8 27 59 270 379 409
Condylomata accuminata	363 436
Conjunctivitis acuta, chron.	94 96 102—104 362 364—366 402 411
Cor pulmonale	vt. Insufficiencia cardio-vascularis
Coryza s. Rhinitis acuta	118—123 414
Cretinismus	308—310
Cystitis	45 292 294 397 398 403 404 409 410 416
Dakryoadenitis (-cystitis)	349 351
Decubitus	79 98 401

Delirium tremens	37 270 319
Dermatitis	432—434
Diabetes insipidus	302 316
— mellitus	319 320
Diarrhoea	46—49 215 216 218 220 223 404 405
Diathesis exsudativa catar- rhalis	282 283
— haemorrhagica s. Haemophilia	284 285
Dilatatio ventriculi acuta	57 270 271 302
Diphtheria	59 335 336 339 340 458
Diphyllobothriosis (Cesto- dosis)	192 193 421
Dyshidrosis	161 282 445 446
Dysenteria	217 405 406 408 416
Dyspepsia intestini acuta	195—197 217 405 406
— putrida	172 175 195—197 293 405 406
— simplex	195—197 217 405 406
Dystrophia hepatis acuta	270 274 275 284 285
— myocardii	vt. Insuff. cardio-vascularis
Ekthyma vulgare	106 377 403 404 409 427 437
Ekzema	436—440
Emphysema pulmonum	163
Encephalitis	6 25 39 379
Endocarditis rheumatica (Pancarditis)	30 64 65 67 68 272 273 347— 350 409

Endocarditis septica acuta	408 409 418
— subacuta s. lenta	55 274 275 409
Enterobiosis s. Oxyuridasis	78 198 422—424
Enterocolitis acuta, chron.	193 225 226 405 406 416
Enuresis nocturna	26 316
Epidermophytia	428 429 445
Epilepsia	27 34 38
Erosio corneae	95 97 115
Erysipelas	403 404 409 440
Eunuchoidismus, Hypogeni- talisimus masculinus	323 330 334
Fibrillatio atriorum	vt. Arrhythmia absoluta
Fissura ani	45 77 211 212 405 406
Furunculus	vt. Carbunculus
Gastritis acuta	180 214 219 225
— chronica hypacida	166—175 339
— — hyperacida	214 221 224 225
Gastroptosis	319 347—350
Glaukoma	89—92
Gonorrhoea	366 403 404 409 412 413 418
Grippus	55 61 63 404 407 409
Haemophilia	vt. Diathesis haemorrhagica
Haemoptoe	141—143 282 283
Haemorrhagia gastrica acuta	282—285
Haemothorax	40—44 282 283
Hemeralopia	332—334 342
Hemicrania	55 63 156 157 229 270

Hepatitis epidemica s.	
Morbus Botkini	170 172 194 270 274 319 344 345
— chronica	170 172 186 187 194 270 274 275 289 291 296 319
Herpes corneae	55 56 93 95 97
— simplex	440
— zoster	55 58 60 64 65 67 335 336 408 409
Highmoritis	vt. Anthritis maxillaris
Hirsutismus	323 325—327
Hidradenitis	95 98 374 409
Hydrothorax	258 282 283 290 291 296
Hyperhidrosis	85 445
Hyperaciditas	vt. Gastritis chron. hyper- acida
Hyperaesthesia oesophagi	76 448
Hyperthyreosis (Morbus Basedowi)	311—314 357
Hypertonia (Morbus hyper- tonicus)	233—237 240—242 245 246
Hypertrophia prostatae	325
Hypogalactia	318
Hypoglycaemia	160 270
Hypothyreosis	308—310
Hypotonia	1—7 160
Hysteria	26—31
Icterus	270 274 319

Impetigo s. Pyodermia	106 358 374 377 400 401 417 419
Incontinentia urinae	16 59 330 331
Infarctus myocardii	40—42 44 52 229 231 232
— pulmonum	40—44 52
Influenza	vt. Grippus
Insufficiëntia cardialis acuta	252—254 263 264 266 269 270
— cardio-vascularis chro-	
— — — nica I	11 28 30 247—251 290
— — — II	252—266 268 289
— — — III	231 255 256 258 264 269 291
— vascularis acuta (col-	
— lapsus)	3 9 10 158 160 269
Iridocyclitis	85—88 418
Katarakta	vt. Cataracta
Keratitis	101 105 270 283 370 379 402 409 411
Kerato-conjunctivitis	
tuberculosa allergica	
(s. scrofulosa)	99 100 105 283 342 395 396 418
Keratomalacia	270 332—334 339 342 402
Keratoconus	89—92 283 341
Kolpitis	98 388 361 367 368 369 403 404 409
— trichomonalis	387—391 451 452
Lambliosis	193 381

Laryngitis	124—127
Leucoma corneae	93 97 100
Lymphadenitis et Lymph- angoitis	409
Lymphogranuloma inguinale	403 404 408 409 416
Malaria	381—384
Mastitis	403 404 409
Mastoiditis	403 404 409
Meningitis	379 409 412
— tuberculosa	395 396 418
Menorrhagia	284 297—300 302 304
Meteorismus	225—227
Metrorrhagia	301 304—307
Morbilli	270 409
Morbus Addisoni	160 317 321 333 339 340
— Basedowi	vt. Hyperthyreosis
— Botkini	vt. Hepatitis epidemica
— hypertonicus	vt. Hypertonia
Myalgia. Myositis	55 64 65 67 70—75
Myocarditis acuta	vt. Insufficiencia cardialis acuta
Myxoedema	vt. Hypothyreosis
Nephritis acuta, chronica	270 282 290 294 403 404 408 409 418
Nephrosis amyloidea	270 282 291 296 409
Nephrolithiasis	44 85
Neuralgia	55 58 60 62 63 335 336
Neurasthenia	26—31 347—352

Neuritis	vt. Neuralgia
Neurodermitis	27 28 342—345 430 440—443
Neurosis cordis	265
— ventriculi	27 28 76
Obstipatio	192—212
Oophoritis	403 404 408 409
Oedema pulmonum	44 264 270 283 291
Orchitis	396 409 418
Otitis externa	128 131 134
— media	128—131 353 403 404 409
Ozaena (Rhinitis foetida)	133
Pancreatitis	175 270 319 403 404 409
Panophthalmitis	409
Paralysis agitans (Parkin- sonismus)	25 39
Paranephritis	409 418
Paratyphus abdominalis	vt. Typhus abdominalis
Parametritis	vt. Adnexitis
Parotitis epidemica	359 409
Pelvioperitonitis	403 404 408 409 418
Pemphigus neonatorum	373 374 417
Pertussis	408 415 416 460
Phlegmona	403 404 409
Pityriasis versicolor	445
Pleuritis exsudativa	64 65 67 136—143 282 283
— sicca	136—143
Pneumonia crouposa	136—153 403 404 409 418
Podagra	vt. Arthritis urica

Polymenorrhoea	vt. Menorrhagia
Prostatitis	403 404 408 409 416
Pruritus cutaneus	441—443
Psychasthenia	27 59 270 282 283
Purpura	246 282 283 339 340 441
Pyelitis	270 292 294 403 404 408 409 418
Pylorospasmus	213
Pyodermia	vt. Impetigo
Rachitis	341 342
Radiculitis lumbosacralis	44 58 60 64—68 282 283 379
Rhagades mammillae	373 417 427 431
Rheumatismus	55 64—67 322
Rhinitis acuta	vt. Coryza
— foetida	vt. Ozaena
Salpingitis	403 408 409 418
Scabies	451—456
Scorbutus	246 339 340
Seborrhoea	444—447
Sepsis	270 399 403 404 408 409 418
Soor	360
Spasmophilia	37 282
Sykosis vulgaris	106 373 417 428 430
Syphilis	392—394 409 412
Tetania	282 283 315
Tetanus	459

Tracheobronchitis acuta	127 136—144 148—153	403 404
Trachoma	105 107 117 370 417	
Trichophytia profunda, superficialis	356 362 363 429	
Tuberculosis pulmonum	395 396 418	
Typhus abdominalis	321 415 416	
Ulcus corneae	89—95 111 112	
— ventriculi, duodeni	161 176—179 282 283	
Urethritis (gonorrhoeica)	vt. Gonorrhoea	
Varicella	373 409	
Varices haemorrhoidales	45	
Verrucae	450	
Vomitus	182—185	

RAVIMITE MAKSIMAAL-

Ravimi nimetus	Täiskasvanuile		Ühekordne	
	pro dosi	pro die	kuni 6 kuud	6 kuud— 1 aasta
Acidum arsenicosum	0,003	0,01		
— nicotinicum (subkut.)	0,1	0,3		
— hydrochloricum purum dilutum	20 gtt.	60 gtt.	1 gtt. (1%)	1 gtt. (1%)
Acrichinum	0,2	0,4	0,0125	0,0125
Adonisdium (subkut.)	30 gtt. 1 ml	60 gtt. 2 ml	1 gtt.	3 gtt.
Adrenalinum solutum (1:1000) (subkut.)	1 ml	—	0,1—0,2 ml	0,25 ml
Amylium nitrosium (sissehingamiseks)	5 gtt.	30 gtt.		
Anaesthesinum	0,5	1,5		
Analginum	1,0	3,0		
Antipyrinum	1,0	3,0	ei kasutata	0,05
Apomorphinum hydro- chloricum	0,01	—	ei kasutata	
— — (subkut.)	0,005	—		
Argentum colloidal (intraven.)	0,25	0,5		
— nitricum	0,03	0,1		
Atropinum sulfuricum	0,001	0,003	0,0002	0,0002
Barbamylium	0,5	1,0		
Bijochinolum (intra- musk.)	3 ml	—	0,3—0,5 ml	0,8 ml

* Ainete lahustuvuse tabelis kasutatud lühendid: k = kergeslahustuv (100—1000); vr = väga raskesti lahustuv (1000—tähistatud vee või piirituse (96%) hulki, milles lahustub 1 osa

ANNUSTE TABEL

lastele					Lahustuvus*	
2 aastat	3—4 aastat	5—6 aastat	7 aastat	8—14 aastat	vees	piirituses
					80	
					70	
2 gtt. 1%	3 gtt., 1,5%	5 gtt., 1,5%	7 gtt., 2%	8—10 gtt., 2%	k	
0,025	0,04	0,05	0,075	0,1	k	k
3 gtt.	5 gtt.	6 gtt.	7 gtt.	8—15 gtt.	k	
0,3 ml	0,4 ml	0,5 ml	0,6 ml	0,6—1 ml	k	
					ei	k
					r	1:5
0,1	0,15	0,2	0,25	0,25—0,3	1,5	r
					1	1,5
0,002	0,0025	0,003	0,003	0,003—0,005	60	50
					lh	
					0,6	30
0,0002	0,00025	0,0003	0,0004	0,0005	1	3
					k	k
1,25 ml	1,25 ml	1,25 ml	1,5 ml	1,5—2 ml	ei	ei

ti lahustuv (1—10 osas); lh = lahustuv (30—100); r = raskesti lahustuv (1000); ei = praktiliselt ei lahustu (üle 10000); arvudega on märgitud ainet.

Ravimi nimetus	Täiskasvanuile		Ühekordne	
	pro dosi	pro die	kuni 6 kuud	6 kuud— 1 aasta
Chloralum hydratum	2,0	6,0	0,1	0,15
Chloroformium	0,5 ml	1 ml		
Cocainum hydrochlori- cum	0,03	0,03		
Codeinum	0,05	0,2	ei kasutata	
— phosphoricum	0,1	0,3	ei kasutata	0,002
Coffeinum	0,3	1,0	ei kasutata	0,025
— natrio-benzoicum	0,5	2,0	0,05	0,05
Convallenum (intraven.)	0,5 ml	—		
— (subkut.)	1 ml	2 ml		
Convasidum (intraven.)	0,5 ml	1 ml		
— (subkut.)	1 ml	2 ml		
Cordiaminum (subkut.)	1 ml	2 ml		
— (per os)	30 gtt.	90 gtt.		
Corazolum	0,1	0,3		
Cuprum sulfuricum (per os) (oksendamisvahend)	0,5	—		
Dioninum	0,03	0,1	ei kasutata	
Diuretinum	1,0	6,0	0,05	0,1
Emetinum hydrochlori- cum (subkut.)	0,05	0,1		
Ephedrinum hydrochlori- cum	0,05	0,15	0,005	0,005
Extractum Belladonnae siccum	0,05	0,15	ei kasutata	0,0025
— Filicis maris aethereum	8,0	—	ei kasutata	
— opii siccum	0,05	0,3	ei kasutata	
— Secalis cor- nuti fluidum	25 gtt.	50 gtt.		
— Strychni	0,025	0,1		

lastele					Lahustuvus	
2 aastat	3—4 aastat	5—6 aastat	7 aastat	8—14 aastat	vees	piiri- tuses
0,15	0,2	0,25	0,3	0,3—0,5	k 200	k k
0,002	0,004	0,005	0,006	0,006—0,01	0,5 150	2,6 2,5
0,003	0,005	0,006—0,008	0,01	0,015—0,02	3,5 80	r 50
0,04	0,05	0,06	0,075	0,075—0,1	2	40
0,06	0,08	0,1	0,15	0,15—0,2	k k k	k
					k	k
0,003	0,005	0,006	0,0075	0,0075—0,01	3 12	r 25
0,15	0,2	0,25	0,3	0,4—0,5	1	
					8	k
0,006	0,008	0,012	0,015	0,015—0,025	25	14
0,003	0,004	0,005	0,0075	0,01—0,015	k	
1,0	1,5—2,0	2,5—3,0	3,5	4,0—5,0	ei k	lh r
		0,01	0,015	0,015—0,02	lh lh	k k

Ravimi nimetus	Täiskasvanuile		Ühekordne	
	pro dosi	pro die	kuni 6 kuud	6 kuud— 1 aasta
Folium Belladonnae	0,2	0,6		
— Convallariae majalis et flos	0,5	1,5		
Folium Digitalis	0,2	1,0	0,005	0,01
— Hyoscyami	0,4	1,2		
— Stramonii	0,2	0,6		
Herba Adonidis vernalis	0,8	10,0	ei kasutata	
— Thermopsidis	0,1	0,3	0,01	0,01
Hexenalum (intraven.)	1,0	—		
Hydrargyrum bichlo- ratum	0,02	0,06		
— chloratum mite s. Calomel	0,6	1,8		
— cyanatum ja oxy- cyanatum (subkut.)	0,01	0,03		
Jodum	0,02	0,06		
Lobelinum hydrochlo- ricum	0,01	0,02	0,0025	0,0025
Luminalum	0,3	0,6	0,01	0,02
Medinalum	1,0	2,0	0,03	0,075
Mercusalum (intramusk.)	2 ml	—	0,1 ml	0,2 ml
Morphinum hydrochlo- ricum	0,03	0,1	ei kasutata	
Natrium arsenicum	0,003	0,01		
— nitrosum	0,3	1,0		
— — (subkut.)	0,05	0,15		
Nitroglycerinum sol.	4 gtt.	10 gtt.		
Norsulfazolium	2,0	7,0		
Novarsenolum (intra- ven.)	0,6	—	0,03—0,15	0,05—0,15
Novocainum (subkut.)	0,2	—		

lastele	Lahustuvus						
	2 aastat	3—4 aastat	5—6 aastat	7 aastat	8—14 aastat	vees	piiri- tuses
	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05—0,075		
	0,15 0,01	0,2 0,015	0,25 0,02	0,3 0,025	0,3—0,5 0,03	k	k
						18,5 ei 13	4 ei 12
						r	ei
						5000 100 ei 5	10 15 k r
	0,003 0,03	0,004 0,05	0,006 0,06	0,0075 0,07	0,01 0,1		
	0,1 0,25 ml	0,15 0,3 ml	0,2 0,5 ml	0,25 0,75 ml	0,3 1 ml		
	0,001	0,0015	0,0025	0,003	0,003—0,006	25 9,7 1,5 r 2000	50 ei r k vr
	0,05— 0,2	0,1— 0,3	0,1— 0,3	0,1— 0,3	0,1—0,3	k 1	ei 8

Ravimi nimetus	Täiskasvanuile		Ühekordne	
	pro dosi	pro die	kuni 6 kuud	6 kuud— 1 aasta
Omnoponum	0,03	0,1	ei kasutata	
Opium	0,1	0,3		
Osarsolum	0,25	1,0		
Papaverinum hydro- chloricum	0,1	0,2	ei kasutata	0,005
Parathyroidinum (sub- kut.)	5 ml	—		
Physostigminum salicy- licum	0,001	0,003		
Pilocarpinum hydro- chloricum (subkut.)	0,01	0,02		
Pituitrinum (subkut.)	2 ml	4 ml		
Plasmocidum	0,02	0,06		
Platyphyllinum bitarta- ricum	0,01	0,03		
Pyramidonum	0,5	1,5	0,025	0,05
Radix Ipecacuanhae (kui ekspektoreeriv vahend)	0,1	0,4	0,01	0,01
Rivanolum	0,05	0,15		
Salipyrinum	1,0	3,0		
Salsolinum hydrochlo- ricum	0,1	0,3		
Santoninum	0,1	0,3		
Scopolaminum hydro- bromicum	0,0005	0,0015		
Secale cornutum	1,0	5,0		
Streptocidum album	2,0	7,0	0,2 keha-	
Strychninum nitricum	0,002	0,005	ei kasutata	

lastele					Lahustuvus	
2 aastat	3—4 aastat	5—6 aastat	7 aastat	8—14 aastat	vees	piiri- tuses
0,002	0,004	0,006	0,007	0,008—0,01	15 r vr	50 vr
0,01	0,015	0,02	0,02	0,03	40	r
					100	12
					1 ei	5 r
					10	r
0,05	0,1	0,1	0,15	0,2—0,3	20	2
0,01	0,015	0,02	0,02	0,025	50 200	10 k
					14 vr	45
					3	17
					250 90	35 70
0,00025	0,0003	0,0005	0,0006	0,00075— 0,001		
kaalu 1 kg kohta ööpäevas						

SISUKORD

Eessõna	3
I. Kesknärvisüsteemi vahendid	5
Ergutavad vahendid	5
Pärssivad vahendid	7
Inhalatsioon-narkootikumid	7
Mitteinhalatsioon-narkootikumid	7
Rahustid	8
Uinutid	9
II. Valuvaigistavad vahendid	10
III. Perifeerse närvisüsteemi vahendid	13
Tundenärvilõpmeid ergutavad vahendid	13
Tundenärvilõpmeid halvavad vahendid	14
IV. Silmavahendid	15
Silmaava laiendavad vahendid	15
Silmaava ahendavad vahendid	16
Desinfitseerivad ja adstringeerivad vahendid	17
Silmalaugude vahendid	18
V. Nina-, kurgu- ja kõrvavahendid	20
VI. Hingamisvahendid	22
Kõhavastased vahendid	22
Ekspektoreerivad vahendid	24
Astmavastased vahendid	25
VII. Mao- ja soolevahendid	27
Maosekretsiooni soodustavad vahendid	27

Seedenõret asendavad vahendid	28
Maosekretsiooni pärssivad vahendid	29
Oksendamisvahendid	29
Oksendamisvastased vahendid	30
Sapiteket ja -voolust soodustavad vahendid	30
Lahtistid	31
Kinnistid ja spasme lõõgastavad vahendid	34
VIII. Veresoonkonna- ja südamevahendid	36
Veresoonkonda laiendavad vahendid	36
Südamenõrkuse vastased vahendid	38
IX. Verevahendid	41
Vereteket soodustavad vahendid	41
Vere hüübimist soodustavad vahendid	43
Vere hüübimist pärssivad vahendid	43
X. Neeruvahendid	44
XI. Emakavahendid	45
XII. Hormoonid ja inhibiitorid	46
Kilpnääre	46
Kilpnäärme inhibiitorid	47
Parathyreoidea	47
Hüpofüüs	48
Pankreas	48
Neerupealis	49
Naissuguhormoonid	49
Meessuguhormoonid	49
XIII. Vitamiinid	50
XIV. Roboreerivad vahendid	52
XV. Mikroobide vastased vahendid	53
Bakteritsiidid	53
Protozoade ja spirillide vastased vahendid	56
Tuberkuloosivastased vahendid	58
Sulfaniilamiidid	58
Antibiootikumid	59

XVI. Parasiitide vastased vahendid	61
XVII. Nahavahendid	62
Naha mädapõletiku vastased vahendid	62
Ekseemi- ja dermatiidivastased vahendid	63
Naha sügelemise vastased vahendid	64
Kõõmavastased vahendid	64
Desensibiliseerivad vahendid	65
Konnasilmavastased vahendid	65
Sügelisvastased vahendid	66
XVIII. Seerumid	66
Ravimite indeks	68
Haiguste indeks	81
Ravimite maksimaalannuste ja lahustuvuse tabel	92

Георг Янович Кингисепп, Олаф Леонхардович
Раявез и Хилья Антсовна Курвитс

СОБРАНИЕ РЕЦЕПТОВ

На эстонском и латинском языках

Эстонское Государственное Издательство
Таллин, Пярнуское шоссе, 10

*

Toimetaja A. Pärn. Tehniline toimetaja I. Vahtre.
Korrektorid H. Peel ja M. Juske

Ladumisele antud 3. V 1957. Trükkimisele antud 27. XI 1957. Paber
60×92, 1/32. Trükipoognaid 3,25. Arvutuspoognaid 2,62. Trükiarv 5000.
MB-00288. Tellimise nr. 1134.

Trükikoda „Pioneer“, Tartu, Kastani 38.

Hind rbl. 1.60

Rbl. 1.60

N ^v
A-388
XVII