





E. ETVERK
A. LINTS
A. VIHMAN


Matemaatika

VII KLASSILE

Ash. els.

2/62 154





A-26158

E. ETVERK, A. LINTS, A. VIHMAN

MATEMAATIKA

VII KLASSILE

KIRJASTUS «EESTI RAAMAT»
TALLINN 1965

Kinnitatud Eesti NSV Haridusministeeriumi poolt.

2



1. KORDAMISEKS.

1. Kirjuta arvude a ja b summa. Arvuta see summa, kui

1) $a = 716$ 2) $a = 1\frac{5}{8}$ 3) $a = 7,5$ 4) $a = -4\frac{1}{2}$

$b = 284$ $b = 2\frac{1}{2}$ $b = 2,95$ $b = 3\frac{3}{4}$

2. Kirjuta arvude m ja n vahe ja arvuta see vahe, kui

1) $m = 1701$ 2) $m = 4,08$ 3) $m = 6\frac{5}{18}$ 4) $a = -13,4$

$n = 601$ $n = 3,9$ $n = 1\frac{11}{24}$ $b = -28,6$

3. Kirjuta kordaja abil lühemalt:

1) $ab + ab + ab + ab + ab$

2) $mx + mx + mx + mx + mx + mx$

4. Kirjuta astendaja abil lühemalt:

1) $aaaaa$ 2) $mmmmmm$

5. Kirjuta lühemalt:

1) $aaann + aaann + aaann + aaann$

2) $a + a + a + aaa + aaa + aaa + aaa + aaa$

3) $xxxxy + xxxyy + xxyyy + xxyyy + xxyyy$

6. Kumb on suurem, kas

4^2 või 2^4 ; 2^3 või 3^2 ; 5^3 või 3^5 ; 3^4 või 4^3 .

7. Arvuta.

1) $4a$ ja a^4 , kui $a = 3$ 4) $3x$ ja x^3 , kui $x = 1\frac{1}{2}$

2) b^3 ja $3b$, kui $b = 5$ 5) $4n$ ja n^4 , kui $n = -2$

3) $2m$ ja m^2 , kui $m = 10$ 6) $5y$ ja y^5 , kui $y = -1$


8. Arvuta.

1) $(\frac{1}{3})^2$ 2) $(\frac{3}{4})^2$ 3) $(\frac{1}{2})^3$ 4) $(0,1)^3$ 5) $(0,5)^2$

9. Arvuta.


1) $2^4 \cdot 5^2$ 2) $8^2 \cdot 5^3$ 3) $2^3 \cdot 5 + 8^2$ 4) $6 + 3 \cdot 2^5$

10. Koosta valem joonisel 1 esitatud kujundi übermõõdu arvutamiseks.



Joon. 1.

11. Ruudukujulisest kartongitükist, mille külje pikkus on a cm, valmistati servi üles pöörates pealt lahtine karp. Selleks lõigati lehe nurkadest välja ruudud külje pikkusega b cm. Avalda saadud karbi ruumala V .




Joon. 2.

12. Kirjuta algebraline avaldis, mida loetakse järgmiselt:


- 1) arvude a ja b summa ruut;
- 2) arvude m ja n ruutude summa;
- 3) arvude a ja b summa kuup;
- 4) arvude a ja b kuupide summa;
- 5) arvude x ja y vahe ruut;
- 6) arvude x ja y ruutude vahe;
- 7) arvude c ja d vahe kuup;
- 8) arvude u ja v kuupide vahe.

13. Avalda joonisel 3 esitatud kujundite pindalad S_1 ja S_2 . Arvuta S_1 ja S_2 , kui $a = 3$ m ja $b = 1$ m.



Joon. 3.


14. Avalda joonisel 4 esitatud kujundite pindalad S_1 ja S_2 . Arvuta need pindalad, kui $a = 1,2$ m ja $b = 0,6$ m.



Joon. 4.

15. Põhjenda joonise 5 abil üksliikme ja hulkliikme korrutamise eeskirja

$$a(b + c + d) = ab + ac + ad.$$




Joon. 5.

16. Korruta

a) hulkliige $2a^3 - 5a + 1$ üksliikmega $-3a^4$;

b) hulkliige $15x^2 - 7x - 25$ üksliikmega $11x^2$.

17. Selgita joonise 6 põhjal hulkliikmete $a + b$ ja $m + n + k$ korrutamise eeskirja



Joon. 6.

$$(a + b)(m + n + k) = am + an + ak + bm + bn + bk.$$

18. Korruta ja koonda tulemus.

a) $(2x^2 - x + 1)(x + 3)$

b) $(a^2 - 2a + 3)(3a^2 + a - 2)$

c) $(x^2 - x + 1)(x + 1)$

d) $(a^2 + 2a + 3)(3a^2 + a - 2)$

19. Sõnasta alljärgnevad valemid.

$$\begin{aligned} (a + b)(a - b) &= a^2 - b^2 \\ (a + b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 \\ (a - b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2 \\ (a + b)^3 &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \\ (a - b)^3 &= a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 \\ (a + b)(a^2 - ab + b^2) &= a^3 + b^3 \\ (a - b)(a^2 + ab + b^2) &= a^3 - b^3 \end{aligned}$$

Joon. 7.

20. Lihtsusta.

- 1) $(3 + a)^2 + (a - 3)^2 - 18$
- 2) $2n^2 + (5 + n)(5 - n) - (5 - n)^2$
- 3) $(2 + x)^3 + (2 - x)^3 - 12x^2$
- 4) $(a - n)(a^2 + an + n^2) + (a - n)^3 + 3an^2$
- 5) $2(3a - b) + 3(4 - 2a) + 2b$

21. Lihtsusta.

- 1) $(4 + b)^2 + (b - 4)^2 - 32$
- 2) $(3 + a)(3 - a) - (3 - a)^2 + 2a^2$
- 3) $(1 + y)^3 + (1 - y)^3 - 6y^2$
- 4) $(b - x)(b^2 + bx + x^2) - (b - x)^3 + 3bx^2$
- 5) $2(10 - 5x) + 5(2x - a) + 5a$

22. Arvuta avaldise väärtus, lihtsustades enne avaldist.

- 1) $(4 + m)(4 - m) + (4 + m)^2 - 32$, kui $m = 1,25$
- 2) $(x + 3)^2 - (x - 3)^2$, kui $x = 15$
- 3) $(a + 2)^3 - (a - 2)^3 - 16$, kui $a = 5$
- 4) $(1 + x)(1 - x + x^2) - (1 + x)^3 + 3x^2$, kui $x = -1,5$

23. Lihtsusta võrduse vasakut poolt ja leia siis saadud võrdusest x .

- 1) $4(2x + 3) + 6(x - 2) = 42$
- 2) $(7 + x)^2 + (8 + x)(8 - x) = 127$
- 3) $(x + 1)^2 - x^2 = 2$
- 4) $2x^2 - 2(x - 3)^2 = 27$

24. Ristküliku ja ruudu ümbermõõdud on võrdsed. Ristküliku pikkus on a meetrit ja laius b meetrit. Leia ruudu külje pikkus.

25. Klassis on 22 tüdrukut ja 18 poissi. Mitu protsenti klassi õpilastest on tüdrukud?

26. Risttahukakujulise siloaugu sügavus on 1,9 m, pikkus 3,4 m ja laius 3,1 m. Silo täidab 85% augu ruumalast. Mitu kuupmeetrit silo on augus?

27. Kauba hinda 220 rubla alandati 10% võrra. Järgmisel aastal alandati selle kauba hinda veel 15% võrra. Kui palju maksab see kaup pärast teistkordset hinnaalandamist?

28. 14-grammise söetüki analüüsimisel selgus, et selles oli 10,4 g süsinikku, 1 g vesinikku, 0,84 g hapnikku, 0,56 g lämmas-

tikku ja peale selle veel mitmesuguseid muid aineid. Mitu prot-senti sisaldas söetükk iga nimetatud ainet?

29. Klassist puudus 4 õpilast ehk 12,5% klassi õpilaste üld-arvust. Leia klassi õpilaste arv.

30. Nimeta kõik x täisarvulised väärtused, mis rahuldavad tingimusi

1) $-5 < x < 2$; 2) $-1007 < x < -1002$; 3) $|x| < 4$.

31. Arvuta ja täida tühjad lahtrid alljärgnevas tabelis.


	1	2	3	4	5	6	7	8
a	3	-8	12	$\frac{5}{18}$	-16	-0,3	-5	824
b	6	4	-3	$-\frac{7}{24}$	-8	0,12	-10	-376
$a + b$								
$a - b$								
$a \cdot b$								
$a : b$								
$\frac{a + b}{a - b}$								
$\frac{a - b}{a \cdot b}$								

32. Täida alljärgnev tabel.


a	18	10	13	-11	-9	-23	750	-96
b	15	-8	-23	3	17	-17	750	-96
$a - b$								
$b - a$								

Millega võrdub $n - m$, kui $m - n = -7$?
 Mis arvud on teineteise suhtes $x - y$ ja $y - x$?

33. Kui lai on jõgi (joon. 8)?




Joon. 8.



Joon. 9.

34. Kui pikk on lõik AB joonise 9 andmeil?

35. Otsusta joonise 10 põhjal, kui suur on punktide A ja B vaheline kaugus.



Joon. 10.

2. ALGEBRALINE MURD.

ÜKSLIHKMETE SUURIM ÜHISTEGUR JA VÄIKSEIM ÜHISKORDNE.

36. Kirjuta järgnevad arvud nende algtegurite korrutistena. Vördsete algtegurite korrutis kirjuta astmena.

Näide. $324 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 2^2 \cdot 3^4$

36	54	81	102	510
40	63	82	121	484

37. Lahuta järgnevad arvud algteguureiks.

42	64	86	144	720
45	72	92	150	1050
49	77	96	169	1352

38. Üksliikme algteguureiks loeme tema kordaja algtegurid ja üksliikmes esinevad tähed. Näiteks üksliikme $60ax^2y^3$ algtegurid on 2, 3, 5, a , x ja y .

Kirjutades üksliikme $60ax^2y^3$ tema algtegurite korrutisena, saame

$$60ax^2y^3 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5ax^2y^3$$

39. Kirjuta üksliige tema algtegurite korrutisena.

$15a$	a^2	m^2n^2	$12a^3bc$
$8x$	$3b^2$	$120ab^3$	$18a^2b^2c^2$
$14b$	$36x^2$	$57x^2y^3$	$8a^5b$
$24a$	$26y^3$	$210ax^2y^3$	$20a^4b^2$
$39z$	$17x^4$	$4a^4b^3x$	$27a^2xy$

40. Leia peast järgmiste arvude suurim ühistegur (SÜT).

9 ja 12	15 ja 35	6; 12 ja 20
10 ja 15	39 ja 52	9; 18 ja 45
21 ja 14	34 ja 51	7; 14 ja 21

41. Arvuta järgmiste arvude SÜT:

112 ja 176	121; 154 ja 165
132 ja 364	102; 136 ja 170
308 ja 392	144; 162 ja 198
360 ja 450	264; 360 ja 600
468 ja 624	104; 525 ja 712

42. Antud üksliikmete suurimaks ühisteguriks on nende üksliikmete kõikide ühiste tegurite korrutis.

Näide: Üksliikmete $3a^2b^3$, $12a^3bc$ ja $18a^2b^2c^2$ SÜT leiame järgmiselt:

$$\begin{array}{r}
 3a^2b^3 = 3 \cdot a^2b^3 \\
 12a^3bc = 2^2 \cdot 3 \cdot a^3bc \\
 18a^2b^2c^2 = 2 \cdot 3^2 \cdot a^2b^2c^2 \\
 \hline
 \text{SÜT} = 3 \cdot a^2b
 \end{array}$$

Ühistegurita üksliikmete SÜT on 1.

43. Leia üksliikmete SÜT.

a ja $2a$	$6a$ ja 8	$14ax^2$ ja $21a^2x$
ab ja b	$7ab$ ja $12ac$	$44cy^3$ ja $77c^2y^2$
$3x$ ja $6x$	a^4 ja a^2	$30m^2p^3q$ ja $65mp^2q^3$
x ja x^2	$14y^3$ ja $7y$	$22a^2b^3c^2$ ja $121a^3bc$
a ja b	$18abc$ ja $12ac$	$42ax^2y^3$ ja $35bx^2$

44. Leia kolme üksliikme SÜT.

a) $15ab^2$	b) $16x^3y^2z$	c) $12mn$	d) $26p^3q^2$
$21a^2b$	$24xy^2z^3$	$18n^2$	$65a^2p^2q^3$
$12ab$	$6x^2y^2z^2$	$30mn^2$	$39p^2q^3$

45. Leia peast järgmiste arvude väikseim ühiskordne (VÜK):

8 ja 12	3; 5 ja 11
12 ja 15	4; 10 ja 16
21 ja 14	5; 12 ja 18
33 ja 22	9; 15 ja 25
24 ja 100	7; 10 ja 21

46. Arvuta järgmiste arvude VÜK.

12; 18; 96 ja 144	240; 810 ja 6300
14; 20; 28 ja 30	42; 56 ja 98
12; 28; 35 ja 40	54; 72 ja 126
12; 20; 36 ja 54	504; 686 ja 1890
18; 24; 32 ja 48	720; 945 ja 3969

47. Antud üksliikmete väikseimaks ühiskordseks nimetame korrutist, mille saame, kui ühe üksliikme korrutame teiste üksliikmete nende teguritega, mis võetud üksliikmes ei esine.

Näide. Üksliikmete $40m^2n^3p$ ja $84mnq^2$ VÜK leiame järgmiselt:

$$40m^2n^3p = 2^3 \cdot 5 \cdot m^2n^3p$$

$$84mnq^2 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot mnq^2$$

$$VÜK = 2^3 \cdot 5 \cdot m^2n^3p \cdot 3 \cdot 7 \cdot q^2 = 2^3 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 7 \cdot m^2n^3pq^2 = 840m^2n^3pq^2.$$

Ühisteguriteta üksliikmete VÜK on nende korrutis. Näiteks $3a^2$ ja $5b$ VÜK on $15a^2b$.

Kui antud üksliikmetest üks jagub kõigi teiste üksliikmetega, siis on ta antud üksliikmete VÜK.

Näiteks üksliikmete $18a^2b$, $54a^2b^2x$ ja $9ab^2$ VÜK on $54a^2b^2x$, sest

$$54a^2b^2x : 18a^2b = 3bx,$$

$$54a^2b^2x : 9ab^2 = 6ax.$$

48. Leia iga üksliikmete paari VÜK.

1) $a; 7$	2) $2y; y$	3) $a; b$	4) $ab; ac$
$2a; 8$	$10x; 5x$	$2a; 2b$	$ab; 5ac$
$8a; 2$	$12b; 4b$	$2a; 5b$	$4ab; 16ac$
$12x; 16$	$2a; 3a$	$14a; 3b$	$24ab; 6a$
$51y; 34$	$6b; 8b$	$15a; 3b$	$36ab; 48ac$

49. Leia iga üksliikmete paari VÜK.

1) $abc; bcd$	2) $a^2; a$	3) $a^2b; a$	4) $a^3; b^3$
$8abc; bcd$	$a^2; 7a$	$a^2b; 2a$	$a^3; ab^3$
$9abc; bc$	$3a; 7a^2$	$3a^2b; 6b$	$a^3; a^2b^3$
$8xyz; 3xy$	$5a; 15a^2$	$18a^2b; 54a^2$	$a^2b; ab^2$
$8xyz; 32xz$	$28a^2; 35a$	$45a^2b; 18b^2$	$ab^2; a^3b$

50. Leia iga üksliikmete paari SÜT ja VUK.

1) $6x; 3x$

$k^2; 7k$

$cv; v$

$x^2y; xy^2$

$2m^2; 3mn$

2) $4np; 2pz$

$6a^2b; 9b^2$

$7t^2; 3t^2$

$12r; 18rp$

$7abc^2; 14abc$

3) $12a^4; 27a^6$

$18x^2y^4; 12x^3y^5$

$15a^2x^3; 35a^3x$

$24x^3y^2; 30xy^4$

$16am^2n; 15am^3n^2$

ALGEBRALISE MURRU MÕISTE.

51. 75 sm^3 õli kaalub 60 g. Arvuta õli erikaal.

52. Auto sõitis a tunniga m kilomeetrit. Mitu kilomeetrit sõitis auto keskmiselt tunnis?

53. Paberi paksuse määramiseks võeti pakk paberit, milles oli n lehte. Paki paksus oli p millimeetrit. Kui paks oli paber?

54. Laua mõõtmed on m meetrit ja n meetrit. Laua poleerimiseks kulus p grammi polituuri. Mida tähendab avaldis $\frac{p}{mn}$?

55. Ruudukujulise põranda värvimiseks kulus v kg värvi. Mida tähendab avaldis $\frac{v}{a^2}$, kui a on põranda pikkus meetrites?

56. Murdu, mille liikmetes esineb tähti, nimetatakse **algebra-**liseks murruks.

Algebraalises murrus $\frac{a}{b}$ tähed a ja b võivad tähendada mistahes arvusid, ainsaks erandiks on, et b ei või olla null. Miks?

57. Murdu $\frac{a}{c}$ võib vaadelda arvude a ja b jagatisena. Iga arvu võib kirjutada murruna, näiteks $x = \frac{x}{1}$.

58. Kirjuta murruna järgmised arvud:

$5; 0; a; b; a^2; a^2b; 2a^3b.$

59. Arvuta murru väärtus, kui temas esinevate tähtede väärtused on antud.

1) $\frac{3a}{5b}; \quad a = 15; b = 9.$

2) $\frac{6ab}{7c}; \quad a = 14; b = 7; c = 12.$

$$3) \quad \frac{4a}{3bc}, \quad a = 6; b = -2; c = 12.$$

$$4) \quad \frac{ax^2}{5b}, \quad a = 10; x = -2; b = 24.$$

$$5) \quad \frac{a+b}{a-b}, \quad a = 2,6; b = 2,4.$$

$$6) \quad \frac{3a+2b}{2a-3b}, \quad a = 5; b = 3.$$

60. Millist väärtust ei või omada murru nimetajas esinev täht igas alljärgnevas murrus:

$$\frac{m}{n}; \quad \frac{3}{n}; \quad \frac{5}{1-x}; \quad \frac{a}{x-2}; \quad \frac{5}{2+a}; \quad \frac{m}{x+3}?$$

MURRU PÕHIOMADUS.

61. Murd $\frac{a}{b}$ on arvude a ja b jagatis. Jagatise omadustest on teada, et jagatis ei muutu, kui jagatavat ja jagajat suurendada või vähendada üks ja sama arv korda. Sellest järeldub, et murru $\frac{a}{b}$ väärtus jääb endiseks, kui ta lugejat ja nimetajat korrutada või jagada ühe ja sama nullist erineva arvuga.

Miks ei või murru lugejat ja nimetajat korrutada nulliga? jagada nulliga?

62. Eelmisest ülesandest järeldub algebralise murru põhiomadus:

$$\boxed{\frac{a}{b} = \frac{ma}{mb}, \quad \frac{a}{b} = \frac{a:m}{b:m}}$$

Murru väärtus ei muutu, kui tema lugejat ja nimetajat korrutada või jagada ühe ja sama nullist erineva arvuga.

63. Murru lugeja ja nimetaja korrutamist ühe ja sama arvuga nimetatakse murru laiendamiseks. Arvu, millega murru laiendamisel lugejat ja nimetajat korrutatakse, nimetatakse laiendajaks.

Laiendame näiteks 3-ga murdu $\frac{a}{5}$, saame

$$\frac{a}{5} = \frac{3 \cdot a}{3 \cdot 5} = \frac{3a}{15}.$$

64. Laienda

4-ga murdu $\frac{1}{2}$;	2-ga murdu $\frac{a}{b}$;	8-ga murdu $\frac{a}{3}$;
5-ga „ $\frac{1}{3}$;	7-ga „ $\frac{a}{2}$;	3-ga „ $\frac{x}{5}$;
6-ga „ $\frac{1}{4}$;	12-ga „ $\frac{3}{x}$;	4-ga „ $\frac{2x}{7}$;
3-ga „ $\frac{3}{4}$;	10-ga „ $\frac{2a}{3b}$;	3-ga „ $\frac{1}{2a}$;
8-ga „ $\frac{7}{8}$;	4-ga „ $\frac{5x}{6y}$;	4-ga „ $\frac{5}{6a}$;

65. Laienda

b -ga murdu $\frac{5}{9}$;	5-ga murdu $\frac{3a}{4c}$;
a -ga „ $\frac{8}{13}$;	$3n$ -ga „ $\frac{12m}{17n}$;
c -ga „ $\frac{7}{10}$;	$2n$ -ga „ $\frac{12m}{17n}$;
$3k$ -ga „ $\frac{7}{12}$;	$5x$ -ga „ $\frac{24xy}{25z}$;
$10x$ -ga „ $\frac{2}{3}$;	$3xy^2$ -ga „ $\frac{24xy}{25z}$;

66. Murru laiendamiseks antud nimetajani leiame esmalt laiendaja, mille saame, kui jagame uue nimetaja antud murru nimetajaga. Saadud jagatisega laiendame antud murdu.

Näiteid. 1) Laienda murd $\frac{2}{37}$ nimetajani 111.

$$111 : 37 = 3; \quad \frac{\frac{2}{37}}{3} = \frac{6}{111}$$

2) Laienda murd $\frac{2m}{13n}$ nimetajani $52m^2n$.

$$52m^2n : 13n = 4m^2; \quad \frac{\frac{4m^2}{13n}}{4m^2} = \frac{8m^3}{52m^2n}$$

Kui võimalik, siis laiendaja leitakse peast.

67. Laienda murd

$\frac{3a}{4b}$ nimetajani $20b$;	$\frac{a}{n}$ nimetajani bn^2
$\frac{5m}{4n}$ „ $24n$;	$\frac{3}{7}$ „ 259 ;

$$\frac{14x}{45y} \text{ nimetajani } 180xy^2;$$

$$\frac{a}{b} \quad " \quad 4a^2b^2;$$

$$\frac{12}{13} \quad " \quad 169;$$

$$\frac{b}{x} \text{ nimetajani } 2ax;$$

$$\frac{a}{4b} \quad " \quad 12ab^2;$$

$$\frac{3m^2n}{4xy} \quad " \quad 12m^2xy.$$

MURRU TAANDAMINE.

68. Murru lugeja ja nimetaja jagamist nende ühisteguriga nimetatakse murru taandamiseks.

$$\frac{\overset{3}{12} \overset{1}{ab^2c}}{\underset{2}{8} \underset{c}{ab^2c}} = \frac{3}{2c}; \quad \frac{\overset{1}{4} \overset{1}{mnx}}{\underset{2}{8} \underset{nx}{mn^2x^2}} = \frac{1}{2nx}$$

69. Missugust murdu nimetatakse taandumatuks? Millega peab murdu taandama, et saada taandumatu murd?

70 Taanda järgmised murrud:

$$1) \begin{array}{r} 16 \\ 40 \\ \hline 15 \\ 18 \\ \hline 40 \\ 88 \\ \hline 27 \\ 63 \\ \hline 57 \\ 243 \end{array}$$

$$2) \begin{array}{r} 12 \\ 64 \\ \hline 24 \\ 78 \\ \hline 24 \\ 54 \\ \hline 40 \\ 96 \\ \hline 115 \\ 320 \end{array}$$

$$3) \begin{array}{r} 14 \\ 35 \\ \hline 33 \\ 88 \\ \hline 35 \\ 63 \\ \hline 39 \\ 91 \\ \hline 117 \\ 130 \end{array}$$

$$4) \begin{array}{r} 24 \\ 66 \\ \hline 28 \\ 32 \\ \hline 88 \\ 121 \\ \hline 60 \\ 84 \\ \hline 132 \\ 143 \end{array}$$

$$5) \begin{array}{r} 28 \\ 72 \\ \hline 14 \\ 49 \\ \hline 30 \\ 84 \\ \hline 42 \\ 72 \\ \hline 112 \\ 176 \end{array}$$

$$6) \begin{array}{r} 21 \\ 63 \\ \hline 27 \\ 72 \\ \hline 24 \\ 70 \\ \hline 84 \\ 220 \\ \hline 308 \\ 392 \end{array}$$

$$7) \begin{array}{r} 2 \cdot 6 \\ 42 \\ \hline 3 \\ 2 \cdot 3 \\ \hline 4 \\ 3 \cdot 8 \\ \hline 6 \\ 3 \cdot 10 \\ \hline 3 \cdot 4 \\ 9 \end{array}$$

$$8) \begin{array}{r} -12 \\ 6 \cdot 5 \\ \hline -8 \cdot 5 \\ 12 \\ \hline 5 \cdot 16 \\ -32 \\ \hline 3 \cdot (-12) \\ 40 \\ \hline -36 \cdot 5 \\ -96 \end{array}$$

$$9) \begin{array}{r} 72 \cdot 6 \\ -36 \\ \hline 22 \\ -33 \cdot 9 \\ \hline 17 \cdot (-2) \\ -51 \\ \hline -36 \\ -5 \cdot (-24) \\ \hline -75 \cdot 3 \\ -50 \end{array}$$

$$10) \begin{array}{r} 3 \cdot 12 \\ 18 \cdot 24 \\ \hline -15 \cdot 20 \\ 45 \cdot 30 \\ \hline -3 \cdot 8 \cdot 36 \\ -2 \cdot 9 \cdot 48 \\ \hline -4 \cdot (-7) \cdot 15 \\ 3 \cdot 7 \cdot 50 \\ \hline 2 \cdot (-6) \cdot 32 \\ 45 \cdot 5 \cdot (-6) \end{array}$$

71. Taanda järgmised murrud:

$$1) \frac{6a}{4}$$

$$\frac{6}{2a}$$

$$\frac{8b}{4a}$$

$$\frac{3a}{5a}$$

$$\frac{b}{2b}$$

$$2) \frac{12}{6a}$$

$$\frac{5a}{10}$$

$$\frac{9a}{3b}$$

$$\frac{5c}{7c}$$

$$\frac{n}{3n}$$

$$3) \frac{ab^2}{abc}$$

$$\frac{9ax}{15a^2}$$

$$\frac{15ax^2}{35bx^3}$$

$$\frac{12a^2b^2x}{18a^2b^2y}$$

$$\frac{20ab^2c^3}{48a^2b^3c^4}$$

$$4) \frac{a^2b}{abc}$$

$$\frac{8a^2}{12ax}$$

$$\frac{9ax^3}{6bx^2}$$

$$\frac{18a^2b^3y}{24a^2b^3x}$$

$$\frac{36a^2b^3c^4}{30ab^2c^3}$$

$$5) \frac{15a^2}{35ab}$$

$$\frac{26ab^2}{65a^2b}$$

$$\frac{48a^2bc}{78abc^2}$$

$$\frac{33m^2nx}{48mnx}$$

$$\frac{74p^2q^4}{37npq^3}$$

$$6) \frac{96m^2n^2}{72m^3n^3}$$

$$\frac{144mn^2p^3}{192m^2np}$$

$$\frac{169m^4n^3}{195m^2np^2}$$

$$\frac{57c^3u^4v^5}{190c^4u^3v^5}$$

$$\frac{105x^2z^2}{360x^3z}$$

$$7) \frac{ab \cdot 5ab}{10ab^2 \cdot 4b^2}$$

$$\frac{21x^3 \cdot 6y^3}{7xy \cdot 18xy}$$

$$\frac{39mp^2 \cdot 4n^2p}{26mn \cdot 7np}$$

$$\frac{32u^2 \cdot 49v^2}{56uv \cdot 28uv}$$

$$\frac{18x^2 \cdot 32y}{32x^2 \cdot 45y^3}$$

MURDUDE TEISENDAMINE ÜHENIMELISTEKS.

72. Milliseid murde nimetatakse isenimelisteks? Milliseid murde nimetatakse ühenimelisteks? Mis on antud murdude ühiseks nimetajaks, kui nimetajad on ühistegurita?

Mis on antud murdude ühiseks nimetajaks, kui üks nimetajaist jagub teistega?

Mis võetakse antud isenimeliste murdude ühiseks nimetajaks?

73. Teisenda ühenimelisteks murrud:

$$1) \frac{2}{3} \text{ ja } \frac{3}{5}$$

$$\frac{5}{7} \text{ ja } \frac{4}{15}$$

$$\frac{2}{7} \text{ ja } \frac{5}{8}$$

$$\frac{1}{2} \text{ ja } \frac{7}{11}$$

$$\frac{6}{11} \text{ ja } \frac{7}{12}$$

$$2) \frac{5}{7} \text{ ja } \frac{5}{21}$$

$$\frac{3}{5} \text{ ja } \frac{7}{15}$$

$$\frac{3}{5} \text{ ja } \frac{8}{45}$$

$$\frac{3}{55} \text{ ja } \frac{10}{11}$$

$$\frac{13}{144} \text{ ja } \frac{7}{12}$$

$$3) \frac{5}{26} \text{ ja } \frac{1}{51}$$

$$\frac{11}{63} \text{ ja } \frac{13}{126}$$

$$\frac{13}{54} \text{ ja } \frac{7}{81}$$

$$\frac{1}{81} \text{ ja } \frac{49}{135}$$

$$\frac{34}{35} \text{ ja } \frac{54}{55}$$

$$4) \frac{2}{3}, \frac{3}{5} \text{ ja } \frac{5}{7} \\ \frac{3}{5}, \frac{5}{7} \text{ ja } \frac{4}{15} \\ \frac{23}{24}, \frac{7}{8} \text{ ja } \frac{59}{60}$$

$$5) \frac{2}{7}, \frac{5}{8}, \frac{7}{11} \text{ ja } \frac{1}{2} \\ \frac{6}{11}, \frac{7}{12}, \frac{8}{13} \text{ ja } \frac{9}{14} \\ \frac{11}{50}, \frac{23}{125}, \frac{29}{150} \text{ ja } \frac{34}{225}$$

74. Näide. Teisenda murrud $\frac{a}{3b}$ ja $\frac{b}{4c}$ ühenimelisteks.

Lahendus. Et antud murdude nimetajad on ühistegurita, siis ühiseks nimetajaks on antud nimetajate korrutis.

$$3b \cdot 4c = 12bc.$$

Vastavad laiendajad on $4c$ ja $3b$.

Seega

$$\frac{a}{3b} = \frac{a \cdot 4c}{3b \cdot 4c} = \frac{4ac}{12bc}$$

$$\frac{b}{4c} = \frac{b \cdot 3b}{4c \cdot 3b} = \frac{3b^2}{12bc}$$

75. Näide. Teisenda murrud

$$\frac{7c}{12abx}, \frac{13x}{20ab^2} \text{ ja } \frac{8b}{15a^2x^3}$$

ühenimelisteks.

Lahendus. Lahutades nimetajad algteguriteks, saame

$$2^2 \cdot 3 \cdot abx \quad 2^2 \cdot 5 \cdot ab^2 \quad 3 \cdot 5 \cdot a^2x^3;$$

seega nimetajate väikseim ühiskordne on

$$2^2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot a^2b^2x^3 = 60a^2b^2x^3.$$

Leitud väikseim ühiskordne $60a^2b^2x^3$ on antud murdude ühiseks nimetajaks. Jagades saadud ühise nimetaja antud murdude nimetajatega, leiame vastavad laiendajad:

$$60a^2b^2x^3 : 12abx = 5abx^2;$$

$$60a^2b^2x^3 : 20ab^2 = 3ax^3;$$

$$60a^2b^2x^3 : 15a^2x^3 = 4b^2.$$

Laiendades antud murde nende laiendajatega, saamegi ühenimelised murrud:

$$\frac{7c \cdot 5abx^2}{12abx \cdot 5abx^2} = \frac{35abcx^2}{60a^2b^2x^3};$$

$$\frac{13x \cdot 3ax^3}{20ab^2 \cdot 3ax^3} = \frac{39ax^4}{60a^2b^2x^3},$$

$$\frac{8b \cdot 4b^2}{15a^2x^3 \cdot 4b^2} = \frac{32b^3}{60a^2b^2x^3}.$$

76. Teisenda järgmised murrud ühenimelisteks:

1) $\frac{a}{b}$
 $\frac{c}{d}$

2) $\frac{a}{3b}$
 $\frac{c}{4d}$

3) $\frac{a}{a^2}$
 $\frac{3}{b}$

4) $\frac{p}{a^2}$
 $\frac{q}{2ab}$

5) $\frac{2a^2}{x}$
 $\frac{3b}{y}$
 $\frac{4c}{z}$

6) $\frac{4x}{a^2}$
 $\frac{3y}{2b^2}$
 $\frac{5y}{4ab}$

7) $\frac{2m}{3a^3}$
 $\frac{n}{12a^2b}$
 $\frac{5n}{18ab^2}$

8) $\frac{p}{4m^2n}$
 $\frac{3p^2}{2mn^3}$
 $\frac{5}{14m^3n^2}$

9) $\frac{x}{a}$
 a^2
 $\frac{y}{3a^3b}$

10) $2b$
 $\frac{a}{3x^2}$
 $\frac{3ab}{5xy}$

11) $\frac{2p}{3m^2}$
 $\frac{5p^2}{6m^2n^2}$
 $3mn$

12) $\frac{5b}{24a^2c^3}$
 $5d$
 $\frac{7a}{36c^2}$

13) $\frac{5}{a}$
 $\frac{4}{a^2}$
 $\frac{1}{a^3}$

14) x
 $\frac{1}{2a}$
 $\frac{1}{4}$

15) 2
 9
 $\frac{4}{5x^2}$

16) $\frac{1}{x}$
 $\frac{1}{x^2}$
 $\frac{1}{x^3}$

MURDUDE LIITMINE JA LAHUTAMINE.

77. Ühenimeliste murdude summa on murd, mille lugejaks on antud murdude lugejate summa ja nimetajaks on liidetavate nimetaja;

$$\boxed{\frac{a}{n} + \frac{b}{n} + \frac{c}{n} = \frac{a+b+c}{n}}$$

78. Liida murrud:

$$\frac{2}{7} + \frac{3}{7}$$

$$\frac{4}{a} + \frac{5}{a}$$

$$\frac{-p}{q} + \frac{2p}{q}$$

$$\frac{8}{15} + \frac{2}{15}$$

$$\frac{3a}{k} + \frac{a}{k}$$

$$\frac{r}{10s} + \frac{1}{10s}$$

$$\frac{2x}{3} + \frac{4x}{3}$$

$$\frac{5u^3}{b} + \frac{u^3}{b}$$

$$\frac{-3u}{-5v} + \frac{2u}{5v}$$

$$\frac{4R}{9} + \frac{R}{9}$$

$$\frac{7}{2h} + \frac{k}{2h}$$

$$\frac{92a^2}{35y} + \frac{8ab}{35y}$$

$$\frac{p^2}{4} + \frac{3p^2}{4}$$

$$\frac{4m^2}{3n} + \frac{1}{3n}$$

$$\frac{a}{a^2} + \frac{1}{a^2}$$

79. Murru $\frac{1}{2}$ vastandaruks on $-\frac{1}{2}$ ja murru $\frac{a}{b}$ vastandaruks $-\frac{a}{b}$.

Kirjuta järgmiste arvude vastandaruks:

$$-\frac{2}{3}; \quad \frac{3}{5}; \quad -\frac{a}{b}; \quad -\frac{m}{4}; \quad -\frac{5}{n}.$$

80. 1) Teades, et arvu korrutamine (või jagamine) -1 -ga on samaväärne märgi vahetamisega arvu ees ja et murru korrutamisel täisarvuga korrutatakse murru lugeja selle täisarvuga, võime kirjutada:

$$-\frac{a}{b} = (-1) \cdot \frac{a}{b} = \frac{(-1) \cdot a}{b} = \frac{-a}{b}.$$

Seega

$$\boxed{-\frac{a}{b} = \frac{-a}{b}}$$

Teades ka, et murru jagamisel täisarvuga korrutatakse murru nimetaja selle täisarvuga, võime kirjutada:

$$-\frac{a}{b} = \frac{a}{b} : (-1) = \frac{a}{(-1) \cdot b} = \frac{a}{-b}.$$

Niisiis

$$\boxed{-\frac{a}{b} = \frac{a}{-b}}$$

2) Laiendades murdu $\frac{a}{b}$ arvuga -1 , saame

$$\frac{a}{b} = \frac{(-1) \cdot a}{(-1) \cdot b} = \frac{-a}{-b}, \text{ seega}$$

$$\boxed{\frac{a}{b} = \frac{-a}{-b}}$$

Murru väärtus ei muutu, kui muuta märk vastupidiseks murru ees ja murru ühes liikmes.

Murru väärtus ei muutu, kui muuta märk vastupidiseks murru mõlemas liikmes.

81. Kirjuta järgnevad murrud miinusmärgita murru ees:

$$-\frac{3}{4}; \quad -\frac{a}{2}; \quad -\frac{m}{n}; \quad -\frac{-3}{m}; \quad -\frac{a}{-2}.$$

82. Kirjuta järgnevad murrud miinusmärgita murru liikmete ees:

$$\frac{-2}{-5}; \quad \frac{-x}{2}; \quad \frac{a}{-b}; \quad \frac{5}{-n}; \quad \frac{n}{-3}.$$

83. Murru lahutamisel liidame lahutatava murru vastandaru. Selgita järgmist sümbolites kirjutatud arutlust:

$$\begin{aligned} \frac{a}{n} - \frac{b}{n} - \frac{c}{n} &= \frac{a}{n} + \left(-\frac{b}{n}\right) + \left(-\frac{c}{n}\right) = \\ &= \frac{a}{n} + \frac{-b}{n} + \frac{-c}{n} = \frac{a + (-b) + (-c)}{n} = \frac{a - b - c}{n}. \end{aligned}$$

$$\boxed{\frac{a}{n} - \frac{b}{n} - \frac{c}{n} = \frac{a - b - c}{n}}$$

84. Liida murrud ja kui võimalik, siis taanda tulemus.

$$1) \frac{2}{15} + \frac{1}{15} + \frac{7}{15}$$

$$\frac{5}{18} + \frac{11}{18} - \frac{7}{18}$$

$$\frac{4}{9} - \frac{5}{9} + \frac{4}{9}$$

$$2) \frac{3}{10} - \frac{9}{10} + \frac{1}{10}$$

$$\frac{3}{28} + \frac{9}{28} - \frac{5}{28}$$

$$\frac{11}{12} - \frac{1}{12} - \frac{7}{12}$$

$$3) \frac{7a}{10} - \frac{3a}{10}$$

$$\frac{5g}{16} + \frac{3g}{16}$$

$$\frac{2m}{3n} + \frac{m}{3n}$$

$$4) \frac{15x}{16y} - \frac{7x}{16y}$$

$$\frac{a}{2} - \frac{a}{2}$$

$$\frac{2ab}{5x} + \frac{ab}{5x}$$

85. Arvuta.

$$1) \frac{a}{3b} + \frac{a}{3b} + \frac{a}{3b}$$

$$\frac{a^2}{3} + \frac{2b^2}{3} - \frac{4c^2}{3}$$

$$\frac{a}{x} + \frac{3a}{x} + \frac{5a}{x}$$

$$\frac{10x}{9a} - \frac{5x}{9a} + \frac{x}{9a}$$

$$\frac{9}{10a^2} - \frac{3}{10a^2} - \frac{1}{10a^2}$$

$$2) \frac{2a+5}{6} + \frac{3a+2}{6}$$

$$\frac{4m+8}{3} + \frac{2m-8}{3}$$

$$\frac{7n+12}{8} - \frac{3n+12}{8}$$

$$\frac{14x-9}{10} - \frac{6x+2}{10}$$

$$\frac{m+n}{2} + \frac{m-n}{2}$$

Näide.

$$\frac{16x-3}{7} - \frac{2x-3}{7} = \frac{16x-3-(2x-3)}{7} = \frac{16x-3-2x+3}{7} = \frac{14x}{7} = 2x.$$

86. Arvuta.

$$1) \frac{m+n}{4p} - \frac{m-n}{4p}$$

$$\frac{24x-6y}{7} - \frac{10x-48y}{7}$$

$$\frac{7m+8n}{3m} - \frac{3m-5n}{3m}$$

$$\frac{20a-9}{6b} - \frac{8a-9}{6b}$$

$$\frac{7x+5}{2y} + \frac{7x-5}{2y}$$

$$2) \frac{3a}{a+b} + \frac{5a}{a+b} + \frac{7a}{a+b}$$

$$\frac{a+b}{a-b} - \frac{b}{a-b}$$

$$\frac{a}{a+b} + \frac{b}{a+b}$$

$$\frac{a}{x} - \frac{b+c+d}{x}$$

$$\frac{2a+3b}{a-b} - \frac{a+4b}{a-b}$$

$$3) \frac{4a+b}{8} + \frac{2a-b}{8}$$

$$\frac{a+b}{10} + \frac{a-b}{10}$$

$$\frac{a+y}{3m} + \frac{2a-y}{3m}$$

$$\frac{5c-3u}{6n^2} + \frac{7c+3u}{6n^2}$$

$$\frac{2r-t}{s^2} + \frac{t-r}{s^2}$$

$$4) \frac{5a+b}{4} - \frac{a+b}{4}$$

$$\frac{c+nd}{2} - \frac{c-nd}{2}$$

$$\frac{6x-32}{2R^2} - \frac{4x-32}{2R^2}$$

$$\frac{58a^2-81}{27D^2} - \frac{58a^2}{27D^2}$$

$$\frac{19N-23}{8h^3} - \frac{1+19N}{8h^3}$$

87. Isenimeliste murdude algebralisel liitmisel

- 1) leiame nende murdude ühise nimetaja, võttes selleks antud nimetajate VÜK;
- 2) leiame igale antud murrule laiendaja, milleks jagame leitud VÜK iga nimetajaga;
- 3) laiendame iga antud murdu leitud laiendajaga;
- 4) arvutame saadud ühenimeliste murdude summa;
- 5) kui võimalik, siis koondame saadud murru lugejat;
- 6) kui võimalik, siis taandame saadud murdu.

Näiteid. 1) *Leiame summa*

$$\frac{2a+b}{2ab} - \frac{a+b}{b^2} + \frac{a}{b^2}.$$

$$\frac{2a+b}{2ab} - \frac{a+b}{b^2} + \frac{a}{b^2} =$$

1) Ühiseks nimetajaks on $2ab^2$.

$$= \frac{\overset{b}{2a+b}}{2ab} - \frac{a+b}{b^2} + \frac{\overset{2a}{2a}}{b^2} =$$

2) Laiendajad on:
 $2ab^2 : 2ab = b$;
 $2ab^2 : b^2 = 2a$.

$$= \frac{2ab+b^2}{2ab^2} - \frac{2a^2+2ab}{2ab^2} + \frac{2a^2}{2ab^2} =$$

3) Laiendame iga murdu leitud laiendajaga.

$$= \frac{2ab+b^2-(2a^2+2ab)+2a^2}{2ab^2} =$$

4) Liidame lugejad.

$$= \frac{2ab+b^2-2a^2-2ab+2a^2}{2ab^2} =$$

5) Koondame lugeja.

$$= \frac{b^2}{2ab^2} = \frac{1}{2a}.$$

6) Taandame.

2) *Arvuta summa* $2a + \frac{b^3}{5c^2}$.

Lahendus. $2a + \frac{b^3}{5c^2} = \frac{\overset{5c^2}{2a}}{1} + \frac{\overset{1}{b^3}}{5c^2} = \frac{10ac^2+b^3}{5c^2}.$

88. Arvuta.

1) $\frac{1}{3} + \frac{1}{4}$

2) $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$

3) $\frac{1}{3x} + \frac{1}{3y}$

4) $1 + \frac{a}{3}$

$\frac{1}{3} + \frac{1}{5}$

$\frac{1}{f} + \frac{1}{g}$

$\frac{1}{5a} + \frac{1}{7b}$

$5 + \frac{b}{5}$

$\frac{1}{6} + \frac{1}{7}$

$\frac{1}{a} + \frac{1}{x}$

$\frac{1}{4m} + \frac{1}{5n}$

$1 + \frac{2}{x}$

$\frac{1}{5} + \frac{1}{8}$

$\frac{1}{b} + \frac{1}{y}$

$\frac{1}{3} + \frac{1}{8u}$

$4 + \frac{3}{x}$

$$5) a + \frac{b}{c}$$

$$3 + \frac{a}{b}$$

$$ab - \frac{2}{d}$$

$$3a - \frac{a}{2}$$

$$6) m + \frac{2m+3n}{2}$$

$$4 + \frac{a+x}{4}$$

$$8 + \frac{a-x}{4}$$

$$2a + \frac{2a+3b}{2b}$$

$$7) \frac{9}{25} - \frac{8}{45}$$

$$\frac{1-2x}{6} + \frac{1+x}{3}$$

$$\frac{2b}{15a} + \frac{b}{5a}$$

$$\frac{x}{3a} - \frac{1}{3a^2}$$

89. Arvuta.

$$1) \frac{1}{m} - \frac{1}{n}$$

$$\frac{1}{a} - \frac{1}{b}$$

$$\frac{3}{a} - \frac{1}{2a}$$

$$\frac{5}{a} - \frac{2}{3a}$$

$$\frac{y}{z} - \frac{z}{mx}$$

$$2) \frac{2}{3x} - \frac{3}{2y}$$

$$\frac{4}{5a} - \frac{6}{7b}$$

$$\frac{a}{b} - \frac{c}{d}$$

$$\frac{1}{a} - \frac{2}{b}$$

$$\frac{2}{b} - \frac{3}{ab}$$

$$3) 1 - \frac{a}{3}$$

$$5 - \frac{b}{5}$$

$$1 - \frac{2}{x}$$

$$4 - \frac{3}{x}$$

$$3 - \frac{2}{a}$$

$$4) 5 - \frac{a+x}{3}$$

$$7 - \frac{a-x}{6}$$

$$3m - \frac{4m+5n}{3}$$

$$3a - \frac{8a+3c}{2b}$$

$$4 - \frac{2+a}{3}$$

$$5) a - b - \frac{a^2-b^2}{a}$$

$$a + b - \frac{a^2-b^2+ab}{a}$$

$$1 + \frac{a}{1-a}$$

$$1 - \frac{a}{1+a}$$

$$6) a^2 - \frac{3b^3+a^3}{a}$$

$$\frac{a^2+b^2}{a+b} + a - b$$

$$\frac{a^2+b^3}{a-b} - (a+b)$$

$$a^2 - ab + b^2 - \frac{b^3}{a+b}$$

$$7) 3a + 2b - \frac{2a^2-b^2}{a}$$

$$\frac{x^2+y^2}{x+y} + 3(x-y)$$

$$x^2 + xy + y^2 + \frac{y^3}{x-y}$$

$$\frac{n^3}{n^2-2n+4} + n + 2$$

90. Arvuta.

$$1) \frac{1}{4} + \frac{3}{8}$$

$$\frac{8}{15} + \frac{2}{5}$$

$$\frac{5}{8} - \frac{1}{2}$$

$$\frac{9}{10} - \frac{5}{4}$$

$$\frac{5}{6} + \frac{7}{12}$$

$$2) \frac{a}{4} + \frac{a}{12}$$

$$\frac{c}{3} - \frac{c}{6}$$

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{3p}$$

$$\frac{5}{4q} - \frac{3}{2q}$$

$$\frac{1}{a} + \frac{2}{ab}$$

$$3) \frac{2m}{ar} - \frac{a}{r}$$

$$\frac{b}{a^2} + \frac{c}{a}$$

$$\frac{5u}{6a^2} - \frac{u}{3a}$$

$$\frac{5}{a^2} - \frac{4}{a^2b^2}$$

$$\frac{7}{4x^3} + \frac{3}{x^2}$$

$$4) \frac{2}{a^2} - \frac{3}{ab}$$

$$\frac{m}{x^2y} - \frac{n}{xy^2}$$

$$\frac{3x}{4a^2b} + \frac{5y}{6ab^2}$$

$$\frac{5n}{6m^2} - \frac{7p}{6mn^2}$$

$$\frac{3ab}{10c^2d} + \frac{2c}{15d^2}$$

$$5) \frac{a+4}{2} + \frac{a+5}{3}$$

$$\frac{x+7}{4} + \frac{x-21}{12}$$

$$\frac{x-1}{6} + \frac{x+4}{21}$$

$$\frac{p+2q}{3} - \frac{5p+16q}{24}$$

$$\frac{5a-7b}{14} - \frac{a-3b}{6}$$

$$6) \frac{am+bn}{ab} + \frac{am+cn}{ac}$$

$$\frac{a^2-1}{2a} - \frac{a-1}{2}$$

$$\frac{m^2+n^2}{mn} + \frac{1-n}{m}$$

$$\frac{p^2+q^2}{pq} - \frac{p-1}{q}$$

$$\frac{1}{a} - \frac{b+1}{ab}$$

91. Näide. Teisendame murru $\frac{a}{m-n}$ murruks nimetajaga $n-m$. Selleks laiendame seda murdu (-1) -ga.

Saame

$$\frac{a}{m-n} = \frac{-a}{-(m-n)} = \frac{-a}{n-m}.$$

Seega

$$\frac{a}{m-n} = \frac{-a}{n-m}.$$

92. Näide. Teisendame summat

$$\frac{a}{m-n} + \frac{b}{n-m}.$$

Saame

$$\frac{a}{m-n} + \frac{b}{n-m} = \frac{a}{m-n} + \frac{-b}{m-n} = \frac{a-b}{m-n}.$$

93. Arvuta.

$$1) \frac{x}{3} - \frac{y}{-3}$$

$$\frac{2}{a} - \frac{1}{-a}$$

$$\frac{4}{3a} + \frac{1}{-3a}$$

$$\frac{1}{a+x} - \frac{1}{-a-x}$$

$$\frac{1}{a-x} + \frac{2}{x-a}$$

$$2) \frac{1}{a-1} - \frac{a}{1-a}$$

$$\frac{m^2}{m-n} - \frac{n^2}{n-m}$$


$$\frac{n}{n-2} + \frac{n}{2-n}$$

$$\frac{2a}{a-x} + \frac{a}{x-a}$$

$$\frac{a}{x-a} + \frac{x}{x-a}$$

94. Ühe kolmnurga pindala on $\frac{3h}{2}$ cm², teise pindala on $\frac{5h}{2}$ cm². Kui suur on nende kolmnurkade pindalade summa?

95. Arvuta joonisel 11 kujutatud kahe nelinurga pindalade vahe. Esimese nelinurga pindala leidmiseks tükelda ta rööpkülikuks ja kolmnurgaks. Teine nelinurk on ruut.



Joon. 11.

96. Prisma kummagi põhja pindala on $\frac{a^2}{6}$ cm² ja külgpindala $\frac{m^2}{3}$ cm². Kui suur on prisma täispindala?

97. Püramiidi põhja pindala on $\frac{a^2}{2}$ cm² ja külgpindala $\frac{am}{3}$ cm². Kui suur on püramiidi täispindala?

98. Kauba brutokaal on $\frac{a}{b}$ kg ja netokaal $\frac{1}{3b}$ kg. Kui suur on taarakaal?

99. Kooli esimese klassi õpilastest puudus ühel päeval $\frac{m}{n}$ protsenti; selles klassis puudus teisel päeval $\frac{a}{2n}$ protsenti õpilastest. Mitme protsendi võrra oli teisel päeval puudujaid vähem kui eelmisel päeval?

MURDUDE KORRUTAMINE.

100. Arvuta korrutis ja võimaluse korral taanda.

$$1) \frac{3}{4} \cdot 8$$

$$\frac{5}{6} \cdot 24$$

$$\frac{7}{12} \cdot 60$$

$$\frac{11}{15} \cdot 90$$

$$\frac{9}{17} \cdot 102$$

$$2) \frac{7}{8} \cdot 12$$

$$\frac{3}{5} \cdot 15$$

$$\frac{9}{10} \cdot 35$$

$$\frac{13}{18} \cdot 27$$

$$\frac{11}{24} \cdot 32$$

$$3) 21 \cdot \frac{5}{7}$$

$$39 \cdot \frac{11}{13}$$

$$48 \cdot \frac{5}{8}$$

$$85 \cdot \frac{12}{17}$$

$$95 \cdot \frac{15}{19}$$

$$4) 65 \cdot \frac{19}{30}$$

$$78 \cdot \frac{7}{12}$$

$$30 \cdot \frac{23}{42}$$

$$56 \cdot \frac{9}{16}$$

$$63 \cdot \frac{25}{27}$$

$$5) \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}$$

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5}$$

$$\frac{3}{5} \cdot \frac{5}{6}$$

$$\frac{4}{7} \cdot \frac{7}{8}$$

$$\frac{7}{8} \cdot \frac{4}{9}$$

$$6) \frac{7}{12} \cdot \frac{24}{35}$$

$$\frac{5}{9} \cdot \frac{27}{55}$$

$$\frac{11}{13} \cdot \frac{65}{33}$$

$$\frac{17}{15} \cdot \frac{25}{6}$$

$$\frac{18}{35} \cdot \frac{77}{24}$$

$$7) 1 \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{14}$$

$$3 \frac{4}{7} \cdot \frac{14}{15}$$

$$2 \frac{1}{5} \cdot \frac{15}{22}$$

$$7 \frac{1}{2} \cdot \frac{8}{15}$$

$$9 \frac{1}{3} \cdot \frac{6}{7}$$

$$8) \frac{11}{12} \cdot 4 \frac{4}{5}$$

$$\frac{5}{16} \cdot 7 \frac{1}{9}$$

$$\frac{7}{10} \cdot 3 \frac{1}{3}$$

$$\frac{8}{13} \cdot 3 \frac{1}{4}$$

$$\frac{11}{17} \cdot 5 \frac{2}{3}$$

$$9) 2 \frac{1}{3} \cdot 3 \frac{1}{2} \quad 10) 1 \frac{4}{5} \cdot \frac{5}{9} \cdot \frac{7}{12} \quad 11) -3 \cdot \frac{2}{3} \quad 12) -\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{8}$$

$$4 \frac{1}{2} \cdot 1 \frac{1}{3} \quad 2 \frac{2}{3} \cdot 2 \frac{5}{8} \cdot \frac{2}{7} \quad (-6) \cdot \left(-12 \frac{1}{4}\right) \quad \frac{5}{6} \cdot \left(-\frac{3}{10}\right)$$

$$7 \frac{3}{5} \cdot 1 \frac{6}{19} \quad 3 \frac{3}{8} \cdot 1 \frac{1}{9} \cdot 5 \frac{1}{2} \quad \frac{-3}{5} \cdot \frac{5}{-6} \quad -\frac{5}{9} \cdot \left(-\frac{3}{10}\right) \cdot \frac{5}{8}$$

$$8 \frac{1}{4} \cdot 1 \frac{5}{11} \quad 7 \frac{1}{2} \cdot 3 \frac{1}{3} \cdot \frac{6}{25} \quad -4 \cdot \frac{5}{6} \quad -\frac{7}{8} \cdot \left(-\frac{4}{5}\right) \cdot \left(-\frac{2}{3}\right)$$

$$10 \frac{4}{5} \cdot 4 \frac{4}{9} \quad 5 \frac{4}{5} \cdot \frac{10}{29} \cdot 4 \frac{3}{4} \quad 2 \frac{1}{3} \cdot \frac{-3}{5} \quad -2 \frac{2}{5} \cdot \frac{5}{6} \cdot \left(-8 \frac{4}{5}\right)$$

101. Kontrolli valemi

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{m}{n} = \frac{am}{bn}$$

õigsust, täites alljärgneva tabeli.

a	b	m	n	$\frac{a}{b} \cdot \frac{m}{n}$	$\frac{am}{bn}$
3	5	15	18		
0,4	1,5	0,5	0,6		
3	-5	-15	18		
$\frac{2}{3}$	$\frac{5}{6}$	$\frac{7}{15}$	$\frac{14}{25}$		
$-\frac{2}{3}$	$\frac{5}{6}$	$\frac{7}{15}$	$-\frac{14}{25}$		

Murdude korrutis on murd, mille lugejaks on antud murdude lugejate korrutis ja nimetajaks on antud murdude nimetajate korrutis.

102. Esitades täisavaldise murruna, mille nimetajaks on 1, tuleta valemi $\frac{a}{b} \cdot \frac{m}{n} = \frac{am}{bn}$ põhjal valem $k \cdot \frac{a}{b} = \frac{ka}{b}$

103. Arvuta korrutis ja kui võimalik, siis taanda.

$$\begin{array}{llll}
 1) \frac{5}{9} \cdot 21 & 2) 12 \cdot \frac{5}{9} & 3) \frac{5}{12} \cdot \frac{8}{15} & 4) 1 \frac{2}{5} \cdot \frac{a}{n^2} \cdot \frac{3}{7} a^2 n^2 \\
 \frac{3}{x} \cdot a & 6 \cdot \frac{a}{3b} & \frac{4}{7} \cdot \frac{a}{n^2} & 2 \frac{1}{4} \cdot \frac{c^3}{x} \cdot \frac{11x^2}{3c^2} \\
 \frac{c}{u^2} \cdot 2u & 7m \cdot \frac{5}{u^2} & \frac{4a}{b} \cdot \frac{3c}{8a} & \frac{3a}{5b} \cdot \frac{10b}{21c} \cdot \frac{7c}{4a} \\
 \frac{h}{ab} \cdot a & 20c \cdot \frac{4ab}{5c} & \frac{ab}{6} \cdot \frac{3a}{4b} & \frac{8a^2}{21b^2} \cdot \frac{14b}{15c} \cdot \frac{c}{4a^2} \\
 \frac{4f}{g^2h} \cdot fgh & 9hx^2 \cdot \frac{a}{hx^2} & \frac{x^2u^3}{7} \cdot \frac{14}{a^2u} & 1 \frac{3}{4} N^2 u^2 \cdot \frac{8u}{15N^2}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 5) (-2) \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) & 6) \frac{5a}{16b^2} \cdot (-32ab^2c) \\
 nx \cdot \left(-\frac{x}{n}\right) & \left(-\frac{2a^2}{3b^2}\right) \cdot \left(-\frac{5a^2b^2}{8c}\right) \\
 (-15m^3p) \cdot \left(\frac{3x}{10m^2p}\right) & \left(-\frac{N}{a}\right) \cdot \frac{a^2}{5N^3}
 \end{array}$$

$$\begin{aligned} & (-4at) \cdot \left(-\frac{5a^2u}{8t^2}\right) \\ & \left(-\frac{3qw}{r}\right) \cdot qwr \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \frac{-a^2x^3}{13} \cdot \frac{52c}{-ax} \\ & \frac{h}{5u^2} \cdot \left(-\frac{15u^3}{16h^3}\right) \end{aligned}$$

104. Korruta kahel viisil:

- teostades enne sulgudes näidatud tehted;
- korrutades sulgavaldised, kasutades hulkliikmete korutamise eeskirja.

Võrdle tulemusi.

$$\begin{array}{ll} 1) \left(1 + \frac{b}{c}\right) \left(2 + \frac{3}{a}\right) & 6) \left(\frac{a}{3} + \frac{4}{b}\right) \cdot \frac{3b}{4a} \\ 2) \left(2 + \frac{a}{3}\right) \left(3 - \frac{a}{2}\right) & 7) \left(\frac{2x}{7y} - \frac{3y}{5x}\right) \cdot \left(-\frac{35x^2}{6y^2}\right) \\ 3) \left(5 - \frac{3}{x}\right) \left(4 + \frac{2}{x}\right) & 8) \left(\frac{a}{2} + \frac{b}{3}\right) \cdot \left(\frac{a}{3} + \frac{b}{2}\right) \\ 4) \left(7 - \frac{2}{a}\right) \left(7 - \frac{2}{a}\right) & 9) \left(\frac{x}{5} - \frac{y}{4} + \frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{x}{4} - \frac{y}{5}\right) \\ 5) \left(5 + \frac{a}{x}\right) \left(5 - \frac{a}{x}\right) & 10) \left(\frac{2}{a} + \frac{b}{3}\right) \cdot \left(\frac{a}{2} + \frac{3}{b}\right) \end{array}$$

$$\begin{aligned} \text{Näide. 1) } & \left(\frac{x}{3} + \frac{2}{x}\right) \cdot \left(\frac{x}{3} - \frac{2}{x}\right) = \frac{3x+2}{x} \cdot \frac{3x-2}{x} = \\ & = \frac{(3x+2) \cdot (3x-2)}{x \cdot x} = \frac{9x^2-4}{x^2}. \end{aligned}$$

$$2) \left(3 + \frac{2}{x}\right) \cdot \left(3 - \frac{2}{x}\right) = 3^2 - \left(\frac{2}{x}\right)^2 = \frac{x^2}{9} - \frac{4}{x^2} = \frac{9x^2-4}{x^2}.$$

105. Teosta tehted.

$$\begin{array}{ll} 1) \frac{a+b}{6} \cdot 2(m-4) & 2) \left(\frac{x}{4a} - \frac{y}{4}\right) \cdot \left(\frac{x}{5a} + \frac{y}{5}\right) \\ \frac{m+4}{6} \cdot 2(m-4) & \frac{a+b}{7} \cdot \frac{a-b}{14} \\ \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) \cdot (a-b) & \frac{m+n}{5} \cdot \frac{m-n}{16} \\ \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{q}\right) \cdot (p+q) & \left(\frac{p}{6} - \frac{q}{2}\right) \cdot \left(\frac{p}{9} + \frac{q}{3}\right) \\ \frac{a+2}{3} \cdot \frac{a+3}{4} & \left(\frac{u^2}{4} - \frac{v^2}{2}\right) \cdot \left(\frac{u^2}{8} + \frac{v^2}{4}\right) \end{array}$$

MURRU ASTENDAMINE.

106. Et aste on võrdsete tegurite korrutis, siis

$$\left(\frac{a}{b}\right)^2 = \frac{a}{b} \cdot \frac{a}{b} = \frac{a \cdot a}{b \cdot b} = \frac{a^2}{b^2};$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^3 = \frac{a}{b} \cdot \frac{a}{b} \cdot \frac{a}{b} = \frac{a \cdot a \cdot a}{b \cdot b \cdot b} = \frac{a^3}{b^3}.$$

Üldiselt

$$\boxed{\left(\frac{a}{b}\right)^n = \underbrace{\frac{a}{b} \cdot \frac{a}{b} \cdots \frac{a}{b}}_{n \text{ tegurit}} = \frac{a^n}{b^n}}$$

Murru n -es aste on murd, mille lugejaks on antud murru lugeja n -es aste ja nimetajaks antud murru nimetaja n -es aste.

107. Astenda.

1) $\left(\frac{a}{2}\right)^2$

$\left(\frac{b}{3}\right)^2$

$\left(\frac{2x}{9}\right)^2$

$\left(-\frac{a}{2}\right)^2$

$\left(-\frac{a}{2}\right)^3$

2) $\left(-\frac{5a^2}{6b^3}\right)^2$

$\left(\frac{3x^2}{10y^2}\right)^3$

$\left(-\frac{y^3}{6x^2}\right)^3$

$\left(\frac{a^3}{3b^2}\right)^2$

$\left(\frac{3x^2}{4y^3}\right)^3$

3) $\left(\frac{a+2}{2}\right)^2$

$\left(\frac{x-5}{10}\right)^2$

$\left(\frac{x+1}{4}\right)^3$

$\left(\frac{x+y}{2}\right)^3$

$\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right)^3$

4) $\left(\frac{4a}{5}\right)^2$

$\left(-\frac{7b}{8}\right)^2$

$\left(-\frac{8c}{15}\right)^3$

$\left(\frac{9d}{10}\right)^3$

$\left(-\frac{11e}{15}\right)^2$

5) $\left(\frac{3m}{4n}\right)^2$

$\left(-\frac{1}{2N}\right)^2$

$\left(\frac{0,1ab}{7c^2}\right)^3$

$\left(\frac{3a^2}{8mnp}\right)^2$

$\left(-\frac{1}{2m^2x}\right)^3$

6) $\left(a + \frac{1}{2}\right)^2$

$\left(\frac{a}{2} - 2\right)^2$

$\left(\frac{a}{3} + \frac{3}{a}\right)^2$

$\left(\frac{2}{3}a - \frac{3}{4}b\right)^2$

$\left(\frac{a}{n} - 1\right)^3$

7) $\left(2 + \frac{a}{2}\right)^3$

$\left(\frac{2}{3} - \frac{a}{2}\right)^3$

$\left(\frac{1}{2}a - \frac{2}{3}n\right)^3$

$\left(m + \frac{3}{4}\right)^3$

$\left(\frac{2}{5} - \frac{2n}{3}\right)^3$

MURDUDE JAGAMINE.

108. Arvuta.

- | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| 1) $\frac{12}{35} : 6$ | 2) $\frac{3}{5} : 5$ | 3) $\frac{15}{16} : 10$ | 4) $28 : \frac{7}{10}$ |
| $\frac{14}{15} : 7$ | $\frac{6}{7} : 3$ | $\frac{28}{33} : 35$ | $16 : \frac{8}{13}$ |
| $\frac{27}{48} : 9$ | $\frac{3}{8} : 7$ | $\frac{63}{50} : 14$ | $20 : \frac{4}{5}$ |
| $\frac{36}{55} : 12$ | $\frac{7}{16} : 2$ | $\frac{52}{105} : 12$ | $64 : \frac{16}{17}$ |
| $\frac{65}{72} : 13$ | $\frac{5}{21} : 4$ | $\frac{84}{95} : 60$ | $80 : \frac{10}{11}$ |
-
- | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 5) $\frac{2}{3} : \frac{4}{7}$ | 6) $\frac{5}{24} : \frac{35}{12}$ | 7) $1 \frac{14}{15} : \frac{29}{45}$ | 8) $-2 \frac{3}{5} : 6 \frac{1}{2}$ |
| $\frac{3}{5} : \frac{6}{11}$ | $\frac{27}{55} : \frac{3}{22}$ | $5 \frac{11}{14} : \frac{-18}{35}$ | $4 \frac{3}{8} : (-2 \frac{5}{8})$ |
| $\frac{5}{16} : \frac{5}{7}$ | $\frac{24}{65} : \frac{12}{91}$ | $3 \frac{5}{12} : \frac{5}{-16}$ | $5 \frac{4}{9} : (-4 \frac{2}{3})$ |
| $\frac{9}{14} : \frac{11}{35}$ | $\frac{4}{9} : \frac{8}{27}$ | $-9 \frac{3}{8} : \frac{-15}{24}$ | $7 \frac{7}{8} : 5 \frac{1}{4}$ |
| $\frac{7}{12} : \frac{31}{24}$ | $\frac{1}{3} : \frac{7}{30}$ | $-2 \frac{3}{5} : \frac{13}{-15}$ | $-8 \frac{1}{4} : (-3 \frac{2}{3})$ |

109. Murru $\frac{a}{b}$ pöördaru on $\frac{b}{a}$, sest

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} = 1.$$

Mis on murru $-\frac{a}{b}$ pöördarv?

Nimeta murdude

$$\frac{2}{3}, -\frac{5}{6}, \frac{m}{n}, -\frac{m}{n}, a, -b, \frac{1}{a}$$

pöördarvud.

110. Jagada murd $\frac{a}{b}$ murruga $\frac{m}{n}$, tähendab leida niisugune arv, mille korrutamisel jagajaga $\frac{m}{n}$ saame jagatava $\frac{a}{b}$.

Tõestame, et

$$\frac{a}{b} : \frac{m}{n} = \frac{a}{b} \cdot \frac{n}{m}.$$

Selleks on tarvis näidata, et võrduse parema poole korrutamisel jagajaga $\frac{m}{n}$ saame jagatava $\frac{a}{b}$.

Korrutame:

$$\left(\frac{a}{b} \cdot \frac{n}{m} \right) \cdot \frac{m}{n} = \frac{an}{bm} \cdot \frac{m}{n} = \frac{anm}{bmn} = \frac{a}{b}.$$

Seega

$$\boxed{\frac{a}{b} : \frac{m}{n} = \frac{a}{b} \cdot \frac{n}{m} = \frac{an}{bm}}$$

Murru jagamisel murruga korrutame esimese murru teise murru pöördarvuga.

111. Esitades arvu a murruna ja kasutades murdude jagamise eeskirja, tõesta võrdused:

$$a : \frac{m}{n} = \frac{an}{m}; \quad \frac{a}{b} : m = \frac{a}{bm}.$$

112. Arvuta.

1) $\frac{a}{5} : 5$

$\frac{2x}{5} : 4$

$-\frac{6m}{5} : 2$

$-\frac{3n}{8} : (-27)$

$\frac{8p}{9} : 16$

2) $2\frac{1}{4}a : 3$

$6\frac{1}{2}b^2 : 2b$

$-3\frac{1}{3}xy : (-10)$

$4\frac{1}{6}x^2y : 50$

$1\frac{1}{2}m^3 : 15$

3) $\frac{2a}{5} : a$

$\frac{ab}{8} : b$

$3\frac{1}{5} : 8a$

$\frac{12xy}{17} : 3x$

$\frac{42pq}{5} : 21p$

4) $\frac{x}{5} : 2\frac{1}{3}$

$\frac{2a}{9} : 3\frac{1}{9}$

$\frac{a}{10} : 1\frac{2}{5}$

$\frac{1}{3}u : 6\frac{2}{3}$

$6\frac{2}{3}a^3 : 1\frac{2}{3}$

5) $\frac{a^2}{3} : \frac{a}{b}$

$\frac{x}{8} : \frac{x^2}{4}$

$\frac{3q^3}{4} : \frac{16q}{15}$

$\frac{18p}{5} : \frac{27p^3}{35}$

$\frac{m^2}{2} : \frac{m^2}{10}$

6) $\frac{a^2}{b^2} : \frac{a}{b}$

$\frac{a^2}{b^2} : \frac{b}{a}$

$\frac{a}{b} : \frac{1}{b}$

$\frac{2x}{3y} : \frac{2y}{3x}$

$\frac{x}{y} : \frac{x^2}{y^2}$

113. Arvuta.

$$1) \frac{b^2}{a} : 3a$$

$$\left(-\frac{2a^3}{n}\right) : a^2$$

$$\frac{16b}{a^2} : 4b^3$$

$$\left(-\frac{15m^4}{8q}\right) : (-5m^2)$$

$$\frac{2c^2}{5x} : (-14c^3x)$$

$$2) \left(-\frac{a^2}{b}\right) : 5n$$

$$\left(\frac{-a}{b}\right) : 7ac^2$$

$$\frac{16b}{m^2} : (-4b^3)$$

$$\frac{4ax}{b} : (-5ax^2)$$

$$\left(\frac{8c^2n}{3f}\right) : (-4cf)$$

$$3) \frac{3m}{4p} : \frac{q}{2m}$$

$$\left(-\frac{ax}{c}\right) : \frac{2}{3x^2}$$

$$\frac{x^2}{y} : \left(-\frac{x^2}{y}\right)$$

$$\frac{1}{q^2} : \left(-\frac{n}{q^2}\right)$$

$$\frac{4fg}{h^2} : \frac{2fg}{h^3}$$

$$4) \frac{3a^2b}{2c^2} : \frac{6ab}{2c^2}$$

$$\left(-\frac{14xy}{9z^2}\right) : \frac{21x^2}{2c^2}$$

$$\left(-\frac{156a^4b^3}{17m}\right) : \left(-\frac{12a^2b}{17m}\right)$$

$$\frac{72u^5}{v^2} : 84 \frac{u^3}{v^2}$$

$$\frac{135a^4b^3}{c^4} : \frac{105a^3b^3}{c^3}$$

114. Näide. Lihtsusta mitmekordset murdu

$$\frac{\frac{7}{\frac{25}{\frac{14}{15}}}}{15}$$

jagamise teel.

Lahendus.

$$\frac{\frac{7}{\frac{25}{\frac{14}{15}}}}{15} = \frac{7}{25} : \frac{14}{15} = \frac{7 \cdot 15}{25 \cdot 14} = \frac{3}{10}.$$

115. Näide. Lihtsusta mitmekordset murdu

$$\frac{a + \frac{bx}{c}}{\frac{1}{cx}}$$

laiendamise teel.

$$\frac{a + \frac{bx}{c}}{\frac{1}{cx}} = \frac{acx + bx^2}{1} = acx + bx^2.$$

116. Lihtsusta järgmised murrud.

1) $\frac{\frac{3}{4}}{9}$

2) $\frac{\frac{1}{1}}{a}$

3) $\frac{x - \frac{x}{3}}{2x}$

4) $\frac{a - \frac{1}{a}}{1 + \frac{1}{a}}$

$$\frac{\frac{a}{b}}{c}$$

$$\frac{\frac{a}{2}}{2}$$

$$\frac{a + \frac{b}{c}}{c}$$

$$\frac{2b + \frac{b}{a}}{b - \frac{a}{b}}$$

$$\frac{\frac{3x}{8y^2}}{\frac{5x^2}{12y}}$$

$$\frac{-b^2}{-\frac{a}{b}}$$

$$\frac{a + \frac{b}{c}}{\frac{1}{c}}$$

$$\frac{\frac{2a}{1+a}}{1 - \frac{1}{a}}$$

$$\frac{\frac{8}{3}}{5}$$

$$\frac{-\frac{b^2}{a}}{b}$$

$$\frac{m + \frac{1}{4}}{m + \frac{1}{6}}$$

$$\frac{m - \frac{b}{a}}{\frac{m}{a+b}}$$

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}}$$

$$\frac{\frac{16b}{a^2}}{4b^3}$$

$$\frac{2 + \frac{1}{a}}{3 + \frac{1}{a}}$$

$$\frac{x + \frac{y}{z}}{z + \frac{y}{x}}$$

KORDAMISEKS.

117. Taanda murrud.

a) $\frac{-12a^3b^4c^5}{-36a^4b^4c^5};$

b) $\frac{-72a^3b^4c^5x^6y^7}{-9a^3b^2c};$

c) $\frac{0,75a^5x^2y}{0,25a^4xy}.$

118. Arvuta korrutis

$$\frac{m}{n} \cdot \left(\frac{p}{q} + \frac{r}{s} \right)$$

kahel viisil ja võrdle tulemusi.

119. a) Kirjuta hulkliige

$$a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

astmena.

b) Kirjuta hulkliige

$$a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

astmena.

120. a) Tõesta, et võrdus

$$(-a + b)(-a - b) = (a + b)(a - b)$$

on õige.

b) Tõesta, et võrdus

$$(-a - b)^2 = (a + b)^2$$

on õige.

121. Tõesta, et võrdus

$$(a - b)^2 = (b - a)^2$$

on õige.

122. Millise avaldise peab liitma avaldisega $(a - b)^2$, et tulemus oleks võrdne avaldisega $(a + b)^2$?

123. Millise avaldise peab lahutama arvude a ja b summa kuu-
bist, et tulemus oleks võrdne a ja b kuupide summaga?

124. Arvuta x antud võrdest.

$$a) \frac{x}{m} = \frac{5n}{2m};$$

$$b) \frac{ab}{cd} = \frac{a^2b^2}{x}.$$

125. Teisenda murd

$$-\frac{-x^2 - x + 1}{2}$$

murruks, mille ees ei ole miinusmärki.

126. Teisenda murd $\frac{-a+b}{-x-y}$ niisuguseks murruks, milles lugeja
ega nimetaja esimese liikme ees ei ole miinusmärki.

127. Ristküliku ühe külje pikkus on $\frac{a}{2}$ meetrit ja teise külje
pikkus on $\frac{m}{a}$ meetrit. Kui suur on ristküliku pindala?

128. Toa pikkus on $\frac{a}{2}$ meetrit ja laius $\frac{b}{3}$ meetrit. Avalda toa
põranda pindala.

129. Kolmnurga alus on $\frac{2a}{5}$ cm ja kõrgus $\frac{b}{2}$ cm. Leia pindala.

130. Kolmnurga küljed on $\frac{a}{2}$ cm, a cm ja $\frac{b-a}{14}$ cm. Leia kolmnurga übermõõt.


131. Rööpküliku külgede pikkused on $\frac{a-b}{3}$ cm ja $\frac{2a-b}{3}$ cm. Leia rööpküliku übermõõt.

132. Plekist ruudu külje pikkus on a mm. Soojenedes paisus ruudu külj 1 mm võrra. Leia pindala, mille võrra plekist ruudu pindala suurenes soojenedes.


133. Vasest kuubi serv, mille pikkus on b mm, paisus kuumen-
damisel 1 mm võrra. Leia, mille võrra suurenes kuubi ruumala.

134. Arvuta joonisel 12 antud kujundi pindala.

135. Arvuta joonisel 13 antud kujundi pindala.



Joon. 12.



Joon. 13.

3. HULKLIIKMETE LAHUTAMINE TEGUREIKS.

HULKLIIKMETE TEGUREIKS LAHUTAMINE ÜHISE TEGURI SULGUDE ETTE TOOMISEGA.

136. Jagades hulkliikme

$$am + bm - cm$$

arvuga m , saame

$$(am + bm - cm) : m = a + b - c.$$

Et jagata võrdub jagaja ja jagatise korrutisega, siis

$$am + bm - cm = m(a + b - c).$$

Nii on hulkliige $am + bm - cm$ teisendatud korrutiseks $m(a + b - c)$. Selle kohta öeldakse, et hulkliige on lahutatud tegureiks.

Hulkliikme teisendamist korrutiseks nimetatakse hulkliikme tegureiks lahutamiseks.

137. Jaga hulkliige

$$12x^2 - 18x + 30$$

tema liikmete suurima ühisteguriga 6 ning kirjuta seejärel antud hulkliige korrutisena, s. t. lahuta see hulkliige tegureiks.

138. Mis on hulkliikme $ak - bk - ck$ liikmete ühiseks teguriks? Jaga see hulkliige tema liikmete ühise teguriga ja esita siis antud hulkliige korrutisena.

139. Jaga hulkliige

$$9a^5x^2 - 6a^3x^3 + 15a^2x^5$$

tema liikmete suurima ühisteguriga. Lahuta antud hulkliige tegureiks.

140. Ülesandeis 136—139 kirjeldatud hulkliikme tegureiks lahutamise võtet nimetatakse liikmete ühise teguri sulgude ette toomise võtteks.

Antud hulkliikme lahutamisel tegureiks liikmete ühise teguri sulgude ette toomise võttega toimime järgmiselt:

- 1) leiame hulkliikme liikmete SÜT ja kirjutame selle tegurina sulgude ette;
- 2) sulgudesse kirjutame teise teguri, milleks on antud hulkliikme ja sulgude ees seisva teguri jagatis.

Näide. $12a^2b - 18a^3b^2 - 24a^4b^3 = 6a^2b(2 - 3ab - 4a^2b^2)$,
 sest $12a^2b : 6a^2b = 2$,
 $-18a^3b^2 : 6a^2b = -3ab$,
 $-24a^4b^3 : 6a^2b = -4a^2b^2$.

141. Lahuta järgmised hulkliikmed tegureiks:

1) $3a + 3b$	2) $6a - 3x$
$3a + 6$	$7x - 14a$
$9a - 6$	$15x + 3a$
$12 - 4a$	$16a - 24x$
$21 - 35a$	$72x - 9a$
3) $mn + mx$	4) $16r^3 - 24r^2$
$Q^2 - PQ$	$4u^3 - u^4$
$mv^2 - gv$	$pq^2 - 3p^2q$
$2st - 6at^2$	$m^3 + 5am^2$
$14N^2 - 7Nc$	$15h^2k^3 - 9h^2k$

142. Kui antud hulkliikme üks liikmetest on liikmete SÜT, siis saab tuua selle liikme sulgude ette. Sulgudes on sel korral üheks liikmeks $+1$ või -1 .

Näiteid. $3a + 3 = 3(a + 1)$
 $2ab - a = a(2b - 1)$

143. Lahuta alljärgnevad kaksliikmed tegureiks:

1) $6ax - 6a$	2) $x^2 + 2ax^2$
$5a^2 - 10ab$	$12a^2 - 4a^2x$
$6ax - 12a^2$	$10ax - 15bx$
$9x^2 - 18ax$	$12ax^2 - 10a^2x$
$3a^2b + 3b$	$a^2b^2 - ab$

144. Too -2 sulgude ette.

$$\begin{aligned} 1) \quad & -6a - 4b \\ & -2x^2 + 10x - 12 \\ & -8a^2 - 6a - 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad & -4a^2 + 2a - 2 \\ & -10 - 2x - 4x^2 \\ & -2 + 2a + 2a^2 \end{aligned}$$

145. Lahuta järgmised hulkliikmed tegureiks:

$$\begin{aligned} 1) \quad & 6ax - 9bx + 21cx \\ & 42a^2y - 35ay^2 + 7ay \\ & 9cz^4 - 21c^2z^3 - 15c^3z^2 \\ & -12ax^2 - 9ax - 6a \\ & -5 + 10x - 15x^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad & 12ab - 18bc + 24bd \\ & 33a^2x - 22ax - 11x \\ & 77a^2b + 42ab^2 - 14ab \\ & -27a^2 - 18a - 36 \\ & -63x^2 + 126x + 189 \end{aligned}$$

146. Jagades hulkliikme

$$7u(3a - 2) + 5(3a - 2)$$

tema liikmete ühise teguriga $3a - 2$, saame

$$[7u(3a - 2) + 5(3a - 2)] : (3a - 2) = 7u + 5.$$

Siit järeldame, et

$$7u(3a - 2) + 5(3a - 2) = (3a - 2)(7u + 5).$$

Sellest näeme, et kui antud hulkliikme liikmetel on hulkliikmeline ühistegur, siis võib tuua selle sulgude ette, kirjutades ta omakorda sulgudesse.

147. Lahuta järgmised hulkliikmed tegureiks:

$$\begin{aligned} & a(3m + n) + b(3m + n) \\ & 5(x - 2y) + a(x - 2y) \\ & (a + b)(2x + y) + a(2x + y) \\ & m(u + 2) - n(u + 2) \\ & 2(3b - v) - 3v(3b - v) \end{aligned}$$

148. Lahutame hulkliikme

$$m(1 + a + a^2) - (1 + a + a^2)$$

tegreiks. Liikmete ühiseks teguriks on kolmlüige $1 + a + a^2$. Kirjutame selle sulgude ette esimeseks teguriks; et ta on hulkliikmeline tegur, siis peame ta kirjutama sulgudesse.

Nii saame

$$m(1 + a + a^2) - (1 + a + a^2) = (1 + a + a^2)(m - 1).$$

$$\frac{m(1+a+a^2)}{1+a+a^2} = m \text{ ja } \frac{-(1+a+a^2)}{1+a+a^2} = -1.$$

149. Lahuta järgmised hulkliikmed tegureiks:

$$\begin{aligned} & a(1+x) - (1+x) \\ & a(1+x+x^2) - (1+x+x^2) \\ & x(a^2-a+1) - 2(a^2-a+1) \\ & m(5x-1) - (n+2)(5x-1) \\ & (3a+2b)(m+3c) - (2a+b)(m+3c) \end{aligned}$$

HULKLIIKMETE TEGUREIKS LAHUTAMINE VALEMITE KASUTAMISEGA.

150. Kui hulkliige on kahe arvu ruutude vahe, siis tema tegureiks lahutamisel saab kasutada valemit

(vt. ül. 19.) $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b).$

Näiteid.

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad & 16a^2 - 81b^2 = (4a)^2 - (9b)^2 = (4a+9b)(4a-9b). \\ \text{b)} \quad & (2x+3y)^2 - (2x-3y)^2 = \\ & = [(2x+3y) + (2x-3y)] \cdot [(2x+3y) - (2x-3y)] = \\ & = 4x \cdot 6y = 24xy. \end{aligned}$$

151. Lahuta alljärgnevad hulkliikmed tegureiks:

1) $x^2 - 1$	2) $1 - x^2$	3) $4x^2 - 9y^2$
$y^2 - 4$	$a^2 - 9$	$0,16a^2 - 0,09b^2$
$25 - y^2$	$64u^2 - v^2$	$9a^2 - (2x-1)^2$
$49 - 9x^2$	$x^2 - \frac{9}{25}$	$(3a+b)^2 - (a-3b)^2$
$0,04 - c^2$	$a^2 - 0,49$	$(a+b)^2 - (a-b)^2$

152. Lahuta alljärgnevad hulkliikmed tegureiks, tuues esmalt ühise teguri sulgude ette ning kasutades seejärel valemit.

1) $ax^2 - ay^2$	2) $2a^2 - 2b^2$	3) $8a^3 - 8ab^2$
$a^3 - ax^2$	$8 - 18x^2$	$5x - 20a^2x$
$3R^2 - 3r^2$	$2R^2 - 2r^2$	$4a^3m - am^3$
$27a^2 - 12b^2$	$50a^2 - 98b^2$	$3a^3 - 75ab^2$
$s^3t^2 - s$	$9a^3x^2 - a$	$50x^3 - 2a^2x$

$$\begin{aligned} \text{N ä i d e. } 18a^3m^2 - 50a &= 2a(9a^2m^2 - 25) = \\ &= 2a[(3am)^2 - 5^2] = 2a(3am + 5)(3am - 5). \end{aligned}$$

153. Valemist

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

järeldame võrduse poolte vahetamise teel, et

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2.$$

Samal viisil järeldame valemist

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2,$$

et

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2.$$

Neist valemest näeme, et kui kolmliikme kaks liiget on kahe arvu ruudud ja üks liige on nende arvude kahekordne korrutis, siis selle kolmliikme saab kirjutada nende arvude summa või vahe ruuduna, s. t. selle kolmliikme saab lahutada teguriteks.

$$a) 4a^2 + 12ab + 9b^2 = (2a)^2 + 2 \cdot 2a \cdot 3b + (3b)^2 = (2a + 3b)^2.$$

$$b) 36m^2 - 60mn + 25n^2 = (6m)^2 - 2 \cdot 6m \cdot 5n + (5n)^2 = (6m - 5n)^2.$$

154. Lahuta järgmised hulkliikmed võimaluse korral tegureiks:

$$\begin{aligned} 1) \quad & x^2 + 4x + 4 \\ & x^2 - 2x + 3 \\ & x^2 + 14x + 49 \\ & x^2 - 8x + 16 \\ & x^2 - 18x + 72 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad & 25 - 10y + y^2 \\ & 1 + 2z + z^2 \\ & 4u + 8 + u^2 \\ & v^2 - 2v - 1 \\ & t^2 - 16t + 64 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3) \quad & 25 + 10x + x^2 \\ & a^2 - 12a + 36 \\ & 9 + 18m + m^2 \\ & b^2 - 4b + 8 \\ & b^2 - 8b + 16 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4) \quad & x^2 - \frac{2}{5}x + \frac{1}{25} \\ & 4f^2 + 4f + 1 \\ & x^2 - 0,2x + 0,01 \\ & x^2 - 2,4x + 1,44 \\ & x^2 - 0,6x - 0,09 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5) \quad & x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{16} \\ & 16g^2 - 16g + 4 \\ & h^2 - 6ah + 9a^2 \\ & c^2 - 4ck + 4k^2 \\ & 25m^2 - 30mn + 9n^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 6) \quad & 1 - x + \frac{x^2}{4} \\ & r^2 + 2r + 1 \\ & 1 - 2n + n^2 \\ & u^2 - 22u + 121 \\ & 9a^2 + 30a + 25 \end{aligned}$$

155. Lahuta järgnevad hulkliikmed tegureiks, tuues esmalt ühise teguri sulgude ette ning kasutades seejärel valemit.

$$\begin{aligned} 1) \quad & 3a^2 - 6a + 3 \\ & 5a^2 + 10a + 5 \\ & ax^2 + 4ax + 4a \\ & 7x^2 - 14x + 7 \\ & 2x^2 - 16x + 32 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad & 6a^2 + 12a + 6 \\ & 50y^2 + 20y + 2 \\ & av^2 - 2av + a \\ & 3m^2 - 48m + 192 \\ & 5 + 10z + 5z^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3) \quad & am^2 + 2am + a \\ & nx^2 - 2nx + n \\ & 9u^2 - 18u + 9 \\ & 2t^2 + 4t + 2 \\ & 2a^4 + 4a^3b + 2a^2b^2 \end{aligned}$$

156. Lahuta järgnevad kolmliikmed tegureiks:

$$1) -a^2 - 8a - 16$$

$$-x^2 + 10x - 25$$

$$2x - x^2 - 1$$

$$2) -x^2 - 4x - 4$$

$$2ab - a^2 - b^2$$

$$-x^2 + 6x - 9$$

$$\text{Näide. } 10a - a^2 - 25 = -(-10a + a^2 + 25) = -(a^2 - 10a + 25) = -(a - 5)^2.$$

157. Valemeist

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

ja

$$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

saame järeldada, et

$$a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 = (a+b)^3$$

ja

$$a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 = (a-b)^3.$$

Neid valemeid saab hulkliikme tegureiks lahutamisel kasutada siis, kui hulkliikmes on neli liiget, milledest kaks on kahe arvu kuubid, üks on kolmekordne esimese arvu ruudu ja teise arvu korrutis ning üks on kolmekordne esimese arvu ja teise arvu ruudu korrutis.

$$\text{Näide. } a^3 + 12a^2 + 48a + 64 = a^3 + 3 \cdot a^2 \cdot 4 + 3 \cdot a \cdot 4^2 + 4^3 = (a+4)^3.$$

158. Lahuta järgnevad hulkliikmed tegureiks:

$$1) x^3 + 3x^2 + 3x + 1$$

$$8 - 12a + 6a^2 - a^3$$

$$c^3 + 3c^2d + 3cd^2 + d^3$$

$$-a^3 - 30a^2 - 300a - 1000$$

$$y^3 + 2y^2 + \frac{3}{4}y + \frac{8}{27}$$

$$2) 1 - 3a + 3a^2 - a^3$$

$$a^3 + 6a^2 + 12a + 8$$

$$8a^3 + 36a^2 + 54a + 27$$

$$8a^3 - 36a + 54a - 27$$

$$x^3 - 1 \frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{4}x - \frac{1}{8}$$

$$3) x^3 + 18x^2 + 108x + 216$$

$$1 + 0,03p + 0,0003p^2 + 0,000001p^3$$

$$125 - 75z + 15z^2 - z^3$$

$$8u^3 + 12u^2v + 6uv^2 + v^3$$

$$125a^3 - 150a^2b + 60ab^2 - 8b^3$$

159. Valemeist

$$(a+b)(a^2 - ab + b^2) = a^3 + b^3$$

ja

$$(a - b) (a^2 + ab + b^2) = a^3 - b^3$$

saame järeldada, et

$$a^3 + b^3 = (a + b) (a^2 - ab + b^2)$$

ja

$$a^3 - b^3 = (a - b) (a^2 + ab + b^2).$$

Neist valemest näeme, et kui hulkliige on kahe arvu kuupide summa või kuupide vahe, siis saab seda hulkliiget lahutada tegureiks, kirjutades üheks teguriks nende arvude summa (või vahe) ja teiseks teguriks nende arvude vahe (või summa) mittetäieliku ruudu.

$$\begin{aligned} \text{Näide. } 8a^3 - 27b^3 &= (2a)^3 - (3b)^3 = \\ &= (2a - 3b) [(2a)^2 + 2a \cdot 3b + (3b)^2] = \\ &= (2a - 3b) (4a^2 + 6ab + 9b^2). \end{aligned}$$

160. Lahuta järgnevad hulkliikmed tegureiks.

1) $a^3 + 125$	2) $250p^3 + 54q^3r^3$	3) $3a^2 - 3$
$64 - x^3$	$x^3 - 0,008$	$2x^2 - 12x + 18$
$8x^3 + 1$	$\frac{1}{8} - 8a^3$	$4n^2 + 8n + 4$
$27a^3 - 8b^3$	$125u^3 + 216$	$5a^3 + 40$
$z^3 + 0,001$	$128a^3b^2 - 432b^2c^3$	$3y^3 + 6y^2 + 7y + \frac{8}{9}$

HULKLIIKMETE TEGUREIKS LAHUTAMINE LIIKMETE RÜHMITAMISE VÕTTEGA.

161. *Hulkliikme*

$$m(a+b) + n(a+b)$$

tegureiks lahutamisel saame kasutada ühise teguri sulgude ette toomise võtet, sest hulkliikme liikmetel on ühiseks teguriks $(a+b)$. Tuues selle ühise teguri sulgude ette, saame

$$m(a+b) + n(a+b) = (a+b)(m+n).$$

Hulkliikme

$$m(a+b) + n(a+b)$$

võib anda ka kujul

$$ma + mb + na + nb.$$

Kui seda hulkliiget hakata lahutama tegureiks, siis näeme, et kõikidel tema liikmetel ei ole ühist tegurit, kuid esimesel kahel liikmel on ühiseks teguriks m , kahel viimasel aga n .

Rühmitades selle hulkliikme liikmeid nii, et igas rühmas oleks ühise teguriga liikmed, siis saame

$$(ma + mb) + (na + nb).$$

Kummaski rühmas saab nüüd tuua ühise teguri sulgude ette. Seega saame

$$(ma + mb) + (na + nb) = m(a + b) + n(a + b).$$

Sel viisil oleme saanud hulkliikme niisugusel kujul, et kõikidel liikmetel on ühine tegur $(a + b)$, mille võime tuua sulgude ette. Nii saame lõpuks:

$$\begin{aligned} ma + mb + na + nb &= (ma + mb) + (na + nb) = \\ &= m(a + b) + n(a + b) = (a + b)(m + n). \end{aligned}$$

Niisugust hulkliikme tegureiks lahutamise võtet nimetatakse liikmete rühmitamise võtteks.

Lahuta hulkliige

$$ma + mb + na + nb$$

tegereiks, rühmitades liikmeid nii, et esimeses rühmas oleks liikmed ühise teguriga a , teises rühmas liikmed ühise teguriga b . Võrdle tulemust eespool saadud tulemusega.

162. Lahuta järgnevad hulkliikmed tegureiks liikmete rühmitamise võttega:

$$\begin{aligned}
 1) \quad & ax+ay+2x+2y \\
 & n^2+nz+5n+5z \\
 & u^2+7u+au+7a \\
 & 3a^2+2ab+3ab+2b^2 \\
 & 6x^2-13x+6xy-13y
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2) \quad & 2ax-au+4bx-2bu \\
 & 5Nc-5Nd+7c^2-7cd \\
 & z^2-hz+11z-11h \\
 & 8x^3-8x^2y-4xy^2+4y^3 \\
 & ax^2-bx^2+ax-bx
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3) \quad & t^2-at-3t+3a \\
 & 8m^2-4mn-6m+3n \\
 & 16pq-12q-8pr+6r \\
 & 20ab-4b-5a+1 \\
 & 5z^2-5hz+ah-az
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 4) \quad & x^3+x^2+x+1 \\
 & x^3-3x^2-2x+6 \\
 & 3x^3-7x^2-9x+21 \\
 & x^3-2x^2-2x+4 \\
 & 5x^3-35x^2+x-7
 \end{aligned}$$

HULKLIHKMETE TEGUREIKS LAHUTAMINE MITME VÖTTEGA.

163. *Hulkliikmete tegureiks lahutamine ei ole lõpetatud, kui saadud korrutises hulkliikmeline tegur on omakorda veel tegureiks lahutatav. Näiteks, kui hulkliige*

$$3ax^2 - 3ay^2$$

on ühise teguri 3a sulgude ette toomisega teisendatud korrutiseks

$$3a(x^2 - y^2),$$

siis tegureiks lahutamine ei ole lõpetatud, sest teine tegur on omakorda veel tegureiks lahutatav:

$$x^2 - y^2 = (x+y)(x-y).$$

Hulkliikme tegureiks lahutamine on lõpetatud siis, kui ta on teisendatud niisuguseks korrutiseks, mille ükski hulkliikmeline tegur ei ole enam tegureiks lahutatav.

Tegureiks ei ole lahutatavad näiteks järgmised hulkliikmed:

$$\begin{array}{lll}
 a+b; & a-b; & a^2+ab+b^2; \\
 a^2-ab+b^2; & a-b; & 2x-4y+3xy.
 \end{array}$$

Näide.

$$3ax^2 - 3ay^2 = 3a(x^2 - y^2) = 3a(x+y)(x-y)$$

Siin on tegureiks lahutamine lõpetatud, sest kumbagi hulkliikmelist tegurit ei saa enam tegureiks lahutada.

Hulkliikme tegureiks lahutamisel vaatame kõigepealt, kas kõigil liikmetel on ühine tegur; kui on, siis toome selle sulgude ette. Seejärel vaatame, kas sulgudes olevat avaldist saab veel tegureiks lahutada kas valemite kasutamise või liikmete rühmitamise võttega; kui see on võimalik, siis tuleb seda teha.

Näide.

$$\begin{aligned} 6ax^2 - 12ax - 9bx^2 + 18bx &= 3x(2ax - 4a - 3bx + 6b) = \\ &= 3x[(2ax - 4a) - (3bx - 6b)] = \\ &= 3x[2a(x - 2) - 3b(x - 2)] = 3x[(x - 2)(2a - 3b)] = \\ &= 3x(x - 2)(2a - 3b). \end{aligned}$$

164. Lahuta järgmised hulkliikmed tegureiks:

1) $3x^2 - 6x + 3$

$6 - 24p^2q^2$

$5y^2 - 1445$

$11x^2 - 66x + 99$

$u^2 - 1,21$

2) $7a^2b^2 - 7c^4$

$245Q^2 - 140Q + 20$

$121a^2b^2 - 100c^2d^2$

$24x^2 + 72x + 54$

$4f^2 - \frac{9}{25}$

3) $3a^3 - 12a$

$4a^4 + 4ab^3$

$x^2 - a^2 - 2ab - b^2$

$a^2 - b^2 + 2bc - c^2$

$5ax^3 - 40ax^2 + 80ax$

4) $a^4 - ab^3$

$a^2 + 2ab + b^2 - x^2$

$a^2 - b^2 - a - b$

$2a - 3b - 4a^2 + 9b^2$

$3k^4 - 6k^3 + 3k^2$

HULKLIIKMETE SUURIMA ÜHISTEGURI LEIDMINE.

165. Antud hulkliikmete SÜT leidmiseks lahutame need hulkliikmed tegureiks ja moodustame siis kõikide ühiste tegurite korutise.

Näide. Leiame hulkliikmete

$15h^2 - 15h,$

$9h^3 - 9h$ ja

$24h^3 - 48h^2 + 24h$

suurima ühisteguri.

Lahendus.

$$15h^2 - 15h = 15h(h - 1) = 3 \cdot 5 \cdot h \cdot (h - 1);$$

$$9h^3 - 9h = 9h(h^2 - 1) = 3^2 \cdot h(h + 1)(h - 1);$$

$$24h^3 - 48h^2 + 24h = 24h(h^2 - 2h + 1) = 2^3 \cdot 3 \cdot h(h - 1)^2.$$

$$SÜT = 3h(h - 1).$$

166. Leia iga järgmise avaldisepaari SÜT:

- | | | |
|--------------------|----------------------|-------------------|
| 1) $8mnp$ | 2) $a^2x + ax^2$ | 3) $6x + 2ax$ |
| $12m^2np - 4mn^2p$ | $a^2x - ax^2$ | $6x - 2ax$ |
| 4) $15pq - 5p$ | 5) $7a^2 - 21ab$ | 6) $5x - 10a$ |
| $10p^2 + 15p$ | $5a - 15b$ | $6ax - 6a^2$ |
| 7) $a^2 - 1$ | 8) $5(a + x)^2$ | 9) $14a + 7x$ |
| $a + 1$ | $10(a^2 - x^2)$ | $42a + 21x$ |
| 10) $N^2 - 9$ | 11) a^3 | 12) $a^3 - 2a^2b$ |
| $N^2 - 6N + 9$ | $a^2x + ax^2$ | $a^3x + a^2bx$ |
| 13) $m^2n^2 - 1$ | 14) $u^3 - c^2u$ | 15) $3a^3 + 3x^3$ |
| $5mn^2 + 5n$ | $u^3 - 2u^2c + uc^2$ | $3a^2 - 3x^2$ |

167. Leia iga järgmise avaldisekolmiku SÜT:

- | | | |
|--------------------|------------------------|---------------------|
| 1) $x^2 - 2x + 1$ | 2) $9 - x^2$ | 3) $x^2 - 9$ |
| $x^2 - 1$ | $x^2 + 6x + 9$ | $2ax + 6a$ |
| $5x - 5$ | $2x + 6$ | $3x^2 + 18x + 27$ |
| 4) $25 - 36x^2$ | 5) $2a - 5$ | 6) $12x - 8$ |
| $5 + 6x$ | $10 - 4a$ | $9x^2 - 4$ |
| $36x^2 - 60x + 25$ | $6a - 15$ | $15x - 10$ |
| 7) $4(a + 1)^2$ | 8) $a^2 - b^2 + a - b$ | 9) $a^3 - x^3$ |
| $6a^2 - 6$ | $3a^2 - 6ab + 3b^2$ | $a^2 - x^2 + a - x$ |
| $2a^2 + 4a + 2$ | $5a^2 - 5b^2$ | $8a^2 - 8x^3$ |

HULKLIHKMETE VÄIKSEIMA ÜHISKORDSE LEIDMINE.

168. Antud hulkliikmete VÜK leidmiseks lahutame kõik need hulkliikmed tegureiks, misjärel moodustame korrutise, mille tegureiks on ühe hulkliikme kõik tegurid ning teiste hulkliikmete tegurite hulgast need, mis võetud hulkliikme tegurite hulgas ei esine.

Näide. Leiame hulkliikmete $4N^2x - 4N^2$, $6N(x^2 + 2x + 1)$ ja $20Nx^2 - 20N$ väikseima ühiskordse.

Lahendus.

$$4N^2x - 4N^2 = 4N^2(x - 1) = 2^2 \cdot N^2(x - 1);$$

$$6N(x^2 + 2x + 1) = 6N(x + 1)^2 = 2 \cdot 3 \cdot N(x + 1)^2;$$

$$20Nx^2 - 20N = 20N(x^2 - 1) = 2^2 \cdot 5 \cdot N(x + 1)(x - 1).$$

$$\begin{aligned} VÜK &= 2^2 \cdot N^2(x - 1) \cdot 3 \cdot (x + 1)^2 \cdot 5 = \\ &= 60N^2(x - 1)(x + 1)^2. \end{aligned}$$

169. Leia järgmiste avaldisepaaride VÜK:

1) 5

$$5a - 5x$$

2) 12

$$12a + 5b$$

3) m

$$m^2 + m$$

4) Ny

$$N^2 - N$$

5) $4a + 4n$

$$5a - 5n$$

6) $a^3 - aR^2$

$$6a - 6R$$

7) $x^2 - u^2$

$$7x + 7u$$

8) $1 - x^2$

$$(x - 1)(x + 2)$$

9) $(v - 9)^2$

$$(18 - 2v)^2$$

170. Leia iga järgmise kolme hulkliikme VÜK:

1) $(b - 7)^2$

$$b^2 - 7b$$

$$5b$$

2) ax

$$a^2 + ax$$

$$ax + x^2$$

3) $3x^2 - 48$

$$3x - 12$$

$$(x + 4)^2$$

4) $(x - 3)^2$

$$x^2 - 9$$

$$5x - 15$$

5) $3(n^2 - 1)$

$$(n - 1)(n^2 + 1)$$

$$n^3 + n$$

6) $2(x - 1)^2$

$$7(x + 1)^2$$

$$14(x^2 - 1)$$

7) $a(a + b) + a^2 - b^2$

$$4a^2 - 4ab + b^2$$

$$a^2 - b^2$$

8) $a^2 - 4$

$$a^3 + 8$$

$$a^2 + 2a + 4$$

9) $a^3 - a^2 + a - 1$

$$a^3 + a^2 + a + 1$$

$$a^4 - 1$$

10) $8ab + 16b^2$

$$a^2b + 4ab^2 + 4b^3$$

$$a^3$$

HULKLIKMELISTE LIIKMETEGA MURRUD.

MURRU TAANDAMINE.

171. Kui murru lugeja ja nimetaja on hulkliikmed, siis sellise murru taandamiseks lahutame tema lugeja ja nimetaja tegureiks. Juhul kui lugejal ja nimetajal on ühiseid tegureid, siis nende ühiste teguritega taandame murdu.

Näiteid.

1. Taanda murd $\frac{3ab + 3b}{6b + 6ab}$

$$\text{Lahendus. } \frac{3ab+3b}{6b+6ab} = \frac{3b(a+1)}{6b(1+a)} = \frac{3b(a+1)}{6b(a+1)} = \frac{1}{2}.$$

$$2. \text{ Taanda murd } \frac{(x+3)(x+2)+2(x-3)}{x^2+14x+49}.$$

Lahendus.

$$\begin{aligned}(x+3)(x+2)+2(x-3) &= x^2+5x+6+2x-6 = \\ &= x^2+7x = x(x+7); \\ x^2+14x+49 &= (x+7)^2;\end{aligned}$$

$$\frac{(x+3)(x+2)+2(x-3)}{x^2+14x+49} = \frac{x(x+7)}{(x+7)^2} = \frac{x}{x+7}.$$

$$3. \text{ Taanda murd } \frac{2ab-2b}{8b-8ab}.$$

Lahendus.

$$\frac{2ab-2b}{8b-8ab} = \frac{2b(a-1)}{8b(1-a)} = \frac{a-1}{4(1-a)} = -\frac{1-a}{4(1-a)} = -\frac{1}{4}.$$

172. Taanda võimaluse korral iga järgmine murd:

1) $\frac{9m+18}{9m-27}$	2) $\frac{7h+14}{7h-35}$	3) $\frac{3abc-7abu}{3ac-7au}$
$\frac{ab-ac}{ad+ac}$	$\frac{2e-1}{2e+3}$	$\frac{ns+nt}{sv+tv}$
$\frac{a^2-a}{ab+a}$	$\frac{n+n^2}{1+n}$	$\frac{a^2-az}{ab-bz}$
$\frac{2x-2}{2x+7}$	$\frac{ar+a^2r^2}{a+ar}$	$\frac{Q^3+Q^2}{Q^3-Q}$
$\frac{a-ax}{n-nx}$	$\frac{6u^3-6u^2}{u-1}$	$\frac{5z^3-6z}{15z^2-18}$
4) $\frac{4x^2-4x+1}{10x-5}$	5) $\frac{ay^2-2ay+a}{y-1}$	6) $\frac{x-a}{a-x}$
$\frac{z^4-2z^2+1}{z^3-z}$	$\frac{u^3-2u^2+u}{2u-2}$	$\frac{5nz-15}{3-nz}$
$\frac{25-10v+v^2}{25a-av^2}$	$\frac{4x^2-1}{4x+2}$	$\frac{15a^2-20ab}{21am-28bm}$
$\frac{9p^2-16q^2}{6p+8q}$	$\frac{4n^2+25}{16n^4-625}$	$\frac{1-h^2}{ch^2-c}$
$\frac{gh^2-gf^2}{kh+kf}$	$\frac{1-Q^4}{Q^2+1}$	$\frac{ab-bc}{ad-dc}$

$$7) \frac{by \rightarrow b}{1-y}$$

$$\frac{x^2 + xy}{xy + y^2}$$

$$\frac{2a - 5b}{15b - 6a}$$

$$\frac{abd^2 - abc}{abc - abd^2}$$

$$\frac{a^2 - b^2}{a + b}$$

$$8) \frac{a^2 - 1}{1 + a}$$

$$\frac{d^2u^2 - 9d^2}{du - 3d}$$

$$\frac{(nz + 1)^3}{n^2z^2 - 1}$$

$$\frac{a - x}{a - x}$$

$$-\frac{6-x}{x^2-36}$$

$$9) \frac{c^2 - 16}{4 - c}$$

$$\frac{(\omega + 1)^2}{\omega^2 - 1}$$

$$\frac{m^3n - mn^3}{mn^2 - m^2n}$$

$$\frac{a - b}{b^2 - a^2}$$

$$\frac{3h - k}{k^2 - 9h^2}$$

$$10) \frac{a^2 + 2ab + b^2}{a^2 - b^2}$$

$$\frac{m^2 - 2mn + n^2}{n - m}$$

$$\frac{u^2 - v^2}{u^2 - 2uv + v^2}$$

$$\frac{a^3 + a^2b - ab^2 - b^3}{a^3 - a^2b - ab^2 + b^3}$$

$$\frac{a^3 + a^2b + ab^2 + b^3}{a^2 + 2ab + b^2}$$

$$11) \frac{9 - p^2}{p + 3}$$

$$-\frac{-p - q}{p^2 + 2pq + q^2}$$

$$\frac{9a^2 - 16b^2}{9a^2 - 24ab + 16b^2}$$

$$\frac{x^2 - y^2 - (x + y)z}{x^2 - y^2 + xz + yz}$$

$$\frac{m^4 - m}{m^4 - m^2}$$

173. Lihtsusta avaldist

$$\frac{2a^3 + 3a^2 - 20a - 30}{4a^2 - 9}$$

ja arvuta siis ta väärtus, kui $a = 11$.

174. Lihtsusta avaldist

$$\frac{8x^2 + 16x + 32}{x^3 - 8}$$

ja arvuta siis ta väärtus, kui $x = 3$.

175. Näita, et murru

$$\frac{n^2 - nx + n - x}{n^2 - nx - n + x}$$

väärtus ei sõltu x väärtusest.

176. Näita, et murru

$$\frac{m^2 + 2m - mx - 2x}{m^2 + 3m - mx - 3x}$$

väärtus ei sõltu x väärtusest.

MURRU LAIENDAMINE.

177. Laienda murd $\frac{11}{17}$ nimetajani 51. Millega pead antud murru nimetajat korrutama, et saada uueks nimetajaks 51? Kui suur on laiendaja?

178. Näide. Laienda murd $\frac{2a-b}{a+3b}$ nimetajani $a^2 + 6ab + 9b^2$.

Lahendus.

$$a^2 + 6ab + 9b^2 = (a + 3b)^2.$$

Laiendaja on $a + 3b$.

$$\frac{2a-b}{a+3b} = \frac{(2a-b) \cdot (a+3b)}{(a+3b) \cdot (a+3b)} = \frac{2a^2 + 6ab - ab - 3b^2}{a^2 + 6ab + 9b^2} = \frac{2a^2 + 5ab - 3b^2}{a^2 + 6ab + 9b^2}.$$

179. Laienda järgmised murrud antud nimetajani:

- 1) $\frac{1}{a+b}$ nimetajani $a^2 - b^2$
- 2) $\frac{a-b}{a+b}$ „ $a^2 + 2ab + b^2$
- 3) $\frac{x+y}{x-y}$ „ $x^2 - 2xy + y^2$
- 4) $\frac{m+n}{m-n}$ „ $m^2 - n^2$
- 5) $\frac{a+b}{a-b}$ „ $a^3 - b^3$
- 6) $\frac{m-n}{m+n}$ „ $m^3 + n^3$
- 7) $\frac{2a+5}{3a-1}$ „ $9a^2 - 6a + 1$
- 8) $\frac{2x-3}{5x+7}$ „ $25x^2 + 70x + 49$

MURDUDE TEISENDAMINE ÜHENIMELISTEKS.

180. Tuleta meelde, kuidas teisendatakse murde ühenimelisteks.

Teisenda ühenimelisteks murrud

$$\frac{5}{54}, \frac{7}{81} \text{ ja } \frac{19}{135}.$$

181. Näide. Teisenda murrud

$$\frac{a-b}{a^2+2ab+b^2} \quad \text{ja} \quad \frac{2ab}{a^2-b^2} \quad \text{ühenimelisteks.}$$

$$\text{Lahendus. } a^2+2ab+b^2 = (a+b)^2$$

$$a^2-b^2 = (a+b)(a-b)$$

$$\hline VÜK = (a+b)^2(a-b).$$

Esimese murru laiendaja on

$$(a+b)^2(a-b) : (a^2+2ab+b^2) = a-b;$$

teise murru laiendaja on

$$(a+b)^2(a-b) : (a^2-b^2) = a+b.$$

$$\frac{a-b}{a^2+2ab+b^2} = \frac{(a-b) \cdot (a-b)}{(a^2+2ab+b^2) \cdot (a-b)} = \frac{(a-b)^2}{(a+b)^2(a-b)};$$

$$\frac{2ab}{a^2-b^2} = \frac{2ab \cdot (a+b)}{(a^2-b^2)(a+b)} = \frac{2ab \cdot (a+b)}{(a+b)(a-b)(a+b)} = \frac{2ab \cdot (a+b)}{(a+b)^2(a-b)}.$$

182. Teisenda järgmised murrud ühenimelisteks:

$$\begin{array}{ll} 1) \quad \frac{a}{a+b} \quad \text{ja} \quad \frac{b}{a-b} & 4) \quad \frac{2ab}{a^2-b^2} \quad \text{ja} \quad \frac{a+b}{a^2-2ab+b^2} \\ 2) \quad \frac{m}{m-n} \quad \text{ja} \quad \frac{n}{m+n} & 5) \quad \frac{b}{a(a+b)}, \quad \frac{a}{b(a-b)} \quad \text{ja} \quad \frac{ab}{a^2-b^2} \\ 3) \quad \frac{a-b}{a+b} \quad \text{ja} \quad \frac{a+b}{a-b} & 6) \quad \frac{c+d}{d(c-d)}, \quad \frac{c-d}{d(c+d)} \quad \text{ja} \quad \frac{cd}{c^2-d^2} \end{array}$$

MURDUDE LIITMINE JA LAHUTAMINE.

183. Kuidas toimub isenimeliste murdude liitmine ja lahutamine?

Teosta tehked:

$$\frac{12}{35} + \frac{29}{42} - \frac{61}{70}.$$

184. Näide. Teosta tehked:

$$\frac{m-2n}{m^3+n^3} - \frac{m-n}{m^2n-mn^2+n^3} - \frac{1}{mn+n^2}.$$

Lahendus.

1) Lahutame nimetajad tegureiks ja leiame nimetajate VÜK, mis on antud murdude ühiseks nimetajaks:

$$\begin{aligned}
 m^3 + n^3 &= (m + n)(m^2 - mn + n^2) \\
 m^2n - mn^2 + n^3 &= n(m^2 - mn + n^2) \\
 mn + n^2 &= n(m + n) \\
 \hline
 VÜK &= (m + n)(m^2 - mn + n^2)n.
 \end{aligned}$$

2) Jagades leitud VÜK iga murru nimetajaga, leiame iga murru laiendaja:

$$n, m + n \text{ ja } m^2 - mn + n^2.$$

3) Laiendame iga murdu vastava laiendajaga ja liidame laiendatud murrud:

$$\begin{aligned}
 &\frac{\overbrace{n}^n}{m - 2n} - \frac{\overbrace{m + n}^{m + n}}{m - n} - \frac{\overbrace{m^2 - mn + n^2}^{m^2 - mn + n^2}}{1} = \\
 &= \frac{n(m - 2n) - (m + n)(m - n) - (m^2 - mn + n^2)n}{(m + n)(m^2 - mn + n^2)n} = \\
 &= \frac{mn - 2n^2 - m^2 + n^2 - m^2 + mn - n^2}{(m + n)(m^2 - mn + n^2)n}.
 \end{aligned}$$

4) Koondame lugeja, saame

$$\frac{2mn - 2n^2 - 2m^2}{(m + n)(m^2 - mn + n^2)n}.$$

5) Kui võimalik, siis taandame. Taandamise võimaluse selgitamiseks lahutame lugeja tegureiks:

$$\begin{aligned}
 \frac{2mn - 2n^2 - 2m^2}{(m + n)(m^2 - mn + n^2)n} &= \frac{-2(m^2 - mn + n^2)}{(m + n)(m^2 - mn + n^2)n} = \\
 &= \frac{-2}{(m + n)n} = -\frac{2}{n(m + n)}.
 \end{aligned}$$

Vastus.

$$\frac{m - 2n}{m^3 + n^3} - \frac{m - n}{m^2n - mn^2 + n^3} - \frac{1}{mn + n^2} = -\frac{2}{n(m + n)}.$$

Aja ja ruumi kokkuhoidmiseks teostame punktides 1 kuni 5 esitatud teisendused edaspidi ühes võrduste reas, nagu on näidatud järgmises näites.

185. Näide. Lihtsusta avaldis

$$\frac{a}{a - 1} - \frac{2a}{1 - a} - \frac{3a^2 + a - 2}{a^2 - 1}.$$

Lahendus.

$$\begin{aligned}\frac{a}{a-1} - \frac{2a}{1-a} - \frac{3a^2+a-2}{a^2-1} &= \frac{a+1}{a-1} + \frac{a+1}{a-1} - \frac{1}{(a+1)(a-1)} = \\ &= \frac{a^2+a+2a^2+2a-3a^2-a+2}{(a+1)(a-1)} = \\ &= \frac{2a+2}{(a+1)(a-1)} = \frac{2(a+1)}{(a+1)(a-1)} = \frac{2}{a-1}.\end{aligned}$$

186. Teosta järgmised tehted:

$$\begin{aligned}1) \quad & \frac{b}{a+b} + \frac{a}{a-b} \\ & \frac{2a+3b}{2a-3b} - \frac{2a-3b}{3b-2a} \\ & \frac{7b-8a}{3a-2b} - \frac{b-4a}{2b-3a} \\ & \frac{3a-4b}{a^2-b^2} - \frac{3b-2a}{b^2-a^2} + 1 \\ & \frac{2b^3-2a^3}{a^3-b^3} - \frac{1}{b-a} + 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}2) \quad & \frac{a}{a-b} - \frac{b}{a+b} \\ & \frac{5x-6y}{x-y} - \frac{3x-2y}{y-x} \\ & \frac{7a+8}{5a-5} + \frac{8+4a}{4-4a} \\ & \frac{4}{x-y} + \frac{5x+5y}{2y^2-2x^2} - 2 \\ & \frac{2b^2-ab}{a^3+b^3} - \frac{a-b}{ab-a^2-b^2} - 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}3) \quad & \frac{1}{y-3} - \frac{1}{y-1} \\ & \frac{4-3a}{a-1} - \frac{4a-5}{1-a} \\ & \frac{1}{a+b} + \frac{1}{c} \\ & \frac{x}{2x-c} + \frac{c}{2x} \\ & \frac{x-y}{x+3y} - \frac{x+y}{3y}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}4) \quad & \frac{1}{2u-v} - \frac{1}{2u+v} \\ & \frac{5}{3x-3} - \frac{3}{2x-2} \\ & \frac{2}{a} + \frac{4a-b}{a^2+ab} \\ & \frac{1}{1-c} - \frac{1}{c+1} \\ & \frac{7n}{5m^2-m} - \frac{2n}{10m-2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}5) \quad & \frac{4}{x-1} + \frac{3}{1-x} \\ & \frac{3}{2x-1} + \frac{7}{2x+1} - \frac{4-20x}{1-4x^2} \\ & \frac{5}{5+3n} + \frac{3}{5-3n} - \frac{3n-35}{9n^2-25} \\ & \frac{a-b}{a+b} + \frac{a+b}{a-b} \\ & \frac{4a+x}{4a-x} + \frac{4a-x}{x-4a}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}6) \quad & \frac{2}{1-a^2} - \frac{2}{a-1} \\ & \frac{2a+3x}{2a-3x} - \frac{2a-3x}{3x-2a} \\ & \frac{x}{x-y} + \frac{3x}{x+y} - \frac{2xy}{x^2-y^2} \\ & \frac{2}{2x+3} + \frac{3}{3-2x} + \frac{2x+15}{4x^2-9} \\ & \frac{2x-19}{3x-4} - \frac{5x}{6x-8} - \frac{1}{2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 7) \quad & \frac{2}{a+b} + \frac{3}{a-b} + \frac{4a+8b}{a^2-b^2} \\
 & \frac{2}{2a+3} + \frac{3}{3-2a} + \frac{2a+15}{4a^2-9} \\
 & \frac{2}{a} + \frac{3}{b-2a} - \frac{2a-3b}{4a^2-b^2} \\
 & \frac{1}{(a-2)(a-3)} + \frac{2}{(a-1)(3-a)} + \frac{1}{(a-1)(a-2)} \\
 & \frac{n}{n^2-1} + \frac{n^2+n-1}{n^3-n^2+n-1} + \frac{n^2-n-1}{n^3+n^2+n+1} + \frac{2n^3}{n^4-1}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 8) \quad & \frac{a-2b}{a^3+b^3} - \frac{a-b}{a^2b-ab^2+b^3} - \frac{1}{ab+b^2} \\
 & \frac{1}{a-b} - \frac{3ab}{a^3-b^3} - \frac{b-a}{a^2+ab+b^2} \\
 & \frac{2}{4+a} - \frac{a-3}{16-4a+a^2} - \frac{a^2-9a}{64+a^3} \\
 & \frac{1}{2m-3n} - \frac{2m+3n}{4m^2+6mn+9n^2} - \frac{6mn}{8m^3-27n^3} \\
 & \frac{a+1}{2a-2} + \frac{a^2+3}{2-2a^2} + \frac{2a-3}{a+1}
 \end{aligned}$$

187. Näide. Kirjuta avaldis

$$a - b - \frac{a^2 - b^2 + ab}{b}$$

murruna.

Lahendus.

$$a - b = \frac{a-b}{1} = \frac{b(a-b)}{b} = \frac{ab-b^2}{b};$$

seega

$$\begin{aligned}
 a - b - \frac{a^2 - b^2 + ab}{b} &= \frac{ab-b^2}{b} - \frac{a^2 - b^2 + ab}{b} = \\
 &= \frac{ab-b^2-a^2+b^2-ab}{b} = \frac{-a^2}{b} = -\frac{a^2}{b}.
 \end{aligned}$$

188. Kirjuta järgmised avaldised murdudena:

$$1) \quad 1 + \frac{a}{1-d}$$

$$4) \quad \frac{b}{b+x} + 1$$

$$2) \quad 1 + n + \frac{n^2}{1-n}$$

$$5) \quad x - 3 + \frac{7}{x+3}$$

$$3) \quad a - b - \frac{a^2 - b^2}{a}$$

$$6) \quad \frac{x^2 - x - 6}{x^2 - 4} - 2 - \frac{x-1}{2-x}$$

189. Maja veevärgi kraan annab torustiku korrasolekul q liitrit vett minutis. Torude osalisel ummistumisel langeb minutiline läbivool d liitri võrra. Mitme minuti võrra kasvab sel puhul vanni täitumise aeg, kui vanni lastakse v liitrit vett?

190. Ujuja ujub seisvas vees kiirusega v meetrit sekundis. Jõe- voolu kiirus on w meetrit sekundis. Kui palju aega kulub ujujal k meetri ujumiseks vastuvoolu rohkem kui sama vahemaa ujumiseks päri voolu?

Kui palju aega kulub ujujal k meetri edasi-tagasi ujumiseks?

MURDUDE KORRUTAMINE.

191. Korruta.

$$\begin{array}{lll}
 1) \ 3 \cdot \frac{5}{6} & 2) \ \frac{9}{16} \cdot \frac{20}{21} \cdot \frac{28}{45} & 3) \ \frac{113}{355} \cdot 1 \frac{2}{113} \\
 14 \cdot \frac{2}{7} & \frac{17}{18} \cdot \frac{27}{34} \cdot \frac{9}{16} & 1 \frac{1}{3} \cdot 20 \frac{1}{4} \\
 3a \cdot \frac{b}{6a} & \left(\frac{a^2}{b^2} \right) \cdot \frac{b}{c} \cdot \frac{c^2}{a^2} & \left(1 + \frac{a+b}{a-2b} \right) \cdot \left(2 - \frac{3a}{2a-b} \right) \\
 \frac{a}{10b} \cdot 5b & \left(-\frac{2a}{3b} \right) \cdot \left(-\frac{6c}{4a} \right) \cdot 2b & \left(1 - \frac{a-2b}{2a+b} \right) \cdot \left(2 - \frac{5b}{a+3b} \right)
 \end{array}$$

192. Näide. Leia korrutis

$$(4 - a^2) \cdot \frac{3a}{2 + a}.$$

Lahendus.

$$\begin{aligned}
 (4 - a^2) \cdot \frac{3a}{2 + a} &= \frac{(4 - a^2) \cdot 3a}{2 + a} = \frac{3a(2 + a)(2 - a)}{2 + a} = \\
 &= 3a(2 - a) = 6a - 3a^2.
 \end{aligned}$$

193. Näide. Lihtsusta avaldis

$$\frac{x^2 - 4u^2}{x + u} \cdot \frac{x^2 - u^2}{x + 2u}.$$

Lahendus.

$$\begin{aligned}
 \frac{x^2 - 4u^2}{x + u} \cdot \frac{x^2 - u^2}{x + 2u} &= \frac{(x^2 - 4u^2) \cdot (x^2 - u^2)}{(x + u) \cdot (x + 2u)} = \\
 &= \frac{(x + 2u)(x - 2u) \cdot (x + u)(x - u)}{(x + u) \cdot (x + 2u)} = (x - 2u)(x - u).
 \end{aligned}$$

194. Korruta.

$$1) \frac{x^2 - y^2}{xy} \cdot \frac{y}{x^2 + xy} - \frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2} \cdot \left(-\frac{3a^2}{4a - 4b} \right) \\ (2x - 2a) \cdot \frac{c}{x - a} \\ \frac{m + n}{7m} \cdot \frac{5m}{2m + 2n}$$

$$2) \frac{a^2 + ab}{3bc} \cdot \frac{12c}{a^2 - b^2} - \frac{10b^2 - 10a^2}{a^2} \cdot \left(\frac{b^2 + a^2}{5a + 5b} \right) \\ (x + 1) \cdot \frac{3}{x^2 - 1} \\ \frac{4n + 1}{6 - 10n} \cdot (5n - 3)$$

$$3) \frac{m}{n - 1} \cdot \frac{n^2 - 2n + 1}{m + mn} \\ \frac{x + 7u}{x - 7u} \cdot (x^2 - 49u^2) \\ \frac{x^2 - u^2}{2a + 2b} \cdot \frac{a + b}{3x + 3u} \\ \frac{x^2 - 1}{4} \cdot \frac{12}{x - 1} \\ \frac{u^2 - 4v^2}{8u} \cdot \frac{12u^2}{2u - 4v}$$

$$4) \frac{4ax - 4x}{a + 1} \cdot \frac{1}{4(a - 1)} \\ \frac{x + a}{x - a} \cdot \frac{3a}{x^2 - a^2} \\ \frac{9 - z^2}{3z} \cdot \frac{d}{3 + z} \\ \left(1 + \frac{1}{x} \right) \cdot \frac{5x}{x^2 - 1} \\ \frac{s^2 - 3s}{7t} \cdot \frac{14t^2}{s^2 - 9}$$

$$5) \frac{5p(p - q)}{3r(p + q)} \cdot \frac{3(p^2 + q^2)}{5(p^2 - q^2)} \\ \frac{4r^2 + 8r}{3r + 9} \cdot \frac{15r + 45}{14r^2 + 28r} \\ \frac{3a + 3}{a^2 + 6a + 9} \cdot \frac{6a + 18}{a^2 - 1} \\ \frac{a}{a - b} \cdot \left(-\frac{b - a}{c} \right) \\ -\frac{ab + ac}{cd - bd} \cdot \frac{ab - ac}{bd + cd}$$

$$6) \frac{ad - ab}{bc + cd} \cdot \frac{ab + ad}{bc - cd} \\ \frac{a^2 + 4a + 4}{3a + 6} \cdot \frac{6a - 12}{a^2 - 4} \\ \frac{9 - 6b + b^2}{3 + b} \cdot \frac{9 + 6b + b^2}{3 - b} \\ \frac{7a^2 + 28a + 28}{21a^2 - 189} \cdot \frac{3a^2 - 18a + 27}{a^2 - 4} \\ \frac{3a^2 - 3}{2a^2 + 8a + 8} \cdot \frac{a^2 - 4}{6a^2 - 12a + 6}$$

195. Leia jagatised:

$$\begin{array}{llll}
 1) \frac{39}{67} : \frac{52}{134} & 2) \frac{22}{35} : \frac{33}{70} & 3) \frac{a^2}{b^2} : \frac{5}{a} & 4) -\frac{2x}{3y} : \left(-\frac{2y}{3x}\right) \\
 26 : \frac{13}{15} & 7 : \frac{14}{15} & \frac{6a^2}{25b^2} : \frac{3a}{5b} & \frac{8m^2n}{15k} : \frac{2mn^2}{3k} \\
 \frac{15}{16} : 5 & -\frac{5}{8} : 15 & a^2b : \frac{ab^2}{n} & -m^2 : \left(-\frac{2m}{a^2}\right) \\
 12\frac{1}{2} : 7\frac{1}{2} & 13\frac{1}{3} : 4\frac{4}{9} & \frac{4ax}{b} : 8ax^2 & \frac{8c^2n}{3a} : 4ac
 \end{array}$$

196. Näide. Leia jagatis

$$\frac{3a+2}{2} : (9a^2 - 4).$$

Lahendus. Korrutades murru nimetaja täisavaldisega, saame

$$\frac{3a+2}{2} : (9a^2 - 4) = \frac{3a+2}{2(9a^2 - 4)} = \frac{3a+2}{2(3a+2)(3a-2)} = \frac{1}{2(3a-2)}.$$

197. Näide. Leia jagatis

$$(a+x)^2 : \frac{2a+2x}{6}.$$

Korrutades täisavaldisega murru pöördarvuga, saame

$$(a+x)^2 : \frac{2a+2x}{6} = \frac{6(a+x)^2}{2a+2x} = \frac{6(a+x)^2}{2(a+x)} = \frac{3(a+x)}{1} = 3(a+x).$$

198. Leia järgmised jagatised:

$$\begin{array}{ll}
 1) \frac{a+b}{c} : (a+b) & 2) \frac{4n(p-q)}{p} : (p-q) \\
 \frac{x^2-c^2}{7c} : (x+c) & \frac{m^2-mn}{6} : (3m-3n) \\
 \frac{5a+1}{3} : (25a^2-1) & \frac{4a^2+4a+1}{a-1} : (4a^2-1) \\
 c^2 : \frac{-c^3}{a+b} & (2p+2q) : \frac{p+q}{5a} \\
 (x+2y) : \left(\frac{x+2y}{4n}\right) & (a-m)^2 : \frac{3a-3m}{8} \\
 (14m-7) : \frac{4m^2-1}{9} & (a^3-n^3) : \frac{a^2+an+n^2}{a-n}
 \end{array}$$

199. Näide. *Leia jagatis*

$$\frac{a^2 - 4}{x} : \frac{a + 2}{x^2 - x}$$

Lahendus. Lahutades esimese murru lugeja tegureiks, saame:

$$a^2 - 4 = (a + 2)(a - 2).$$

Lahutades teise murru nimetaja tegureiks, saame:

$$x^2 - x = x(x - 1).$$

Korrutades nüüd esimese murru teise murru pöördarvuga ning taandades, saame:

$$\frac{a^2 - 4}{x} : \frac{a + 2}{x^2 - x} = \frac{(a + 2)(a - 2)x(x - 1)}{x(a + 2)} = (a - 2)(x - 1).$$

200. Leia järgmised jagatised:

$$1) \frac{x^2 - ax}{4a} : \frac{x}{8a^2}$$

$$\frac{a^2 - x^2}{ax} : \frac{a + x}{a^2 x^2}$$

$$\frac{p^2 + pq}{rx + sx} : \frac{p^3 + p^2 q}{rx^3 + sx^3}$$

$$\frac{105f^2}{gh - 1} : \frac{84fg}{1 - gh}$$

$$(R^2 - 2 + \frac{1}{R^2}) : 3(R - \frac{1}{R})$$

$$2) \frac{2x - 4}{5a} : \frac{x - 2}{15a^2}$$

$$\frac{(m + n)^2}{4m - 4n} : \frac{6m + 6n}{m - n}$$

$$\frac{a + b}{a - b} : \frac{b + a}{b - a}$$

$$\left(\frac{Q}{2} - \frac{2}{Q}\right) : \frac{Q + 2}{4Q}$$

$$\frac{2a}{x - 2} : \frac{4}{2 - x}$$

KÕIK TEHTED MURDUDEGA.

201. Näide. *Lihtsusta avaldis*

$$\left(\frac{a + 2}{a - 2} + \frac{a - 2}{a + 2}\right) \cdot (a^2 - 4).$$

Lahendus. Sulgudes olevate murdude ühiseks nimetajaks on $(a - 2)(a + 2)$. Vastavad laiendajad on $a + 2$ ja $a - 2$. Niisiis

$$\begin{aligned} \left(\frac{a+2}{a-2} + \frac{a-2}{a+2}\right) : (a^2 - 4) &= \frac{(a+2)(a+2) + (a-2)(a-2)}{(a-2)(a+2)} (a^2 - 4) = \\ &= \frac{(a^2 + 4a + 4 + a^2 - 4a + 4)(a^2 - 4)}{a^2 - 4} = 2a^2 + 8. \end{aligned}$$

202. Lihtsusta järgmised avaldised:

$$1) \left(\frac{a}{3} + \frac{4}{b} \right) \cdot \frac{3b}{4a}$$

$$2) \left(\frac{2x}{7y} - \frac{3y}{5x} \right) \cdot \left(\frac{35x^2}{6y^2} \right)$$

$$3) \left(\frac{x}{3} - \frac{3}{x} \right) : (x + 3)$$

$$4) \left(\frac{a}{b} - \frac{b}{a} \right) : \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right)$$

$$5) \left(\frac{a+1}{a-1} + \frac{a-1}{a+1} \right) \cdot (a^2 - 1)$$

$$6) \left(\frac{a-3}{a+3} + \frac{a+3}{a-3} \right) \cdot (a^2 - 9)$$

203. Näide. Lihtsusta avaldis

$$\frac{2 + \frac{2}{a-2}}{2 - \frac{2}{a+2}}$$

Lahendus.

$$\begin{aligned} \frac{2 + \frac{2}{a-2}}{2 - \frac{2}{a+2}} &= \left(2 + \frac{2}{a-2} \right) : \left(2 - \frac{2}{a+2} \right) = \frac{2(a-2)+2}{a-2} : \frac{2(a+2)-2}{a+2} = \\ &= \frac{2a-4+2}{a-2} : \frac{2a+4-2}{a+2} = \frac{2a-2}{a-2} : \frac{2a+2}{a+2} = \frac{(2a-2)(a+2)}{(a-2)(2a+2)} = \\ &= \frac{2(a-1)(a+2)}{(a-2) \cdot 2(a+1)} = \frac{(a-1)(a+2)}{(a-2)(a+1)} = \frac{a^2+a-2}{a^2-a-2}. \end{aligned}$$

204. Näide. Lihtsusta mitmekordset murdu

$$\frac{1 - \frac{1}{a+1}}{1 + \frac{1}{a+1}}$$

laiendamise teel.

Lahendus. Korrutades lugejat ja nimetajat avaldisega $a+1$, saame:

$$\frac{1 - \frac{1}{a+1}}{1 + \frac{1}{a+1}} = \frac{a+1-1}{a+1+1} = \frac{a}{a+2}.$$

205. Lihtsusta järgmised avaldised:

$$1) \frac{x + \frac{x}{2}}{x - \frac{x}{2}}$$

$$2) \frac{a + \frac{1}{3}}{a - \frac{1}{2}}$$

$$3) \frac{\frac{m}{n} - \frac{p}{q}}{\frac{1}{n} - \frac{1}{q}}$$

$$4) \frac{1 - \frac{b}{a}}{a + b}$$

$$5) \frac{1 - \frac{p}{q}}{\frac{q-p}{r}}$$

$$6) \frac{1 - \frac{1}{n}}{\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}}$$

$$7) \frac{1+c}{1+\frac{1}{c}}$$

$$8) \frac{\frac{5m}{2n}}{\frac{1}{2n} - \frac{1}{4}}$$

$$9) \frac{1 + \frac{1}{m-1}}{1 - \frac{1}{m+1}}$$

$$10) \frac{a + \frac{5}{6}b}{a - \frac{4}{9}b} - 1$$

206. Teosta tehted:

$$1) \left(\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{a} \right) : \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right)$$

$$6) \left(\frac{1}{a^3} + \frac{1}{b^3} \right) : \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right)$$

$$2) \left(\frac{a}{b^2} - \frac{b}{a^2} \right) : (a - b)$$

$$7) \frac{x^4 - y^4}{x^2 - xy + y^2} \cdot \frac{x^3 + y^3}{x^2 - y^2}$$

$$3) \left(\frac{x^3}{y} - \frac{y^3}{x} \right) : \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right)$$

$$8) \left(\frac{1}{x-3} - \frac{1}{y} \right) : \left(\frac{1}{x-3} - \frac{1}{y} \right)$$

$$4) \left(\frac{m^2}{n^2} - \frac{n^2}{m^2} \right) : (m + n)$$

$$9) \left(\frac{1-x}{1+x} - \frac{4x}{x^2-1} \right) \cdot \frac{1-x}{2x}$$

$$5) \left(\frac{a+b}{b} - \frac{2b}{b-a} \right) \cdot \frac{b-a}{a^2+b^2}$$

$$10) \frac{a^2-1}{b-1} : \frac{1-a^4}{1-b^2}$$

207. Näide. Lihtsusta avaldis

$$\left[\frac{(a+b)^3}{3ab} - a - b \right] : \left[\frac{(a-b)^2}{ab} + 1 \right] =$$

ja arvuta ta väärtus, kui $a = 2\frac{1}{2}$ ja $b = 3\frac{1}{2}$.

Lahendus.

$$\begin{aligned} & \left[\frac{(a+b)^3}{3ab} - a - b \right] : \left[\frac{(a-b)^2}{ab} + 1 \right] = \\ &= \frac{(a+b)^3 - 3a^2b - 3ab^2}{3ab} : \frac{(a-b)^2 + ab}{ab} = \\ &= \frac{a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 - 3a^2b - 3ab^2}{3ab} : \frac{a^2 - 2ab + b^2 + ab}{ab} = \\ &= \frac{a^3 + b^3}{3ab} : \frac{a^2 - ab + b^2}{ab} = \frac{(a^3 + b^3)ab}{3ab(a^2 - ab + b^2)} = \\ &= \frac{(a+b)(a^2 - ab + b^2)}{3(a^2 - ab + b^2)} = \frac{a+b}{3}. \end{aligned}$$

Kui $a = 2\frac{1}{2}$ ja $b = 3\frac{1}{2}$, siis $\frac{a+b}{3} = \frac{6}{3} = 2$.

208. Lihtsusta avaldis ja arvuta ta väärtus.

- 1) $\left(1 + a - \frac{a^2 + 3}{a + 1}\right) \cdot \left[\frac{1}{4} - \left(\frac{1}{2}a\right)^2\right]$, kui $a = \frac{1}{2}$;
- 2) $\left[\frac{a^2 + ax}{2x} : (a^2 - x^2)\right] \cdot \left[\frac{(a + x)^2}{4ax} - 1\right]$, kui $a = 4$ ja $x = -2$;
- 3) $\left(\frac{a - 1}{a + 1} - \frac{a + 1}{a - 1}\right) \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{a}{4} - \frac{1}{4a}\right)$, kui $a = 1\frac{1}{2}$;
- 4) $\frac{a^3 + 27}{a^3 - 27} \cdot \frac{a - 3}{a^2 - 3a + 9}$, kui $a = 2$;
- 5) $\frac{a + 2}{a^2} - \frac{a - 3}{3a} - \frac{3a + 2}{a^2} + \frac{5}{6}$, kui $a = \frac{1}{4}$;
- 6) $\frac{2a + 3b^2}{4b^2} + \frac{6 - 15a}{20a} - \frac{a^3 - 2b^3}{2a^2b^2} - \frac{4}{5a}$, kui $a = b = -1$;
- 7) $\left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a} - 2\right) : \left(\frac{a}{b} - \frac{b}{a}\right)$, kui $a = 5\frac{1}{2}$ ja $b = 3\frac{2}{3}$;
- 8) $\left(3a - \frac{12a^2 - b^2}{4a - 2b}\right) : \frac{\frac{b}{6} - a}{\frac{1}{3}}$, kui $a = -\frac{1}{2}$ ja $b = \frac{1}{3}$;
- 9) $\left(\frac{x - 4}{x + 1} - \frac{x - 5}{x^2 - 1}\right) : \frac{x - 3}{2x^2 - 2}$, kui $x = -2\frac{1}{2}$;
- 10) $\frac{2 - x}{2x^2 + 4x} + \frac{2}{3x + 6} - \frac{2}{3x^2 + 12x + 12} - \frac{4}{3x(x + 2)^2}$, kui $x = \frac{1}{6}$;
- 11) $\frac{1}{m + 2} + \frac{1}{m - 2} + \frac{m}{4 - m^2} - \frac{4}{m^3 - 4m}$, kui $m = 0,1$;
- 12) $\left[x + 2 : \left(1 + \frac{x}{2}\right)\right] \cdot \frac{x + 2}{x^3 - 8} + \frac{1}{x - 2}$, kui $x = 2\frac{1}{2}$;
- 13) $\frac{a^3 - 8}{a + 2} : \left[a + 2 : \left(1 + \frac{a}{2}\right)\right] - \frac{a - 2}{2}$, kui $a = 1\frac{1}{2}$;
- 14) $\left(\frac{3a + 2b}{4b} - 2\right) : \left(1 - \frac{5}{6}a - \frac{5b + 3a}{3}\right)$, kui $b = 0,9$;
- 15) $\frac{x^4 + x^3 - x - 1}{1 - y^2} \cdot \frac{y^2 - 1}{x^2 + x} \cdot \left(1 - \frac{x}{x - 1}\right)$, kui $x = 1\frac{2}{3}$;
- 16) $\left(2m + \frac{m^2 + n^2}{n}\right) : \left(m + \frac{n^2}{m + 2n}\right) - \frac{m}{n} \left(n + 1 + \frac{2n}{m}\right)$,
kui $m = -\frac{1}{2}$;
- 17) $\left[m - \frac{1}{m} : \left(\frac{1}{m} - 1\right)\right] \cdot \frac{1 - m^2}{m^4 + m}$, kui $m = -\frac{2}{3}$;
- 18) $\left(\frac{4n^2 + 2n + 1}{2n + 1} \cdot \frac{n + 1}{8n^3 - 1} + \frac{1}{2 - 4n}\right) : \frac{2n + 1}{4n - 2} - \frac{2}{(2n + 1)^2}$, kui $n = \frac{1}{2}$;

- 19) $\frac{a^2 + ab + b^2}{a^2 - ab + b^2} : \frac{a^3 - b^3}{a^3 + b^3} = \frac{a-b}{a+b}$, kui $a = 15$ ja $b = 14$;
- 20) $\frac{38(a^2 - 3a + 9)}{11a} : 95(a^3 + 27)$, kui $a = \frac{2}{11}$;
- 21) $\frac{18(x^3 - 8)}{4(x+2)} : 42(x^2 + 2x + 4)$, kui $x = -2$;
- 22) $\frac{a-x}{ax} \cdot \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{x}\right) : \frac{a^2 + x^2}{ax} \cdot \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{x}\right)$, kui $a = 0,7$ ja $x = 5$;
- 23) $\left(a - 2 + \frac{1}{a}\right) : \left(a^2 - a - 1 + \frac{1}{a}\right)$, kui $a = 24$.

KORDAMISEKS.

209. Näita, et

- 1) $(a + b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a + b)$
 2) $(a - b)^3 = a^3 - b^3 - 3ab(a - b)$

210. Lahuta kahel viisil tegureiks:

- 1) $x^3 + 3x^2 + 3x + 1$ 3) $a^3 + 6a^2 + 12a + 8$
 2) $x^3 - 3x^2 + 3x - 1$ 4) $27 - 27a + 9a^2 - a^3$

211. Kontrolli, kas kumbki alljärgnev võrdus on õige:

- a) $x(x+1)(x+2)(x+3) = (x^2 - 3x + 1)^2$
 b) $(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2$

212. Arvuta x võrdest:

- 1) $\frac{a+1}{x} = \frac{a^2-1}{a-1}$ 6) $\frac{a^2-b^2}{(a+b)^3} = \frac{a-b}{x}$
 2) $\frac{a^3+3a^2+3a+1}{a^2+2a+1} = \frac{a+1}{x}$ 7) $\frac{a-b}{a^2-b^2} = \frac{x}{a-b}$
 3) $\frac{x}{n-1} = \frac{n^2-2n+1}{n^3-3n^2+3n-1}$ 8) $\frac{3a-6b}{x} = \frac{a-2b}{4}$
 4) $\frac{x}{a^2-a+1} = \frac{a+1}{a^3+1}$ 9) $\frac{nb}{x} = \frac{b(n+b)}{b+n}$
 5) $\frac{n-1}{n^3-1} = \frac{x}{n^2+n+1}$ 10) $\frac{a^2+ab+b^2}{a+b} = \frac{a^3-b^3}{x}$

213. Arvuta x võrdusest:

- 1) $(x+1)(x-1) - x(x-1) = 4$ 3) $(x+2)(x-2) - (x-1)^2 = 11$
 2) $(x+3)^2 - x^2 = 21$ 4) $(x+5)^2 - (x-5)^2 = 20$

- 5) $(x+3)(x^2-3x+9)-(x-1)^3-3x^2=1$
 6) $(x-2)(x^2+2x+4)-(x+1)^3+x(3x+4)=1$
 7) $x(x-2)^2-(x+1)(x^2-x+1)+4x^2=15$

214. Lihtsusta avaldised:

- 1) $\frac{a^2+b^2}{(a+b)^2} + \frac{\frac{2}{ab}}{\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right)^2}$
 2) $\frac{a(a-b)-b(a+b)}{\frac{a}{a+b} - \frac{b}{a-b}}$
 3) $\left[\frac{(a-x)^2}{ax} + 1\right] : \left[\frac{(a+x)^3}{3ax} - a - x\right]$
 4) $\frac{x^4-x-3x^3+3x^2}{x^3y-y^4} : \frac{x^4+x^2-2x^2}{x^2y^2+xy^3+y^4}$
 5) $\frac{x^2+xy}{x^2+y^2} : \frac{x^3y+xy^3+2x^2y^2}{x^4-y^4}$
 6) $\frac{a^2-ab}{a^2b+b^3} - \frac{2a^2}{b^3-ab^2+a^2b-a^3}$
 7) $1 - \frac{b-1}{a} - \frac{b}{a^2}$
 8) $\left[\frac{1}{(b-a)^3} : \frac{1}{(a-b)^2} - \frac{1}{a+b}\right] : \frac{2a^2}{a^2-b^2}$
 9) $\left(\frac{1}{b^2-a^2} : \frac{a^2}{a^3-b^3} + \frac{1}{a+b}\right) : \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{1+b}\right)$
 10) $\frac{2a^2b}{(a-b)^3} - \frac{b^2}{(a-b)^2} + \frac{a}{a-b}$

215. Taanda murrud:

- | | |
|--|---|
| 1) $\frac{a^5-a^4-a^3+a^2}{a^6-2a^4+a^2}$ | 7) $\frac{a^2-2a+1}{b-ab}$ |
| 2) $\frac{9a^2-16b^2}{9a^2-24ab+16b^2}$ | 8) $\frac{8a^3+b^3}{2a+b}$ |
| 3) $\frac{a^2-2ab+b^2-am+bm}{a^2-am-b^2-bm}$ | 9) $\frac{(a^2+b^2)(y-x)^2}{(x^2-y^2)(a^4-b^4)}$ |
| 4) $\frac{x^3-4x^2+8x-8}{x^4-2x^3+8x-16}$ | 10) $\frac{3a^4c+5a^3bc-2a^3c^2}{2ab^2c^2-3a^2b^2c-5ab^3c}$ |
| 5) $\frac{(x^2-x-7)^2-25}{(x^2-x-6)^2-36}$ | 11) $\frac{x^5-2x^3+x}{x^5-x^4+x^2-x}$ |
| 6) $\frac{a^2-b^2-2bc-c^2}{b^2-2bc+c^2-a^2}$ | 12) $\frac{x^4+x^2y^2+y^4}{x^6-y^6}$ |

216. Teosta tehted.

$$1) \frac{a^2 + b^2}{a + b} + 2(a - b)$$

$$3) \frac{1 - a}{3b^2 - 12a^2} \cdot \frac{6a + 3b}{a^2 - 1}$$

$$2) \frac{x^2 + y^2}{x + y} + 3(x - y)$$

$$4) \frac{a^2 - 2a + 4}{a^2 + 2a + 4} \cdot \frac{a^3 + 8}{a^3 - 8}$$

$$5) \frac{m^3 + n^3}{(m - n)^3} + \frac{mn}{(m - n)^2} - \frac{m + n}{m - n}$$

$$6) \frac{5}{4x + 4y} + \frac{3}{x - y} - \frac{13x + 7y}{4(x^2 - y^2)}$$

$$7) \frac{x^2 + xy + y^2}{x + y} - \frac{x^2 - xy + y^2}{x - y} + \frac{2y^3 - y^2 + x^2}{x^2 - y^2}$$

217. Et antud arvu korrutada 100-ga ja siis tulemusega liita mingi kahekohaline arv, selleks tuleb ainult antud arvu lõppu kirjutada see kahekohaline arv.

Näide.

$$100 \cdot 37 + 46 = 3746$$

Arvuta peast:

$$100 \cdot 58 + 12$$

$$100 \cdot 375 + 39$$

$$100 \cdot 8 + 34$$

218. Peast saab kergesti korrutada kahte kahekohalist arvu, millede algusnumbrid on võrdsed ja lõpunumbrite summa on 10.

Olgu ühe arvu numbrid a ja b , teise numbrid a ja c , kusjuures $b + c = 10$.

$$\begin{aligned} \text{Korrutades need arvud, saame } (10a + b) \cdot (10a + c) &= \\ &= 100a^2 + 10ab + 10ac + bc = 100a^2 + 10a(b + c) + bc = \\ &= 100a^2 + 10a \cdot 10 + bc = 100a^2 + 100a + bc = \\ &= 100a(a + 1) + bc. \end{aligned}$$

Seega

$$(10a + b) \cdot (10a + c) = 100 \cdot a \cdot (a + 1) + bc$$

Selleks et korrutada kahte kahekohalist arvu, millede algusnumbrid on võrdsed ja lõpunumbrite summa on 10, tuleb nende arvude algusnumber korrutada 1 võrra suurema arvuga ning tulemusele kirjutada lõppu lõpunumbrite korrutis.

$$83 \cdot 87 = 7221$$

Märkus. Kui antud arvude lõpunumbrid on 1 ja 9, siis tuleb algusnumbri ja 1 võrra suurendatud arvu korrutisele kirjutada juurde 09. Miks?

219. Korruta peast

1) $72 \cdot 78$	2) $36 \cdot 34$	3) $49 \cdot 41$
$56 \cdot 54$	$23 \cdot 27$	$48 \cdot 42$
$71 \cdot 79$	$88 \cdot 82$	$94 \cdot 96$
$17 \cdot 13$	$22 \cdot 28$	$77 \cdot 73$
$57 \cdot 53$	$24 \cdot 26$	$38 \cdot 32$

220. 5-ga lõppeva kahekohalise arvu ruudu leidmine taandub kahe võrdse arvu korrutamisele, millede algusnumbrid on võrdsed ja lõpunumbrite summa on 10. Seega saame 5-ga lõppeva kahekohalise arvu ruudu leidmiseks järgmise eeskirja:

et leida 5-ga lõppeva kahekohalise arvu ruutu, tuleb selle arvu esimene number korrutada 1 võrra suurema arvuga ja tulemusele kirjutada lõppu 25.

Näide.

$$35^2 = 1225.$$

221. Arvuta peast järgmised ruudud.

75^2	95^2	55^2	25^2	45^2
$8,5^2$	$6,5^2$	$7,5^2$	$3,5^2$	$5,5^2$

4. SIRGETE LÕIKUMINE JA PARALLEELSUS.

MATEMAATILISED LAUSED.

222. a) Mis on algarv? Mis on paarisarv? Mis on kahe arvu väikseim ühiskordne? Mida nimetatakse kahe arvu suurimaks ühisteguriks?

b) Mis on rööpkülik? Mida nimetatakse kolmnurga kõrguseks? Missugust hulknurka nimetatakse korrapäraseks? Missugust kolmnurka nimetatakse teravnurkseks, missugust nürinurkseks?

223. Lauset, mis selgitab mingi uue mõiste sisu, nimetatakse **definiitsiooniks**.

Definiitsioon on seega vastus selle mõiste kohta esitatud küsimusele «Mis see on?».

Definiitsiooni andmine on defineerimine.

Näiteks lause «Rööpkülik on nelinurk, mille vastasküljed on paralleelsed» on definiitsioon, sest selle lausega selgitatakse mõiste «rööpkülik» sisu.

Definiitsiooni saab alati anda niisugusel kujul, et selles esineb sõna «nimetatakse». Näiteks rööpküliku definiitsiooni saab anda ka kujul «Rööpkülikuks nimetatakse nelinurka, mille vastasküljed on paralleelsed».

224. Anna järgmiste mõistete definiitsioonid: teravnurk, sirg-nurk, võrdkülgne kolmnurk, kaarekraad, ring, võrdsed kujundid.

225. Lauseid, mis väljendavad geomeetriliste kujundite (või arvude) omadusi, on kahte liiki: aksioomid ja teoreemid.

Teoreem on niisugune lause, mille õigsust saab põhjendada varem tundma õpitud lausete abil.

Teoreemi põhjendamist varem tundma õpitud lausete abil nimetatakse teoreemi tõestamiseks.

Aksioom ehk põhilause on niisugune lause, mida loetakse õigeks ilma tõestuseta.

Näiteks sirgjoone omadustest kasutame aksioomina lauset


kaht punkti läbib ainult üks sirgjoon.

Seevastu lause


kaks sirgjoont saavad lõikuda ainult ühes punktis on teoreem, sest tema õigsust saab põhjendada eelmise aksioomi abil. Tõepoolest, kui kaks sirgjoont lõikuksid kahes punktis, siis neid punkte läbiks kaks sirgjoont. Kuid seda antud aksioomi järgt ei saa olla. Selle tõttu tuleb õigeks lugeda väide, et kaks sirgjoont saavad lõikuda ainult ühes punktis.

226. Geomeetriliste kujundite omadusi õpitakse sageli tundma vaatluste ja mõõtmiste teel. Sel teel leitud omadused ei tarvitse alati olla õiged ja vajavad seepärast tõestamist. Et vaatlus võib anda ebaõigeid tulemusi, selles saame veenduda jooniste 14 kuni 17 vaatlemisel.

a) Joonisel 14 kaldu läbikriipsutatud sirged ei näi olevat paralleelsed. Kontrolli nende vastastikust asendit rööplükke abil.




Joon. 14.




Joon. 15.

b) Kumb lõikudest *a* ja *b* joonisel 15 on pikem?

c) Kas joonis 16 kujutab spiraale või ühise keskpunktiga ringjooni? Kontrolli oma arvamist sirgli abil.



Joon. 16.



Joon. 17.

d) Mitu kuupi on kujutatud joonisel 17? Pööra joonist 180° võrra ja vaata uuesti. Missuguses kuupide reas kuupide arv lehe pööramisel näib muutuvat ja kui palju?

227. Tuleta meelde teoreemid, mis väljendavad kahe kolmnurga võrdsuse tingimusi.

228. Tuleta meelde teoreemid, mis väljendavad võrdhaarse kolmnurga omadusi.

229. Tuleta meelde teoreem

- a) ristküliku pindalast;
- b) kolmnurga pindalast;
- c) korrapärase hulknurga pindalast.

230. Tuleta meelde teoreem, mis väljendab,

- a) milline arv jagub 9-ga;
- b) milline arv jagub 5-ga;
- c) milline arv jagub 2-ga.

TEOREEMI KOOSTIS.

231. Iga teoreemi saab sõnastada nii, et üks osa temast algab sõnaga «kui» ja teine osa sõnaga «siis».

Näiteks teoreemi «Võrdhaarse kolmnurga alusnurgad on võrdsed» saab sõnastada ka nii: «Kui kolmnurk on võrdhaarne, siis tema alusnurgad on võrdsed.»

Seda osa teoreemist, mis algab sõnaga «kui», nimetatakse teoreemi eelduseks, ja seda osa, mis algab sõnaga «siis» — teoreemi väiteks.

Teoreemi eeldus ütleb, mis vaadeldava kujundi (või arvu) kohta on teada ehk mis tema kohta on antud, ja väide ütleb, mis eeldusest järeldeb selle kujundi (või arvu) kohta. Näiteks ülalantud teoreemi eeldus ütleb, et vaadeldav kujund on võrdhaarne kolmnurk, ja väide ütleb, et siis kolmnurga alusnurgad on võrdsed.

232. Leia iga alljärgneva teoreemi eeldus ja väide ning sõnasta iga teoreem nii, et temas esineksid sõnad «kui» ja «siis»:

a) võrdhaarse kolmnurga aluse mediaan on ühtlasi kolmnurga kõrguseks;

b) korrapärase kuusnurga külg on võrdne tema ümberringjoone raadiusega;

c) nulliga lõppev arv jagub 10-ga.

233. Sõnasta teoreem, mille eeldus ja väide on allpool kõrvuti antud.

Eeldus.

Väide.

a) Arvu ristsumma jagub 9-ga.

Arv jagub 9-ga.

b) Kolmnurga kaks külge on võrdsed.

Kolmnurga kaks nurka on võrdsed.

c) Kolmnurk on täisnurkne.

Kolmnurga kahe teravnurga summa on täisnurk.

d) Hulknurk on korrapärane.

Hulknurga pindala võrdub poole ümberrõõdu ja apoteemi korrutisega.

e) Kahest arvust a ja b suurem arv jagub väiksemaga.

Suurem arv on arvude a ja b väikseim ühiskordne.

f) Jagatav ja jagaja on ühesuguste märkidega.

Jagatis on positiivne.

234. Sõnasta teoreem, mille eeldus on antud.

a) Korrutise üks tegur võrdub nulliga.

b) Ühe kolmnurga kolm külge on vastavalt võrdsed teise kolmnurga kolme küljega.

c) Antud kaks suurust on võrdelised.

d) Jagatav ja jagaja on erinevate märkidega.

e) Jagatav on 0 ja jagaja on nullist erinev arv.

JÄRELDAMISHARJUTUSI.

235. Antud tõdedest uute tõdede tuletamist ainult mõtlemise teel nimetatakse **järeldamiseks**. Kui on näiteks teada, et lõik a ei ole suurem lõigust b ega võrdne lõiguga b , siis saame järeldada, et lõik a on väiksem lõigust b .

Mis järeldub lõikude a ja b kohta, kui on teada, et $a \neq b$?

236. Kuidas saab kolmnurki liigitada nende nurkade järgi? Mis järeldub kolmnurga kohta, kui on teada, et

a) kolmnurk ei ole teravnurkne ega nürinurkne?

b) kolmnurk ei ole nürinurkne?

c) kolmnurk ei ole täisnurkne?

237. Mida saab öelda arvu kohta,

a) mis ei ole negatiivne ega null?

b) mis ei ole positiivne?

c) mis ei ole positiivne ega negatiivne?

238. a) Mida saab öelda kahe suuruse kohta, kui nad on võrdsed ühe ja sama kolmanda suurusega?

b) On antud kaks võrdset suurust a ja b . Kummagi suurusega on liidetud üks ja sama suurus c . Mis saab öelda saadud summade $a + c$ ja $b + c$ kohta?

c) On antud võrratus $a < b$. Selle kummastki poolest lahutatakse üks ja sama arv c . Mis saab öelda vahede $a - c$ ja $b - c$ kohta?

239. Tee järeldus antud eeldustest ja anna eeldus ja järeldus ühe lausena.

a) $a = b$ ja $b = c$.

b) $a < b$ ja $b < c$.

c) $a = b$ ja $b \neq 8$.

- d) Antud murru lugeja on 3 korda väiksem kui nimetaja.
e) Summa $a + b$ kumbki liidetav jagub 5-ga.

240. Otsusta, mida saab järeldada igast allpool antud lausest.

- a) Arv x ei ole negatiivne.
b) Arv a ei ole suurem kui 12.
c) VII klassis ei ole üle 30 ega alla 29 õpilase.
d) Kumbki lõikudest a ja b ei ole teisest pikem.
e) Arvu x absoluutväärtus on väiksem kui 1.

241. Tee järeldus igast järgnevast eelduste paarist:


- 1) $a = b$ 2) $a > b$ 3) $x = a + b$ 4) $s = a + b$
 $b < c$ $b > c$ $x = a + c$ $b = a$

242. Otsusta, kas järgnevad väited on õiged või mitte.

- a) Kui $x = 4$, siis $3x - 10 > 4$.
b) Iga võrdkülgne kolmnurk on võrdhaarne.
c) Iga võrdhaarne kolmnurk on võrdkülgne.
d) Iga võrdkülgne kolmnurk on võrdnurkne.
e) Kui kumbki kahest liidetavast jagub 4-ga, siis summa jagub 8-ga.
f) Kui arvu ristsumma jagub 9-ga, siis arv jagub 3-ga.
g) Kui koolis on 370 õpilast, siis seal leidub vähemalt kaks õpilast, kelle sünnipäev on ühel ja samal päeval.

KÕRVUNURGAD.

243. Nurki tähistatakse sageli väikeste kreeka tähtedega α (alfa), β (beeta), γ (gamma), δ (delta) jne. See täht kirjutatakse nurga sisse (joon. 18). Selle tähise ette nurga märki ei kirjutata, näiteks $\alpha = 75^\circ$, mitte $\angle \alpha = 75^\circ$.




Joon. 18.

244. Joonesta mingi nurk α ja pikenda tema üht haara üle nurga tipu O (joon. 18). Siis nurga α kõrvale tekib uus nurk β ehk $\angle BOC$ (joon. 18). Nurki α ja β nimetatakse teineteise kõrvunurkadeks.

Kaht nurka nimetatakse kõrvunurkadeks, kui neil on ühine tipp ja üks ühine haar, kuna teised haarad moodustavad sirgjoone.

Leia jooniselt 18 nurkade α ja β ühine tipp ja ühine haar. Missuguse joone moodustavad nende nurkade teised haarad?

245. Joonesta kaks lõikuvat sirget AB ja CD , tähista nende lõikepunkt ja selle juures tekkinud nurgad. Nimeta nüüd joonise järgi seal esinevad kõrvunurkade paarid ja iga paari puhul nurkade ühine haar.



Joon. 19.

246. Missuguse nurga saab, kui liita kõrvunurgad, s. o. kõrvaldada nende ühine haar (joon. 19)?

Kõrvunurkade summa võrdub sirgnurgaga.

Sümbolites:

$$\alpha + \beta = 180^\circ.$$

247. Avalda

a) α tema kõrvunurga β kaudu;

b) β tema kõrvunurga α kaudu.

248. Kui suur on nurk, mis on võrdne oma kõrvunurgaga? Kuidas saaks täisnurka defineerida kõrvunurga mõiste abil?

249. Mis liiki on teravnurga kõrvunurk, nürinurga kõrvunurk?

VÖRRAND.

250. Ülesanne. Kui suur on nurk, mis on oma kõrvunurgast 26° võrra väiksem?

Lahendus. Oletame, et otsitav nurk sisaldab x kraadi. Siis tema kõrvunurk sisaldab $x + 26$ kraadi ja nende summa sisaldab $x + (x + 26)$ ehk $2x + 26$ kraadi. Et kõrvunurkade summa on sirgnurk, siis

$$2x + 26 = 180.$$

Saadud võrdusest järeldub (kuidas?), et

$$2x = 180 - 26$$

ehk

$$2x = 154,$$

seega

$$x = 77.$$

Kontroll. Kui nurk on 77 kraadi, siis tema kõrvunurk peab olema $180 - 77 = 103$ kraadi. Lahutades sellest 77 kraadi, näeme, et saadud nurk on oma kõrvunurgast tõepoolest 26 kraadi võrra väiksem.

Vastus. Otsitav nurk on 77° .

251. Eelmise ülesande lahendamisel tähistasime otsitava nurga tähega (x) ja koostasime võrduse, milles see täht oli tundmatuks.

Võrdust, mis sisaldab tundmatut, nimetatakse võrrandiks. Tundmatu leidmist võrrandist nimetatakse võrrandi lahendamiseks.

Ülesande lahendamine võrrandi abil algab otsitava suuruse tähistamisest mingi tähega. Sellele järgneb võrrandi koostamine ühes tarviliku selgitusega ja võrrandi lahendamine. Saadud lahendit, s. o. tundmatu väärtust tuleb kontrollida. Lahendi kontrollimine peab toimuma ülesande teksti, mitte koostatud võrrandi põhjal, sest viimane võib sisaldada juba viga. Lahendi kontrollimise järel tuleb anda ülesande vastus.

Võrrandisse nimetusi arvude juurde ära kirjuta.

Lahenda järgnevad ülesanded võrrandi abil.

252. Kui suur on nurk, mis on oma kõrvunurgast 34° võrra suurem?

253. Kui suur on nurk, mis on oma kõrvunurgast 15° võrra väiksem?


254. Kui suur on nurk, mis on oma kõrvunurgast 3 korda suurem?

255. Kui suur on kumbki kõrvunurkadest, kui nende vahe on 9 korda väiksem nende summast?

TIPPNURGAD.

256. Joonesta mingi nurk α (joon. 20) ja pikenda tema mõlemat haara üle nurga tipu.

Kummagi haara pikendamisel üle nurga tipu (joon. 20) tekib nurgale α kõrvunurk: α ja β on kõrvunurgad, samuti α ja γ on kõrvunurgad. Nurki β ja γ nimetatakse teineteise suhtes tippnurkadeks.



Joon. 20.

Kaht nurka nimetatakse tippnurkadeks, kui neil leidub ühine kõrvunurk.

Mitu tippnurkade paari tekib kahe sirge lõikumisel?

257. Olgu β ja γ tippnurgad ning α nende ühine kõrvunurk (joon. 20). Siis

$$\alpha + \beta = 180^\circ \text{ ja } \alpha + \gamma = 180^\circ.$$

Avaldades neist võrdustest tippnurgad β ja γ , saame

$$\beta = 180^\circ - \alpha \text{ ja } \gamma = 180^\circ - \alpha.$$

Seega

$$\beta = \gamma.$$

Nii oleme tõestanud teoreemi

tippnurgad on võrdsed.

258. Joonesta kaks lõikuvat sirget ja tähistatud nurgad ringjärjekorras tähtedega $\alpha, \beta, \gamma, \delta$. Nimeta kõik tekkinud tippnurkade paarid ja kõik tekkinud kõrvunurkade paarid.

259. Kahe sirge lõikumisel tekkinud nurkadest on üks 78° . Kui suured on teised nurgad?


260. Kahe sirge lõikumisel tekkinud nurkadest on kahe nurga summa 128° . Leia iga tekkinud nurga suurus.

261. Kahe tippnurga summa on $158^\circ 20'$. Kui suur on nende ühine kõrvunurk?

KAHE SIRGE LÕIKAMINE SIRGEGA.

262. Lõikame kaht sirget s ja t mingi kolmanda sirgega u (joon. 21). Tähistame sirgete u ja s lõikumisel tekkinud nurgad

tähtedega α , β , γ ja δ , sirgete u ja t lõikumisel tekkinud nurgad aga tähtedega α' , β' , γ' , δ' (loe: alfa prim jne.).



Joon. 21.

Kuidas nimetatakse nurki α ja γ , β' ja δ' , γ ja δ , α' ja γ' , γ' ja β' joonisel 21?


263. Nurkadest, mis tekivad kahe sirge lõikamisel kolmandaga ja asetsevad eri lõikepunktide juures, on mõnele paarile antud erinime-tused.

1) Kaht nurka, mis asetsevad ühel pool lõikajat ja mille haarad lõikajal suunduvad ühtepidi, nimetatakse kaasnurkadeks (joon. 22).


Joonisel 21 on kaasnurkadeks α ja α' , β ja β' , γ ja γ' , δ ja δ' .

2) Kaht nurka, mis asetsevad ühel pool lõikajat ja mille haarad lõikajal suunduvad vastamisi, nimetatakse lähisnurkadeks (joon. 23). Joonisel 21 on lähisnurkadeks γ ja β' , δ ja α' .


3) Kaht nurka, mis asetsevad üks ühel ja teine teisel pool lõikajat ja mille haarad lõikajal suunduvad vastamisi, nimetatakse põiknurkadeks (joon. 24). Joonisel 21 on põiknurkadeks γ ja α' , δ ja β' .



Joon. 22.



Joon. 23.



Joon. 24.

264. Arvuta joonisel 21 esinevad nurgad, mis on tekkinud kahe sirge lõikamisel kolmanda sirgega, kui $\alpha = 54^\circ$ ja $\beta = \beta'$.

265. Arvuta nurgad, mis tekivad kahe sirge lõikamisel kolmanda sirgega, kui kahe kaasnurga summa on 153° ja üks neist on 70° .

266. Kahe sirge lõikamisel kolmanda sirgega on tekkinud üks paar võrdseid kaasnurki, näiteks $\alpha = \alpha'$ (joon. 21). Mis saab öelda siis teiste kaasnurkade kohta? põiknurkade kohta? lähisnurkade kohta?

267. Joonisel 21 $\gamma = \alpha'$. Mida saab öelda nurkade δ ja α' , α ja α' , β ja β' kohta?


KAHE SIRGE PARALLEELSUS.

268. Kaht sirget, mis asetsevad ühel ja samal tasapinnal ning ei lõiku, nimetatakse paralleelseteks.

Kahe sirge u ja v paralleelsust märgitakse nii: $u \parallel v$.

Too näiteid paralleelsetest sirgetest.


269. Paralleelseid sirgeid oleme joonestanud rööplükke abil (joon. 25). See joonestamise võtte põhineb järgmisel teoreemil:



Joon. 25.

kui kahe sirge lõikamisel kolmanda sirgega tekib paar võrdseid kaasnurki, siis need kaks sirget on paralleelsed.


Eeldus. Sirgete u ja v lõikamisel sirgega t on tekkinud võrdsed kaasnurgad α ja β (joon. 26).



Joon. 26.

Väide. Sirged u ja v on paralleelsed.

Tõestus. Leiame lõigu AB keskpunkti C ja pöörame kogu joonise selle punkti ümber 180° võrra (joon. 27). Siis



Joon. 27.

- 1) punkt A satub sinna, kus enne oli punkt B ja punkt B sinna, kus enne oli punkt A , sest lõigud CA ja CB on võrdsed;
- 2) nurk α satub sinna, kus enne oli nurga β tippnurk, ja nurk β sinna, kus enne oli nurga α tippnurk (need nurgad on võrdsed);
- 3) sirgete u ja v asukohad vahetuvad.

Nii näeme, et kogu joonis ühtib oma endise asendiga.

Kui sirged u ja v lõikuksid ühel pool sirget t (näiteks paremal punktis M), siis kirjeldatud pööramine näitab, et neil leiduks veel

teine lõikepunkt teisel pool sirget t (punkt N). Et kaks sirget saavad lõikuda ainult ühes punktis, siis u ja v ei või lõikuda, s. t. $u \parallel v$.

Seda teoreemi nimetame kahe sirge paralleelsuse esimeseks tunnuseks.


270. Valmista endale õppevahend eelmise teoreemi tõestamiseks. Selleks tee joonis 26 paksemale paberile, kopeeri siis sealt läbipaistvale paberile (kalkale) ja kinnita need joonised punktis C nõõpnõela või peenikese naela abil.

Näita selle mudeli abil, kuhu satub nurk α pärast ühe lehe pööramist 180° võrra, kuhu nurk β .


271. a) Eeldame, et sirgete u ja v lõikamisel sirgega t tekkis paar võrdseid põiknurki γ ja β (joon. 28). Näita, et siis ka kaasnurgad α ja β on võrdsed ja seega $u \parallel v$.

Kahe sirge paralleelsuse teine tunnus.

Kui kahe sirge lõikamisel kolmanda sirgega tekib paar võrdseid põiknurki, siis need kaks sirget on paralleelsed.



Joon. 28.




Joon. 29.

b) Eeldame, et sirgete u ja v lõikamisel sirgega t tekkis üks paar lähisnurki β ja γ , millede summa on sirgnurk (joon. 29). Näita, et siis ka kaasnurgad α ja γ on võrdsed ja seega $u \parallel v$.

272. Joonestame antud sirgele v paralleelse sirge läbi antud punkti A , kasutades ainult sirklit ja joonlauda. Selleks võtame läbi A vabalt mingi sirge t , mis lõikab antud sirget v ja ehitame punkti A juurde sirgete t ja v vahelise nurgaga α võrdse kaasnurga β (joon. 30).

Kui ehitatud nurga β teist haara pikendada üle nurga tipu A , siis saame sirge u , mis läbib punkti A ja on paralleelne sirgega v . Millest see järeldub?

Teosta see konstruktsioon, võttes vabalt sirge ja väljaspool sirget ühe punkti.



Joon. 30.

273. Rakendades sirgete paralleelsuse tunnuseid, näita, et kaks sirget u ja v , mis on risti ühe ja sama sirgega t , on paralleelsed.

274. Läbi antud punkti (punkt A joonisel 30) saab antud sirgele (sirge v joonisel 30) joonestada paralleelse sirge mitmel viisil. Kogemused näita-

vad, et sõltumatult ehitamisviisist saame läbi antud punkti ikka ainult ühe paralleeli sirgele v . Seda tõsiasja väljendab järgmine nn. paralleelide aksioom:

läbi punkti, mis asetseb väljaspool antud sirget, ei lähe rohkem kui üks sirge, mis on paralleelne antud sirgega.


275. Paralleelide aksioomist tuleneb hulk järeldusi. Märgime neist kaks tähtsat.

a) Kui kumbki kahest sirgest on paralleelne ühe ja sama sirgega, siis need kaks sirget on paralleelsed.

Eeldus. $x \parallel z$; $y \parallel z$
(joon. 31).

Väide. $x \parallel y$.

Tõestus. Kui x ja y ei oleks paralleelsed, siis nad lõikuksid mingis punktis P . Seda punkti läbiks siis kaks sirgega z paralleelset sirget, nimelt x ja y . Kuid see on vastuolus paralleelide aksioomiga, tähendab $x \parallel y$.




Joon. 31.

b) Kui sirge lõikab üht kahest paralleelsest sirgest, siis lõikab ta ka teist.

Eeldus. $y \parallel z$; x lõikab sirget y punktis A (joon. 32).

Väide. x lõikab sirget z .

Tõestus. Kui sirge x ei lõikaks sirget z , siis oleks ta sellega paralleelne ja seega läbi sirgete x ja y lõikepunkti A läheks kaks sirget (x ja y), mis oleksid paralleelsed sirgega z . Kuid see pole võimalik. Tähendab, sirge x lõikab ka sirget z .



Joon. 32.

KAHE PARALLEELSE SIRGE LÕIKAMINE SIRGEGA.

276. Joonesta kaks paralleelset sirget, lõika need mingi sirgega, mõõda tekkinud nurgad ja kirjuta tulemused joonisele. Mida paned tähele: a) iga kahe kaasnurga kohta; b) iga kahe põiknurga kohta; c) iga kahe lähisnurga kohta?

Kontrolli tehtud tähelepanekuid mingi teise lõikaja puhul.

Neist mõõtmistest nähtub, et

kui kahte paralleelset sirget lõigata mingi kolmanda sirgega, siis

- 1) iga kaks kaasnurka on võrdsed,
- 2) iga kaks põiknurka on võrdsed,
- 3) iga kahe lähisnurga summa on sirgnurk.

277. Kaks paralleelset sirget on lõigatud kolmanda sirgega nii, et üks tekkinud kaheksast nurgast on 57° . Kui suured on teised nurgad?


278. Näita, et kui sirge on risti ühega kahest paralleelsest sirgest, siis on ta risti ka teisega.

279. Kaks laeva sõidavad paralleelsete kurssidega, üks läänest itta, teine idast läände. Esimeselt laevalt paistab teine parajasti kirdesuunas. Mis suunas paistab sel momendil teiselt laevalt esimene?

280. Kaks lennukit lendavad paralleelsete kurssidega, üks lõunast põhja, teine põhjast lõunasse. Esimeselt lennukilt paistab teatud momendil teine lennuk suunas, mis on põhjasuunast 35° ida pool (lühemalt, suunas $N35^\circ E$). Mis suunas paistab sel momendil teiselt lennukilt esimene?

281. Laevalt L peiliti tuletorni T suunas $N47^\circ E$ (joon. 33). Mis suunas paistis sel momendil tuletornist laev? Kui suur on $\angle LTN$?

282. Kaks paralleelset sirget on lõigatud kahe sirgega nii, et tekkinud nelinurga kaks vastasnurka on 73° ja 127° . Kui suured on selle nelinurga ülejäänud nurgad?



Joon. 33.

283. a) On antud kaks paralleelset sirget s ja t . Sirgel s on võetud kaks punkti A ja B , millest on tõmmatud ristlõigud AC ja BD sirgele t . Tõesta, et need ristlõigud on võrdsed, s. t. punktid A ja B on sirgest t võrdsetel kaugustel.

Näpunäide. Ühenda punktid C ja B ning vaatle tekkinud kolmnurki.

Kahe paralleelse sirge vahelise ristlõigu pikkust nimetame nende sirgete vaheliseks kauguseks. See kaugus on igal pool üks ja sama.

b) Joonesta antud sirgega paralleelne sirge, mis asetseb sellest antud kaugusel. Mitu lahendit on sellel ülesandel?

VASTAVALT PARALLEELSETE HAARADEGA NURGAD.

284. a) Joonesta mingi terav- või nürinurk α , võta selle nurga sees punkt ja tõmba sellest punktist kaks kiirt, mis on vastavalt paralleelsed ja samasuunalised nurga α haaradega. Tõesta, et nende kiirte vaheline nurk β võrdub nurgaga α .

Näpunäide. Pikenda nurga β üht haara üle nurga tipu nii, et ta lõikaks nurga α haara, ja võrdle nurki α ja β sellel pikenemisega tekkinud ühe nurgaga (joon. 34).

b) Lahenda eelmine ülesanne veel kord, võttes nurga β tipp nii, et üks nurk ei asetseks teise sees.

Kui ühe nurga haarad on vastavalt paralleelsed ja samasuunalised teise nurga haaradega, siis need nurgad on võrdsed.


c) Missugused nurgad saab vastavalt paralleelsete ja samasuunaliste haaradega nurkadest, kui ühe nurga tipp võtta teise haaral?

285. Joonesta kaks vastavalt paralleelsete ja vastandsuunaliste haaradega nurka ja võrdle neid teineteisega.

Näpunäide. Võta abiks ühe nurga tippnurk.

286. Joonesta kaks vastavalt paralleelsete haaradega nurka, mille ühed haarad on samasuunalised ja teised vastandsuunalised. Missugune seos valitseb nende nurkade vahel?


Näpunäide. Võta abiks ühe nurga kõrvunurk.




Joon. 34.

VASTAVALT RISTUVATE HAARADEGA NURGAD.

287. Joonesta mingi teravnurk α , mille haarad olgu k ja l , ning tõmba selle nurga tipust kaks uut kiirt m ja n nii, et need oleksid vastavalt risti nurga α haaradega ja moodustaksid teravnurga, ütleme β (joon. 35) : $m \perp k$; $n \perp l$. $\beta < 90^\circ$. Mõõda nurgad α ja β . Näita, et need nurgad on alati võrdsed. Selleks pane tähele, et joonisel 35 on $\alpha + \gamma = 90^\circ$ (miks?) ja ka $\beta + \gamma = 90^\circ$ (miks?). Mis



Joon. 35.



Joon. 36.

saad, kui esimesest võrdusest avaldad α ja teisest β ? Mis nähtub saadud avaldistest?

288. Joonesta kaks erinevate tippudega teravnurka CAD ja CBD (joon. 36) nii, et ühe teravnurga haarad on vastavalt risti teise teravnurga haaradega. Tõesta, et $\angle CAD = \angle CBD$.

Näpunäide. *Ülesande lahendamiseks tõmba punktiist A kaks kiirt m ja n , mis on vastavalt paralleelsed ja samasuunalised nurga B haaradega. Mis võib öelda nende kiirte vahelise nurga α ja nurga B kohta? Mis võib öelda nende kiirte vahelise nurga α ja nurga CAD kohta? Mis sellest järeldub nurkade CAD ja CBD kohta?*

Kui ühe teravnurga haarad on vastavalt risti teise teravnurga haaradega, siis need nurgad on võrdsed.

289. Täisnurkses kolmnurgas ABC on täisnurga tipust C joonestatud kõrgus CD . Näita, et nurgad ACD ja CBD on vastavalt ristuvate haaradega teravnurgad. Mis sellest järeldub nende nurkade suuruse kohta?

290. Võrdhaarses kolmnurgas ABC , mille alus on BC , on joonestatud kõrgused AD ja BE . Näita, et nurgad CAD ja EBC on vastavalt ristuvate haaradega teravnurgad. Järelda siit, et võrdhaarse kolmnurga haarale joonestatud kõrguse ja kolmnurga aluse vaheline nurk on pool kolmnurga tipunurgast.

291. Joonesta mingi teravnurk, võta selle sees punkt ja tõmba sellest kaks kiirt, mis on vastavalt risti võetud nurga haaradega. Leia nende kiirte vahelise nurga suurus, kui võetud teravnurga suurus on α .

292. Teravnurkse kolmnurga ABC tippudest A ja B on joonestatud kolmnurga kõrgused, mille vaheline teravnurk on 67° . Leia

1) kolmnurga nurga C suurus;

2) tipust A tõmmatud kõrguse ja külje AC vahelise nurga suurus.

KORDAMISEKS.

293. Teisenda murruks avaldis

$$\text{a) } x + 6 - \frac{x^2 - 40}{x - 6}; \quad \text{b) } a^2 + 2a + 4 - \frac{a^2 - 10}{a - 2}.$$

294. Taanda murd

a) $\frac{3u^2 - 27}{u^3 - 27}$;

b) $\frac{(x-3)^2 + 3x}{x^3 + 27}$.

295. Arvuta kuubi täispindala, kui kuubi serv on 0,8 dm.

296. Arvuta korrapärase nelinurkse püramiidi ruumala, kui püramiidi põhiserv on 14 cm ja kõrgus on 18 cm.

297. Üks kõrvunurkadest on teisest 4 korda suurem. Kui suur on kumbki nurk?

298. Kahe vastavalt paralleelsete ja samasuunaliste haaradega nurga summa on $135^\circ 20'$. Kui suur on kummagi nurga kõrvunurk?

299. Kolmes korvis on kokku 155 õuna. Teises korvis on 3 korda rohkem õunu kui esimeses ja kolmandas korvis on 10 õuna rohkem kui esimeses. Mitu õuna on igas korvis? Lahenda võrrandi abil.

300. Kolmnurga übermõõt on 37 cm. Teine külge on esimesest kaks korda pikem ja kolmas on teisest 3 cm lühem. Kui pikad on küljed? Lahenda võrrandi abil.

301. Missugust lauset nimetatakse definitsooniks, missugust teoreemiks, missugust aksioomiks? Nimeta mingi definitsoon, teoreem, aksioom.

302. Mis on põhjasuuna vastandsuund? kagusuuna vastandsuund? suuna $S8^\circ E$ vastandsuund?

303. Missugune on põhja-lõuna sihi ristsiht? kagu-loode sihi ristsiht? püstsihi ristsiht?

304. Lihtsusta avaldised:

a) $(3x - 7y)^2 - (3x + 7y)^2$;

b) $(5a - 4b)(6a - 3b) - (2a + 9b)(15a - 4b)$.

305. Lihtsusta järgmine avaldis ja arvuta selle väärtus, kui $x = -0,2$.

$$\frac{2x-1}{2x+1} + \frac{3x-1}{2x-1} - \frac{10x}{4x-2}.$$

306. Lihtsusta järgmine avaldis ja arvuta selle väärtus, kui $x = -0,5$.

$$\frac{2x-7}{4x^2-38x+49} + \frac{2x+7}{4x^2-28x+49}.$$


5. KOLMNURKADE JA NELINURKADE TÄHTSAMAD OMADUSED.

KOLMNURGA NURKADE SUMMA.


307. Joonesta kolmnurk ja selle kolmnurga mingi nurga kõrvunurk. Mis selleks teha? Joonesta ka kolmnurga teiste nurkade kõrvunurgad, pikendades iga külge ainult üks kord.

Kolmnurga nurga kõrvunurka nimetatakse kolmnurga välisnurgaks.

Mitu välisnurka on igal kolmnurgal? Nimeta neid jooniselt 37. Eristamiseks välisnurkadest nimetame kolmnurga nurki mõnikord tema sisenurkadeks.



Joon. 37.



Joon. 38.

308. Joonesta kolmnurk ABC ja tema välisnurk, mille tipuks on punkt C (joon. 38). Selleks et näha, kuidas välisnurga suurus on seotud sisenurkadega, joonesta läbi C sirge CD , mis on paralleelne nurga C vastasküljega AB . Mis toimub välisnurgaga? Mis-

suguse nurgaga võrdub $\angle 1$, missugusega $\angle 2$ (joon. 38) ja miks? Millega võrdub siis välisnurk ACB_1 ? Mida saaks samal viisil tõestada tipu A juures oleva välisnurga kohta, mida tipu B juures oleva välisnurga kohta?

Kolmnurga välisnurk võrdub temaga mitte kõrvuti asetsevate sisenurkade summaga.

309. Tõesta eelmises ülesandes sõnastatud teoreem tipu B juures oleva välisnurga kohta.

310. Kolmnurga üks sisenurk on $38^\circ 40'$ ja teine sisenurk $56^\circ 20'$. Kui suur on kolmanda tipu juures olev välisnurk?

311. Mis tuleb liita kolmnurga tipu C juures oleva välisnurgaga, et saada kolmnurga kõikide sisenurkade summa? Kui suur on see summa?

Kolmnurga nurkade summa võrdub sirgnurgaga.

312. Miks kolmnurgas ei saa olla kaht täisnurka ega kaht nürinurka? Kas leidub kolmnurka, mille üks nurk on täisnurk ja teine nürinurk? Miks?

313. On antud, et ühe kolmnurga kaks nurka on vastavalt võrdsed teise kolmnurga kahe nurgaga. Mis järeldub kolmandate nurkade kohta?

314. a) Kui suur on täisnurkse kolmnurga teravnurkade summa?

b) Täisnurkse kolmnurga üks teravnurk on 28° . Leia välisnurgad.

315. a) Võrdhaarse kolmnurga alusnurk on $52^\circ 10'$. Kui suured on kolmnurga välisnurgad?

b) Võrdhaarse kolmnurga tipu juures olev välisnurk on 138° . Kui suured on sisenurgad?

316. Kui suured on kolmnurga nurgad, kui nad suhtuvad nagu $1:2:3$? Lahenda võrrandi abil.

317. Kolmnurga kaks välisnurka on 81° ja $117^\circ 40'$. Kui suured on selle kolmnurga sisenurgad?

318. Võrdhaarse kolmnurga alusnurk on tipunurgast 18° suurem. Leia kolmnurga sise- ja välisnurgad. Lahenda võrrandi abil.

KUMER HULKNURK.


319. Tähistata tasapinnal neli punkti nii, et nende hulgas ei leiduks kolme punkti, mis asetseksid ühel sirgel. Ühenda need punktid järjestikku lõikude abil ja nimeta saadud nelinurka, tema tippe ja külgi.

320. Võta eelmise ülesande eeskujul viis punkti ja ühenda need viisnurgaks.

321. Kuidas nimetatakse kolmnurki, nelinurki, viisnurki jne. ühise nimega?

322. Hulknurka nimetatakse kumeraks, kui tema iga külje pikendamisel saadakse sirge, millest hulknurga teised küljed on kõik ühel ja samal pool.

Näiteks joonisel 39 kujutatud nelinurk $ABCD$ on kumer (miks?), kuid nelinurk $EFGH$ ei ole kumer, sest pikendades viimase külge FG saame sirge, millest selle nelinurga külge EF on ühel pool, külge GH aga teisel pool.



Joon. 39.


Missugused joonisel 40 esitatud hulknurkadest ei ole kumerad ja miks?

Kas kolmnurk saab olla mitte kumer?

323. Lõiku, mis ühendab hulknurga kaht tippu ja ei ole tema küljeks, nimetatakse hulknurga diagonaaliks.

Mitu diagonaali on nelinurgal, mitu viisnurgal?

324. Mitu diagonaali saab tõmmata viisnurga, seitsmenurga, kümmenurga ühest tipust?



Joon. 40.

Näpunäide. Leia enne, mitmesse tippu diagonaali ei saa tõmmata.

325. Edaspidi vaatleme ainult kumeraid hulknurki. Kumera hulknurga iga nurk (ehk sisenurk) on väiksem kui sirgnurk, kuna aga mittekumeral hulknurgal võib see olla sirgnurgast suurem, nagu nurk FGH joonisel 39.


Hulknurga nurga kõrvunurka nimetatakse tema välisnurgaks.

KUMERA HULKNURGA NURKADE SUMMA.

326. a) Joonesta mingi nelinurk ja leia selle nurkade summa, tükeldades nelinurga tema diagonaaliga kolmnurkadeks.

b) Joonesta mingi viisnurk ja tõmba tema ühest tipust kõik võimalikud diagonaalid. Mitmeks kolmnurgaks tükeldus viisnurk? Kui suur on kokku nende kolmnurkade nurkade summa? Kuidas selle põhjal leida viisnurga nurkade summat?

327. Kui hulknurgal on n tippu, siis selle hulknurga ühest tipust tõmmatud diagonaalid jaotavad hulknurga $n - 2$ kolmnurgaks, sest selle tipu vastas on hulknurgal $n - 2$ külge, milledest igaüks saab ühe kolmnurga üheks küljeks (joon. 41). Nende kolmnurkade nurkade summa on $(n - 2) \cdot 180^\circ$. Niisama suur on ka hulknurga nurkade summa, sest hulknurga nurgad on kas kolmnurkade nurkadeks või koosnevad neist ja ainult neist. Seega,



Joon. 41.

kumera hulknurga nurkade summa võrdub $(n-2) \cdot 180^\circ$, kus n on hulknurga tippude arv.

328. Arvuta hulknurga nurkade summa, kui hulknurga tippude arv on 4; 6; 9; 12.

329. Missuguse hulknurga nurkade summa on 900° ; 12 täisnurka; 5 sirgnurka; 2340° ? Lahenda võrrandi abil.

330. Kui suur on hulknurga iga tipu juures oleva sisenurga ja välisnurga summa? Kui suur on siis n tipu juures olevate sise- ja välisnurkade summa kokku?

Hulknurga välisnurkade summa saamiseks lahuta sise- ja välisnurkade kogusummast sisenurkade summa ja näita, et

iga kumera hulknurga välisnurkade summa võrdub 360° .

331. Korrapärase hulknurga sisenurgad on teatavasti võrdsed. Mis sellest järeldub välisnurkade kohta? Kui suur on korrapärase hulknurga välisnurk, kui hulknurga tippude arv on 3; 5; 6; 8?

Kuidas leida korrapärase hulknurga sisenurga suurust, kui välisnurga suurus on teada?

Näita, et korrapärase n -nurga välisnurk võrdub $360^\circ : n$ ja sisenurk võrdub $180^\circ - 360^\circ : n$.

Anna avaldisele $180^\circ - 360^\circ : n$ murru kuju.

332. a) Arvuta korrapärase 15-nurga sisenurk ja välisnurk?

b) Missuguse korrapärase hulknurga välisnurk on 15° ?

c) Missuguse korrapärase hulknurga sisenurk on 135° ?

333. Kuidas muutub hulknurga sisenurkade summa, kui hulknurga tippude arv kasvab kolme võrra? viie võrra?

KOLMNURGA KAHE KÜLJE SUMMA JA VAHE VÖRDLEMINE KOLMANDA KÜLJEGA.

334. Joonesta mingi kolmnurk ABC ja tähistä tema külgede pikkused tähtedega a , b ja c , nagu näidatud joonisel 42. Näita mõõtmise teel, et

kolmnurga iga külge on väiksem kui kahe teise külje summa.


Külje AB ehk c kohta saab seda lauset kirjutada kujul

$$AB < BC + AC \text{ ehk } c < a + b.$$

Kirjuta vastavad võrratused ka teiste külgede kohta.

335. Võtame kolm lõiku a , b ja c kord nii, et kõige pikem neist, ütleme a , on suurem kahe teise summast, teine kord nii, et ta võrdub nende summaga:

$$a > b + c \text{ või } a = b + c.$$




Joon. 42.


Proovime ehitada kolmnurka, mille küljed võrduvad lõikudega a , b ja c . Selleks joonestame esmalt lõigu pikkusega a ja siis tema otspunktide ümber ringjooned, mille raadiused on vastavalt b ja c . Selgub, et kolmnurga joonestamine ei õnnestu, sest selleks tarvilikud abiringjooned raadiustega b ja c ei lõiku (joon. 43 ja 44). Kolmnurk tekib alles siis, kui külgi b ja c (või ühte neist) pikendada nii, et $a < b + c$ (joon. 45). Sellest selgub, et

antud kolm lõiku saavad olla kolmnurga külgedeks ainult siis, kui suurim lõik on väiksem kahe teise lõigu summast.


Näiteks lõikudest $a = 15 \text{ cm}$, $b = 27 \text{ cm}$ ja $c = 12 \text{ cm}$ ei saa ehitada kolmnurka, sest suurim lõik b ei ole väiksem lõikude a ja c summast.



Joon. 43.



Joon. 44.



Joon. 45.

336. Otsusta, kas leidub kolmnurk, mille küljed on pikkusega

- 5 m, 7 m ja 10 m;
- 1,5 m, 4 dm ja 2,5 dm;
- 7,4 dm, 3,7 dm ja 2,9 dm;
- 35 cm, 18,9 m ja 19,2 m.

337. Otsusta, kas leidub võrdhaarne kolmnurk, millel .

- a) alus on 15 cm ja haar on 7 cm;
- b) alus on 7 cm ja haar on 15 cm;
- c) alus on 7,8 m ja haar on 3,9 m;
- d) ümbermõõt on 6 m ja haar on 12 dm.

338. Olgu antud kolmnurga kahe külje pikkused, näiteks a ja b , kusjuures $a > b$. Varem leidsime, et siis kolmas külg $c < a + b$. Summat $a + b$, millest c on väiksem, nimetame külje c ülemtõkkeks. Näitame nüüd, et kolmas külg c ei saa olla kuitahes väike, vaid ta peab olema suurem kahe teise külje vahest, s. t. $c > a - b$. Selleks kasutame juba leitud tõsiasja, et

$$a < b + c.$$

Kui vähendada selle võrratuse mõlemaid pooli ühe ja sama suuruse b võrra, siis vasak pool jääb ikkagi paremast väiksemaks, s. t.

$$a - b < b + c - b$$

ehk

$$a - b < c.$$

Lugedes seda võrratust paremalt vasakule, saame

$$c > a - b.$$

Nüüd oleme saanud külje c alamtõkke, s. o. arvu, millest külje c pikkus on suurem. Tulemust saab üles märkida järgmiselt:

$$a - b < c < a + b.$$

Seda loetakse nii: c on suurem a ja b vahest ning väiksem a ja b summast.

Näide. Kui $a = 4$ cm ja $b = 1,5$ cm, siis

$$4 \text{ cm} - 1,5 \text{ cm} < c < 4 \text{ cm} + 1,5 \text{ cm}$$

$$2,5 \text{ cm} < c < 5,5 \text{ cm}.$$

Kolmnurga iga külg on suurem kahe teise külje vahest ja väiksem nende summast.

339. Leida kolmnurga külje x tõkked, kui kaks antud külge on järgmised:

- a) 5,7 cm ja 6,3 cm;
- b) 18 dm ja 7 dm;
- c) 3,5 m ja 8,4 m;
- d) $8\frac{3}{4}$ m ja $6\frac{2}{3}$ m.

340. Kolmnurga kahe lühema külje pikkused on 35 cm ja 47 cm. Missugused on kolmanda külje tüked?

341. Missugused on kolmnurga lühima külje tüked, kui kaks pikemat külge on 7,8 dm ja 13,1 dm?

KOLMNURGA KÜLGEDE JA NURKADE VAHELISED SEOSSED.

342. Joonesta mingi kolmnurk, mõõda tema kaks mittevõrdset külge ja nende vastas asetsevad nurgad. Missuguse külje vastas asetseb suurem nurk?


343. Tõestame, et
kolmnurgas asetseb suurema külje vastas suurem nurk.

Eeldus. Kolmnurgas ABC külge $AC > BC$ (joon. 46).

Väide. $\angle ABC > \angle CAB$.

Tõestus. Märkime küljel AC punkti D nii, et $DC = BC$ ja ühendame punktid D ning B . Siis kolmnurgas BCD nurgad CDB ja DBC on võrdsed (miks?). Et $\angle CDB$ on kolmnurga ABD välisnurk, siis on ta suurem kui temaga mitte kõrvuti asetsev sisenurk A (miks?).

Seega $\angle CDB > \angle CAB$. Et $\angle CDB = \angle DBC$, siis ka $\angle DBC > \angle CAB$. Kuid $\angle DBC$ on osa nurgast ABC , mistõttu ka $\angle ABC > \angle CAB$. Sellega on väide tõestatud.



Joon. 46.

344. Tõestame, et on õige ka eelmise teoreemi pöördteoreem, s. o. teoreem, mille saame, kui eelmise teoreemi eelduse ja väite ümber vahetame:

kolmnurgas asetseb suurema nurga vastas suurem külge.

Eeldus. Kolmnurgas ABC (joon. 46) $\angle ABC > \angle CAB$.

Väide. $AC > BC$.

Tõestus. Külgede AC ja BC kohta on õige üks kolmest väitest:

$$AC < BC \text{ või } AC = BC \text{ või } AC > BC.$$

Neist esimene väide ei saa olla õige, sest eelmise teoreemi järgi peaks siis olema $\angle ABC < \angle CAB$, mis on vastuolus eeldusega.

Samal põhjusel ei saa ka teine väide olla õige, sest sellest järelduks, et nurgad ABC ja CAB on võrdsed. Nii jääb püsima ainult kolmas väide, s. t. $AC > BC$.

Samal viisil saab näidata, et

kolmnurgas asetsevad võrdsete nurkade vastas võrdsed küljed.

345. Kolmnurga ABC kohta on teada, et $\angle A = 78^\circ$ ja $\angle B = 37^\circ$. Järjesta kolmnurga küljed nende pikkuse järgi.

346. Täisnurkse kolmnurga ABC teravnurgad on $\angle A$ ja $\angle B$. Nimeta pikem kaatet, kui $\angle A = 34^\circ$.

347. Täisnurkse kolmnurga üks teravnurk on 45° . Mida saab öelda kaatetite kohta?

348. Missugune külg on täisnurkses kolmnurgas kõige pikem? Missugune külg on nürinurkses kolmnurgas kõige pikem?

349. Kolmnurga küljed on $AB = 7,8$ cm, $BC = 9,4$ cm ja $AC = 5,6$ cm. Järjesta kolmnurga nurgad nende suuruse järgi.

350. Võrdhaarse kolmnurga alus on 8,4 dm ja ümbermõõt 23 dm. Kumb on suurem, kas alusnurk või tipunurk?

351. Kolmnurga KLM kohta on teada, et $\angle L > \angle M$ ja $LM > KM$. Missugune on kolmnurga suurim nurk?

352. Kolmnurga ABC külgede kohta on teada, et $BC > AC > AB$. Missugused nurgad on selles kolmnurgas teravnurgad? Mida saab öelda kolmanda nurga suuruse kohta?

353. Tõesta, et

täisnurkses kolmnurgas 30° -se nurga vastaskaatet võrdub poole hüpotenuusiga.

Tõestuseks joonestatakse võrdkülgne kolmnurk ja jaotatakse see kõrgusega kaheks täisnurkseks kolmnurgaks. Vaatle üht neist. Kui suur on selles väiksem teravnurk ja kui pikk on tema vastaskaatet?

354. Joonestatakse sirkli ja joonlaua abil täisnurkne kolmnurk, mille üks teravnurk võrdub 60° ja hüpotenuus võrdub antud lõiguga.

355. Kui pikk on telefoniposti tugi, mis moodustab postiga nurga 30° , kui posti ja toe vaheline kaugus mööda maapinda on 1,8 m?

356. Täisnurkse kolmnurga üks nurk on 60° ja hüpotenuusi ning väiksema kaateti summa on 24 dm. Kui pikk on hüpotenuus?

RÖÖPKÜLIKU OMADUSED.


357. Joonesta kaks paralleelset sirget ja lõika neid kahe paralleelse sirgega. Kuidas nimetatakse tekkinud nelinurka?

Rööpkülik on nelinurk, millel on kaks paari paralleelseid vastaskülgi.


Kuidas nimetatakse keha (joon. 47), mille kõik tahud on rööpkükülikud?

358. Rööpkülik leiab tehnikas sageli rakedamist. Joonised 48 kuni 51 kujutavad mõningaid esemeid, millede juures on kasutatud rööpkükülikut (kirjakaal, lauakaal, jalgratta lamp, hambaarsti riistade laud).


Selgita, miks on sobiv viimase kahe eseme kinnitamisel kasutada rööpkükülikut, mitte aga kolmnurka.




Joon. 47.




Joon. 48.




Joon. 49.



Joon. 50.



Joon. 51.



Joon. 52.

359. Rööpküliku kahe vastaskülje vahelist ristlõiku nimetatakse tema kõrguseks. Et vastaskülgi on rööpkülikul kaks paari, siis on tal ka kaks kõrgust (joon. 52).

Joonesta mingi rööpkülik ühes tema kahe kõrgusega, mõõda alused ja kõrgused, arvuta pindala kahel viisil ja võrdle tulemusi. Millest on tingitud tulemuste erinevus, kui see esineb?

360. Joonesta rööpkülik, mille kaks külge on 5 cm ja 3,5 cm ning nende vaheline nurk on 60° . Mõõda rööpküliku diagonaalid.

361. Joonesta rööpkülik, mille kaks külge on 6,8 cm ja 4 cm ning nende vaheline nurk on 140° . Mõõda rööpküliku diagonaalid.


362. Tõestame, et

rööpküliku diagonaal tükeldab rööpküliku kaheks võrdses kolmnurgaks.

Eeldus. $AB \parallel DC$ ja $AD \parallel BC$ (joon. 53).

Väide. $\triangle ABD = \triangle CDB$.

Tõestus. Kolmnurkadel ABD ja CDB on ühine külg BD . Selle külje lähisnurkadest $\beta_1 = \beta_2$ kui põiknurgad paralleelide AB ja DC juures ning $\delta_1 = \delta_2$ kui põiknurgad paralleelide AD ja BC juures. Kolmnurkade võrdsuse tunnuse NKN põhjal järeldame eeltoodust, et $\triangle ABD = \triangle CDB$, mida oligi vaja tõestada.



Joon. 53.

363. Nimeta rööpküliku tükeldamisel saadud kolmnurkade vastavaid elemente; järelda eelmisest teoreemist, et

- 1) rööpküliku vastasküljed on võrdsed ja
- 2) rööpküliku vastasnurgad on võrdsed.

364. Joonestame mingi rööpküliku $ABCD$ ühes tema mõlema diagonaaliga ja tõestame, et

rööpküliku diagonaalid poolitavad teineteist.

Eeldus. $AB \parallel DC$ ja $AD \parallel BC$ (joon. 54).

Väide. $AO = CO$ ja $BO = DO$.

Tõestus. Kolmnurkade AOD ja COB külgedest $AD = BC$, sest nad on rööpküliku vastasküljed.

Nende külgede lähisnurkadest $\alpha = \gamma$ kui põiknurgad paralleelide AD ja BC lõikaja AC juures ja $\delta = \beta$ kui põiknurgad samade paralleelide lõikaja BD juures. Kuid siis kolmnurkade võrdsuse tunnuse NKN järgi

$$\triangle AOD = \triangle COB.$$

Sellest järeldub, et

$$AO = CO \text{ ja } BO = DO,$$

sest nad on võrdsete kolmnurkade vastavad küljed.

365. Põhjenda väidet, et

rööpküliku külje lähisnurkade summa võrdub sirgknurgaga.

366. Rööpküliku übermõõt on 18,6 dm. Üks külg on teisest 1,8 dm pikem. Kui pikad on küljed?


367. Rööpküliku übermõõt on 5,5 m ja üks külg on $\frac{5}{6}$ teisest. Kui pikad on küljed?

368. Rööpküliku üks nurk on $57^\circ 15'$. Kui suured on teised nurgad?

369. Rööpküliku üks nurk on $52^\circ 20'$ suurem kui teine. Leia nurkade suurused.

370. Võrdhaarse kolmnurga alusel vabalt võetud punktist on joonestatud sirged paralleelselt haaradega. Leia saadud rööpküliku übermõõt, kui võrdhaarse kolmnurga haar on 12 cm.

371. Tõesta, et rööpküliku vastasnurkade poolitajad on paralleelsed.



Joon. 54.

372. Tõesta, et rõõpküliku külje lähisnurkade poolitajad on risti.

373. Rõõpküliku teravnurga poolitaja, lõikudes rõõpküliku küljega, jaotab selle lõikudeks 8 cm ja 3 cm. Leia rõõpküliku ümbermõõt.

374. Tõesta, et kui rõõpküliku pikema külje lähisnurkade poolitajad lõikuvad vastasküljel, siis lühem külg on pool pikemast.

RÕÕPKÜLIKU TUNNUSED.

375. Peale rõõpküliku definitsiooni on veel muid tunnuseid, mis võimaldavad otsustada, et antud nelinurk on rõõpkülik. Üks neist on järgmine:


võrdsete vastaskülgedega nelinurk on rõõpkülik.

Eeldus. $AB = DC$ ja $AD = BC$ (joon. 55).

Väide. $ABCD$ on rõõpkülik.

Tõestus. Joonestame nelinurga ühe diagonaali, näiteks diagonaali AC . Siis

$$\triangle ABC = \triangle ACD,$$



sest ühe kolmnurga kolm külge on vastavalt võrdsed teise kolmnurga kolme küljega. Kuid siis

$$\alpha_1 = \gamma_2 \text{ ja } \gamma_1 = \alpha_2$$

kui vastavad nurgad neis kolmnurkades. Nende nurkade võrdsusest järeldub, et

$$AB \parallel DC \text{ ja } AD \parallel BC,$$

Joon. 55.

kuna nimetatud sirgete lõikamisel sirgega AC on tekkinud võrdsed põiknurgad. Et nelinurga $ABCD$ vastasküljed on paralleelsed, siis on ta rõõpkülik.

376. Teine teoreem, mis võimaldab otsustada, et antud nelinurk on rõõpkülik, on järgmine:

nelinurk, millel on üks paar võrdseid ja paralleelseid vastaskülgi, on rööpkülik.

Eeldus. $AD = BC$ ja $AD \parallel BC$ (joon. 55).

Väide. $ABCD$ on rööpkülik.

Tõestus. Kolmnurkadel ADC ja ABC on peale ühise külje AC veel eelduse järgi

$$AD = BC.$$

Nende kolmnurkade nurkadest

$$\alpha_2 = \gamma_1$$

kui põiknurgad paralleelsete sirgete AD ja BC lõikaja AC juures. Kolmnurkade võrdsuse tunnuse KNK järgi on siis

$$\triangle ADC = \triangle CBA.$$

Kolmnurkade võrdsusest järeldub, et

$$\alpha_1 = \gamma_2,$$

sest nad on võrdsete kolmnurkade vastavad nurgad. Sellest järeldub sirgete paralleelsuse teise tunnuse põhjal, et nelinurga $ABCD$ vastasküljed AB ja DC on paralleelsed. Et eelduse järgi nelinurgal $ABCD$ ka teine paar vastaskülgi on paralleelsed, siis on ta rööpkülik.

377. Rööpküliku konstrueerimiseks tema antud elementide järgi ehitame nende elementide järgi esmalt ühe kolmnurga, milleks diagonaal jaotab rööpküliku, ja siis teise. Teostanud konstruktsiooni, põhjendame, kasutades rööpküliku tunnuseid, et saadud nelinurk on tõesti rööpkülik.

Rööpküliku kaht lähiskülge tähistame tähtedega a ja b , külje a lähisnurki tähtedega α ja β , diagonaale tähtedega e ja f (f on b vastas).

a) Joonesta rööpkülik, millel $a = 3,9$ cm, $b = 2,9$ cm ja $e = 5,8$ cm.

b) Joonesta rööpkülik, millel $a = 4,5$ cm, $\alpha = 48^\circ$ ja $f = 72$ cm.

c) Joonesta rööpkülik, millel $a = 5,5$ cm, $\beta = 130^\circ$ ja $b = 4,1$ cm.

378. a) Tõesta, et

nelinurk, mille diagonaalid poolitavad teineteist, on rööpkülik.


b) Eelmises ülesandes tõestatud lauset kasutades ehita rööpkülik, millel $a = 5,7$ cm, $e = 7,2$ cm ja $f = 5,2$ cm.

RÖÖPKÜLIKU ERILIIGID.

379. Rööpküliku eriliigid on niisugused rööpkülikud, millel kas nurgad on võrdsed või küljed on võrdsed või nii nurgad kui ka küljed on võrdsed. Selliseid rööpkülikuid nimetatakse vastavalt ristkülikuteks, rombideks ja ruutudeks (joon. 56).

a) Ristkülik on rööpkülik, mille nurgad on võrdsed.

Et rööpküliku nurkade summa on 360° , siis ristküliku iga nurk peab olema $360^\circ : 4$ ehk 90° . Seega ristkülik on täisnurkne rööpkülik. Niisuguse rööpküliku saame, kui tema ühe nurga teeme täisnurgaks (joon. 56).



Joon. 56.

Põhjenda väidet, et kui rööpküliku üks nurk on täisnurk, siis on ka teised nurgad täisnurgad.

b) Romb on rööpkülik, mille küljed on võrdsed.

Rombi saame, kui rööpküliku ühe tipu lähisküljed teeme võrdseiks, sest siis on rööpküliku vastaskülgede võrdsuse tõttu kõik küljed võrdsed (joon. 56). Seega romb on võrdkülgne rööpkülik.

c) Ruut on rööpkülik, mille nurgad on võrdsed ja küljed on võrdsed (joon. 56).

380. a) Kuidas defineerida ruutu ristküliku kaudu (joon. 56)?

b) Kuidas defineerida ruutu rombi kaudu (joon. 56)?

RISTKÜLIKU OMADUSED.

381. Rööpküliku igal eriliigil on muidugi kõik rööpküliku omadused. Kuid peale nende on igal eriliigil veel omad eriomadused. Kui kõneldakse ristküliku või rombi omadustest, siis mõeldakse tavaliselt neid eriomadusi. Vaatleme neid.


Joonesta ristkülik $ABCD$ ühes tema diagonaalidega AC ja BD , vaatle kolmnurki ABC ja BAD ning tõesta teoreem:

ristküliku diagonaalid on võrdsed.


382. Et ristküliku kui rööpküliku diagonaalid poolitavad teineteist ja ühtlasi on teineteisega võrdsed, siis järeldub, et

ristküliku diagonaalide lõikepunkt on tema tippudest võrdsetel kaugustel.

Kontrolli seda, joonestades ringjoone, mille keskpunktiks on ristküliku diagonaalide lõikepunkt ja mis läbib ristküliku üht tippu (joon. 57). Kas ta läbib ristküliku kõiki tippe?



Joon. 57.



Joon. 58.

Ringjoont, mis läbib ristküliku kõiki tippe, nimetatakse tema ümberringjooneks.

383. Näita, et ristküliku diagonaalide lõikepunktist küljele joonestatud ristsirge poolitab külje (joon. 58).

384. a) Joonesta ristkülik, mille ühe tipu lähisküljed on 4,8 cm ja 7,5 cm.

b) Joonesta ristkülik, mille üks külg ja diagonaal on antud.

c) Joonesta ristkülik, mille ümberringjoone raadius on 3,5 cm ja nurk diagonaalide vahel on 45° .

385. Tõesta, et võrdsete diagonaalidega rööpkülik on ristkülik.

ROMBI OMADUSED.

386. Rombi eriomadustest tähtsaimat väljendab teoreem:


rombi diagonaalid on teineteisega risti.

Eeldus. Nelinurgas $ABCD$ (joon. 59) $AB = BC = CD = AD$.

Väide. $AC \perp BD$.

Tõestus. Vaatleme kolmnurka ACD . Eelduse järgi

$$AD = CD$$



Joon. 59.

ja seega kolmnurk ACD on võrdhaarne. Et rombi kui rööpküliku diagonaalid poolitavad teineteist, siis diagonaalide lõikepunkt O on kolmnurga ACD aluse AC keskpunkt. Võrdhaarse kolmnurga aluse keskpunkti ja tipu ühenduslõik on ühtlasi kolmnurga kõrgus. Seetõttu

$$DO \perp AC$$

ehk

$$AC \perp BD,$$

mida tuligi tõestada.


Võrdhaarse kolmnurga kõrgus on ühtlasi tipunurga poolitaja. Nii poolitab DO nurga ADC ; seega on tõestatud ka teoreem

rombi diagonaal poolitab rombi nurga.


387. Näita, et kui romb tema diagonaali mööda kahekorra murda, siis rombi üks pool ühtib teisega (joon. 60).

388. Tõestame, et

rombi diagonaalide lõikepunkt asetseb rombi külgedest võrdsetel kaugustel.



Joon. 60.



Joon. 61.

Eeldus. Nelinurk $ABCD$ on romb ja O on tema diagonaalide lõikepunkt; $OK \perp AD$; $OL \perp AB$; $OM \perp BC$; $ON \perp CD$ (joon. 61)

Väide. $OK = OL = OM = ON$.

Tõestus. On teada, et nurgapoolitaja punkt asetseb nurga haaradest võrdsetel kaugustel. Et diagonaal AC on rombi nurkade A ja C poolitaja, siis on punkt O võrdsetel kaugustel nii nurga A kui ka nurga C haaradest, seega

$$OK = OL \text{ ja } OM = ON.$$

Sama punkt O kui diagonaali BD punkt asetseb võrdsetel kaugustel nurga B haaradest ja seega

$$OL = OM.$$

Ühendades need kolm võrdust, saame

$$OK = OL = OM = ON,$$

mida tuligi tõestada.

Ringjoon, mille keskpunktiks on punkt O ja raadiuseks on lõik OK , läbib punkte K , L , M ja N . Seda ringjoont nimetatakse rombi siseringjooneks (joon. 61).

389. a) Joonesta romb, mille külg on 5 cm ja diagonaal on 8 cm.

b) Joonesta romb, mille külg on 6,5 cm ja üks nurk on 45° .

c) Joonesta romb, mille diagonaalide pikkused on antud.

390. Tõesta, et rombi kõrgused on võrdsed. Nimeta neid kõrgusi jooniselt 61.

391. a) Tõesta, et ristuvate diagonaalidega rööpkülik on romb.


b) Tõesta, et võrdsete külgedega nelinurk on romb.

392. Joonesta romb, mille külg võrdub ühe diagonaaliga.

393. Rombi külg on 15 cm ja üks nurk on 60° . Kui pikk on rombi lühem diagonaal?

394. Rombi kõrgus, mis on tõmmatud tema ühest tipust, poolitab külje. Leia, kui suured on rombi nurgad.

395. Rombi joonestamisega saab kergesti lahendada mitmeid konstruktsioonülesandeid sirkli ja joonlaua abil. Lahendame näiteks järgmise ülesande: joonestada antud sirgega paralleelne sirge, mis läbib antud punkti väljaspool antud sirget.




Joon. 62.

Olgu antud sirge s ja väljaspool seda punkt A (joon. 62). Joonestame meelevaldse raadiusega AB ringjoone, mille keskpunktiks on punkt A , ja mis lõikab antud sirget s kahes punktis

(üks neist on B). Muutmata sirgli haaret märgime sirgel s lõigu $BC = BA$ ja joonestame sama raadiusega kaare ümber punkti C . Punktide A ja C ümber joonestatud kaarte lõikepunkti D ühendame punktiga A . Sirge AD ongi otsitav.


Mis kujund on $ABCD$? Miks $AD \parallel s$?

396. Näita, et antud sirgele s ristsirge joonestamine läbi antud punkti A sirgli ja joonlaua abil on teostatav rombi joonestamise teel, asetsegu antud punkt väljaspool antud sirget või sellel sirgel (joon. 63). Missugusel rombi omadusel põhineb see konstruktsioon?




Joon. 63.

397. Näita, et antud lõigu poolitamine sirgli ja joonlaua abil on teostatav rombi joonestamise teel (joon. 64). Missugusel rombi omadusel põhineb see konstruktsioon?



Joon. 64.



Joon. 65.

398. Näita, et nurga poolitamine sirkli ja joonlaua abil on teostatav rombi joonestamise teel (joon. 65). Missugusel rombi omadusel põhineb see konstruktsioon?

RUUDU OMADUSED.

399. Põhjenda väidet, et ruudul on kõik ristküliku ja ühtlasi ka kõik rombi omadused. Mis sellest järeldeb ruudu diagonaalide kohta?

400. Põhjenda väidet, et ruut on korrapärane nelinurk. Mis on ruudu keskpunktiks? Näita, et ruudul leidub siseringjoon ja ka ümberringjoon.

401. a) Joonesta sirkli ja joonlaua abil ruut, mille üheks küljeks jääb antud lõik.


b) Joonesta ruut, mille diagonaali pikkus on 6,4 cm.

c) Joonesta ruut, mille ümberringjoon on antud.


TRAPETS.

402. Trapets on nelinurk, millel ainult üks paar vastaskülgi on paralleelsed.

Trapetsi paralleelsed küljed (AB ja DC , joon. 66) on tema alused, teised küljed aga haarad. Alustevaheline ristlõik on trapetsi kõrgus (EF , joon. 66).



Joon. 66.



Joon. 67.

Kui suur on trapetsi haara lähisnurkade summa? Kui suur on trapetsi nurkade summa?


403. *Trapetsit, mille üks haar on alustega risti, nimetatakse täisnurkseks trapetsiks (joon. 67).*

Kui suured on täisnurkse trapetsi kaks nurka? Mis saab öelda täisnurkse trapetsi kõrguse kohta?

404. Joonesta täisnurkne trapets, mille

- a) alused on 5,5 cm ja 3,9 cm ning lühem haar on 3,3 cm;
 - b) alused on 5,5 cm ja 3,9 cm ning pikem haar on 3,3 cm;
 - c) pikem alus on 6 cm ja haarad on 4 cm ja 5,5 cm;
 - d) üks alus on 6,4 cm ja diagonaalid on 5,4 cm ja 7,5 cm.
- Mõõda jooniselt küljed ja diagonaalid, mis pole antud.

405. *Kui trapetsi haarad on võrdsed, siis nimetatakse teda võrdhaarseks trapetsiks (joon. 68).*



Joon. 68.

Tõestame, et


võrdhaarse trapetsi aluse lähisnurgad on võrdsed.

Eeldus. $AB \parallel DC$ ja $AD = BC$ (joon. 68).

Väide. $\angle A = \angle B$ ja $\angle D = \angle C$.

Tõestus. Joonestame aluse DC otspunktidest trapetsi kõrgused DK ja CL (joon. 68). Et paralleelsete sirgete vahelised ristlõigud on võrdsed, siis $DK = CL$. Eelduse järgi $AD = BC$ ja joonise järgi $\angle K = \angle L$. Rakendades kolmnurkade võrdsuse tunnust KkN , saame $\triangle ADK = \triangle BCL$. Kuid siis on võrdsed nende kolmnurkade kõik vastavad elemendid, seega ka $\angle A = \angle B$.

Sellest on kerge järeldada (kuidas?), et $\angle D = \angle C$.



Joon. 69.

406. Võrreldes kolmnurki ABD ja ABC (joon. 69), tõesta, et

võrdhaarse trapetsi diagonaalid on võrdsed.

407. Joonesta võrdhaarne trapets, mille

a) alus on 6 cm, haar 3 cm ja nendevaheline nurk on 60° ;

b) alus, haar ja diagonaal on antud;

c) alused on 6 cm ja 4 cm ning kõrgus on 3 cm.

408. a) Kui suur on võrdhaarse trapetsi vastasnurkade summa?

b) Võrdhaarse trapetsi haar on võrdne lühema alusega ja risti diagonaaliga. Kui suured on trapetsi nurgad?

409. Joonesta trapets, mille

a) alused on 9,5 cm ja 4,2 cm, haarad on 4 cm ja 5,2 cm;

b) alused on 7 cm ja 3 cm, haarad on 5,3 ja 5,9 cm;

c) üks alus on 7,5 cm, üks haar 3,7 cm, nende otspunkte ühendav diagonaal 7 cm ja teine diagonaal 6 cm;

d) üks alus on 9 cm, üks haar 4,8 cm, nende otspunkte ühendav diagonaal 6 cm ja teine diagonaal 7,2 cm;

e) üks alus on 4 cm, üks haar 3 cm, nende otspunkte ühendav diagonaal 6 cm ja teine alus 8 cm;

f) pikem alus on 8 cm, kõrgus 4,7 cm, haarad 5,7 cm ja 5 cm.

Igalt jooniselt mõõda küljed ja kõrgus, mis ei ole antud.

Näide. Joonestame trapetsi, mille alused on a ja b , haarad c ja d . Ülesande lahenduse leidmiseks oletame, et ülesanne on lahendatud ja $ABCD$ on otsitav trapets (joon. 69 a). Kui lühema aluse CD ühest otspunktist, näiteks punktist C joonestada teise haaraga paralleelne lõik CE , siis tekib kolmnurk BCE , mille küljed on teada. Ülesande lahendamiseks joonestame antud andmete järgi esmalt selle kolmnurga ja siis viimase külge rööpküliku $AECD$.

410. Leia võimalikult lihtsa joonise abil trapetsi kõrgus, kui

a) trapetsi alused on 8,3 cm ja 13,3 cm, haarad on 4 cm ja 3,5 cm;

b) trapetsi alused on 25 cm ja 18 cm, haarad on 6 cm ja 5 cm;


c) trapetsi alused on 2,12 m ja 2,03 m, haarad on 80 cm;

d) trapetsi üks alus on 8,4 cm, üks haar 6 cm ja nende ots-punkte ühendav diagonaal 5,2 cm.


KOLMNURGA KESKLÕIK. TRAPETSI KESKLÕIK.

411. Joonesta mingi kolmnurk ABC ja ühenda selle kahe külje keskpunktid D ja E (joon. 70). Saadud lõiku DE nimetatakse kolmnurga kesklõiguks.

Kolmnurga kesklõiguks nimetatakse tema kahe külje keskpunkte ühendavat lõiku.



Joon. 69a.



Joon. 70.

Mitu kesklõiku on kolmnurgal? Joonesta tema kõik kesklõigud. Mõõda iga kesklõik ja võrdle tema pikkust küljega, millel pole kesklõiguga ühist punkti. Kuidas kesklõik näib asetsevat selle külje suhtes?

412. Tõestame, et


kolmnurga kesklõik on paralleelne kolmnurga ühe küljega ja võrdub poolega sellest küljest.

Eeldus. $AD = DC$ ja $BE = EC$ (joon. 71).

Väide. $DE \parallel AB$ ja $DE = AB : 2$.

Tõestus. Joonestame sirge läbi punkti B paralleelselt sirgega AC ja pikendame kesklõiku DE lõikumiseni selle sirgega

punktis F. Nii saame kolmnurga BEF, mis tunnuse NKN põhjal on võrdne kolmnurgaga CED (põhjenda seda üksikasjaliselt). Kolmnurkade võrdsusest järeldub, et $BF = DC$ ja $EF = DE$ (miks?). Nii näeme, et nelinurgas ABFD on vastasküljed AD ja BF mitte ainult paralleelsed, nagu joonestasime, vaid ka võrdsed ($AD = DC$ ja $BF = DC$, järelikult $AD = BF$). Seega nelinurk ABFD on rõõpkülik. Kuid siis tema vastasküljed DF ja AB on paralleelsed ja võrdsed. Et DE on pool lõigust DF, siis ka $DE \parallel AB$ ja $DE = AB : 2$, mida oligi vaja tõestada.



Joon. 71.

413. Eelmises ülesandes saime kolmnurga kesklõigu tema kahe külje keskpunktide ühendamise teel. Näitame, et sama lõigu võib saada veel teisiti, nimelt kui ühe külje keskpunktist tõmmata teise küljega paralleelne lõik kuni kolmanda küljeni. Tõepoolest, kui näiteks läbi punkti D (joon. 71) tõmmata küljega AB paralleelne lõik küljeni BC, siis peab see ju ühtima lõiguga DE, sest vastasel korral läheks läbi punkti D kaks sirget, mis oleksid paralleelsed sirgega AB: üks oleks äsja joonestatud sirge ja teine oleks sirge, millel asetseb kesklõik. Niisiis

kolmnurga ühe küljega paralleelne sirge, mis poolitab teise külje, poolitab ka kolmanda.

414. Joonesta mingi trapets ABCD ja tema üks diagonaal, ütleme BD. Tõmba trapetsi haara AD keskpunktist E alustega paralleelne sirge, mis lõigaku diagonaali BD punktis F ja haara BC punktis G (joon. 72). Eelmise teoreemi põhjal EF poolitab kolmnurga ABD külje BD, s. t. $BF = FD$. Kuid sama teoreemi põhjal EG poolitab siis ka kolmnurga DCB külje CB, sest ta poolitab

külje DB ja on paralleelne küljega DC. Seega punkt G on trapetsi haara BC keskpunkt. Saadud lõiku EG, mis ühendab trapetsi mitteparalleelsete külgede keskpunkte, nimetatakse trapetsi kesklõiguks. Kolmnurga kesklõigu omadustest järeldub, et trapetsi kesklõik


$$EG \parallel AB \parallel DC$$

ja

$$EG = EF + FG = \frac{AB}{2} + \frac{DC}{2} = \frac{AB + DC}{2}.$$

Nii oleme saanud, et

trapetsi kesklõik on alustega paralleelne ja võrdub aluste poolsummagi.



Joon. 72.

415. a) Anna trapetsi kesklõigu definitsioon.

b) Missugusel kahel viisil saab joonestada antud trapetsi kesklõiku?


416. Missuguse kujundi saab trapetsist, kui tema ühe aluse pikkus väheneb nii, et saab võrdseks nulliga? Mis saab sel juhul trapetsi kesklõigust? Järelda sel teel, et kolmnurga kesklõik võrdub poolega ühest küljest.

417. Kui trapetsi üks haar poolitada, saadud pooled uuesti poolitada jne., siis see haar jaotub võrdseteks lõikudeks (joon. 73). Tõmmates kõigist saadud jaotuspunktidest alustega paralleelsed sirged, jaotub trapetsi kesklõigu omaduste põhjal ka teine haar


võrdseteks lõikudeks. Seda tõsiasja võime sõnastada järgmiselt (joon. 73):

kui paralleelsed sirged lõikavad kaht sirget nii, et ühel neist tekivad võrdsed lõigud, siis tekivad võrdsed lõigud ka teisel sirgel.

418. Eelmises ülesandes antud paralleelsete sirgete omadus võimaldab antud lõiku kergesti jaotada võrdseteks osadeks. Olgu vaja lõik AB jaotada näiteks viieks võrdseks osaks (joon. 74)



Joon. 73.



Joon. 74.

Ülesande lahendamiseks joonestame läbi lõigu AB otspunkti A mingi abisirge s , märgime sellel järjestikku, alates punktist A , viis võrdset lõiku ning ühendame viimase lõigu otspunkti punktiga B . Nüüd joonestame sellele ühendussirgele paralleelsed sirged abisirge s punktidest 1, 2, 3 ja 4. Need paralleelid jaotavad lõigu AB viieks võrdseks osaks.

419. a) Jaota vabalt võetud lõik joonisel 74 näidatud viisil kolmeks võrdseks osaks.

b) Jaota vabalt võetud lõik joonisel 74 näidatud viisil kuueks võrdseks osaks.

420. a) Kolmnurga küljed on 22 m, 28 m ja 34 m. Tema külgede keskpunktide ühendamisel saadakse uus kolmnurk. Kui pikad on selle küljed?

b) Kolmnurga külgede pikkused a , b ja c avalduvad kahe arvu x ja y kaudu järgmiselt:

$$a = 4x - 2y; \quad b = 3x + y; \quad c = 5x - 3y.$$

Avalda antud kolmnurga kesklõikudest moodustuva kolmnurga küljed x ja y kaudu. Leia kummagi kolmnurga übermõõt ja võrdle neid.

421. Trapetsi alused on 7 dm ja 12 dm. Kui pikad on lõigud, milleks diagonaal tükeldab kesklõigu?

422. Trapetsi kesklõik on 12 m. Diagonaal tükeldab selle lõigu-deks, milledest üks on teisest 3 m pikem. Kui pikad on trapetsi alused?

423. a) Trapetsi alused on 8,7 cm ja 5,9 cm. Kui pikk on kesk-lõik?

b) Trapetsi üks alus on 16 cm ja kesklõik on 12 cm. Kui pikk on teine alus?

c) Trapetsi üks alus on 4,8 cm ja kesklõik on 6,4 cm. Kui pikk on teine alus?

KOLMNURGA MEDIAANIDE LÕIKUMINE.


424. Mida nimetatakse kolmnurga mediaaniks? Kas mediaan saab asetseda väljaspool kolmnurka?

425. Joonesta mingi kolmnurga kolm mediaani. Mida paned tähele nende kohta? Leia mõõtmise teel, kuidas suhtuvad need kaks lõiku, milledeks mediaanide lõikepunkt jaotab iga mediaani.

426. Tõestame, et

kolmnurga mediaanid lõikuvad kõik ühes punktis, mis jaotab iga mediaani suhtes 2:1, arvates kolmnurga vas-tavast tipust.

Eeldus. $AE = CE$; $AF = BF$; $BD = CD$ (joon. 75).



Joon. 75.

Väide. AD , BE ja CF lõikuvad kõik ühes ja samas punktis M ning seejuures $AM : MD = BM : ME = CM : MF = 2 : 1$.

Tõestus. Tähistame mingi kahe mediaani (näiteks AD ja BE) lõikepunkti tähega M ja ühendame nende mediaanide otspunktid D ja E ning lõikude AM ja BM keskpunktid G ja H . Siis DE on kolmnurga ABC kesklõik ja GH on kolmnurga ABM kesklõik, tähendab:

$$ED \parallel AB \text{ ja } ED = \frac{1}{2} AB;$$

$$GH \parallel AB \text{ ja } GH = \frac{1}{2} AB.$$

Sellest järeldub, et

$$ED \parallel GH \text{ ja } ED = GH.$$


Kuid siis nelinurk $GHDE$ on rööpkülik, sest tema üks paar vastaskülgi on paralleelsed ja võrdsed. Et rööpküliku diagonaalid poolitavad teineteist, siis

$$MD = MG \text{ ja } ME = MH.$$

Kuid MG on pool lõigust AM ja MH on pool lõigust BM , tähendab

$$AM : MD = 2 : 1 \text{ ja } BM : ME = 2 : 1.$$

Joonestame nüüd kolmanda mediaani CF . See peab tõestatu põhjal lõikama nii mediaani AD kui ka mediaani BE punktis, mis jaotab neid suhtes $2 : 1$, arvates vastavast tipust, s. t. punktis M . See näitab, et kõik kolm mediaani lõikuvad ühes ja samas punktis.



Joon. 76.

427. Lõika papist välja mingi kolmnurk, määra tema mediaanide lõikepunkt ja näita katseliselt, et mediaanide lõikepunkt on kolmnurga raskusekeske (joon. 76).

428. Missugusel kolmnurgal üks mediaan on ühtlasi kolmnurga kõrguseks ja nurga poolitajaks? Missugusel kolmnurgal iga mediaan on ühtlasi kolmnurga kõrguseks ja nurga poolitajaks?

429. Joonesta mingi täisnurkne kolmnurk ühes hüpotenuusi mediaaniga ja võrdle mediaani pikkust hüpotenuusi pikkusega. Näita, et hüpotenuusi mediaan võrdub alati poole hüpotenuusiga.

430. Teades, et hüpotenuusi mediaan võrdub poole hüpotenuusiga, leia, kui suur on nurk täisnurkse kolmnurga hüpotenuusi mediaani ja täisnurga poolitaja vahel, kui kolmnurga üks teravnurk on 59° .

TRAPETSI PINDALA.

431. a) Millega võrdub rööpküliku pindala? Avalda rööpküliku pindala S tema aluse a ja kõrguse h kaudu.

b) Millega võrdub ristküliku pindala? Järelda rööpküliku pindala valemist, et ristküliku pindala võrdub tema kahe lähiskülje pikkuste korrutisega.


432. a) Millega võrdub kolmnurga pindala? Avalda kolmnurga pindala S tema aluse a ja kõrguse h kaudu.

b) Avalda täisnurkse kolmnurga pindala S tema kaatetite a ja b kaudu. Kuidas see valem tuleneb ristküliku pindala valemist?

433. Tõestame, et

trapetsi pindala võrdub aluste poolsumma ja kõrguse korrutisega.

Tõestuseks joonestame mingi trapetsi $ABCD$ ja tükeldame ta diagonaaliga BD kahiks kolmnurgaks ABD ja DBC (joon. 77).



Joon. 77.

Trapetsi pindala võrdub saadud kolmnurkade pindalade summaga. Tähistades trapetsi alused tähtedega a ja b ning kõrguse tähega h , saame nüüd, et trapetsi pindala

$$S = \frac{1}{2} ah + \frac{1}{2} bh,$$

sest kui kolmnurkade ABD ja DCB alusteks võtta trapetsi alused, siis kõrgused võrduvad trapetsi kõrgusega. Võttes saadud summas ühised tegurid $\frac{1}{2}$ ja h sulgude ette, saame

$$S = \frac{1}{2} h(a + b)$$

ehk, korrutades tegurid $\frac{1}{2}$ ja $a + b$,

$$S = \frac{a+b}{2} h,$$

mida oligi vaja tõestada.

Trapetsi aluste poolsumma $\frac{a+b}{2}$ võrdub teatavasti tema kesklõiguga. Tähistades selle tähega k , saame trapetsi pindala valemi kirjutada kujul

$$S = kh,$$

mis ütleb, et

trapetsi pindala võrdub kesklõigu ja kõrguse korrutisega.

434. a) Arvuta trapetsi pindala, kui trapetsi alused on 5,8 cm ja 4,6 cm ning kõrgus on 3,7 cm.

b) Arvuta trapetsi pindala, kui trapetsi alused on 320 m ja 240 m ning kõrgus on 65% kesklõigust.

435. a) Arvuta pindala trapetsil, mille alus $a = 15,7$ m, alus $b = 8\frac{2}{3}$ m ja kõrgus $h = 4,8$ m.

b) Arvuta pindala trapetsil, mille üks alus on 48 m, teine alus on sellest 25% võrra suurem ja kõrgus on teisest alusest 25% võrra väiksem.

436. a) Trapetsi pindala $S = 127,1$ m², alus $a = 18$ m ja alus $b = 13$ m. Arvuta trapetsi kõrgus.

b) Trapetsi pindala $S = 392 \text{ m}^2$, alus $a = 25 \text{ m}$ ja kõrgus $h = 14 \text{ m}$. Kui pikk on alus b ?

437. Trapetsi alused ja kõrgus avalduvad kahe arvu x ja y abil järgmiselt:

$$a = 2x + y, b = 2x - y, h = x + y.$$

Avalda trapetsi pindala x ja y kaudu ja arvuta pindala, kui $x = 5$ ja $y = 7$.

438. Arvuta täisnurkse trapetsi pindala, kui alused on 8 dm ja 5 dm ning trapetsi üks nurk on 45° .

439. Täisnurkse trapetsi lühem alus on 12 cm , kõrgus 7 cm ja pikem haar 8 cm . Arvuta trapetsi pindala, kui on teada, et trapetsi üks nurk on 60° .

440. Missuguse kujundi pindala valemi saab trapetsi pindala valemist,

1) kui selles ühe aluse pikkuseks võtta 0?


2) kui selles alused on võrdsed?

TRAPETSIKUJULISE PÕHJAGA PÜSTPRISMA.


441. *Trapets on paljude kehade juures esinev kujund. Näiteks on teetammide ja kraavide ristlõigetel tavaliselt trapetsi kuju (joon. 81 ja 82). Sama kuju on ka paljude hoonete (kioskide, kuuride) külgmistel seintel (joon. 78).*

Vaadeldes teetammi või kraavi osa tema kahe ristlõike vahel, saame keha, millel on sama kuju nagu ülalnimetatud hoonetel. See keha on trapetsikujulise põhjaga püstprisma (joon. 79).

Too oma ümbrusest näiteid trapetsikujulise põhjaga püstprismadest.



Joon. 78.




Joon. 79.

442. Mitu tahku, serva ja tippu on trapetsikujulise põhjaga püstprismal? Missuguse kujuga on selle keha külgtahud? põhitahud? Missugused tahud on paralleelsed, missugused võrdsed? Missugused servad on paralleelsed ja võrdsed?

443. a) Valmista endale traat- või puuvarbadest trapetsikujulise põhjaga püstprisma varbmudel, ühendades prisma servi kujutavad varvad korkide või plastiliini abil.

b) Joonis 80 kujutab trapetsikujulise põhjaga püstprisma pinna-laotust. Joonesta see joonisel antud mõõtmete järgi rudulisele paberile, lõika välja ja kleebi kokku püstprismaks, täiendades joonist enne väljalõikamist kokkukleepimiseks vajalike äärtega.



Joon. 80.

444. Leia joonise 80 põhjal, missuguse kujuga on trapetsikujulise põhjaga püstprisma külgpinna laotus ja millega võrdub selle prisma külgpindala. Avalda see külgpindala, kui prisma põhjaks oleva trapetsi alused on a ja b , haarad on c ja d ning prisma külgserv (ühtlasi ka kõrgus) on k (joon. 79).

Arvuta trapetsikujulise põhjaga püstprisma külgpindala, kui põhja küljed on 17,8 cm, 8,3 cm, 6,8 cm ja 9,6 cm ning külgserv on 22,4 cm.

445. Prisma täispindala T koosneb külgpindalast K ja kahe põhja pindalast $2P$:

$$T = K + 2P.$$

Avalda K , P ja T joonisel 79 märgitud suuruste a , b , c , d , h ja k kaudu. Näita, et trapetsikujulise põhjaga püstprisma täispindala valemile saab anda kuju

$$T = (a + b)(k + h) + (c + d)k,$$

kus tähed a , b , c , d , h ja k tähendavad joonisel 79 näidatud suurusi.

446. Arvuta trapetsikujulise põhjaga püstprisma põhja pindala, külgpindala ja täispindala järgmise tabeli andmeil (tähed tähendavad joonisel 79 näidatud suurusi).


Harjutuse nr. \ Andmed	a	b	c	d	k
1	9 cm	5 cm	3,6 cm	3,6 cm	25 cm
2	8 m	3,5 m	4,3 m	5 m	0,5 m
3	12,6 m	6 m	4,5 m	7,5 m	1 m
4	17 dm	6 dm	11,3 dm	8,4 dm	10 dm

Näpunäide. Prisma põhjaks oleva trapetsi kõrguse leidmiseks kasuta (tarbe korral vähendatud) joonist (vt. ül. 409 ja 410).


447. Eelmisel õppeaastal nägime, et iga prisma ruumala võrdub põhja pindala ja kõrguse korrutisega. Kasutades seda tõsisaja, avalda trapetsikujulise põhjaga püstprisma ruumala põhja aluste a ja b , põhja kõrguse h ja prisma kõrguse k kaudu.

Arvuta prisma ruumala eelmise ülesande tabeli andmeil.

448. Trapetsikujulise ristlõikega teetammi (joon. 81) laius pealt on 6 m, laius alt 10 m ja kõrgus 1,2 m. Mitu autokoormat kruusa läheb niisuguse ristlõikega teetammi ühe kilomeetri ehitamiseks, kui auto kandejõuks arvestada 4,5 t ja kui 1 m³ kruusa




Joon. 81.




Joon. 82.

kaalub 1,5 t? Mitme päevaga võivad selle kruusa kohale toimetada 10 autot, kui iga auto teeb päevas 15 reisi?

449. Mitu kuupmeetrit pinnast tuleb välja võtta selleks, et kaevata trapetsikujulise ristlõikega kraav, mille mõõtmed on antud joonisel 82?



Joon. 83.



Joon. 84.

450. Mitu pange vett mahub joonisel 83 antud mõõtmetega künasse, kui pang mahutab 12 liitrit?

KORDAMISEKS.

451. Tõesta, et ristküliku külgede keskpunktid on ühe rombi tippudeks.

452. Tõesta, et rombi külgede keskpunktid on ühe ristküliku tippudeks.

453. Pioneerid matkasid kompassi järgi esiteks 3 km suunas N30°E, siis 2 km suunas N40°W ja lõpuks veel 4 km suunas N40°E. Valmista nende teest joonis mõõdus 1 : 100 000 ja leia sellest, kui kaugel olid pioneerid matka lõpul oma lähtekohast otsejoones.

454. Laev sõitis esiteks kursiga N60°E, siis kursiga E ja lõpuks kursiga S30°W. Kuidas esimene teelõik asetseb viimase suhtes?

455. Risttahukakujulisest rauatükist on välja lõigatud trapetsikujulise põhjaga püstprisma (joon. 84). Arvuta joonise andmeil rauatüki ruumala ja kaal.

456. Missugune kujund tekib, kui võrdhaarse trapetsi külgede keskpunktid ühendada järjestikku?

457. Missugune kujund tekib, kui nelinurga külgede keskpunktid ühendada järjestikku?

Näpunäide. *Kasuta nelinurga diagonaale.*

458. Kolmnurga mediaanid on 15,6 cm, 18,9 cm ja 14,1 cm. Arvuta kolmnurga tippude kaugused mediaanide lõikepunktist.

459. Lihtsusta avaldis

$$\left(\frac{5}{2x-1} + \frac{8}{2x+1} + \frac{7+16x}{1-4x^2} \right) \cdot \frac{2x-1}{x-1}.$$

460. Lihtsusta avaldis

$$\left(\frac{5}{2a+3} + \frac{2}{3-2a} + \frac{2a+9}{4a^2-9} \right) : \frac{8}{4a^2+12a+9}.$$

461. Teosta tehted

$$\frac{5,22 - 0,744 : 0,2}{25 \cdot 0,016} + \left(3 \frac{1}{15} - \frac{44}{45} \right) : 1 \frac{22}{25}.$$

462. Teosta tehted

$$34,17 : 1,7 + \left(2 \frac{3}{4} + 0,15 \right) : \frac{4}{5} - 23 \frac{3}{8}.$$

463. Mitu protsenti moodustab arvude 4,2 ja 3,8 vahe ruui samade arvude ruutude vahest?

464. Lihtsusta järgmine avaldis ja arvuta selle väärtus, kui $a = -2$:

$$\frac{a^2 - ax + a - x}{a^2 - ax - a + x}.$$

6. ARVUTAMINE LIGIKAUDSETE ARVUDEGA.

ARVUDE ÜMARDAMINE JA SELLEST TEKKIV VIGA.

465. Arvu 1254 saab ümardada sajalisteni kahel viisil, nimelt võttes 1254 asemel 1200 või 1300. Esimest ümardamist nimetatakse ümardamiseks **puuduga**, teist aga ümardamiseks **liiaga**.

Vastavalt sellele on arv 1200 arvu 1254 ligikaudne väärtus **puuduga** ja arv 1300 arvu 1254 ligikaudne väärtus **liiaga**.

Asendades antud arvu ükskõik kummaga nendest ligikaudsetest väärtustest, teeme vea, mida nimetatakse **ümardamisveaks**. Puuduga ümardamise juhul on siin ümardamisviga 1254—1200, s. o. 54, liiaga ümardamise puhul 1300—1254, s. o. 46.

Täisarvude ümardamisel asendatakse iga ärajääv number nulliga, kümnendmurdude ümardamisel jäetakse aga lõpunumbrid lihtsalt ära.

N ä i d e. $1685 \approx 1700$ (ümardatult sajalisteni);
 $37,658 \approx 37,7$ (ümardatult kümnendikeni).

466. Maakera läbimõõt poolusest pooluseni on 12 713,8 km. Anna maakera läbimõõdu ligikaudne väärtus tuhandetes kilomeetrites. Kui suure vea teed, kui ümardad selle arvu tuhandeliseni puuduga? liiaga?

Kummal juhul on viga väiksem?

467. a) Euroopa pindala on 9 439 926 km². Ümarda see arv tuhandeliseni nii puuduga kui ka liiaga. Otsusta, kummal juhul on viga väiksem.

b) Ringjoone pikkuse ja ringi läbimõõdu suhe on 3,141592653... Ümarda see arv sajandikeni nii puuduga kui ka liiaga. Otsusta, kummal juhul on viga väiksem.

468. Selleks et ümardamisviga oleks võimalikult väike, on kokku lepitud

ümardada liiaga, kui esimene ärajääv number on 5, 6, 7, 8 või 9, ja puuduga, kui see on 0, 1, 2, 3 või 4.

Järgnevates ülesannetes ümarda ikka selle reegli järgi.

469. Ümarda kümnelisteni arvud

37,4; 182; 1645; 5,6; 2049; 305.

Määra ümardamisvead ning leia nende hulgast suurim.

Missugune on suurim võimalik ümardamisviga, kui ümardame arve kümnelisteni?

Näide. $716,4 \approx 720$; ümardamisviga on 3,6.

470. Ümarda kümnendikeni

3,78; 4,348; 6,85; 29,391; 36,54; 0,259.

Missugune on suurim võimalik ümardamisviga, kui ümardame arve kümnendikeni?

471. Ümarda täismeepriteks

2,7 m; 16,3 m; 28,5 m; 39,4 m; 128 dm; 365 dm; 984 dm, 191 cm; 236 cm; 3799 cm; 5830 cm.

Missugune on suurim võimalik ümardamisviga, kui mingi pikkuse ümardame täismeepriteks?

472. Suurimat võimalikku ümardamisviga nimetatakse ümardamisvea ülemmääraks.

Ümardades kümnelisteni on vea ülemmäär 5 (vt. ül. 469), ümardades kümnendikeni on vea ülemmäär 0,05 (vt. ül. 470) jne.

Üldiselt:

arvude ümardamisel on ümardamisvea ülemmääraks pool selle järgu ühikust, milleni ümardati.

Ümardades arve näiteks tuhandeliteni, on ümardamisvea ülemmääraks pool tuhandest, s. o. 500.

473. Kui suur on vea ülemmäär, kui arv ümardati sajalisteni? sajandikeni? ühelisteni? kümnelisteni? tuhandikeni?

474. Ümarda järgmised arvud

a) tuhandikeni:	b) sajandikeni:	c) kümnendikeni:
0,2096	19,407	48,805
27,0607	8,095	4,83
4,00852	5,5428	0,754
6,90049	11,1065	127,896
1,82171	1,009	6,695
15,0999	2,999	14,051

Märkus. Kui kümnendmurru ümardamisel esimene alles jääv number on 0, siis seda nulli ei kustutata. Miks?

Näide. Ümardatult sajandikeni $1,997 \approx 2,00$, ümardatult kümnendikeni $1,997 \approx 2,0$ ja ümardatud ühelisteni $1,997 \approx 2$.

475. Ümarda järgmised arvud nii, et ümardamisvea ülemmäär oleks 5.

1237,698; 75,6789; 465,5664; 791,1243; 65,0075.

476. Ümarda eelmise ülesande arvud nii, et ümardamisvea ülemmäär oleks: a) 0,5; b) 50; c) 0,005; d) 0,05.

477. Ümarda järgmised arvud

- a) sajandikeni: 0,2093; 27,0605; 4,00202;
- b) ühelisteni: 1,23; 0,746; 19,507; 8,09; 2,103;
- c) tuhandikeni: 0,7385; 9,2297; 16,3776; 9,999;
- d) kümnelisteni: 18,1; 96,2; 15,099; 19,101; 85,5;
- e) tuhandelisteni: 817,8; 1511; 3690; 12723; 999;
- f) kümnendikeni: 2,53; 0,95; 6,678; 0,6099.

478. Ümarda järgmised arvud kümnelisteni ning määra ümardamisviga: 503; 817; 4305; 21 658; 21 814.

479. Ümarda järgmised arvud tuhandelisteni ning määra ümardamisviga: 23 458; 13 709; 100 998; 365 651.

480. Ümarda järgmised arvud ühelisteni ning määra ümardamisviga: 0,8; 3,7; 15,5; 0,379; 1,813; 2,972.

481. Teisenda kümnendmurruks $\frac{2}{7}$; $\frac{4}{9}$; $\frac{5}{12}$; $\frac{7}{55}$ täpsusega 0,005.

482. Ümarda järgmised tulemused tuhandikeni:

a) $2,496 : 0,48$ b) $32,204 : 7,1$ c) $1,8 : 0,288$

ARVU ALAMTÖKE JA ÜLEMTÖKE.

483. Olgu mingi arvu x ümardamisel sajalisteni saadud 2700, s. t. $x \approx 2700$. Kui ümardamine on toimunud ülesandes 468 antud reegli kohaselt, siis arv x , mille täpne väärtus ei ole teada, peab olema väiksem kui 2750, kuid suurem kui 2650 (mõnikord ka viimasega võrdne):

$$2650 < x < 2750.$$

Arve 2650 ja 2750 nimetame tundmatu arvu x tõketeks, nimelt on 2650 tema alamtöke ja 2750 tema ülemtöke.

484. Eesti NSV pindala p on sadade ruutkilomeetriteni ümardatult 45 100 km². Anna pindala p tõkked.

485. Tervete meetriteni ümardatult on koolimaja pikkus $p \approx 42$ m ja laius $l \approx 14$ m. Anna suuruste p ja l tõkked.

486. Olgu tundmatu arvu x ümardamisel saadud tema ligikaudseks väärtuseks a , kusjuures selle ligikaudse väärtuse vea ülemmäär on v . Siis on arvu x ülemtöke $a + v$ ja alamtöke $a - v$:

$$a - v < x < a + v.$$

Seega

arvu ülemtöke võrdub selle arvu ligikaudse väärtuse ja vea ülemmäära summaga, alamtöke võrdub ligikaudse väärtuse ja vea ülemmäära vahega.

Näide. Kui $x \approx 15,4$ ja $v = 0,05$,

siis

$$15,4 - 0,05 < x < 15,4 + 0,05$$

ehk

$$15,35 < x < 15,45.$$

487. Ümardamisel kümnendikeni saadi arvud:

$$a = 53,8; b = 14,3; c = 187,6; d = 48,5; e = 5,0.$$

Milline on nende arvude alam- ja ülemtõke? Vastus anna kujul:

$$53,75 < a < 53,85.$$

488. Ümardamisel sajandikeni saadi arvud:

$$a = 1,07; b = 0,12; c = 19,36; d = 187,05; e = 40,00.$$

Milline on nende arvude alam- ja ülemtõke?

489. Ümardamisel tuhandikeni saadi arvud:

$$a = 16,825; b = 4,791; c = 63,559; d = 191,099; e = 0,030.$$

Milline on nende arvude alam- ja ülemtõke?

490. Anna järgmiste suuruste tõkked nende suuruste ligikaudsete väärtuste põhjal:

$$a = 0,8; b = 6,5; c = 1,25; d = 12,683; e = 79; f = 6300; \\ g = 48\,000; h = 6795; i = 21.$$

491. Kui kirjutatakse, et klassi pikkus on 12,0 m, siis tahetakse sellega öelda, et viga mõõtmisel ei ületa 0,05 meetrit.

Kui suur on klassi pikkuse alam- ja ülemtõke? Kuidas mõjuks nulli kustutamine arvu lõpust vea ülemmäärale?

492. Missugune on vea ülemmäär ning ülem- ja alamtõke, kui kirjutatakse, et mingi raskus on 16,0 t? 9,00 ts? 25,000 kg? 0,030 t?

TÄPSED JA LIGIKAUDSED ARVUD.

493. Igasugune arvutamine tähendab antud arvude kaudu otsitavate arvude leidmist. Antud arvud on võetud sageli igapäevasest elust, on saadud seega mõõtmise, loendamise ja arvutamise teel, kusjuures need andmed on sageli ümardatud.

Kõik ümardamise teel saadud arvud on ligikaudsed.

494. Missuguse vea ülemmääraga saab mõõta pikkusi mõõdupuu abil, millel pole a) detsimeetritest peenemaid jaotusi, b) senti-

meetritest peenemaid jaotusi, c) millimeetritest peenemaid jaotusi?

Kõik mõõtmise teel saadud arvud on ligikaudsed.

Mõõtmisel saadud arve kirjutatakse ikka nii, et mõõtmisviga poleks suurem kui pool arvu viimase järgu ühikut. Seega tuleb mõõtmisel saadud ligikaudseid arve mõista ja kirjutada niisamuti nagu ümardamisel saadud ligikaudseid arvegi.

Näiteid. 1) Kui tänava laius $l \approx 8,4$ m, siis see tähendab, et

$$8,35 \text{ m} < l < 8,45 \text{ m}.$$

2) Kui laua pikkus $p \approx 1,20$ m, siis see tähendab, et

$$1,195 \text{ m} < p < 1,205 \text{ m}.$$

3) Kui rauatüki kaalumisel saadi $k \approx 73,0$ g, siis see tähendab, et

$$72,95 \text{ g} < k < 73,05 \text{ g}.$$

495. a) Loendamise tulemus on ligikaudne arv, kui loendata-vaid esemeid on palju, kui nad loendamise ajal muudavad oma asukohta, on paigutatud korrapäratult jne.

Kuigi loendamise tulemus on mõnikord täpne arv, tuleb see arvutamise ja meelepidamise hõlbustamiseks asendada ümardamisel saadava ligikaudse arvuga. Kui näiteks linna elanike arvuks saadi rahvaloendusel 271 826 inimest, siis ümardatakse see harilikult arvuks 272 000.

b) Ligikaudsed arvud võivad tekkida ka arvutamise tulemu-sena. Olgu näiteks vaja jaotada 24 m traati 7-ks võrdseks osaks. Siis iga osa pikkus meetrites on

$$24 : 7 = 3,428 \dots$$

Tulemuse kasutamiseks peame selle ümardama. Nii saame jagatiseks ligikaudse arvu.

496. Asudes lahendama ükskõik millist ülesannet, on kõige-pealt vaja endale selgeks teha, missugused selles ülesandes esi-nevad andmed on ligikaudsed ja missugused täpsed.

Näiteks ülesandes: «Korrapärase kaheksanurga külje pikku-seks saadi mõõtmisel 5,7 m. Kui suur on selle kaheksanurga

ümbermõõt?» esinev arv 8 on täpne arv, 5,7 aga ligikaudne arv, kuna see on saadud mõõtmise tulemusena.

497. Otsusta, kas alltoodud arvud väljendavad suuruse täpset või ligikaudset väärtust.

- a) Kooli õpilaste arv on nimekirja järgi 791.
- b) Linnas on 72 000 elanikku.
- c) Tööline sai kassast 82 rubla palka.
- d) Rong sõitis Tallinnast Moskvasse 23 tundi.
- e) Isa, ema ja poja vanus on kokku 112 aastat.
- f) Muuseumi külastas kuu jooksul 2500 inimest.
- g) Kauplusest müüdi nädala jooksul 450 paari jalatseid.
- h) Raamatukogu raamatute arv on 25 000.
- i) Raudteerööpa pikkus on 10,35 m.
- j) Jalgratta ratta kõrgus on 0,63 m.
- k) Bensiniivaadi maht on 125 l.

498. Arvuta läbi ülesanded 622—632 ja määra kindlaks, kas neis esinevad arvud on täpsed või ligikaudsed.

499. *Eelmistes klassides õppisime teostama tehteid täpsete arvudega ja jättsime tulemused enamasti ümardamata. Vaatleme nüüd, kuidas tuleb tehete tulemusi ümardada, kui teame, et arvutamisel kasutatavad andmed on ligikaudsed.*

LIGIKAUDSETE ARVUDE LIITMINE.

500. *Õpilased mõõtsid jaama kaugust koolimajast. Seda teostati osade kaupa. Saadi järgmised tulemused: koolimajast sidekontorini on 229 m, sidekontorist apteegini 198 m ja apteegist raudteejaamani 377 m. Kui kaugel asetseb raudteejaam koolimajast?*

○ ————— ○ ————— ○ ————— ○
 Koolimaja Sidekontor Apteek Raudteejaam

Liites need arvud, saame:

$$\begin{array}{r}
 229 \\
 + 198 \\
 \hline
 377 \\
 \hline
 804
 \end{array}$$

Ulesande andmed on saadud mõõtmise teel ja on seega ligikaudsed. Järelikult on ligikaudne ka saadud summa. Kuidas tuleb see summa ümardada?

Sellele küsimusele vastuse saamiseks leiame otsitava summa alamtõkke, liites liidetavate alamtõkked, ja summa ülemtõkke, liites liidetavate ülemtõkked.

Summa alamtõke:

228,5
197,5
376,5
802,5

Summa ülemtõke:

229,5
198,5
377,5
805,5

Seega teame otsitavast kaugusest x järgmist:

$$802,5 < x < 805,5.$$

Võrdleme otsitava summa ligikaudset väärtust, tema alam- ja ülemtõket omavahel.

804
802,5
805,5

Kõigis kolmes arvus esineb üks ja sama sajaliste ning üks ja sama kümneliste number (8 ja 0). Ühe- liste numbrid on erinevad: 4, 2 ja 5. Lepime kokku kirjutada ligikaudsete arvudega arvutamisel tule- musi, nii et kõik nendes esinevad numbrid oleksid õiged, peale viimase, mis võib õigest erineda. (Selleks viimaseks numbriks ei tohi olla muidugi mingi juhuslikult võetud number, vaid arvutamisel või ümardamisel saadud number.) Selle kokku- leppe kohaselt võtame otsitava summa ligikaudseks väärtu- seks 804. Seda pole enam vaja ümardada, sest ta vastab ülaltoo- dud kokkuleppele.

Vastus. Raudteejaama kaugus koolimajast on 804 m.

501. *Arvutamisel ligikaudsete arvudega ei ole tulemuse vea ülemmäär enam pool ligikaudse arvu viimase järgu ühikust, nagu on andmete vea ülemmäär. Lahutades eelmises ülesandes vaadel- dud summa ülemtõkkest 805,5 selle ligikaudse väärtuse 804, saame 1,5. Sama tulemuse saame, kui ligikaudsest väärtusest 804 lahu- tame alamtõkke 802,5. Tähendab, ligikaudse arvu 804 vea ülem- määr on juba 1,5. Kui ligikaudse arvu vea ülemmäär ei ole pool!*

tema viimase järgu ühikust, siis märgitakse see ülemmäär sageli selle arvu järele sulgudesse:

$$x \approx 804 (\pm 1,5).$$

See kirjutus tähendab, et

$$804 - 1,5 < x < 804 + 1,5.$$

502. Anna järgmiste ligikaudsete arvude tőkked.

$$a \approx 18,7 (\pm 1,3); b \approx 0,80 (\pm 0,007); c \approx 120 (\pm 15).$$

503. Kaalumise teel määrati kindlaks, et tühi pudel kaalub 239,2 g ja kork 5,24 g. Pudelisse valati 25 g vett. Kui palju kaalub nüüd pudel koos vee ja korgiga?

Alamtõke	Ligikaudne väärtus	Ülemtõke
239,15	239,2	239,25
5,235	5,24	5,245
24,5	25	25,5
268,885	269,44	269,995

Õigeid numbreid, nagu nende kolme summa kõrvutamine näitab, on saadud summas ainult kaks: 2 ja 6 (sajalised ja kümnelised). Sel põhjusel on õige ümardada summa ühelisteni:

$$269,44 \approx 269.$$

Vastus. Pudel koos korgi ja veega kaalub 269 g.

504. Missugused arvu järgud on antud eelmise ülesande esimeses liidetavas? teises liidetavas? kolmandas liidetavas?

Missugune on kõige madalam järk, mis kõikides andmetes on antud?

Missuguse järguni tuli ümardada ligikaudsete arvude summa?

Ligikaudsete arvude summa tuleb ümardada kõige madalama järguni, mis kõikides liidetavates on teada.

Märkus. Kui mõni liidetav on täpne arv, siis selle järgu määramisel, milleni summat ümardada, seda liidetavat ei arvestata. Näiteks, kui ülesandes 503 oleks 25 täpne arv, siis tuleks

summa ümardada esimese ligikaudse liidetava järgi, s.o. küm-
nendikeni.

505. Tee kindlaks, millise järguni tuleb ligikaudsete arvude
summa ümardamise eeskirja põhjal ümardada iga järgmine
ligikaudsete arvude summa:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| a) $29,594 + 3,7 + 0,9009$; | d) $444,4 + 2,22 + 111,111$; |
| b) $0,00825 + 0,002 + 0,87$; | e) $0,2093 + 27 + 4,008$; |
| c) $9,4 + 2,7327 + 7,26$; | f) $0,08 + 0,10023 + 0,7$. |

506. Ümarda järgmised summad vastavalt ligikaudsete
arvude summa ümardamise eeskirjale:

- a) $57,028 + 0,3 + 84 = 141,328 \approx \dots$
b) $0,2 + 49,35 + 0,069 = 49,619 \approx \dots$
c) $40 + 0,91 + 51,7 = 92,61 \approx \dots$

507. Leia järgmiste ligikaudsete arvude summa ning ümarda
see:

- a) $137\,000 + 680 + 31\,200 + 1700$;
b) $395 + 710 + 2900 + 3600$;
c) $478\,000 + 6750 + 4781 + 5400$.

508. Olgu vaja liita neli ligikaudset arvu:

$$3,5 + 6,7837 + 4,257 + 0,07896.$$

Liidame need:

$$\begin{array}{r} 3,5 \\ 6,7837 \\ 4,257 \\ 0,07896 \\ \hline 14,61966. \end{array}$$

Ligikaudsete arvude summa ümardamise reegli kohaselt tuleb
saadud tulemuses säilitada ainult üks koht pärast koma (miks?):

$$14,61966 \approx 14,6.$$

Kolme viimase liidetava suurem täpsus osutus siin kasutuks
ja ülearused kohad pärast koma nõudsid tarbetut tööd.

Seda tööd saab vältida, kui enne liitmist suurema täpsusega

liidetavad ümardada nii, et neis jääks üks koht (varunumber) koma järel rohkem, kui on kõige väiksema täpsusega liidetavas.

Ümardame kolm viimast liidetavat ühe varunumbri-ga ning liidame uuesti:

$$\begin{array}{r} 3,5 \\ 6,78 \\ 4,26 \\ 0,08 \\ \hline 14,62 \approx 14,6. \end{array}$$

Saime endise tulemuse.

Suurema täpsusega antud liidetava ümardamine enne liitmist kergendab arvutamist. Rakenda seda kergendavat võtet.

509. Ümarda eelmises ülesandes antud ligikaudsed arvud kümnendikeni (nagu on antud väikseima täpsusega liidetav 3,5) ja liida siis. Missuguse tulemuse saad? Miks on liidetavate ümardamisel vaja säilitada üks varunumber?

510. Leia järgmiste ligikaudsete arvude summa:

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| a) $0,52 + 0,079 + 12$; | b) $1,038 + 12,5$; |
| c) $4,8 + 0,475 + 3,5691$; | d) $12,57 + 0,617 + 32$; |
| e) $0,72 + 0,6482 + 0,01686$; | f) $15,240 + 2,6463 + 0,81418$. |
| g) $52,3 + 432 + 250 + 26,47$; | |

511. Turist käis 94 km jalgsi, sõitis 895,6 km rongiga ja 240 km laevaga. Kui pikk oli kogu teekond?

512. Ühes tükis on 17,25 m nõöri, teises 19 m ja kolmandas 21,3 m. Mitu meetrit nõöri on kolmes tükis kokku?

513. Kolmnurga külgede mõõtmisel saadi pikkused 20,7 m, 14,53 m ja 21 m. Arvuta kolmnurga ümbermõõt.

514. Kollase vase valmistamiseks võeti 64,1 kg punast vaske, 32,75 kg tsinki ja 2,863 kg tina. Kui palju kaaluvad võetud metallid kokku?

515. Nelinurkse aia ümber ehitati tara. Aia üks külg oli 20 m, teine külg 16,8 m, kolmas 184 dm ja neljas 22,75 m. Kui pikk on kogu tara?

516. Teisenda harilikud murrud kümnendmurdudeks kahe numbriga koma järel ja leia summa S.

$$S = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{11}{12} + \frac{11}{15}.$$

Kontrolli saadud tulemuse õigsust, sooritades tehted harilike murdudega ning teisendades siis tulemuse kümnendmurruks.

517. Teisenda liidetavad kümnendmurdudeks kahe kohaga koma järel ning leia tulemus.

a) $4\frac{1}{7} + 5\frac{4}{9} + 3\frac{5}{11}$; c) $11\frac{15}{309} + 111\frac{17}{412} + 1\frac{1}{206}$;

b) $10\frac{5}{9} + 6\frac{9}{11} + \frac{4}{7}$; d) $4\frac{5}{63} + 5\frac{1}{79} + \frac{11}{51}$.

518. Ristkülikukujulise maatüki pikkus on 1240 m ja laius 236 m. Leia selle maatüki übermõõt.

519. Maja ehitamiseks vajatakse 1 532 000 punast tellist ja 325 500 silikaatkivi. Mitu kivi on vaja selle maja ehitamiseks?

520. Kolhoosi maa-alast on põldude all 1550 ha, metsa all 640 ha, heinamaa all 1360 ha ning muuks otstarbeks kasutatakse 345 ha. Kui palju maad on sellel kolhoosil?

LIGIKAUDSETE ARVUDE LAHUTAMINE.

521. Olgu vaja leida ligikaudsete arvude 22,8 ja 1,248 vahe. Lahutades saame:

$$\begin{array}{r} 22,8 \\ - 1,248 \\ \hline 21,552. \end{array}$$

Millise järguni ümardada saadud vahet?

Leiame vahe alamtõkke, lahutades vähendatava alamtõkkest lahutatava ülemtõkke, sest vahe on seda väiksem, mida väiksem on vähendatav ning mida suurem on lahutatav:

$$\begin{array}{r} 22,75 \\ - 1,2485 \\ \hline 21,5015. \end{array}$$

Vahe ülemtõkke leidmiseks lahutame vähendatava ülemtõkkest lahutatava alamtõkke, sest vahe on seda suurem, mida suurem on vähendatav ja mida väiksem on lahutatav:

$$\begin{array}{r} 22,85 \\ - 1,2475 \\ \hline \end{array}$$

$$21,6025.$$

Seega teame otsitavast vahest x järgmist:

$$21,5015 < x < 21,6025.$$

Võrdleme leitud vahet tema alam- ja ülemtõkkega.

21,552
21,5015
21,6025

*Kõigis kolmes arvus esineb üks ja sama kümne-
liste ning üks ja sama üheliste number (2, 1). Küm-
nendike numbris on erinevusi: 5, 5 ja 6. Vastavalt
arvutamise tulemuste kirjutamise kokkuleppele
peame ümardama:*

$$21,552 \approx 21,6.$$

Tulemusest saame teha sama järelduse mis liitmisegi puhul:

**ligikaudsete arvude vahe tuleb ümardada kõige mada-
lama järguni, mis on teada nii vähendatavas kui ka lahu-
tatavas.**

522. Tee arvutamata kindlaks, mitu numbrit saame koma järel vastavalt vahe ümardamise eeskirjale järgmiste ligikaudsete arvude vahes:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| a) 276,1 — 69,8943; | d) 0,75958 — 0,6; |
| b) 97,8 — 0,8594; | e) 7,8004 — 2,23; |
| c) 784,4908 — 35,3; | f) 3,5 — 0,789. |

523. Ümarda järgmised vahed vastavalt vahe ümardamise eeskirjale:

- $10,7 - 0,532 = 10,168 \approx \dots$
- $15,348 - 8,3 = 7,048 \approx \dots$
- $2 - 1,221 = 0,779 \approx \dots$

524. Teosta järgmiste erineva täpsusega ligikaudsete arvude lahutamine: 1) tavalisel viisil; 2) ümardades suurema täpsusega ligikaudset arvu enne lahutamist ühe varunumbrini.

a) $14,8 - 2,3651$;

b) $29,3785 - 7,6$.

Ümarda saadud tulemused eespool toodud ligikaudsete arvude vahe ümardamise reegli kohaselt. Võrdle saadud tulemusi. Millise järelduse võid sellest teha?

Rakenda seda arvutamist kergendavat võtet ligikaudsete arvude lahutamisel.

525. Lahuta järgmised ligikaudsed arvud:

1) $9 - 0,85$

2) $81 - 0,09$

3) $5,6 - 2,367$

$17 - 0,24$

$48 - 28,58$

$17,993 - 8,4$

$15 - 13,351$

$30 - 18,86$

$29,72 - 8,643$

$500 - 14,275$

$8,65 - 7$

$4,153 - 2,9$

526. Leia järgmiste ligikaudsete arvude vahe:

1) $377 - 2,35$

2) $8,1 - 5,906$

3) $74,38 - 27$

$58,41 - 55,7$

$738 - 69,465$

$115,25 - 49$

$12 - 1,18$

$895,1 - 386,472$

$4,195 - 2,5$

$684,42 - 36,8$

$85 - 68,642$

$98 - 10,75$

$4,7 - 0,522$

$0,2 - 0,057$

$60 - 21,40$

527. Teisenda harilikud murrud kümnendmurdudeks ühe numbriga koma järel ning arvuta alltoodud arvude vahe:

a) $\frac{9}{10} - \frac{1}{15}$

d) $\frac{11}{18} - \frac{11}{90}$

b) $\frac{15}{27} - \frac{1}{18}$

e) $\frac{13}{85} - \frac{11}{17}$

c) $\frac{25}{27} - \frac{10}{21}$

f) $\frac{17}{70} - \frac{11}{35}$

Kontrolli saadud tulemuste õigsust, teostades tehted harilike murdudega ning teisendades vahe kümnendmurruks.

528. Kahe ligikaudse arvu summa on 120,4. Üks liidetavatest on 50,98. Leia teine liidetav.

529. Auto, sõites kiirusega 68,7 km tunnis, möödub teisest samas suunas sõitvast autost, mille kiirus on 49 km tunnis. Kui kaugel olid need autod teineteisest üks tund enne kohtumist?

530. Sulatati 64,85 kg vaske, 32,755 kg tsinki ja 2,1 kg tina. Metalli kadu sulatamisel oli 2215 g. Leia saadud sulami kaal.

531. Linnas *A* on ligikaudu 175 000 elanikku, linnas *B* aga 89 500 elanikku. Kui palju on linnas *A* elanikke enam?

532. Sovhoosi metsas kasvas ligikaudu 5200 puud. Aasta jooksul raiuti maha ligikaudu 860 puud. Mitu puud on veel sovhoosi metsas?

533. Kütteladu sai 15 500 m³ puid. Sellest on laos järel 210 m³. Kui palju puid on müüdud?

534. Pudel koos petrooleumiga kaalub 1,42 kg, pudel kaalub 0,543 kg. Kui palju kaalub pudelis olev petrooleum?

535. Korterite pindala on 79,43 m², sellest on ahjude all 5,325 m². Kui palju on vaba põrandapinda?

536. Mensuuris on 62,0 cm³ vett. Mensuuri lasti tinatükk, mille järel veepind tõusis 94,35 cm³-ni. Kui suur on tinatüki ruumala?

537. Kauba brutokaal on 1,23 t, taarakaal 0,150 t. Kui palju kaalub kaup?

538. Leia järgmised vahed, kui üks arvudest on ligikaudne ja teine täpne arv (täpne arv on antud jämedas kirjas):

a) 0,96 — 0,5; b) 3,2 — 0,12; c) 3,27 — 0,2;

d) 8,065 — 0,0035.

Märkus. Täpset arvu vahe ümardamisel ei arvestata (vt. ül. nr. 504).

LIGIKAUDSETE ARVUDE KORRUTAMINE.

539. Arvutame korrutise $7 \cdot 0,052$, milles esimene tegur on täpne ja teine ligikaudne arv, ning küsime, missuguse järguni tuleb tulemus ümardada.

Korrutades antud arvud, saame

$$7 \cdot 0,052 = 0,364.$$

Et teise teguri vea ülemmäär on 0,0005, siis võib arvutatud korrutis õigest tulemusest erineda juba kuni

$$7 \cdot 0,0005 = 0,0035$$

võrra. Seega ei ole arvutatud korrutise viimasel järgunumbri 4 mingit mõtet ja me ümardame korrutise sajandikeni:

$$7 \cdot 0,052 = 0,364 \approx 0,36.$$

540. Eelmises ülesandes toodud näite eeskujul saaksime:

$$70 \cdot 0,052 = 3,6;$$

$$0,7 \cdot 0,052 = 0,036;$$

$$7 \cdot 0,0052 = 0,036;$$

$$0,07 \cdot 5200 = 360.$$

Selleks et sõnastada siit silmanähtavat ümardamisreeglit, jätame nii ligikaudses teguris (0,052; 0,0052; 5200) kui ka korrutises (0,36; 3,6; 0,036; 360) koma ja nullid arvu kirjutise alguses ja lõpus ära ning vaatleme siis saadud numbrite rühmi 52 ja 36. Esi-
mest numbrite rühma (52) nimetatakse teguri **tüveks** ja teist (36) korrutise **tüveks**. Arvu tüves esinevad numbrid on arvu **tüvenumbrid**.

Ligikaudse täisarvu tüveks nimetatakse seda arvu, mille saame, kui arvu lõpus olevad nullid ära jätame.

Ligikaudse kümnendmurru tüveks nimetatakse seda arvu, mille saame, kui koma ja arvu alguses olevad nullid ära jätame.

Erandina kuulub 0 täisarvu lõpus mõnikord tüvenumbrite hulka (vt. ül. 542).

Näiteid.

a) 5200, tüvi 52;

b) 360, tüvi 36;

c) 0,07, tüvi 7;

d) 0,070, tüvi 70.

Nagu näeme, on eespool saadud korrutistes niisama palju tüvenumbreid, kui palju neid on ligikaudses teguris.

*Ligikaudsed arvud
0,7 ja 0,70
ei tähenda
ühte ja sama!*

Joon. 85.

Seega -

täpse arvu ja ligikaudse arvu korrutis tuleb ümardada nii, et korrutises oleks niisama palju tüvenumbreid, kui palju on neid ligikaudses teguris.

541. Kirjuta järgmiste ligikaudsete arvude tüved:

250; 7500; 0,07; 1,005; 0,070; 0,3009; 3,090.

Märkus: Kümnnendmurru lõpus olevad nullid kuuluvad tüvenumbrite hulka.

542. Nullidega lõppev ligikaudne täisarv, mille kohta me ei tea, millise järguni ta ümardati, loetakse ümardatuks selle madalaima järguni, milles esineb veel nullist erinev number.

Näiteks loetakse ligikaudne arv 2400 ümardatuks sajalisteni, ligikaudne arv 10 030 ümardatuks kümnelisteni, ligikaudne arv 13 000 ümardatuks tuhandelisteni jne.

Nullid selliste ligikaudsete täisarvude lõpus tema tüvenumbrite hulka ei kuulu.

Kui aga on teada, missuguse järguni nullidega lõppev ligikaudne täisarv on ümardatud, ja kui selles järgus, milleni arv ümardati (võib-olla ka kõrgemates järkudes), leidub nulle, siis kuuluvad need nullid tüvenumbrite hulka.

Näide:

$2501 \approx 2500$ (ümardatud kümnelisteni) $\rightarrow$ 3 tüvenumbrit (2,5,0).
Arv ümardati kümnelisteni. Selles järgus asub null. See null kuulub tüvenumbrite hulka.

$2500,3 \approx 2500$ (ümardatud ühelisteni) $\rightarrow$ 4 tüvenumbrit (2,5,0,0).
Nullid, mis asuvad selles järgus, milleni arv ümardati, ja sellest kõrgemates järkudes, kuuluvad tüvenumbrite hulka.

$250\,300 \approx 250\,000 \rightarrow$ 3 tüvenumbrit. Missuguse järguni see arv ümardati? Miks kuulub esimene null tüvenumbrite hulka, kolm viimast aga mitte?

Tüvenumbrite hulka kuuluvad nullid ligikaudses täisarvus märgime edaspidi, kus see teisiti pole selge, väikese kriipsukesega nulli all. Näiteks: arv 1700 on ümardatud kümnelisteni, järelikult on selles arvus 3 tüvenumbrit.

543. Mitu tüvenumbrit on järgmistes ligikaudsetes arvudes:
 $12\,000$; $12\,000$; $12\,000$; $12\,000$?

544. Mitu tüvenumbrit on järgmistes ligikaudsetes arvudes:
 24 ; 356 ; 502 ; 7004 ; $20\,604$; 250 ; 3100 ; 2050 ; $302\,400$;
 $5\,003\,000$?

545. Mitu tüvenumbrit on igas järgmises kümnelisteni ümardatud ligikaudses arvus: 230 ; 480 ; 1040 ; $20\,050$; $11\,700$?

546. Mitu tüvenumbrit on igas järgmises ligikaudses arvus:
 $8,5$; $0,42$; $0,703$; $6,05$; $1,003$; $201,03$; $0,03$; $0,004$; $2,60$; $8,240$; $8,040$;
 $0,070$; $0,2080$; $0,300$; $2,500$; $603,100$; $2004,50$; 9800 ; $83\,000$; $75\,000$;
 8500 ; 490 ; $300\,200$; 1010 ?

547. Missugune erinevus on kirjutustel: «temperatuur on 37° » ja «temperatuur on $37,0^\circ$ »?

548. Arvuta võrdkülgse kolmnurga ümbermõõt, kui tema külje pikkuse mõõtmisel saadi $0,73$ m.

549. Arvuta ruudu ümbermõõt, kui tema külje pikkus on ligikaudu $5,8$ dm.

550. Arvuta korrapärase kuusnurga ümbermõõt, kui tema külje pikkus on ligikaudu $13,6$ cm.

551. Arvuta järgmised korrutised, kui esimene tegur on täpne arv ja teine ligikaudne arv:

a) $8 \cdot 0,0042$;

c) $98 \cdot 1,37$;

e) $59 \cdot 0,20$;

b) $12 \cdot 0,751$;

d) $60 \cdot 0,68$;

f) $75 \cdot 9800$.

Näide. $31 \cdot 0,60 = 18,60 \approx 19$;

$22 \cdot 970 = 21\,340 \approx 21\,000$.

552. Klassi pikkus on 11,3 m ja laius 8,4 m. Kui suur on klassi põranda pindala?

Pindala leidmiseks tuleb pikkust ja laiust väljendavad arvud korrutada:

$$\begin{array}{r} \times 11,3 \\ 8,4 \\ \hline 452 \\ 904 \\ \hline 94,92 \end{array}$$

Klassi pikkust ja laiust väljendavad arvud on ligikaudsed (miks?), mistõttu korrutis tuleb ümardada. Küsime, missuguse järguni tuleb seda teha?

Antud arvude alamtõkked on 11,25 ja 8,35, ülemtõkked on 11,35 ja 8,45.

Korrutis omandab väikseima väärtuse, kui tegurid on võimalikult väiksed. Leiame korrutise alamtõkke, korrutades tegurite alamtõkked:

$$\begin{array}{r} \times 11,25 \\ 8,35 \\ \hline 5625 \\ 3375 \\ 9000 \\ \hline 93,9375 \end{array}$$

Nüüd korrutame tegurite ülemtõkked, et leida korrutise ülemtõke.

$$\begin{array}{r} \times 11,35 \\ 8,45 \\ \hline 5675 \\ 4540 \\ 9080 \\ \hline 95,9075 \end{array}$$

Kõrvutame nüüd kõik kolm korrutist.

Antud arvude korrutis: 94,92

Alamtõkete korrutis: 93,9375

Olemtõkete korrutis: 95,9075

Igas korrutises on kümneliste arv üks ja sama (9). Üheliste arv aga on juba erinev: 4, 3, 5. Järelikult tuleb korrutis ümardada ühelisteni. Seega $94,92 \approx 95$.

Mitu tüvenumbrit on esimeses teguris? teises teguris? Mitu tüvenumbrit on korrutises?

Millise järeltõkete võid teha?

Kahe ligikaudse arvu korrutis tuleb ümardada nii, et korrutises oleks nii mitu tüvenumbrit, kui mitu neid on vähima tüvenumbrite arvuga teguris.

553. Määra arvutamist teostamata, mitu tüvenumbrit saame vastavalt korrutise ümardamise eeskirjale järgmiste ligikaudsete arvude korrutistes:

- | | | |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| a) $7 \cdot 3,587$; | d) $121 \cdot 1,0042$; | g) $0,57 \cdot 0,305$; |
| b) $22 \cdot 5,87$; | e) $1308 \cdot 0,00561$; | h) $5,8 \cdot 0,001$; |
| c) $1,008 \cdot 81$; | f) $44 \cdot 0,207$; | i) $0,3 \cdot 7,84$. |

554. Ümarda järgmised ligikaudsete arvude korrutised vastavalt korrutise ümardamise eeskirjale:

- | | |
|---|---|
| a) $0,8 \cdot 16,9 = 13,52 \approx \dots$ | d) $366 \cdot 90 = 32940 \approx \dots$ |
| b) $7,2 \cdot 0,09 = 0,648 \approx \dots$ | e) $0,79 \cdot 6,41 = 5,0639 \approx \dots$ |
| c) $24,0 \cdot 481 = 11544 \approx \dots$ | f) $0,03 \cdot 0,07 = 0,0021 \approx \dots$ |

555. Arvuta kolmnurkse maatüki pindala, kui maatüki üks külg on 46 m ja vastastipu kaugus sellest küljest on 37 m.

556. Arvuta ligikaudsete arvude

$$3,8 \cdot 12,456$$

korrutis kahel viisil: 1) korrutades tegurid antud kujul; 2) ümardades enne korrutamist suurema tüvenumbrite arvuga tegurit nii, et selles oleks üks tüvenumber enam (varunumber) kui väiksema tüvenumbrite arvuga teguris.

Ümarda tulemused korrutise ümardamise reegli kohaselt ja võrdle tulemusi. Missuguse järelduse võid teha?

Rakenda seda arvutamist kergendavat võtet ligikaudsete arvude korrutamisel.

Näide. $0,06 \cdot 3,8754 = 0,06 \cdot 3,9 = 0,234 \approx 0,2$.

557. Leia järgmiste ligikaudsete arvude korrutised:

1) $15 \cdot 2,34$	2) $15,2 \cdot 0,03$	3) $17,007 \cdot 4,08$
$1,6 \cdot 0,25$	$0,07 \cdot 15,25$	$5,08 \cdot 0,0149$
$7,5 \cdot 0,014$	$0,156 \cdot 1,7$	$6,8 \cdot 0,93$
$1,01 \cdot 2,04$	$16,15 \cdot 0,08$	$0,991 \cdot 0,89$
$0,09 \cdot 3,07$	$23 \cdot 4,08$	$6,07 \cdot 0,305$

558. Leia ristkülikukujulise maatüki pindala, kui maatüki pikkus on 1,72 km ja laius 0,34 km.

559. Laoplatsile veeti 16 250 m³ tammepalke. Arvuta palkide kaal, kui üks kuupmeeter palke kaalub 0,85 tonni.

560. Kui palju kaalub 17,5 m³ kivisütt, kui 1 m³ kivisütt kaalub 1,3 tonni?

561. Leia korrapärase kuusnurga ümbermõõt, kui kuusnurga külje pikkuseks saadi mõõtmisel 12,24 m.

Mitu tüvenumbrit tuleb võtta siin korrutises? Miks?

562. Teosta järgmised korrutamised (üks tegureist on ligikaudne arv; teine — täpne arv, mis on trükitud jämedas kirjas).

1) $8 \cdot 6,57$;	3) $0,283 \cdot 734$;	5) $90 \cdot 375$;
2) $0,85 \cdot 375$;	4) $70 \cdot 4,8$;	6) $7 \cdot 12,8$.

563. Leia korrutised:

$$1) 5 \frac{1}{9} \cdot 2 \frac{4}{7}; \quad 2) \frac{8}{11} \cdot \frac{11}{18} \text{ ja } 3) 5 \frac{1}{2} \cdot 8 \frac{1}{11}$$

kahel viisil: a) teisenda iga harilik murd kümnendmurruks ning ümarda tulemust; b) leia korrutis harilike murdude korrutamise teel ning teisenda tulemus kümnendmurruks.

Harilike murdude teisendamisel kümnendmurruks ümarda arvud esimeses ülesandes kümnendikeni, teises sajandikeni ja kolmandas tuhandikeni.

Võrdle mõlemal teel saadud korrutisi.

564. Kooli spordiväljakust oli ette nähtud katta muruga 5800 m^2 . Kui palju on selleks vaja muruseemet, arvestades ühele aarile $1,85 \text{ kg}$?

565. Sovhoosis on nisu all 1250 ha . Kui palju nisu saab sovhoos, kui loodetav saak on $18,5 \text{ ts hektarilt}$?

566. Tööliste brigaad töötas maantee parandamisel 132 tundi , korrastades keskmiselt 24 m maanteed tunnis. Mitu meetrit maanteed parandas see brigaad?

567. Põranda värvimiseks kulub $0,242 \text{ kg}$ värvi ruutmeetrile. Kui palju värvi on vaja 43 m^2 suuruse põranda värvimiseks?

568. Leia $18,5 \text{ m}^3$ kivisöe kaal, kui 1 m^3 kivisütt kaalub $1,3 \text{ t}$.

569. Kui palju kaalub $12,87 \text{ m}$ pikkune raudtala, mille jooksva meetri kaal on $60,4 \text{ kg}$?

570. Arvuta oma klassi põranda pindala.

571. Arvuta oma toa põranda pindala.

572. Veoauto koormasse mahub 1600 kg turvast. Kui palju turvast tuuakse kohale 19 koormaga?

573. Kaupluses oli 23 tükki vahariiet, igas tükis $23,0 \text{ m}$. Kui palju vahariiet oli selles kaupluses kokku?

574. Kui palju kaaluvad 36 kaubavagunit, kui ühe vaguni keskmine kaal koos kaubaga on $23,76 \text{ t}$?

575. Katusepleki tahvel kaalub $4,52 \text{ kg}$. Kui palju kaalub 50 sellist tahvlit?

576. Kahe punkti vaheline kaugus plaanil on $8,3 \text{ cm}$. Leia nende punktide vaheline tõeline kaugus, kui plaani mõõt on $1 : 250$.

577. Maatüki pindala plaani järgi on $3,3 \text{ cm}^2$. Leia selle maatüki tõeline pindala, kui 1 cm plaanil kujutab 50 m .

578. Pudeli kaalub $0,0475 \text{ kg}$. Kui palju kaaluvad 120 sellist pudelit?

LIGIKAUDSETE ARVUDE JAGAMINE.

579. Olgu vaja jagada ligikaudne arv 72,4 ligikaudse arvuga 0,13

$$72,4 : 0,13 = 7240 : 13 = 556,923 \dots$$

$$\begin{array}{r} 74 \\ 90 \\ 120 \\ 30 \\ 40 \\ 1 \end{array}$$

Kuna siin jagamine nähtavasti ei lõpe, siis on väga oluline teada, kui kaugele jagamist jätkata.

Küsimusele vastamiseks leiame otsitava jagatise alam- ja ülemtõkke.

Jagatis omandab väikseima väärtuse siis, kui jagatav on võimalikult väike ja jagaja võimalikult suur. Seetõttu jagatise alamtõkkeks on jagatava alamtõkke ja jagaja ülemtõkke jagatis:

$$72,35 : 0,135 = 535,9 \dots$$

Jagatise ülemtõkkeks on jagatava ülemtõkke ja jagaja alamtõkke jagatis:

$$72,45 : 0,125 = 579,6.$$

Võrdleme nüüd antud ligikaudsete arvude jagatist tema alam- ja ülemtõkkega.

Ligikaudsete arvude jagatis:	556,923 ...
Jagatise alamtõke:	535,9 ...
Jagatise ülemtõke:	579,6.

Näeme, et jagatistes on ühesugused ainult sajaliste numbrid (5). Kümneliste number on igas jagatises juba isesugune: 5, 3, 7. Seega tuleb jagatis ümardada kümnelisteni:

$$72,4 : 0,13 = 556,923 \dots \approx 560.$$

Mitu tüvenumbrit on jagatavas? Mitu jagajas? Mitme tüvenumbriga saime jagatise?

580. Eeltoodud näide kinnitab, et ligikaudsete arvude jagatise ümardamisel kehtib sama reegel, mis nende arvude korrutise ümardamiselgi:

ligikaudsete arvude jagatis tuleb ümardada nii, et jagatises oleks nii mitu tüvenumbrit, kui mitu neid on väiksema tüvenumbrite arvuga andmes.

581. Kontrolli selle reegli õigsust, jagades eelmise näite eeskujul arvu 4,3 arvuga 5,73, siis esimese arvu alamtõkke teise arvu ülemtõkkega ja lõpuks esimese arvu ülemtõkke teise arvu alamtõkkega. Mitu kohta tuleb jagatises säilitada?

582. Määra ilma jagamist teostamata, mitu tüvenumbrit saame vastavalt jagatise ümardamise eeskirjale järgmistes ligikaudsete arvude jagatistes:

a) $75 : 8$; b) $6,18 : 0,0013$; c) $90,3062 : 30,1$.

583. Ümarda järgmised ligikaudsete arvude jagatised vastavalt jagatise ümardamise eeskirjale.

a) $135 : 1,9 = 71,05 \dots \approx \dots$ b) $143,8 : 0,15 = 958,6 \dots \approx \dots$
c) $8,5 : 9 = 0,944 \dots \approx \dots$

584. Arvuta ligikaudsete arvude jagatis
 $0,3 : 6,374$

kahel viisil: 1) teostades jagamise arvudega antud kujul, 2) ümardades enne jagamist suurema tüvenumbrite arvuga arvu nii, et selleks oleks üks tüvenumber enam (varunumber) kui väiksema tüvenumbrite arvuga antud arvus.

Saadud jagatised ümardame jagatise ümardamise reegli kohaselt ja võrdleme tulemusi:

1) $0,3 : 6,374 = 300 : 6374 = 0,047 = 0,05$;

$$\begin{array}{r} 30\ 000 \\ - 25\ 496 \\ \hline 45\ 040 \\ - 44\ 618 \\ \hline 4220 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{r} 30\ 000 \\ - 25\ 496 \\ \hline 45\ 040 \\ - 44\ 618 \\ \hline 4220 \end{array}} \right\} 24 \text{ numbrit!}$$

2) $0,3 : 6,374 = 0,3 : 6,4 = 3 : 64 = 0,046 = 0,05$.

$$\begin{array}{r} 300 \\ 256 \\ \hline 440 \\ 384 \\ \hline 560 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{r} 300 \\ 256 \\ \hline 440 \\ 384 \\ \hline 560 \end{array}} \right\} 15 \text{ numbrit!}$$

Et tulemused on võrdsed ja teisel viisil arvutamine on tunduvalt lihtsam, siis on praktilisem arvutada teisel viisil, s. o.

enne jagamist ümardame suurema tüvenumbrite arvuga arvu varunumbrini.

Näiteid. 1) $38,593 : 8,7 = 38,6 : 8,7 = 4,43 = 4,4$.

2) $0,7 : 0,628 = 0,7 : 0,63 = 1,1 = 1$.

Rakenda seda arvutamist kergendavat võtet ligikaudsete arvude jagamisel.

585. Leia järgmised ligikaudsete arvude jagatised:

1) $18,63 : 0,8$	2) $4,28 : 0,7$	3) $822 : 76$	4) $341,3 : 12$
$382,6 : 36,8$	$4,8 : 0,284$	$8 : 34$	$5 : 22,5$

586. Ristküliku pindala on $15,12 \text{ cm}^2$. Ristküliku ühe külje pikkus on $3,6 \text{ cm}$. Leia teise külje pikkus.

587. Toa põranda pindala on $69,2 \text{ m}^2$. Kui suur peab olema selle toa kõrgus, et toas oleks 250 m^3 õhku?

588. Ristkülikukujuliselt põllult, mille pindala on 54 ha , saadi 834 ts nisu. Kui suur on keskmine niusaak hektarilt?

589. $32,7 \text{ m}$ pikkune traat on vaja jaotada 16 võrdseks tükiks. Leia iga tüki pikkus.

Siin arv $32,7 \text{ m}$ on ligikaudne arv, 16 aga täpne arv. Kuna $16 = 16,0 = 16,00 = 16,000$ jne., s. t. täpsel arvul võime kujutleda ükskõik kui mitu tüvenumbrit, siis määratakse jagatise tüvenumbrite arv ligikaudse andme tüvenumbrite arvu järgi.

$$32,7 \text{ m} : 16 = 2,044 \text{ m} \approx 2,04 \text{ m}$$

590. Teosta järgmised jagamised, kus üks arvudest on täpne arv (trükitud jämeda kirjaga).

1) $2,6 : 165$	2) $573 : 4,3$	3) $900 : 96$	4) $1,05 : 12$
$27 : 2,37$	$435 : 13$	$37,4 : 19$	$0,1 : 26$

591. Kahe linna vahemaa on 955 km . Mitme tunniga läbib selle vahemaa rong, kui selle keskmine kiirus on 52 km tunnis?

592. 83 ha suuruselt maa-alalt saadi 1430 t kartuleid. Kui suur on keskmine kartulisaak hektarilt?

593. Mitu vagunit on vaja 7500 t kauba veoks, kui kasutada 17 t kandejõuga vaguneid?

594. Ristkülikukujulise maatüki pindala on 19,45 ha. Selle maatüki laius on 230 m. Leia maatüki pikkus.

595. 1442 km raudteeliini ehitamine maksis 17 900 000 rubla. Leia raudtee ühe kilomeetri ehitamise hind.

596. Sovhoos eraldas 250 ha suuruse põllu väetamiseks 63,45 t mineraalväetist. Kui palju mineraalväetist tuleb külvata 1 hektarile?

597. Jalgrattur läbis 38,06 km 47,3 minutiga. Mitu kilomeetrit läbiks jalgrattur sellise kiirusega sõites ühe tunniga?

598. Rull traati kaalub 38,54 kg. Mitu meetrit traati on selles rullis, kui 1 m traati kaalub 0,528 kg?

599. Kui suur on tsemenditünni ruumala, kui tünn mahutab 0,106 t tsementi, 1 m³ tsementi kaalub aga 1,4 t?

600. Naftaveo tsistern mahutab 38,8 t naftat. Mitu sellist tsisterni on vaja 2138 t nafta veoks?

601. 1 cm³ pliid kaalub 11,3 g, 1 cm³ tina aga 7,3 g. Mitu korda on plii tinast raskem?

602. Klassi ruumala on 235,34 m³. Klassi põranda pindala on 48,3 m². Leia klassi kõrgus.

603. Heli levimiskiirus õhus on 333,3 m sekundis. Kui pika aja pärast on kuulda müristamist, kui välku lõi 8690 m kaugusel?

604. 94-st võrdse pikkusega veetorst saadi 762 m pikkune torustik. Kui pikk on iga toru?

605. Koolimaja ruumala on 24 986 m³. Selles koolis õpib ligikaudu 1100 õpilast. Mitu kuupmeetrit ehituse mahust tuleb iga õpilase kohta?

606. 25 ühesugust polti kaaluvad 7,82 kg. Kui raske on iga polt?

607. 50 ühesugust raamatut kaaluvad 21,32 kg. Kui raske on iga raamat?

ÜLESANDEID.

608. Lahendades ülesandeid, kus otsitava arvu leidmiseks on vaja sooritada mitu tehet, lisanduvad andmete vigadest tingitud vigadele veel vahepealsete tehete tulemuste ümardamisest tingitud vead.

Olgu vaja näiteks leida korrutiste summa

$$x = 3,6 \cdot 2,18 + 1,8 \cdot 3,74 + 2,4 \cdot 4,06 + 0,90 \cdot 8,61.$$

Arvutades vahepealseid tulemusi ümardamata, saame:

1) $3,6 \cdot 2,18 = 7,848;$	5) 7,848
2) $1,8 \cdot 3,74 = 6,732;$	6,732
3) $2,4 \cdot 4,06 = 9,744;$	9,744
4) $0,90 \cdot 8,61 = 7,749;$	7,749
	32,073 $\approx$ 32,1.

Ümardades aga iga vahepealse tehete tulemuse vastavalt reeglile, saame

$$7,8 + 6,7 + 9,7 + 7,7 = 31,9.$$

See tulemus erineb märgatavalt esimesest tulemusest (32,1).

Märgitud puudust saame vältida, kui ümardame vahepealsete tehete tulemused mitte selle järguni või tüvenumbrite arvuni, mida näevad ette tehete tulemuste ümardamise reeglid, vaid võtame igas vahepealses tulemuses ühe järgu või tüvenumbri rohkem. Sellise varunumbri säilitame kuni lõpptulemuse saamiseni, siis jätame selle ära, lõpptulemust vastavalt ümardades.

Arvutame eelmise ülesande tulemuste ühte varunumbrit kasutades:

7,85
6,73
9,74
7,75
32,07 $\approx$ 32,1.


Saime sama tulemuse mis ümardamata andmetega arvutades.

Seega enam kui ühetehtelise ülesande lahendamisel rakedame järgmist juhust:

vahepealsete tulemuste arvutamisel säilitame ühe varunumbri. Lõpptulemuses jätame selle varunumbri ära, tulemust vastavalt ümardades.


609. Kui palju kaalub kuusepuust palk, mille ristlõige on ristkülik mõõtmetega $168 \text{ mm} \times 113 \text{ mm}$, palgi pikkus aga $4,29 \text{ m}$ ja kui 1 dm^3 kuusepuud kaalub $0,5 \text{ kg}$?

610. Kui palju tuleb maksta plaanil (joon. 86) näidatud kahe toa põranda värvimise eest, kui 1 m^2 värvimine maksab $0,19 \text{ rubla}$?



Mõõt 1:250

Joon. 86.



Joon. 87.

611. Arvuta suhkrupeedisaak ristkülikukujuliselt põllult, mille pikkus plaanil (mõõdusuhe $1 : 10\,000$) on $2,5 \text{ cm}$ ja laius $1,2 \text{ cm}$, kui suhkrupeedisaak hektarilt on 550 ts .

612. Ruudukujulist metsalanki (joon. 87) läbib tee, mis jaotab selle langi kaheks mittevõrdseks osaks. Langi üks osa on teisest $526,5 \text{ a}$ võrra suurem. Kui see tee oleks aetud $40,5 \text{ m}$ võrra paremale, siis oleks ta langi poolitanud.

Kui suur on selle metsalangi pindala?

613. Tühi klaaskolb kaalub $24,8 \text{ g}$, veega täidetult $74,6 \text{ g}$, petrooleumiga täidetult aga $64,9 \text{ g}$. Arvuta nende andmete põhjal, kui palju kaalub 1 cm^3 petrooleumi.

614. Ristkülikukujuline tükk plekki kaalub 149,3 g. Selle plekitüki pikkus on 32,3 cm ja laius 12,7 cm. Mõõtmisel saadi selle plekitüki paksuseks $\frac{1}{2}$ mm. Leia plekitüki paksus arvutamise teel ja võrdle seda mõõtmise tulemusega, kui raua erikaal on 7,8.

615. Ristkülikukujuline vaskplaat kaeti ühelt küljelt niklikorraga. Enne nikeldamist kaalus see plaat 48,7 g, pärast nikeldamist aga 49,5 g. Plaadi pikkus on 11,3 cm ja laius 6,5 cm. Nikli erikaal on 8,9. Leia niklikihi paksus.

616. Vundamendikaevise pikkus on 7,3 m, laius 5,5 m ja sügavus 3,5 m. Mitu autokoormat mulda tuleb sealt ära vedada, kui on teada, et 1 m³ mulda kaalub 2,13 t ja auto kandejõud on 2,5 tonni?

617. Aia pikkus on 67,5 m ja laius 56,25 m. Mitu pange vett on vaja selle aia kastmiseks, kui maapinda tahetakse niisutada niisama tugevasti, nagu seda tegi vihmahoog, mis sadememõõtja järgi andis veekihi paksuseks 5,25 mm?

Pang mahutab 12,3 liitrit vett.

618. Tornis kõige kõrgemal asuvast aknast allavisatud kivi jõudis maapinnani 4 sekundiga. On teada, et vabalt langev keha läbib esimese sekundiga 4,9 m ja iga järgmise sekundiga 9,8 m võrra rohkem kui eelmises sekundis.

Leia selle torni kõrgus, kui torni tipuni on viimasest aknast veel 4 m.

619. Teosta tehted ligikaudsete arvudega:

- a) $(2500 + 46,12 - 11\,220 : 38) : 8$;
- b) $0,28 : (0,64 \cdot 0,843 + 0,78 \cdot 0,8 - 26,078 : 32,6)$;
- c) $(2,17 \cdot 4,3 + 3,07 : 0,3 - 7,8 \cdot 1,2) \cdot 0,8$;
- d) $(3,58 : 12 - 0,28) \cdot 8 + 0,028$;
- e) $(5,05 : 200) \cdot 63 - 0,4725$.

M ä r k u s. Jämedas kirjas on antud täpsed arvud.

620. Leia järgmiste avaldiste ligikaudne väärtus, teisendades harilikud murrud kümnendmurdudeks sajandikeni.

$$a) \frac{\left(7\frac{5}{6} - 6\frac{7}{8}\right) \cdot 13\frac{1}{3}}{3\frac{11}{12}};$$

$$b) \frac{7\frac{1}{3} + 8\frac{1}{6}}{5\frac{1}{2} - 1\frac{7}{12}} \cdot 10\frac{3}{7}.$$

621. Leia järgmiste avaldiste ligikaudne väärtus, teisendades harilikud murrud kümnendmurdudeks kahe kohaga murdosas (yiimane koht annab varunumbri).

$$a) \frac{3\frac{5}{6} + 1\frac{4}{9} - 2\frac{1}{2}}{\frac{3}{4} + \frac{2}{3}};$$

$$b) \frac{\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{3}\right) \cdot \frac{3}{4}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}.$$

622. Lennuk, mille kiirus on 270 km tunnis, peab lendama punktist A punkti B, mis asub lähtekohast põhja suunas 1250 km kaugusel, ning siis uuesti tagasi punkti A.

a) Leia, kui kaua kestab lend tuulevaikse ilmaga.

b) Kui kaua kestab lend lõunatuule puhul, mis puhub kiirusega 37,5 km tunnis?

623. Risttahukakujulise metallitüki pikkus on 0,14 m, laius 0,4 dm ja paksus 2 cm. See metallitükk kaalub 873,6 g. Teise samast metallist risttahukakujulise metallitüki mõõtmed on 0,09 m $\times$ 0,8 dm $\times$ 0,2 dm. Kui palju kaalub teine metallitükk?

624. Viljapeade noppimine pärast lõikust annab täiendavalt miljoneid tsentnereid teravilja. Kooliõpilased korjasid 125 ha suuruselt nisupõllult viljapäid, kusjuures igalt ruutmeetritlt leiti neid keskmiselt 4. Kui palju teravilja saadi õpilaste poolt kogutud viljapeadest, kui igas viljapeas olevate terade kaaluks arvata 1 g?

625. Toa pikkus on 8,4 m, laius 6,5 m ja kõrgus 4 m. Sellel toal on 3 akent, kõrgusega 1,64 m ja laiuks 1,2 m, ja kaks ust, mille kõrgus on 2 m 20 cm ja laius 1 m. Mitu rulli tapeeti on vaja osta selle toa tapeetamiseks, kui tapeedirulli laius on 50 cm ja tapeeti on rullis 12 m (kadudeks arvestada 10%)?

626. Viljasalve pikkus on 12 m ja laius 8 m. Vilja sügavus salves on 1,5 m. Selleks et teada saada, kui palju kaalub salves olev vili, võeti kast sisemiste mõõtmetega 0,5 m $\times$ 0,5 m $\times$ 0,4 m, täideti see ääreni viljaga ning kaaluti. Kastitaisi teri kaalus 80 kg.

Kui palju kaalub salves olev vili?

627. Katuse katmiseks kasutati ristkülikukujulisi katusekive, mille pikkus oli 25 cm ja laius 17 cm. Katus koosneb kahest ristkülikukujulisest osast, kummagi pikkus on 14 m ja laius 6,25 m. Kui palju kive on vaja selle katuse katmiseks, kui on teada, et katusekivide osaliselt üksteise peale asetamisel katab iga kivi katust 40% ulatuses kivi pindalast.

628. Nõu koos veega kaalus 68,4 kg. Kui sellest nõust kallati ära 78% seal olevast veest, siis kaalus nõu koos ülejäänud veega 28,3 kg. Kui palju kaalub tühi nõu?

629. Tühi nõu kaalub 15,2 g, elavhõbedaga täidetult aga 263 g. Leia selle nõu ruumala, kui on teada, et 1 cm³ elavhõbedat kaalub 13,6 g.

630. Kolhoosi 42 ha suuruselt nisupõllult saadi 15,2 hektarilt keskmiseks saagiks 20,3 ts hektarilt, ülejäänud osalt 13,1 ts hektarilt. Kui suur oli keskmine niusaak selle põllu igalt hektarilt?

631. Rong koosneb vedurist koos tendriga, mis kokku kaaluvad 76 t, ja 35-st kaubavagunist. Iga vagun koos kaubaga kaalub keskmiselt 23 t. Rong kulutab 1 km pikkuse tee läbimiseks rongikaalu iga tonni kohta 32 g kivisütt. Kui palju kivisütt peab vedur peale võtma sõiduks Tallinnast Tartusse, mille vahemaa on ligikaudu 200 km?

632. 1 m³ telliseid kaalub 1620 kg. Iga tellise mõõtmed on 27 cm × 13 cm × 6,5 cm. Kui palju kaalub 1000 tellist?

633. Pirita—Kose—Kloostrimetsa võidusõiduringraja pikkus on 6,7554 km. Sõitja läbis selle 3 minuti 27 sekundiga. Arvuta keskmise kiiruse alamtõke ja ülemtõke. Kas saab uskuda võistluse korraldajate teadet, et sõitja keskmine kiirus oli 117,485 km tunnis?

634. Käsitöötunnis valmistati plekist karp. Selleks kulus 60,0 dm² plekki. Pärast kasti valmimist selgus, et selle välispindala oli 52,5 dm². Mitu protsenti plekist läks jäätmeteks?

635. Õhk sisaldab ligikaudu 20% hapnikku ja 80% lämmastikku.

a) Mitu kuupmeetrit hapnikku sisaldab klassituba, mille ruumala on 245 m³?

b) Kui palju hapnikku leidub toas, mille pikkus on 4,2 m, laius 3,6 m ja kõrgus 2,5 m?

636. Kolhoosil on teravilja all 432,46 ha põldu, sellest nisu all 219,00 ha, rukki all 120,32 ha, odra all 46,30 ha, kaera all 29,21 ha ja herne all 17,63 ha. Mitu protsenti teravilja all olevast maast on iga nimetatud kultuuri all?


Märkus. Siin ja ka edaspidi anna protsentide arv täpsusega 0,1, kui pole eraldi nõutud teistsugust täpsust.

637. Meie maja õu on 329 m^2 ning seejuures 25% suurem naabermaja õuest. Kui suur on naabermaja õu?

638. Kauba taarakaal moodustab 6,3% kauba brutokaalust. Sama kauba netokaal on 75,2 kg. Kui palju kaalub see kaup koos taaraga?

639. a) Mitu protsenti moodustab joonisel 88 kujutatud kolmnurga pindala trapetsi pindalast?

b) Mitu protsenti moodustab joonisel 88 kujutatud trapetsi pindala kolmnurga pindalast?



Joon. 88.

640. Vedel metallisulam tõmbub jahtudes kokku. Terasevalu juures on see vähenemine 6,1%. Milline oli vedela metalli maht, kui jahtunult oli tema ruumala $9,63 \text{ dm}^3$?

641. Rukkiteradest saadakse keskmiselt 85% jahu ja 13% kliisid. Kui palju rukkijahu ja kliisid saadi ristkülikukujuliselt põllult koristatud rukkist, kui põllu pikkus on 480 m, laius 126 m ja hektarisaak keskmiselt 22 ts?

642. Suitsutamisel saadi 24,2 kilogrammist lihast 21,6 kg suitsuliha. Kui suur oli kaalukadu protsentides liha suitsutamisel?

643. Umbrohu vastu võitlemiseks kasutati $3 \frac{1}{2}$ kg keemilist umbrohutõrjevahendit, mis lahustati 200 l vees. Mitme protsendiline lahus saadi?

Märkus. Ära unusta, et lahuse kaalu moodustavad siin vee ja kemikaali raskus kokku.

644. Kartul kaotab laos hoidmisel 8,5% oma kaalust. Mitu tonni kartuleid saadi kevadel laost, kuhu sügisel pandi 240 tonni kartuleid?

645. Pronks on vase ja tina sulam. Kui palju vaske ja tina on vaja võtta 350 kg pronksi valmistamiseks, mis sisaldaks 94% vaske ja 6% tina?

646. Messing on vase ja tsingi sulam, mis sisaldab veel vähesel määral teisi metalle. Mitu kilogrammi vaske ja mitu kilogrammi tsinki on vaja võtta 120 kg messingi valmistamiseks, mis sisaldaks 69,5% vaske ja 29,5% tsinki?

647. Rauamaak sisaldab ligi 70% rauda. Kui palju rauamaaki on vaja võtta 2500 t raua saamiseks?

648. Mitu tonni vaske saab 538 t vasemaagist, mille vasesisaldus on ligikaudu 1,5%?

649. Veoautojuht sõitis uue veoautoga 135 290 km, siis anti auto kapitaalremonti. Norm nägi ette 80 000 kilomeetri läbimist kapitaalremondita. Mitme protsendi võrra ületas autojuht normi?

650. Sõiduautojuht sõitis oma autoga kapitaalremondita 128 390 km. Norm oli 75 000 km. Mitme protsendi võrra ületas sõiduautojuht plaani?

Kumb autojuht saavutas parema tulemuse (võrdle eelmise ülesandega)?

651. Lauda desinfitseerimiseks on vaja valmistada lahus desinfitseerivast vahendist ja veest. Desinfitseeriva vahendi hulk lahuses peab moodustama 2,5% lahuse üldkogusest (s. o. 2,5-prot-

sendiline lahus). Kui palju desinfitseerivat vahendit on vaja võtta 30 l lahuse jaoks? Kui palju vett on selleks vaja võtta?

652. Piimatööstus arvestab piima vastuvõtmisel selle rasvasisalduseks 3,5%. Kui majanditest toodud piim on kellest erineva rasvasisaldusega, siis leitakse piimakogus 3,5%-lise rasvasisalduse järgi.

Mitu kilogrammi piima arvestatakse kolhoosile, kes piimatööstusse saatis 2250 kg 4,1%-lise rasvasisaldusega piima?

KORDAMISEKS.

653. Kuidas leida ligikaudsete arvude

- a) summa ülemtõket? alamtõket?
- b) vahe ülemtõket? alamtõket?
- c) korrutise ülemtõket? alamtõket?
- d) jagatise ülemtõket? alamtõket?

654. Kuidas ümardatakse ligikaudsete arvude summat ja vahet?

655. Kuidas ümardatakse ligikaudsete arvude korrutist ja jagatist?

656. Millega võrdub kolmnurga pindala? ristküliku pindala? rõõpküliku pindala? trapetsi pindala? ruudu pindala?

657. Ristküliku külje ja diagonaali vaheline nurk on $27^{\circ}34'$. Kui suured on diagonaalidevahelised nurgad?

658. Võrdhaarse trapetsi ümbermõõt on 87 m ja haara pikkus on 16,4 m. Kui pikk on trapetsi kesklõik?

659. Leia arvude 120 ja 80 suurim ühistegur ja väikseim ühiskordne.

660. Lihtsusta avaldis

$$\left[\frac{2}{3a} - \frac{2}{a+b} \cdot \left(\frac{a+b}{3a} - a - b \right) \right] : \frac{a-b}{a}.$$

661. Lihtsusta avaldis

$$\left(\frac{a}{b} - \frac{b}{a} \right) : \left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a} - 2 \right) : \left(1 + \frac{b}{a} \right).$$

662. Lihtsusta avaldis

$$\frac{ab}{(a+b)^2} \cdot \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right).$$

663. Lihtsusta avaldis

$$\frac{ab}{a^2 - 2ab + b^2} \cdot \left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} \right).$$

664. Lahuta hulkliige tegureiks.

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1) $a^3 + 2a^2 + a$ | 2) $2a^3 - 4a^2 + 2a$ |
| 3) $a^4 + 2a^3 + a^2$ | 4) $a^3 + 4a^2 + 4a$ |
| 5) $a^3 + a^2b + ab^2 + b^3$ | 6) $a^4 + a$ |
| 7) $ab^2 - ac^2 - bc^2 + b^3$ | 8) $x^4 - x$ |
| 9) $24ax - 36ay + 14bx - 21by$ | 10) $8ax - 12bx - 20ay + 30by$ |

665. Arvuta, rakendades valemeid.

- | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 1) 82^2 | $4,1^2$ | $6,08^2$ | $(-1,08)^2$ | $(6\frac{1}{3})^2$ |
| 2) 79^2 | $8,3^2$ | $9,98^2$ | $(-8,97)^2$ | $(6\frac{1}{12})^2$ |
| 3) $99 \cdot 101$ | $95 \cdot 105$ | $89 \cdot 111$ | $6,5 \cdot 7,5$ | |
| 4) $98 \cdot 102$ | $91 \cdot 109$ | $87 \cdot 113$ | $41,2 \cdot 38,8$ | |
| 5) $576^2 - 424^2$ | $6,57^2 - 3,43^2$ | $19,86^2 - 0,14^2$ | | |
| 6) $693^2 - 307^2$ | $5,35^2 - 4,65^2$ | $3,75^2 - 6,25^2$ | | |

666. Mis arvu peab liitma avaldisega

$$25x^2 + 30x,$$

et saada kaksliikme ruut?

667. Mis arvu peab liitma kolmliikmega

$$16x^2 + 24x - 7,$$

et saada kaksliikme ruut?

668. Kui palju kasvab avaldise

$$6,25x^2 + 40x + 64$$

väärtus, kui x kasvab 4-st kuni 8-ni?

669. Mitme protsendi võrra muutub avaldise

$$8a^3 - 36a^2 + 54a - 27$$

väärtus, kui a väärtus kasvab 4-st kuni 5-ni?

Kas avaldise väärtus kasvab või kahaneb?

670. Mitu protsenti moodustab avaldise

$$a^2 + b^2$$

väärtus avaldise

$$(a + b)^2$$

väärtusest, kui $a = 5$ ja $b = 3$? kui $a = 10$ ja $b = 6$?

7. ARVUTUSLÜKATI.


LIHTNE ARVUTUSLÜKATI TÄISARVUDE LIITMISEKS.

671. Joonesta ruudulisele paberile arvtelg nagu joonisel 89. Lõika saadud joonis piki sirget pooleks. Saad kaks ühtlast skaalat. Nimetame üht neist skaalaks *A*, teist skaalaks *B*. Aseta skaalad *A* ja *B* teineteise kõrvale nii nagu joonisel 90. Skaalasid *A* ja *B* võib teineteise kõrvale edasi-tagasi nihutada. Sel viisil oled saanud lihtsa arvutuslükati täisarvude liitmiseks ja lahutamiseks. Et skaalasid *A* ja *B* oleks parem käsitseda, kleebi nad joonestuspaberile või kartongile.


Nimetame skaala kriipsu, mille juures on arv 1, nullkriipsuks.

Joonisel 90 on näidatud +9 ja +5 liitmine, joonisel 91 arvude +9 ja -7 liitmine ja joonisel 92 arvude -4 ja -6 liitmine lükati abil.


Kahe täisarvu liitmiseks võtame skaalal A ühe liidetava, seame sellega kohakuti skaala B nullkriipsu ja leiame siis skaalalt B teise liidetava. Summa loeme skaalalt A teise liidetava kohalt.




Joon. 89.



Joon. 90.



Joon. 91.



Joon. 92.

672. Leia omavalmistatud lihtsa lükati abil summa:

1) $(+12) + (+4)$

5) $(+11,5) + (+3,5)$

2) $(+15) + (-8)$

6) $(+9,5) + (-7,5)$

3) $(-2) + (-7)$

7) $(-8,5) + (+1,5)$

4) $(-11) + (-1)$


8) $(-6,5) + (-4,5)$

673. Kuna arvu lahutamine on samaväärne vastandarvu liitmisega, siis võimegi arvude lahutamist vaadelda liitmisenä.

Näiteks

$$(-8) - (-5) = (-8) + (+5) = -3.$$

Joonisel 93 on näidatud vahe $(-8) - (-5)$ leidmine lükati abil.



Joon. 93.

Leia lükati abil vahe:

1) $(+7) - (-4)$

5) $(+6,5) - (-3,5)$

2) $(-8) - (+2)$


6) $(-7,5) - (+2,5)$

3) $(-9) - (-7)$

7) $(-11,25) - (+1,25)$

4) $(+1) - (-10)$

8) $(-2,25) - (+7,75)$



Joon. 94.

TEMPERATUURI ÜMBERARVUTAMINE.

674. Mitmeks kraadiks on Celsiuse skaalal jaotatud jää sulamispunkti ja vee keemispunkti vahe?

Missugusel temperatuuril Celsiuse skaala järgi vesi jäätub? keeb?


675. Temperatuuri mõõtmisel kasutatakse ka Fahrenheiti skaalat. Sellel skaalal on jää sulamispunkti ja vee keemispunkti vahe jaotatud 180-ks kraadiks. Jää sulamistemperatuur on Fahrenheiti skaalal 32° (lühemalt 32° F), vee keemistemperatuur aga 212° F. Joonis 94 võimaldab üht ja sama temperatuuri väljendada nii Celsiuse kui ka Fahrenheiti kraadides. Näiteks $20^{\circ}\text{C} = 68^{\circ}\text{F}$, $50^{\circ}\text{F} = 10^{\circ}\text{C}$.

Täida lüngad.

- 1) $60^{\circ}\text{C} = \dots^{\circ}\text{F}$
- 2) $10^{\circ}\text{C} = \dots^{\circ}\text{F}$
- 3) $40^{\circ}\text{C} = \dots^{\circ}\text{F}$
- 4) $80^{\circ}\text{C} = \dots^{\circ}\text{F}$

- 5) $160^{\circ}\text{F} = \dots^{\circ}\text{C}$
- 6) $140^{\circ}\text{F} = \dots^{\circ}\text{C}$
- 7) $150^{\circ}\text{F} = \dots^{\circ}\text{C}$
- 8) $100^{\circ}\text{F} = \dots^{\circ}\text{C}$

ARVUDE LUGEMINE JA MÄRKIMINE SKAALAL.



Joon. 95.

676. 1) Joonisel 95 on kujutatud arvud mitteühtlasel skaalal. Et see skaala ei ole ühtlane, nähtub kriipsuvahedest, mis skaala lõpu poole pidevalt vähenevad.

Skaala alguses ja lõpus olevate numbrite 1 ja 2 vahel on pisut väiksemate numbritega kirjutatud arvud 1,1; 1,2; ...; 1,9.

Kui skaala alguskriips märgib arvu 1, siis sel korral märgib täht a arvu 1,1 ja täht b arvu 1,2.

Vahemikud 1 kuni 1,1, 1,1 kuni 1,2, ..., 1,9 kuni 2 on igaüks omakorda jaotatud kümneks osaks, kuid jaotuskriipsude juurde ei ole nendele vastavaid arve kirjutatud. Eeldusel, et alguskriips vastab arvule 1, märgib c arvu 1,15, d arvu 1,25 ja f arvu 1,04.

Mis arvusid märgivad sel eeldusel tähed $g, h, e, i, k, l, m, n, p$?

Vastused kirjuta nii: $g = 1,07$.

2) Näita pliiatsi terava otsaga joonisel 95 jaotuskriipsu, mis märgib arvu

1,02; 1,05; 1,12; 1,17; 1,35; 1,41; 1,56; 1,98.

3) Kui joonisel 95 skaala alguses ja lõpus olevad numbrid väljendavad vastavalt arve 10 ja 20, siis $a = 11$ ja $f = 10,4$.

Mis arve märgivad nüüd tähed $b, c, d, e, g, h, i, k, l, m, n, p$?

4) Kui joonisel 95 skaala algus- ja lõpunumbrid 1 ja 2 väljendavad vastavalt arve 100 ja 200, siis $a = 110$, $h = 136$ ja $f = 104$.

Mis arve märgivad sel korral tähed $b, c, d, e, g, i, k, l, m, n, p$?

5) Kui joonisel 95 skaala algus- ja lõpunumbrid 1 ja 2 väljendavad vastavalt arve 1000 ja 2000, siis $a = 1100$, $d = 1250$ ja $f = 1040$.

Mis arve märgivad nüüd tähed $b, c, e, g, h, i, k, l, m, n, p$?

6) Kui joonisel 95 skaala algus- ja lõpunumbrid 1 ja 2 väljendavad vastavalt arve 0,1 ja 0,2, siis

$a = 0,11$, $b = 0,12$ ja $f = 0,104$.

Mis arve märgivad sel korral tähed $c, d, e, g, h, i, k, l, m, n, p$?

7) Leia joonisel 95 kriips, mis märgib arvu


a) 10,2; 10,5; 11,2; 11,7; 13,5; 14,1; 15,6; 19,8.

b) 102; 105; 112; 117; 135; 141; 156; 198.

c) 1020; 1050; 1120; 1170; 1350; 1410; 1560; 1980.

d) 0,102; 0,105; 0,112; 0,117; 0,135; 0,141; 0,156; 0,198.

677. 1) Skaalal joonisel 96 on kujutatud arvud 2-st kuni 4-ni. Sellel skaalal näed kolmesuguse pikkusega kriipse. Kõige pikemaid neist on ainult kaks; need on joonisel märgitud tähtedega C ja E .



Joon. 96.

Kriips C on arvude 2 ja 3 kriipsude vahel ja märgib arvu 2,5.
Kriips E märgib arvu 3,5.

Lõigud kriipsude 2 ja 2,5, 2,5 ja 3, 3 ja 3,5 ning 3,5 ja 4 vahel on pikkuselt järgmiste lühemate kriipsudega jaotatud 5-ks osaks. Seega need kriipsud märgivad vastavalt arve 2,1 (kriips A), 2,2, 2,3, ..., 3,1 (kriips D), 3,2, ..., 3,8 ja 3,9.

Leia joonisel 96 kriips, mis märgib arvu

2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9;
3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9.

2) Lõigud kriipsude 2 ja 2,1, 2,1 ja 2,2, 2,2 ja 2,3, ..., 3,9 ja 4 vahel on kõige lühemate kriipsudega jaotatud 5 osaks. Seega märgivad kriipsud 2 ja 2,1 vahel vastavalt arve

2,02; 2,04; 2,06; 2,08.

Kriipsud arvude 2,3 ja 2,4 vahel märgivad vastavalt arve

2,32; 2,34 (kriips B); 2,36; 2,38.

Nagu näed, märgivad kõige lühemad kriipsud joonisel 96 paarisnumbriga lõppevaid kolmekohalisi arve 2 ja 4 vahel.

Loe 0,02 kaupa ja näita vastavaid kriipse joonisel 96:

- a) 2-st kuni 2,5-ni;
- b) 2,52-st kuni 3-ni;
- c) 3,02-st kuni 3,5-ni;
- d) 3,52-st kuni 4-ni.

678. 1) Joonisel 96 oleval skaalal tuleb kolmekohalised paa-
ritu numbriga lõppevad arvud 2 ja 4 vahelt võtta silma järgi kahe
kõrvuti seisva kriipsu vahelise lõigu keskelt. Näiteks c märgib arvu
2,22 (on arvude 2,22 ja 2,24 vahel).

Mis arvusid märgivad tähed d, e, g, i, k ?

2) Kui joonisel 96 skaala alguskriips märgib arvu 20 ja lõpu-
kriips arvu 40, siis

$$A = 21; B = 23,4; a = 21,2; c = 22,3.$$

Mis arvusid märgivad sel korral tähed $C, D, E, b, d, e, f, g, h, i,$
 j, k, l ?

3) Leia jooniselt 96 arvud

20,2; 20,3; 20,4; 20,5; 20,8; 20,9;
25,2; 25,3; 25,4; 25,5; 25,8; 25,9;
29,1; 29,2; 29,4; 29,5; 29,8; 29,9;
37,2; 37,4; 37,3; 37,5; 37,8; 37,9;
39,2; 39,3; 39,4; 39,5; 39,8; 39,9.

4) Kui joonisel 96 skaala alguskriips märgib arvu 200 ja lõpu-
kriips arvu 400, siis

$$A = 210; B = 234; a = 212; c = 223.$$

Mis arvusid märgivad sel korral tähed $C, D, E, b, d, e, f, g, h,$
 i, j, k, l ?

5) Leia jooniselt 96 arvud

202; 203; 204; 205; 208; 209;
252; 253; 254; 255; 258; 259;
291; 292; 294; 295; 298; 299;
372; 374; 373; 375; 378; 379;
392; 393; 394; 395; 398; 399.

6) Kui joonisel 96 skaala alguskriips märgib arvu 0,2 ja lõpu-
kriips arvu 0,4, siis

$$A = 0,21; B = 0,234; a = 0,212; c = 0,223.$$

Mis arvusid märgivad sel korral tähed $C, D, E, b, d, e, f, g, h,$
 i, j, k, l ?

4) Leia jooniselt 96 arvud

0,202; 0,204; 0,206; 0,208;
 0,201; 0,203; 0,205; 0,207;
 0,262; 0,264; 0,266; 0,268;
 0,261; 0,263; 0,265; 0,269;
 0,322; 0,324; 0,326; 0,328;
 0,381; 0,383; 0,385; 0,387.


679. 1) Joonisel 97 kujutatud skaalal on arvud 4-st kuni 10-ni. Lõigud arvude 4 ja 5, 5 ja 6, 6 ja 7, 7 ja 8, 8 ja 9 ning 9 ja 10 vahel on pikkuselt erinevate kriipsudega jaotatud osadeks. Pisut pikemad kriipsud jaotavad need lõigud 10-ks osaks. Seega vastab jaotuskriips *A* arvule 4,1 ja kriips *B* arvule 4,2. Kriips *C* märgib arvu 5,1, kriips *D* aga arvu 5,2.

Mis arvusid märgivad tähed *E, F, G, H, J, K, L, M, N*?

2) Leia jooniselt 97 kõik arvud 0,1-kaupa 6,7-st kuni 8,5-ni; 4,3-st kuni 5-ni; 5-st kuni 6-ni.

3) Nagu jooniselt 97 näed, on iga lõik, mis väljendab kümnendikku (lõik 4 ja 4,1 vahel, 4,1 ja 4,2 vahel jne.), jaotatud veel kaheks osaks, nii et sel teel saadud lõigu osa väljendab poolt kümnendikku ehk 0,05. Seega märgib täht *a* arvu 4,05, *b* arvu 4,15 ja *i* arvu 7,85.

Mis arvusid märgivad tähed *c, d, e, f, g, h, k*?



Joon. 97.

4) Loe ja näita jooniselt 97 kõik arvud 0,05-kaupa

4-st kuni 4,95-ni;	7,05-st kuni 7,95-ni;
5-st kuni 5,95-ni;	8,05-st kuni 8,95-ni;
6-st kuni 6,95-ni;	9,05-st kuni 9,95-ni.

5) Kui joonisel 97 skaala alguskriips märgib arvu 40 ja lõpu-kriips arvu 100, siis täht *A* märgib arvu 41, täht *B* arvu 42 ja täht *a* arvu 40,5.

Mis arvused märgivad sel korral tähed *C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, b, c, d, e, f, g, h, i, k*?

6) Kui joonisel 97 skaala alguskriips märgib arvu 400 ja lõpu-kriips arvu 1000, siis *A* märgib arvu 410, *B* arvu 420 ja *a* arvu 405.

Mis arvused märgivad nüüd tähed *C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, b, c, d, e, f, g, h, i, k*?

7) Loe ja näita jooniselt 97 kõik arvud 5-kaupa

400-st kuni 500-ni;	705-st kuni 800-ni;
505-st kuni 600-ni;	805-st kuni 900-ni;
605-st kuni 700-ni;	905-st kuni 995-ni.

8) Kui joonisel 97 skaala alguskriips märgib arvu 0,4 ja lõpu-kriips arvu 1, siis *A* märgib arvu 0,41, *B* arvu 0,42 ja *a* arvu 0,405.

Mis arvused märgivad sel korral tähed *C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, b, c, e, f, g, h, i, k*?

9) Loe ja näita jooniselt 97 kõik arvud 0,005-kaupa

0,405-st kuni 0,495-ni;	0,705-st kuni 0,795-ni;
0,505-st kuni 0,595-ni;	0,805-st kuni 0,895-ni;
0,605-st kuni 0,695-ni;	0,905-st kuni 0,995-ni.

680. 1) Pannes joonistel 95, 96 ja 97 kujutatud skaalad otsa-kuti kokku, saame joonisel 98 kujutatud skaala. Lõigates nüüd saadud joonise piki telge pooleks, saame kaks ühesugust skaalat, mida võib teineteise kõrval edasi-tagasi nihutada ja kasutada see-tõttu arvutuslükatina.

Nimetame ühte neist *C*-, teist *D*-skaalaks.

Tähendagu joonisel 98 skaala alguskriips arvu 1. Loe ja näita sellel skaalal kõik arvud

1-kaupa arvust 1 kuni arvuni 10;
0,1-kaupa arvust 1 kuni arvuni 4;
0,1-kaupa arvust 4 kuni arvuni 10;
0,01-kaupa arvust 1 kuni arvuni 2;
0,02-kaupa arvust 2 kuni arvuni 4;
0,05-kaupa arvust 4 kuni arvuni 10.

2) Tähendagu joonisel 98 skaala alguskriips arvu 10. Loe ja näita sel eeldusel skaalal kõik arvud

10-kaupa arvust 10 kuni arvuni 100;
1-kaupa arvust 10 kuni arvuni 40;
1-kaupa arvust 40 kuni arvuni 100;
0,1-kaupa arvust 10 kuni arvuni 20;
0,2-kaupa arvust 20 kuni arvuni 40;
0,5-kaupa arvust 40 kuni arvuni 100.

3) Tähendagu joonisel 98 skaala alguskriips arvu 0,1. Loe ja näita sel tingimusel skaalal kõik arvud

0,1-kaupa arvust 0,1 kuni arvuni 1;
0,01-kaupa arvust 0,1 kuni arvuni 0,4;
0,01-kaupa arvust 0,4 kuni arvuni 1;
0,001-kaupa arvust 0,1 kuni arvuni 0,2;
0,002-kaupa arvust 0,2 kuni arvuni 0,4;
0,05-kaupa arvust 0,4 kuni arvuni 1.

681. Et skaalasid C ja D oleks arvutamisel mugav teineteise suhtes nihutada, selleks on skaala C paigutatud **arvutuslükati** (joon. 99) **korpus**es edasi-tagasi nihutatava **keele** alumisele servale ja skaala D korpusse alumise poole ülemisele servale. Arvude märkimiseks neil skaaladel kasutame lükati **aknale** tehtud kriipsu, mida nimetame **märkijaks**.


Arvutuslükatil on mitu skaalat. Meie õpime esialgu kasutama ainult skaalasid C ja D ; neid nimetatakse **lükati põhiskaaladeks**.

Kui joonisel 99 kujutatud lükati keelel asuva skaala C alguskriips märgib arvu 1, siis akna kriipsuga ehk märkijaga on seal märgitud arv 1,4. Mis arvu näitab märkija skaalal D ?


682. Kui joonisel 99 skaala C alguskriips märgib arvu 10, siis akna kriips märgib arvu 14.

Märkigu skaala C alguskriips arvu 100. Mis arvu märgib siis kriips sellel skaalal?

Märkigu skaala C alguskriips vastavalt arvu 0,1; 0,01; 1000. Mis arvu märgib sellele vastavalt märkija skaalal C ?



Joon. 98.



Joon. 99.

683. Eelmisest ülesandest näeme, et kui skaala C alguskriips märgib arvu

...0,01; 0,1; 1; 10; 100 või 1000, ...,

siis akna kriips joonisel 99 märgib vastavalt sellel skaalal arvu

...0,014; 0,14; 1,4; 14; 140 või 1400, ...

Seega skaala C (ja samuti skaala D) iga kriips märgib kõiki arve, millel on ühed ja samad tüvenumbrid.

Skaaladel C ja D saame üldiselt märkida ja lugeda kolme tüvenumbriga arve.

Arvu, mille tüvenumbrid on 1, 4 ja 0, kirjutame nii:

1 — 4 — 0.

Seda loeme: «üks, neli, null».

Kui soovime ära märkida, et kõne all olev arv on skaalal C , siis kirjutame nõnda:

C — 1 — 4 — 0.

a) Kirjuta üles, missuguste tüvenumbritega arv skaalal D (joon. 99) on kohakuti arvuga C — 1 — 4 — 0.

b) Kirjuta üles, missuguste tüvenumbritega arv skaalal C on kohakuti arvuga D — 2 — 7 — 0 (joon. 99).

684. Märgi akna kriipsuga oma lükatil, mille keel on normaalasendis (s. o. skaalade C ja D alguskriipsud on kohakuti), arv ta tüvenumbrite järgi.

a) 1—1—0; 1—2—0; 1—3—0; 1—7—0; 1—8—0; 1—9—0;

b) 1—0—5; 1—1—5; 1—2—5; 1—7—5; 1—8—5; 1—9—5;

c) 1—0—1; 1—0—2; 1—0—3; 1—0—4; 1—7—1; 1—8—3;

d) 2—0—0; 3—0—0; 4—0—0; 2—1—0; 2—2—0; 3—8—0;

e) 2—0—2; 2—0—4; 2—0—6; 2—0—8; 3—0—2; 3—0—4;

f) 2—0—1; 2—0—3; 2—0—7; 2—0—9; 2—1—1; 2—6—5;

g) 3—0—0; 3—1—0; 3—2—0; 3—3—0; 3—8—0; 3—9—0;

h) 3—0—2; 3—0—4; 3—0—6; 3—0—8; 3—5—2; 3—9—6;

i) 2—3—1; 2—6—5; 2—9—7; 3—2—1; 3—7—1; 3—8—3;

k) 4—1—0; 4—2—0; 4—5—0; 5—1—0; 6—3—0; 8—2—0;

l) 4—0—5; 4—1—5; 5—2—5; 5—4—5; 7—1—5; 9—4—5;

m) 6—0—5; 6—1—0; 6—1—5; 6—2—0; 6—2—5; 6—3—0.

685. Lükatilt näed, et näiteks vahemik 4,0 kuni 4,1 on kaheks jaotatud. Jaotuskriips märgib arvu 4,05. Märgi see arv akna kriipsuga.

Arve 4,01; 4,02; 4,03; 4,04 peame märkima silma järgi, jaotades vahemiku 4,0 kuni 4,05 silma järgi viieks osaks. Analoomiliselt tuleb toimida kogu vahemiku ulatuses 4-st 10-ni, sest kogu selles vahemikus on iga kahe kõrvutioleva kriipsu vahe viis sajandikku.

Märgi lükatil arvud:

- a) 4,15; 4,16; 4,17; 4,18; 4,19; 4,20;
- b) 4,51; 4,52; 4,53; 4,54; 4,55; 4,56;
- c) 5,01; 5,02; 5,03; 5,04; 5,05; 5,06;
- d) 5,07; 5,08; 5,09; 5,10; 5,11; 5,12.

686. Märgi lükatil arvud, mille tüvenumbrid on:

- a) 5—2—1; 5—2—2; 5—2—3; 5—2—4; 5—2—5; 5—2—6;
- b) 5—2—7; 5—2—8; 5—2—9; 5—3—0; 5—3—1; 5—3—2;
- c) 7—5—0; 7—5—1; 7—5—2; 7—5—3; 7—5—4; 7—5—5;
- d) 8—7—0; 8—7—1; 8—7—2; 8—7—3; 8—7—4; 8—7—5.

687. Märgi lükatil arvud:

- a) 110; 120; 130; 170; 180; 190;
- b) 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7;
- c) 2,31; 2,65; 2,97; 3,21; 3,71; 3,83;
- d) 60,5; 61,0; 61,5; 62,0; 62,5; 63,0;
- e) 52,1; 52,2; 52,3; 52,4; 52,5; 52,6;
- f) 750; 751; 752; 753; 754; 755.

688. Koma koha määramiseks kasutame tulemuse ligikaudse hindamise võtet jämedalt ümardatud arvudega. See toimub peast ja tehakse nii, et andmed ümardatakse ühe tüvenumbriga arvudeks ning sooritatakse tehe ümardatud arvudega. Selliselt saame tulemuse ligikaudse väärtuse ühe või kahe tüvenumbriga, mis aitab otsustada tulemuse suurust.

Olgu näiteks teada, et korrutise

$$3,71 \cdot 4,35$$

tüvenumbrid on 1—6—1. Millega võrdub korrutis?

Tehes ligikaudse hinnangu, saame

$$3,71 \cdot 4,35 \approx 4 \cdot 4 = 16.$$

Seega $3,71 \cdot 4,35 = 16,1$.

Teine näide. Jagatise

$$108 : 4,81$$

tüvenumbrid on 2—2—5. Millega võrdub jagatis? Saame

$$108 : 4,81 \approx 100 : 5 = 20.$$

Seega $108 : 4,81 = 22,5$.

Korrutise $0,42 \cdot 92$ tüvenumbrid on 3—8—6. Millega võrdub korrutis?

Teades, et jagatise $1,05 : 5,55$ tüvenumbrid on 1—8—9, kirjuta, millega võrdub jagatis.

689. Kirjuta, millega võrdub korrutis, kui nurksulgudes korrutise järel on antud ta tüvenumbrid.

1. $2,64 \cdot 3,14$ [8—3—0]	2. $1,07 \cdot 44$ [4—7—1]
$57,3 \cdot 6,28$ [3—6—0]	$8,05 \cdot 1,2$ [9—6—5]
$3,6 \cdot 4,5$ [1—6—2]	$2,55 \cdot 3,1$ [7—9—0]
$33,2 \cdot 27$ [9—0—0]	$4,05 \cdot 1,06$ [4—3—0]
$36,3 \cdot 22$ [8—0—0]	$2,5 \cdot 3,06$ [7—6—5]
$5,8 \cdot 1,3$ [7—5—4]	$5,4 \cdot 6,3$ [3—4—0]
$1,1 \cdot 7,7$ [8—4—7]	$2,28 \cdot 5,45$ [1—2—4]
$2,72 \cdot 3,4$ [9—2—5]	$7,05 \cdot 4,85$ [3—4—2]


690. Kirjuta, millega võrdub jagatis, kui nurksulgudes jagatise järel on antud ta tüvenumbrid.

1. $6 : 4,8$ [1—2—5]	2. $3,4 : 7$ [4—8—5]
$7,4 : 5,6$ [1—3—2]	$6,2 : 8,4$ [7—4—0]
$3,8 : 2,9$ [1—3—1]	$5,2 : 7,8$ [6—6—5]
$5,3 : 3,9$ [1—3—6]	$1,6 : 9,2$ [1—7—4]
$4,05 : 1,82$ [2—2—2]	$3,34 : 4,35$ [7—6—8]
$2,66 : 2,44$ [1—0—9]	$3,74 : 7,15$ [5—2—3]
$3,22 : 1,23$ [2—6—2]	$5,75 : 6,05$ [9—5—0]
$5,55 : 3,2$ [1—7—4]	$1,11 : 8,15$ [1—3—6]

LÜKATI PÕHISKAALADE OMADUS.

691. Joonisel 100 on kujutatud skaalad C ja D skemaatiliselt niisuguses asendis, et arv 1 skaalal C on kohakuti arvuga 2 skaalal D . Arvude 1 ja 2 suhe on $\frac{1}{2}$. Nagu jooniselt 100 näed, on kõikide kohakuti seisvate arvude suhted võrdsed $\frac{1}{2}$ -ga:

$$\frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \frac{4}{8} = \frac{5}{10} = \dots$$



Joon. 100.

Seega on kohakuti seisvad arvud võrdelised, s. t. nende suhted on võrdsed.

Pane oma lükati keel nii, et skaalal C arv 3 oleks kohakuti skaala D arvuga 1. Näed, et kohakuti on veel arvud 4,5 ja 1,5, 6 ja 2, 7,5 ja 2,5 ning 9 ja 3. Ka need arvud on võrdelised, sest

$$\frac{4,5}{1,5} = \frac{6}{2} = \frac{7,5}{2,5} = \frac{9}{3} = 3.$$

Põhiskaalade igas asendis on kohakuti seisvad arvud võrdelised.

Olgu $C = 3$ ja $D = 1$ kohakuti. Vaata oma lükatil kohakuti seisvaid arve ja täida tabel:

C	3	3,3	4,2		5,1		6,3		7,8	8,7	
D	1	1,1		1,6		1,9		2,4	2,5		3,1

692. Kontrolli lükati abil, kas järgmises tabelis olevad suu-
sed x ja y on võrdelised.

x	3,6	45	50	7,5	0,6	5,85	12	13,5	21	14,8	13,5	67,5
y	4,8	60	66,5	10	0,8	7,2	16	18	28	19,7	18,5	86

VÖRDE TUNDMATU LIIKME LEIDMINE.

693. Võrde lahendamisel on meil tegemist kahe võrdse suh-
tega, kusjuures ühe suhte mõlemad liikmed on antud; teisest suh-
test on antud üks liige, teine liige on otsitav.

Otsitava liikme leidmiseks seame skaaladel C ja D kohakuti
selle suhte liikmed, mis on antud. Kui nüüd otsitavaks liikmeks on
võrde neljas liige, siis märgime märkijaga skaalal C võrde kol-
manda liikme. Märkija alt skaalal D leiame otsitava liikme.

Näiteid. Leia x võrdest


$$\frac{7,4}{3,7} = \frac{8,1}{x}.$$

Lahendus. Seame kohakuti $C = 7,4$ ja $D = 3,7$ (joon. 101).
Nüüd märgime märkijaga skaalal C arvu 8,1. Skaalal D näeme
märkija all otsitava arvu tüvenumbreid 4—0—5.

Koma koha määramiseks toimime nii: suhet $\frac{7,4}{3,7}$ hinnates
leiame, et see on 2. Seega x on ligikaudu 4.

Vastus. $x = 4,05$.

Kui otsitavaks on võrde kolmas liige, siis märgime märkijaga
skaalal D antud neljanda liikme. Märkija alt skaalal C leiame
otsitava.



Joon. 101.


Näide. Lahenda võrrde

$$\frac{41}{5,95} = \frac{x}{0,45}.$$

Lahendus. Seame kohakuti C — 41 ja D — 5,95 (joon. 102). Paneme märkija arvule D — 0,45. Märkija alt loeme otsitava arvu tüvenumbrid 3—1—0.

Hinnates antud suhet, saame $\frac{41}{5,95} \approx \frac{40}{6} \approx 7$. Seega x peab olema arvust 0,45 seitse korda suurem, s. t. $7 \cdot 0,45 \approx 7 \cdot 0,5 = 3,5$.

Vastus. $x = 3,10$.



Joon. 102.

Lahenda nende näidete eeskujul võrdded

$$\text{a) } \frac{8,2}{4,3} = \frac{9,25}{x}; \quad \text{b) } \frac{27,8}{3,64} = \frac{x}{3,24}.$$

Märkus. Skaaladel C ja D kohakuti seisvate arvude suhet võib vaadelda murruna, kusjuures suhte esimene liige on lugejaks, teine liige nimetajaks ning keele alumine serv murrujooneks.

694. Leia x võrdest

$$1) \frac{5}{8,2} = \frac{15}{x}; \quad 2) \frac{20}{32,3} = \frac{25}{x};$$

$$3) \frac{14,5}{20,8} = \frac{x}{41,5}; \quad 4) \frac{29,6}{42,5} = \frac{x}{6,05}.$$

695. Teades, et $4^{\circ}\text{R} = 5^{\circ}\text{C}$, täida alljärgnev tabel.

R	4	6	6,3	6,5	7,05	7,2					12,7	15,6		
C							2,8	30,2	40	41,7			36,8	61,2

KORRUTAMINE.

696. Lahenda lükati abil võrre

$$\frac{1}{2} = \frac{3}{x}.$$

Võrde põhiomaduse põhjal saad, et

$$x = 2 \cdot 3.$$

Seega annab selle võrde lahendamine korrutise $2 \cdot 3$.
Niisamuti võrde


$$\frac{1}{1,82} = \frac{2,75}{x}$$

lahendamine annab korrutise $1,82 \cdot 2,75$. Leia lükati abil see korrutis.


697. Ülesandest 696 järeldub, et kahe teguri korrutise leidmiseks lükatil toimime nii:

- 1) märgime skaalal D ühe teguri;
- 2) seame selle teguriga kohakuti skaala C alguskriipsu, s. o. arvu 1 (või lõpukriipsu, s. o. arvu 10);
- 3) märgime skaalal C teise teguri;
- 4) leiame märkija alt skaalal D otsitava korrutise.

Joonistel 103 ja 104 on skemaatiliselt näidatud korrutise $a \cdot b$ leidmine lükati abil.



Joon. 103.



Joon. 104.

698. Leia lükati abil korrutis:

a) $2,14 \cdot 17,3$

b) $7,25 \cdot 8,45$

699. Leia lükati abil korrutis ja võrdle tulemust vastusega.

1) $8,30 \cdot 7,25$

5) $1,74 \cdot 6,50$

2) $9,80 \cdot 19,0$

6) $1,29 \cdot 8,55$

3) $4,25 \cdot 7,20$

7) $5,05 \cdot 7,65$

4) $6,05 \cdot 8,10$

8) $4,75 \cdot 6,75$

Vastused. 1) 60,2. 2) 186. 3) 30,6. 4) 49. 5) 11,3. 6) 11,0.
7) 38,6. 8) 32,0.

700. Leia lükati abil korrutis, ja kontrolli tulemust ülesande lõpus antud tüvenumbrite järgi.

1) $2,08 \cdot 5,55$

5) $8,30 \cdot 33,0$

2) $3,38 \cdot 8,35$

6) $0,56 \cdot 0,84$

3) $6,05 \cdot 1,88$

7) $86 \cdot 113$

4) $12,2 \cdot 8,75$

8) $34 \cdot 0,58$

Korrutiste tüvenumbrid: 1) 1—1—5. 2) 2—8—2. 3) 1—1—4.
4) 1—0—7. 5) 2—7—4. 6) 4—7—0. 7) 9—7—2. 8) 1—9—
—7.

701. Leia lükati abil korrutised:

1) $52 \cdot 0,016$

2) $152 \cdot 0,42$

$0,63 \cdot 0,57$

$26 \cdot 4,6$

$31,6 \cdot 8,10$

$37,4 \cdot 0,64$

$0,21 \cdot 7,2$

$67 \cdot 17,2$

3) $4,2 \cdot 3,9$

4) $13,2 \cdot 5,60$

$5,6 \cdot 3,2$

$16,1 \cdot 1,10$

$4,75 \cdot 3,20$

$17,2 \cdot 0,495$

$6,7 \cdot 4,9$

$21,7 \cdot 0,875$

702. Leia korrutised:

1) $1,4 \cdot 2,7$

2) $3,2 \cdot 1,56$

$3,5 \cdot 3,6$

$7,81 \cdot 1,62$

$3,7 \cdot 1,5$

$32,4 \cdot 2,8$

$4,2 \cdot 5,6$

$1,87 \cdot 2,56$

$$\begin{aligned} 3) \quad & 3,47 \cdot 5,66 \\ & 0,47 \cdot 56,6 \\ & 8,75 \cdot 0,69 \\ & 0,42 \cdot 0,97 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4) \quad & 3,2 \cdot 5,6 \\ & 7,8 \cdot 1,45 \\ & 6,42 \cdot 34,5 \\ & 4,8 \cdot 0,75 \end{aligned}$$

703. Leia korrutised, teades, et tegurid on ligikaudsed arvud.

$$\begin{aligned} 1) \quad & 3,2 \cdot 4,1 \\ & 3,4 \cdot 1,5 \\ & 2,3 \cdot 4,7 \\ & 3,0 \cdot 1,5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad & 4,70 \cdot 2,10 \\ & 0,3 \cdot 12,5 \\ & 0,30 \cdot 12,5 \\ & 0,300 \cdot 12,5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3) \quad & 3,2 \cdot 4,73 \\ & 1,1 \cdot 10,6 \\ & 3,5 \cdot 4,10 \\ & 0,755 \cdot 81 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4) \quad & 4,7 \cdot 5,1 \\ & 0,22 \cdot 8,9 \\ & 13,8 \cdot 4,2 \\ & 0,86 \cdot 162 \end{aligned}$$

704. Üks tellis kaalub 3,6 kg. Kui palju kaaluvad 12; 15; 17; 19; 21; 25; 37; 42; 56; 62 tellist?

705. Klassi pikkus on 7,8 m ja laius 6,2 m. Kui suur on klassi põranda pindala?

706. Traktor künnab 1 tunniga 0,22 ha kesa. Kui palju künnab see traktor 7,67 tunniga?

707. Meeter riiet maksab 2,75 rbl. Kui palju maksab 0,75; 3,25; 4,2; 5,6; 6,45 meetrit seda riiet?

PROTSENTIDE LEIDMINE.

708. Protsentide leidmine antud arvust toimub korrumtamise teel. Näiteks 47,5% arvust 63,2 leitakse nii:

$$47,5\% \cdot 63,2 = 0,475 \cdot 63,2 = 30.$$

Leia lükati abil 25% arvust 72.

709. Leia lükati abil:

$$\begin{aligned} 1) \quad & 72\% \quad 85\text{-st} \\ & 35\% \quad 42\text{-st} \\ & 25\% \quad 48\text{-st} \\ & 12\% \quad 22\text{-st} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad & 67\% \quad 95\text{-st} \\ & 87,5\% \quad 129\text{-st} \\ & 92\% \quad 335\text{-st} \\ & 13,5\% \quad 47\text{-st} \end{aligned}$$

JAGAMINE.

710. Lahenda lükati abil võrre

$$\frac{8}{4} = \frac{x}{1}.$$

Lahendades selle võrde võrrandi abil, saad:

$$4x = 8, \quad x = \frac{8}{4}.$$

Seega tuleb selle võrde lahendamiseks leida jagatis $8:4$.

Leia võrde

$$\frac{12}{4} = \frac{x}{1}$$


lahendamise teel jagatis $\frac{12}{4}$.

711. Leia eelneva eeskujul jagatis $69,4:2,46$. (Vastus. 28,2).


712. Ülesannetest 710 ja 711 järeldub, et kahe arvu jagatise leidmiseks lükati abil toimimine järgmiselt:

- 1) *märgime jagaja skaalal D;*
- 2) *seame jagajaga kohakuti jagatava skaalal C;*
- 3) *leiame skaala D alguskriipsu, s. o. arvu 1 (või lõpukriipsu, s. o. arvu 10) kohalt skaalal C jagatise.*

Joonisel 105 ja 106 on skemaatiliselt näidatud jagatise $a:b$ leidmine lükati abil.



Joon. 105.



Joon. 106.

Leia lükati abil jagatis:

a) $9,35 : 2,32$

b) $44 : 7,8$

713. Arvuta lükati abil jagatis ja võrdle tulemust vastusega.

1) $19,5 : 3,86$

5) $6,1 : 2,91$

2) $3,06 : 5,15$

6) $9,8 : 6,7$

3) $16,2 : 4,5$

7) $2,22 : 1,14$

4) $4,4 : 2,1$

8) $5,45 : 4,15$

Vastused. 1) 5,05. 2) 0,595. 3) 3,6. 4) 2,1. 5) 2,1. 6) 1,46.
7) 1,86. 8) 1,31.

714. Arvuta lükati abil ligikaudsäte arvude jagatis.

1) $8,35 : 5,6$

2) $7,05 : 2,46$

$7,20 : 2,04$

$8,15 : 4,05$

$2,08 : 1,45$

$2,88 : 2,36$

$3,38 : 1,83$

$6,05 : 1,05$

3) $4,6 : 3,02$

4) $2,22 : 4,25$

$1,64 : 3,1$

$7,05 : 9,9$

$2,88 : 5,8$

$3,82 : 4,35$

$4,9 : 9,15$

$4,15 : 6,65$

715. Ristküliku pindala on $32,5 \text{ dm}^2$. Leia ristküliku alus, kui kõrgus on $5,2 \text{ dm}$.

716. Kui kõrge peab olema $8,5 \text{ dm}^2$ suuruse põhjaga risttahukas, et selle ruumala oleks $56,5$; $13,3$; $45,2$; $56,8$; $62,4$ kuupdetsimeetrit?

717. Saadeti jalgrattaid kaalus $2,25$ tonni. Mitu jalgratast seal oli, kui üks jalgratas kaalub keskmiselt $0,018$ tonni?

718. Mitmelt hektarilt saadi 861 ts kartuleid, kui keskmine saak hektarilt oli 182 ts?

ARVU LEIDMINE TEMA PROTSENTIDES ANTUD OSA JÄRGI.

719. Arvu leidmine tema protsentides antud osa järgi toimub jagamise teel. Olgu näiteks teada, et 34,5% mingist arvust on 68,5. Siis otsitav arv on

$$68,5 : 34,5\% = 68,5 : 0,345.$$

Lükatil leiame, et jagatise tüvenumbrid on 1—9—8. Et $68,5 : 0,345 \approx 70 : 0,3 \approx 200$, siis $68,5 : 0,345 = 198$.

Leia lükati abil arv, millest 32% on 17,5.

720. Leia arv, millest

1) 64% on 16

48% on 72

68% on 0,65

2,5% on 25

2) 3,1% on 93

6,8% on 13,6

1,8% on 90

8% on 2,4

721. Tööline maksab korteri eest üüri 1,44 rubla kuus. See moodustab 1,8% tema kuupalgast. Kui suur on selle töölise kuu-palk?

722. Maak sisaldab 66,7% rauda. Kui palju maaki on tarvis 2,5 tonni raua saamiseks?

723. Pärast seda, kui 7,2% sõest oli ära tarvitatud, oli sütt veel järel 232 tonni. Mitu tonni sütt oli ära kulutatud?

724. Kui masina hinda alandati 5,2% võrra, siis selle hind vähenes 182 rubla võrra. Kui palju maksis masin enne hinnaalandust?

KAHE ARVU SUHE PROTSENTIDES.

725. Kolhoosil on 960 ha maad, sellest põllumaad 912 ha. Mitu protsenti kolhoosi maast on põldude all?

L a h e n d u s. $912 : 960 = 0,955 = 95,5\%$.

Leia, mitu protsenti on 3,4 10,5-st.

726. Mitu protsenti on

1) 2 6-st?
5 20-st?
9 45-st?
6 25-st?

2) 8 17,5-st?
8,75 15-st?
5,3 80-st?
2,25 32-st?

727. Kooliõpilased panid idanema 60 peediseemet, millest idanes 57. Mitu protsenti idanes?

728. 400-st rukkiterast idanes 392 tera. Mitu protsenti rukkiteradest idanes?

729. Kauba brutokaal on 120 kg, netokaal 98 kg. Mitu protsenti moodustab taarakaal brutokaalust?

730. Klassis on 36 õpilast. Ühel päeval puudus klassist 4 õpilast. Mitu protsenti õpilastest puudus sel päeval klassist?

731. Noorte tehnikute ringi liikmete arv kasvas 98-lt 125-ni. Mitme protsenti võrra kasvas ringi liikmete arv?

8. RINGJOON. SILINDER. KOONUS. KERA.

LÕIGU KESKRISTSIRGE.

732. a) Poolita vabalt võetud lõik sirkli ja joonlaua abil.

Selle ülesande lahendamisel kasutatakse sirget, mis on risti võetud lõiguga ja poolitab seda.

Sirget, mis on risti antud lõiguga ja poolitab seda, nimetatakse lõigu keskristsirgeks.


b) Kui palju on sirgeid, mis poolitavad antud lõigu? Kui palju on lõigul keskristsirgeid?

733. Tõesta, et

lõigu keskristsirge iga punkt asetseb lõigu otspunktidest võrdsetel kaugustel.

Tõestuseks võta lõigu AB keskristsirgel MP mingi punkt, näiteks P (joon. 107), ühenda see lõigu otspunktidega ja näita, et tekkinud kolmnurgad AMP ja BMP on võrdsed. Kuidas sellest järeldub tõestatav väide?

734. a) Kui arv lõpeb 5-ga, siis ta jagub 5-ga. Kas sellest, et arv jagub 5-ga, järeldub, et ta lõpeb 5-ga? Too näiteid 5-ga jaguvaist arvudest, mis ei lõpe 5-ga.



Joon. 107.

b) Kas sellest, et punkt on lõigu otspunktidest võrdsetel kaugustel, järeldub, et ta asetseb lõigu keskristsirgel? Näitame, et järeldub. Selleks oletame, et punkt B (joon. 107) on lõigu AB otspunktidest A ja B võrdsetel kaugustel, s. t. kolmnurk ABP on võrdhaarne. Ühendades selle aluse keskpunkti M kolmnurga tipuga P, saame võrdhaarse kolmnurga aluse mediaani. Kuid võrdhaarses kolmnurgas aluse mediaan on ühtlasi kolmnurga kõrgus, tähendab MP on risti alusega AB ja seega punkt P asetseb lõigu AB keskristsirgel.


Niisiis, ainult lõigu keskristsirgel asetsev punkt on lõigu otspunktidest võrdsetel kaugustel.

RINGJOON.

735. Kui punkt, ütleme A, liigub tasapinnal nii, et ta jääb antud punktist O antud kaugusele r , siis ta kujundab ringjoone, mille keskpunktiks on O ja raadiuseks r (joon. 108). See näitab, et

ringjooneks nimetatakse joont, millel asetsevad tasapinna kõik need punktid, mis on sama tasapinna ühest antud punktist ühel ja samal kaugusel.


Mida nimetatakse ringjoone kõõluks (DE joonisel 108), mida diameetriks (BC joonisel 108)?




Joon. 108.

736. Ringjoon läbib punkte A ja B (joon. 109). Mis on lõik AB selle ringjoone suhtes? Kuidas asetseb ringi keskpunkt O kõõlu otspunktide suhtes? Põhjenda väidet, et

kõõlu keskristsirge läbib ringjoone keskpunkti.



Joon. 109.



Joon. 110.

737. Joonis 110 kujutab ringjoont koos kõõluga AB ja selle kõõluga ristuva diameetriga CD . Tõesta teoreem:

kõõluga ristuv diameeter poolitab kõõlu ja selle otspunkte ühendavad kaared.

Mis on siin eelduseks, mis väiteks? Tõestuseks näita, mis juhtub joonise pooltega, kui joonis mööda sirget CD kokku murda.

738. Olgu antud, et diameeter DC joonisel 110 poolitab kõõlu AB . Kuidas siis see diameeter asetseb kõõlu AB suhtes?

739. On antud lõik $AB = 4$ cm. Joonesta viis ringjoont, millele see lõik on ühiseks kõõluks ja mille raadiused on vastavalt 3 cm, 3 cm, 2,5 cm, 2,5 cm ja 2 cm.

740. Joonesta ringjoon, mis läbib kaht antud punkti ja mille keskpunkt asetseb antud sirgel. Millal sel ülesandel lahend puudub?

KOLMNURGA ÜMBERRINGJOON.

741. Joonesta mingi ringjoon, võta sellel kolm punkti ja ühenda need nii, et saaksid kolmnurga. Mis on selle kolmnurga küljed ringjoone suhtes?


Kolmnurka, mille tipud asetsevad ringjoonel, nimetatakse kõõlkolmnurgaks. Ringjoont, mis läbib kolmnurga tippe, nimetatakse kolmnurga ümberringjooneks.

Kõõlkolmnurga kohta öeldakse, et ta on joonestatud ringjoone sisse. Kolmnurga ümberringjoone kohta öeldakse, et ta on joonestatud kolmnurga ümber.

742. Kuidas defineerida kõõlnelinurka? üldiselt kõõlhulknurka? Joonesta mingi kõõlviisnurk.

743. Tõestame, et iga kolmnurga saab teha kõõlkolmnurgaks, s. t. tema ümber saab joonestada ringjoone. Selleks tõestame, et kolmnurga külgede keskristsirged lõikuvad kõik ühes ja samas punktis, mis on selle kolmnurga ümberringjoone keskpunktiks.

Joonestame kolmnurga ABC kahele küljele, näiteks külgedele AB ja BC , keskristsirged (joon. 111). Olgu nende keskristsirgete lõikepunkt K . Siis $AK = BK$ (miks?) ja $BK = CK$ (miks?), järelikult ka $AK = CK$. See võrdus näitab, et kolmnurga kahe külje AB ja BC keskristsirgete FK ja DK lõikepunkt K asetseb ka kol-



Joon. 111.

manda külje AC keskristsirgel, sest ta on selle külje otspunktidest võrdsetel kaugustel. Seega kõik kolm keskristsirget lõikuvad ühes ja samas punktis K, mida oligi vaja tõestada. See punkt, asetledes kolmnurga tippudest võrdsetel kaugustel, on neid tippe läbiva ringjoone keskpunktiks. Et kolmnurga külgede keskristsirged alati lõikuvad ja ainult ühes punktis, siis igal kolmnurgal leidub ümberringjoon.

744. Eelmisest teoreemist järeldub, et

läbi kolme punkti, mis ei asetse ühel ja samal sirgel, läheb üks ja ainult üks ringjoon.

Võta kolm punkti, mis ei asetse ühel sirgel, ja joonesta neid punkte läbiv ringjoon.

745. Joonisel on antud ringjoon, kuid ilma keskpunktita. Kuidas leida keskpunkt?


746. a) Joonesta ümberringjoon täisnurksele kolmnurgale, mille hüpotenuus on 5 cm ja üks kaatet on 4 cm. Kui pikk on selle ringjoone raadius?

b) Näita, et täisnurkse kolmnurga hüpotenuusi keskpunkt on tema ümberringjoone keskpunktiks.

747. Joonesta nürinurkne kolmnurk koos ümberringjoonega. Kas selle ringjoone keskpunkt asetseb kolmnurga sees või väljaspool kolmnurka?

748. Ehita võrdhaarne kolmnurk, mille tipunurk on 120° ja haar 5 cm. Joonesta kolmnurga ümberringjoon. Kui pikk on selle ringjoone raadius?

749. Joonesta võrdkülgne kolmnurk, mille ümberringjoone raadius on 4 cm. Kui pikk on selle kolmnurga apoteem? Kui suur on kolmnurga kõrgus?




Joon. 112.

750. Joonis 112 kujutab ringi segmenti. Millega on piiratud segment? Kuidas joonestamise teel leida segmendi kaare raadiust?


751. Ummargusest esemest on säilinud joonisel 113 kujutatud tükike. Kuidas teha kindlaks eseme läbimõõtu?

752. a) Joonesta mingi «kuusirp» (joon. 114), mida piiravad võrdsete raadiustega kaared.

b) Joonesta mingi «kuusirp» (joon. 114), mida piiravad mittevõrdsete raadiustega kaared.




Joon. 113.



Joon. 114.

KOLMNURGA KÕRGUSTE LÕIKUMINE.


753. Joonesta mingi teravnurkne kolmnurk KLM ja selle külgede kolm keskristsirget. Need lõikuvad teatavasti ühes ja samas



Joon. 115.

punktis, ütleme O . Joonesta nüüd kolmnurk ABC , mille tippudeks on antud kolmnurga külgede keskpunktid (joon. 115). Mis on kolmnurga ABC küljed kolmnurga KLM suhtes? Näita, et kolmnurga KLM külgede keskristsirged on vastavalt risti kolmnurga ABC külgedega. Mis sellest järeldub kolmnurga ABC kõrguste lõikumise kohta?

754. Lahenda eelmine ülesanne veel kord, võttes kolmnurgaks KLM nürinurkse kolmnurga (joon. 116).



Joon. 116.

755. Kuidas saab valmistada jooniseid 115 ja 116 alates kolmnurgast ABC ? Mis on kolmnurga ABC kõrgused AD , BE ja CF kolmnurga KLM külgede suhtes? Mis sellest järeldub kolmnurga ABC kõrguste kohta?

Kolmnurga kõrgused või nende pikendused lõikuvad kõik ühes ja samas punktis.

756. Mis on kõrguste lõikepunktiks täisnurksel kolmnurgal?

757. Millega võrdub kolmnurga pindala? Põhjenda väidet, et igas kolmnurgas

$$ah_a = bh_b = ch_c,$$

kus a , b , c on kolmnurga külgede pikkused ja h_a , h_b , h_c on vastavalt nendele külgedele joonestatud kõrgused.

758. Kolmnurga kül $a = 4,8$ m ja $c = 6,2$ m. Kolmnurga kõrgus $h_c = 3,6$ m. Arvuta küljele a joonestatud kõrgus.

759. Kolmnurga pindala on $24,5$ a ja üks kül 35 m. Kui pikk on sellele küljele joonestatud kõrgus?

760. Võrdhaarse kolmnurga alus on 6 cm ja haar 5 cm. Joonesta kolmnurk, mõõda alusele joonestatud kõrgus, arvuta pindala ja selle põhjal haarale joonestatud kõrgus. Kontrolli tulemust otsese mõõtmisega.

PUNKTI JA RINGJOONE VASTASTIKUNE ASEND.

761. Tasapinnal on ringjoon keskpunktiga O ja raadiusega 3 cm. Otsusta, kas tasapinna punkt M asetseb seespool ringjoont, ringjoonel või väljaspool ringjoont, kui

$$OM = 5 \text{ cm}; \quad OM = 2,5 \text{ cm}; \quad OM = 3 \text{ cm}.$$

762. Tee joonis järgmise lause selgitamiseks.

Punkt asetseb seespool ringjoont, ringjoonel või väljaspool ringjoont vastavalt sellele, kas punkti kaugus ringjoone keskpunktist on väiksem kui raadius, võrdne raadiusega või suurem kui raadius.

763. a) Väljaspool ringjoont asetsevast punktist on ringjoone lähima punktini 5 cm ja kaugeima punktini 12 cm. Kui pikk on raadius?

b) Seespool ringjoont asetsevast punktist on ringjoone lähima punktini 3 cm ja kaugeima punktini 6 cm. Kui kaugel asetseb punkt ringjoone keskpunktist?

764. a) On antud ringjoon ja väljaspool seda punkt. Leia ringjoone punktid, mis asetsevad antud punktist niisama kaugel, nagu see punkt on ringjoone keskpunktist. Kas ülesandel leidub alati lahend?

b) Lahenda eelmine ülesanne juhul, kui antud punkt on seespool ringjoont.

SIRGE JA RINGJOONE VASTASTIKUNE ASEND.

765. a) Joonesta ringjoon ja selle mingi kõõl. Pikenda seda kõõlu üle mõlema otspunkti. Mitu ühist punkti on saadud sirgel ringjoonega?


Sirget, millel on ringjoonega kaks ühist punkti, nimetatakse ringjoone lõikajaks.

b) Joonesta ringjoon ja selle mingi lõikaja. Leia lõikaja kaugus ringjoone keskpunktist ja võrdle seda raadiusega. Põhjenda ilma mõõtmiseta, et

ringjoone lõikaja kaugus ringjoone keskpunktist on väiksem kui raadius.

Näpunäide. Kasuta teoreemi ülesandest 344.

766. Saab näidata, et mõnel sirgel on ringjoonega ainult üks ühine punkt. Niisuguse sirge saamiseks joonest ringjoone mingi raadiuse OA otspunktist A raadiusele ristsirge t (joon. 117). Tõesta, et sirgel t on ringjoonega ainult üks ühine punkt, nimelt punkt A .



Joon. 117.

Tõestuseks võta sirgel t mingi muu punkt (mitte A), näiteks punkt B , ühenda see punktiga O ja näita, et võetud punkti kaugus ringjoone keskpunktist on suurem kui raadius. Mis sellest järeldub punkti B asukoha kohta? Kus asetsevad siis sirge t kõik punktid, välja arvatud punkt A ?

Sirget, millel on ringjoonega ainult üks ühine punkt, nimetatakse ringjoone puutujaks. Seda ühist punkti nimetatakse puutepunktiks. Ringjoone puutuja on risti puutepunktist lähtuva raadiusega.

Puutuja ehitamiseks ringjoonele selle mingis punktis peame meeles, et

raadiusega ristuv sirge, mis läbib raadiuse otspunkti ringjoonel, on ringjoone puutuja.


767. Joonesta vabalt võetud ringjoonele puutuja ringjoone mingis punktis A .

768. Kuidas leida sirge kaugust punktist? Kuidas leida puutuja kaugust ringjoone keskpunktist? Näita, et puutuja kaugus ringi keskpunktist võrdub raadiusega.


769. Mida võib öelda sirgest, kui on teada, et tema kaugus ringjoone keskpunktist a) on väiksem kui raadius, b) võrdub raadiusega, c) on suurem kui raadius?

770. Joonesta vabalt võetud raadiusega r ringjoon ja kolm üksteisega paralleelset sirget nii, et nende kaugused ringi keskpunktist on vastavalt $0,5r$, r ja $1,5r$. Näita, et äärmiste sirgete vaheline kaugus võib olla r , $2r$ või $2,5r$.

771. a) Mis saab väljaspool ringjoont asetsevast sirgest α joonisel 118, kui ta liigub nooltega näidatud suunas?



Joon. 118.



Joon. 119.

b) Mis saab lõikajast AB joonisel 119, kui seda lõikajat pöörata tema lõikepunkti A ümber, kuni teine lõikepunkt B ühtib lõikepunktiga A ?

772. Ehita antud raadiusega ringjoon, mis läbib antud punkti ja mille keskpunkt asetseb antud sirgel. Millal on sel ülesandel üks lahend, millal kaks lahendit, millal lahend puudub?


773. a) Joonesta antud keskpunktiga ringjoon, mis puudutab antud sirget.

b) Joonesta ringjoon, mis läbib antud punkti A ja puudutab antud sirget selle antud punktis B .

774. a) Joonesta puutuja, kui on antud ringjoone keskpunkt ja puutepunkt.

b) Joonesta antud ringjoonele puutujad tema ühe ja sama diameetri otspunktidest. Kuidas asetsevad need puutujad teineteise suhtes? Miks?

775. Ringjoonele on joonestatud kaks lõikuvat puutujat (joon. 120). Arvuta nende puutujate vahelise nurga suurus, kui puutepunktidesse tõmmatud raadiuste vaheline nurk on 112° .



Joon. 120.

Näita, et

puutujatevahelise nurga ja puutepunktidesse tõmmatud raadiuste vahelise nurga summa on sirgennurk.

776. a) Olgu ringjoonele joonestatud kaks lõikuvat puutujat AC ja BC (joon. 120).

Tõesta, et $AC = BC$, s. t.

puutujate lõigud nende lõikepunktist puutepunktideni on võrdsed.


Näpunäide. Ühenda punktid O ja C ning vaata kolmnurki AOC ja BOC (joon. 120).

b) Mis on kiir CO joonisel 120 nurga ACB suhtes? Põhjenda väidet, et

puutujatevahelise nurga poolitaja läbib ringjoone keskpunkti.

777. Joonesta antud ringjoonele puutujad läbi punkti, mis on väljaspool ringjoont.


a) Ülesannet saab lahendada nurklaua abil proovimise teel. Selleks paiguta nurklaud nii, et täisnurga üks haar läbiks antud ringi keskpunkti O , teine haar läbiks antud punkti A ja täisnurga tipp asetseks antud ringjoonel (joon. 121). Nurklaua niisuguse asendi puhul täisnurga teine haar asetseb puutujal, sest ta on risti raadiusega ja läbib selle otspunkti ringjoonel.



Joon. 121.

b) Ülesande lahendamiseks sirkli ja joonlaua abil (joon. 122) joonest antud ringjoone keskpunkti O ümber uus ringjoon raadiusega, mis võrdub antud ringjoone diameetriga, ja antud punkti A ümber ringjoon, mis läbib punkti O . Olgu nende kahe uue ringjoone lõikepunktid B ja C . Joonesta nüüd lõigud OB ja OC ning leia punktid P ja Q , kus nad lõikavad antud ringjoont. Nii sirge PA kui ka sirge QA on puutuja läbi punkti A .


Põhjendus. Konstruktsiooni järgi on punkt P lõigu OB keskpunkt, sest $OB = 2 \cdot OP$, ja punkt A on lõigu OB otspunkti-dest võrdsetel kaugustel, sest $AO = AB$. Järelikult AP on lõigu OB keskristsirge ja seega $AP \perp OP$. Kuid siis AP on ringjoone puutuja punktis P . Samal viisil saame näidata, et AQ on ringjoone puutuja punktis Q . Mõlemad nad läbivad punkti A .



Joon. 122.


778. Joonesta ringjoonele, mille raadius on 3 cm, puutujad läbi punkti, mille kaugus ringjoone keskpunktist on 5 cm.

779. Joonisel 123 kujutatud riista nimetatakse keskpunkti otsijaks. Kirjelda, kuidas tema abil leida ümmarguste esemete keskpunkti ja missugusel puutujate omadusel põhineb see leidmine (vt. üles. 776, b).



Joon. 123.

780. On antud ringjoone kaks lõikuvat puutujat ja puutepunktidel neist. Joonesta ringjoon.



Joon. 124.

781. Tõesta, et kui punkti kaugus ringi keskpunktist võrdub diameetriga, siis sellest punktist tõmmatud puutujate vaheline nurk on 60° .

KOLMNURGA SISERINGJOON.

782. Olgu mingile ringjoonele, mille keskpunkt on N (joon. 124), joonestatud välisest punktist A kaks puutujat AP ja AQ . Võtame ühel neist, näiteks puutujal AQ punkti B ja tõmbame sellest ringjoonele veel kolmanda puutuja BR , mis lõikab puutujal AP mingis punktis C . Need kolm puutujat moodustavad kolmnurga ABC , millele antud ringjoon on siseringjooneks. Niisiis

kolmnurga siseringjooneks nimetatakse ringjoont, mis puudutab kolmnurga kõiki külgi.

Kolmnurka, mille küljed puudutavad ringjoont, nimetatakse puutujakolmnurgaks.

783. Küsime, kas igal kolmnurgal leidub siseringjoon. Kui selline ringjoon leidub, siis tema keskpunkt peab asetsema kolmnurga nurgapoolitajatel, sest ülesande 776, b järgi puutujatevahelise nurga poolitaja läbib ringjoone keskpunkti. Sel puhul nurgapoolitajad peaksid lõikuma kõik ühes ja samas punktis.

Joonesta mingi kolmnurga kolm nurgapoolitajat sirkli ja joonlaua abil. Mida paned tähele nurgapoolitajate kohta?


784. Tõestame teoreemi:

kolmnurga sisenurkade poolitajad lõikuvad kõik ühes punktis, mis on selle kolmnurga siseringjoone keskpunktiks.

Tõestus. Joonestame kolmnurga ABC mingi kahe sisenurga, näiteks nurkade A ja B poolitajad ja tõmbame nende lõikepunktist N ristlõigud NP, NQ ja NR kolmnurga külgedele (joon. 124). Siis $NP = NQ$, sest punkt N kui nurga A poolitaja punkt on külgedest AC ja AB võrdsetel kaugustel. Niisamuti saab näidata, et $NQ = NR$. Neist kahest võrdusest järeldub, et ka $NP = NR$, s. t. punkt N on külgedest CA ja CB võrdsetel kaugustel. Kuid siis CN on kolmnurga nurga C poolitaja. Seega kõik kolm nurgapoolitajat lõikuvad punktis N. Ringjoon, mille keskpunktiks on punkt N ja raadiuseks on NP, läbib ka punkte Q ja R ning puudutab kolmnurga kõiki külgi.

Et kolmnurga nurgapoolitajad lõikuvad ainult ühes punktis, siis iga kolmnurga sisse saab joonestada ainult ühe ringjoone.

785. Mis on kolmnurga ümberringjoone keskpunktiks, mis siseringjoone keskpunktiks? Missugusel kolmnurgal need kaks punkti ühtivad? Mis sellest järeldub selle kolmnurga siseringjoone keskpunkti ja ümberringjoone keskpunkti kohta?



Joon. 125.


786. Joonesta kolmnurk, mille küljed on 4,5 cm, 5 cm ja 8 cm, ühes tema siseringjoone ja ümberringjoonega. Mõõda kummagi ringjoone raadius.

787. Näita, toetudes joonisele 125, et võrdkülgse kolmnurga ABC siseringjoone raadius OD on pool ümberringjoone raadiusest OA.

788. Leia vabalt võetud kolm-

nurga ABC küljel BC punkt, mis on kahest ülejäänud küljest võrdsetel kaugustel.

789. Joonis 126 kujutab kaht raudteed ühes kahe külaga A ja B . Kuidas leida 1) kolhoosi keskuse rajamiseks niisugune koht, mis asetseks võrdsetel kaugustel mõlemast raudteest ja võrdsetel kaugustel küladest A ja B ? 2) peatuskohad raudteel, mis oleksid rajatavale kolhoosikeskusele võimalikult lähedal?




Joon. 126.

PIIRDENURK.


790. Joonesta ringjoone ühest ja samast punklist K kaks kõõlu KL ja KM (joon. 127). Nende kõõlude vahelist nurka LKM nimetatakse piirdenurgaks. Piirdenurga kohta öeldakse, et ta toetub nurga sees olevale kaarele, näiteks piirdenurk LKM toetub kaarele LM . Samale kaarele toetub ka üks kesknurk, nimelt kesknurk LOM .

Missugusele kaarele toetuvad piirdenurgad A , B , C ja D joonisel 128?

Mitu piirdenurka toetub ühele ja samale kaarele? Mitu kesk-
nurka toetub sellele kaarele?



Joon. 127.



Joon. 128.

791. Mõõda piirdenurk ja samale kaarele toetuv kesk-
nurk. Kumb on suurem ja mitu korda?

792. Tõestame, et

**piirdenurk võrdub poolega samale kaarele toetuvast kesk-
nurgast.**

Olgu $\angle ABC$ piirdenurk ja $\angle AOC$ kesk-
nurk, mis toetuvad
ühele ja samale kaarele. Tõestame siis, et $\angle ABC = \frac{1}{2} \cdot \angle AOC$.

Tõestamisel tuleb vaadelda kolme võimalikku juhtumit:


- 1) ringjoone keskpunkt asetseb piirdenurga ühel haaral
(joon. 129);
- 2) ringjoone keskpunkt asetseb piirdenurga sees (joon. 130);
- 3) ringjoone keskpunkt asetseb väljaspool piirdenurka
(joon. 131).

1. Kui ringjoone keskpunkt O asetseb piirdenurga haaral BC ,
siis kesk-
nurk AOC on kolmnurga ABO väiisnurk ja seetõttu


$$\angle AOC = \angle ABO + \angle OAB.$$

Et kolmnurk OAB on võrdhaarne (miks?), siis saadud võrduse
paremal poolel on võrdsed liidetavad ja seega


$$\angle AOC = 2 \cdot \angle ABO,$$



Joon. 129.



Joon. 130.



Joon. 131.

millest järeldubki, et

$$\angle ABC = \frac{1}{2} \cdot \angle AOC.$$

2. Kui ringjoone keskpunkt asetseb piirdenurga sees (joon. 130), siis joonestame diameetri BD. See diameeter jaotab piirdenurga ja kesknurga kaheks osaks, mille kummagi kohta teoreem on eelmises punktis tõestatud:

$$\angle ABD = \frac{1}{2} \cdot \angle AOD;$$

$$\angle DBC = \frac{1}{2} \cdot \angle DOC.$$

Liites esimese võrduse pooltega teise võrduse pooled ja tuues paremal ühise teguri $\frac{1}{2}$ sulgude ette, saame

$$\angle ABD + \angle DBC = \frac{1}{2} (\angle AOD + \angle DOC)$$

ehk

$$\angle ABC = \frac{1}{2} \cdot \angle AOC.$$

3. Kui ringjoone keskpunkt asetseb väljaspool piirdenurka (joon. 131), siis, joonestades diameetri BD, saame piirdenurga ABC esitada kahe niisuguse piirdenurga vahena, millede kohta teoreem on juba tõestatud:

$$\angle ABD = \frac{1}{2} \cdot \angle AOD;$$

$$\angle CBD = \frac{1}{2} \cdot \angle COD.$$

Lahutades esimese võrduse pooltest teise võrduse pooled ja tuues paremal ühise teguri $\frac{1}{2}$ sulgude ette, saame

$$\angle ABD - \angle CBD = \frac{1}{2} (\angle AOD - \angle COD)$$

ehk

$$\angle ABC = \frac{1}{2} \cdot \angle AOC.$$

Sellega on teoreem täielikult tõestatud.

793. Teoreemist piirdenurga kohta teeme järgmised järeldused.


1. Ühele ja samale kaarele toetuvad piirdenurgad on võrdsed, sest igaüks neist võrdub poolega ühest ja samast kesknurgast. Nende piirdenurkade tipud asetsevad kaarel (MCL joonisel 128), mille igast punktist ($A, B, C, \dots$) paistab kaare otspunkte ühendav kõõl (ML) ühes ja samas vaatenurgas.

2. Võrdsetele kaartele toetuvad piirdenurgad on võrdsed (miks?).


3. Diameetrile toetuv piirdenurk on täisnurk,

sest vastav kesknurk on kaks täisnurka (joon. 132). See järeldus näitab, et ringjoone igast punktist (peale kahe punkti) paistab diameeter täisnurgas.

Viimast järeldust nimetatakse Thalese* teoreemiks. Seda teoreemi saab kasutada täisnurkse kolmnurga ehitamiseks antud hüpotenuusi ja kaateti järgi. Selleks joonestame ringjoone,



Joon 132.



Joon. 133.

* Thales, kreeka filosoof ja matemaatik, elas VI saj. 1 poolel e. m. a.

mille diameetriks on antud hüpotenuus, ja mõõdame diameetri ühest otspunktist kõõlu, mis võrdub antud kaatetiga. Selle kõõlu ja diameetri teiste otspunktide ühendamisel saame nõutud täisnurkse kolmnurga.

794. Thalese teoreem annab uue võimaluse ringjoone puutuja ehitamiseks punktist, mis asetseb väljaspool ringjoont. Selleks ühendame antud punkti A antud keskpunktiga C ja joonestame ringjoone, millele lõik AC on diameetriks (joon. 133). Siis leiame saadud ringjoone ja antud ringjoone ühised punktid P ja Q ning joonestame sirged AP ja AQ .

Teosta see konstruktsioon ja põhjenda, et AP ja AQ on puutujad.

795. Missugust joont mööda tuleb paadiga sõita lahel, kui soovime mingit rannalõiku kogu aeg näha täisnurgas (joon. 134)?



Joon. 134.

796. a) Kui suur piirdenurk toetub kaarele 40° , 75° , $118^\circ 20'$, $131^\circ 48'$?

b) Piirdenurk toetub kaarele, mis on 76° võrra väiksem ringjoone ülejäänud osast. Kui suur on piirdenurk?

797. Ümber kolmnurga ABC , mille $\angle A = 58^\circ 40'$ ja $\angle B = 72^\circ 30'$ on joonestatud ringjoon. Kui suured on kaared, milledeks kolmnurga tipud jaotavad selle ringjoone?

798. Ringjoonel asetsevad järjestikku punktid A , B , C ja D nii, et $\cup AB$ on $\frac{1}{5}$ ringjoonest, $\cup BC$ on $\frac{1}{6}$ ringjoonest ja $\cup CD$ on $\frac{3}{10}$ ringjoonest. Kui suured on nelinurga $ABCD$ nurgad?

799. Kaks ringjoont lõikuvad punktides A ja B . Punktist A on

joonestatud mõlema ringjoone diameetrid AC ja AD . Tõesta, et punktid B , C ja D asetsevad ühel ja samal sirgel.

Näpunäide. Joonesta kõõl AB ja vaatle nurki ABC ja ABD .

800. Ringjoonel on märgitud järjestikku punktid A , B , C ja D nii, et kaared AB ja CD on võrdsed. Tõesta, et kõõlud AD ja BC on paralleelsed.

Näpunäide. Joonesta kõõl AC ja vaatle tekkinud piirde-
nurki.

801. Ringjoonel on märgitud järjestikku punktid A , B , C ja D nii, et kaared AB ja CD on võrdsed. Tõesta, et kõõlud AC ja BD on võrdsed.

Näpunäide. Võrdle kaari, milledele need kõõlud toetuvad.

802. Antud on lõik $AB = 4$ cm. Missugusel joonel asetsevad punktid, milledest lõik AB paistab täisnurgas?

803. Antud on võrdkülgne kolmnurk, mille üheks küljeks on lõik AB , ja sirge s , mis lõikab selle kolmnurga kaht ülejäänud külge. Leia sirgel s kaks punkti, milledest lõik AB on näha nurgas 60° .

804. a) Ringi sisse on joonestatud korrapärane kuusnurk. Missuguse osa ringjoonest moodustab kuusnurga nurgale (kui piirde-
nurgale) vastav kaar? Leia selle nurga suurus.


b) Ringi sisse on joonestatud korrapärane viisnurk. Kui suur on selle viisnurga nurk?

805. Tõesta, et korrapärase viisnurga ühest ja samast tipust tõmmatud diagonaalid jaotavad hulknurga nurga võrdseteks osadeks.

806. Väljenda kolmnurga sisenurk α teise sisenurga β ja kolmanda tipu juures oleva välisnurga γ_1 kaudu. Arvuta α , kui $\beta = 38^\circ$ ja $\gamma_1 = 117^\circ$.

807. a) Väljaspool ringjoont asetsevast punktist A on joonestatud ringjoonele kaks lõikajat ACE ja ABD (joon. 135), millede vahel on kaared BC ja DE . Kaar BC on 54° ja kaar DE on 132° . Kui suur on $\angle AEB$, $\angle EBD$, $\angle BAC$?


b) Arvuta eelmise ülesande eeskujul väljaspool ringjoont lõikuvate lõikajate vaheline nurk BAC , kui nurga haarade vahel olevad kaared on 34° ja 105° .



Joon. 135.

808. Arvuta nurk ringjoone lõikajate vahel, kui nurga sees olevad kaared on a) 78° ja 134° ; b) 55° ja 172° ; c) $165^\circ 17'$ ja $47^\circ 39'$.

809. a) Ringjoon on lõigatud kahe sirgega EC ja DB , mis lõikuvad seespool ringjoont punktis A (joon. 136). Lõikajatevahelise nurga BAC ja tema tippnurga EAD sees olevad kaared on 78° ja 25° . Kui suur on $\angle CEB$, $\angle EBD$, $\angle BAC$?



Joon. 136.

b) Arvuta eelmise ülesande eeskujul seespool ringjoont lõikuvate lõikajate vaheline nurk BAC , kui selle nurga ja tema tippnurga haarade vahel olevad kaared on 115° ja 34° .

810. Arvuta nurk ringjoone lõikajate vahel, kui selle nurga ja tema tippnurga sees olevad kaared on a) 51° ja 34° ; b) 68° ja $27^\circ 20'$; c) $115^\circ 14'$ ja $18^\circ 24'$.

811. Kaks kõõlu lõikuvad nii, et nad jaotavad ringjoone osadeks, mis suhtuvad järjestikku nagu 1:3:5:6. Arvuta kõõludevaheline teravnurk.

812. Ringjoonel järjestikku võetud punktid A , B , C ja D jaotavad ringjoone kaarteks, mis suhtuvad nagu 2:5:7:1. Kui suur on nurk sirgete AB ja DC vahel? sirgete AC ja BD vahel?

813. Ühest ja samast punktist P on ringjoonele joonestatud kaks puutujat PU ja PV . Puutepunktid U ja V jaotavad ringjoone kaheks kaareks, milledest väiksem on 134° . Joonesta kõõl UV ja leia, kui suur on $\angle PUV$, $\angle PVU$, $\angle UPV$.

814. Ühest ja samast punktist P on ringjoonele joonestatud kaks puutujat PU ja PV , millede vaheline nurk on 78° . Kui suured on kaared, milledeks puutepunktid U ja V jaotavad ringjoone?


815. Arvuta puutuja ja puutepunktist tõmmatud kõõlu vaheline nurk BAD (joon. 137), kui kõõlule toetuv kesknurk $\angle ACB = 110^\circ$.

816. Puutuja ja kõõlu vahelise nurga sees olev kaar moodustab 70% ringjoonest. Kui suur on see nurk?

817. Puutuja ja kõõlu vaheline nurk on $64^\circ 45'$. Kui suured on kaared, milledeks kõõl jaotab ringjoone?

818. Kui suur on korrapärase kõõlkolmnurga külje ja selle otspunktist tõmmatud puutuja vaheline nurk?

819. Kui suur on korrapärase kõõlkuusnurga külje ja selle otspunktist joonestatud puutuja vaheline nurk?



Joon. 137.


KORRAPÄRANE HULKNURK.

820. Missugust hulknurka nimetatakse korrapäraseks? Kuidas joonestada korrapärast kuusnurka, korrapärast kaheksanurka, üldiselt korrapärast n -nurka?

Korrapäraseks hulknurgaks nimetatakse hulknurka, millel kõik küljed on võrdsed ja nurgad on võrdsed.

821. Kus oled näinud korrapäraseid hulknurki? Nimeta-joonisel 138 kujutatud esemete juures esinevaid korrapäraseid hulknurki.


822. Varem õppisime tundma korrapäraseid hulknurki, mis tekivad, kui ringjoon jaotada võrdseteks osadeks ja saadud jaotuspunktid ühendada järjestikku kõõlude abil. Saadud hulknurki nimetatakse korrapärasteks kõõlhulknurkadeks.



Joon. 138.

Korrapärast hulknurka võib saada veel teisiti.

Kui ringjoon jaotada enam kui kaheks võrdseks osaks ja igast jaotuspunktist tõmmata puutuja kuni lõikumiseni naaberpunktidest tõmmatud puutujatega, siis tekib korrapärane hulknurk. Seda hulknurka nimetatakse korrapäraseks puutujahulknurgaks.



Joon. 139.


Olgu ringjoon, mille keskpunkt on O ja raadius OK , jaotatud n võrdseks kaareks, näiteks kuueks võrdseks kaareks KL , LM , MN jne. (joon. 139). Joonestades puutujad punktidest K , L , M jne., saame hulknurga $ABCDEF$. Tõestame, et see on korrapärane. Selleks näitame esmalt, et saadud hulknurga nurgad on võrdsed. Et ühest ja samast punktist tõmmatud puutujate vaheline nurk

ja puutepunktidesse tõmmatud raadiuste vaheline nurk annavad liitmisel sirgnurga (üles. 775), siis hulknurga $ABCDEF$ iga nurk võrdub sirgnurga ja ühe kesknurga vahega. Nii saame, et $\angle A = 180^\circ - \angle KOL$, $\angle B = 180^\circ - \angle LOM$ jne. Kuid need kesknurgad on kõik võrdsed, sest nad toetuvad võrdsetele kaartele KL , LM jne. Seega on võrdsed ka puutujatevahelised nurgad:

$$\angle A = \angle B = \dots = \angle F.$$

Hulknurga $ABCDEF$ külgede võrdsuse tõestamiseks joonestame kõõlud KL , LM , MN jne. Nii saame kolmnurgad AKL , BLM jne., mis on võrdhaarsed, sest kaheks küljeks on neil ühest ja samast punktist tõmmatud puutujate lõigud (üles. 776). Need kolmnurgad on ka võrdsed, sest peale tipunurkade on neil veel alused võrdsed (põhjenda seda). Kuid siis $AB = BC = CD = \dots$, sest igaüks neist koosneb kahest ühe ja sama pikkusega lõigust. Sellega on tõestatud, et hulknurk $ABCDEF$ on korrapärane.

823. Mida nimetatakse korrapärase hulknurga apoteemiks? Millega võrdub korrapärase puutujahulknurga apoteem, kui ringi läbimõõt on 14 cm? 25 cm?




Joon. 140.

824. Joonesta korrapärane kõõlviisnurk $ABCDE$ (joon. 140). Tõesta, et tema küljel AB , BC jne. on hulknurga keskpunktist O võrdsetel kaugustel. Joonesta ringjoon, mis puudutab hulknurga kõiki külgi.


825. Joonesta ringjoon raadiusega $r = 3$ cm ja tema ümber ning sisse korrapärane kuusnurk.

RINGJOONE PIKKUS.

826. Ringjoone pikkuse ehk ringi ümbermõõdu mõõtmisega puutume kokku, kui soovime mõõta näiteks ümmarguse palgi, ämbri põhja või vankri ratta ümbermõõtu. Sageli saab selleks kasutada painduvat mõõdulinti, nagu näidatud joonisel 141.



Joon. 141.



Joon. 142.

Too näiteid, kus veel saab ringjoone pikkust niiviisi mõõta.

827. Maapinnal leiduva ringjoone pikkuse mõõtmiseks on mõõdusirkel mõnikord sobivam kui mõõdulint (joon. 142). Selgita, miks

Too näiteid, kus maapinnal esineb ringjooni. Selgita, milleks nende pikkust on vaja mõõta ja kuidas seda tehakse.

828. Mõõda mõne ümmarguse (ringikujulise) eseme ümbermõõt ja läbimõõt, arvuta nende suhe ja koosta mõõtmise tulemustest järgmine tabel.

Eseme nimetus	Ümbermõõt	Läbimõõt	Nende suhe

Arvuta leitud suhete aritmeetiline keskmine ja võrdle seda teiste õpilaste poolt saadud keskmisega. Mida paned tähele?

829. Täpsemad mõõtmised näitavad, et erinevate ringide ümbermõõtude ja läbimõõtude suhted ei erine üksteisest kuigi palju, olles kõik ligikaudu võrdsed arvuga 3,14. Ringi ümbermõõdu ja läbimõõdu suhe ei muutu ringi läbimõõdu muutudes

ehk, teisiti öeldes, ringi ümbermõõdu ja läbimõõdu suhe on jääv suurus.

Selle suhte täpset väärtust tähistatakse kreeka tähega π (pii). Nüüd saame, et ringjoone pikkuse c ja läbimõõdu d ehk $2r$ suhe on

$$c : d = \pi \text{ ehk } c : 2r = \pi.$$

Avaldades siit jagatava c , saame ringi ümbermõõdu (ehk ringjoone pikkuse) valemid:

$$c = \pi d; \quad c = 2\pi r$$

Ringi ümbermõõt võrdub arvu π ja läbimõõdu korrutisega ehk arvu 2π ja raadiuse korrutisega.

Arvu π täpne väärtus avaldub lõpmatu mitteperioodilise kümnendmurruna, millest on arvutatud enam kui 700 kümnendkohta.

Arvu π esimesed 21 kohta on järgmised:

3,14159265358979323848.

Ringi ümbermõõdu arvutamisel saab kasutada neist muidugi ainult esimesi kohti. Arvu π ligikaudse väärtusena kasutatakse harilikult arvu 3,14, mõnikord ka arvu $3\frac{1}{7}$ ja suuremat täpsust nõudvate arvutuste puhul arvu 3,1416.


830. Ümmarguse vaagna ümbermõõdu mõõtmisel saadi tulemuseks 89,2 cm ja läbimõõdu mõõtmisel 28,4 cm. Arvuta arvu π ligikaudne väärtus.

831. a) Arvuta peast ringi ümbermõõt, kui läbimõõt on 1 m; 10 dm; 0,1 km; kui raadius on 5 cm; 0,5 dm; 1 m.

b) Arvuta ringi ümbermõõt c , kui läbimõõt $d = 16$ cm; 4,5 dm; 0,8 m.

c) Arvuta ringjoone pikkus c , kui raadius $r = 7$ cm; 3,8 dm; 12 m.

832. Mida kujutab joonis 143?



Joon. 143.

833. a) Arvuta Maa ekvaatori pikkus, kui ekvaatori raadius on 6378 km.

834. Kuu liigub ümber Maa peaaegu ringjoonelist teed mööda ja tema kaugus Maast on 380 000 km. Arvuta Kuu tee pikkus (eeldusel, et Maa seisab ruumis paigal).

835. Maa liigub ümber Päikese peaaegu ringjoonelist teed mööda, tehes aasta vältel ühe täistiiru. Arvuta Maa aastase tee pikkus, kui Maa kaugus Päikesest on 150 000 000 km (ja kui Päike seisaks ruumis paigal).

836. a) Ringjoone pikkuse kergemaks leidmiseks on koostatud tabelleid. Ühe sellise tabeli leiad õpiku lisast. Selles on antud ringi läbimõõdu kolmekohaliste tüvedega väärtustele

1,00, 1,01, 1,02, ..., 9,99, 10,0

vastavad übermõõdu väärtused (niisamuti kolmekohaliste tüvedega):

3,14, 3,17, 3,20, ..., 31,4, 31,4.

Antud läbimõõdule, näiteks läbimõõdule 2,76 vastava übermõõdu leidmiseks võtad tabelist selle rea, mille algul (esimeses veerus) seisab antud läbimõõdu esimesest kahest numbrist koosnev arv 2,7, ja selle veeru, mille pealkirjaks (esimeses reas) on antud läbimõõdu viimane number 6. Võetud rea 2,7 ja veeru 6 lõikekohas leiad läbimõõdule 2,76 vastava übermõõdu 8,67. (Tabeli kergemaks kasutamiseks lõika papist riba ja pane see selle rea alla, millest parajasti arvu otsid.)

b) Kontrolli tabeli abil, et:

kui ringi läbimõõt on 1,74 dm, siis übermõõt on 5,47 dm;

kui ringi raadius on 3,54 m, siis übermõõt on 22,2 m;

kui ringi raadius on 4,5 km, siis übermõõt on 28,3 km.

c) Sama tabeli abil saab leida ka ringi läbimõõtu, kui tema übermõõt on antud.

Ringi läbimõõdu leidmisel übermõõdu järgi tuleb silmas pidada, et tabeli osas, mis algab übermõõdu väärtusega 10,1, iga übermõõt esineb järjestikku 3 või 4 korda. Näiteks übermõõt 10,1 on ringil läbimõõduga 3,20, 3,21, 3,22, 3,23, sest ümardatult kümnendikeni on nende ringide übermõõdud kõik 10,1. Seega võib übermõõdule 10,1 vastavaks läbimõõduks ühesuguse õigsusega võtta 3,20, 3,21, 3,22 või 3,23. Vastuste erine-

vuse vältimiseks võtame võimalikest väärtustest suurima, mis lõpeb paarisnumbriga. Niisiis,

kui ringi ümbermõõt on 10,1 cm, siis läbimõõt on 3,22 cm;

kui ringi ümbermõõt on 10,7 dm, siis läbimõõt on 3,42 dm;

kui ringi ümbermõõt on 28,7 m, siis läbimõõt on 9,14 m.

837. Joonesta alljärgnev tabel vihikusse ja täida see, kasutades ringjoone pikkuste tabelit.

r (cm)				2,36	1,65	3,65			
d (cm)	1,90	5,78	9,24						
c (cm)							25,8	17,0	5,97

838. Tabel võimaldab leida ringjoone pikkust ka neil juhtumitel, kui antud läbimõõtu ei leidu tabelis. Selleks tuleb teada, et kui läbimõõt d suureneb (väheneb) 10, 100 jne. korda, siis ringjoone pikkus πd samuti suureneb (väheneb) 10, 100 jne. korda, sest ühe teguri (d) suurenemisel (vähennemisel) mingi arv korda suureneb (väheneb) korrutis (πd) sama arv korda. Lühemalt öeldes, ringjoone pikkus on võrdeline läbimõõduga.

Näiteid. 1. Et leida ringjoone pikkust, kui $d = 27$ cm, võtame tabelist läbimõõdule 2,7 vastava pikkuse 8,48 ja suurendame seda 10 korda. Nii saame, et kui $d = 27$ cm, siis $\pi d = 84,8$ cm.

2. Et leida ringjoone pikkust, kui $d = 0,0852$ m, võtame tabelist läbimõõdule 8,52 vastava pikkuse 26,8 ja vähendame seda 100 korda. Nii saame, et kui $d = 0,0852$ m, siis $\pi d = 0,268$ m.

839. Kasutades tabelit, leia ringjoone pikkus järgmistel andmetel:

a) läbimõõt on 15 cm, 92 m, 236 m, 928 km, 307 m, 57 dm, 1400 m;

b) läbimõõt on 0,163 cm, 0,47 km, 0,9 dm, 0,025 m, 0,06 dm, 0,007 m.

Töö vormista tabeli kujul:

d	15 cm	92 m	...	
c	...	...	...	

840. Kasutades tabelit, leia ringjoone pikkus järgmistel andmetel:

- a) raadius on 8 cm, 13,5 dm, 32,6 dm, 13 m, 245 m, 382 km;
b) raadius on 0,07 cm, 0,272 cm, 0,38 km, 0,415 m, 0,46 km.

Töö vormista tabeli kujul:

r	d	c
8 cm	16 cm	...
13,5 dm	...	...

841. Ringjoone pikkuste tabelis antud läbimõõdud on kolmekohaliste tüvedega arvud. Kui antud ringjoone läbimõõt on enam kui kolme tüvenumbriga, siis ringjoone pikkuse leidmisel tabeli järgi tuleb läbimõõt enne ümardada kolmekohalise tüvega arvuks.

Näide. Kui $d = 8,376$ m, siis ümardades saame, et $d \approx 8,38$ m ja sellele vastav ringjoone pikkus $c \approx 26,3$ m.

842. Leida ringjoone pikkus, kui

- a) läbimõõt on 1,082 m, 0,2747 dm, 5,718 m, 6223 m, 0,3065 km;
b) raadius on 0,1274 dm, 38,81 cm, 5296 m, 0,7652 km, 69,88 km.

Näide. Kui $r = 0,3284$ km, siis $d = 0,6568$ km $\approx 0,657$ km ja $c \approx 2,06$ km.

843. Tabelis antud ringjoone pikkused on kolmekohaliste tüvedega arvud, milledest väikseim on 3,14 ja suurim on 31,4. Kui antud ringjoone pikkus on tabelis mitteleiduv arv, mis on suurem kui 3,14, aga väiksem kui 31,4, siis leiame ringjoone pikkuste tabelist kaks järjestikust arvu, millede vahel ta asetseb, vaatame, kummast neist ta erineb vähem, ja võtame sellele vastava läbimõõdu. Näiteks ringjoone pikkus 3,97 asetseb tabelis leiduvate ringjoone pikkuste 3,96 ja 3,99 vahel ja seejuures erineb arvust 3,96 vähem kui arvust 3,99. Seetõttu võtame otsitavaks läbimõõduks ringjoone pikkusele 3,96 vastava läbimõõdu, s. o. 1,26. Nii siis, kui ringjoone pikkus on 3,97 ühikut, siis läbimõõt on 1,26 ühikut. See läbimõõdu väärtus on muidugi ligikaudne ja nimelt veaga alla 0,005.

Kui antud ringjoone pikkus erineb täpselt ühepalju kahest tabelis antud järjestikusest ringjoone pikkusest, siis on ükskõik, kummale vastav läbimõõt neist võtta. Raadiuse kergemaks arutamiseks on soovitatav võtta paarisnumbriga lõppev väärtus. Näiteks, kui ringjoone pikkus on 3,66 ühikut, siis läbimõõduks saame 1,16 ühikut.

844. Leia tabeli abil ringi läbimõõt, kui tema ümbermõõt on: 4 cm; 4,3 dm; 5,5 m; 12 m; 14,3 m; 18,7 m; 28,39 km; 30,46 km.

845. Kui antud ringjoone pikkuse mõõtarv ei kuulu tabelis antud äärmiste arvude, s. o. 3,14 ja 31,4 vahele, siis suurendame (või vähendame) seda mõõtarvu 10, 100, ... korda nii, et uus mõõtarv oleks suurem kui 3,14, kuid väiksem kui 31,4. Selle põhjal leitud läbimõõt tuleb muidugi sama arv korda vähendada (vastavalt suurendada).

Näited. 1. Olgu ringjoone pikkus $c = 1,66$ m; suurendades seda mõõtarvu 10 korda, saame 16,6, millele vastav läbimõõt tabeli järgi on 5,28; tähendab, otsitav läbimõõt $d = 0,528$ m.

2. Olgu ringi ümbermõõt $c = 386$ m; vähendades mõõtarvu 100 korda, saame 3,86, millele vastav läbimõõt tabeli järgi on 1,23; tähendab, otsitav läbimõõt $d = 123$ m.

846. Leia tabeli abil ringi läbimõõt, kui tema ümbermõõt on:

a) 52 mm, 138 mm, 75 cm, 204 cm, 0,87 dm, 2,56 m, 2,92 dm, 0,6 km;

b) 88 mm, 212 mm, 1,12 m, 2,75 m, 0,03 km, 2,42 km, 1920 m, 2,5 m.

847. Mitu meetrit on ümmarguse tiigi läbimõõt, kui ümbermõõt on 245 sammu ja sammu pikkus on 0,7 m?

848. a) Mitu äärekivi kulub ümmargusele lillepeenrale, mille läbimõõt on 2,6 m, kui kivi pikkus on 17 cm?

b) Mitu lilletaime kulub ümmarguse lillepeenra ääristamiseks, kui peenra läbimõõt on 3,7 m ja taimede vaheks jätta 20 cm?

849. Lapsed tegid jääle karusselli, pannes kelgu tiirlema 6,5 m pikkuse lati otsa. Kui pika sõidu sai Tõnu, kes tegi 15 tiiru?

850. a) Ratas tegi 19,6 m vahemaal 8 pööret. Mitu pööret teeb ratas 1 km pikkusel vahemaal? Kui suur on selle ratta raadius?


b) Mitu pööret teeb 1,5 m kõrgune veduriratas ühes tunnis, kui vedur läbib tunnis 75 km? Missuguse aja vältel teeb see ratas 1000 pööret?

KAARE PIKKUS.

851. Kaar on kahe punktiga — kaare otspunktidega — piiratud osa ringjoonest (joon. 144). Selle osa suurus on määratud kaare kraadide arvuga: kui kaar sisaldab näiteks 120° , siis ta on $\frac{120}{360} = \frac{1}{3}$ ringjoonest. Üldiselt

n -kraadine kaar on $\frac{n}{360}$ ringjoonest.

Leiame kaare suuruse pikkusühikutes ehk kaare pikkuse.



Joon. 144.

Tähistades ringjoone pikkuse tähega c ja n -kraadise kaare pikkuse tähega s , saame valemi

$$s = \frac{n}{360} \cdot c$$

Ringjoone pikkuse c võtame muidugi tabelist.

Näide. Kui kaare raadius $r = 15$ cm ja kaare kraadide arv $n = 40$, siis ringjoone pikkus on $c = 94,2$ cm ja kaare pikkus

$$s = \frac{40}{360} \cdot 94,2 = \frac{1}{9} \cdot 94,2 = 10,5 \text{ cm.}$$

852. Kui kaare pikkuse s ja kraadide arvu n põhjal tuleb leida kaare raadius r , siis leiame esmalt ringjoone pikkuse c ja siis tabeli

järgi raadiuse r . Näiteks, kui kaare pikkus $s = 6$ cm ja ta sisaldab 20° , siis ringjoone pikkus

$$c = 360 \cdot \frac{6}{20} = 18 \cdot 6 = 108 \text{ cm},$$

mille järgi tabelist saame, et $d = 34,4$ cm ja

$$r = 34,4 : 2 = 17,2 \text{ cm}.$$

853. Kui pikk on 75° -ne kaar ringjoonel, mille raadius on 6 cm?

854. Ringjoone 36° -se kaare pikkus on 5 dm. Kui pikk on raadius?


855. Kui pikk on 100° -ne kaar ringjoonel, mille läbimõõt on 1 m?

856. Joonesta ringjoon, mille 40° -se kaare pikkus on 4 cm.

857. Ringjoone raadius on 10 cm. Kui pikk on selle ringjoone

a) korrapärase kõõlviisnurga küljele vastava kaare pikkus?

b) korrapärase kõõlkaheksanurga küljele vastava kaare pikkus?



Joon. 145.


858. Kaks sirget raudteed, mille sihtide vaheline nurk on 60° , on sujuvalt ühendatud ringi kaarega (joon. 145), mille pikkus on 125 m. Arvuta selle kaare raadius.

859. Ringi raadius on r cm. Kui palju ja mitme protsendi võrra on korrapärase kõõlkuusnurga küljele vastav kaar sellest küljest pikem?

860. Maa ekvaatori raadius on 6378 km. Arvuta meremiili pikkus, kui on teada, et see võrdub Maa ekvaatori 1'-se kaare pikkusega.

RINGI PINDALA.

861. Ruudulisele paberile joonestatud ringi pindala ligikaudselt leidmiseks loendame kõik ruudud, mida see ring katab, kusjuures pooliku ruudu loeme terve eest, kui üle poole temast näib olevat ringi sees, ja jätame arvesse võtmata, kui üle poole temast näib olevat väljaspool ringi. Töö kergendamiseks võib leida esmalt veerandringi pindala ja korrutada tulemus neljaga. Ruutude kergemaks loendamiseks piirame joonega kõik kaasaarvatavad ruudud (joon. 146).




Joon. 146.

Leia joonisel 146 kujutatud ringi ligikaudne pindala, kui seal iga ruudu külg on 0,5 cm.


862. Joonesta ruudulisele paberile kolm ringi, mille raadiused on vastavalt 1 cm, 2,5 cm ja 3 cm. Leia eelmise ülesande eeskujul iga ringi ligikaudne pindala.

863. Joonesta paksemale paberile (kartongile) mingi ring, näiteks raadiusega 4 cm, jaota see raadiustega esiteks kuueks ja siis kaheteistkümneks võrdseks osaks ja lõika need osad korralikult paberist välja (joon. 147). Iga niisugust osa nimetatakse ringi

sektoriks. Kleebi need sektorid vihikusse üksteise kõrvale joonise 148 eeskujul ja värvi vaheldumisi kahe eri värviga. Missugust kujundit meenutab see kujund? Mille poolest ta erineb rööpkülilükst? Millega võiks lugeda võrdseks selle «rööpküliliku» aluse, millega kõrguse? Mis siit järeldub ringi pindala kohta?



Joon. 147.



Joon. 148.

Ringi pindala võrdub poole ümbermõõdu ja raadiuse korrutisega.

Näide. Kui ringi raadius $r = 2$ cm, siis pool ümbermõõdu $\pi r = 3,14 \cdot 2 = 6,28$ cm ja pindala $S = 6,28 \cdot 2 = 12,56 \approx 13$ cm².

Arvuta sel viisil ringi pindala, kui ringi raadius on 5 cm; 4 dm; 8 m.

864. Tuleta eelmises ülesandes antud teoreemi põhjal ringi pindala valem.

$$S = \pi r^2$$


Ringi pindala võrdub raadiuse ruudu ja arvu π korrutisega.

Ringi pindala on seega võrdeline raadiuse ruuduga; võrdetegur on π .


Võrdle ringi pindala puutujaruudu pindalaga (joon. 149).

865. a) Arvuta valemi järgi ringi pindala, kui raadius

$r = 3$ cm; 1,5 cm; 35 m; 0,8 km; 2,45 km.



$$4r^2$$



$$3,14r^2$$

Joon. 149.

b) Mitu protsenti moodustab ringi pindala tema puutujaruudu pindalast?


866. Asenda ringi pindala valemis raadius r tema avaldisega diameetri d kaudu ja tuleta järgmine ringi pindala valem:

$$S = \frac{1}{4} \pi d^2$$

Sõnasta see valem. Arvuta selle valemi järgi ringi pindala, kui läbimõõt

$d = 2 \text{ cm}; 4 \text{ dm}; 1 \text{ m}; 0,4 \text{ m}; 2,6 \text{ km}.$

Näide. Kui ringi läbimõõt $d = 3,2 \text{ dm}$, siis pindala $S = \frac{1}{4} \pi d^2 = \frac{1}{4} \cdot 3,14 \cdot 3,2^2 = \frac{1}{4} \cdot 3,14 \cdot 10,24 = 3,14 \cdot 2,56 = 8,0384 \approx 8,0 \text{ dm}^2.$



Joon. 150.

867. Tuleta ringi pindala arvutamise eeskiri korrapärase hulknurga pindala arvutamise eeskirjast. Selleks vaatle ringi sisse joonestatud korrapärase 6-nurga, korrapärase 12-nurga, korrapärase 24-nurga jne. pindalasid (joon. 150). Millega võrdub iga niisuguse hulknurga pindala? Mida siit võiks järeldada ringi pindala kohta?

868. a) Arvuta ümmarguse piimanõu põhja pindala, kui nõu läbimõõt on 16 cm.

b) Arvuta ümmarguse palgi ristlõike (otsa) pindala, kui palgi läbimõõt on 36 cm.

869. Ringi pindala kergemaks leidmiseks on koostatud tabeleid. Ühe sellise tabeli leiad õpiku lisast. Selle ehitus ja kasutamine on analoogiline ringi ümbermõõtude tabeli ehituse ja kasutamiselega.

Näiteid.

a) Kui ringi läbimõõt on 2,4 m, siis pindala on 4,52 m².

b) Kui ringi raadius on 3,76 dm, siis pindala on 44,4 dm².

c) Kui ringi pindala on 29,9 m², siis läbimõõt on 6,17 m.

870. a) Leia tabeli abil ringi pindala, kui läbimõõt on 1,8 cm, 2,7 cm, 3,74 dm, 5 dm, 6,38 m, 7,25 m, 8 km, 10 km.

b) Leia tabeli abil ringi pindala, kui ringi raadius on 1,2 cm, 3,8 cm, 4,72 dm, 0,71 dm, 0,95 m, 2 m, 1,5 km, 4,87 km.

c) Leia tabeli abil ringi raadius, kui ringi pindala on 11,7 cm², 41,4 dm², 7,07 m², 11 m², 18,2 km², 28 km².

871. a) Selgita, kuidas muutub ringi pindala, kui tema raadius suureneb mingi arv korda.

Kui ringi raadius on r , siis pindala on πr^2 .

Kui ringi raadius on $10r$, siis pindala on $\pi(10r)^2 = \pi \cdot 100r^2 = 100\pi r^2$.

Kui ringi raadius on $100r$, siis pindala on $\pi(100r)^2 = \pi \cdot 10\,000r^2 = 10\,000\pi r^2$.

Mitu korda suurenes ringi pindala, kui tema raadius suurenes 10 korda? kui raadius suurenes 100 korda?

b) Näita samal viisil, et

kui ringi raadius suureneb n korda, siis pindala suureneb n^2 korda.

c) Kuidas muutub ringi pindala, kui tema raadius suureneb 3, 5, 7, 12, 20, 50 korda?

d) Kuidas muutub ringi pindala, kui tema raadius väheneb 2, 5, 8, 10, 25, 100 korda?

872. Kuidas muutub ringi raadius ja kuidas pindala, kui

a) läbimõõt suureneb 2 korda, 5 korda, 10 korda?

b) läbimõõt väheneb 3 korda, 8 korda, 100 korda?

873. Teades, kuidas muutub ringi pindala tema raadiuse (läbimõõdu) muutudes, leia tabeli abil ringi pindala järgmistel andmetel.

a) Läbimõõt on 12 cm, 43 cm, 92 m, 25 km, 0,4 dm, 0,75 m.

b) Raadius on 8 cm, 32 cm, 0,3 m, 15 m, 0,28 km, 0,39 km.

Näide. Kui ringi raadius $r = 5,5$ m, siis läbimõõt $d = 11$ m. Tabelist leiame, et 10 korda väiksema läbimõõduga ringi pindala on $0,95$ m². Suurendades seda 100 korda, saame 95 m². Lühidalt: kui $r = 5,5$ m, siis $d = 11$ m ja $S = 100 \cdot 0,95$ m² = 95 m².

Analoogiliselt:

kui $r = 0,07$ m, siis $d = 0,14$ m ja $S = 1,54$ m² : $100 = 0,0154$ m².

874. Leia ringi pindala järgmistel andmetel:

a) läbimõõt on 1,07 dm, 0,326 dm, 7,87 m, 246 m, 0,508 km;

b) raadius on 0,124 dm, 31,9 cm, 671 m, 1128 m, 7,87 km.

875. Tabelis antud ringi pindala väärtused on arvud vahemikust 0,79 kuni 78,5. Kui antud ringi pindala väärtus on sellesse vahemikku kuuluv arv, mida ei ole tabelis, siis läbimõõdu leidmiseks leia tabelist antud pindala väärtusele lähim pindala väärtus ja võta sellele vastav läbimõõt. Näiteks pindala väärtusele 5,02 lähim tabelis leiduv väärtus on 5,03 ja sellele vastav läbimõõt 2,53. Tähendab, kui pindala $S = 5,02$, siis läbimõõt $d = 2,53$.

Kui antud ringi pindala väärtus ei kuulu vahemikku 0,79 kuni 78,5, siis läbimõõdu leidmiseks suurendame (või vähendame) seda väärtust 100 või 10 000 korda nii, et ta kuuluks sinna, leiame siis suurendatud (või vähendatud) pindala väärtusele vastava läbimõõdu ja vähendame (või suurendame) seda vastavalt 10 või 100 korda.

Näide. Olgu antud ringi pindala $0,235$ m². Suurendades seda 100 korda, saame $23,5$ m². Sellele vastav läbimõõt on $5,47$ m. Vähendades seda 10 korda, saame $0,547$ m. Tähendab, kui ringi pindala on $0,235$ m², siis läbimõõt on $0,547$ m.


876. Leia tabeli abil ringi läbimõõt, kui tema pindala on

a) $2,4$ dm², 13 dm², 53 cm², 248 cm², 4840 m², $0,8$ m², $0,075$ m², 100 m²;

b) $4,7$ dm², 16 dm², 855 m², 322 mm², 2100 m², $0,6$ m², $0,024$ km², 500 km².

877. Spordiplats kujutab endast ristkülikut, mille otstes on poolringid. Selle ristküliku mõõtmed on 120 m ja 80 m. Spordiplatsi äärel on jooksurajad, mis moodustavad 8 m laiuse riba (joon. 151).

- a) Kui suur on spordiplatsi kogupindala?
- b) Kui suur on jooksuradade all olev pindala?
- c) Kui suur on jooksuradade all oleva riba välimise ääre pikkus, kui suur on seesmise ääre pikkus ja kui suur on nende vahe?



Joon. 151.

878. Hobusekõietamise keti pikkus on 8,4 m. Kui suur pindala on maatükil, millelt hobune saab süüa rohtu?

879. Ristkülikukujulise väljaku igasse nurka tahetakse rajada veerandringi-kujuline ja keskele ringikujuline iluaed. Esimesed neist on raadiusega 7 m ja viimane raadiusega 6 m. Aia all minev pind tuleb katta mullaga nii, et igal ruutmeetril oleks seda 0,1 m³. Mitu autokoormat kulub selleks mulda, kui igas koormas on seda 3 m³?


880. a) Mitu protsenti moodustab korrapärase kõõlnelinurga pindala ringi pindalast?

Näpunäide. Ringi raadius olgu r . Kõõlnelinurga pindala leidmiseks vaata neid kaht kolmnurka, milledeks diagonaal jaotab selle nelinurga.

b) Mitu protsenti moodustab korrapärase kõõlkuusnurga pindala ringi pindalast?

881. Ümmarguse tiigi ümbermõõt on 132 m. Kui suur on tiigi pindala?


882. Arvuta joonisel 152 kujutatud väljaku pindala (hektarites) ja ümbermõõt.



Joon. 152.

SEKTORI PINDALA.

883. Kesknurga sees olevat ringi osa nimetatakse ringi sektoriiks. Kesknurga AOB (joon. 153) sees on ringi sektor AOB . Seda kesknurka nimetatakse sektori nurgaks ja kesknurgale vastavat kaart sektori kaareks. Antud ringi (kaare) raadiust nimetatakse ka sektori raadiuseks.



Joon. 153.

- Joonesta sektor, mille raadius on 5 cm ja kaar on 45° .
- Joonesta sektor, mille raadius on 5 cm ja kaar on 275° .
- Joonesta ilma malli kasutamisetä sektor, mille kesknurk on 60° .

d) Ringi raadius on 10 cm. Ring on jaotatud 10 võrdseks sektoriks. Arvuta iga sektori nurk ja kaare pikkus.

884. Olgu ringi pindala 240 mm^2 . Arvuta selle ringi sektori pindala järgmistel juhtumitel:

a) sektor on $\frac{3}{8}$ ringist;

b) ring on jaotatud 36-ks võrdseks sektoriks;

c) sektori nurk on 1° , 5° , 18° .

885. Tuletame sektori pindala valemi. Olgu sektori nurk n° . Selle sektori pindala leidmiseks märgime, et

360° -se sektori pindala on sama mis ringi pindala S ;

1° -se sektori pindala on ringi pindalast 360 korda väiksem, seega ta võrdub $\frac{1}{360} \cdot S$;

n° -se sektori pindala on 1° -se sektori pindalast n korda suurem ja võrdub seega $n \cdot \frac{1}{360} \cdot S = \frac{n}{360} \cdot S$.

Tähistades sektori pindala tähega R , saame valemi:

$$R = \frac{n}{360} \cdot S$$

Näide. Kui sektori raadius on 3,8 dm ja nurk on 72° , siis ringi pindala on tabeli järgi $45,4 \text{ dm}^2$ ja sektori pindala

$$R = \frac{72}{360} \cdot 45,4 = \frac{1}{5} \cdot 45,4 = 9,1 \text{ dm}^2.$$

Näitame, et sektori pindala saab arvutada veel järgmise eeskirja järgi:

sektori pindala võrdub kaare pikkuse ja raadiuse poole korrutisega.

Selle väite tõestamiseks asendame ülalloodud valemis ringi pindala S tema poole ümbermõõdu ja raadiuse korrutisega (vt. üles. 803), s. o. avaldisega $\frac{1}{2} cr$ ja teisendame valemit järgmiselt:

$$R = \frac{n}{360} \cdot S = \frac{n}{360} \cdot \frac{1}{2} cr = \frac{1}{2} \cdot \frac{n}{360} cr.$$

Et keskmine tegur $\frac{n}{360} c$ väljendab sektori kaare pikkust s , siis saamegi

$$R = \frac{1}{2} sr$$

mida oligi tarvis tõestada.

886. Arvuta sektori pindala, kui sektori nurk on 144° ja raadius on 25 cm.

887. Arvuta 48° -se sektori pindala, kui sektori raadius on 0,5 m.

888. Ringi raadius on 1 m ja sektori pindala on 1 m^2 . Mitu kraadi on sektori kaar?

889. Mitu kraadi on sektori nurk, kui sektori raadius on 8 cm ja pindala on $12,56 \text{ cm}^2$?

890. Ringi 56° -se sektori pindala on 84 cm^2 . Leia ringi pindala ja übermõõt.

891. Ringi sektori pindala on 65% ringi pindalast. Kui suur on sektori nurk?

892. Mitu protsenti ringi pindalast on 81° -se sektori pindala?

SILINDER.

893. Joonisel 154 kujutatud ümmargune pliiats, kilukarp, liimipurk ja pümanõu on oma kujult silindrid.




Joon. 154.


Silinder on piiratud kahe ringiga, mida nimetatakse silindri põhjadeks, ja silindri külgpinnaga (joon. 155). Silindri külgpind on piiratud silindri põhjade ringjoontega.

Nimeta veel silindrikujulisi kehi.

894. Silindrit nimetatakse pöördkehaks, sest ristküliku kiirel pöörlemisel ühe ta külje ümber näeme tekkivat silindrit. Külge



Joon. 155.



Joon. 156.


OO_1 (joon. 156), mille ümber ristkülik pöörleb, nimetatakse silindri teljeks. Silindri telg on ühtlasi ka silindri kõrguseks. Külge BB_1 , mis pöörlemisel tekitab silindri külgpinna, nimetatakse silindri moodustajaks.

Ristküliku küljed OB ja O_1B_1 tekitavad pöörlemisel silindri põhjad. Lõigud OB ja O_1B_1 on silindri põhjade raadiusteks.


895. Ristkülik, mille pikkus on 3 cm ja laius 1 cm, pöörleb kord pikema, kord lühema külje ümber. Joonesta sel teel tekkinud silindrite kujutised.

896. Ummarguste kehade läbimõõdu leidmiseks kasutatakse varbsirklit ja kobisirklit ehk tastrit (joon. 157).

Määra varbsirkli abil mõne silindrikujulise eseme läbimõõt.



Joon. 157.



Joon. 158.


897. a) Raudtoru väline läbimõõt on 6,4 cm ja seesmine läbimõõt 4,8 cm. Arvuta toru seina paksus.

b) Arvuta joonisel 158 kujutatud toru väline läbimõõt, kui toru seina paksus moodustab 5% seesmisest läbimõõdust.


SILINDRI PINNALAOTUS JA PINDALA.

898. Kata silindri külgpind ühekordselt paberiga, lõika vabaks jäävad paberiääred ära ja laota see leht tasapinnale (joon. 159).

Milline kujud on silindri külgpinna laotusel? Mis on selle ristküliku aluseks, mis kõrguseks?



Joon. 159.




Joon. 160.

Lõika paberist välja ka silindri põhjad ja kleebi silindri pinnalaotus vihkusse (joon. 160).

899. Silindri moodustaja on 4 cm ja põhja läbimõõt 2 cm. Arvuta silindri põhja übermõõt ja joonest silindri pinnalaotus.

900. Valmista kartongist silindri mudel, mille moodustaja on 8 cm ja põhja raadius 3 cm.

Selleks joonest kõigepealt silindri külgpinnalaotus, varusta see kleepimiseks vajalike äärtega ja lõika saadud kujund kartongist välja. Seejärel kleebi külgpind kokku, nagu joonisel 161 näidatud, ja aseta kohale ka põhjad.



Joon. 161.

901. Silindrikujuliste esemete valmistamisel on materjali hulga arvestamiseks vaja osata arvutada silindri pindala ja ruumala.


Silindri pindala ehk täispindala T koosneb külgpindalast K ja kahe põhja pindalast $2P$.

Avalda täispindala T külgpindala K ja põhjapindala P kaudu.

902. Silindri külgpindala leiame tema külgpinna laotusest. Et silindri külgpinna laotus on ristkülik, mille alus on võrdne silindri põhja ümbermõõduga ja kõrgus on võrdne silindri kõrgusega, siis

silindri külgpindala võrdub põhja ümbermõõdu ja kõrguse korrutisega.

Kui silindri põhja raadius on r ja kõrgus on h , siis põhja ümbermõõt on $2\pi r$ ja silindri külgpindala valem on:



Joon. 162.


$$K = 2\pi rh$$

Liites sellega põhjade pindala $2\pi r^2$, saame täispindala

$$T = 2\pi rh + 2\pi r^2$$

ehk

$$T = 2\pi r(h + r)$$



Joon. 163.

903. Arvuta silindri külgpindala, põhjade pindala ja täispindala, kui silindri põhja läbimõõt on 10 cm ja kõrgus 8 cm.

904. Silindri põhja raadius on 12 cm ja kõrgus 32 cm. Leia silindri külgpindala ja täispindala.

905. Kui palju plekki kulub silindrikujulise raudahju külginna katmiseks, kui ahju kõrgus on 2,4 m ja läbimõõt 1,2 m?

906. Joonisel 163 on antud silindri esivaade ja põhivaade. Arvuta silindri külgpindala.

907. Mitu ruutmeetrit plekki kulub vihma-veetoru valmistamiseks, kui toru pikkus on 8,5 m ja läbimõõt 12 cm ning valtsimiseks kulub 5% kogu materjalist?

908. Silindri kõrgus on a cm ja põhja läbimõõt b cm. Anna valem silindri külgpindala K ja täispindala T arvutamiseks.

909. a) Kuidas leida silindri kõrgust, kui on teada silindri külgpindala ja põhja ümbermõõt?

b) On antud silindri külgpindala ja kõrgus. Kuidas leida silindri põhja ümbermõõtu? läbimõõtu? raadiust?

910. Kui palju on vaja plekki silindrikujulise vabrikukorstna valmistamiseks, mille kõrgus on 12 m ja läbimõõt 6 dm?

911. Mitu ruutsentimeetrit plekki kulub silindrikujulise kaaneta nõu valmistamiseks, mille kõrgus on 5 cm ja põhja raadius 5 cm?


912. On vaja värvida 200 silindrikujulist posti. Iga posti kõrgus on 5 m ja läbimõõt 35 cm. Kui palju kulub selleks värnitsat, kui 1 m² värvimiseks kulub seda 0,2 kg?

913. Silindrikujulise konservipurgi põhja raadius on 6 cm ja kõrgus 15 cm. Kui palju plekki kulub selle purgi valmistamiseks?

914. Mitu tahvlit plekki mõõtmetega 142 cm $\times$ 71 cm on vaja 20 silindrikujulise veepange valmistamiseks, kui pange läbimõõt on 30 cm ja kõrgus 40 cm? Pange külj ja põhi valmistatakse tervest plekitükist.

SILINDRI RUUMALA.

915. Kui võtta risttahukas ja silinder, mille põhjade pindalad on võrdsed ja kõrgused on võrdsed, täita üks neist liivaga ja valada see liiv teisesse, siis selgub, et nende kehade ruumalad on



Joon. 164.

võrdsed. Et risttahuka ruumala võrdub tema põhja pindala ja kõrguse korrutisega, siis ka

silindri ruumala võrdub tema põhja pindala ja kõrguse korrutisega:

$$V = P \cdot h.$$

Et silindri põhja pindala $P = \pi r^2$, siis asendamisel saame

$$V = \pi r^2 h$$

916. Võta mingi silindrikujuline nõu, mõõda tema põhja läbimõõt ja kõrgus ning arvuta põhja pindala ja nõu ruumala. Kontrolli tulemust otsese mõõtmise teel, kasutades mõõtklaasi.

917. Mitu liitrit vett sisaldab silindrikujuline nõu, mille kõrgus on 9 dm ja sisemine läbimõõt 6 dm?

918. Silindrikujulise piimanõu põhja raadius on 8 cm ja kõrgus 30 cm. Mitu liitrit piima mahutab see nõu?

919. 90 cm pikkune ja 60 cm läbimõõduga raudplekist vaat on täidetud bensiiniga (erikaal 0,7). Kui palju kaalub see bensiin?

920. Silindrikujulise basseini läbimõõt on 9,1 m, vee sügavus basseinis on 70 cm. Mitu kuupmeetrit vett sisaldab see bassein?

921. Vasktraadi läbimõõt on 1 mm. Kui palju kaalub 50 m seda traati, kui vasktraadi erikaal on 8,9?


922. Kui palju kaalub 100 m vasktraati ($\varnothing$ 2 mm, erikaal 8,9)?

923. Arvuta, kui palju kaalub silindrikujuline kuiv männipalk (erikaal 0,52), mille pikkus on 5 m ja läbimõõt 16 cm.

924. Klaaspurgi sisemine läbimõõt on 15 cm ja kõrgus 30 cm. Mitu liitrit keedist mahutab see purk?

925. Silindrikujulise kaevu läbimõõt on 12 dm. Mitu liitrit vett on selles kaevus, kui vee sügavus selles on 2,1 m?

926. Betoonist silindrikujulise kaevurakke (joon. 165) kõrgus on 8 dm, rakke sisemine läbimõõt 7,8 dm ja väline läbimõõt 9,2 dm. Kui palju kaalub see kaevurake? Betooni erikaal on 2,2.



Joon. 165.

927. Kui palju kaalub 4 m ümarrauda ($\varnothing$ 40 mm)?

928. Kera terastraati (erikaal 7,85), läbimõõduga 5 mm, kaalub 77 kg. Mitu meetrit on selles kera traati?

929. Silindrikujuline veenõu sisaldab 180 l vett. Veenõu kõrgus on 1 m. Kui suur on selle veenõu põhja läbimõõt?

930. Silindrikujulise klaaspurgi sisemine läbimõõt on 18 cm. Kui kõrgel on veepind purgis, kui sinna valada 1 l vett?

931. 3 m pikkusest palgist, mille ristlõige on ruut küljepikkusega 40 cm, on vaja valmistada võimalikult suure läbimõõduga ümmargune võll. Kui suur on seejuures puidu kadu kuupdetsimeetrites ja protsentides?



932. Silindrikujulise mõõtklaasi sisemine läbimõõt on 40 mm ja iga kriipsuvahe 5 cm³. Kui suur on kahe teineteisele järgneva kriipsu vaheline kaugus?

933. Silindrikujulise naftapaagi läbimõõt on 11 m. Nafta pind on paagis 4 m kõrgusel. Kui palju kaalub paagis olev nafta (erikaal 0,76)?

934. On vaja valmistada 1 liitri mahutavusega nõu, mille põhja läbimõõt on 8,6 cm. Kui kõrge peab olema see nõu?

935. Silindrikujuline teeklaas, mille sisemine läbimõõt on 5,6 cm, on pooleni täidetud veega. Pärast seda kui klaasi lasti kivi, mis kaalus 128 g, tõusis vee pind 2 cm võrra. Arvuta kivi erikaal.


KOONUS.




Joon. 166.

936. Vaatle joonisel 166 kujutatud tornide katuseid, lambivarju, telgi katust. Niisuguse kujuga kehi nimetatakse koonusteks.

Koonus on piiratud ühe ringiga, mida nimetatakse koonuse põhjaks, ja koonuse külgpinnaga. Külgpind on piiratud ühelt poolt koonuse tipuga ja teiselt poolt koonuse põhja ringjoonega (joon. 167).



Joon. 167.



Joon. 168.

Nimeta veel koonusekujulisi kehi.

937. Koonust nimetatakse **pöördkehaks**, sest täisnurkse kolmnurga kiirel pöörlemisel ühe kaateti ümber näeme tekkivat koonust (joon. 168). Kaatetit, mille ümber toimub pöörlemine, nimetatakse **koonuse teljeks**, ühtlasi on ta ka **koonuse kõrguseks**; hüpoteenuusi, mis tekitab koonuse külgpinna, nimetatakse koonuse **moodustajaks**. Pöörleva kolmnurga teine kaatet tekitab koonuse põhja. See kaatet on koonuse **põhja raadiuseks**.

938. Nimeta joonise 168 põhjal a) millise külje ümber pöörleb kolmnurk ABC ja milleks on see külg koonusel? b) mille moodustab kaatet AC ja milleks on ta koonusel? c) mille moodustab hüpoteenus AB ja milleks on AB koonusel?


939. a) Mis kujuline katus ehitatakse tavaliselt prismakujulisele tornile? silindrikujulisele tornile?

b) Kuiva liiva, viljateri, väiksemaid kive jne. ei saa panna prisma- või püramiidikujulisse hunnikusse. Missuguse kuju võtavad need hunnikud tavaliselt?


940. Arvuta koonuse põhja ümbermõõt, kui põhja raadius $r = 4$ cm; 1,5 dm.

KOONUSE PINNALAOTUS JA PINDALA.


941. Kata mingi koonuse külgpind ühekordselt paberiga, lõigates üleliigsed ääred ära, ja laota see paberileht tasapinnale (joon. 169). Nii saad koonuse külgpinna laotuse.



Joon. 169.



Joon. 170.



Missugune kuju on koonuse külgpinna laotusel? Mis on selle sektori raadiuseks ja millega võrdub sektori kaar?

Lõika välja ka koonuse põhi ja kleebi koonuse pinnalaotus vihikusse.

Koonuse külgpinna laotus on ringi sektor, mille raadius võrdub koonuse moodustajaga ja kaare pikkus võrdub koonuse põhja ümbermõõduga.

942. Koonuse külgpinna laotus on sektor, mille raadius on 10 cm ja nurk on 90° . Arvuta koonuse põhja raadius. Joonesta antud külgpinna laotus, varusta see kleepimiseks vajalike ääretega, lõika paberist välja ning kleebi kokku koonuse mudel (joon. 170). Mõõda saadud koonuse põhja raadius ja võrdle tulemust arvutuse tulemusega.

943. Koonuse külgpinna laotus on ringi sektor, mille raadius on 8,4 cm ja nurk on 60° . Kui pikk on koonuse põhja raadius?

944. Koonuse põhja raadius on 5 cm ja moodustaja on 8 cm. Kui pikk on külgpinna laotuse kaar ja kui suur on selle nurk?

945. Koonuse põhja raadius on 1 dm ja moodustaja 2 dm. Kui suur on selle koonuse külgpinna laotuse pindala ja kui suur on koonuse külgpindala?

946. a) Tuletame valemi koonuse külgpindala K arvutamiseks. Olgu koonuse põhja raadius r ja moodustaja m . Siis külgpinna laotusena saadava sektori raadius on m ja kaare pikkus $s = 2\pi r$ (joon. 171). Et sektori pindala võrdub kaare pikkuse ja raadiuse poole korrutisega, siis koonuse külgpindala

$$K = \frac{2\pi r \cdot m}{2}$$

ehk

$$K = \pi r m$$

Koonuse külgpindala võrdub tema põhja ümbermõõdu ja moodustaja poole korrutisega.

Näide. Kui koonuse põhja raadius on 60 mm ja moodustaja on 100 mm, siis koonuse külgpindala

$$K = \pi \cdot 60 \cdot 100 = 18\,800 \text{ mm}^2 \approx 190 \text{ cm}^2.$$

b) Liites koonuse külgpindalaga $\pi r m$ tema põhja pindala πr^2 , saame koonuse täispindala:


$$T = \pi r m + \pi r^2$$

ehk

$$T = \pi r(m + r)$$

Näide. Kui koonuse põhja raadius $r = 4 \text{ cm}$ ja moodustaja $m = 6 \text{ cm}$, siis koonuse täispindala

$$T = \pi \cdot 4(6 + 4) = \pi \cdot 4 \cdot 10 = 40 \cdot 3,14 = 125,6 \approx 126 \text{ cm}^2.$$



Joon. 171.

947. Kuidas arvutada korrapärase püramiidi külgpindala?

Avalda joonisel 172 kujutatud püramiidide külgpindala, kui püramiidi põhiserv on a ja apoteem on m .

Võrdle koonuse ja korrapärase püramiidi külgpindala arvutamise eeskirju.







948. Arvuta külgpindala koonusel, mille põhja raadius on 4 cm ja moodustaja 6,5 cm.

949. Arvuta koonuse täispindala, kui koonuse põhja läbimõõt on 8 cm ja moodustaja 10 cm.

950. Arvuta täispindala koonusel, mille põhja raadius on 1,2 dm ja moodustaja 1,8 dm.

951. Mitu ruutmeetrit riidet kulub koonusekujulise telgi katmiseks, kui telgi kõrgus on 2,3 m ja põhja läbimõõt 3,4 m?

Näpunäide. Moodustaja leia vähendatud joonise abil (ruudulisel paberil).



Joon. 172.

952. Mitu ruutmeetrit plekki kulub torni koonusekujulise katuse katmiseks, kui katuse kõrgus on 3,8 m, torni läbimõõt 8,4 m ja kui valtsimiseks kulub 5% kogu materjalist?

953. Koonusekujulise katuse räästa pikkus on 15,7 m ja moodustaja 7,0 m. Kui suur on selle katuse pindala?

954. Koonuse põhja pindala on $28,26 \text{ dm}^2$ ja moodustaja 4,5 dm. Arvuta selle koonuse täispindala.

955. Koonuse külgpindala on $3,8 \text{ m}^2$ ja moodustaja 1,5 m. Kui suur on selle koonuse põhja raadius?

956. Täisnurkne kolmnurk, mille küljed on 3 m, 4 m ja 5 m, pöörleb pikema kaateti ümber. Kui suur on pöörlemisel tekkiiva koonuse täispindala?


KOONUSE RUUMALA.

957. Koonuse ruumala arvutamise eeskirja leidmiseks kasutame võrdsete kõrgustega ja võrdsete põhjadega silindri ja koonuse õõnsaid mudeleid (joon. 173). Mõõtes, mitu koonusetäit liiva mahub sellesse silindrisse, selgub, et silindri ruumala on kolm korda suurem koonuse ruumalast (joon. 174). Et silindri ruumala


võrdub põhja pindala ja kõrguse korrutisega, siis tehtud katse järgi

koonuse ruumala võrdub põhja pindala ja kõrguse ühe kolmandiku korrutisega:

$$V = \frac{1}{3} Ph$$



Joon. 173.



Joon. 174.

958. Tähistades koonuse põhja raadiuse tähega r ja kõrguse tähega h , koosta koonuse ruumala valem:

koonuse põhja pindala on ... ,

põhja pindala ja kõrguse korrutis on ... ,

koonuse ruumala

$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

959. Kasutades ringi pindala tabelit, arvuta allpool antud and-
meil koonuse ruumala.

r	1 cm	3 cm	3,2 dm	2,5 dm	1 m	3,5 m
h	3 cm	4 cm	5 dm	4,8 dm	2,5 m	5,2 m
πr^2						
$\pi r^2/h$						

960. Koonuse ruumala võib arvutada ka teisiti: kui r^2 või h on jaguv 3-ga, siis ei tarvitse korrutist $\pi r^2 \cdot h$ jagada 3-ga, vaid võib kas r^2 või h jagada 3-ga. Seega koonuse ruumala

$$V = \frac{\pi r^2 \cdot h}{3} = \pi r^2 \cdot \frac{h}{3} = \pi \frac{r^2}{3} \cdot h.$$

961. Koonusekujulise liivakuhja kõrgus on 1,2 m ja põhja raadius 0,8 m. Kui palju on selles kuhjas liiva?

962. Mitu 1,5-tonnise kandejõuga auto koormat liiva (erikaal 1,4) saab hunnikust, mille kõrgus on 1,5 m ja übermõõt 10,7 m?

963. Koonusekujulise kartulikuha übermõõt on 11,9 m ja kõrgus 1,6 m. Mitu tonni kartuleid on selles kuhjas, kui 1 hl kartuleid kaalub 72 kg?

964. Koonuse kõrgus on 6,0 m ja põhja übermõõt 15,7 m. Leia selle koonuse ruumala.

965. Kuidas leida koonuse kõrgus, kui on antud koonuse ruumala ja põhja pindala?

966. Kuidas leida koonuse põhja pindala, kui on teada koonuse ruumala ja kõrgus?

967. Koonuse ruumala on 2411 cm^3 ja põhja raadius $8,0 \text{ cm}$. Leia koonuse kõrgus.

968. Koonuse põhja raadius on $4,5 \text{ cm}$ ja moodustaja $7,0 \text{ cm}$. Leia selle koonuse ruumala.

Näpunäide. Koonuse kõrgus leia joonise abil.

969. Rauast (erikaal $7,8$) koonuse põhja läbimõõt on $10,4 \text{ cm}$ ja kõrgus $1,7 \text{ dm}$. Kui palju kaalub see koonus?

970. Puust (erikaal $0,6$) koonuse põhja raadius on $4,8 \text{ cm}$ ja kõrgus $12,0 \text{ cm}$. Kui palju kaalub see koonus?

971. Metallist koonuse põhja raadius on $2,2 \text{ cm}$ ja kõrgus $4,5 \text{ cm}$. Kui palju jääb see koonus kergemaks, kui teda kaaluda nõõri otsas vette lastuna?


972. Kui palju kaalub vasest (erikaal $8,8$) koonus vees, kui koonuse põhja läbimõõt on $4,0 \text{ cm}$ ja kõrgus $5,0 \text{ cm}$?

973. Koonusekujulise kivisöehunniku ümbermõõt on $5,2 \text{ m}$ ja kõrgus $2,2 \text{ m}$. Kui palju kaalub see kivisüsi, kui 1 m^3 sütt kaalub $1,3 \text{ t}$?

KERA.

974. Jalgpall, gloobus, lambikuppel ja õhupall on kerakujulised kehad (joon. 175).

Nimeta veel kerakujulisi kehi.




Joon. 175.

Kera on piiratud kõverpinnaga, mida nimetatakse **kerapinnaks** ehk **sfääriks**. Sfäär on niisugune pind, mille kõik punktid asetsevad ühest kindlast punktist ühel ja samal kaugusel. Seda punkti nimetatakse sfääri (ka kera) **keskpunktiks** (punkt O joonisel 176).


Sirglõik, mis ühendab kera pinna mingi punkti kera keskpunktiga, on kera **raadius** (OC joonisel 176). Ühe ja sama kera raadiused on võrdsed. Sirglõiku, mis ühendab kaht kera pinna punkti ja läbib kera keskpunkti, nimetatakse kera **läbimõõduks** ehk **diameetriks** (AB joonisel 176).

Kera läbimõõt on kera raadiusest kaks korda pikem: kui kera raadius on r cm, siis läbimõõt $d = 2r$ cm.

Kuidas mõõta kera läbimõõtu?



Joon. 176.




Joon. 177.

975. Kerapind on kõverpind, nagu silindri ja koonuse külgpindki. Viimastest erineb kerapind selle poolest, et kerapinnale ei saa üheski sihis joonestada sirgeid (joon. 177).



Mitmes sihis saab sirgeid joonestada silindri külgpinnal läbi selle pinna mingi punkti?

Lahenda sama küsimus koonuse külgpinna kohta.

976. Võta võimalikult kerakujuline kartul või õun. Lõika see noaga kaheks osaks (joon. 178). Mis kujuline on saadud lõige? Tee veel samalaadilisi lõikeid. Mis kujuline on iga lõige?



Joon 178.






Joon. 179.

977. Kera lõiget, mis läbib kera keskpunkti, nimetatakse kera suurringiks (joon. 179).

Miks nimetatakse seda lõiget suurringiks? Mis on kera suurringi raadiuseks?


Kera suurringid on omavahel võrdsed, sest iga suurringi läbimõõt võrdub kera läbimõõduga. Suurring poolitab kera ja kera pinna.



Joon. 180.

978. Joonesta joonestuspaberile 3 võrdset ringi, lõika need välja ja tee neile sisselõiked, nagu on näidatud joonisel 180. Pane need ringid kokku joonisel 181 näidatud «tuulekeraks».

Mitmest ringist on koostatud «tuulekera» ja mis need ringid on «tuulekera» suhtes? Mis võib öelda nende kolme suurringi lõikejoonte kohta?




Joon. 181.

979. Maa kujutab endast suurt kera, mille raadius on 6371 km. Meridiaanid on selle kera suurringjooned, samuti on suurringjoon ka ekvaator.

Vaatle gloobust ja tee kindlaks, kas **paralleelid** on suurringjooned (joon. 182).


Kui suur on ekvaatori läbimõõt? meridiaani läbimõõt? Kui pikk on meridiaani kaar ekvaatorist pooluseni?



Joon. 182.

980. Kui ringjoon pöörleb kiiresti oma diameetri ümber, siis näeme tekkivat kerapinda (joon. 183). Sfäär on seega **pöördepind** ja kera — **pöördkeha**.

Mis tekib poolringi pöörlemisel tema läbimõõdu ümber?



Joon. 183.

981. a) Kera läbimõõt on 12 cm. Kui suur on selle kera suur-
ringi pindala?

b) Kera raadius on 3,5 dm. Kui suur on selle kera suurringi
pindala?

KERA PINDALA.


982. Varem tundmaõpitud pöördkehade (silindri ja koonuse)
külgpindala arvutamise eeskirja leidsime nende pinnalaotuse abil.

Selgita, kas ka kerapinda saab laotada tasapinnale. Selleks
katsu mõnda kerakujulist eset (näiteks kummipalli, gloobust)
paberilehega katta. Mis selgub?

Kui käepärast on poolik kummipall, siis proovi seda laotada
tasapinnale. Kas see on võimalik ilma pinna väljavenitamisetä või
kokkusurumiseta?

Kerapinda ei saa tasapinnale laotada.

983. Et kerapinda ei saa tasapinnale laotada, siis kasutame
kera pindala määramiseks teistsugust võtet. Alljärgnev joonis



Joon. 184.

näitab, kuidas kera pindala saab võrrelda selle kera suurringi
pindalaga. Selleks mähime jämedat nööri tihedalt esiteks pool-
kera kõverale pinnale ja pärast mähime sama nööri suurringi pin-
nale. Nööri mõõtes selgub, et poolkera kõvera pinna katmiseks
kulub nööri kaks korda rohkem kui suurringi katmiseks.

Mitu korda on poolkera kõvera pinna pindala suurem suur-
ringi pindalast? Mitu korda on terve kera pindala suurem suur-
ringi pindalast?

See katse näitab, et

kera pindala on neli korda suurem sama kera suurringi pindalast.

Kui kera raadius on r , siis suurringi pindala on πr^2 ja eelneva põhjal kera pindala

$$S = 4 \pi r^2$$

984. Täida järgmise tabeli tühjad kohad.

Suurringi pindala	15 cm ²	3,5 m ²			0,35 dm ²	
Kera pindala			1 m ²	72 cm ²		3,48 dm ²

985. Kera raadius on 5 cm. Arvuta kera pindala.

986. Arvuta kera pindala, kui kera läbimõõt on 36 cm.

987. Võrkpalli läbimõõt on 21 cm. Kui palju nahka kulub palli kesta valmistamiseks, kui õmblusteks arvestada 15% palli pindalast?

988. a) Mõõda vajalikud suurused ja arvuta kooli gloobuse pindala.

b) Arvuta Maa pindala (vt. ülesanne 979).

989. Kera suurringi pindala on 19,6 dm². Kui suur on selle poolkera täispindala?

990. Mitu ruutmeetrit riiet kulub õhupalli kesta valmistamiseks, kui palli läbimõõt on 20 m ja õmblusteks arvestada 5% õhupalli pindalast?

991. Leia poolkera täispindala, kui kera läbimõõt on 5 dm.

992. Kera ümbermõõt on 24,5 dm. Arvuta kera pindala.

993. Kooli gloobuse ümbermõõt on 157 cm. Mitu ruutsentiimeetrit on sellel gloobusel Euroopa pindala, kui Euroopa pindala moodustab ligikaudu 2% maakera pindalast?


994. Kui palju plekki on vaja poolkerakujulise kuppelkatuse katmiseks, kui katuse läbimõõt on 6,0 m?

995. Täida järgmine tabel.

Kera raadius (dm)	4	5,9	8,7	0,6	120
Suuringi pindala (dm ²)					
Kera pindala (dm ²)					

KERA RUUMALA.

996. Kera ruumala arvutamise eeskirja leidmiseks kasutame joonisel 185 kujutatud koonuse ja poolkera õõnsaid mudeleid. Jooniselt näeme, et koonuse kõrgus ja põhja raadius peavad olema



Joon. 185.

võrdsed poolkera raadiusega. Mõõtes, mitu koonusetäit liiva mahub sellesse poolkerasse, näeme, et poolkera ruumala on koonuse ruumalast kaks korda suurem. Et kasutatud koonuse ruumala on

$$\frac{1}{3} \cdot \pi r^2 \cdot r = \frac{1}{3} \pi r^3,$$

siis poolkera ruumala on

$$2 \cdot \frac{1}{3} \pi r^3 = \frac{2}{3} \pi r^3$$

ja kera ruumala

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

Sellele valemile saab anda kuju

$$V = \frac{1}{3} \cdot 4\pi r^2 \cdot r,$$

millest nähtub, et

kera ruumala võrdub kera pindala ja raadiuse ühe kolmandiku korrutisega.

997. Täida järgmine tabel.

Kera raadius (m)	0,10	0,30	0,80	2,0	4,0	10,0
Kera pindala (m ²)	0,126	1,13	8,04	50,3	201	1256
Kera ruumala (m ³)						

998. Täida järgmine tabel.

Kera raadius (cm)	1,0	8,0	20	30	50
Suuringi pindala (cm ²)					
Kera pindala (cm ²)					
Kera ruumala (cm ³)					

999. Kera ruumala arvutamise lihtsustamiseks leiame teguri, millega tuleb korrutada raadiuse kuubi, et saada kera ruumala:

$$\frac{4}{3} \pi \approx 4,19.$$

Seda teades võime kirjutada

$$V \approx 4,19 r^3$$

1000. Arvuta eelmises ülesandes antud eeskirja järgi kera ruumala tabelis antud raadiuste põhjal.

r (cm)	2,0	5,0	7,0	10,1	$\frac{1}{2}$	1,2	2,5	$1\frac{1}{3}$
r^3 (cm ³)								
V (cm ³)								

1001. Näita, et läbimõõdu d kaudu avaldub kera ruumala järgmiselt:

$$V \approx 0,52 d^3$$

Arvuta kera ruumala tabelis antud läbimõõdu põhjal.

d (cm)	3,0	4,0	6,0	8,0	9,5	12	$\frac{1}{2}$	$3\frac{1}{3}$
d^3 (cm ³)								
V (cm ³)								

1002. Arvuta kera ruumala, kui kera läbimõõt on 14 cm.

1003. Arvuta kera ruumala, kui kera raadius on 3,00 m.

1004. Kui palju kaalub rauast kera, kui kera raadius on 18 cm?

1005. Puust kerakujulise kuuli läbimõõt on 6,5 cm. Kui palju kaalub see kera, kui puu erikaal on 0,6?

1006. Kas sa jõuad üles tõsta korgist kera, mille läbimõõt on 1 m? Korgi erikaal on 0,24.


1007. Kui palju kaaluvad 100 teraskuuli, kui ühe kuuli läbimõõt on 5 mm ja terase erikaal on 7,83?

1008. Mitu protsenti materjali läheb kaotsi, kui kuubist treida võimalikult suur kera?

1009. Kuidas suhtuvad kahe kera ruumalad, kui ühe kera raadius on teise kera raadiusest kaks korda suurem?

1010. Kuidas suhtuvad kahe kera pindalad, kui ühe kera raadius on teise kera raadiusest kaks korda suurem?

1011. Poolkera suurringile, mille raadius on r , on paigutatud koonus raadiusega r ja kõrgusega r (joon. 186).



Joon. 186.

Kui suur on tekkinud keha ruumala?

1012. Kui palju kaalub rauast vanaaegne kahurikuul läbimõõduga 10 cm? Raua erikaal on 7,8.

1013. Mitu liitrit vett mahutab 40-sentimeetrise läbimõõduga poolkerakujuline pada?

1014. Ühe ja sama hinnaga saaks osta kaks õuna läbimõõduga 6 cm või ühe õuna läbimõõduga 8 cm. Kumb ost on kasulikum?

1015. Joonis 187 kujutab Tallinna torni «Kiek in de Kök» läbilõikes. Torni müüride paksus on 3,7 m. Arvuta järgmised suurused.


1) Torni katuse pindala. Puuduvate mõõtmete leidmiseks tee vähendatud joonis.

2) Torni välispindala (ilma katusest).

3) Torni iga korruse poolkerakujulise lae pindala.

4) Torni seinteks vajamineva pae kogus (akna- ja ukseavasid arvesse võtmata).

5) Torni seinte kaal, kui pae erikaal on 2,5.



Joon. 187.

9. ÜHE TUNDMATUGA LINEAARSED VÖRRANDID.

SAMASUS.

1016. Teisendame avaldist $(2x + 1)^2 - (4x^2 + 1)$, avades selles sulud ja koondades sarnased liikmed:

$$(2x + 1)^2 - (4x^2 + 1) = 4x^2 + 4x + 1 - 4x^2 - 1 = 4x.$$

Kirjutame võrduse, mille üheks pooleks on antud avaldis ja teiseks pooleks teisendamisel saadud avaldis:

$$(2x + 1)^2 - (4x^2 + 1) = 4x.$$

Kui selle võrduse mõlemal poolel asendada täht x mistahes vabalt võetud väärtusega ja arvutada võrduse poolte väärtused, siis selgub, et need on võrdsed. Näiteks, kui x asendada arvuga 3, siis võrduse vasaku poole väärtus

$$v = (2 \cdot 3 + 1)^2 - (4 \cdot 3^2 + 1) = 7^2 - 37 = 49 - 37 = 12$$

ja parema poole väärtus

$$p = 4 \cdot 3 = 12,$$

seega $v = p$. Selles ei ole midagi üllatavat, sest sulgude avamine ja sarnaste liikmete koondamine on teisendused, mille puhul avaldise väärtus ei muutu.

Teisendust, mille puhul avaldise väärtus ei muutu, nimetatakse samasusteisenduseks.

Sulgude avamine ja sarnaste liikmete koondamine on seega samasusteisendused.

1017. Otsusta iga allpool nimetatud teisenduse kohta, kas see on samasusteisendus või mitte. Kui teisendus ei ole samasusteis-

sendus, siis otsusta, kuidas avaldise väärtus nimetatud teisendusel muutub.

- 1) Hulkliikme liikmete ühise teguri toomine sulgude ette.
- 2) Avaldise jagamine 3-ga, näiteks üleminek avaldiselt $3a + 6$ avaldisele $a + 2$.
- 3) Kahe arvu summa ja vahe korrutise asendamine nende arvude ruutude vahega.
- 4) Murru laiendamine.
- 5) Murdude liitmise reegli rakendamine.
- 6) Murru korrutamine 4-ga, näiteks üleminek murrult $\frac{a}{8}$ murrule $\frac{a}{2}$.
- 7) Murde sisaldava avaldise korrutamine nende murdude ühise nimetajaga.
- 8) Hulkliikme lahutamine tegureiks.
- 9) Hariliku murru teisendamine kümnendmurruks.

1018. Võrdust, mille ühest poolest saab samasusteisenduste abil teise poole, nimetatakse samasuseks. Samasuses võib tähe asendada vabalt võetud arvuga, ilma et võrdus kaotaks kehtivust.

Näiteks järgmised võrdused on samasused:

- 1) $(2a - b)^2 = 4a^2 - 4ab + b^2$;
- 2) $3x - \frac{1-x}{2} = \frac{7x-1}{2}$;
- 3) $1 - 9a^4 = (1 + 3a^2)(1 - 3a^2)$;
- 4) $0,75 - \frac{1}{4} = 0,5$.

Nimeta iga võrduse puhul need teisendused, mille abil saab võrduse ühest poolest teise.

Märkus. Samasuse tähiseks on $\equiv$, kuid seda sümbolit kasutatakse ainult siis, kui soovitakse eriti rõhutada, et tegemist on samasusega. Niisugusel juhtumil tuleks näiteks kirjutada, et

$$(a - 2)^2 - 4 \equiv a^2 - 4a + 4 - 4 \equiv a^2 - 4a \equiv a(a - 4).$$

Kui samasust pole vaja eriti rõhutada, siis kasutatakse samasuse märkimiseks harilikku võrdusmärki $=$. Nii võib ülal antud samasust kirjutada ka kujul

$$(a - 2)^2 - 4 = a^2 - 4a + 4 - 4 = a^2 - 4a = a(a - 4).$$

1019. Tõesta, et järgmised võrdused on samasused.

$$1) \frac{a}{2}(4x-1) - \frac{a}{3}(6x-2) = \frac{a}{6}$$

$$2) 3mn - 2m - 12 + 18n = (3n-2)(m+6)$$

$$3) 6x^2 - 5x - 4 = (3x-4)(2x+1)$$

$$4) (m^2 + 2mn + n^2)(m^2 - 2mn + n^2) = (m^2 - n^2)^2$$

$$5) (3 - 1 : \frac{2}{3}) : (4 - 1 : 1\frac{1}{3}) = \frac{6}{13}$$

Näpunäide. Tõestuseks näita, et võrduse ühest poolest (ükskõik kummast) saab samasusteisenduste teel teise poole.

1020. Kas antud võrdus on samasus või mitte, seda saab otsustada ka proovimise teel. Selleks asenda võrduses esinev täht (või tähed, kui neid on mitu) mõnede vabalt võetud arvudega ja kontrolli arvutamise teel, kas võrdus jääb kehtima või mitte.

Mida võib öelda võrduse kohta, mis ei jää kehtima tähe asendamisel mingi arvuga?

Kontrolli proovimise teel, kas järgnevad võrdused on samasused või mitte:

$$1) (3+a)^2 - (3-a)^2 = 12a$$

$$2) (1-a)^2 - (a-1)^2 = 0$$

$$3) 4(a-1) = 0$$

$$4) a^2 = 3a - 2$$

$$5) a^2 - b^2 = b^2 - a^2$$

1021. Näita arvutamise teel, et

$$1) \text{ võrdus } 2a^2 - 3a = 3a \text{ on õige, kui } a = 3;$$

$$2) \text{ võrdus } 6 + \frac{2a}{2-a} + \frac{4}{a-2} = 4 \text{ on õige, kui } a = 1;$$

$$3) \text{ võrdus } 5x + 8 = x \text{ on õige, kui } x = -2;$$

$$4) \text{ võrdus } 6x - 2(3x - 1) - 2 = 0 \text{ on õige, kui } x = 0.$$

Näita nüüd proovimise teel, et mõned nendest võrdustest ei ole samasused. Missugused nimelt?

Iga võrdus ei ole samasus.

1022. Koosta iga järgneva lause põhjal võrdus ja otsusta, kas saadud võrdus on samasus või mitte.

$$1) \text{ Arv } 5a \text{ on } 3a \text{ võrra suurem kui } 2a.$$

- 2) Arv $7m$ on 6 võrra väiksem kui $10m$.
- 3) Arv x on 4 võrra väiksem kui 12.
- 4) Arv x on 4 korda väiksem kui arv y .
- 5) Arvude a ja 3 jagatis võrdub poolega nende arvude summast.
- 6) Arvude x ja 4 ruutude vahe on 16 võrra väiksem arvu x ruudust.
- 7) Arvude x ja 1 summa ruut on $2x$ võrra suurem samade arvude ruutude summast.

VÕRRANDI LAHENDID.

1023. Mida nimetatakse võrrandiks? Kasutades tehetes esinevate arvude vahelisi seoseid, lahenda peast järgmised võrrandid.

a) $x + 4 = 11$	b) $x + 7 = 2$	c) $x + 1 = 7$	d) $x + 5 = 3$
$y - 2 = 7$	$y - 3 = 0$	$y - 2 = 10$	$y - 6 = -4$
$6 - z = 1$	$2 - z = 3$	$15 - z = 9$	$74 - z = 80$
$5u = 0,1$	$3u = 7$	$5u = -1$	$-3u = \frac{1}{3}$
$21 : v = 7$	$4 : v = 0,5$	$15 : v = 3$	$18 : v = -2$

Missuguseid tehetes esinevate arvude omadusi tuleb kasutada tulbas a antud võrrandite lahendamisel?

1024. Olgu antud võrrand $x^2 = x + 6$. Kui selles x asendada arvuga 2, siis saame mittevõrdsed tulemused: $2^2 \neq 2 + 6$. Kui aga x asendada arvuga 3, siis saame võrdsed tulemused:

$$3^2 = 3 + 6.$$

Kui võrrandis tundmatu asendamisel mingi arvuga võrrandi pooled osutuvad võrdseteks, siis öeldakse, et see arv rahuldab võrrandit.

Kas arv 3 rahuldab võrrandit $x^2 = x + 6$? Aga arv 2?

Proovi, kas arvudest 0, -1 , -2 ja -3 mõni rahuldab võrrandit $x^2 = x + 6$.

Võrrandit rahuldavat arvu nimetatakse võrrandi lahendiks.

Näiteks arv 3 on võrrandi $x^2 = x + 6$ lahendiks, samuti ka arv -2 .

1025. Leia proovimise teel, kas arvude 0, 2, -2 , 5, -5 hulgas leidub võrrandi

$$\frac{4x-1}{x-2} = 3$$

lahendit.

1026. a) Näita, et arvud 5 ja -3 on võrrandi $x^2 = 2x + 15$ lahenditeks.

b) Näita, et arvud -1 , $+1$, -2 ja $+2$ rahuldavad võrrandit $(x^2 - 1)(x^2 - 4) = 0$. Mitu lahendit leidsid sellel võrrandil?

1027. Mis liiki arv on positiivse arvu ruut? negatiivse arvu ruut? nulli ruut? Kas leidub niisugune arv, mille ruut võrdub -4 ? Kas leidub lahendit võrrandil

$$x^2 = -4; x^2 = -9; x^2 + 1 = 0; x^2 + 100 = 0?$$

1028. a) Missuguse arvu jagamisel 5-ga saadakse 0? Mis on lahendiks võrrandil

$$\frac{x}{5} = 0; \frac{x}{10} = 0; x : 2\frac{1}{3} = 0; x : 0,05 = 0?$$

b) Kas leidub arvu, millega arvu 1 jagades saadakse 0? Kas leidub lahendit võrrandil

$$\frac{1}{x} = 0; \frac{5}{x} = 0; 0,5 : x = 0; 1\frac{1}{4} : x = 0?$$

1029. Mis on lahendiks võrrandil

$$\frac{x}{2} = 1; \frac{x}{2} = 0; \frac{2}{x} = 1?$$

Võrrandil võib olla üks või mitu lahendit. Võrrandil võib ka lahend puududa.

VÖRRANDI PÕHIOMADUSED.

1030. Rakendades tehetes esinevate arvude vahelisi seoseid, põhjenda järgmisi väiteid:

- 1) kui $x + 7 = 15$, siis $x = 15 - 7$;
- 2) kui $y - 12 = 8$, siis $y = 8 + 12$;
- 3) kui $6 - z = 4$, siis $z = 6 - 4$;
- 4) kui $8 = 17 - u$, siis $u = 17 - 8$.

Võrreldes siin kaht ühes ja samas reas olevat võrrandit, näeme, et teine neist saadakse esimesest, kui selles viia üks liige (reas 1 ja 2) või kaks liiget (reas 3 ja 4) võrrandi ühelt poolelt teisele, muutes seejuures iga üleviidava liikme märgi vastupidiseks. Näiteks reas 4 olevast võrrandist $8 = 17 - u$ saab võrrandi $u = 17 - 8$, kui liige $-u$ viia võrrandi paremalt poolelt vasakule poolele, kirjutades sinna $+u$, ja liige 8 viia võrrandi vasakult poolelt paremale, kirjutades sinna -8 (joon. 188).

$$\begin{array}{c} 8 = 17 - u \\ \swarrow \quad \searrow \\ u = 17 - 8 \end{array}$$

Joon. 188.

Selgita, missugused liikmed on võrrandites 1, 2 ja 3 viidud ühelt poolelt teisele.

Võrrandi liikmete ülkirjeldatud omadust nimetatakse võrrandi esimeseks põhiomaduseks.

Võrrandi iga liikme võib viia võrrandi ühelt poolelt teisele, muutes selle liikme märgi vastupidiseks.

1031. Võrrandi esimene põhiomadus võimaldab tunduvalt kerendada võrrandi lahendamist. Olgu vaja lahendada näiteks võrrand

$$6 - 5x = 27 - 8x.$$

Teisendame võrrandit nii, et tema liikmed, mis sisaldavad tundmatut, oleksid võrrandi vasakul poolel, ja liikmed, mis ei sisalda tundmatut, paremal poolel. Antud võrrandis tuleb selleks liige $-8x$ viia paremalt poolelt vasakule (märgiga $+$) ja liige 6 viia vasakult paremale (märgiga $-$). Seda tehes saame teisendatud võrrandi

$$8x - 5x = 27 - 6.$$

Koondades nüüd sarnased liikmed, saame

$$3x = 21.$$

Siit järeldeb, et

$$x = 7.$$

Lahenduse kirjutame lühidalt järgmiselt:

$$6 - 5x = 27 - 8x;$$

$$8x - 5x = 27 - 6;$$

$$3x = 21;$$

$$x = 7.$$

$$\text{Kontroll. } v = 6 - 5 \cdot 7 = 6 - 35 = -29;$$

$$p = 27 - 8 \cdot 7 = 27 - 56 = -29;$$

$$v = p.$$

$$\text{Vastus. } x = 7.$$

1032. Rakendades võrrandi esimest põhiomadust, lahenda võrrandid:

$$1) 5x = 4x + 12$$

$$2) -5x = 36 - 6x$$

$$3) 10x = 9x - 44$$

$$4) x - 1 = 1$$

$$5) x + 2 = 5 - x$$

$$6) 14x - 9 = 5x$$

$$7) 3x - 3 = 4 + x$$

$$8) 2x + 4 = 1 - x$$

$$9) 7 + 3x = 8 - 2x$$

$$10) 4 - 5x = 8 + 3x$$

1033. Millega võrdub x , kui

$$5 = x; -3 = x; -1 = x?$$

$$\text{Kui } a=b, \text{ siis } b=a$$

Võrrandi pooli võib vahetada ilma ühegi liikme märki muutmata.

Kasuta seda omadust järgmiste võrrandite lahendamisel:

1) $12 = x + 7$

3) $4 + 2x = 10x - 4$

2) $28 = 4 + 6x$

4) $-10 = 3 + x$

Näide. $60 = x + 15;$

$x + 15 = 60;$

$x = 60 - 15;$

$x = 45.$

1034. Rakendades tehetes esinevate arvude vahelisi seoseid, põhjenda järgmisi väiteid.

1) Kui $8x = 5$, siis $x = \frac{5}{8}$.

2) Kui $-3x = 9$, siis $x = 9 : (-3)$.

3) Kui $\frac{x}{5} = a$, siis $x = 5a$.

4) Kui $\frac{4}{x} = 2$, siis $4 = 2x$ ja $x = 4 : 2$.

Võrreldes siin kaht ühes ja samas reas seisvat võrrandit, näeme, et teine neist saadakse esimesest selle vasaku ja parema poole korrutamisel või jagamisel ühe ja sama (nullist erineva) arvuga. Näiteks võrrandist $\frac{4}{x} = 2$ saame võrrandi $4 = 2x$, kui esimese võrrandi mõlemad pooled korrutame arvuga x .

Missuguse arvuga tuleb korrutada või jagada 1., 2. ja 3. reas oleva võrrandi pooli, et leida võrrandi lahendit?

Võrrandi teine põhiomadus:

võrrandi pooli võib korrutada või jagada ühe ja sama nullist erineva arvuga.

1035. Nõue, et arv, millega võrrandi pooli korrutame, ei oleks 0, on tarvilik sellepärast, et võrrandi poolte korrutamisel arvuga 0 saaksime võrrandi, mida rahuldab iga arv. Korrutades näiteks võrrandi $2x = 10$ pooli arvuga 0, saame võrrandi $0 \cdot 2x = 0 \cdot 10$ ehk $0x = 0$. Seda võrrandit rahuldab iga arv. Tõepoolest, $0 \cdot 2 = 0$, $0 \cdot (-2) = 0$, $0 \cdot 5 = 0$ jne. Antud võrrandit $2x = 10$ rahuldab aga ainult arv 5.

Võrrandil $0 \cdot x = 0$ on lõpmata palju lahendeid, sest tema lahendiks sobib iga arv.

Lahenda võrrandid

$$x + 5 = 5 + x; \quad 2x + 3 = 3 + 2x; \quad 3x - 6 = 3(x - 2).$$

1036. Võrrandi mõlema poolega teostatav tehe märgitakse hari-likult võrrandi järele püstkriipsu taha. Näiteks tähendab kirjutus

$$2(x + 7) = 34; \quad | : 2$$

võrrandi mõlema poole jagamist 2-ga. Jagades saame

$$x + 7 = 17,$$

millest

$$x = 17 - 7$$

ehk

$$x = 10.$$

1037. Kasutades võrrandi teist põhiomadust, lahenda järgmi-
sed võrrandid. Lahendeid kontrolli peast.

1) $7x = 49$	2) $9x = 0$	3) $1 = \frac{3}{4}x$	4) $5 = \frac{x}{2}$
$3y = -2,1$	$\frac{y}{2} = 3$	$3y = \frac{1}{3}$	$\frac{6}{y} = 2$
$\frac{z}{4} = 1$	$\frac{2z}{3} = \frac{1}{6}$	$\frac{2z}{5} = 0$	$\frac{3z}{4} = \frac{1}{2}$
$0,4u = 0,8$	$0,3u = 1,2$	$\frac{3}{u} = 2$	$-1,2u = 0,8$
$\frac{v}{5} = 0,3$	$12 = 8v$	$\frac{3}{2v} = 1,5$	$\frac{2}{3}v = -\frac{1}{6}$

Näiteid.

1) $\frac{3x}{4} = 6; \quad \cdot 4$	2) $\frac{5}{2z} = 15; \quad \cdot 2z$
$3x = 24; \quad : 3$	$5 = 30z;$
$x = 8.$	$30z = 5; \quad : 30$
	$z = \frac{5}{30} = \frac{1}{6}.$

1038. Võrrandi esimene ja teine põhiomadus võimaldavad antud võrrandit mitmeti teisendada. Need teisendused ei ole samasus-teisendused, sest antud võrrandi pooled pole võrdsed teisendami-sel saadud võrrandi vastavate pooltega. Näiteks võrrandi

$$3x - 4 = 6 + x$$

ja sellest esimese põhiomaduse põhjal saadud võrrandi

$$3x - x = 6 + 4$$

vastavääd pooled ei ole omavahel võrdsed. Küll on aga nende võrrandite lahendid võrdsed.

Kontrolli, et arv 5 rahuldab nii üht kui ka teist ülalantud võrrandit.

VÖRRANDITE LIIKE.

1039. Võrrandid liigitatakse neis esinevate tundmatute arvu järgi ühe tundmatuga võrrandeks, kahe tundmatuga võrrandeks jne. Lugesdes tähtedega x , y ja z märgitud arvad tundmatuiks, on näiteks

$$3x^2 = x - 1 \text{ ühe tundmatuga võrrand;}$$

$$2x + 3y = 4a \text{ kahe tundmatuga võrrand;}$$

$$x^2 + y^2 = 2z \text{ kolme tundmatuga võrrand.}$$

Käesolevas peatükis vaatleme ainult ühe tundmatuga võrrandeid.

1040. Vaatleme mingit võrrandit, milles tundmatu ei esine murru nimetajas, näiteks võrrandit

$$2(5x - 8) = 4 - 3(x + 1).$$

Anname sellele võrrandile võimalikult lihtsa kuju. Selleks avame sulud, viime kõik liikmed võrrandi vasakule poolele, kirjutades paremale 0, ja koondame sarnased liikmed:

$$10x - 16 = 4 - 3x - 3;$$

$$10x + 3x - 16 - 4 + 3 = 0;$$

$$13x - 17 = 0.$$

Kui pärast võrrandi lihtsustamist tundmatu esineb võrrandis ainult esimesel astmel, siis nimetatakse seda võrrandit esimese astme võrrandiks ehk lineaarseks võrrandiks (ka lineaarvõrrandiks).

Ühe tundmatuga lineaarses võrrandis on pärast võrrandi lihtsustamist ainult kaks liiget: liige tundmatuga esimesel astmel ja tundmatut mittesisaldav liige, nn. vabaliige. Niisuguse võrrandi üldkuju on

$$ax + b = 0.$$

Selles võrrandis a ja b on mistahes arvud, kusjuures $a \neq 0$. Lahendades üldkujulise lineaarse võrrandi, saame

$$ax = -b;$$

$$x = -\frac{b}{a}.$$

Ühe tundmatuga lineaarsel võrrandil on üks ja ainult üks lahend.

1041. Anna igale alljärgnevale võrrandile võimalikult lihtne kuju ja otsusta, missugused neist on lineaarsed võrrandid, missugused mitte. Lineaarsed võrrandid lahenda.

1) $3x - 4(2 - x) = 6$

2) $x(3 + x) = 2(3 - x)$

3) $(x - 1)^2 = x^2$

4) $3(2 - 3x) = 8 - 2(3 - x)$

5) $(x - 3)(x + 3) = 7$

Näide. $x(7 + x) = 5 - x(5 + 2x);$

$$7x + x^2 = 5 - 5x - 2x^2;$$

$$7x + x^2 - 5 + 5x + 2x^2 = 0;$$

$$3x^2 + 12x - 5 = 0. \text{ Ei ole lineaarne võrrand.}$$

LINEAARSETE VÕRRANDITE KOOSTAMINE JA LAHENDAMINE.

1042. Lineaarseid võrrandeid lahendame järgmise üldplaani järgi.

1) Avame sulud, kui neid võrrandis on, ja koondame sarnased liikmed.

2) Viime tundmatut sisaldavad liikmed võrrandi ühele poolele ja kõik muud liikmed võrrandi teisele poolele.

3) Koondame sarnased liikmed.

4) Jagame võrrandi mõlemad pooled tundmatu kordajaga. Leitud lahendit tuleb kontrollida.

Näide. Lahendame võrrandi $4(x - 2) - 9 = 3 - (x + 5).$

Lahendus.

Avame sulud:

$$4x - 8 - 9 = 3 - x - 5;$$

Koondame sarnased liikmed:

$$4x - 17 = -x - 2;$$

Viime üle liikmed -17 ja $-x$:

$$4x + x = 17 - 2;$$

Koondame sarnased liikmed:

$$5x = 15;$$

Jagame võrrandi pooled 5-ga:

$$x = 3.$$

Kontroll. $v = 4 \cdot (3 - 2) - 9 = 4 \cdot 1 - 9 = -5;$

$$p = 3 - (3 + 5) = 3 - 8 = -5;$$

$$v = p.$$

Vastus. $x = 3.$

Märkus. Lahendus kirjuta edaspidi ilma selgituseta.

1043. Lahenda võrrandid:

1) $7(x - 3) + 3(x - 5) = 2(3x + 2)$

2) $11x - (25 - 3x) = 17$

3) $7 - (7x - 28) = 0$

4) $3(10 - x) - 6(9,5 - x) = 0$

5) $3(x + 4) = (17 - x) \cdot 4$

1044. Lahenda võrrandid:

1) $0,02(30 - x) - 4 = 0,2 - 0,04(x - 3)$

2) $2x + 3 - 4(x - 2) = 7 - (3x - 5) + 4x$

3) $6 + 2v(-4v - 1) = 1 - 4v(2v + 3) - 5$

4) $(y - 6)(2y - 3) = 2(y - 4)(y - 3)$

5) $5(x - 2) - 3(x - 1) = -1$

1045. Lahenda võrrandi abil järgmised ülesanded.

1) Arvuga x liideti 21 ning saadi 68. Millega võrdub x ?

2) 26,8-le lisati arv a ning saadi 43,3. Leia a .

3) Arvust m lahutati 3,8 ja saadi 4,5. Leia m .

4) Arvust 15,7 lahutati arv s ja saadi 6,9. Leia s .

5) Arvu m suurendati 6,8 korda ja saadi 34. Leia m .

6) Arvu y jagamisel arvuga 3,7 saadi 11,1. Leia y .

7) Arv 13,5 jagati arvuga x ja saadi 0,5. Leia x .

8) Mingi arvuga liideti 180 ja saadi 150. Leia see arv.

1046. Lahenda võrrandid:

1) $4k - 0,2(k + 4) = 41$

2) $0,5(z - 1) - 0,25(3 - z) = 2$

- 3) $4(3x - 2) = 6x - 6$
- 4) $5(k + 2) = 13 + 3k$
- 5) $4(3v - 1) = 3(2v + 2) + 8$

1047. Lahenda võrrandid:

- 1) $2(5u - 3) = 3(2u + 5) - 5$
- 2) $(2x - 1) - (6x - 4) = 0$
- 3) $(x - 2)(x - 3) = x(x - 1)$
- 4) $3(6 - x) - 4(x + 8) = 0$
- 5) $2(x - 1) - 3(3 + x) = 5 + x$

1048. Lahenda võrrandi abil järgmised ülesanded.

- 1) Arvu 35 korrutati ühe teise arvuga ja saadi 72,45. Missuguse arvuga korrutati?
- 2) Mingi arv jagati 7,5-ga ja saadi 4,4. Leia see arv.
- 3) Missuguse arvuga tuleb liita 2,87, et saada 11,06?
- 4) Missugusest arvust tuleb lahutada 12,5, et saada 63,1?
- 5) Missugust arvu tuleb korrutada 3,8-ga, et saada 4,18?
- 6) Missuguse arvuga tuleb jagada 33,5, et saada 3,7?
- 7) Riiulil oli teatud hulk raamatuid. Kui neile lisati veel 14 raamatut, siis oli riiulil 81 raamatut. Mitu raamatut oli esialgu riiulil?
- 8) Pärast seda kui laost veeti 284 m³ puid ära, jäi sinna veel 3759 m³ puid. Kui palju puid oli esialgu laos?

1049. Kui võrrand sisaldab harilikke murde, siis alustame võrrandi lahendamist murdude kaotamisega. Selleks korrutame võrrandi mõlemad pooled murdude ühise nimetajaga.

Näide. $\frac{2x-1}{5} = 3 + \frac{1-3x}{4}; | \cdot 20$

Võrrandi mõlema poole korrutamiseks 20-ga korrutame võrrandi iga liikme selle arvuga:

$$\frac{\overset{4}{\cancel{20}}(2x-1)}{\underset{1}{\cancel{5}}} = 20 \cdot 3 + \frac{\overset{5}{\cancel{20}}(1-3x)}{\underset{1}{\cancel{4}}}$$

ehk

$$4(2x - 1) = 20 \cdot 3 + 5(1 - 3x);$$

$$8x - 4 = 60 + 5 - 15x;$$

$$8x + 15x = 65 + 4;$$

$$23x = 69;$$

$$x = 3.$$

$$\text{Kontroll. } v = \frac{2 \cdot 3 - 1}{5} = \frac{5}{5} = 1;$$

$$p = 3 + \frac{1 - 3 \cdot 3}{4} = 3 - 2 = 1;$$

$$v = p.$$

$$\text{Vastus. } x = 3.$$

1050. Lahenda võrrandid.

$$1) \frac{y}{3} - 7 = 5$$

$$6) 7 + \frac{x}{3} = 13$$

$$2) 20 = 13 + \frac{7x}{2}$$

$$7) 8 = \frac{x}{5} + 7$$

$$3) 1 + \frac{4t}{1} = 13$$

$$8) \frac{3r}{8} - 15 = 0$$

$$4) \frac{3x}{4} - \frac{x}{2} = 1$$

$$9) \frac{s}{2} + \frac{s}{4} = 0$$

$$5) \frac{x-2}{3} = 5$$

$$10) \frac{5}{x} = \frac{2}{3}$$

1051. Lahenda võrrandid.

$$1) \frac{2c-1}{5} - \frac{1+c}{2} = 1$$

$$4) \frac{2x+7}{4} - \frac{x+1}{3} = \frac{3}{4}$$

$$2) \frac{s+3}{5} = 8 - \frac{s-1}{4}$$

$$5) \frac{n}{2} - \frac{5n+4}{3} = \frac{4n-9}{3}$$

$$3) \frac{a}{2} - \frac{a}{3} = \frac{a}{4} - 1$$

1052. Koosta võrdus iga järgneva lause põhjal.

1. Arv 6 on 2 võrra suurem kui 4.

2. Arv 10 on 2 korda suurem kui 5.

3. Arv $x + 3$ on 4 võrra suurem kui $\frac{x}{2}$.

4. Arvude $x + 1$ ja $x - 1$ jagatis on 2.

5. Arvude $3x - 1$ ja $x - 2$ vahe on 3.

1053. Näide. Ma mõtlesin ühe arvu, liitsin sellega 2, tule-
muse jagasin 3-ga, saadud jagatisest lahutasin 4 ja sain 6. Mis-
suguse arvu ma mõtlesin?

Lahendus.

I. Võrrandi koostamine.

Olgu minu poolt mõeldud arv x . Liitnud selle arvuga 2, sain
 $x + 2$. Saadud tulemuse jagamisel 3-ga sain $\frac{x+2}{3}$. Lahutades sel-
lest 4, sain $\frac{x+2}{3} - 4$. Ülesandes on öeldud, et tulemuseks ma
sain 6. Järelikult

$$\frac{x+2}{3} - 4 = 6.$$

II. Võrrandi lahendamine.

$$\begin{aligned} \frac{x+2}{3} - 4 &= 6; \quad | \cdot 3 \\ x + 2 - 12 &= 18; \\ x - 10 &= 18; \\ x &= 18 + 10; \\ x &= 28. \end{aligned}$$

III. Lahendi kontroll (ülesande teksti põhjal).

$$28 + 2 = 30; 30 : 3 = 10; 10 - 4 = 6.$$

IV. Vastus. Mõeldud arv oli 28.

1054. Ma mõtlesin ühe arvu. Sellest arvust lahutasin 11, saa-
dud vahe jagasin 8-ga ja tulemusega liitsin 7. Sain 10. Mis-
suguse arvu ma mõtlesin?

1055. Jagades tundmatu arvu 5-ga ja suurendades saadud
jagatist 27 võrra, saame arvu, mis on pool endisest tundmata
arvust. Leia see arv.

1056. Jüri on Reinust 2 aastat vanem, Maret on Jürist 3 aastat
noorem. Kokku on Reinu, Jüri ja Mareti vanus 37 aastat. Kui
vana on Rein?

1057. Isa, poja ja tütre vanus on kokku 47 aastat. Isa on pojast
5 korda vanem, tütar on pojast 2 aastat noorem. Kui vana on poeg?

1058. Lahenda võrrandid.

$$1) \frac{2x-3}{5} = \frac{x+1}{3}$$

$$4) \frac{2x+5}{3} - \frac{x+6}{2} - \frac{x+8}{6} = 0$$

$$2) \frac{11}{15}x - \frac{5}{6}(x-2) = 0$$

$$5) \frac{5(4x-1)}{8} - \left[x - \frac{3(1-x)}{2} \right] = 2$$

$$3) \frac{2(x-4)}{3} = 3(x-2) - \frac{4x-3}{2}$$

1059. Kolme järjestikuse täisarvu summa on 54. Leia need arvud.

1060. Nelja järjestikuse täisarvu summa on 34. Leia need arvud.

1061. Kirjutati neli täisarvu, milledest iga järgmine on temale eelnevast arvust 2 võrra suurem. Nende arvude summa on 44. Leia need arvud.

1062. Jaota arv 37 kahte ossa nii, et pool ühest osast oleks 15 võrra suurem teise osa $\frac{2}{3}$ -st.

1063. Lahenda võrrandid.

$$1) 2 - x - \frac{5x-1}{3} = \frac{4x+2}{15}$$

$$2) 2x - \frac{8x+7}{3} = -\frac{6x-5}{7}$$

$$3) \frac{6x-5}{7} = x - 1 - \frac{3x-4}{5}$$

$$4) 5 \cdot \frac{x}{6} - 3 \cdot \frac{x}{4} - 2 \cdot \frac{3}{8} = \frac{7}{9}x - 1 \cdot \frac{1}{12}x + 15 \cdot \frac{1}{8}$$

$$5) 13z - \frac{8z}{9} = 15z + 22 - \frac{7z}{2}$$

1064. Lahenda võrrandid.

$$1) \frac{6}{7}(9-2x) - \frac{2}{3}(3x-4) = 3 - 1\frac{1}{2}x$$

$$2) \frac{7x+18}{3} - \frac{4}{5}(x+3) = \frac{3}{2}(x+2) + \frac{2}{3}$$

$$3) \frac{7-2x}{2} - \left(1\frac{1}{2}x - \frac{x-2}{7} \right) = 36 - 6x$$

$$4) \frac{5x-1}{3} + \frac{4(x-1)}{5} - 2x - 4 = 0$$

$$5) \frac{2(2x-7)}{7} + 6\frac{5}{6} + \frac{7(x-4)}{3} = x + 4 - \frac{9-7x}{8} - \frac{1}{6}$$

1065. Näide. 5., 6. ja 7. klass kogusid 840 kg vanapaberit, kusjuures 6. klass kogus 2 korda rohkem ja 7. klass 4 korda rohkem kui 5. klass. Kui palju vanapaberit kogus iga klass?

Lahendus.

I. Võrrandi koostamine.

Olgu 5. klassis kogutud x kilogrammi vanapaberit. Siis 6. klassis on seda kogutud $2x$ kilogrammi ja 7. klassis $4x$ kilogrammi. Et üldse koguti vanapaberit 840 kg, siis

$$x + 2x + 4x = 840.$$

II. Võrrandi lahendamine.

$$x + 2x + 4x = 840;$$

$$7x = 840;$$

$$x = 120.$$

III. Lahendi kontroll.

$$5. \text{ klass} \dots 120 \text{ kg};$$

$$6. \text{ klass} \dots 240 \text{ kg};$$

$$7. \text{ klass} \dots 480 \text{ kg};$$

$$\text{Kokku} \dots 840 \text{ kg}.$$

IV. Vastus. 5. klass kogus vanapaberit 120 kg, 6. klass 240 kg ja 7. klass 480 kg.

1066. Kolhoosi aias kasvab 120 pirni-, õuna- ja ploompuid. Pirnipuid on kolm korda rohkem kui ploompuid, õunapuid kaks korda rohkem kui pirnipuid. Mitu pirni-, õuna- ja ploompuid on kolhoosi aias?

1067. Ristkülikukujulise põllu pikkus on kaks korda suurem laiuselt. Leia selle põllu pikkus ja laius, kui põllu übermõõt on 960 m.

1068. Kolmnurga übermõõt on 180 cm. Kolmnurga küljed suhtuvad nagu 9, 11 ja 16. Leia kolmnurga iga külje pikkus.

1069. Kolm perekonda kasutavad korterit, mille üür on 9 rubla kuus. Esimese perekonna kasutada on korteri elamispiinast 30 m^2 , teisel 20 m^2 ja kolmandal 50 m^2 . Üür jaotatakse kolme perekonna

vahel võrdeliselt kasutatavale elamispinnale. Kui palju tuleb maksta igal perekonnal?

1070. Kolmnurga külgede pikkused väljenduvad kolme üksteisele järgneva täisarvuga. Leia iga külje pikkus, kui kolmnurga ümbermõõt on 24 cm.

1071. Kahest kõrvunurgast on üks 4 korda teisest suurem. Leia kummagi nurga suurus.

1072. Kahest kõrvunurgast on üks 36° teisest väiksem. Leia need nurgad.

1073. Kolmes koolis on kokku 1200 õpilast. Teises koolis on õpilasi kaks korda rohkem kui esimeses, kolmandas koolis aga 40 õpilast vähem kui teises. Mitu õpilast on igas koolis?

1074. Koolil on musti, valgeid ja kirjusid kanu kokku 178. Kirjusid kanu on 3 korda rohkem kui musti, valgeid aga 3 võrra rohkem kui musti. Mitu musta, mitu valget ja mitu kirjut kana on koolil?

1075. Tehase kolmes tsehhis töötab kokku 624 töolist. Teises tsehhis on töölisi 5 korda rohkem kui esimeses, kolmandas tsehhis aga niipalju kui esimeses ja teises tsehhis kokku. Mitu töolist on igas tsehhis?

1076. «Tere, tere, sada hane,» ütles haneparvele vastulendav üksik hani.

«Ei meid ole 100 hane,» vastas parve juht. «Kui meid oleks veel nii palju, nagu meid on, ja veel pool sellest ning veerand sellest ning sina ka lendaksid koos meiega, alles siis oleks meid sada hane!»

Mitu hane lendas parves?

VÖRRANDID, MIS SISALDAVAD TUNDMATUT MURRU NIMETAJAS.

1077. *Võrrandit*

$$\frac{2}{x} - \frac{1}{x-1} = 0$$

lahendamata saab öelda, et selle lahendiks ei või olla arv 0 ega arv 1. Miks? Lahenda see võrrand, korrutades võrrandi mõlemad pooled murdude ühise nimetajaga $x(x-1)$.

Võrrandi lahendiks ei saa olla arv, mille puhul tundmatut sisaldav murru nimetaja võrduks nulliga.

1078. Põhjenda väidet, et võrrandi

$$\frac{4-x}{x-2} = 6 + \frac{2}{x-2} \text{ lahendiks ei või olla arv 2;}$$

$$\frac{1}{x(x-1)} = \frac{2}{x-2} \quad " \quad " \quad " \quad " \quad \text{ükski arvudest 0, 1 ja 2;}$$

$$\frac{3}{x^2-4} = \frac{2}{x^2-2x-8} \quad " \quad " \quad " \quad " \quad \text{ükski arvudest 2, -2 ja 4.}$$

1079. Ütle arvud, mis ei või olla

$$\text{võrrandi } \frac{4}{x-1} = \frac{2}{x+1} \text{ lahenditeks;}$$

$$" \quad \frac{1}{x} + \frac{1}{x-1} = \frac{5}{x+3} \quad "$$

$$" \quad \frac{2}{x+2} = \frac{1}{2x-1} \quad "$$

1080. Lahendame võrrandi

$$\frac{4-x}{x-2} = 6 + \frac{2}{x-2}, \quad (I)$$

teades ette, et tema lahendiks ei saa olla arv 2. (Miks?) Korrutades võrrandi mõlemad pooled arvuga $x-2$, saame võrrandi

$$4-x = 6(x-2) + 2, \quad (II)$$

mille lahendamisel saame:

$$4-x = 6x-12+2;$$

$$4-x = 6x-10;$$

$$-x-6x = -10-4;$$

$$-7x = -14;$$

$$x = 2.$$

Oleme saanud lahendiks arvu, mis ei või olla antud võrrandi (I) lahendiks. Kontrollimine näitab, et viga me teinud ei ole; arv 2 rahuldab võrrandit (II) ja kõiki järgnevaid võrrandeid, kuid ei rahulda antud võrrandit (I). Sellest tuleb teha järgmine järeldus:

kui võrrandi pooli korrutada avaldisega, mis sisaldab tundmatut, siis võib saada võrrandi, millel on rohkem lahendeid kui antud võrrandil.

Siin korrutasime võrrandi pooli avaldisega $x - 2$ ja saime võrrandi, millel on üks lahend (2), kuna antud võrrandil ei ole ühtki lahendit. Et võrrandil (1) lahendit ei saa olla, see selgub, kui tundmatut sisaldavad liikmed viia võrrandi vasakule poolele ja seal murrud liita. Siis võrrand omandab kuju

$$\frac{2-x}{x-2} = 6 \text{ ehk } \frac{x-2}{x-2} = -6.$$

Sellel võrrandil ei ole lahendit, sest x iga väärtuse puhul võrrandi vasak pool on 1, kuna parem pool on -6 .



Joon. 189.

1081. Arvu, mis rahuldab antud võrrandi (algvõrrandi) teisendamisel saadud võrrandit, kuid ei rahulda algvõrrandit, nimetatakse algvõrrandi võõrlahendiks.

Näita, et $x = 3$ on võrrandi

$$\frac{2}{x-3} + \frac{x-5}{x-3} = 2$$

võõrlahend.

1082. Lahendanud võrrandi, milles tundmatu esineb murru nimetajas, vaatame esmalt, kas murdude nimetajad on leitud lahendi puhul nullist erinevad või mitte. Kui tundmatu asendamisel leitud arvuga mõni nimetaja muutub nulliks, siis see arv ei ole antud võrrandi lahendiks. Kui ükski nimetaja nulliks ei muutu, siis see arv võib olla võrrandi lahendiks. Kas ta seda on või ei ole, seda näitab lahendi kontroll.

Näide 1. Lahendame võrrandi

$$\frac{3}{4x-2} = 1 - \frac{1}{1-2x}$$

Lahutame esimese murru nimetaja teguriteks:

$$\frac{3}{2(2x-1)} = 1 - \frac{1}{1-2x}$$

Muudame märgi teise murru nimetaja kõigil liikmel ja teise murru ees:

$$\frac{3}{2(2x-1)} = 1 + \frac{1}{2x-1}$$

Korrutame võrrandi mõlemad pooli murdude ühise nimetajaga $2(2x-1)$:

$$3 = 2(2x-1) + 2.$$

Lahendame saadud võrrandi:

$$3 = 4x - 2 + 2;$$

$$4x = 3;$$

$$x = \frac{3}{4}.$$

Kontroll.

I. Arvutame algvõrrandis esinevate murdude nimetajad, kui $x = \frac{3}{4}$:

$$4x - 2 = 4 \cdot \frac{3}{4} - 2 = 3 - 2 = 1;$$

$$1 - 2x = 1 - 2 \cdot \frac{3}{4} = 1 - \frac{3}{2} = -\frac{1}{2}.$$

II. Arvutame algvõrrandi poolte väärtused:

$$v = \frac{3}{1} = 3; \quad p = 1 - \frac{1}{-\frac{1}{2}} = 1 + 2 = 3;$$

$$v = p.$$

$$\text{Vastus. } x = \frac{3}{4}.$$

Näide 2.

$$\frac{x+5}{x-1} - \frac{x+1}{x-3} + \frac{8}{(x-1)(x-3)} = 0.$$

Korrutame võrrandi mõlemaid pooli murdude ühise nimetajaga $(x-1)(x-3)$:

$$(x+5)(x-3) - (x+1)(x-1) + 8 = 0.$$

Avades sulud ja koondades sarnased liikmed, saame:

$$x^2 + 5x - 3x - 15 - x^2 + 1 + 8 = 0;$$

$$2x - 6 = 0;$$

$$x = 3.$$

Kontroll.

I. Arvutame algvõrrandis esinevate murdude nimetajad, kui $x = 3$:

$$x - 1 = 3 - 1 = 2;$$

$$x - 3 = 3 - 3 = 0(!)$$

Arv 3 ei rahulda antud võrrandit.

Vastus. Antud võrrandil ei ole lahendit.

1083. Lahenda võrrandid:

$$1) \frac{6}{x-1} = 2$$

$$2) \frac{2x}{x-1} = 5$$

$$3) \frac{1-x}{x-1} = 3$$

$$4) \frac{0,5x+2}{3-0,25x} = 2$$

1084. Lahenda võrrandid:

$$1) \frac{5}{2x} + \frac{1}{6} = \frac{3}{5x} + \frac{4}{5}$$

$$2) \frac{2}{3x} - \frac{5}{6} = \frac{1}{2x}$$

$$3) \frac{5}{6x} - \frac{3}{4x} = \frac{1}{12x}$$

$$4) \frac{0,1}{2x} - \frac{0,15}{3x} = 2$$

1085. Lahenda võrrandid:

$$1) \frac{2}{10-x} = \frac{3}{x}$$

$$2) \frac{2}{3x} = \frac{3}{2x}$$

$$3) \frac{2}{x-4} = \frac{6}{x-3}$$

$$4) \frac{x+2}{x-2} = \frac{x-4}{x+2}$$

$$5) \frac{x-5}{x-7} = \frac{x-8}{x-9}$$

$$6) \frac{x-3}{x} = \frac{x+1}{x+10}$$

Märkus. Võrde kuju omavaid võrrandeid on kõige lihtsam lahendada võrde põhiomaduse põhjal (joon. 190).

$\begin{array}{ccc} a & \searrow & c \\ b & \nearrow & d \end{array}$ $ad = bc$	$\frac{2x-3}{5} = \frac{x+8}{3}$ $3(2x-3) = 5(x+8)$
---	---

Joon. 190.

1086. Lahenda võrrandid:

1) $\frac{x+2}{3x} = \frac{5}{12}$

2) $\frac{3u-5}{2} = \frac{4u-1}{-3}$

3) $\frac{6}{z} = \frac{7}{10-z}$

4) $\frac{E}{1+E^2} = \frac{1}{2+E}$

5) $\frac{2l}{1+l+4l^2} = \frac{1}{1+2l}$

6) $\frac{a}{a^2+1} = \frac{1}{a+4}$

1087. Lahenda võrrandid:

1) $\frac{3}{x-1} = \frac{4}{x+1}$

2) $\frac{x+1}{x} = \frac{2x+1}{2x}$

3) $\frac{18}{x-2} = 9$

4) $\frac{3}{2x+4} = \frac{5}{3x+8}$

5) $\frac{x^2}{x-4} = x-6$

6) $\frac{24}{x} - \frac{17-x}{x-1} = 1$

1088. Lahenda võrrandid:

1) $\frac{x}{x-2} - \frac{x-2}{x+2} = \frac{2}{x^2-4}$

2) $\frac{x+1}{3-x} + \frac{2x-5}{x-3} = 4$

3) $\frac{11+x}{6+x} = \frac{8+x}{4+x}$

4) $\frac{0,3x+1,8}{1,6x+2,7} = 0,6$

5) $\frac{2}{x-1} - \frac{1}{x-2} = \frac{1}{x-3}$

6) $\frac{x^2}{x^2-4} + \frac{1}{2x-x^2} = 1$

1089. Lahenda võrrandid:

1) $\frac{4x+7}{x-1} = \frac{12x+5}{3x+4}$

2) $\frac{5x-7}{3x+2} = \frac{5x-7}{3x-1}$

3) $\frac{7x-3}{x-1} = \frac{2}{3}$

4) $\frac{2(3-7x)}{1+x} = \frac{1}{2}$

5) $\frac{x+5}{x-5} - \frac{x-5}{x+5} = \frac{20}{x^2-25}$

6) $\frac{x+4}{x-4} - \frac{x-4}{x+4} = \frac{24}{x^2-16}$

1090. Lahenda võrrandid:

$$1) \frac{10,3}{x} + \frac{1}{3} = \frac{7,8}{x} + \frac{2}{3}$$

$$2) \frac{1}{3x} - \frac{1}{4x} = \frac{1}{24}$$

$$3) \frac{1}{x} + \frac{1}{2x} + \frac{1}{3x} + \frac{1}{4x} = \frac{1}{6}$$

$$4) \frac{3}{4-3x} + \frac{1}{3x} = 0$$

$$5) \frac{1}{x} + \frac{3}{x-1} = \frac{4}{x-2}$$

$$6) \frac{x-7}{x+7} = \frac{2x-15}{2x-6} - \frac{1}{2(x+7)}$$

1091. Üks masinakirjutaja võib käsikirja ümber kirjutada 8 tunniga, teine 7 tunniga. Kui kiiresti võivad nad selle töö lõpetada koos töötades?

1092. Bassein täitub veega ühe kraani kaudu 3 tunniga, teise kraani kaudu 5 tunniga. Mitme tunniga täitub bassein siis, kui avada mõlemad kraanid korraga?

1093. Kaks töölist lõpetaksid töö koos töötades 3 tunni ja 36 minutiga. Esimene tööline üksi lõpetaks töö 6 tunniga. Mitme tunniga teeks selle töö teine tööline üksi töötades?

1094. Jaan läbis ühekilomeetrise vahemaa joostes 9 minuti võrra kiiremini kui kõndides. Teades, et joostes liikus Jaan $2\frac{1}{2}$ korda kiiremini kui kõndides, leia Jaani kõndimiskiirus ja jooksumiskiirus.

1095. Missugune arv on vaja liita murru $\frac{2}{5}$ lugejaga ja nimetajaga, et saaksime murru $\frac{3}{7}$?

1096. Missugune arv on vaja liita murru $\frac{2}{5}$ lugejaga ja nimetajaga, et saaksime murru $\frac{5}{14}$?

1097. Murru nimetaja on lugejast 4 korda suurem. Kui murru lugejaga ja nimetajaga liidame 10, siis saame murru, mille väärtus on $\frac{1}{2}$. Leia murd.

1098. Murru $\frac{4}{25}$ lugejale lisati 9 ja nimetajale 2. Siis lisati uuesti lugejale 9 ja nimetajale 2. Nii toimiti korduvalt, kuni murru väärtuseks saadi 1. Mitu korda lisati neid arvusid murru lugejale ja nimetajale?

1099. Murru $\frac{13}{22}$ lugejast lahutati 3 ja nimetajast 5. Siis lahutati uuesti lugejast 3 ja nimetajast 5. Nii toimiti korduvalt, kuni murru väärtuseks saadi $\frac{1}{2}$. Mitu korda lahutati neid arvusid murru lugejast ja nimetajast?

1100. Töölised said kokku 120 rubla. Kui neid oleks olnud 4 võrra vähem, siis oleks igaüks neist saanud kolm korda rohkem. Kui palju oli töölisi?

1101. Töölised said kokku 180 rubla. Kui neid oleks olnud 3 võrra rohkem, siis oleks neist igaüks saanud kaks korda vähem. Kui palju oli töölisi?

1102. Kui turist oli sõitnud $\frac{3}{8}$ kahe linna vahelisest teest, siis jäi tal sõita poolest teest veel 15 km. Leia nende linnade vaheline kaugus.

1103. Kui turist oli sõitnud $\frac{5}{9}$ kahe linna vahelisest teest, siis oli tal sõidetud 10 km rohkem kui pool teed. Leia nende linnade vaheline kaugus.

1104. Isa on 42 aastat ja poeg 9 aastat vana. Mitme aasta pärast on isa kaks korda pojast vanem?

1105. Isa on 39-aastane, poeg 15-aastane. Mitme aasta eest oli poeg isast seitse korda noorem?

1106. Esimese toru kaudu täitub bassein 5 tunniga, teise kaudu aga tühjeneb 6 tunniga. Mitme tunni pärast täitub bassein, kui avada mõlemad torud korraga?

1107. Esimese toru kaudu täitub bassein 4 tunniga, teise kaudu 5 tunniga. Mitme tunni pärast täitub bassein, kui avada mõlemad torud korraga?

TÄHELISTE KORDAJATEGA VÕRRANDID.

1108. Võrrandis võib peale tundmatut tähistava tähe esineda veel muid tähti. Need tähed tähistavad antud arve, kuid pole öeldud, missuguseid nimelt. Neid tähtede abil kirjutatud antud arve

nimetatakse tähelisteks kordajateks ehk parameetriteks ja tähistatakse harilikult tähestiku esimeste tähtedega a, b, c jne., kuna tundmatuid tähistatakse tähestiku lõpuosa tähtedega x, y, z, u, v .

Et tähelise kordaja kohta pole öeldud, millist arvu ta tähendab, siis võib tema all mõelda meelevaldset arvu, kuid mitte niisugust, mille puhul võrrandis või tema lahendis mõni nimetaja muutub nulliks. Näiteks võrrandis

$$\frac{x}{a} - x = a$$

parameeter a tähendab meelevaldset arvu, kuid mitte arvu 0. Lahendame selle võrrandi:

$$\frac{x}{a} - x = a; \quad | \cdot a$$

$$x - ax = a^2;$$

$$(1 - a)x = a^2; \quad | : (1 - a)$$

$$x = \frac{a^2}{1 - a}$$

Nüüd näeme, et antud võrrandis ei tohi tähe a all mõista ka arvu 1, sest siis saadud lahend ei kõlbaks.

Täheliste kordajatega võrrandi lahendamisel pane tähele, et

pärast tundmatut sisaldavate liikmete viimist võrrandi ühele poolele tuleb tundmatu viia sulgude taha ja siis võrrandi pooled jagada tundmatu kordajaga.

Näide. $ax + 2 = b - 3x;$

$$ax + 3x = b - 2;$$

$$(a + 3)x = b - 2;$$

$$x = \frac{b - 2}{a + 3}.$$

1109. Lahenda tähe x suhtes järgmised võrrandid:

- | | | |
|------------------------|------------------------|---|
| 1) $2x = a$ | 6) $x - a = b - x$ | 11) $px + qx = 9$ |
| 2) $ax = m - 2x$ | 7) $ax + (x - a) = b$ | 12) $x = 1 - 3x$ |
| 3) $2x + 1 = n$ | 8) $x + h = 2(x + k)$ | 13) $x = 1 - mx$ |
| 4) $2(x + 1) = p$ | 9) $2x + 3x = 2c + 3d$ | 14) $\frac{x}{p} + \frac{x}{q} = 1$ |
| 5) $px + 3(x + 1) = q$ | 10) $nx + x = 1$ | 15) $\frac{x}{2} = \frac{\frac{x}{t}}{3} - x$ |

1110. Lahenda tähe x suhtes järgmised võrrandid:

$$\begin{array}{lll}
 1) \frac{a}{x} - b = c & 6) \frac{a}{x-2} - c = \frac{b}{x-2} & 11) \frac{1}{x} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \\
 2) \frac{m}{x} + \frac{n}{x} = p & 7) \frac{m}{m-x} = \frac{n}{n-x} & 12) \frac{1}{x} = \frac{2}{m} - \frac{3}{n} \\
 3) \frac{a}{x-1} - 1 = -b & 8) \frac{a}{x-1} - \frac{6}{x+1} = 0 & 13) \frac{1}{x} = 3 - \frac{a}{b} \\
 4) \frac{a}{mx} + \frac{b}{nx} = p & 9) \frac{m-x}{n-x} = \frac{m+x}{n+x} & 14) \frac{1}{x} = \frac{2u}{V} + 3u \\
 5) \frac{m-x}{m+1} = n & 10) \frac{a}{x+1} + 2 = \frac{bx}{x+1} & 15) \frac{m}{x} = 2a - \frac{b}{a}
 \end{array}$$

1111. Ühe ruudu külg on a cm võrra väiksem teise ruudu küljest, pindala on aga d cm² võrra väiksem. Kui pikk on suurema ruudu külg?

1112. Kolhoosis on tööl b naist, mis moodustab $a\%$ kogu kolhoosnike arvust. Kui suur on kolhoosnike arv selles kolhoosis?

1113. Laeva kiirus seisvas vees on a km tunnis. Jõe voolu kiirus on b km tunnis. Kui kaugel asetseb üks linn teisest, kui aurik kulutas reisiks sinna ja tagasi mööda jõge t tundi?

1114. Plaani järgi pidid kolhoosnikud külvama a ha päevas. Tegelikult ületasid nad igapäevase külviplaani, külvates b ha päevas, mille tõttu lõpetasid külvitööd 2 päeva enne määratud tähtaega. Kui suur oli külvipind?

1115. Kolm töölist lõpetaksid töö koos töötades a tunniga. Esimene tööline lõpetaks selle töö üksi b tunniga, teisel töölisel kuluks selleks üksi töötades c tundi. Kui palju aega kuluks kolmandal töölisel üksi selle töö lõpetamiseks?

1116. Allpool on antud rida valemeid, milledes esineb mitu tähte. Loe kordamööda iga täht valemis tundmatuks ja lahenda valem selle tähe suhtes (kui ta pole juba selle suhtes lahendatud).

$$\begin{array}{lll}
 1) S = \frac{1}{2} ah & 3) k = \frac{a+b}{2} & 5) T = K + 2P \\
 2) c = 2\pi r & 4) S = \frac{ab}{2} & 6) V = abc
 \end{array}$$

- 7) $s = vt$ 10) $S = (n - 2) \cdot 180^\circ$ 13) $2\alpha + \beta = 180^\circ$
 8) $K = \frac{na}{2} \cdot m$ 11) $ab = hc$ 14) $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$
 9) $e = \frac{P}{V}$ 12) $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{c}$ 15) $\alpha = 180^\circ - \frac{360^\circ}{n}$

Mitmed neist valemeist väljendavad tuntud tõsiasju. Kas tead mõnda neist?

• ÜLESANNETE LAHENDAMINE VÖRRANDI ABIL.

1117. Näide. Linnade A ja B vahemaa on 240 km. Nendest linnadest väljusid ühel ja samal ajal teineteisele vastu kaks jalgratturit, kes kohtusid 6 tunni pärast. Leia kummagi jalgratturi sõidukiirus, kui on teada, et teine neist läbis tunnis 4 km rohkem kui esimene.


Lahendus.

Kiirus $\times$ Aeg = Tee pikkus

	$\left(\frac{\text{km}}{\text{t}}\right)$	(t)	(km)
I jalgrattur	x	6	$6x$
II jalgrattur	$x + 4$	6	$6(x + 4)$

Tee pikkus on 240 km.

$$\begin{aligned} 6x + 6(x + 4) &= 240; \\ 6x + 6x + 24 &= 240; \\ 12x &= 216; \end{aligned}$$



$$x = 18 \frac{\text{km}}{\text{t}} \text{ (I jalgrattur)}$$

$$x + 4 = 22 \frac{\text{km}}{\text{t}} \text{ (II jalgrattur)}$$

Kontroll. II jalgrattur sõitis tunnis $22 - 18 = 4$ km rohkem kui I jalgrattur. I jalgrattur läbis $6 \cdot 18 = 108$ km. II jalgrattur läbis $6 \cdot 22 = 132$ km. Kokku oli tee pikkus $108 + 132 = 240$ km.

V a s t u s. I jalgrattur sõitis 18 km tunnis, II jalgrattur 22 km.

M ä r k u s. Kasuta ka edaspidi, kus sobib, võrrandi koostamiseks niisugust skeemi, nagu ülal näidatud.

1118. Maret väljus linnast jalgrattal 2 tundi enne Virvet. Maret läbis tunnis 10 km, Virve 14 km. Millise aja jooksul jõuab Virve Maretile järele?

1119. Kaks mootorpaati väljusid samaaegselt ühest ja samast kohast ning sõitsid üks päri voolu, teine vastu voolu. Mootorpaatide kiiruste suhe on 2 : 3. Viie tunni pärast asusid nad teineteisest 100 km kaugusel. Leia mootorpaatide kiirus.

1120. Asulate A ja B vahemaa on 66 km. Kell 9 väljus asulast A jalgrattur asula B suunas kiirusega 14 km tunnis. Kell 10 väljus asulast B teine jalgrattur asula A suunas kiirusega 12 km tunnis. Kui kaua aja pärast kohtas esimene jalgrattur teist?

*

1121. Epul on 30 metallraha, 10- ja 15-kopikalised, koguväärtusega 3 rbl. 90 kop. Mitu 10- ja mitu 15-kopikalist tal on?

1122. Mootorsõidukite remonditöökojas parandati kuu jooksul autosid ja motorollereid, kokku 40 masinat. Töökojas praktikal viibiv Tõnu leidis, et parandatud sõidukeil oli kokku 100 ratast. Mitu autot ja mitu motorollerit oli töökojas parandamisel kuu jooksul?

1123. Pirita jõel sõitis 70 inimest süstadel. Üheinimesesüstasid oli kolm korda rohkem kui kaheinimesesüstasid. Mitu ühe- ja mitu kaheinimesesüsta oli jõel?

1124. Jaanil on 3,05 rbl. väärtuses metallraha, viie- ja kümnekopikalised. Viiekopikalisi on 19 võrra enam kui kümnekopikalisi. Mitu viie- ja mitu kümnekopikalist on Jaanil?

1125. Jüri kasvatas kanu ja jäneseid. Kokku oli kanadel ja jänestel 33 pead ja 100 jalga. Mitu jänest ja mitu kana oli Jüril?

*

1126. Ristkülikukujulise ehituskrundi pikkus on laiusest 3 korda suurem. Kui selle ehituskrundi laiust suurendada 2 m võrra, siis tema pindala suureneb 96 m² võrra. Leia ehituskrundi mõõtmed.

1127. Ristküliku pikkus on 2 korda suurem laiusest. Kui selle ristküliku pikkust suurendada 5 m võrra, laiust aga 3 m võrra, siis tema pindala suureneb 92 m^2 võrra. Missugused on selle ristküliku esialgsed mõõtmed?

1128. Ruudu külgi pikendati 1 m võrra. Ruudu pindala suurennes selle tõttu 15 m^2 võrra. Kui pikk oli selle ruudu külgesialgu?

1129. Ruudu iga külje pikkust vähendati 3 cm võrra, mille tõttu ruudu pindala vähenes 33 cm^2 võrra. Leia selle ruudu külje esialgne pikkus.

1130. Ristküliku pikkus on 5 m võrra suurem tema kahekordsest laiusest. Ristküliku ümbermõõt on 190 m. Leia selle ristküliku pikkus ja laius.

*

1131. Kolme üksteisele järgneva paarisarvu summa on 120. Leia need arvud.

1132. Leia kolme üksteisele järgneva paarisarvu summa, kui on teada, et teise ja kolmanda arvu summa on 28 võrra suurem esimesest arvust.

1133. Leia neli üksteisele järgnevat paarisarvu, kui on teada, et lahutades neljanda arvu teise arvu kolmekordsest, saame arvu, mis on 4 võrra suurem esimesest arvust.

1134. Leia kolm üksteisele järgnevat paaritut arvu, kui on teada, et esimese ja kolmanda arvu summa on 37 võrra suurem teisest arvust.

1135. Peeter, Jüri ja Rein korjasid kokku 63 seent. Jüri korjas 8 seent vähem kui Peeter, Rein korjas aga seeni 3 korda rohkem kui Jüri. Mitu seent korjas neist igaüks?

1136. Kolhoosi aias on 240 viljapuud. Õunapuid on 3 korda rohkem kui pirnipuid, ploomipuid 9 võrra vähem kui õunapuid, kirsipuid aga 4 korda rohkem kui ploomipuid. Mitu igast liigist puud on kolhoosi aias?

1137. Kolhoosil on 3 maatükki. Teine maatükk on esimesest $2,3$ korda suurem, kolmas aga moodustab $\frac{2}{3}$ esimesest ja teisest

tükist kokku. Kui suur on iga maatükk, kui kolme maatüki pindala kokku on 385 ha?

1138. Kolme arvu summa on 76. Leia need arvud, kui on teada, et teine arv on esimesest kaks korda suurem, kolmas arv aga on 4 võrra suurem kahe esimese summast.

1139. Plaani järgi pidid kolhoosnikud külvama 25 ha päevas. Tegelikult külvasid nad 30 ha päevas ning lõpetasid selle töttu külvitööd 3 päeva enne tähtaega. Kui suur oli ettenähtud külvi-pind?

1140. Aurik pidi plaani järgi sõitma ühest sadamast teise kiirusega 15 km tunnis. Masinarikke töttu sõitis aurik ainult 12 km tunnis ning hilines selle töttu 3 tundi. Kui kaugel asus üks sadam teisest?

1141. Jalgrattur sõitis kolhoosist linna kiirusega 16 km tunnis ja linnast tagasi koju kiirusega 12 km tunnis. Kogu sõiduaeg linna ja tagasi oli $2\frac{1}{3}$ tundi. Kui kaugel asus kolhoos linnast?

1142. Teekonnaks Tallinnast Tartusse ja tagasi kulus autol kokku 10 tundi. Mitu kilomeetrit on maanteed mööda Tallinnast Tartusse, kui auto keskmine kiirus sinnasõidul oli 60 km tunnis ja tagasisõidul 40 km tunnis ning kui Tartus peatuti 2 tundi?

1143. Jalgrattur sõitis kodunt raudteejaama ja tagasi. Minnes oli tuul vastu, tulles tagant, mistöttu sinnasõit toimus kiirusega 12 km tunnis ja tagasisõit 18 km tunnis. Jaamas kulus jalgratturil pool tundi. Kogu reis kestis 3 tundi. Kui kaugel elas jalgrattur raudteejaamast?

1144. Kooperatiiv müüs esimesel päeval 0,5 kalevikangast, teisel päeval 0,4, kusjuures teisel päeval müüdi 30 m vähem kui esimesel päeval. Mitu meetrit kalevit oli kangas?

1145. Valve luges läbi $\frac{2}{9}$ raamatust. Nüüd selgus, et lugeda on 95 lehekülge rohkem sellest, mis on juba loetud. Mitu lehekülge on selles raamatus?

1146. Sovhoosis on põllumaa all $\frac{2}{3}$ kogu maa-alast, heinamaad moodustavad aga $\frac{2}{15}$ sovhoosi maa-alast. Kui palju on sellel sovhoosil maad, kui on teada, et põllumaad on 320 ha rohkem kui heinamaad?

1147. Ruudu külg on 6 m pikem kui võrdkülgse kolmnurga külg. Ruudu übermõõt on võrdkülgse kolmnurga übermõõdust 34 m suurem. Leia võrdkülgse kolmnurga külje pikkus.

1148. Trapetsi lühem alus on $\frac{2}{3}$ pikemast alusest. Trapetsi keskloigu pikkus on 5 cm. Kui pikk on trapetsi pikem alus?

1149. Kaks matkagruppi väljuvad samaaegselt linnast A, et minna linna B. Esimene grupp liigub kiirusega 4 km tunnis, teine grupp aga kiirusega 5 km tunnis. Teine grupp jõudis 1 tund varem linna B. Kui suur on linnade A ja B vahemaa?

1150. Toomas, Jaan ja Peeter koguvad raha jalgrataste ostmiseks. Jaanil on kogutud 6 rubla rohkem kui Toomal, Peetril aga 10 rubla vähem kui Tooma kogutud kahekordne summa. Mitu rubla on igal poisil kogutud, kui kokku on nende poolt kogutud 96 rubla?

1151. Rein ütles: «Kui ma oma vanuse korrutan 3-ga ning tulemusega liidan 2 aastat, siis saan oma isa vanuse. Korrutades aga isa vanuse 2-ga ning liites tulemusega 3 aastat, saan vanaisa vanuse. Meie kolme vanus kokku on 99 aastat.»

Kui vana on Rein?

1152. Murru nimetaja on lugejast 2 võrra suurem. Suurendades murru lugejat ja nimetajat 1 võrra, saame uue murru, mille lugeja ja nimetaja suhe on 2 : 3. Kui suur on esialgne murd?

1153. Kahe arvu suhe on 7 : 2. Samade arvude vahe on 30. Leia suurem arv.

1154. Kahe arvu suhe on 3 : 5. Nende arvude vahe on 12. Leia väiksem arv.

1155. Kolhoosi viljapuuaeda istutati 120 viljapuud. Ünapuid istutati 3 korda, pirnipuid aga 30 võrra enam kui kirsipuid. Mitu puud istutati igast liigist?

1156. Kolme arvu summa on 51. Leia need arvud, teades, et esimene arv on kaks korda väiksem teisest, kolmas arv on aga 3 võrra suurem esimesest.

1157. Ma võtsin ühe arvu, liitsin sellega 28, korrutasin tulemuse 3-ga, siis lahutasin 120, jagasin saadud vahe 20-ga ja sain 8 korda väiksema arvu, kui ma algul võtsin. Missuguse arvu ma võtsin?

1158. Kui ma algul jagan mõeldud arvu 4-ga, siis aga jagan mõeldud arvu 6-ga ja saadud jagatised liidan, saan 20. Leia mõeldud arv.

1159. Isa sõitis autoga ühest linnast teise keskmise kiirusega v km tunnis. Tagasi sõitis ta lennukiga, mille keskmine kiirus oli 3 korda suurem auto kiirusest. Kogu teekond kestis t tundi. Kui suur on nende linnade vahemaa?

1160. Ristküliku pikkus ja laius suhtuvad nagu 3 : 2. Kui selle ristküliku pikkust suurendada 2 korda, laiust aga vähendada 1 ühiku võrra, siis suureneb ristküliku ümbermõõt 16 ühiku võrra. Leia antud ristküliku mõõtmed.

1161. Ruudu pindala on ristküliku pindalast 3 m^2 suurem. Ristküliku pikkus on 4 meetrit suurem, laius aga 3 m väiksem ruudu külje pikkusest. Leia ruudu külje pikkus.

1162. Juhan sõitis Tartusse ja sealt tagasi. Kokku kulus tal sõiduks 14 tundi. Tema kiiruseks minnes oli 40 km ja tulles 30 km tunnis. Mitme tunniga jõudis Juhan Tartusse?

1163. Lennuk läbis 600 km 3 tunniga. Teekonna esimese osa läbis ta kiirusega 240 km tunnis. Teekonna teisel osal oli tuul vastu, mistõttu lennuki kiirus oli 160 km tunnis. Kui kaua sõitis lennuk kummagi kiirusega?

1164. Kolhoos müüs 20 m^3 kase- ja lelapuid. Kasepuudest saadi 4 rubla ruumimeetrist, lelapuudest 3 rubla ruumimeetrist. Kogu ostu eest saadi 68 rubla. Kui palju müüdi kase-, kui palju lelapuid?

10. ÜLDISEKS KORDAMISEKS.

1165. Leia 8,4% avaldise $3\frac{1}{6} + 2\frac{3}{4} : 1\frac{1}{2}$ väärtusest.

1166. Mitu protsenti moodustab avaldise $2\frac{3}{8} - 3 \cdot 0,75$ väärtus avaldise $2\frac{3}{8} + 3 \cdot 0,75$ väärtusest?

1167. Leia arv, millest 17% võrdub avaldise $1,45 - 0,25 : \frac{5}{12}$ väärtusega.

1168. Mitu protsenti moodustab arvude 5 ja 7 ruutude summa samade arvude summa ruudust?

1169. Arvuta avaldise väärtus.

a) $4,2 - 3\frac{3}{4} \cdot (5,4 - 4\frac{1}{3})$

b) $4\frac{3}{8} : (6,5 - 2,2 \cdot 1\frac{4}{11})$

c)
$$\frac{3 + 4,2 : 0,1}{(1 : 0,3 - 2\frac{1}{3}) \cdot 0,3125}$$

d)
$$\frac{(18,305 : 7 - 0,38 : 4) \cdot (6,35 + 4,65)}{28,08 : 6 + 7,38 : 9}$$

1170. Leia võrde tundmatu liige.

a) $x : 12 = 4\frac{3}{4} : 7\frac{1}{8}$

b) $3\frac{1}{2} : 0,4 = x : 1\frac{1}{7}$

c) $1\frac{7}{8} : 1,5 = x : 0,24$

d) $0,8 : x = 4\frac{2}{3} : \frac{5}{6}$

1171. Kolmepäevasest automatkast osavõtjad sõitsid esimesel päeval 30% kogu teekonnast, teisel päeval $\frac{3}{8}$ ülejäänud teeosast ja kolmandal päeval viimased 189 km. Kui pikk oli teekond?

1172. Kinoetendusel oli õpilasi kolmest koolist võrdeliselt arvu-
dega $2\frac{1}{3}$, $1\frac{3}{4}$ ja $1\frac{1}{6}$. Mitu õpilast oli igast koolist, kui esimesest ja teisest koolist oli neid kokku 343?

1173. Kolhoosil oli 1. oktoobril sügiskünni teha veel 630 ha. Sellest künni oktoobrikuu esimesel poolel 23% ja sama kuu teisel poolel $\frac{8}{11}$ ülejäänud pindalast. Mitu hektarit jäi künda novembrikuuks?

1174. 31. oktoobril 1959. aastal saavutas nõukogude lendur G. Mossolov ühe turboreaktiivmootoriga lennukil E-66 keskmiseks kiiruseks ühel lennulõigul 2504 kilomeetrit tunnis. Kui kaua vältab sellise kiirusega reis ümber Maa (Maa ümbermõõt on 40 000 km)?

1175. Mitu pööret minutis peab tegema veduriratas, mille ümbermõõt on 5,18 m, et rongi kiirus oleks 60 km tunnis?

1176. On vaja tapeetida 6,5 m pikkune, 4 m laiune ja 3 m kõrgune tuba. Toal on üks mõõtmetega 2,5 m $\times$ 1 m ja kaks akent mõõtmetega 2 m $\times$ 1 m. Seina ülemine osa vastu lage jääb 0,35 m kõrguselt tapeetimata.

Mitu rulli tapeeti on vaja osta, kui igas rullis on tapeeti 12 meetrit ja tapeedi laius on 0,5 m?

1177. Lihtsusta avaldised.

- a) $(3x - 4)(3x + 4) - (3x - 4)^2 + 32$
- b) $(2a + 0,3b)(2a - 0,3b) - (2a + 0,3b)^2 + 1,2ab$
- c) $(3a - 1)^2 - 5(a + 2)(a - 2) - 2a(2a + 3)$
- d) $(2a - 1)^3 - (2a + 1)^3$
- e) $(3x - 2a)^3 - (3x + 2a)(9x^2 - 6ax + 4a^2)$

- 1178. a) Missuguseid nurki nimetatakse kõrvunurkadeks?
- b) Missuguseid nurki nimetatakse tippnurkadeks?

1179. Missugused on kahe sirge paralleelsuse tunnused?

1180. Arvuta kumera kaheksanurga sisenurkade summa. Kui suur on sama kaheksanurga välisnurkade summa?

1181. Arvuta kõik nurgad, mis tekivad kahe sirge lõikamisel kolmanda sirgega, kui kahe lähisnurga summa on 217° ja samade nurkade vahe on 39° .

1182. Sirgete s ja t lõikamisel sirgega u (joon. 21) tekkis kaks lähisnurka α' ja δ , millede summa oli 234° . Kui suured on nurgad, mis tekivad sirgete s ja t lõikumisel?

1183. Arvuta korrapärase viisteistnurga välisnurk ja sisenurk.

1184. Tõesta, et rombi pindala võrdub tema diagonaalide poole korrutisega.


1185. Avalda täisnurkse trapetsi pindala, kui tema alused on $x + 2$ ja $3x - 4$ ning lühem haar on $2x + 1$.

1186. Leia hulkliikmete jagatis.


a) $(a^6 + 2a^5 + a^4) : (a^2 + a)$

b) $(x^5 + x^3y^3 + x^2y^2 + y^5) : (x^3 + y^2)$

1187. Mitu pange vett mahutab joonisel 191 kujutatud küna, kui pange mahub 14 liitrit?



Joon. 191.



Joon. 192.

1188. Kui palju kaalub 3,8 m pikkune raudtala, mille ristlõige on kujutatud joonisel 192?

1189. Mitu kuupmeetrit mulda sisaldab raudteetammi jooksev kilomeeter, kui tammi ristlõige on võrdhaarne trapets, mille lühem alus on 6 m, kõrgus 2,4 m ja haara ning pikema aluse vaheline nurk 45° ?

1190. Kanali ristlõige on võrdhaarne trapets, mille alused on 4 m ja 2 m, kõrgus 1,8 m. Mitu töötundi kulus ekskavaatoril selle kaevamiseks, kui ekskavaatori tootlikkus antud pinnase puhul oli 78 kuupmeetrit tunnis ja kanali pikkus on 1,2 km?

1191. Arvu a jagamisel arvuga b saadi jagatiseks täisarv q ja jäagiks r . Avalda

- 1) arv a arvude b , q ja r kaudu;
- 2) arv b arvude a , q ja r kaudu;
- 3) arv q arvude a , b ja r kaudu;
- 4) arv r arvude a , b ja q kaudu.

Sõnasta seos, mis näitab, kuidas jagatav avaldub jagaja, jagatise ja jäägi kaudu.

1192. Kahe arvu summa on 33. Kui suurem nendest arvudest jagada väiksemaga, siis saame jagatiseks 4 ja jäägiks 3. Leia need arvud.

1193. Taanda murrud.

a) $\frac{a^2 - ab}{a^2 - b^2}$

b) $\frac{3x - 3}{x^2 - 2x + 1}$

c) $\frac{7a + 7}{a^2 + 2a + 1}$

d) $\frac{x^2 - 1}{ax - a}$

e) $\frac{a^2 - b^2}{a^3 + b^3}$

f) $\frac{x^3 - y^3}{x^2 - y^2}$

1194. Lihtsusta avaldised.

a) $\frac{5x - 3}{15} + \frac{3x - 5}{10}$

b) $\frac{2a + 5}{8} + \frac{3a - 7}{12}$

c) $\frac{a - 1}{4} + \frac{2a - 3}{6} - \frac{3a + 1}{9}$

d) $\frac{3x - 7}{12} - \frac{2x - 1}{16} - \frac{x - 3}{18}$

e) $\frac{4x}{1 - x^2} + \frac{2}{x} - \frac{2}{x + x^2}$

f) $x - \frac{x^2}{x - 1} - \frac{x}{x + 1}$

g) $\frac{5 - 3x}{x^2 - 9} + \frac{5}{x^2 - 3x}$

h) $a + \frac{a}{a - 1} - \frac{a^2}{a + 1}$

i) $\frac{2x - 5}{2x^2 + 5x} - \frac{2x + 5}{2x^2 - 5x} + \frac{40}{4x^2 - 25}$

1195. Kahe arvu summa on 95. Samade arvude vahe on 3 korda väiksem väiksemast liidetavast. Leia need arvud.

1196. Kahe arvu summa on 96. Kui väiksemat liidetavat suurendada 6 võrra, suuremat aga niisama palju vähendada, siis saame võrdsed arvud. Leia need arvud.

1197. Õhk sisaldab ümmarguselt 20% hapnikku ja 80% lämmastikku. Kui palju hapnikku ja kui palju lämmastikku on teie klassiruumis?

1198. Haudeaparaati paigutati 240 muna. Nendest munadest saadi 211 tibu. Mitu protsenti see on?

1199. Tehas valmistas 223 masinat, täites sellega plaani 105-protsendiliselt. Mitu masinat nägi ette plaan?

1200. On vaja valada 65-millimeetrise läbimõõduga alumiiniumvardaid. On teada, et vedel alumiinium tõmbub jahtumisel kokku 1,8%. Kui suur peab olema valuvormi läbimõõt?

1201. Trapetsikujulise põllu rööbiti asetsevate külgede pikkused on 365 m ja 462 m, nende külgede kaugus üksteisest on 221 m. Sellel põllul kasvatati rukist, mille saak oli keskmiselt 21 ts hektarilt. Kui palju jahu ja kliisid saab sellest rukist, kui jahvatamisel saab teradest keskmiselt 85% jahu ja 13% kliisid?

1202. Mitu kilogrammi liha võeti suitsutamiseks, kui saadud suitsuliha kaalus 18,6 kg ja kaalukadu suitsutamisel on 12,3%?

1203. On vaja valmistada 710 kg pronksi, mis sisaldaks 87% vaske ja 13% tina. Kui palju on selleks vaja võtta vaske, kui palju tina?

1204. Kui palju vaske ja tsinki on vaja võtta 150 kg messingi valmistamiseks, kui selles tsingi kaal peab olema 65% vase kaalust?

1205. Kolmnurga üks külg on teisest kaks korda pikem ja kolmas külg esimesest küljest 16 cm pikem. Kolmnurga übermõõt on 108 cm. Kui pikad on kolmnurga küljed?

1206. Millised on kolmnurga pikima külje tõkked, kui sama kolmnurga kaks lühemat külge on 17,8 cm ja 24,6 cm?

1207. Klassis on 15 poissi ja 21 tüdrukut. Mitme protsendi võrra on tüdrukuid rohkem kui poisse? Mitme protsendi võrra on poisse vähem kui tüdrukuid?

1208. a) Arv x on 25% arvust y . Mitu protsenti on arv y arvust x ?

b) Arv u on 64% arvust v . Mitu protsenti on arv v arvust u ?

1209. Täisnurkse kolmnurga üks teravnurk on teisest 25% võrra suurem. Kui suured on need nurgad?

1210. Võrdhaarse kolmnurga alusnurk on 30% võrra suurem kui tipunurk. Kui suured on kolmnurga nurgad?

1211. Võrdhaarse kolmnurga tipunurk on 40% võrra suurem kui alusnurk. Kui suured on kolmnurga nurgad?

1212. Võrdhaarse trapetsi pikem alus on 4 dm, haar 1 dm ja nendevaheline nurk 60° . Leia lühem alus.

1213. Kahe arvu summa on 145,6. Üks arv moodustab 0,12 teisest arvust. Leia need arvud.

1214. Krohviija koos oma õpilasega sai 30 rbl. 80 kop. töötasu. Krohviija töötas 8 päeva, õpilane aga ainult 35% sellest ajast. Krohviija päevapalk oli õpilase päevapalgast 40% kõrgem. Arvuta krohviija päevapalk ja õpilase päevapalk.

1215. a) Nimeta neli kolmnurkade võrdsuse tunnust.

b) Joonesta võrdhaarne kolmnurk, mille haar on 4,5 cm ja alusnurk on 45° .

c) Joonesta kolmnurk, millest on antud kaks külge ja suurema külje vastasnurk.

1216. Tõesta, et rombi diagonaalid jaotavad rombi neljaks võrdseks kolmnurgaks. Mis liiki need kolmnurgad on?

1217. Rombi diagonaal moodustab ühe küljega nurga $37^\circ 40'$. Leia rombi kõik nurgad.

1218. Tõesta, et rööpkülik, mille diagonaalid on teineteisega risti, on romb.

1219. Ehita kolmnurk, mille küljed on 4 cm, 6 cm ja 7 cm, ning leia punkt, mis asetseb võrdsetel kaugustel kõige pikema külje otspunktidest ja võrdsetel kaugustel kõige väiksema nurga haaradest.

1220. Ehita võrdhaarne trapets, mille pikem alus on 6 cm, kõrgus 2 cm ja haar 2,5 cm.

1221. Ehita romb, mille külg on 3,5 cm ja üks diagonaal on 2 cm.

1222. Kuidas tuleb ümardada

- ligikaudsete arvude summat ja vahet?
- ligikaudsete arvude korrutist ja jagatist?

1223. Kolmas Nõukogude kosmoserakett, mis saadeti välja 4. oktoobril 1959. a., oli sama päeva kella 18-ks eemaldunud Maast 145 000 kilomeetri kaugusele. 5. oktoobril kella 12-ks oli sama kosmoserakett eemaldunud Maast 248 000 kilomeetri kaugusele.

Kui suur oli kolmanda Nõukogude kosmoseraketi keskmine kiirus sellel vahemaal?

1224. Arvuta, rakendades valemeid.

- 83^2 $7,1^2$ $2,05^2$ $(-5,01)^2$ $(3\frac{1}{3})^2$
- $97 \cdot 103$ $93 \cdot 107$ $85 \cdot 115$ $2,7 \cdot 3,3$
- $78,2^2 - 21,3^2$ $9,816^2 - 0,184^2$ $1,27^2 - 8,73^2$

1225. Arvuta, rakendades valemeid.

- 68^2 $5,02^2$ $9,99^2$ $(10,1)^2$ $(-8\frac{1}{8})^2$
- $96 \cdot 104$ $94 \cdot 106$ $84 \cdot 116$ $2,6 \cdot 3,4$
- $98,2^2 - 1,8^2$ $6,91^2 - 3,09^2$ $(7\frac{2}{3})^2 - (2\frac{1}{3})^2$

1226. Mis arvu peab liitma kaksliikmega

$$64x^2 - 48x,$$

et saada kaksliikme ruut?

1227. Mis arvu peab liitma kolmliikmega

$$9x^2 + 24x + 25,$$

et saada kaksliikme ruut?

1228. Lahuta hulkliige tegureiks.

- $a^3 + b^3 + 3(a + b)$
- $2a^2 - 4a + 2$
- $a^3 + a^2 - 2a - 2$
- $216a^3 + 1$
- $3a^3 - 20bc^2 - 5b + 12a^3c^2$

1229. Lahuta hulkliige tegureiks.

a) $a^3 + 2a^2b + ab^2$

b) $a^3 + a^2c - ac^2 - c^3$

c) $a^3 - a^2 - a + 1$

d) $64a^6 - x^6$

e) $12b + 20a^2b - 15a - 16ab^2$

1230. Lahuta hulkliige tegureiks.

a) $a^2b - 2ab^2 + b^3$

b) $a^3 - a^2b - ab^2 + b^3$

c) $a^3b + 4a^2b^2 + 4ab^3$

d) $a^6 - 729$

e) $0,15a^2 - 0,21bc - 0,35ab + 0,09ac$

1231. Lahuta hulkliige tegureiks.

a) $4x^2 + 12xy + 9y^2 - 25$

b) $9a^2 - 24ab + 16b^2 - 36$

c) $81 - 25u^2 + 20uv - 4v^2$

d) $49 - 36x^2 - 24ax - 4a^2$

1232. Näita, et olgu x väärtus missugune tahes, avaldise
 $(2x - 3)(7 - x) + (2x - 9)(x - 4)$

väärtus on ikka 15.

1233. Avalda valemist

a) $s = vt + S_0$ suurus t ;

b) $Q = cm(t_2 - t_1)$ suurus t_2 ;

c) $\frac{1}{a} = \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$ suurus c ;

d) $S = \frac{a+b}{2}h$ suurus a ;

e) $u = \frac{ax+by}{3}$ suurus y .

1234. Leia võrrandi lahend täpsusega 0,1.

a) $(2 - 3x)x + 3(x - 7)(x + 1) = -42$

b) $7(x - 3) - (x - 3)^2 + (x - 2)(x + 2) = 23$

c) $2(x - 3)(x + 4) - (x - 3)(x + 3) - (x + 4)^2 = -100$

1235. Leia võrrandi lahend täpsusega 0,01.

a) $(x - 1)(3x + 2) - 3(x - 7)(x - 2) = 0$

b) $(12 - x)(3 + x) - 0,5(3 + 2x)(4 - x) = 48$

1236. Leia võrrandi lahend täpsusega 0,001.

a) $2(x - 18)(x + 3) - 2x^2 = -110,2$

b) $(8x - 3)(x + 1) - 2x(4x - 3) = -1,8$

1237. Tallinn—Pihkva rong sõidab Tallinnast Aakre jaamani 6 tunniga. Kui see rong sõidaks tunnis 8 km rohkem, siis läbiks ta sama tee 5 tunniga. Mitu kilomeetrit on Tallinnast Aakreni?

1238. Jalgrattur, kes väljus punktist A punkti B poole, sõitis 12 km tunnis, kohtas poolel teel veoautot, mis liikus kiirusega 28 km tunnis ja oli väljunud punktist B 2 tundi hiljem kui jalgrattur punktist A. Arvuta punktide A ja B vaheline kaugus.

1239. Lihtsusta avaldis

$$\frac{m}{n} \left(n + 1 + \frac{2n}{m} \right) - \left(2m + \frac{m^2 + n^2}{n} \right) : \left(m + \frac{n^2}{m + 2n} \right).$$

1240. Lihtsusta avaldis

$$\left(\frac{1+x}{1-x} - \frac{1-x}{1+x} + \frac{4x^2}{x^2-1} \right) \cdot \frac{x+1}{2x}.$$

1241. Lihtsusta avaldis

$$\left(\frac{a+b}{a-b} - \frac{a-b}{a+b} - \frac{4a}{a^2-b^2} \right) \cdot \frac{a^2-b^2}{4b-4b^2}.$$

1242. Lihtsusta avaldis

$$\left(a - \frac{b+a}{1+ab} \right) : \left[1 - \frac{a(b-1)}{1+ab} \right].$$

1243. Lihtsusta avaldis

$$\left(\frac{x}{y} - \frac{y}{x} \right) : \left(\frac{x}{y} + \frac{y}{x} - 2 \right) : \left(1 + \frac{y}{x} \right).$$

1244. Jaota arv 45 kaheks osaks nii, et väiksema osa pool oleks kaks korda suurem kui suurema osa viiendik.

1245. Ruudu pindala on võrdne ristküliku pindalaga. Ristküliku laius on 2 m väiksem ja ristküliku pikkus 4 m suurem kui ruudu kül. Kui pikk on ruudu kül?

1246. Auto sõitis 225 km 5 t. 15 minutiga. Algul sõitis ta kiirusega 40 km tunnis, siis aga kiirusega 60 km tunnis. Kui kaugel sihtkohast auto kiirust suurendati?

SISUKORD.

1. Kordamiseks	3
2. Algebraline murd	10
Oksliikmete suurim ühistegur ja väikseim ühiskordne	10
Algebralise murru mõiste	13
Murru põhiomadus	14
Murru taandamine	16
Murdude teisendamine ühenimelisteks	17
Murdude liitmine ja lahutamine	19
Murdude korrutamine	27
Murru astendamine	30
Murdude jagamine	31
Kordamiseks	34
3. Hukliikmete lahutamine tegureiks	37
Hukliikmete tegureiks lahutamine ühise teguri sulgude ette toomisega	37
Hukliikmete tegureiks lahutamine valemite kasutamisega	40
Hukliikmete tegureiks lahutamine liikmete rühmitamise võttega	43
Hukliikmete tegureiks lahutamine mitme võttega	45
Hukliikmete suurima ühisteguri leidmine	46
Hukliikmete väikseima ühiskordse leidmine	47
Hukliikmeliste liikmetega murrud	48
Murru taandamine	48
Murru laiendamine	51
Murdude teisendamine ühenimelisteks	51
Murdude liitmine ja lahutamine	52
Murdude korrutamine	56
Murdude jagamine	58
Kõik tehted murdudega	59
Kordamiseks	63

4. Sirgete lõikumine ja paralleelsus	67
Matemaatilised laused	67
Teoreemi koostis	69
Järeldamisharjutusi	71
Kõrvnurgad	72
Võrrand	73
Tippnurgad	75
Kahe sirge lõikamine sirgega	76
Kahe sirge paralleelsus	77
Kahe paralleelse sirge lõikamine sirgega	81
Vastavalt paralleelsete haaradega nurgad	82
Vastavalt ristuvate haaradega nurgad	83
Kordamiseks	84
 5. Kolmnurkade ja nelinurkade tähtsamad omadused	86
Kolmnurga nurkade summa.	86
Kumer hulknurk	88
Kumera hulknurga nurkade summa	89
Kolmnurga kahe külje summa ja vahe võrdlemine kolmanda küljega	90
Kolmnurga külgede ja nurkade vahelised seosed	93
Rööpküliku omadused	95
Rööpküliku tunnused	98
Rööpküliku erilligid	100
Ristküliku omadused	101
Rombi omadused	102
Ruudu omadused	106
Trapets	105
Kolmnurga kesk lõik. Trapetsi kesk lõik	109
Kolmnurga mediaanide lõikumine	113
Trapetsi pindala	115
Trapetsikujulise põhjaga püstprisma	117
Kordamiseks	120
 6. Arvutamine ligikaudsete arvudega	122
Arvude ümardamine ja sellest tekkiv viga	122
Arvu alamtõke ja ülemtõke	125
Täpsed ja ligikaudsed arvud	126
Ligikaudsete arvude liitmine	128

Ligikaudsete arvude lahutamine	133
Ligikaudsete arvude korrutamine	136
Ligikaudsete arvude jagamine	144
Ülesandeid	148
Kordamiseks	155
 7. Arvutuslükati	 158
Lihtne arvutuslükati täisarvude liitmiseks	158
Temperatuuri ümberarvutamine	160
Arvude lugemine ja märkimine skaalal	160
Lükati põhiskaalade omadus	171
Võrde tundmatu liikme leidmine	172
Korrutamine	174
Protsentide leidmine	176
Jagamine	177
Arvu leidmine tema protsentides antud osa järgi	179
Kahe arvu suhe protsentides	179
 8. Ringjoon. Silinder. Koonus. Kera	 181
Lõigu keskristsirge	181
Ringjoon	182
Kolmnurga ümberringjoon	184
Kolmnurga kõrguste lõikumine	186
Punkti ja ringjoone vastastikune asend	188
Sirge ja ringjoone vastastikune asend	188
Kolmnurga siseringjoon	194
Piirdenurk	196
Korrapärane hulknurk	203
Ringjoone pikkus	206
Kaare pikkus	212
Ringi pindala	214
Sektori pindala	220
Silinder	222
Silindri pinnalaotus ja pindala	224
Silindri ruumala	227
Koonus	229
Koonuse pinnalaotus ja pindala	230
Koonuse ruumala	233

Kera	236
Kera pindala	240
Kera ruumala	242
9. Ühe tundmatuga lineaarsed võrrandid	246
Samasus	246
Võrrandi lahendid	249
Võrrandi põhiomadused	251
Võrrandite liike	255
Lineaarsete võrrandite koostamine ja lahendamine	256
Võrrandid, mis sisaldavad tundmatut murru nimetajas	263
Tähealiste kordajatega võrrandid	270
Ülesannete lahendamine võrrandi abil	273
10. Üldiseks kordamiseks	279

Этвек Эльмар Германович
Линд Альфред Юханович
Вихман Арнольд Юрьевич

МАТЕМАТИКА ДЛЯ VII кл.

На эстонском языке

Обложка В. Варе


Издательство «Ээсти Раамат»
Таллин, Пярнуское шоссе, 10


•


Toimetaja K. Kallaste
Kunstiline toimetaja H. Keigo
Tehniline toimetaja O. Mullari
Korrektorid H. Kahar ja E. Toots

Ladumisele antud 25. IX 1964. Trükkimisele
antud 5. I 1965. Paber 60×90, 1/16. Trüki-
poognaid 18,25 + 1 lisa. Arvestuspoognaid
13,44. Trükiarv 22 000. Tellimise nr. 8307.
Trükikoda «Kommunist», Tallinn, Pikk tn. 2

Hind 25 kop.







25 kop.

A-26158

TÜ RAAMATUKOGU



1 0300 00379257 1

25 kop.

A-26158

TÜ RAAMATUKOGU



1 0300 00379257 1

MATEMAATIKA

E. ETVERK
A. LINTS
A. VIHMAN

Matemaatika

VII KLASSILE