




Проф. Д-ръ К. Дегіо  
СБОРНИКЪ  
КЛИНИЧЕСКИХЪ  
РЕЦЕПТОВЪ

---



Издание  
Гансъ Раагъ, Юрьевъ



По архив. кат. № 232.





Est. A - 10756

# СБОРНИКЪ

клиническихъ и поликлиническихъ

## РЕЦЕПТОВЪ И НАЗНАЧЕНІЙ

составленный

Проф. Д-ромъ К. Дегіо,

директоромъ медицинской клиники.

LIBRARY — STRAT  
UNIVERSITY OF TORONTO

ПЯТОЕ ИЗДАНИЕ.



Издание Гансъ Раагъ.

1917.



Дозволено военною цензурою. — Юрьевъ, 30 августа  
1916 г.

TARTU ÜHIKOOLI  
RAAMATUKOGU  
129511653

## Предисловіе.

Я не имѣю намѣренія настоящимъ сборникомъ рецептовъ дѣлать излишними болѣе подробныя руководства по фармакологіи. Своимъ происхожденіемъ сборникъ этотъ обязанъ единственно сдѣланному нами неоднократно при веденіи клиническаго и поликлиническаго преподаванія наблюденію, что студенты-практиканты, начиная свои первые самостоятельные шаги на поприщѣ практической медицины, нуждаются въ небольшомъ запасѣ испробованныхъ рецептныхъ формулъ и лекарственныхъ назначеній, при примѣненіи которыхъ они пріучаются точно дозировать употребительныя средства и прописывать ихъ въ наиболѣе простой, по возможности, формѣ.

Обыденныя рецептныя книжки имѣютъ болѣею частью тотъ недостатокъ, что онѣ содержатъ такую массу рецептныхъ формулъ, что неопытному студенту представляется затруднительнымъ выборъ того или другого средства и ему не удается запечатлѣть и удержать въ своей памяти основныя правила назначенія рецептовъ, безъ которыхъ въ практикѣ обойтись невозможно.

Желаніе дать моимъ ученикамъ такой основной запасъ лекарственныхъ назначеній побудило меня составить сборникъ употребляемыхъ въ моей клиникѣ рецептовъ и назначеній. Я не боюсь того, что могу этимъ содѣйствовать бесплодному терапевтическому схематизму, такъ какъ я знаю, что каждый мыслящій врачъ, пріобрѣтая больше практическаго навыка, самъ научается дѣлать различныя варіаціи въ своихъ назначеніяхъ соотвѣтственно каждому случаю въ отдѣльности. Кромѣ того, оставленныя свободными отъ печати страницы, которыми снабжена эта книжка, даютъ возможность каждому въ отдѣльности пополнить свой сборникъ рецептовъ согласно съ совѣтами своихъ учителей и съ ходомъ своихъ занятій.

Я постарался привести отъ cadaго употребительнаго средства, гдѣ это возможно было, только одну форму прописыванія и при томъ, по возможности, наиболѣе простую и дешевую. Болѣе сложныхъ рецептовъ, и именно такихъ, которые содержатъ болѣе одного дѣйствующаго лекарственнаго вещества, я по мѣрѣ возможности избѣгалъ, такъ какъ таковыя не даютъ точнаго понятія и затрудняютъ правильное сужденіе о дѣйствиіи cadaго изъ входящихъ составныхъ частей.

Предлежащая книжка издается въ старой формѣ, которая на дѣлѣ оказалась годной, и придерживается предписаній русской фармакопеи.

Въ указателѣ я кромѣ средствъ, приведенныхъ въ сборникѣ, прибавилъ также и соотвѣтствующія основныя вещества или производя-

щія растенія, чтобы этимъ напомнить о происхожденіи прописанныхъ средствъ.

Да будетъ книжка сія для моихъ учениковъ полезнымъ воспоминаніемъ о времени ихъ клиническихъ занятій.

Проф. Д-ръ Карль Дегіо.

#### Объясненія сокращеній.

раз. = разъ или раза

в. = въ

д. = день

стол. л. = столовая ложка

дес. л. = десертная ложка

чайн. л. = чайная ложка

кап. = капля

порош. = порошокъ

пил. = пилюля.

На основаніи многолѣтняго опыта я не могу не указать моимъ ученикамъ на то, что даже въ такихъ случаяхъ, гдѣ нужно торопиться, всегда должно заботиться о томъ, чтобы рецепты и подписи были написаны четко и разборчиво.

*Авторъ.*

## I. Antipyretica.

1.

Chinini sulf. 1,0.  
D. tal. dos. Nr. 3.  
S. Вечеромъ 1 порош. въ облаткѣ.  
NB. При Febris intermit-  
tens за 3 часа до ожи-  
даемаго приступа.

2.

Chinini sulf. 0,3.  
D. tal. dos. Nr. 6.  
S. 2—3 раз. в. д. по 1 по-  
рош. въ облаткахъ.

3.

Euchinin. 0,5—1,0.  
D. tal. dos. Nr. 6.  
S. 2—3 раз. в. д. по 1 по-  
рош. (употребляется и  
при коклюшѣ).

4.

Acid. salicylic. cryst. pulv.  
1,0.  
D. tal. dos. Nr. 6.  
S. Черезъ 2 часа по 1 по-  
рош. въ облатк. (при  
катаррѣ мочев. пузыря  
4 раз. в. д.).

5.

Natr. salicylic. 10,0.  
Aq. dest. 100,0.  
Aq. Menthae piperit. 50,0.  
MDS. Утромъ, днемъ и ве-  
черомъ по 1—2 стол. л.  
за одинъ разъ.

6.

Aspirini 1,0.  
D. tal. dos. Nr. 6.  
S. 3—4 порош. в. д. (Aspi-  
rinъ есть эстръ уксусной  
кислоты съ салициловой  
кислотой).

7.

Antipyrini 1,0—2,0.  
D. tal. dos. Nr. 6.  
S. 3 раз. в. д. по 1 порош.  
(употребляется и какъ  
Antalgicum и Antirheu-  
maticum).

8.

Antifebrini 0,3—0,5.  
D. tal. dos. Nr. 6.  
S. 3 раз. в. д. по 1 порош.  
(употребляется и какъ  
Antalgicum и Antirheu-  
maticum).

9.

Saloli 0,5—1,0.  
D. tal. dos. Nr. 6.  
S. 3—4 порош. в. д. (Salol  
есть соединеніе салици-  
ловой кислоты и фе-  
нола).

10.

Salipyrini 0,5—1,0.  
D. tal. dos. Nr. 6.  
S. 3—4 порош. в. д. (Sali-  
pyrinъ есть соединеніе са-  
лициловой кислоты и Ан-  
типирина).

11.

Phenacetini 0,5.  
D. tal. dos. Nr. 3.  
S. 2—3 раз. в. д. по 1 по-  
рошку (употребляется и  
какъ Antalgicum).

11 a.

Pyramidon 0,2—0,5.  
D. tal. dos. Nr. 6.  
S. 3 порош. в. д. (Pyramidon  
есть Диметиль = Amido  
= Антипиринь).

12.

Chloroformii 1,0.  
Aq. dest. 100,0.  
MDS. Черезъ 2 часа 1—2  
стол. л. (Typhus abd.).

13.

Migränin 1,0.  
D. tal. dos. Nr. 6.  
S. 1—2 порошка в. д. (Mi-  
gränin есть Antipygin и  
Coffein citric. по ровнымъ  
частямъ).

## II. Кислоты.

14.

Acid. muriat. dil. 3,0.  
Aq. dest. 130,0.  
Syrup. spl. 20,0.  
MDS. Черезъ 2 ч. по стол. л.  
NB. Acid. muriat. dil. со-  
держать по русской фар-  
макопее 8,3% СН.

15.

Acid. phosphoric. dil. 5,0.  
Aq. dest. 130,0.  
Syrup. Rub. idaei 20,0.  
MDS. Черезъ 2 часа по  
стол. л.  
NB. Acid. phosphoric. dilut.  
содержитъ по русской  
фармакопее 11%  $H_3PO_4$ .

## III. Отхаркивающія. Expectorantia.

16.

Liq. Ammon. anisat. 10,0.  
Aq. Amygdalar. amar. 20,0.  
MDS. 3 раз. в. д. по 30 кап.  
на водѣ.

17.

Infus. rad. Seneg. 10,0; 130,0.  
Liq. Ammon. anisat. 4,0.  
Syrup. spl. 20,0.  
MDS. Черезъ 2 ч. по стол. л.

18.

Elixir pectoral. 20,0.  
DS. 3 раз. в. д. по 30 кап.  
(NB. Elixir pectorale со-  
стоитъ изъ: 1 ч. Extr. Li-  
quiritiae, 1 ч. Liq. Ammon.  
anisat. и 3 ч. Aq. Foeni-  
culi. (Называется также  
„Elixir pectorale regis  
Daniae“).

19.

Liq. Ammon. anisat. 5,0.  
Tinct. Stramon. 5,0.  
Tinct. Opii spl. 5,0.  
MDS. 3 раз. в. д. по 20 кап.

20.

Inf. rad. Ipec. 0,5; 150,0.  
Aq. Laurocerasi 3,0.  
(если нужно Morph. muriat.  
0,05).  
MDS. Черезъ 2 ч. по стол. л.

21.

Pulv. Doveri 0,3—0,5.  
D. tal. dos. Nr. 6.  
S. 3 раз. в. д. по 1 порош.  
или вечеромъ 1 порош.  
(снотворное). NB. Pulv.  
Doveri состоитъ изъ: 8 ч.  
Kali sulf., 1 ч. Pulv. rad.  
Ipecacuanh., 1 ч. Opium  
purum.

22.

Vini Ipecacuanh. 20,0.  
DS. 3 раз. в. д. по 10 (дѣ-  
тямъ) до 20 кап. NB. На-  
стой 1 ч. Pulv. rad. Ipec.  
съ 10 ч. Хереса.





## 23.

Apomorphini mur. 0,05.  
 Acid. mur. dil. 0,5.  
 Aq. dest. 130,0.  
 Syrup. spl. 20,0.  
 MDS. Черезъ 2—3 ч. по  
 стол. л.

## 24.

Ammon. muriat. 3,0.  
 Extract. Liquirit. 3,0.  
 Aq. dest. 150,0.  
 MDS. Черезъ 2 ч. по стол. л.  
 (Mixture solvens).

## 25.

Stib. sulfurat. aurant. 0,05.  
 (s. Sulfur. aurat. Antimonii).  
 Morph. muriat. 0,01.  
 Sachar. alb. 0,5.  
 M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 6.  
 S. 3 порош. в. д.

## 26.

Vini stibiat. 20,0.  
 DS. 3 раз. в. д. по 10 (дѣ-  
 тямъ) до 20 кап. NB. 1 ч.  
 рвотнаго камня: 250 ч.  
 Хересу.

## 27.

Natr. bicarbon. 3,0.  
 Aq. Laurocer. 3,0.  
 Aq. dest. 150,0.  
 (если нужно Morph. mur.  
 0,05).  
 MDS. Черезъ 2 ч. по стол. л.  
 NB. Вмѣсто aqua Lauroce-  
 gasi можно также пропи-  
 сать aqua amygdalarum  
 amagar.

## 28.

Natr. bicarb. pulverat. 30,0.  
 DS. На кончикъ ножа —  
 до чайной ложки съ теп-  
 лымъ молокомъ.

## 29.

Natr. bicarbon. pulv. 30,0.  
 Natr. chlorat. cryst. pulv. 2,0.  
 M. f. pulv.  
 DS. также.

## 30.

Ol. Therebinthinae gallic.  
 20,0.  
 DS. 3 раз. в. д. по 15 кап.  
 въ горячемъ молокъ  
 (Bronchitis putrida).

## 31.

Plumb. acetic. 0,03—0,05.  
 Sachar. alb. 0,5.  
 M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 6.  
 S. 3 порош. в. д. (Bronchitis  
 putrida, при отекъ лег-  
 кихъ черезъ  $\frac{1}{2}$  часа до  
 0,5 p. die).

## 32.

Acid. benzoic. 0,1.  
 Camphorae trit. 0,1.  
 Sachar. lact. 0,3.  
 M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 6.  
 S. Черезъ 2 часа по 1 порош.  
 (капиллярный бронхитъ,  
 у дѣтей  $\frac{1}{2}$  дозы).

#### IV. Другія средства, прописываемыя при заболѣваніяхъ орга- новъ дыханія и зѣва.

## 33.

Plumb. acetic. 0,05.  
 Opii puri 0,03.  
 Sachar. alb. 0,5.  
 M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 6.  
 S. Черезъ 2 часа по 1 порош.  
 (кровохарканье).

## 34.

Infus. Secal. cornut. 5,0: 150,0.  
(если нужно Morph. muriat.  
0,1).

MDS. Черезъ 2 часа по  
стол. л. (кровохарканье),

## 35.

Secal. cornut. 0,3--0,6.

D. tal. dos. Nr. 6.

S. Черезъ часъ по порош.

## 36.

Stypticin 0,05.

Sachar. alb. 0,5.

M. f. pulv. d. tal. dos.  
Nr. 10.

S. 4—5 порош. в. д. (маточ-  
ныя кровотеченія, чрез-  
мѣрная менструація).

## 37.

Extr. fluid. Hydr. Canad.  
30,0.

DS. 3—5 раз. в. д. по 30 кап.  
(маточныя кровотеченія,  
кровохарканье, ночные  
поты).

## 38.

Solut. Adrenalini hydrochlo-  
rici (1:1000) 10,0.

DS. 3 раз. в. д. по 30 кап.  
внутренно (внутреннія  
кровотеченія, Asthma  
bronch.).

## 38 a.

Gelatinae alb. 15,0.

Aq. dest. 150,0.

M. f. decoctum,

adde Syrup. Aurantior. 35,0.

MDS. Черезъ часъ по стол. л.  
внутреннія кровотече-  
нія).

## 39.

Calcii chlorati (CaCl<sub>2</sub>) 3,0.  
Aq. dest. 150,0.

MDS. Черезъ 3 ч. по стол. л.  
(кровохарканіе).

Не смѣшать съ Calcaria  
chlorata!

Atropin подкожно (при  
кровохарканіи) cfr. Nr.  
275.

Digitalis (при кровохарка-  
ніи) cfr. Nr. 62.

Morphium подкожно (при  
кровохарканіи) cfr. Nr.  
274.

Ergotin подкожно (при кро-  
вохарканіи) cfr. Nr. 279.

Cornutin подкожно (при  
кровохарканіи, маточн.  
кровотеченіяхъ) cfr. Nr.  
280.

## 40.

Extract. Belladonnae 0,1.

Aq. Laurocer. 3,0.

Aq. dest. 150,0.

MDS. Черезъ 2 ч. по стол.  
л. (дѣтямъ прописывать  
половину черезъ 2 часа  
по чайн. л. (коклюшь)).

## 41.

Extr. tuborum Aconiti 0,05.

Aq. Laurocer. 3,0.

Aq. dest. 150,0.

MDS. также (коклюшь).

## 42.

Ammon. bromat. 3,0—5,0.

Aq. Laurocerasi 3,0.

Aq. dest. 130,0.

Syrup. spl. 20,0.

MDS. Отъ 1 чайн. до 1 стол.  
л. 4 раз. в. д. (коклюшь).





## 43.

Bromoformii 15,0.  
Tinct. Gentianae 15,0.  
MDS. 3 раз. в. д. по 10—30  
кап. съ сахарной водой  
(коклюшь, бронхіальная  
астма).

## 44.

Kreosoti 6,0.  
Pulv. et Extract. Liquirit.  
q. s. ut f. pil. Nr. 60.  
Consp. Lycopod.  
DS. 3 раз. в. д. по 2 пил.

## 45.

Kreosoti 10,0.  
Tinct. Gentianae 20,0.  
MDS. 3 раз. в. д. по 10—20  
кап. съ молокомъ.

## 46.

Kreosoti carbonic. 20,0.  
DS. 3 раз. в. д. по 20—30  
кап. на стаканъ теплаго  
молока. (Kreosotum car-  
bonicum называется и  
Kreosotal).

## 47.

Guajacol. carbonic. 0,5.  
Da in capsula amylacea  
tal. dos. Nr. 30.  
S. 3 капсулы в. д.  
(Guajacol. carbonic. назы-  
вается и Duotal).

## 48.

Agaricini 0,005—0,01.  
Opii puri 0,03.  
Sachar. alb. 0,5.  
M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 6.  
S. Вечеромъ 1 порошок. (ноч-  
ные поты).

## 49.

Ингаляціи :

- a. Ol. terebinth. gallic. 30,0.  
DS. Вдыхать съ теплыми  
водяными парами.
- b. Balsam. peruvian. 5,0.  
Spirit. vini alcoholisat.  
(95%) 10,0.  
MDS. также.
- c. Natr. bicarb. 3,0.  
Aq. laurocer. 3,0.  
Aq. dest. 150,0.  
M.
- d. Natr. chlorat. (2% вод-  
ный растворъ).
- e. Alumen pulverat. (1%  
водный растворъ).
- f. Zinc. sulfuric. (2% вод-  
ный растворъ).
- g. Ворах (2% водный рас-  
творъ).  
с—g. Вдыхать черезъ  
пульверизаторъ.

## 50.

Cocain. muriat. 0,5.  
Aq. Laurocerasi 5,0.  
Aq. dest. 145,0.  
MDS. Развести 1 стол. л.  
4-мя стол. л. воды для  
вдыханія (при болѣзнен-  
ныхъ язвахъ въ гортани  
и зѣвѣ).

## 51.

Orthoformii 0,5.  
D. tal. dos. Nr. 10.  
S. Вдуть въ гортань.  
(Мѣстное Anästheticum при  
туберкулезѣ гортани).

## 52.

- a. Acid. carbolic. (5% вод-  
ный растворъ).  
Брызгать въ комнатѣ.
- b. Ol. terebinth. rossic. 60,0.  
также.

## 53.

Acid. carbolic. crystallisat.  
5,0.  
Spirit. vini (70%) 5,0.  
Liq. Ammon. caust. 3,0.  
MDS. Нюхать (насморкъ).

## 54.

Acid. boric. pulverat. 10,0.  
Jodoformii 3,0.  
M. f. pulv. DS. Вдуть въ  
носъ (хроническій ри-  
нитъ, Ozaena).

## 55.

Amyli (или Talc. venet.) 20,0.  
Argent. nitric. 0,1—0,4.  
M. f. pulv. DS. также.

## 56.

Talc. venet. 10,0.  
Natr. soziodolic. 10,0.  
M. f. pulv. DS. также.  
(При дифтеритѣ зѣва 4  
раз. в. д. вдуть въ зѣвъ  
по кончикѣ ножика).

## 57.

Natr. chlorat. pulv. 30,0.  
DS. Кончикъ ножа на ста-  
канъ воды. Втягивать  
черезъ носъ.

## 58.

Для смазыванія слизистой  
носа и зѣва :

- Argent. nitric. 1,0—3,0  
Aq. dest. 30,0.  
M.
- Acid. tannic. 3,0—6,0.  
Glycerini 30,0.  
M.
- Natr. biboric. 3,0.  
Glycerini 15,0.  
Aq. dest. 15,0.  
M.

- Hydrarg. bichlr. corrosiv.  
0,03.  
Aq. dest. 30,0.  
M.
- Jodi puri 0,5.  
Kalii jodati 2,5.  
Glycerini 25,0.  
M.

## 59.

Воды для полосканья рта  
и горла :


- Kali chloric. 30,0.  
DS. Чайн. л. на стаканъ  
воды для полосканья  
рта и горла.
- Kali hypermanganic. 2,0.  
Aq. dest. 100,0.  
MDS. Стол. л. на ста-  
канъ воды для по-  
лосканья рта и горла.
- Liq. Aluminii aceticici 100,0.  
DS. также.  
NB. Содержитъ около  
8% уксуснокисл. квас-  
цовъ въ водномъ рас-  
творѣ.
- Tinct. Ratanhae 30,0.  
DS. 50—60 кап. на ста-  
канъ воды для полос-  
канья рта и горла.
- Perhydrol 30,0.  
DS. Чайн. л. на  $\frac{1}{2}$  ста-  
кана воды для полос-  
канья рта и горла.  
(Perhydrol содержитъ  
30% перекиси водо-  
рода въ водномъ рас-  
творѣ).

## V. Средства для уре- гулированія дѣятель- ности сердца.

## 60.

Infus. folior. Digit. 1,0:150,0.  
DS. Черезъ 2 часа по стол. л.





61.

Pulv. folior. Digitalis 0,1.  
Diuretin 1,0.  
Sachari alb. 0,3.  
M. f. pulv. d. tal. dos. № 6.  
S. 3 порош. в. д.

62.

Pulv. folior. Digitalis 1,0.  
(если нужно Opii puri 0,3  
или прибавить Chinini  
sulf. 2,0).  
Extract. Liquirit. q. s. ut f.  
pilulae Nr. 30. Consp.  
Lycopod.  
DS. 6 пил. ежедневно (че-  
резъ 2 часа по 1 пил.).

63.

Tinct. Digitalis 10,0.  
Aq. Laurocerasi 20,0.  
MDS. 3 раза в. д. по 20—30  
кап.

63 а.

Digalen. 10,0.  
DS. 3 раза в. д. по 10—15  
кап.  
NB. 1,0 Digalen содержитъ  
0,0003 Digitoxin.

64.

Coffeïni natrobenzoïc. (или  
C. natrosalicylic.) 2,0.  
Aq. dest. 150,0.  
MDS. 4 раза в. д. по стол.  
л. или черезъ 2 часа по  
стол. л.

65.

Infus. herb. Adonidis vernal.  
3,0 : 150,0.  
DS. Черезъ 2 часа по стол. л.

66.

Tinct. Convallariae majal.  
20,0.  
DS. 3 раз. в. д. по 10—30  
кап.

67.

Tinct. sem. Strophanthi 8,0.  
Aq. Laurocer 22,0.  
MDS. 3—4 раз. в. д. по  
15—30 кап.

68.

Natrii nitrosi 1,5.  
Aq. dest. 150,0.  
MDS. 3 раз. в. д. по стол. л.

69.

Nitroglycerini 0,01.  
solve in Spirit vini rectif.  
(70%) 5,0.  
adde Aq. dest. 95,0.  
MDS. 3 раз. в. д. по чайн. л.  
NB. Постепенно можно по-  
высить дозу внятеро,  
даже вдесятеро.

70.

Amylii nitrosi 5,0.  
Ol. Foeniculi 15,0.  
MDS. 5—10 кап. накапать  
на носовой платокъ и  
нюхать, до покраснѣнія  
лица (осторожно!).

---

## VI. Emetica.

71.

Pulv. rad. Ipecacuanhae 1,0.  
Tart. stibiat. 0,05.  
M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 4.  
S. Кяждыя  $\frac{1}{4}$  часа по 1 по-  
рош. до дѣйствія.

72.

Cupr sulfuric. 1,0.  
Aq. dest. 30,0.  
Syrup. spl. 20,0.  
MDS. Черезъ  $\frac{1}{4}$  часа по  
чайн. л. до дѣйствія (дѣ-  
тямъ).

73.

Vini stibiati 30,0.  
 DS. Каждыя  $\frac{1}{4}$  часа по  
 чайн. л. до дѣйствія (дѣ-  
 тямъ).

Aromorphin cfr. Rec. Nr. 276.

## VII. Laxantia.

74.

Calomel 0,3.  
 Sachar alb. 0,3.  
 M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 3.  
 S. Черезъ 3 часа по 1 по-  
 рош.  
 (Остерегаться: Acid. mu-  
 riat., Kali chloric., Aq.  
 chlori!)

75.

Natr. sulfuric. cryst. 30,0.  
 DS. Чайными ложками съ  
 водой.

76.

Magnes. sulfuric. 30,0.  
 DS. также.

77.

Sal. Carlsbadens. factic. 30,0.  
 DS. Чайными ложками въ  
 теплой водѣ.  
 NB. Искусственная Карлс-  
 бадск. соль состоитъ  
 изъ: 22 ч. Natr. sulfuric.,  
 18 ч. Natr. bicarb., 9 ч.  
 Natr. chlorat., 1 ч. Kali  
 sulfur.

78.

Magnes. ust. 25,0.  
 Aq. dest. 150,0  
 MDS Вабалтываемая микс-  
 тура.  
 Какъ противоядіе при от-  
 равленіяхъ: каждыя  $\frac{1}{4}$   
 часа 4—6 стол. л.

79.

Pul. rad. Rheï 5,0.  
 Natr. bicarbon. 3,0.  
 Natr. sulfuric. 2,0.  
 M. f. pulv.  
 DS. 3 раз. в. д. по кончикѣ  
 ножа до чайн. ложки.

80.

Ol. Ricini 30,0.  
 DS. По назначенію.

81.

Emuls. ol. Ricini 130,0.  
 Syrup. spl. 20,0.  
 Ol. Menthae piperit. gutt. 2.  
 MDS. Черезъ 2 часа по  
 стол. л.  
 NB. Emuls. ol. ric. состоитъ  
 изъ: 2 ч. Ol. Ricini, 1 ч.  
 Gummi arabic. и 14 ч.  
 воды.

82.

Aloës pulv. 1,5.  
 Sapon. medicat. 1,5.  
 Extr. Liquirit. q. s. ut f. pil.  
 Nr. 30.  
 Consp. Lycopod.  
 DS. Вечеромъ 2—3 пилюли  
 (легкое слабительное).  
 NB. Sapo medicatus при-  
 готовится омыленіемъ  
 прованскаго масла и сви-  
 ного сала съ ѳдкимъ на-  
 триемъ.

83.

Aloës pulv. 1,0.  
 Pulv. rad. Rheï 1,0.  
 Sapon jalapin. 1,0.  
 Extr. Liquirit. q. s. ut. f. pil.  
 Nr. 30.  
 Consp. Lycopod.  
 DS. 3 раз. в. д. по 2 пил.  
 или вечеромъ 2—3 пил.  
 NB. Sapo jalapin. есть  
 смѣсь изъ равн. частей  
 смолы ялапы и Sapo  
 medicat.





## 84.

Aloës pulv. 4,0.  
 Extract. Rheī comp. 4,0.  
 Extract. nuc. vomic. 0,4.  
 Extract. Liquirit. q. s. ad  
 pil. № 30.  
 Consp. Lycorod.  
 DS. Вечеромъ по одной пил.

## 85.

Extract. Belladonnae 0,3.  
 Extr. Liquirit. q. s. ut. f. pil.  
 Nr. 20.  
 Consp. Lycorod.  
 DS. Черезъ 4 часа по од-  
 ной пил.

## 86.

Podophyllini 0,5.  
 Extr. Liquirit. q. s. ut. f. pil.  
 № 30.  
 Consp. Lycorod.  
 DS. Вечеромъ 2—3 пил.  
 (легкое слабительное.)

## 87.

Fol. Sennae 30,0.  
 DS. Чайн. л. на стаканъ  
 кипятку заварить какъ  
 чай. Выпить вечеромъ  
 половину или все за разъ.

## 88.

Pulv. Liquirit. composit.  
 30,0.  
 DS. 3 раз. в. д. по чайн. л.  
 Дѣтямъ 3 раз. в. д. на  
 кончикъ ножа.  
 NB. Pulv. Liquirit. comp.  
 содержитъ: 2 ч. fol. Sen-  
 nae pulv., 2 ч. rad. Liquirit.  
 pulv., 1 ч. sem. Foeniculi  
 pulv., 1 ч. Sulf. depur.,  
 6 ч. Sachar. alb.

## 89.

Infus. Sennae salin. 150,0.  
 DS. 3—4 раз. в. д. по стол. л.  
 NB. Inf. Sennae salin. со-  
 держитъ: 11 ч. отвара  
 листьевъ Sennae (1:10),  
 1 ч. Natr. sulf., 1 ч. Mel.  
 depurat.

## 90.

Electuar. e Senna lenitivi  
 30,0.  
 DS. 2—3 р. в. д. по чайн. л.  
 NB. Состоитъ изъ 1 ч. fol.  
 Sennae pulv., 5 ч. Pulp.  
 Tamarindorum и 4 ч. Sy-  
 rup. spl.

## 91.

Cort. Rhamni frangul. 60,0.  
 DS. 1 чайн. л. на стак. воды  
 варить до остатка поло-  
 вины. Выпить въ одинъ  
 приемъ.

## 92.

Extr. fluid. Cascar. sagra-  
 dae 30,0.  
 DS. Вечеромъ  $\frac{1}{2}$  до полной  
 чайн. л. (легкое слаби-  
 тельное).

## 93.

Tinct. Rheī aquos. 20,0—60,0.  
 DS. 3 раз. в. д. по 30 кап.  
 (дѣтямъ какъ Tonicum  
 и Digestivum). — Черезъ  
 3 часа по чайн. л. до  
 дѣйствія (дѣтямъ какъ  
 слабительное).  
 NB. Tinct. Rheī aquos. есть  
 настойка изъ 10 ч. rad.  
 Rheī, 1 ч. Kali carbon.  
 1 ч. Буры, 85 ч. Aq. dest.,  
 10 ч. спирта, 15 ч. Aq.  
 Cinnamom.

94.

Emuls. oleos. 150,0.  
 Acid. salicylic. 0,5.  
 (если нужно Tr. Opii spl.  
 gutt. 10—20).  
 MDS. Черезъ 2 часа по  
 стол. л., дѣтямъ чайн. л.  
 NB. Emuls. oleos. состоитъ  
 изъ 2 ч. миндальнаго  
 масла, 1 ч. аравійской  
 камеди и 14 ч. воды.

95.

Sulfur. depurat. 10,0.  
 Kali bitartaric. 10,0.  
 Sachar. alb. 10,0.  
 Ol. foeniculi gutt. 10.  
 M. f. pulv.  
 DS. Утромъ и вечеромъ по  
 чайн. л. (страданіе ге-  
 морроемъ).

96.

Kali bitartaric. s. Cremor.  
 tartari 30,0.  
 DS. Чайн. л. съ водой  
 (Temperans).

97.

Pulv. aëroph. s. effervescens:  
 Natr. bicarb. pulv. 2,5.  
 Da in capsula coerulea.  
 Acid. tartaric. pulv. 2,2.  
 Da in capsula alba.  
 S. Принимать по назначе-  
 нію (Шипучій порошок.).

## VIII. Adstringentia и Antidiarrhoïca.

98.

Tinct. Opii spl. 5,0.  
 DS. 3 раз. в. д. по 5—10  
 кап. при надобности че-  
 резъ 2 часа по 10 кап.

99.

Opii puri 0,03—0,1.  
 Sachar. alb. 0,5.  
 M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 6.  
 S. Черезъ 2—4 часа по  
 1 порош.

100.

Tinct. Opii spl. 5,0.  
 Tinct. nuc. vomic. 3,0.  
 Liq. anodyn. Hoffmanni 12,0.  
 (или же Tinct. Valerian.  
 aether. 12,0).  
 MDS. 3 раз. в. д. по 10—20  
 кап.

101.

Magister. Bismuth. 0,3.  
 Sachar. alb. 0,2.  
 (если нужно Opii puri, 0,03.)  
 M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 6.  
 S. 3 порош. в. д. — или  
 черезъ 3 часа по 1 по-  
 рош. всегда за часъ до  
 приема пищи.  
 NB. Въмѣсто Sachar alb.  
 можно, при увеличенной  
 кислотности въ желудкѣ,  
 прописать Natr. bicarb.  
 0,2.

102.

Bismuth. salicylic. 0,6.  
 D. tal. dos. Nr. 10.  
 S. 4 порош. в. д. (дезинфи-  
 цируетъ кишечникъ).

103.

Resorcini 5,0.  
 Bismuth. salicylic. 5,0.  
 Benzonaphtholi 5,0.  
 Magnes. carbonic. 15,0.  
 M. f. pulv.  
 DS. 4—6 раз. в. д. на кон-  
 чикъ ножа.



ГЕРБЕРТЪ ФРИДРИКОВИЧЪ  
НОРМАНЪ.



## 104.

Plumb. acetic. 0,05.  
 Opii puri 0,03.  
 Sachar. alb. 0,5.  
 M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 6.  
 S. 3 раз. в. д. по 1 порош.

## 105.

Argent. nitric. 0,2.  
 Aq. dest. 130,0.  
 Glycerini 20,0.  
 MDS. Черезъ 3 часа по стол.  
 л., дѣтямъ по чайн. л.  
 NB. Сохранять въ темномъ  
 мѣстѣ или прописывать  
 in vitro nigro.

## 106.

Pantopon 0,01—0,02.  
 Sachar. lact. 0,5.  
 M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 6.  
 S. 3 порош. в. д.

## 107.

Acid. tannic. 0,1—0,2.  
 Sachar. alb. 0,4.  
 (если нужно Opii puri 0,03).  
 M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 6.  
 S. 3 порош. в. д.

## 108.

Tannalbin 1,0—2,0.  
 D. tal. dos. Nr. 6.  
 S. 3 порош. в. д.

## 109.

Decoct. rad. Colombo 10,0.  
 на 130,0.  
 Syrup. spl. 20,0.  
 (если нужно съ Tinct. Opii  
 spl. gutt. 15).  
 MDS. Черезъ 2 часа по  
 стол. л.

## 110.

Mucilagin. Salep. 150,0.  
 (если нужно съ Tinct. Opii  
 spl. gutt. 15).  
 MDS. Черезъ 2 часа по  
 стол. л.  
 NB. Mucilago Salep есть  
 горячій отваръ 100 ч.  
 воды съ 1 ч. Tubera  
 Salep.

## 111.

Calomel. 0,006.  
 Sachar. alb. 0,3.  
 Ol. foeniculi gutt. 1.  
 M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 6.  
 S. 3 раз. в. д. по 1 порош.  
 (груднымъ дѣтямъ).

## 112.

Calomel. 0,01.  
 Sachar. alb. 0,5.  
 Tinct. Opii spl. gutt. 1.  
 M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 6.  
 S. 3 порош. в. д. (дѣтямъ  
 2—3 лѣтъ).

## 113.

Seminis Foeniculi 30,0.  
 DS. Чайными л. въ видѣ  
 отвара (Carminativum).

### Особья показанія имѣють :

## 114.

Aq. Calcis 150,0.  
 DS. Дес. л. нѣсколько р.  
 в. д. съ молокомъ (Ra-  
 chitis).  
 NB. Aqua Calcis содер-  
 житъ около 0,2% водной  
 соли галлуса.

TARTU DLIKOOLI  
 RAAMATUKOGU

## 115.

Ol. terebinth. gallic. 5,0.  
Aether sulf. 15,0.  
MDS. 3 раз. в. д. по 15  
кап. съ виномъ или ов-  
сянкою (Cholelithiasis).

## 116.

Cholelysin. liquid. 60,0.  
D. S. 3 раза въ день по  
одной чайн. л. и запить  
стаканъ слабосоленой  
воды.  
(Cholelysin содержитъ олеи-  
но-кислый натръ).

## 117.

Sacharini 0,05.  
Natr. bicarbon. 0,2.  
M. f. pulv.  
D. tal. dos. Nr. 20.  
S. Подслащать напитки  
(Diabetes mellit.).

## 117 a.

Novozon 30,0.  
DS. 3 раз. в. д. по концу  
ножа.  
(Novozon есть перекись  
магnezия =  $MgO_2$ ).

## 118.

Pankreatin 30,0.  
D. S. 3 раз. в. д. по концу  
ножа принимать послѣ  
ѣды.

## 119.

Какъ питательная  
клизма дается: 250,0  
молока, 2 желтка яиц.,  
 $\frac{1}{2}$  чайн. ложки поварен.  
соли,  $\frac{1}{2}$  чайн. ложки му-  
ки; размѣшать.  
Эта доза дается 4 раз. в. д.  
Утромъ и вечеромъ пред-  
варительно промыва-  
тельный клистиръ.

## 119 a.

Glycerini 3,0—5,0.  
S. вспырнуть въ видѣ  
клизмы помощью ма-  
ленькой спринцовки.  
(Очистительный клистиръ).

IX. Stomachica и  
Amara.

## 120.

Tinct. Chinae comp. 20,0.  
DS. 3 раза в. д. по 20—30  
кап. съ водой или ви-  
номъ.  
NB. Приготавливается изъ  
Cort. Chinae fusc., rad.  
Gentianae, cort. Aurant.

## 121.

Tinct. amarae 20,0.  
DS. также.  
NB. Приготавливается изъ  
fruct. Aurant., herb. Cen-  
taur. minor., rad. Gentian.,  
rhizom. Zedoariae.

## 122.

Tinct. Gentianae 20,0.  
Acid. muriat. dil. 10,0.  
MDS. 3 раз. в. д. по 20—30  
кап. черезъ часъ послѣ  
ѣды въ рюмкѣ воды.

## 123.

Acid. muriat. dil. 10,0.  
DS. 5—10 кап. на вин-  
ный стаканъ воды че-  
резъ часъ послѣ приня-  
тiя пищи.

## 124.

Pepsin. germanic. 2,0.  
Acid. muriat. dil. 1,0.  
Aq. dest. 40,0.  
Syrup. spl. 10,0.  
MDS. Чайн. л. въ водѣ  
послѣ кушанья.





## 125.

Extr. fluid. Condurango 30,0.  
DS. 3—5 раз. в. д. по 30 кап.

## 126.

Tinct. nuc. vomic. 5,0.  
Tinct. Valerian. 15,0.  
MDS. 3 раз. в. д. по 20 кап.

## 127.

Magnes. ustae 10,0.  
DS. На кончикъ ножа (кислая отрыжка, изжога).

## 128.

Pulv. Magnes. с. Rheo 10,0.  
DS. На кончикъ ножа.  
NB. Состоитъ изъ 4 ч.  
Magnes. carbonic., 1 ч.  
pulv. rad. Rhei, 2 ч.  
Elaeosachar. Foenicul. —  
(Hufeland'овскій дѣтскій порошокъ).

## X. Anthelminthica.

## 129.

Trochisci Santonini (à 0,06)  
D. Nr. 6.  
S. Утромъ и вечеромъ по 1 лепешкѣ (принимать 3 дня, потомъ Ol. Ricini).

## 130.

Flor. Cinae pulv. 1,0.  
D. tal. dos. Nr. 6.  
S. 3 раз. в. д. по 1 порош. (съ медомъ), потомъ Ol. Ricini.

## 131.

Pulv. rhizomat. Filic. maris 3,0.  
Extr. Filic. mar. aeth. 3,0.  
M. f. massa, ex qua formen-  
tur pil. Nr. 30.  
Consp. Lycopod.

DS. Принимать въ 2 приема.  
4 часа спустя Magnes.  
sulfuric. (до этого под-  
готовительное лечение).

## 132.

Extr. Filic. mar. aether. 2,0.  
Gummi arabic. 2,0.  
Aq. dest. 5,0.  
Syrup. spl. 15,0.  
MDS. Принимать въ 2  
приема, а 4 часа спустя  
Magnes. sulfuric. (дѣ-  
тямъ).

## 133.

Flor. Kusso 25,0.  
Mel. despumat. q. s. ut. f.  
electuar.  
DS. Принять въ 2 или 3  
приема черезъ часъ. 4  
часа спустя Ol. Ricini.

## 134.

Cort. rad. Granati pulv. 30,0.  
Infunde aq. frigid. 200,0.  
macera per 12 horas, tum  
coque usque ad remanent.  
colaturae 130,0 adde Sy-  
rup. Zingiberis 20,0.  
MDS. Принять въ 2 приема,  
потомъ Ol. Ricini.

## XI. Diuretica.

## 135.

Decoct. (baccar.) Junip. 15,0:  
120,0.  
Liq. Kali acetic. 30,0.  
MDS. Черезъ 2 часа по  
стол. л.  
NB. Liq. Kali aceticі со-  
держитъ около 33 % ук-  
сусно-кислаго калия въ  
водномъ растворѣ.

136.

Theophyllin. natrio-acetic.  
2,0.

Aq. dest. 150,0.

MDS. 3—6 стол. л. в. д.

(Theophyllin есть какъ и Coffein и Theobromin дери- вать Purinia — Theo- phyllin называется и Theocin).

137.

Calomel. 0,1.

Pulv. folior. Digitalis 0,05.

Sachar. alb. 0,4.

M. f. pulv.

D. tal. dos. Nr. 10.

S. Черезъ 3 часа по 1 по- рош. въ течение 4 до 6! дней.

(При водянкѣ, циррозѣ пе- чени).

(Осторожность! Stomatitis mercurialis!).

138.

Diuretin. 10,0.

Aq. Menthae piperit. 50,0.

Aq. dest. 90,0.

Syrup. spl. 10,0.

MDS. 4—6 стол. л. в. д.

(Diuretin есть Theobromi- num natrio-salicylic. —

При водянкѣ отъ сер- дечныхъ и легочныхъ болѣзней, также при сер- дечной жабѣ, и хрони- ческомъ нефритѣ).

## XII. Diaphoretica.

139.

Flor. Chamomillae 30,0 или

140.

Flor. Tiliae 30,0 или

141.

Flor. Sambuci 30,0.

DS. Заварить какъ чай.

142.

Liq. Ammon. acetic. 30,0.

DS. 1 стол. л. прибавить къ стакану чая изъ Flor. Chamomil. или Fl. Thiliae или Fl. Sambuci и пить въ тепломъ видѣ.

NB. Содержитъ 15 % ук- суснокислаго амміака въ водномъ растворѣ. Liq. Ammon. acetic. = Spiritus Mindereri.

Pilocarpin подкожно cfr. Nr. 281.

## XIII. Средства, упо- требляемые при забо- лѣваніи мочевыхъ органовъ.

143.

Fol. Uvae ursi 60,0.

DS. Заварить какъ чай.

144.

Urotropin 0,5.

D. tal. dos. Nr. 15.

S. 3 раз. в. д. по 1 порош. на стаканъ воды. Urotro- pin есть дери- вать форм- алдегида.

145.

Uricedin 60,0.

DS. 1—2 раз. в. д. по 1/2 до 1 чайн. л. на стаканъ теплой воды.

(Состоитъ изъ 67 ч. лимон- нокислаго натрія, 2 ч. ли- моннокисл. литія, 27,5 ч. сѣрнокисл. Na и 1,5 ч. NaCl).





146.

Lithii carbonic. 0,3.  
D. tal. dos. Nr. 12.  
S. 3 раз. в. д. по 1 порох.  
на стаканъ воды или  
сельтерской.

147.

Atophan 1,0.  
D. tal. dos. Nr. 6.  
S. 3 раз. в. д. по 1 по-  
рошк.  
(Подагра, суставной рев-  
матизмъ).

148.

Piperazin 1,0.  
D. tal. dos. Nr. 12.  
S. Одинъ порох. раство-  
рить въ  $\frac{1}{2}$  литра сель-  
терской воды и выпивать  
въ теченіи дня.

Салициловая кисл. cfr. Nr. 4.  
Salol cfr. Nr. 9.

149.

Lupulini 0,3.  
Camphorae trit. 0,1.  
M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 6.  
S. 1 порох. вечеромъ (бо-  
лѣзненные эрекции).

150.

Balsam. Copaivae 1,0—2,0.  
D. in capsula gelatinosa,  
tal. dos. Nr. 12.  
S. 3—4 капсульки в. д.

151.

Ol. ligni Santali 1,0—2,0.  
DS. также.

## XIV. Narcotica и Hypnotica.

152.

Aq. Laurocerasi 20,0.  
Morph. muriat. 0,1.  
MDS. 3 раз. в. д. по 20 кап.  
Можно дойти до приема  
черезъ 2 часа по 20 кап.  
NB. Вмѣсто aq. Laurocer.  
можно также прописать  
aq. Amygdalar. amargar.

153.

Morph. muriat. 0,01—0,015.  
Sachar. alb. 0,5.  
M. f. pulv. d. t. dos. Nr. 6.  
S. Вечеромъ 1 пор. (какъ  
снотворное) или 3 раз.  
в. д. по 1 порох.

Morph. подкожно cfr. Nr.  
274.

Pulv. Doveri cfr. Nr. 21.

154.

Codeïni 0,03—0,05.  
Sachar. alb. 0,5.  
M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 6.  
S. Вечеромъ 1 порох. (какъ  
снотворное) или 3 раз.  
в. д. по 1 порох. (До-  
рого!)

155.

Chlorali hydrati 4,0.  
Aq. dest. 25,0.  
Syrup. gummos. 25,0.  
MDS. Принять въ 2 приема  
въ теченіе  $\frac{1}{2}$  часа (при  
Delirium tremens, уре-  
мич. конвульсіяхъ двойн.  
доза).  
NB. Syrupus gummosus со-  
стоитъ изъ 8 ч. Syrup.  
spl., 8 ч. Mucilag. gummi  
arabic. и 1 ч. Aq. flor.  
Aurantior.

## 156.

Bromural 0,3.  
D tal. dos. Nr. 6.  
S. 3 порошок. в. д. или какъ  
снотворное 2 порошок. за  
одинъ разъ на ночь.

## 157.

Trional. pulv. 1,0—1,5.  
D. tal. dos. Nr. 3.  
S. Вечеромъ 1 порошок. съ  
молокомъ или водой.

## 158.

Veronal 05,—1,0.  
D. tal. dos. Nr. 3.  
S. Принимать вечеромъ  
одинъ порошокъ въ теп-  
ломъ молокѣ или въ теп-  
лой водѣ (Veronal есть  
деривать мочевины).

## 159.

Kalii bromati 1,0—2,0.  
D. tal. dos. Nr. 4.  
S. Вечеромъ 1 порошок. съ  
водой.

## 160.

Chloroformii 30,0.  
DS. Въ собств. руки врача.

## XV. Roborantia.

## 161.

Liq. Ferri oxychlorati 30,0.  
DS. 3 раз. в. д. по 20—30  
кап. принимать на про-  
стой или сахарной водѣ.

## 162.

Ferri lactici 3,0.  
Extr. Chinae 3,0.  
Extr. Strychni spirit. 0,3.  
Extr. Gentianae q. s. ut. f.  
pil. Nr. 30.  
Consp. Lycopod.  
DS. 3 пил. в. д.

## 163.

Tinct. Ferri pomat. 30,0.  
DS. 3 раз. в. д. по 20—30  
кап.

## 164.

Tinct. Ferri chlorati aethe-  
rae Bestusheffii 20,0.  
DS. 3 раз. в. д. по 20 кап.

## 165.

Ferri sulfuric. 4,0.  
Kalii carbonic. 4,0.  
Extr. Liquirit. q. s. ut. f.  
boli Nr. 30.  
Consp. Lycopod.  
DS. 3 раз. в. д. по 2 пил.  
(пилюли Blaud'a).  
NB. Превращается въ fer-  
rum carbonicum и Kali  
sulfur.

## 166.

Haematogen. sicc. 60,0.  
DS. 3 раз. в. д. по чайн. л.

## 167.

Ferri lactic. 0,1.  
Sachar. alb. 0,4.  
M. f. pulv. d. tal. dos. № 12.  
S. 3 раз. в. д. по 1 порошок.  
(дѣтямъ).

## 168.

Ferri hydrogen. reduct. 3,0.  
Acid. arsenicos. 0,06.  
Extr. Liquirit. q. s. ut. f.  
pil. Nr. 30.  
Consp. Lycopod.  
DS. 3 раз. в. д. по 1 пил.

## 169.

Tinct. Ferri pomat. 15,0.  
Tinct. Chinae comp. 15,0.  
MDS. 3 раз. в. д. по 30 кап.

## 170.

Tinct. Ferri pomat. 15,0.  
Tinct. Valerian. 15,0.  
MDS. 3 раз. в. д. по 30 кап.





171.

Ferri hydrogen. reduct. 2,0.  
Chinini sulf 2,0.  
Extr. Liquirit. q. s. ut. f.  
pil. Nr. 30.  
Consp. Lycopod.  
DS. 3 раз. в. д. по 2 пил.

177.

Vini Lusitanic. facticii 180,0.  
DS. Черезъ 2 ч. по стол. л.  
NB. Содержитъ 20% ал-  
коголя и Syrup охусосси  
съ ананасной эссенцией.  
Название „Vin. Lusitanic.  
factic.“ не оффициально,  
но употребляется только  
въ Юрьевской Клиникѣ.

## XVI. Analeptica и Excitantia.

172.

Camphorae trit. 0,1.  
Gummi arabic. pulverat 0,4.  
M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 6.  
S. Черезъ 2—3 часа по 1  
порш.

173.

Aether sulfuric. 15,0. или

174.

Aether. acetic. 15,0.  
DS. 3—6 раз. в. д. по 10  
кап. на сахаръ.

175.

Spirit. aether. Hoffmanni  
15,0.  
DS. 3—6 раз. в. д. по 10—20  
кап. на сахаръ.  
NB. Spirit. aether. s. Liq.  
anodynus Hoffmanni со-  
держитъ: 1 ч. эфира и  
3 ч. Spirit. vini alko-  
holicat. (95%).

176.

Tinct. Valerian. aether. 15,0.  
DS. 3—6 раз. в. д. по 10—20 к.  
NB. Содержитъ 4 ч. Spirit.  
vini rectificatiss. (90%)  
и 2 ч. эфира на 1 ч.  
radix Valerianaе.

## XVII. Nervina.

178.

Kali bromati 4,0—10,0.  
Aq. dest. 150,0.  
MDS. 3 раз. в. д. по стол. л.

179.

Infus. rad. Valerian. 10,0:  
150,0.  
Kali bromati 5,0.  
MDS. 3 р. в. д. по стол. л.

180.

Natrii bromati 2,0—5,0.  
Ammon. bromati 2,0—5,0.  
Aq. dest. 150,0.  
MDS. 3 раз. в. д. по стол.  
ложкѣ.

181.

Coffeïni puri 0,1.  
Sachar. alb. 0,4.  
M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 10.  
S. 3—5 раз. в. д. по 1 порш.

181 a.

Yohimbin hydrochloric. 0,1.  
Aq. dest. 20,0.  
MDS. 3 раз. в. д. по 15—20 к.  
(неврастеническое мужское  
безсплие).

## 182.

Argent. nitric. 0,6.  
 Extr. Liquirit. q. s. ad pil.  
 Nr. 30.  
 Consp. Lycopod.  
 DS. 3 раз. в. д. по 1 пил.  
 до приема пищи.

## 183.

Extr. Secal. cornuti (s. Ergo-  
 tinum Bonjeani) 3,0.  
 Pulv. rad. Liquirit. q. s. ad  
 pil. Nr. 30.  
 Consp. Lycopod.  
 DS. 3 пил. в. д. (Tabes).

## 184.

Atropini sulf. 0,01.  
 Extr. Liquirit. et pulv. rad. Li-  
 quirit. q. s. ut f. pil. Nr. 20.  
 Consp. Lycopod.  
 DS. 1—3! пил. в. д. (эпи-  
 лепсія).

## 185.

Extract. Hyoscyami 1,0.  
 Aq. Laurocer. 20,0.  
 MDS. 3 раз. в. д. по 20 кап.

## 186.

Extr. Strychni spirituos. 0,5.  
 Extr. Liquirit. q. s. ut f. pil.  
 Nr. 30.  
 Consp. Lycopod.  
 DS. 3 раз. в. д. по 1—2 пил.

## 187.

Extract. fluid. nucis Colae  
 30,0.  
 DS. 3 раз. в. д. по 20 кап.

## 188.

Solut. arsenical. Fowleri 5,0.  
 Aq. Menthae 10,0.  
 MDS. 3 раз. в. д. по 6—15  
 кап. послѣ ѣды.  
 NB. Solut. arsenical. Fowleri  
 s. Liq. Kali arsenicosi со-

держитъ: 1 ч. мышьяко-  
 вистой кислоты въ 100 ч.  
 жидкости. Осторожность  
 при употребленіи: посте-  
 пенно повышать дозу.

## 189.

Acid. arsenicos. 0,25.  
 Piper. nigr. pulv. 2,0.  
 Mucilag. Gummi arabic. 5,0.  
 M. f. pil. Nr. 50.  
 Consp. Lycopod.  
 DS. 1 пил. в. д.; черезъ нѣ-  
 сколько дней по 2 пил.,  
 потомъ по 3 пил. в. д. и въ  
 такомъ количествѣ при-  
 нимать болѣе продолжит.  
 время (Pilulae asiaticae).

## 190.

Zinc. valerianic. 1,5.  
 Extr. Liquirit. q. s. ad pil.  
 Nr. 30.  
 Consp. Lycopod.  
 DS. 3 раз. в. д. по 1 пил.

## 191.

Tinct. Valerianae 30,0.  
 DS. 3 раз. в. д. по 30 кап.

## 192.

Tinct. Asae foetid. 15,0.  
 Tinct. Valerianae 15,0.  
 MDS. 3 раз. в. д. по 30 кап.

## 193.

Magister. Bismuthi 2,0.  
 Asae foetidae 2,0.  
 Extract. Valerianae q. s. ut  
 f. pil. Nr. 30.  
 Consp. Lycopod.  
 DS. 3 раз. в. д. по 2 пил.  
 (истерическія кардіаль-  
 гіи).





**XVIII. Resorbentia.****194.**

Kalii jodati 3,0—10,0.  
Aq. dest. 150,0.  
MDS. 3 раз. в. д. по стол. л.

**195.**

Jodi puri 0,1.  
Kalii jodati 3,0.  
Aq. dest. 30,0.  
MDS. 3 раз. в. д. по 15—40  
кап. принимать въ мол.

**196.**

Syrup. ferri jodati 15,0.  
DS. 3 раз. в. д. по 10—30  
кап. съ простой или са-  
харной водой.  
NB. Syrup. ferri jodati со-  
держитъ 5<sup>0</sup>/<sub>0</sub> іодистаго  
желѣза или около 4<sup>0</sup>/<sub>0</sub>  
іода и 1<sup>0</sup>/<sub>0</sub> желѣза.

**197.**

Jodol 0,2.  
Da in capsula amylacea tal.  
dos. Nr. 15.  
S. 2—3 капсульки в. д.  
NB. Jodol содержитъ 90<sup>0</sup>/<sub>0</sub>  
іода.

**197 a.**

Natri jodati 6,0—8,0.  
Natri nitrosi 1,0—2,0.  
Aq. dest. 200,0.  
MDS. 3 раза в. д. по ст. л.  
принимать въ  $\frac{1}{2}$  стаканѣ  
молока.

**198.**

Aether. phosphorat. 2,0.  
Ol. jecor. Aselli 100,0.  
MDS. 2 раз. в. д. по чайн.  
л.; постепенно повышать  
дозу (Rachitis.)  
NB. Aether phosphorat. со-  
держитъ 1 ч. фосфора въ  
200 ч. эфира.

**XIX. Nutrientia.****199.**

Ol. jecor. Aselli 150,0.  
DS. 1—3 стол. л. в. д.

**200.**

Ol. jecor. Aselli 150,0.  
Aether. sulf. 2,0.  
MDS. 1—3 стол. л. в. д.

**XX. Organothera-  
peutica.****201.**

Tablettae Thyreoïdini Nr. 30.  
DS. 1—2 таблетки в. д.  
(Одна таблетка соотвѣт-  
ствуетъ 0,3 свѣжаго ве-  
щества щитовидн. же-  
лѣзы.)

**201 a.**

Antithyreoïdin 10,0.  
DS. По 5—20 кап. 3 раза  
въ день. Доза постепенно  
увеличивается начиная  
съ 5 капель пока не упо-  
треблено всего 50 грам.  
(Antithyreoïdin есть кро-  
вяная сыворотка овецъ,  
которымъ удалена щито-  
видная железа.)

**202.**

Tablettae Ovariini Nr. 30.  
DS. 3 таблетки в. д. (Одна  
таблетка соотвѣтствуетъ  
0,3 вещества яичника).

**203.**

Essentiae Spermini 30,0.  
DS. 3 раз. в. д. по 30 кап.

**XXI. Suppositoria.****204.**

Butyr. Cacao 2,0.  
 Extr. Belladonnae 0,03.  
 M. f. massa ex qua formetur suppositorium.  
 D. tal. suppositor. Nr. 4.  
 S. По предписанію (2 свѣчки. в. д.).

**205.**

Какъ extr. Belladonn. можно также прописать и Tannin 0,2; Extract. Hyoscyami 0,03; Opium purum 0,03 pro supposito.

**XXII. Наружныя средства.****206.**

Ol. Terebinth. Rossic. 30,0.  
 Ol. Olivar. 30,0.  
 MDS. Втираніе.

**207.**

Ungt. Veratrini 20,0.  
 DS. Втираніе.  
 NB. Содержить 1 ч. вератрина на 50 ч. жира.

**208.**

Chloroformii 10,0.  
 Ol. Olivar. 40,0.  
 MDS. Втираніе.

**209.**

Spirit. saponat. 100,0.  
 DS. Втираніе.  
 NB. Содержить около 5 ч. калийнаго мыла на 12 ч. разведеннаго спирта.

**210.**

Spirit. camphorat. 60,0.  
 DS. Втираніе.  
 NB. Содержить 1 ч. камфоры въ 12 ч. спирта.

**211.**

Spirit Sinapis 60,0.  
 DS. Наружное.  
 NB. Содержить 1 ч. горчичнаго масла въ 49 ч. спирта.

**212.**

Spirit. sinapis 50,0.  
 Spirit. saponat. 50,0.  
 MDS. Втираніе.

**213.**

Liniment. volatil. 60,0.  
 DS. Втираніе.  
 NB. Амміачное мыло изъ 1 ч. Liq. Ammon. caust. и 3 ч. прованскаго масла.

**214.**

Linim. saponato-camphorat. (s. Opodeldok) 60,0.  
 DS. Втираніе.  
 NB. Содержить главнымъ образомъ натронное мыло, камфору, амміакъ и спиртъ.

**215.**

Chartae sinapisatae Nr. 2.  
 DS. Горчичникъ. Примѣнять по назначенію.

**216.**

Emplastr. Cantharid. ordin. extens. magnitudine volae manus (или: folio allato aequatum).  
 DS. По назначенію.  
 NB. Содержить 1 ч. измельченныхъ въ порошокъ шпанскихъ мухъ на 3 ч. плас-





тырной массы. Вызываетъ въ теченіе 8—12 час. образование пузырей.

## 217.

Jodi puri 2,0—3,0.  
Vasogen. liquid. 30,0.  
MDS. Втираніе.

## 218.

Kalii jodati 3,0.  
Axung. porci 30,0.  
Tinct. Jodi gutt. 30.  
M. f. ungt.  
DS. Втирать.

## 219.

Tinct. jodi 10,0.  
Tinct. Gallar. 10,0.  
MDS. Смазывать.

## 220.

Aq. Plumbi 100,0.  
DS. Наружное (или для примочекъ).  
NB. Содержитъ основную уксуснокислую окись свинца, растворенную въ водѣ.

## 221.

Ol. Carbohc. (5<sup>0</sup>/) 30,0.  
DS. Наружное.

## 222.

Zinc. oxydat. 10,0.  
Amyli trit. 10,0.  
M. f. pulv. DS. Присыпка.

## 223.

Talc. Venet. 20,0.  
DS. Присыпка.

## 224.

Acid. salicylic. 5,0.  
Amyli trit. 95,0.  
M. f. pulv. DS. Присыпка.

## 225.

Tannoformii 10,0.  
Talci. venet. 20,0.  
M. f. pulv. DS. Присыпка.  
(Поты чахоточныхъ, ножной потъ).  
NB. Tannoformъ есть соединеніе таннина и формалина.

## 226.

Vaselini 20,0.  
DS. Наружное.

## 227.

Ungt. simpl. 30,0.  
DS. Наружное.  
NB. 3 ч. оливковаго масла, стопленные съ 1 ч. воска; восковая мазь.

## 228.

Ungt. Zinci 30,0.  
DS. Наружное.  
NB. Содержитъ 1 ч. окиси цинка на 8 ч. жира и 1 ч. воска.

## 229.

Zinc. oxydat. 15,0.  
Amyli tritic. 15,0.  
Vaselini flav. 30,0.  
M. f. pasta. DS. Наружное.  
NB. Такъ называем. Las-sar'евская паста.

## 230.

Hydrarg. praecipitat. alb. 2,0.  
Vaselini или Axung. porci 20,0.  
M. f. ungt. DS. Наружное.

## 231.

Acid. boric. 3,0.  
Vaselini 30,0.  
M. f. ungt. DS. Наружное.

## 232.

Lanolini 10,0.  
 Aq. dest. 5,0.  
 M. adde Vaselini 5,0.  
 M. f. ungt. DS. Наружное.  
 NB. Эта мазь можетъ быть употребляема тоже какъ основная масса въ другихъ мазяхъ вмѣсто свиного сала или вазелина.

## 233.

Emplastr. Litharg. simpl.  
 (или Emplastr. diachylon)  
 30,0.  
 DS. Наружное.  
 NB. 1 ч. окиси свинца, омыленная 1 ч. деревяннаго масла и 1 ч. свиного сала для образования пластырной массы.

## 234.

Emplastr. adhaesiv. extens.  
 latitudine 20 Cmtr., longi-  
 tudine 5 и болѣе Cmtr.  
 DS. Наклеить по предпи-  
 санію.  
 NB. Есть emplastr. Litharg.  
 simpl. съ прибавленіемъ  
 колофонія.

## 235.

Ungt. Plumbi tannici 30,0.  
 DS. Наружное (Decubitus).  
 NB. Состоить изъ 1 ч.  
 Acid. tannic., 6 ч. Plumb.  
 acetic. basic. solut. и 24 ч.  
 Ungt. spl.

## 236.

Emplastr. Litharg. simpl.  
 15,0.  
 Ol. olivar. 15,0.  
 M. f. ungt. DS. Наружное.  
 (Ungt. diachylon Hebrae.)

## 237.

Chrysarobini 5,0.  
 Vaselini 20,0  
 M. f. ungt. DS. Наружное.

## 238.

Acid. pyrogallic. 3,0.  
 Vaselini 30,0.  
 M. f. ungt. DS. Наружное.

## 239.

Ol. rusci (или Picis liquid.)  
 15,0.  
 Spirit. vini 15,0.  
 MDS. Наружное.

## 240.

Ol. cadini или Ol. empyrheu-  
 matic. Juniperi 5,0.  
 Ol. olivar. 25,0.  
 MDS. Наружное (дегтярное  
 масло).

## 241.

Ol. cadini 5,0.  
 Ungt. diachyl. Hebrae 25,0.  
 M. f. ungt. DS. Наружное.

## 242.

Picis liquid. 10,0.  
 Flor. sulfuris lot. 10,0.  
 Sapon. virid. 20,0.  
 Vaselini 20,0.  
 M. f. ungt. DS. Наружное.  
 (Wilkinson'овская мазь, ви-  
 доизмѣненная Геброй).

## 243.

Axung. porci 50,0.  
 Sapon. virid. 25,0.  
 $\beta$ -Naphthol 5,0—7,0.  
 Cretae alb. 5,0.  
 M. f. ungt. DS. Наружное.  
 (Мазь противъ чесотки  
 по Karosi, Pityriasis.)





## 244.

Sapon. virid. s. sapon. kalin.  
nigr.) 30,0—60,0.  
DS. Наружное или втирание.  
NB. Ёдкое кали, омылен-  
ное льнянымъ масломъ.

## 245.

Sulfur. praecipitat. 3,0.  
Axung. porci или Ungt.  
Lanolini 30,0.  
M. f. ungt. DS. Наружное.

## 246.

Sulfur. praecipit. 10,0.  
Aq. Laurocer. 10,0.  
Aq. Calcis 50,0.  
MDS. Осадокъ вечеромъ  
нанести кисточкой.

## 247.

Solution. Vleminckx 100,0.  
DS. Наружное.  
NB. Содержитъ сѣрнистый  
кальцій и подсѣрнисто-  
кислую известь, разве-  
денные въ водѣ.

## 248.

Ichthyol. 6,0.  
Vasogen 60,0.  
MDS. Втирание. (Prurigo).

## 249.

Balsam. Peruvian. 10,0.  
Spirit. vini rectific. (70 %)  
20,0.  
MDS. Втирание.

## 250.

Petrolei 100,0.  
DS. Наружное (противъ  
головныхъ вшей).

## 251.

Creolin 3,0.  
Aq. dest. 100,0.  
MDS. Наружное (парази-  
тарныя кожныя болѣзни).

## 252.

Acid. salicylic. pulv. 2,0.  
Tinct. Benzoës 3,0.  
Ol. olivar. 100,0.  
MDS. Масло для волосъ.

## 253.

Ungt. Hydrarg. ciner. 10,0.  
DS. Наружное или втирание.  
NB. Содержитъ 1 ч. ртути  
на 2 ч. жира.

## 253 a.

Argenti colloïdalis 5,0.  
Cerae flavae 3,0.  
Adipis suilli benzoat. 27,0.  
M. f. ungt.  
DS. втирать разъ въ день  
по одному грамму (дѣ-  
тямъ), до 3 граммъ (взрос-  
лымъ). (Unguentum Cre-  
dé).

## 253 b.

Acid. salicylic. pulv. 15,0.  
Spirit. saponat. 85,0.  
MDS. втирание (Salicylsa-  
pen, Суставной ревма-  
тизмъ и ревматическiя  
боли).

## 254.

Menthol 1,0.  
Vasolini 25,0.  
Ol. Caryophyll. gutt. 5.  
M. f. ungt. DS. втирание.

## 255.

Liniment calcarei 100,0.  
DS. Для повязки (ожоги).

ND. Смѣсь изъ равныхъ частей льнянаго масла и известковой воды.

## 256.

Xeroformii 1,0.

Vaselini 10,0.

M. f. ungt. DS. Наружное. (ulcus molle etc.).

## 257.

Dermatol 10,0.

DS. Наружное. (ulcus molle etc.).

## 258.

Впрыскиванія въ мочеиспускательный каналъ:

a) Zinc. sulfuric. 0,3:100,0.

b) Protargol  
0,3—3,0:100,0.

c) Kali hypermanganic.  
0,3:100,0.

d) Hydrarg. bichlorat.  
corrosiv. 0,01:100,0.

Всѣ въ водномъ растворѣ.

DS. Впрыскивать въ мочеиспускат. каналъ.

## 259.

Промыванія мочевого пузыря:

a) Argent. nitric.  
1,5:500,0.

b) Resorcin 15,0:500,0.

c) Acid. boric. 10,0:500,0.

Всѣ въ водномъ растворѣ.

DS. Для промыванія пузыря.

## 260.

Kalii sulfurat. pro balneo.  
100,0.

D. tal. dos. Nr. 3.

S. Прибавлять по 1 мѣшечку на ванну.

## 261.

Pulv. dentifric. camphorat.  
20,0.

DS. Зубной порошок.

NB. Содержитъ 2 части Camphor. trit., 2 ч. Balsam. vitae Hoffmanni, 50 ч. Calcar. carbonic. praecipit., 3 ч. Magnes. carbonic., 10 ч. pulv. rad. Iridis florént. — Не оффицинально.

## 262.

Argent. nitric. fus. 2,0.

DS. Въ собств. руки врача.

## 263.

Acid. chromic. 5,0.

Aq. dest. 5,0.

MDS. Наружное (для прижиганія бородавокъ etc.).

## 264.

Zinc. sulf. 0,03.

Aq. Rosae 30,0.

MDS. Глазные капли.

## XXIII. Antisymphilitica.

cfr. Nr. 112. 194.

## 265.

Ungt. Hydrarg. ciner.  
3,0—4,0.

Da in chart. cerat.

tal. dos. Nr. 6.

S. Втирать ежедневно одинъ пакетикъ.

## 266.

Ungt. Hydrarg. ciner. 1,0.

DS. Также (дѣтямъ).





267.

Emplastr. Hydrarg. extens.  
latitudine 20 cmt., longi-  
tudine 5 cmt.

DS. Наружное.

NB. Содержитъ 1 ч. ртути  
въ 4 ч. массы липкаго  
пластыря; иначе назыв.  
Emplastr. mercuriale.

268.

Hydrarg. bichlorat. corrosiv.  
0,2.

Natr. chlorat. 2,0.

Aq. dest. 20,0.

MDS. Для подкожныхъ  
впрыскиваний.

269.

Hydrarg. salicylic. 1,0.

Vaselini liquid. 10,0.

MDS. Также.

270.

Enesol.

Ежедневно или черезъ день  
впрыскивать подкожно  
по 2 куб. цмтр.

(Enesol есть 3% водный  
растворъ салициломы-  
шяковой ртути).

271.

Hydrarg. bijodat 0,1.

Kalii jodati 5,0.

Aq. dest. 150,0.

MDS. 3 раз. в. д. по стол. л.

272.

Calomel. vapore parat. 10,0.

DS. Наружное (пудрить си-  
филит. папулы).

273.

Hydrarg. bichlorat. corrosiv.  
0,25—1,0.

Aq. dest. 25,0

MDS. Наружное. Въ собств.  
руки врача.

273 а.

Salvarsan и Neosalvarsan.  
Составъ и примѣненіе см.  
въ руководствахъ.

## XXIV. Средства для подкожныхъ впры- скиваний.

Таковыя должны всегда  
прописываться въ собств.  
руки врача и не должны  
предоставляться боль-  
нымъ для собственнаго  
употребленія.

274.

Morph. muriat. 0,1.

Aq. dest. 10,0.

MDS. Для подкожн. впры-  
скиваний ( $\frac{1}{2}$  до цѣлаго  
Pravaz'скаго шприца p.  
dosi).

275.

Atropini sulfuric. 0,01.

Aq. dest. 10,0.

MDS. Также.

( $\frac{1}{2}$  до цѣлаго шприца  
pro dosi. — При кровохар-  
кани черезъ 3 часа по  
 $\frac{1}{3}$  шприца до 0,002 p. die.)

276.

Apomorphini muriat. 0,1.

Aq. dest. 10,0.

MDS. Также.

( $\frac{1}{2}$  шприца pro dosi.)

277.

Camphorae trit. 1,0.

Ol. Amygdalar. dulc. 10,0.

MDS. Также (одинъ шприць  
p. dosi.)

## 278.

Strychnini nitric. 0,04.  
Aq. dest. 10,0.  
MDS. Также.  
( $\frac{1}{2}$  до цѣлаго шприца pro  
dosi.)

## 279.

Extract. Secalis cornuti (s.  
Ergotini Bonjeani) 1,0.  
Aq. dest. 10,0.  
MDS. Также.  
( $\frac{1}{2}$  до цѣлаго шприца pro  
dosi.)

## 280.

Cornutini citric (Kobert)  
0,05.  
Aq. dest. 10,0.  
MDS. Также.  
(одинъ шприць pro dosi.)

## 281.

Pilocarpini muriat. 0,2.  
Aq. dest. 10,0.  
MDS. Также.  
( $\frac{1}{2}$  до цѣлаго шприца  
pro dosi.)

## 282.

Cocain. hydrochlor. 0,2—0,3.  
Aq. dest. 10,0.  
MDS. Въ собств. руки врача.  
(подкожно  $\frac{1}{2}$  до цѣлаго  
шприца).

## 282 a.

Eucain- $\beta$  0,1.  
Natr. chlorat. 0,8.  
Aq. dest. 100,0.  
M. Sterilisa.  
DS. Въ собств. руки врача.  
(вспрыснуть за одинъ  
разъ при Jschias).

## 282 b.

Stovain. 0,08.  
Natr. chlorat. 0,002.  
Aq. dest. 2,0.  
M. Sterilisa.  
DS. Въ собств. руки врача.  
(впрыснуть  $1\frac{1}{2}$  до 2 куб.  
цмтр. Поясничная ане-  
стезія).

## 283.

Kalii arsenicosi 0,05.  
Aq. dest. 15,0.  
MDS. Для подкожныхъ  
впрыскиваний.  
( $\frac{1}{2}$  до 1 куб. цмтр. 1—2  
разъ в. д.)

## 284.

Natr. cacodylic. 0,5—1,5.  
Aq. dest. 30,0.  
Acid. carbolic. liquef. gutt.2.  
MDS.  $\frac{1}{2}$ —1 шприць в. д.

## 285.

Hetol. 0,1—0,2.  
Aq. dest. 10,0.  
MDS.  $\frac{1}{2}$ —1 шприць в. д.  
(Hetol есть коричнево-кислый  
натръ).

## 286.

Coffeïni puri 1,0.  
Natr. salicylic. 0,5.  
Aq. dest. 10,0.  
MDS. Одинъ шприць pro  
dosi.

## 287.

Digalen 10,0  
DS. 1—3 Кубическихъ цен-  
тиметровъ вспрыснуть  
внутривенно (Острая сла-  
бость сердца).





287 a.

Strophantin 0,01.

Aq. dest. 10,0.

MDS.  $\frac{1}{2}$  до цѣлаго куб.  
 цмтр. вспрыснуть вну-  
 тривенно черезъ день.  
 (Слабость сердца).

288.

Argent. colloïdal. 1,0.

Aq. dest. steril. 50,0.

MDS. 5 Кубич. сантиметр.  
 внутривенно одинъ разъ  
 въ день (Гнило-гноекро-  
 вие). Argent. colloïdal.  
 называется и Collargol.

289.

Natr. chlorat. puriss. 8,5.

Aq. dest. steril. 1000,0.

MDS. Физиологическій ра-  
 створъ поваренной соли.

---

## XXV. Ванны.

На одну ванну для взро-  
 слаго тѣбуется прибли-  
 зительно 250 литр. или  
 200 штоф. = 20 ведеръ  
 воды.

На одну 1—2% соленую  
 ванну идетъ  $2\frac{1}{2}$ —5 Кило  
 = 6—12 фунтовъ круп-  
 ной поваренной соли.

На одну углекислую ванну  
 берутъ  $\frac{1}{2}$  Кило = 1,2  
 фунта Natr. bicarbonic.  
 и затѣмъ медленно при-  
 бавляютъ  $\frac{1}{3}$  Кило = 0,8  
 фунта Acid. hydrochloric.  
 crudi.

## Максимальныя дозы

нѣкоторыхъ сильно дѣйствующихъ средствъ  
по Русской фармакопее.

	pro dosi	pro die
Acidum arsenicosum . . . . .	0,003	0,015
Acidum carbolicum . . . . .	0,03	0,2
Agaricinum . . . . .	0,1	—
Ammonium bromatum . . . . .	2,0	9,0
Amylenhydrat . . . . .	4,0	8,0
Amylium nitrosum . . . . .	1 кап.	6 кап.
Antipyrinum . . . . .	2,0	6,0
Apomorphinum muriat. . . . .	0,01	0,05
Apomorphin mur. (подкожно)	0,005	—
Aqua amygdalar. amar. . . . .	2,0	8,0
Argent. nitric. cryst. . . . .	0,03	0,18
Atropinum sulfuric . . . . .	0,001	0,003
Bismuthum salicylicum . . . . .	0,6	2,4
Camphora bromata . . . . .	0,36	1,25
Chloralum hydrat. cryst. . . . .	2,0	6,0
Chloroformium . . . . .	0,5	1,0
Cocainum hydrochloric . . . . .	0,03	0,12
Codeinum . . . . .	0,06	0,2
Coffeinum purum . . . . .	0,2	1,0
Cuprum sulfuric. (какъ рво- тное) . . . . . отъ	0,18 до 0,5	
Extract. Aconiti . . . . .	0,02	0,1
„ Belladonnae . . . . .	0,03	0,2
„ Hyoscyami . . . . .	0,06	0,3
„ Secalis cornuti . . . . .	0,3	0,9
„ nucis vomic. s. Strychni	0,03	0,12
Folia Digitalis (порошокъ) . . . . .	0,1	0,8
Hydrarg. bichlorat. corrosiv. . . . .	0,01	0,06
„ bijodat. . . . .	0,02	0,06
„ chlorat. mite . . . . .	0,6	1,8
„ jodatatum flavum . . . . .	0,12	0,36





	pro dosi	pro die
Jodum purum . . . . .	0,01	0,05
Kalium bromatum . . . . .	4,0	10,0
„ jodatum . . . . .	1,0	6,0
Kreosotum . . . . .	0,5	2,0
Liquor Kali arsenicosi . . . . .	3 кап.	15 кап.
Morphium muriat . . . . .	0,03	0,1
Natrium bromatum . . . . .	4,0	15,0
Nitroglycerinum . . . . .	0,0005	0,0015
Opium purum . . . . .	0,15	0,5
Phenacetin . . . . .	1,0	4,0
Phosphorus . . . . .	0,001	0,005
Pilocarpin. muriat. . . . .	0,02	0,05
Plumbum acetic. . . . .	0,06	0,25
Podophyllum . . . . .	0,05	0,4
Podophyllotoxinum . . . . .	0,015	0,03
Resina Jalapae . . . . .	0,15	0,5
Salolum . . . . .	1,0	8,0
Santoninum . . . . .	0,1	0,4
Sapo jalapin. . . . .	0,3	0,8
Secale cornut. pulv. . . . .	1,0	5,0
Stibio - Kali tartaric. (КАБЪ рвотное) . . . . .	0,1	0,5
Strychninum nitric. . . . .	0,003	0,01
Sulfonal . . . . .	2,0	6,0
Syrup. ferri jodati . . . . .	4,0	12,0
Tinct. Convallar. majal. . . . .	20 капель	60 капель
„ Digitalis . . . . .	15	45
„ Nuc. vomic. . . . .	15	45
„ Opii spl. . . . .	10	40
„ Stramonii . . . . .	15	45
„ Strophanti sem. . . . .	8	25
Vinum Ipecacuanh. . . . .	30	90
„ stibiatum. . . . .	28	100
Zincum valerianic. . . . .	0,05	0,2

Указанные выше приемы высчитаны для взрослых. Дѣтямъ и малолѣтнимъ прописываются соотвѣтственно возрасту меньшіе приемы, а именно въ общемъ

Дѣтямъ до 1 года  $\frac{1}{20}$  до  $\frac{1}{10}$  дозы, назнач. для взрослыхъ

”	”	3	”	$\frac{1}{8}$	”	”	”	”
”	”	5	”	$\frac{1}{6}$	”	”	”	”
”	”	8	”	$\frac{1}{4}$	”	”	”	”
”	”	11	”	$\frac{1}{3}$	”	”	”	”
”	”	15	”	$\frac{1}{2}$	”	”	”	”

Молодымъ людямъ

до 20 года  $\frac{3}{4}$

” ” ” ”





# Index.

---

## A.

- Acidum arsenicosum 168. 189.  
 „ benzoicum 32.  
 „ boricum 54. 231. 259.  
 „ carbolicum 52. 53. 221.  
 „ chromicum 263.  
 „ muriaticum dilutum 14. 123. 124.  
 „ phosphoricum dilutum 15.  
 „ pyrogallicum 238.  
 „ salicylicum 4. 224. 252. 253 b.  
 „ tannicum 58. 107. 205.  
 „ tartaricum 97.  
 Aconiti tubera cfr. Extract. Aconiti.  
 Adonis vernalis (herba Adonidis vernal.) 65.  
 Adrenalinum 38.  
 Aether aceticus 174.  
 „ phosphoratus 198.  
 „ sulfuricus 115. 193. 200.  
 Agaricinum (смола изъ Agaricus albus) 48.  
 Aloë 82. 83. 84.  
 Alumen 49.  
 Aluminium aceticum 59.  
 Ammonium aceticum solutum cfr. Liq. Ammon. acetic.  
 Ammonium bromatum 42. 180.  
 Ammonium causticum solutum cfr. Liq. Ammon. caust.  
 Ammonium muriaticum 24.  
 Amylum tritic. 55. 224. 229.  
 Amylnitrit 70.  
 Antifebrinum 8.  
 Antipyrinum 7.  
 Antithyreoidin 201 a.  
 Apomorphinum muriaticum 23. 276.  
 Aqua amygdalarum amararum 16.

- Aqua Calcis 114.  
 „ Laurocerasi 27. 152.  
 „ Plumbi 220.  
 Argentum colloïdale 253 a. 288.  
 Argentum nitricum 55. 58. 105. 182. 259. 262.  
 Arsenicum album v. Acid. arsenicos.  
 Asa foetida 192. 193.  
 Aspirin 6.  
 Atophan 147.  
 Atropinum sulfuricum 184. 275.

### B.

- Balsamum Copaivae 150.  
 Balsamum peruvianum 49. 249.  
 Belladonnae folia cfr. Extract. Bellad.  
 Benzoë cfr. Tinct. Benzoës.  
 Benzonaphthol. 103.  
 Bismuthum salicylicum 102. 103.  
 Bismuthum subnitricum v. Magister. Bismuth.  
 Borax 49.  
 Bromoformium 43.  
 Bromural 156.  
 Butyrum Cacao 204.

### C.

- Calcium chloratum 39.  
 Calomel v. Hydrarg. chlorat. mite.  
 Camphora trita 32. 149. 172. 277.  
 Cantharides cfr. Empl. Cantharid.  
 Cascara sagrada cfr. Extr. fluid. Casc. sagr.  
 Chamomillae flores 139.  
 Charta sinapisata 215.  
 Chinae cortex cfr. Tinct. chinae comp.  
 Chininum sulfuricum 1. 2. 171.  
 Chloralum hydratum crystallisatum 155.  
 Chloroformium 12. 160. 208.  
 Cholelysin 116.



ПЕРБЕЛЪ ФРИДРИХОВИЧЪ  
НОРМАЛЪ.



- Chrysarobinum 237.  
 Cinae flores 130.  
 Clysma nutriens 119.  
 Cocainum muriaticum 50. 282.  
 Codeinum 154.  
 Coffeinum natrobenzoicum 64.  
     "    natrosalicylicum 64.  
     "    purum 181. 286.  
 Colae nux cfr. Extr. fluid. nucis Colae.  
 Collargol 253 a. 288.  
 Colombo radix 109.  
 Condurango cortex 125.  
 Convallariae majalis flores cfr. tinct. Convall. maj.  
 Cornutinum citricum 280.  
 Cortex radices Granati pulveratus 134.  
 Cremor tartari v. Kali bitartaricum depuratum.  
 Creolinum 251.  
 Cuprum sulfuricum 72.

## D.

- Dermatol 257.  
 Digalen 63 a. 287.  
 Digitalis folia 60. 61. 62. 137. v. тоже tinct. Digit.  
 Diuretinum v. Theobromin. natrio-salicylic.  
 Duotal 47.

## E.

- Electuarium lenitivum 90.  
 Elixir pectorale 18.  
 Emplastrum adhaesivum 234.  
     "    cantharidarum 216.  
     "    diachylon 233. 236.  
     "    hydrargyri 267.  
     "    lithargyri simplex 233.  
     "    mercuriale 267.  
 Emulsio olei ricini 81.  
     "    oleosa 94.  
 Enesol 270.


- Ergotinum Bonjeani 183. 279.  
 Eucaïn 282 a.  
 Euchininum 3.  
 Extractum Aconiti tuborum 41.  
 „ Belladonnae 40. 85. 204.  
 „ Chinae 163.  
 „ Filicis maris aethereum (Wolmarensis) 131.  
 132.  
 „ fluidum Cascarae sagradae изъ Rhamnus  
 purshiana 92.  
 „ fluidum Condurango 125.  
 „ fluidum Hydrastis Canadensis 37.  
 „ fluidum nucis Colae 187.  
 „ Hyoscyami 185. 205.  
 „ Liquiritiae 24.  
 „ Rheï compositum 84.  
 „ Secalis cornuti 183. 279.  
 „ Strychni spirituos. 162. 186.  
 „ Valerianae 193.

### F.

- Ferrum carbonicum 165.  
 „ hydrogenio reductum 84. 168. 171. cfr. тоже:  
 Liq. ferri dialysati, Liq. ferri sesquichlorati,  
 syrupus ferri iodati, Tinct. ferri chlorat.  
 aether. и Tinct. ferri pomata.  
 Ferrum lacticum 162. 167.  
 „ sulfuricum 165.  
 Filix mas (rhizoma filicis maris) 131. v. тоже: Extr.  
 filic. mar. aether.

### G.

- Gallae turcicae cfr. tinct. Gallar.  
 Gelatina 38 a.  
 Gentianae radix cfr. tinct. Gentianae.  
 Glycerin 119 a.  
 Glycyrrhizae radix cf. Liquiritiae radix.  
 Guajacolum carbonicum 47.





**H.**

- Haematogenum siccum 166.  
 Hetol 285.  
 Hydrargyrum bichloratum corrosivum 58. 258. 268.  
     273.  
     " chloratum mite: 74. 111. 112. 137.  
     272.  
     " bijodatum 271.  
     " praecipitatum album 230.  
 Hydrargyrum salicylicum 269.  
 Hydrastis Canadensis cfr. Extr. fluid. Hydr. Canad.  
 Hyoscyami herba cfr. Extr. Hyoscyami.

**J.**

- Jaborandi folia cfr. Pilocarpin. muriat.  
 Jalapae resina и Jalapae tubera cfr. Sapo jalapin.  
 Ichthyol. 248.  
 Infusum Sennae salinum 89.  
 Jodoformium 54.  
 Jodolum 197.  
 Jodum purum 58. 195 217. cfr. тоже Tinct. Jodi.  
 Ipecacuanhae radix 20. 71. cfr. тоже vinum  
     Ipecac.  
 Juniperi baccae 135.

**K.**

- Kali aceticum cfr. liquor Kali acetic.  
     " arsenicosum 283. cfr. и liquor Kali arsenicosi.  
     " bitartaricum (depuratum) 95. 96.  
 Kalium bromatum 159. 178. 179.  
     " carbonicum 165.  
 Kali chloricum 59.  
     " hypermanganicum 59. 258.  
 Kalium jodatum 58. 194. 195. 218.  
     " sulfuratum 260.  
 Kreosotum 44. 45.  
     " carbonicum 46.  
 Kusso flores 133.

## L.

- Lanolinum 232.  
 Linimentum calcareum 255.  
 „ saponato-camphoratum 214.  
 „ volatile 213.  
 Liquiritiae radix cfr. pulv. Liquirit. comp.  
 Liquor Aluminium acetici 59.  
 „ Ammonii acetici 142.  
 „ Ammonii anisatus 16. 17. 19.  
 „ Ammonii caustici 53.  
 „ anodynus Hoffmanni cfr. spirit. aether. Hoffm.  
 „ ferri oxychlorati 161.  
 „ Kali acetici 135.  
 „ Kali arsenicosi 188.  
 Lithion carbonicum 146.  
 Lupulinum 149.

## M.

- Magisterium Bismuthi 101. 193.  
 Magnesia carbonica 103. 128.  
 „ sulfurica 76.  
 „ usta 78. 127.  
 Menthol 254.  
 Migränin 13.  
 Morphinum muriaticum 25. 152. 153. 274.  
 Mucilago Salep, cfr. Salep tubera.

## N.

- Naphthol ( $\beta$ -Naphthol) 243.  
 Natrium biboricum 58. 97.  
 „ bicarbonicum 27. 28. 29. 49.  
 „ bromatum 180.  
 „ cacodylicum 284.  
 „ chloratum 29. 49. 57. 289.  
 „ jodatum 197 a.  
 „ nitrosum 68. 197 a.  
 Natrium salicylicum 5.  
 „ sozodolicum 56.





- Natrium sulfuricum 75.  
 Neosalvarsan 273 a.  
 Nitroglycerinum 69.  
 Novozon 117 a.  
 Nux vomica cfr. Semen Strychni, tinct. nuc. vomic.  
 u. Extr. Strychni spirituos.

### O.

- Oleum cadinum = Ol. empyrheumatic. Juniperi =  
 можжевельная смола 240. 241.  
 Oleum carbolicum 221.  
 Oleum jecoris aselli 198. 199. 200.  
 Oleum ligni Santali 151.  
 Oleum Ricini 80. 81.  
 Oleum rusci = Ol. empyrheumatic betulae. = Pix  
 liquida betulae = березовая смола 239.  
 Oleum terebinthinae 30. 52. 115. 206. 49.  
 Opium 33. 48. 99. 205. cfr. тоже tinct. opii simplex.  
 Opodeldoc cfr. Liniment. saponato-camphorat.  
 Orthoformium 51.  
 Ovariinum 202.

### P.

- Pankreatin 118.  
 Pantopon 106.  
 Pasta Lassari 229.  
 Pepsinum germanicum 124.  
 Perhydrol 59.  
 Petroleum 250.  
 Petroselini aqua 136.  
 Phenacetin 11.  
 Phosphorus cfr. Aether phosphorat 198.  
 Piperazin 148.  
 Pix liquida pini = сосновая смола 239. 242.  
 Pilocarpinum muriaticum 281.  
 Plumbi aqua 220.  
 Plumbum aceticum 31. 33. 104.  
 Podophyllum = Resina podophyllii. 86.  
 Protargol 258.

- Pulvis aërophorus s. effervescens 97.  
 „ dentifricius 261.  
 „ Doveri 21.  
 „ Liquiritiae compositus 88.  
 „ magnesia cum Rheo 128.  
 Punica Granatum cfr. cort. rad. Granati.  
 Pyramidon 11 a.

### R.

- Resorcinum purum crystallisatum 103. 259.  
 Rhamni frangulae cortex 91.  
 Rhei radix 79. 83. 128. cfr. тoже tinct. Rheï aquos.  
 Ricini oleum 80. 81.

### S.

- Sal Carlsbadense factitium 77.  
 Sacharinum 117.  
 Salep tubera 110.  
 Salicylsapen 253 b.  
 Salipyrin 10.  
 Salolum 9.  
 Salvarsan 273 a.  
 Sambuci flores 141.  
 Santoninum 129.  
 Sapo jalapinus 83.  
 „ kalinus niger 242. 243. 244.  
 „ medicatus 82,  
 „ viridis = sap. kalin. nigr. 242. 243. 244.  
 Secale cornutum 34. 35. cfr. Ergotinum.  
 Semen Foeniculi 88. 113.  
 Senegae radix 17.  
 Sennae folia 87. 88. 89. 90.  
 Sinapis nigra 215. cfr. Chartae sinapisatae.  
 Solutio arsenicalis Fowleri cfr. Liq. Kali arsenicosi.  
 Solutio Vleminckx 247.  
 Sperminum 203.  
 Spiritus aethereus Hoffmanni 100. 175.  
 „ camphoratus 210.  
 „ Mindereri cfr. Liquor Ammonii acetici.





- Spiritus saponatus 209. 212.  
 „ sinapis 211. 212.  
 Stovain 282 b.  
 Stramonii folia cfr. tinct. Stramon.  
 Stibium sulfuratum aurantiacum cfr. Sulf. aurat.  
 antimon.  
 Stibio-Kali tartaricum = рвотный камень cfr. Tartarus stibiat. u Vinum stibiatum.  
 Strophanti semina cfr. Tinct. Strophanti.  
 Strophantin 287 a.  
 Strychninum nitricum 278.  
 Strychni semen = Nux vomica cfr. Tinct. nuc. vomic.  
 Stypticin 36.  
 Sublimat cfr. Hydrarg. bichlorat corrosiv.  
 Sulfur auratum Antimonii 25.  
 „ depuratum = Sulf. sublimatum elotum 95.  
 „ praecipitatum = Lac sulfuris 245. 246.  
 „ sublimatum = Flores sulfuris 242.  
 Suppositoria 204. 205.  
 Syrupus ferri jodati 196.

## T.

- Talcum venetum 56. 223.  
 Tamarindorum pulpa 90.  
 Tannalbin 108.  
 Tanninum cfr. acid. tannic.  
 Tannoformium 225.  
 Tartarus stibiatus = Stibio-Kali tart. 26. 71. 73.  
 Terebinthinae oleum 30. 49. 52. 115. 206.  
 Theobrominum natrio-salicylicum 61. 138.  
 Theophyllum (Theocinum) natrio-aceticum 136.  
 Thyreoïdinum 201.  
 Tiliae flores 140.  
 Tinctura amara 121.  
 „ Asae foetidae 192.  
 „ Benzoës 252.  
 „ Chinae composita 120. 169.  
 „ Convallariae majalis 66.

- Tinctura Digitalis 63.  
 „ Ferri chlorata aetherea Bestusheffi 164.  
 „ Ferri pomata 163. 169. 170.  
 „ Gallarum 219.  
 „ Gentianae 122.  
 „ Jodi 218. 219.  
 „ Nucis vomicae 100. 126.  
 „ Opii simplex 19. 94. 98. 100.  
 „ Ratanhae 59.  
 „ Rheï aquosa 93.  
 „ Stramonii 19.  
 „ seminum Strophanti 67.  
 „ Valerianae 170. 176. 191. 192.  
 „ Valerianae aetherea 100.  
 Trional 157.

## U.

- Unguentum Credé 253 a.  
 „ diachylon Hebrae 226.  
 „ Hydrargyri cinereum 253. 265. 266.  
 „ plumbi tannici 235.  
 „ simplex 227 = ungt. cereum.  
 „ Veratrini 207.  
 „ Wilkinsonii 242.  
 „ Zinci 228.  
 Uricedinum 145.  
 Urotropinum 144.  
 Uvae ursi folia 143.

## V.

- Valerianae radix 179. cfr. tinct. Valerian.  
 Vaselineum 226.  
 Vasogenum liquidum 217.  
 Veratrinum. Alkaloïd изъ rhizoma veratri cfr. ungt.  
 Veratrini.  
 Veronal 158.  
 Vinum Ipecacuanhae 22.  
 „ Lusitanicum factitium 177.  
 „ stibiatum 26. 73.





## X. Y. Z.

Xeroform 256.

Yohimbin hydrochloric. 181 a.

Zincum oxydatum = Flores Zinci 222. 229.

„ sulfuricum 49. 258. 264.

„ valerianicum 190.

---

Считаютъ :

1 grm. = 16 капель Aq. dest.

1 grm. = 25 капель Tinctur.

1 чайная ложка = 5 grm. Aq. dest.

1 десертная ложка = 10 grm. Aq. dest.

1 столовая ложка = 15 grm. Aq. dest.







Est  
A-10756  
i29511653

TÜ RAAMATUKOGU



1 0300 01064773 5

Переп. К. Унгеръ, Юрьевъ.