



*Ley. 42238.*

IN DER  
**DORPATER POLIKLINIK**  
GEBRÄUCHLICHE  
**RECEPTE UND VERORDNUNGEN**


ZUSAMMENGESTELLT

von

**DR. KARL DEHIO**  
PROF. EXT.  
DIRECTOR DER POLIKLINIK,

**DORPAT.**

DRUCK VON C. MATTIESEN.



1888.



3923

Gedruckt mit Genehmigung der medicinischen Facultät.  
Dorpat, den 16. August 1888.

Nr. 353.

Decan: Raehlmann.

Die vorliegende Sammlung von Recepten und Verordnungen beabsichtigt keineswegs die ausführlicheren Compendien der Arzneiverordnungslehre, unter denen das treffliche Werkchen von O. Roth: Die Arzneimittel der heutigen Medicin, (neubearbeitet von G. Schmitt. Würzburg) als bequemes Nachschlagebuch bestens empfohlen werden kann, überflüssig zu machen. Sie verdankt ihre Entstehung lediglich der von mir bei der Leitung des poliklinischen Unterrichtes vielfach gemachten Erfahrung, dass die poliklinischen Practicanten bei den ersten selbstständigen Schritten, die sie in's Gebiet der practischen Medicin unternehmen, eines kleinen Vorrathes von erprobten Receptformeln und arzneilichen Verordnungen bedürfen, bei dessen Anwendung sie die Dosirung der gebräuchlichen Mittel und eine möglichst einfache Form der Verordnung derselben kennen lernen.

Die gebräuchlichen Recepttaschenbücher leiden vielfach an dem Fehler eine so grosse Menge von Receptformularen zu enthalten, dass dem noch unerfahrenen Studenten die Wahl schwer wird und er nicht dazu gelangt seinem Gedächtniss einen festen Grundstock von Verordnungen einzuprägen, welcher in der Praxis unentbehrlich ist. Der Wunsch, meinen Schülern einen solchen Grundstock medicamentöser Verordnungen zu bieten, hat mich veranlasst, die in der hiesigen Poliklinik üblichen Recepte und Verordnungen zusammenzustellen. Ich fürchte nicht, dadurch einem unfruchtbaren therapeutischen Schematismus Vorschub zu leisten, denn ich weiss, dass bei fortschreitender practischer Erfahrung jeder denkende Arzt von selbst auf die dem einzelnen Krankheitsfall

angemessenen Variationen seiner Verordnungen verfällt. Auch bieten die leeren Blätter, mit denen dieses Büchlein durchschossen ist, jedem Einzelnen die Möglichkeit, seine Sammlung von Recepten gemäss den Rathschlägen seiner Lehrer und dem Gange seiner Studien nach Gefallen zu vervollständigen.

Ich habe mich bemüht von den einzelnen gebräuchlichen Medicamenten, wo es aing, nur je eine Form der Verordnung, und zwar eine möglichst einfache und billige anzugeben. Hierbei ist mir der Herr Magister pharm. C. Böning, Provisor der klinischen Apotheke, vielfach behülflich gewesen, wofür ich ihm zu bestem Dank verpflichtet bin. Complicirtere Recepte, und namentlich solche, die mehr als einen wirksamen Arzneistoff enthalten, habe ich nach Möglichkeit vermieden, weil dieselben ein klares Urtheil über die Wirkung der einzelnen Ingredientien nicht gestatteten. Eine durch alte medicinische Erfahrung gerechtfertigte Ausnahme habe ich allerdings bei den Laxantien eintreten lassen.

Was die Anordnung der Receptformeln betrifft, so habe ich sie im Allgemeinen nach ihrer Wirkung und Anwendungsweise zusammengestellt, ähnlich wie das Strümpell in seinem bekannten Lehrbuch gethan hat. Dass ich nicht prätendire, lauter originale Verordnungen zu liefern, brauche ich wohl nicht zu betonen.

Im Index habe ich ausser den Medicamenten, welche sich in der Sammlung verzeichnet finden, auch die zugehörigen Stammdroguen oder Mutterpflanzen angegeben, um dadurch an die Herkunft der verschriebenen Mittel zu erinnern.

Möge das Büchlein meinen Schülern ein nützliches Andenken an die erste Zeit ihrer practischen ärztlichen Thätigkeit sein.

Dorpat, im August 1888.

Dr. Karl Dehio, prof. ext.





## I. Antipyretica.

1.

Chininí sulf. 1,0.  
D. tal. dos. Nr. 3.  
S. Abends ein Pulver in einer  
Oblate zu nehmen.

2.

Chininí sulf. 0,3.  
D. tal. dos. Nr. 6.  
S. 2 bis 3 Mal tägl. ein Pulver  
in Oblaten z. n.

3.

Chininí sulf. 0,3—0,6.  
Syrup. oxyeocci 30,0.  
Acid. muriat. dil. gutt. X.  
MDS. theelöffelw. (bei Kindern).

4.

Acid. salicylic. cryst. pulv. 1,0.  
D. tal. dos. Nr. 6.  
S. 2stündl. ein Pulver in Obl.  
z. n. (bei Blasenkatarrh 4 Mal  
täglich).

5.

Natr. salicylic. 6,0—8,0.  
Aq. dest. 100,0.  
Aq. Menthae piperit. 50,0.  
MDS. stündlich ein Esslöffel  
od.: Morgens, Mittags, Abds,  
je 3 Esslöffel auf ein Mal z. n.

6.

Natr. salicylic. 2,0—4,0.  
Aq. Menthae 25,0.  
MDS. auf ein Mal z. n. (behufs  
antipyretischer Wirkung).

7.

Antipyrini 1,0—2,0.  
D. tal. dos. Nr. 6.  
S. 3 Pulver täglich z. n. (auch  
als Antineuralgicum benutzt).

8.

Antifebrini 0,3—0,5.  
D. tal. dos. Nr. 6.  
S. 3 Pulver täglich.

9.

Saloli 0,5 - 1,0.  
D. tal. dos. Nr. 6.  
S. 3—4 Pulver täglich.

10.

Phenacetin 1,0.  
D. tal. dos. Nr. 3.  
S. täglich ein (höchstens 2) Pul-  
ver (auch als Antineuralgicum  
benutzt).

## II. Säuren.

11.

Acid. muriat. dil. 3,0.  
Aq. dest. 130,0  
Syrup. spl. 20,0.  
MDS. 2stündl. ein Esslöffel.

12.

Acid. phosphoric. dil. 3,0.  
Aq. dest. 130,0.  
Syrup. rub. idaei 20,0.  
MDS. 2stündl. ein Essl.

### III. Expectorantia.

13.

Liq. Ammon. anisat 10,0.  
 Aq. amygdalar. amar. 20,0.  
 MDS. 3 Mal täglich 30 Tropfen  
 in Wasser z. n.

14.

Infus. rad Senegae 10,0:130,0.  
 Liq. Ammon. anisat. 4,0.  
 Syrup. spl 20,0.  
 MDS. 2stündl. ein Essl.

15.

Elixir pectoral. 20,0.  
 DS. 3 Mal täglich 30 Tropfen.  
 (NB. Elixir pectorale besteht  
 aus: 1 Th. Extr. liquiritiae,  
 1 Th. Liq. Ammon. anisat. u  
 3 Th. Aq. foeniculi. Auch  
 Elixir pectorale regis Daniae  
 genannt.)

16.

Liq. Ammon. anisat 5,0.  
 Tinct. Stramon. 5,0.  
 Tinct. opii spl. 5,0.  
 MDS. 3 Mal tägl. 20 Tropfen.

17.

Infus. rad. Ipecacuanh. 0,5:150,0.  
 Aq. laurocerasi 3,0.  
 (eventuell Morph. muriat. 0,05.)  
 MDS. 2stdl. ein Essl.

18.

Pulv. Doveri 0,3—0,5.  
 D. tal. dos. Nr. 6.  
 S. 3 Mal tägl. ein Pulver oder  
 Abends ein Pulver (Hypnoti-  
 cum). (NB. Pulv. Doveri be-  
 steht aus: 8 Th. Kali sulf.,  
 1 Th. pulv. rad. Ipecacuanh.,  
 1 Th. Opium purum.)

19.

Vini Ipecacuanh. 20,0.  
 DS. 3 Mal täglich 10 (Kindern)  
 bis 20 Tropfen. (NB. Mace-

ration von 1 Th. pulv. Ipec.  
 in 10 Th. Xeres.)

20.

Decoct. cort. Quillajae 3,0:150,0.  
 (eventuell Tinct. opii spl. 1,0.)  
 MDS. 2stündl. ein Esslöffel.

21.

Apomorphini mur. 0,05.  
 Acid. muriat. dil. 0,5.  
 Aq. dest. 130,0.  
 Syrup. spl. 20,0.  
 MDS. 2—3stündl. ein Esslöffel.

22.

Ammon. muriat. 3,0  
 Extract. liquirit. 3,0.  
 Aq. dest. 150,0.  
 MDS. 2stdl. ein Essl. (Mixtura  
 solvens.)

23.

Stib. sulfurat. aurant. 0,05.  
 (s. Sulfur. aurat. Antimonii)  
 Morph. muriat. 0,01.  
 Sachar. alb. 0,5.  
 M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 6.  
 S. 3 Pulver täglich.

24.

Vini stibiat. 20,0.  
 DS. 3 Mal tägl. 10 (Kindern)  
 bis 20 Tropfen. (NB. 1 Th.  
 Brechweinstein: 240 Th. Ma-  
 laga.)

25

Natr. bicarbon. 3,0.  
 Aq. laurocer. 3,0.  
 Aq. dest. 150,0.  
 (eventuell Morph. mur. 0,05.)  
 MDS. 2ständlich ein Esslöffel.  
 NB. statt aqua laurocerasi kann  
 auch aqua amygdalarum ama-  
 rarum verschrieben werden.

26.

Natr. bicarb. pulverat. 30,0.  
 DS. Messerspitzen- bis theelöffel-  
 weise in warmer Müh z. n.





27.

Natr. bicarbon. pulv. 30,0.  
 Natr. chlorat cryst. pulv. 2,0.  
 M. f. pulv.  
 DS. ebenso.

28.

Ol. terebinthinae gallic. 20,0.  
 DS. 3 Mal täglich 15 Tropfen  
 in heißer Milch z. n.  
 (Bronchitis putrida)

29.

Plumb. acetic 0,03—0,05.  
 Sachar. alb. 0,5.  
 M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 6.  
 S. 3 Pulver täglich (Bronchitis  
 putrida, bei Lungenoedem  
 $\frac{1}{2}$ stündl. bis 0,5 p. die).

30.

Terpin. hydrat. 2,0.  
 Spirit. vini (70%) 50,0.  
 Aq. dest. 100,0.  
 MDS. 3 Esslöffel täglich.

31.

Acid. benzoic. 0,1.  
 Camphorae trit. 0,1.  
 Sachar. lact. 0,3.  
 M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 6.  
 S. 2ständl. ein Pulver (Capilläre  
 Bronchitis; bei Kindern die  
 halbe Dosis).

#### IV. Sonstige bei Erkrankungen der Respirationsorgane und des Rachens benutzte Verordnungen.

32.

Plumb. acetic 0,05.  
 Opii puri 0,03.  
 Sachar. alb. 0,5.  
 M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 6.  
 S. 2sttl. ein Pulver (Haemop-

tysis).

33.

Infus. Secal. cornut. 5,0:150,0.  
 (eventuell Morph. muriat. 0,1.)  
 MDS. 2ständl. ein Essl. (Bluthusten). —

34.

Secal. cornut. 0,3—0,6.  
 D. tal. dos. Nr. 6.  
 S. stündlich ein Pulver.

Atropin subcutan (b. Bluthusten)  
 cfr. Nr. 243.

Digitalis (bei Bluthusten) cfr.  
 Nr. 53.

Morphium subcutan (bei Blut-  
 husten) cfr. Nr. 242.

Ergotin subcutan (bei Bluthusten)  
 cfr. Nr. 247.

35.

Extract Belladonae 0,1.  
 Aq. laurocer. 3,0.  
 Aq. dest. 150,0.  
 MDS. 2ständl. ein Essl. (bei  
 Kindern die Hälfte zu ver-  
 schreiben 2sttl. ein Theelöffel.  
 Keuchhusten).

36.

Extr. tuberum Aconiti 0,05.  
 Aq. laurocer. 3,0.  
 Aq. dest. 150,0.  
 MDS. ebenso (Keuchhusten)

37.

Ammon. bromat. 3,0—5,0.  
 Aq. laurocerasi 3,0.  
 Aq. dest. 130,0.  
 Syrup. spl. 20,0.  
 MDS. ein Theelöffel bis zu ei-  
 nem Essl. 4 Mal tägl.

38.

Tinct. Quebracho 30,0.  
 DS. 3 Mal tägl. ein Theelöffel.

39.

Kreosoti 1,5.  
 Ol. jecor. aselli 150,0.  
 MDS. 2—3 Essl. tägl.

- 40.
- Kreosoti 1,5.  
Spirit. vini (70%) 75,0.  
Aq. Menthae 75,0.  
MDS. 2—3 Essl. tägl.
- 
- 41.
- Guajacol. 1,0.  
Spirit. vini (70%) 75,0.  
Aq. Menthae 75,0.  
MDS. 2 Essl. tägl.
- 
- 42.
- Agaricini 0,005—0,01.  
Opii puri 0,03.  
Sachar. alb. 0,5.  
M. f. pulv. d. tal. dos Nr. 6.  
S. Abends ein Pulver (Nachtschweiß).
- 
- 43.
- Inhalationen:
- a. Ol. terebinth. gallic. 30,0.  
DS. mit Warmwasserdämpfen zu inhaliren.
  - b. Balsam. peruvian. 5,0.  
Spirit. vintalcoholisat. (95%) 10,0.  
MDS. ebenso.
  - c. Natr. bicarb. 3,0.  
Aq. laurocer. 3,0.  
Aq. dest. 150,0.  
M.
  - d. Natr. chlorat. (2% in wässr. Lösung)
  - e. Alumen pulverat (1% in wässr. Lösung).
  - f. Acid. tannic. ( $\frac{1}{2}$ %—1% in wässr. Lösung).
  - g. Zinc. sulfuric. (3% in wässr. Lösung).
  - e—g zum Inhaliren mit dem Spray-Apparat.
  - h. Acid. carbolic. (5% in wässr. Lösung). im Zimmer auszusprengen.
  - i. Ol. terebinth. rossic. 60,0.  
dgl.
- 44.
- Acid. carbolic. crystallisat. 5,0.  
Spirit. vini (70%) 5,0.  
Liq. Ammon. caust. 3,0.  
MDS. zum Riechen (Schnupfen).
- 
- 45.
- Acid. boric. pulverat. 10,0.  
Jodoformii 3,0.  
M. f. pulv. DS. Zum Einblasen in die Nase (chron. Rhinitis, Ozaena.)
- 
- 46.
- Amyli (oder Tale. venet) 20,0.  
Argent. nitric. 0,1—0,4.  
M. f. pulv. DS ebenso.
- 
- 47.
- Natr. bicarbon. pulv. 30,0.  
DS. Eine Messerspitze auf ein Glas Wasser. Zum Einziehen durch die Nase.
- 
- 48.
- Natr. chlorat. pulv. 30,0.  
DS. ebenso.
- 
- 49.
- Zum Pinseln der Nasen- und Rachen-Schleimhaut:
- a. Argent. nitric 1,0—3,0.  
Aq. dest. 30,0.  
M.
  - b. Acid. tannic. 3,0—6,0.  
Glycerini 30,0.  
M.
  - c. Natr. biboric. 3,0.  
Glycerini 15,0.  
Aq. dest. 15,0.  
M.
  - d. Hydrarg. bichlr. corrosiv 0,03.  
Aq. dest. 30,0.  
M.
  - e. Jodi puri 0,5.  
Kali iodati 2,5.  
Glycerini 25,0.  
M.
- 50.
- Mundspül- und Gurgelwässer.
- a. Kali chloric. 30,0.  
DS. Ein Theelöffel auf ein Glas Wasser zum Gurgeln und Mundspülen.





- b. Kali hypermanganic. 2,0.  
Aq. dest. 100,0.  
MDS. Ein Esslöffel auf ein Glas Wasser zum Mundspülen und Gurgeln.
- c. Alumin. acetic. solut. 100,0.  
(pharmacop. rossica )  
DS. chenso.  
(NB. wässerige Lösung von essigsaurer Thonerde.)
- d fol. Salviae 60,0.  
DS. als Thee bereitet zum Mundspülen und Gurgeln.
- e. Cort. Quercus 60,0.  
DS. ebenso.
- 56.
- Infus. herb. Adonis vernal 3,0:150,0.  
DS. 2sttl ein Esslöffel.
- 
- 57.
- Tinct. Convallariae majal. 20,0.  
DS. 3 Mal tägl. 10—30 Tropfen.
- 
- 58.
- Tinct. sem. Strophanti 10,0.  
Aq. laurocer. 20,0.  
MDS. 3—4 Mal tägl. 15—30 Tr.
- 
- 59.
- Nitroglycerini 0,01.  
solve in Spirit. vini rectif. (70%) 5,0.  
adde Aq. dest. 95,0.  
MDS. 3 Mal tägl. ein Theelöffl.  
(NB. allmählich kann die Dosis bis zum Fünf- ja Zehnfachen gesteigert werden.)
- 
- 60.
- Amylii nitrosi 1,0.  
DS. Zu Handen des Arztes.  
(Vorsicht!)

## V. Mittel zur Regulirung der Herzthätigkeit.

51.

Infus. folior. Digitalis 0,6:150,0.  
DS. 2stündl. ein Esslöffel.

52.

Infus. folior. Digitalis 0,6:120,0.  
Liq. Kali acetici 30,0.  
MDS. 2sttl. ein Essl.

53.

Pulv. folior Digitalis 1,0,  
(eventuell Opii puri 0,3 oder Chinini sulf. 2,0 hinzu.)  
Extract. liquirit. q. s. ut f. pilulae Nr. 30. Consp. lycopod.  
DS. 6 Pillen tägl. (2sttl eine P.)

54.

Tinct Digitalis 10,0  
Aq. laurocerasi 20,0.  
MDS. 3 Mal tägl. 20—30 Tropf.

55.

Coffeini natrobenzoic. (oder C. natosalicylic.) 2,0.  
Aq. dest. 150,0.  
MDS. 4 Mal tägl. bis 2sttl. einen Esslöffel z. n.

## VI. Emetica.

61.

Pulv. rad. Ipecacuanhae 1,0.  
Tart. stibiat. 0,05.  
M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 4.  
S. alle Viertelstunden ein Pulver bis zur Wirkung.

62.

Cupr. sulfuric. 1,0.  
Aq. dest. 30,0.  
Snrup. spl. 20,0.  
MDS. alle Viertelstunden ein Theelöffel bis zur Wirkung (bei Kindern).

63.		70.
Vini stibati 30,0. DS. alle Viertelstunden ein Theelöffel bis zur Wirkung (bei Kindern). —		Pulv. rad. rhei 5,0. Natr. bicarbon. 3,0. Natr. sulfuric. 2,0. M. f. pulv. DS. 3 Mal täglich eine Messerspitze bis zu einem Theelöffel voll zu nehmen.
Apomorphin cfr. Rec Nr. 244.		—
VII. Laxantia.		71.
64.		Ol. ricini 30,0. DS. nach Verordnung.
Calomel. 0,3. Sachar. alb. 0,3. M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 3. S. nach je 3 Stunden ein Pulver z. n. (cave: Acid. muriat., Kali chloric., Aq. chloril!) —		—
65.		72. Emuls. ol. ricini 130,0. Syrup. spl. 20,0. Ol. Menthae piperit. gutt. 2. MDS. 2stdl. ein Esslöffel. (NB. Emuls. ol. ric. besteht aus: 2 Th. Ol. ricini, 1 Th. Gummi arabic. und 14 Th. Wasser.)
Natr. sulfuric. cryst. 30,0. DS. theelöffelweise in Wasser z. n.		—
66.		73. Aloës pulv. 1,5. Sapon. medicat. 1,5. Extr. liquirit. q. s. ut f. pil. Nr. 30. Consp. Lycopod.
Magnes. sulfuric. 30,0. DS. ebenso. —		DS. Abends 2—3 Stück (gelingt abführend).
67.		—
Sal. Carlsbadens. factie. 30,0. DS. theelöffelweise in warmem Wasser z. n. (NB. Künstliches Karlsbader Salz besteht aus 23 Theilen Natr. sulfuric., 3 Th. Natr. bicarb., 1 Th. Natr. chlorat.) —		74. Aloës pulv. 1,0. Pulv. rad. rheif 1,0. Sapon. jalapin. 1,0 Extr. liquirit. q. s. ut f. pil. Nr. 30. Consp. Lycopod.
68.		DS. 3 Mal tägl. 2 Pillen. (NB. Sapo jalapin. ist ein Gemisch von gleichen Theilen Jalapenharz u. Sapo medicat.)
Magnes. ust. 25,0. Aq. dest. 150,0. MDS. Schüttelmixtur. als Antidot bei Vergiftungen: alle Viertelstunden 4—6 Essl.		—
69.		75. Aloës pulv. 1,0. Sapon. jalapin. 1,0. Ferri hydrogen. reduct. 1,0. Extr. liquirit. q. s. ut f. pil. Nr. 30. Consp. lycopod. DS. 3 Mal tägl. 1—2 Pillen.
Magnes. ust. 10,0. Aq. dest. 130,0, cognac per $\frac{1}{4}$ horae adde Syrup. spl. 20,0. MDS. 2ständl. ein Eselöffel, vor dem Gebrauch umzuschütteln.		—

76.

Extract. Belladonnae 0,5.  
(eventuell mit Aloë pulv. 1,5.)  
Extr. liquirit. q. s. ut f. pil. Nr. 30.  
Consip. lycopod.  
DS. 3 Pillen tägl.

77.

Podophyllini 0,5.  
Extr. liquirit. q. s. ut f. pil. Nr. 30.  
Consip. lycopod.  
DS. Abends 2—3 Pillen.  
(Mildes Laxans.)

78.

Podophyllotoxin. 0,05.  
Spirit. vini (70%) 5,0.  
MDS. Abends 10—30 Tropfen  
in Zuckerwasser z. n. Kindern  
5—10 Tropfen.

79.

Pulv. Liquirit. composit. 30,0.  
DS. 3 Mal tägl. ein Theelöffel  
z. n. Kindern 3 Mal tägl  
eine Messerspitze.  
(NB. Pulv. liquirit. comp. ent-  
hält: 2 Th. fol. Sennae pulv.,  
2 Th. rad. liquirit. pulv., 1 Th.  
sem. foeniculi pulv., 1 Th.  
sulfur depurat., 6 Th. sachar.  
alb.)

80.

Infus. Sennae salin. 150,0.  
DS. 3—4 Mal tägl. ein Essl.  
(NB. Inf. Sennae salin. enthält:  
11 Th. Aufguss von Sennes-  
blättern (1:10), 1 Th. Natr.  
sulf., 1 Th. Mel. depurat.)

81.

Cort. Rhamni frangul. 60,0.  
DS. Ein Theelöffel auf ein Glas  
Wasser zur Hälfte eingekocht.  
Auf ein Mal zu trinken.

82.

Tinct. Rhei aquos. 20,0—60,0.  
DS. 3 Mal täglich 30 Tropfen.  
(Kindern als Tonicum u. Di-

gestivum).—3stündl. ein Thee-  
löffel bis zur Wirkung. (Kin-  
dern als Purgans.)

(NB. Tinct. Rhei aquos. ist  
eine Maceration aus 10 Th.  
rad. rhei, 1 Th. Kali carbon.,  
1 Th. Borax, 85 Th. Aq. dest.,  
10 Th. Spiritus, 15 Th. Aq.  
Cinnamom.)

83.

Emuls. oleos 150,0.  
Acid. salicylic. 0,5.  
(event Tr. opii spl. gutt. 10—20.)  
MDS. 2stündl. ein Essl., Kin-  
dern theelöffelweise.  
(NB. Emuls. oleos besteht aus:  
2 Th. Mandelöl, 1 Th. Gummi  
arabic. u. 14 Th. Wasser.)

84.

Sulfur. depurat. 10,0.  
Kali bitartaric. 10,0.  
Sachar. alb. 10,0.  
Ol. foeniculi gatt. 10.  
M. f. pulv.  
DS. Morgens u. Abends ein  
Theelöffel. (Hämorrhoidalbe-  
schwerden.)

85.

Kalii bitartaric. s. Cremor tar-  
tari 30,0.  
DS. Theelöffelweise in Wasser  
z. n. (Temperans).

86.

Pulv. aerophorus s. effervesrens:  
Natr. bicarb. pulv. 2,5.  
Da in capsula coerulea.  
Acid. tartaric. pulv. 2,2.  
Da in capsula alba.  
S. Nach Verordnung zu nehmen  
als Brausepulver.

**VIII. Adstringentia und  
Antidiarrhoica.**

87.  
Tinct. opii spl. 5,0.  
DS. 2—4stdl. 5—10 Tropfen.

88.  
Opii puri 0,03—0,1.  
Sachar. alb. 0,5.  
M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 6.  
S. 2—4stdl. ein Pulver.

89.  
Tinct. opii spl. 5,0.  
Tinct. nuc. vomic. 3,0.  
Liq. anodyn. Hoffmanni 12,0.  
(oder auch Tinct. Valerian.  
aether. 12,0.)  
MDS. 3 Mal tägl. 10—20 Tr.

90.  
Magister. Bismuth. 0,3.  
Sachar. alb. 0,2.  
(eventuell Opium puri 0,03.)  
M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 6.  
S. 3 Pulver tägl.

91.  
Plumb. acetic. 0,05.  
Opium puri 0,03.  
Sachar. alb. 0,5  
M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 6.  
S. 3 Mal tägl. ein Pulver.

92.  
Argent. nitric. 0,2.  
Aq. dest. 130,0.  
Glycerini 20,0.  
MDS. 3stdl. ein Esslöffel, Kindern theelöffelweise.  
(NB. Im Dunkeln aufzuhbewahren oder in vitro nigro zu verschreiben.)

93.  
Tannini 1,0—1,5.  
Tinct. opii spl. 1,0—1,5.  
Aq. dest. 130,0.  
Syrup. spl. 20,0.  
MDS. 2stdl. ein Essl. Vor dem Gebrauch umschütteln!

94.  
Acid. tannic. 0,1—0,2.  
Sachar. alb. 0,4.  
M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 6.  
S. 3 Pulver täglich.

95.  
Decoct. rad. Ratanhae! 0,0:130,0.  
Syrup. spl. 20,0.  
(event. mit Tinct. opii spl. 1,0.)  
MDS. 2stündl. ein Esslöffel.


96.  
Decoct. rad. Colombo 10,0:130,0.  
Syrup. spl. 20,0.  
(ev. mit Tinct. opii spl. gutt. 15.)  
MDS. 2sthd. ein Essl.

97.  
Naphthalini purissim. 0,3—0,5.  
D. tal. dos. Nr. 10.  
S. 3—5 Pulver tägl. in Obl. z. n.

98.  
Kreosoti gutt. 5.  
Aq. dest. 40,0.  
Syrup. Aurant. 10,0.  
MDS. 2stdl. ein Theelöffel.

99.  
Calomel. 0,006.  
Sachar. alb. 0,3.  
Ol. foeniculi gutt. 1.  
M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 6.  
S. 3 Mal täglich ein Pulver  
(Säuglingen).

100.  
Calomel. 0,01.  
Sachar. alb. 0,5.  
Tinct. opii spl. gutt. 1.  
M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 6.  
S. 3 Pulver tägl. (Kindern im 2. u. 3. Lebensjahr).





**IX. Stomachica u. Amara.**

101.

Tinct. Chinæ comp. 20,0.  
DS. 3 Mal tägl. 20—30 Tropf.  
in Wasser od. Wein z. n.  
(NB. aus Cort. Chinæ fusc.,  
rad. Gentianæ, cort. Aurant.  
bereitet.)

102.

Tinct. amarae 20,0.  
DS. chenso.  
(NB. aus fruct. Aurant., herb.  
Centaur. minor., rad. Gentian.,  
rhizom. Zedoarie bereitet.)

103.

Tinct. Gentianæ 20,0.  
Acid. muriat. dil. 10,0.  
MDS. 3 Mal tägl. 20—30 Tr.  
eine Stunde nach dem Essen  
in einem Spitzglase Wasser z. n.

104.

Acid. muriat. dil. 10,0.  
DS. 5—10 Tropfen eine Stunde  
nach den Mahlzeiten in Was-  
ser z. n.

105.

Pepsin. germanie. 2,0.  
Acid. muriat dil. 1,0.  
Aq. dest. 40,0.  
Syrup. spl. 10,0.  
MDS. Nach den Mahlzeiten ei-  
nen Theelöffel in Wasser z. n.

106.

Cort. Condurango 15,0.  
Infund. aq. frigid. 250,0 macera  
per horas 12, deinde coque  
usque ad remanent 130,0 adde  
Syrup. cort. Aurant. 20,0.  
MDS. 3 Mal tägl. ein Essl.

107.

Tinct. nuc vomic. 5,0.  
Tinct. valerian 15,0  
MDS. 3 Mal tägl. 20 Tropfen.

108.

Magnes. ustae 10,0.  
DS. Messerspitzenweise (saures  
Aufstoßen, Sodbrennen).

109.

Pulv. Magnes c. rheo. 10,0.  
DS. Messerspitzenweise.  
(NB. enthält 4 Th. Magnes.  
carbonic, 1 Th. pulv. rad.  
rhei, 2 Th. Elaeosachar. foen-  
niculi. — Hufelandsches Kin-  
derpulver.)

**X. Anthelmintica.**

110.

Trochisci Santonini (à 0,06) Nr. 6.  
DS. Morgens und Abends ein  
Plätzchen (3 Tage lang zu  
brauchen, hinterher Ol. ricini).

111.

Flor. Cinae pulv. 1,0.  
D. tal. dos. Nr. 6.  
S 3 Mal tägl. ein Pulver (in  
Honig) z. n., hinterher Ol.  
ricini.

112.

Pulv. rhizomat. filic. maris 2,0;  
Extract. filic. mar. aether. 2,0.  
M. f. massa, ex qua formentur  
pil. Nr. 30.  
Consp. lycopod.  
DS. In 2 Parthien zu nehmen:  
4 Std. danach Ol. ricini.  
(vorher Vorbereitungseur!)

113.

Extract. filic. mar. aether. 2,0.  
Mel. despumat. 20,0.  
MDS. In 2 Parthien zu neh-  
men, danach Ol. ricini (Kin-  
dern).

## 114.

Flor. Kusso 25,0.  
Mel. despumat. q.s. ut f. electuar.  
DS. In 2 oder 3 Portionen  
stündlich zu nehmen. 4 Std.  
danach Ol. ricini.

## 115.

Cort. rad. Granati pulv. 30,0.  
Infusde aq. frigid. 200,0 macera  
per 12 horas, tum coque us-  
que ad remanent. colaturae  
130,0 adde Syrup. Zingiberis  
20,0.  
MDS. In 2 Portionen z. n.,  
danach Ol. ricini.

## XI. Diuretica.

## 116.

Decoct. baccar. Junip. 15,0; 120,0.  
Liq. Kali acetic. 30,0.  
MDS. 2stdl. ein Essl.  
(NB. Liq. Kali acetic enthalt  
c. 33% essigsauers Kali in  
wässriger Lösung.)

## 117.

Acet. Scillae 30,0.  
Kali carbonic q. s. ad saturat.  
Aq. petroselini 100,0.  
Syrup. spl. 20,0.  
MDS. 2stdl. ein Essl.

## 118.

Calomel. 0,2.  
Sachar. alb. 0,3.  
M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 3.  
S. 3 Pulver im Laufe eines  
Tages (bei Hydrops durch  
Herz- und Lungenkrankhei-  
ten; nach einigen Tagen kann  
die Verordnung wiederholt  
werden.)

## XII. Diaphoretica.

## 119.

Pilocarpin. muriat. 0,05.  
Acid. muriat. dil. 0,5.  
Aq. dest. 75,0.  
Vini lusitanic. 75,0.  
MDS. 2stdl. ein Essl  
(NB. Wirkung zu controliren,  
bei Herzschwäche zu ver-  
meiden.)

## 120.

Flor. Chamomillae 30,0 oder

## 121.

Flor. Tiliae 30,0 oder

## 122.

Flor. Sambuci 30,0.  
DS. Als Theeaufguss zu be-  
reiten.

## 123.

Liq. Ammon. acetic. 30,0.  
DS. Ein Esslöffel zu einem  
Glase Kamillen- resp. Linden-  
blüthen- resp. Fliederthee zu-  
zusetzen und warm zu trinken.  
(NB. enthält 15% essigsauren  
Ammoniaks in wässr. Lösung.)

Pilocarpin subcutan cfr Nr. 249.

XII. Bei Erkrankung der  
Harnorgane gebräuchliche  
Verordnungen.

## 124.

Fol. uvae ursi 60,0.  
DS. Als Theeaufguss zu be-  
reiten.

## 125.

Kali chloric. 3,0.  
Aq. dest. 150,0.  
MDS. 2stdl. ein Essl.





126.		131.
Lithii carbonic. 0,3.		Chlorali hydrati 4,0.
D. tal. dos. Nr. 12.		Aq dest. 25,0.
S. 3 Mal tägl. ein Pulver in einem Glase Wasser oder Selterswasser z. n.		Syrup. Aurant. 25,0.
—		MDS. In 2 Portionen innerhalb einer halben Std. z. n. (bei Delirium tremens, urämischen Convulsionen in doppelter Dosis). —
127.		132.
Lithii salicylic. 0,3.		Paraldehydi 6,0.
D. tal. dos. Nr. 12.		Aq dest. 25,0.
S ebenso. —		Syrup. Aurant. 25,0.
Salicylsäure efr. Nr. 4.		MDS. Ein Essl. (= 2,0 Paraldehyd.) halbstündl. bis zur Wirkung.
Salol efr. Nr. 9.		—
—		—
128.		133.
Lupulin 0,3.		Sulfonal. 2,0—3,0.
Camphorae trit. 0,1.		D. tal. dos. Nr. 3.
M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 6.		S. Abends ein Pulver in Wasser zu nehmen.
S. Abends ein Pulver (schmerzhafte Erectionen).		—
—		—
129.		134.
Aq. Laurocerasi 20,0.		Amylenhydrat 4,0.
Morph. muriat. 0,1.		Aq. dest. 40,0.
MDS. 3 Mal tägl. bis 2stdl. 20 Tropfen.		Extr. liquirit. 4,0.
(NB. Statt aq. laurocer wird auch aq. amygdalar. amarar. verschrieben.)		MDS. Schüttelmixtur. In 2 Portionen in $\frac{1}{2}$ Std. z. n.
—		—
130.		135.
Morph. muriat. 0,01—0,015.		Kalii bromati 1,0—2,0.
Sachar. alb. 0,5.		D. tal. dos. Nr. 4.
M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 6.		S. Abends ein Pulver in Wasser z. n.
DS. Abends ein Pulver (als Schlafmittel) oder 3 Mal tgl. ein Pulver.		—
—		—
131.		136.
Morphium subcutan efr. Nr. 240.		Chloroformii 30,0.
Pulv. Doveri efr. Nr. 19.		DS. Zu Händen des Arztes.

#### XV. Roborantia.

137.	
Liq. ferri dialysati (Dragendorffii) 30,0.	
DS. 3 Mal tägl. 20—30 Trpf. in Wasser od. Zuckerwasser z. n.	

Ex bibl. univ. Bonn.

138.  
Tinct. ferri pomat. 30,0.  
DS. ebenso.
139.  
Tinct. ferri chlorati aethercae  
Bestusheffii 20,0.  
DS. 3 Mal tägl. 20 Tropfen.
140.  
Ferri sulfuric. 4,0.  
Kalii carbonic. 4,0.  
Extr liquirit. q. s. ut f. boli Nr 30.  
Consp. lycopod.  
DS. 3 Mal tägl. 2 Stück z. n.  
(Blaudsche Pillen)  
(NB setzt sich zu ferrum car-  
bonicum und Kali sulfur. um.)
141.  
Ferri hydrogen. reduct. 0,1.  
Sachar. alb. 0,4.  
M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 12.  
S. 3 Pulver tägl. (Kindern).
142.  
Ferrum lactic. ebenso zu ver-  
schreiben.
143.  
Ferri hydrogen. reduct. 2,0.  
Acid. arsenicos. 0,06.  
Extr. liquirit. q. s. ut f. pil. Nr. 30.  
Consp. lycopod.  
DS. 3 Pillen tägl.
144.  
Tinct. ferri pomat. 15,0.  
Tinct. chinac comp. 15,0.  
MDS. 3 Mal tägl. 30 Tropfen.
145.  
Tinct. ferri pomat. 15,0.  
Tinct. Valerian. 15,0.  
MDS. 3 Mal tägl. 30 Tropfen.

146.  
Ferri hydrogen. reduct. 2,0.  
Chinin sulf. 2,0.  
Extr. liquirit. q. s. ut f. pil. Nr. 30.  
Consp. lycopod.  
DS. 3 Mal tägl. 2 Pillion.

## XVI. Analeptica.

147.  
Camphorae trit. 0,1.  
Gummi arabic. pulverat. 0,4.  
M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 6.  
S. 3—2stdl. ein Pulver.
148.  
Camphorae trit. 1,0.  
Aether sulfuric. 10,0.  
MDS. 3—2stdl 20 Tropfen in  
Wein z. n.
149.  
Aether. sulfuric. 15,0      oder

150.  
Aether. acetic. 15,0.  
DS. 3—6 Mal tägl. 10 Tropf.  
auf Zucker z. n.

151.  
Spirit. aether. Hoffmanni 15,0.  
DS. 3—6 Mal tägl. 10—20 Tr.  
auf Zucker z. n.  
(NB Spirit. aether. s. Liq. ano-  
dynus Hoffmanni enthält:  
1 Th. Aether u. 3 Th. Spi-  
rit. vini alkoholisat. (95%).)

152.  
Tinct. Valerian. aether. 15,0.  
DS. 3—6 Mal tägl. 10—20 Tr.  
(NB. enthält: 4 Th. Spirit. vini  
rectificatiss. (90 %) u. 2 Th.  
Aether auf 1 Tb. radix Va-  
leriana.)





153.

- Tinct. Valerian. aether. 10,0.  
Aq. dest. 130,0.  
Syrup. spl. 20,0.  
MDS. 2stdl. ein Essl.

154.

- Vini lusitanic. facticii 180,0.  
DS. 2stdl. ein Essl.  
(NB. enthält 20% Alkohol, u.  
Syrup. oxycoeci mit essentia  
Ananas parfümiert.)  
Die Bezeichnung Vin. lusitanic.  
factic. ist nicht officinell, son-  
dern nur in der Dorpater  
Klinik gebräuchlich.)

## XVII. Nervina.

155.

- Kalii bromati 4,0 – 10,0.  
Aq. dest. 150,0.  
MDS. 3 Mal tägl. ein Essl.

156.

- Camphor. monobromat. 0,2.  
Sachar. lact. 0,3.  
M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 6.  
S. 3 Pulver tägl.

157.

- Natrii bromati 2,0 – 5,0.  
Ammon. bromat. 2,0 – 5,0.  
Aq. dest. 150,0.  
MDS. 3 Mal tägl. ein Essl.

158.

- Coffeini puri 0,1.  
Sachar. alb. 0,4.  
M. f. pulv. d. tal. dos. Nr. 6.  
S. 3 Pulver täglich.

159.

- Argent nitrie. 0,6.  
Extr. liquirit. q. s. ad pil. Nr. 30.  
Consp. lycopod.  
DS. 3 Mal tägl. eine Pille vor  
dem Essen z. n.

160.

- Extr. secal. cornuti (s. Ergo-  
tinum Bonjeani) 3,0.  
Pulv. rad. liquirit. q. s. ad pil.  
Nr. 30.  
Consp. lycopod.  
DS. 3 – 6 Pillen tägl.

161.

- Atropini sulf. 0,01.  
Extr. liquirit. et pulv. rad. li-  
quirit. q. s. ut f pil. Nr. 20.  
Consp. lycopod.  
DS. 1 – 3 ! Pillen tägl. (Epi-  
lepsie).

162.

- Solut. arsenical. Fowleri 5,0.  
Aq. Menthae 10,0.  
MDS. 3 Mal tägl. 6 – 15 Trpf.  
nach den Mahlzeiten z. n.  
(NB. Solut. arsenical. Fowleri  
s. Liq. Kali arsenicosi ent-  
hält: 1 Th arsenige Säure  
in 100 Th Flüssigkeit. Vor-  
sicht beim Gebrauch! allmäh-  
lich die Dosis steigern.)

163.

- Zinc. oxydat. (s. flor. Zincii) 4,0.  
Sachar. alb. 16,0.  
M. f. pulv.  
DS. 3 Mal tägl. eine Messer-  
spitze (:= 0,1 Zinkoxyd pro  
dosi).  
—

164.

- Zinc. valerianic. 1,5.  
Extr. liquirit. q. s. ad pil. Nr. 30.  
Consp. lycopod.  
DS. 3 Mal tägl. eine Pille.


165.

- Tinet. Valerianae 30,0.  
DS. 3 Mal tägl. 30 Tropfen.

166.

- Tinet. Asae foetid. 15,0  
Tinet. Valerianae 15,0.  
MDS. 3 Mal tägl. 30 Tropfen.


- XVIII. Resorbentia.
167.  
 Magister. Bismuthi 2,0.  
 Asae foetidae 2,0.  
 Extract. Valerianae q. s. ut f.  
 pil. Nr. 30.  
 Consip. lycopod.  
 DS. 3 Mal tägl. 2 Pillen (hysterische Cardialgien).
- 
168.  
 Kalii iodati 3,0.  
 Aq. dest. 150,0.  
 MDS. 3—5 Mal tägl. ein Essl.
- 
169.  
 Syrup. ferri iodati 15,0.  
 DS. 3 Mal tägl. 10—30 Trpf.  
 in Wasser od. Zuckerwasser z. n.
- 
170.  
 Syrup. ferri iodati 10,0.  
 Aq. dest. 130,0.  
 Syrup. spl. 20,0.  
 MDS. 3 Mal tägl. ein Essl
- 
171.  
 Aether. phosphorat 2,0.  
 Ol. jecor. aselli 100,0.  
 MDS. 2 Mal tägl. ein Theelöffel; allmählich die Dosis steigern. Rachitis.  
 (NB. Aether. phosphorat. enthält 1 Th. Phosphor in 200 Th. Aether.)
- 
172.  
 Ol. jecor. aselli 150,0.  
 DS. 1—3 Essl. tägl.
- 
173.  
 Ol. jecor. aselli 150,0.  
 Aether. sulf. 2,0.  
 MDS. 1—3 Essl. tägl.
- XIX. Suppositoria
174.  
 Butyr. Cacao 2,0.  
 Extr. Belladonnae 0,03.  
 M. f. massa ex qua formetur suppositorium.  
 D. tal. suppositor. Nr. 4.  
 S. Nach Verordnung (2 Stück täglich).
- 
175.  
 Wie extr. Belladonna. kann auch Tannin 0,2; Extract. hyoscyami 0,03; Opium purum 0,03 pro suppositorio verschrieben werden.
- 
- XX. Aeusserliche Verordnungen.
176.  
 Ol. terebinth. rossic. 30,0.  
 Ol. olivar. 30,0  
 MDS. Einreibung.
- 
177.  
 Ungt. Veratrini 20,0.  
 DS. Einreibung.  
 (NB. enthält 1 Th. Veratin auf 90 Th. Fett.)
- 
178.  
 Chloroformii 10,0.  
 Ol. olivar. 40,0.  
 MDS. Einreibung.
- 
179.  
 Spirit. saponat. 100,0.  
 DS. Einreibung.  
 (NB. enthält c. 1 Th. Kaliseife in 4 Th. verdünnten Spiritus. ist nicht officinell.)
- 
180.  
 Spirit. camphorat. 60,0.  
 DS. Einreibung.  
 (NB. enthält 1 Th. Kampher in 12 Th. verdünnten Spiritus.)





181.		189.
Spirit. sinapis 60,0. DS. Aeusserlich. (NB. enthält 1 Th. Senföl in 24 Th. Spiritus.)		Kalii iodati 3,0. Axung. porei 30,0. Tinet. jodi gutt. 30. M. f. ungt. DS. Zum Einreiben.
182.		190.
Spirit. sinapis 50,0. Spirit. saponat. 50,0. MDS. Einreibung.		Tinet. jodi 10,0. Tinet. gallar. 10,0. MDS. Zum Aufpinseln.
183.		191.
Liquiment. volatil. 60,0. DS. Einreibung. (NB. Ammoniakseife aus 1 Th. Liq. Ammon caust u 3 Th. Provenceeröl.)		Aq. plumbi 100,0. DS. Aeusserlich (oder zu Um- schlägen). (NB. enthält 1 Th. basisch es- sigsaures Bleioxyd in 49 Th. Wasser.)
184.		192.
Liniment. saponato - camphorat. (s Opodoc) 60,0. DS. Einreibung (NB. enthält in der Hauptsache Natronseife, Kampher, Am- moniak und Spiritus.)		Aq. Goulardi 100,0. DS. Ebenso (NB. enthält 1 Th. basisch es- sigsaures Bleioxyd in 45 Th. Wasser u. 4 Th Spirit. vini.)
185.		193.
Pulv. sinapeos nigr. 60,0. DS. Zum Senfpflaster.		Ol. Carbolic. (5%) 30,0. DS. Aeusserlich.
186.		194.
Emplastrum Cantharidum ordinari- extens. magnitudine volae ma- nus (od. folio allato aequatum) DS. Nach Verordnung (NB. enthält 1 Th. gepulverte Canthariden in 3 Th. Pflaster- masse Bewirkt in 8 – 12 Stun- den Blasenbildung.)		Zinc oxydat. 10,0, Amyli trit. 10,0. M. f. pulv. DS. Streupulver.
187.		195.
Collodii cantharidati 15,0. DS. Auf die Haut aufzupinseln.		Tale. venet. 20,0. DS. Streupulver.
188.		196.
Jodoformii 2,0. Collodii elastic. 20,0. MDS. Zum Aufpinseln.		Acid. salicylic. 5,0. Amyli trit. 95,0. M. f. pulv. DS. Streupulver.
189.		197.
		Vaselini 20,0. DS. Aeusserlich.

198.		205.
Ungt. simpl. 30,0. DS. Aeußerlich. (NB. 3 Th. Olivenöl, 1 Th. Wachs zusammengeschmolzen. Wachssalbe.)		Emplastr. litharg. simpl. 15,0. Ol. olivar. 15,0. M. f. ungt. DS. Aeußerlich, (Ungt. diachylon Hebrae.)
199.		206.
Ungt. Zinci 30,0. DS. Aeußerlich. (NB. enthält 1 Th. Zinkoxyd auf 8 Th. Fett u. 1 Th. Wachs.)		Chrysarobini 5,0. Vaselini 20,0. M. f. ungt. DS. Aeußerlich.
200.		207.
Hydrarg. praecipitat. alb. 2,0. Vaselini od. Axung. porci 20,0. M. f. ungt. DS. Aeußerlich.		Ol. rusci (od. Picis liquid.) 15,0. Spirit. vini 15,0. MDS. Aeußerlich.
201.		208.
Acid. boric. 3,0. Vaselini 30,0. M. f. ungt. DS. Aeußerlich.		Ol. cadiini od. Ol. empyreumatic. Juniperi 5,0 Ol. olivar. 25,0 MDS. Aeußerlich (Theeröl).
202.		209.
Lanolini 10,0. Aq. dest. 5,0. M. adde Vaseline 5,0. M. f. ungt. DS. Aeußerlich. (NB. Diese Salbe kann auch als Grundmasse für andere Sal- ben an Stelle von Schweinefett oder Vaseline benutzt werden; ist als s. g. unguent. lanolini nicht officinell.)		Ol. cadiini 5,0. Ungt. diachyl. Hebrae 25,0. M. f. ungt. DS. Aeußerlich.
203.		210.
Emplastr. litharg. simpl. (oder Emplastr. diachylon) 30,0. DS. Aeußerlich. (NB. 1 Th. Bleioxyd mit 1 Th. Baumöl und 1 Th. Schweine- fett zur Pflastermasse verseift.)		Picis liquid. 10,0. Flor. sulfuris 10,0. Sapon. virid. 20,0. Vaselini 20,0. M. f. ungt. DS. Aeußerlich. (Wilkinson sche Salbe modifizirt von Hebra.)
204.		211.
Emplastr. adhaesiv. extens. la- titudine 20 Cmtr. longitudine 5 und mehr Cmtr. DS. Nach Verordnung aufzu- kleben. (NB. ist emplastr. litharg. simpl. mit Zusatz von Colophonium.)		Sapon. virid. (s. sapon. Kalin. nigr.) 30,0—60,0. DS. Aeußerlich od. Einreibung. (NB. Kalilauge mit Hanföl oder Leinöl verseift.)
212.		
		Sulfur. praeccipitat. 3,0. Axung. porci od. Ungt. lano- lini 30,0. M. f. ungt. DS. Aeußerlich.





- 213.
- Sulfur. praecipit. 10,0.  
Aq. Laurocer. 10,0.  
Aq. Calcis 50,0.  
MDS. Der Bodensatz Abends aufzupinseln.
- 
- 214.
- Solution. Vleminckx 100,0.  
DS. Aeusserlich.  
(NB. Enthält Fünffach-Schweifealcium und unterschweifig-sauren Kalk in Wasser gelöst.)
- 
- 215.
- Hydrarg. bichlorat. corrosiv. 0,3.  
Spirit. vini (70%) 30,0.  
MDS. Aeusserlich (sub signo veneni).
- 
- 216.
- Balsam. peruvian. 10,0.  
Spirit. vini rectif. (70%) 20,0.  
MDS. Einreibung.
- 
- 217.
- Petroleū 100,0.  
DS. Aeusserlich (gegen Kopfläuse).
- 
- 218.
- Acid. salicylic. pulv. 2,0.  
Tinet. Benzoës 3,0.  
Ol. olivar. 100,0.  
MDS. Haaröl.
- 
- 219.
- Tinet. capsic. 20,0.  
Aq. dest. 30,0.  
Spirit. vini (70%) 30,0.  
MDS. Aeusserlich (Alopecia areata)
- 
- 220
- Ungt. hydrarg. ciner. 10,0.  
DS. Aeusserlich, od. Einreibung.  
(NB. Enthält 1 Th. Quecksilber auf 2 Th. Fett.)
- 
- 221.
- Zinc. sulf. 1,0.  
Aq. dest. 100,0.  
MDS. Verbandwasser.
- 
- 222.
- Liq. ferri sesquichlorat. 5,0.  
DS. Aeusserlich.  
(NB. Enthält c. 30% Eisenchlorid in wässriger Lösung.)
- 
- 223.
- Liniment. calcarei 100,0.  
DS. Zum Verbande (Verbrennungen).  
(NB. Besteht aus gleichen Theilen ol. lini und aq calcis.)
- 
- 224.
- Jodoformii 1,0.  
Vaselini 10,0.  
M. f. ungt DS. Aeusserlich.  
(uleus molle etc.)
- 
- 225.
- Injectionen in die Harnröhre:  
a) Zinc.sulfuric 0,3:100,0.  
b) Zinc.sulfocarbolic 0,3:100,0.  
c) Kali hypermanganic 0,3:100,0.  
d) Hydrarg. bichlorat. corrosiv. 0,01:100,0.  
Alle in wässriger Lösung.  
DS. Einspritzung in die Harnröhre.
- 
- 226.
- Blasenausspülungen:  
a) Argent. nitric. 1,5:500,0.  
b) Resorcin. 15,0:500,0.  
c) Kali chloric. 15,0:500,0.  
Alle in wässriger Lösung.  
DS. Zur Blasenausspülung.
- 
- 227.
- Kalii sulfurat. pro balneo 100,0.  
D. tal dos. Nr. 3.  
S. Ein Päckchen zu einem Bade zuzusetzen.

- 228.
- Pulv. dentifric. camphorat. 20,0.  
DS. Zahnpulver.  
(NB. Enthält 2 Th. Camphor.  
trit., 2 Th. Balsam. vitae  
Hoffman., 50 Th Calcar. car-  
bonic praecepit., 3 Th. Magnes.  
carbonic, 10 Th. pulv. rad. Iridis  
florent. — Ist nicht officinell.)
- 229.
- Argent. nitric. fus 2,0.  
DS. Zu Handen des Arztes.
- 230.
- Acid. chromic. 5,0.  
Aq. dest. 5,0.  
MDS. Aeusserlich (zum Beizen  
von Warzen etc.).
- 231.
- Chloral. hydrat. 3,0.  
Camphorae 3,0.  
Ol. menthae piperit. 0,5.  
MDS. Zahntropfen  
(Guttae odontalgicae, auf Watte  
in den hohlen Zahn zu thun.)
- XXI. Antisyphilitica.
- cfr. Nr. 168, 170, 100.
- 232.
- Ungt. hydrarg. ciner. 4,0  
Da in chart. cerat.  
tal, dos. Nr. 6.  
S. täglich ein Päckchen einzurieben.
- 233.
- Ungt. hydrarg. ciner. 1,0.  
DS Ebenso (Kindern).
- 234.
- Emplastr. hydrargyri extens la-  
titudine 20 cmtr., longitudine  
5 cmtr.  
DS. Aeusserlich.  
(NB. Enthält 1 Th Quecksilber  
in 4 Th. Heftfliastermasse;  
auch Emplastr. mercuriale ge-  
nannt.)
- 235.
- Hydrarg. bichlorat. corrosiv. 0,2.  
Natr. chlorat. 2,0.  
Aq. dest. 20,0.  
MDS. Zur subcutanen Injection.
- 236.
- Calomel. via secca parat. 1,0.  
Ol. provincial. 10,0.  
MDS. Ebenso.
- 237.
- Hydrarg. oxydulat nigr. 1,0.  
Ol. provincial. 10,0.  
MDS. Ebenso.
- 238.
- Hydrarg. oxydulat. tannic. 3,0.  
(eventuell Opii puri 0,3.)  
Extr. liquirit. q. s. ut f. pil. Nr. 30.  
Consp. lycopod.  
DS. 3 Mal tägl. eine Pille.
- 239.
- Hydrarg. iodat. flav. 1,0.  
Opii puri 0,3.  
Extr. liquirit. q. s. ut f. pil. Nr 30.  
Consp. lycopod  
DS. Ebenso.
- 240.
- Calomel. vapore parat. 10,0.  
DS. Aeusserlich (auf syphilit.  
Papeln aufzupulvern).
- 241.
- Hydrarg. bichlorat. corrosiv.  
0,2 i—1,0.  
Aq. dest. 25,0.  
MDS. Aeusserlich. Zu Handen  
des Arztes
- XX. Mittel zur subcutanen  
Injection.
- Dieselben sind stets zu Handen  
des Arztes zu verschreiben  
und nicht den Kranken zum  
eignen Gebrauch zu überlassen!





242.		246.
Morph. muriat. 0,1.		Strychnini nitric 0,05.
Aq. dest. 10,0.		Aq. dest. 10,0.
MDS. Zur subcutanen Injection ( $\frac{1}{2}$ bis eine Spritze p. dosi.)		MDS. Ebenso. ( $\frac{1}{2}$ bis eine Spritze pro dosi.)
—		—
243.		247.
Atropini sulfuric. 0,01.		Extract. Secalis cornuti (s. Er- gotini Bonjeani) 1,0.
Aq. dest. 10,0.		Aq. dest. 10,0.
MDS. Ebenso.		Thymol 0,01.
( $\frac{1}{2}$ bis eine Spritze p. dosi. — Bei Bluthusten 3stündl. 30 Theilstriche der Spritze bis 0,002 p. die.)		MDS. Ebenso. ( $\frac{1}{2}$ bis eine Spritze p. dosi.)
—		—
244.		248.
Apomorphini muriat. 0,1.		Liquor Kali arsenicosi 5,0.
Aq. dest. 10,0.		Aq. dest. 10,0.
MDS. Ebenso.		MDS. Zur subcutanen Injection. (30—50 Theilstriche der Spritze 1—2 Mal täglich.)
( $\frac{1}{2}$ bis eine Spritze p. dosi.)		—
—		—
245.		249.
Camphorae trit 1,0.		Pilocarpini muriat. 0,2.
Ol. amygdalar. dulc. 10,0.		Aq. dest. 10,0.
MDS. Ebenso.		MDS. Ebenso. ( $\frac{1}{2}$ bis eine Spritze pro dosi.)
		—
		ctr. NNr. 235, 236, 237.

## Maximaldosen

### einiger stark wirkender Mittel nach der Russischen Pharmacopöe.

NB. Die mit einem Stern (\*) bezeichneten Mittel sind in der Russischen Pharmacopöe nicht enthalten.

		pro dosi	pro die
Acidum arsenicosum . . .		0,005	0,01
Acidum carbolicum cryst. .		0,045	0,12
*Agaricinum . . . . .		0,01	0,02
Ammonium bromatum . . .		2,0	8,0
*Amylenhydrat . . . . .		5,0	—
Amylium nitrosum . . . .		1 Tropfen	6 Tropfen
*Apomorphinum muriat. .		0,01	0,05
Aqua amygdalar. amar. .		2,0	8,0
Argent. nitrie. cryst. .		0,03	0,18
Atropinum sulfuric. . .		0,001	0,003
Camphora bromata . . .		0,36	1,25
Chloralum hydrat. cryst. .		5,6	15,0
Chloroformium . . . . .		1,5	4,0
Coffeinum purum . . . .		0,1	0,5
Cuprum sulfurie. (als Brech- mittel) . . . . . von		0,18 bis 0,6	
Extract. Aeoniti (tuberum)		0,02	0,1
" Belladonnae . . .		0,06	0,24
" Hyoscyami . . .		0,12	0,6
" Secalis cornuti . .		0,3	1,0
Folia Digitalis (als Pulver)		0,18	0,56
Hydrarg. bichlorat. corrosiv.		0,03	0,06
" chlorat. mite . .		0,6	2,0
" jodatum flavum .		0,12	0,36
Kalium bromatum . . . .		5,0	15,0
" jodatum . . . .		2,0	8,0
Kreosotum . . . . .		0,06	0,3
Liquor Kali arsenicosi . .		5 Tropfen	15 Tropfen
Morphium muriat. . . .		0,03	0,12
*Nitroglycerinum . . . .		0,001	0,003
Natrium bromatum . . . .		5,0	15,0
Opium purum . . . . .		0,12	0,36
*Paraldehydum . . . . .		10,0	—

auf mehrere Einzel-  
dosen vertheilt.





		pro dosi	pro die
*Phenacetin . . . . .		3,0	
Phosphorus . . . . .		0,003	0,005
*Pilocarpin. muriat. . . . .		0,03	0,06
Plumbum acetic. . . . .		0,06	0,24
Podophyllum . . . . .		0,06	0,36
*Podophyllotoxinum . . . . .		0,015	0,08
Resina Jalapae . . . . .		0,18	0,50
*Salolun . . . . .		1,0	8,0
Santoninum . . . . .		0,18	0,36
Sapo jalapin. . . . .		0,36	0,72
Secale cornut. pulv. . . . .		0,6	4,0
Syrup. ferri iodati . . . . .		4,0	12,0
Stibio - Kali tartarie. (als Brechmittel) . . . . .		0,18	0,72
Strychninum nitric. . . . .		0,006	0,018
*Sulfonal . . . . .		4,0	—
*Tinct convallar. majal. . . . .	15 Tropfen	45 Tropfen	
Digitalis . . . . .	15	45	
" nue. vomic. . . . .	15	45	
" opii spl. . . . .	10	30	
" Steamonii . . . . .	15	45	
" Strophanti sem. . . . .	10	40	
Vinum Ipecacuanh. . . . .	30	90	
" stibiatum . . . . .	30	90	
Zincum valerianic. . . . .	0,6	0,18	

Obige Maximaldosen sind für Erwachsene berechnet. Kindern und Minderjährigen müssen entsprechend geringere Gaben verordnet werden und zwar giebt man im Allgemeinen

Kindern bis zu 1 Jahr  $\frac{1}{20}$  bis  $\frac{1}{10}$  der für Erwachs. bestimmten Dosis

" "	3	$\frac{1}{6}$	"	"	"	"
" "	5	$\frac{1}{6}$	"	"	"	"
" "	8	$\frac{1}{4}$	"	"	"	"
" "	11	$\frac{1}{3}$	"	"	"	"
" "	15	$\frac{1}{2}$	"	"	"	"


Jugendl. Individuen  
bis zum 20. Jahr  $\frac{3}{4}$

## I n d e x.

---

### A.

- Acetum Seillae 117.  
Acidum arsenicosum 143.  
    " benzoicum 31.  
    " boricum 45. 201.  
    " carbolicum 43. 44. 193.  
    " chronicum 230.  
    " citricum 13.  
    " muriaticum dilutum 11. 103. 104.  
    " phosphoricum dilutum 12.  
    " salicylicum 4. 196. 218.  
    " tannicum 43. 49. 93. 94. 175  
Aconiti tubera cfr. Extract. Aconiti.  
Adonis vernalis. (herba Adonidis vernal.) 56.  
Aether acetiens 150.  
    " phosphoratus 171.  
    " sulfuricus 148. 149.  
Agaricinum (Harz aus Agaricus albus) 42  
Aloë 73. 74. 75.  
Alumen 43.  
Alumina acetica soluta 50.  
Ammonium aceticum solutum cfr. Liq. Ammon. acetic.  
Ammonium bromatum 37. 157.  
Ammonium causticum solutum cfr. Liq. Ammon. caust.  
Ammonium muriaticum 22  
Anhydridat 134.  
Amylum tritici 46. 194. 196.  
Amylnitrit 60.  
Antifebrinum 8.  
Antipyrinum 7.  
Apomorphinum muriaticum 21. 244.



## D.

Digitalis folia 51. 52. 53, siehe auch tinct. Digital.

## E

- Elixir pectorale 15.
- Emplastrum adhaesivum 204
  - " cantharidatum 186.
  - " diachylon 203.
  - " hydrargyri 234.
  - " lithargyri simplex 203.
  - " mercuriale 234.
- Emulsio olei ricini 72.
- " oleosa 83.
- Ergotinum Bonjeani 160. 247.
- Extractum Aconiti tuberum 36.
  - " Belladonnae 35. 76. 174.
  - " Filicis maris aethereum (Wolmarense) 113.
  - " Hyoscyami 175.
  - " Liquiritiae 22
  - " Secalis cornuti 160. 247.
  - " Valerianae 167.

## F.

- Filix mas (rhizoma filicis maris) 112, siehe auch:  
Extr. filic. mar. aether.
- Ferrum carbonicum 140
  - " lacticum 142.
  - " hydrogenio reductum 75. 141. 143. 146, cfr.  
auch: Liq. ferri dialysati, Liq. ferri sesquichlorat., syrpus ferri jodati, Tinct. ferri chlorat  
aether. und Tinct. ferri pomata

## G.

- Gallae turcicae cfr tinct. Gallar.
- Gentianae radix cfr. tinct. Gentianae.
- Glycyrrhizae radix cfr. Liquiritiae radix.
- Guajacol 41.
- Guttae odontalgicae 231.





**H.**

- Hydrargyrum bichloratum corrosivum 49. 215. 225.  
235. 241.  
Hydrargyrum chloratum mite: 64. 99. 100. 118. 236. 240.  
" jodatum flavum 239.  
" oxydulatum nigrum 237.  
" oxydylatum tannicum 238.  
" praecipitatum album 200.  
Hyosciami herba cfr. Extr. Hyosciami.

**J.**

- Jaborandi folia cfr. Pilocarpin. muriat.  
Jalapae resina und Jalapae tubera cfr. Sapo jalapin.  
Jodoformium 45. 188. 224.  
Jodum purum 49 cfr. auch Tinct. Jodi.  
Ipecacuanhae radix 17. 61, cfr. auch vinum Ipecac.  
Juniperi baccae 116.

**K.**

- Kali aceticum cfr. liquor Kalii acetic.  
" arsenicosum cfr. liquor Kalii arsenicosi.  
" bitartaricum (depuratum) 84. 85.  
Kalium bromatum 135. 155  
Kali chloricum 50. 125. 226.  
" hypermanganicum 50. 225.  
Kalium jodatum 168. 189.  
" sulfuratum 227.  
Kreosotum 39. 40. 98.  
Kusso flores 114.

**L.**

- Lanolinum 202.  
Linimentum calcareum 223.  
" saponato-camphoratum 184.  
" volatile 183.  
Lithion carbonicum 126.  
" salicylicum 127.  
Liquiritiae radix cfr. pulv. liquirit. comp.  
Liquor Ammonii acetici 123.

- Liquor Ammonii anisatus 13. 16.  
 " Ammonii caustici 44.  
 " anodynus Hoffmanni cfr. spirit. aether. Hoffm.  
 " ferri dialysati Dragendorffii 137.  
 " ferri sesquichlorati 222.  
 " Kali acetici 52. 116.  
 " Kali arsenicosi 162. 248.  
 Lupulinum 128.

**M.**

- Magisterium Bismuthi 90. 167.  
 Magnesia carbonica 109.  
 " sulfurica 66  
 " usta 68. 69. 108.  
 Morphium muriaticum 23. 129. 130. 242.

**N.**

- Naphthalinum purissimum 97.  
 Natrum biboricum 49  
 " bicarbonicum 25. 26. 27. 43. 47. 49.  
 Natrium bromatum 157.  
 " chloratum 27. 43. 48.  
 Natrum salicylicum 5. 6.  
 " sulfuricum 65.  
 Nitroglycerinum 59.  
 Nux vomica cfr. Semen Strychni u. tinct. nuc. vomic.

**O.**

- Oleum cadiinum = Ol. empyreumatic. Juniperi =  
 Wachholdertheer 208 209.  
 Oleum carbolicum 193.  
 " jecoris aselli 172. 173.  
 " rusci = Ol. empyreumatic betulae = Pix li-  
 quida betulae = Birkentheer 207.  
 Oleum terebinthinae 28. 43. 176.  
 Opium 32. 88. 91. 175 cfr. auch tinct. opii simplex.  
 Opodeloe cfr. Liniment. saponato-camphorat.





## P.

- Paraldehydum 132.  
*Pepsinum germanicum* 105.  
*Petroleum* 217.  
*Petroselini aqua* 117.  
*Phenacetin* 10.  
*Phosphorus* cfr. *Aether phosphorat*.  
*Pix liquida pini* = *Fichtentheer* 207. 210.  
*Pilocarpinum muriaticum* 119. 249.  
*Plumbi aqua* 191.  
*Plumbum aceticum* 29. 32. 91.  
*Podophyllum* = *Resina podophyllii* 77.  
*Podophyllotoxinum* 78.  
*Pulvis aërophorus* s. *effervescens*. 86.  
 " *dentifricius* 228.  
 " *Doveri* 18.  
 " *Liquiritiae compositus* 79.  
 " *magnesiae cum rheo* 109.  
*Punica Granatum* cfr. *cort. rad. Granati*.

## Q.

- Quebracho cortex u. lignum* cfr. *tinct. Quebracho*.  
*Quercus cortex* 50.  
*Quillajae cortex* 20.

## R.

- Ratanhae radix* 95.  
*Resorecinum purum crystallisatum* 226.  
*Rhamni Frangulae cortex* 81.  
*Rhei radix* 70. 74. 109. cfr. auch *tinct. rhei aquos*.  
*Ricini oleum* 71. 72.

## S.

- Sal Carlsbadense factitium* 67.  
*Salolom* 9.  
*Salviae folia* 50.  
*Sambuci flores* 122.  
*Santoninum* 110.  
*Sapo jalapinus* 74. 75.  
 " *Kalinus niger* 210 211.  
 " *medicatus* 73.

- Sapo viridis = sap. Kalin. nigr. 210. 211.  
 Scillae bulbi cfr. acetum Scillae.  
 Secale cornutum 33. 34 cfr. auch Ergotinum.  
 Senegae radix 14.  
 Sennae foia 79. 80  
 Sinapis nigra 185.  
 Solutio arsenicalis Fowleri cfr. Liq. Kali arsenicosi.  
 Solutio Vleminckx 214.  
 Spiritus aethereus Hoffmanni 151.  
 " camphoratus 180.  
 " saponatus 179. 182.  
 " sinapis 181. 182  
 Stramonii folia cfr tinct Stramon.  
 Stibium sulfuratum aurantiacum cfr. Sulf aurat. antimon.  
 Stibio-Kali tartaricum = Brechweinstein cfr. Tartarus  
 stibiat. und Vinum stibiatum.  
 Strophanti semina cfr. Tinet. Strophanti.  
 Strychninum nitricum 250.  
 Strychni semen = Nux vomica cfr. Tinct nuc. vomic.  
 Sublimat cfr. Hydrarg. bichlorat. corrosiv.  
 Sulfonal 133.  
 Sulfur auratum Antimonii 23.  
 " depuratum = Sulf. sublimatum elotum 84.  
 " praecipitatum = Lac. sulfuris 212. 213.  
 " sublimatum = Flores sulfuris 210.  
 Suppositoria 174. 175.  
 Syrupus ferri jodati 169. 170.

## T.

- Talcum Venetum 195.  
 Tanninum cfr acid tannie.  
 Tartarus stibiatus = Stibio-Kali tart. 61.  
 Terebinthinae oleum 28. 43. 176.  
 Terpinum hydratum 30.  
 Tiliae flores 121.  
 Tinctura amara 102.  
 " Benzoës 218.  
 " Capsici 219.  
 " Chinae composita 101. 144.  
 " Convallariae majalis 57.  
 " Digitalis 54.





- Tinctura Ferri chlorata aetherea Bestusheffii 139.  
 " Ferri pomata 138. 144. 145.  
 " Gallarum 190.  
 " Gentianae 103.  
 " Jodi 191.  
 " Nucis vomicae 89. 107.  
 " opii simplex 16. 83. 87. 89.  
 " Quebracho 38.  
 " Rhei aquosa 82.  
 " Stramonii 16.  
 " seminum Strophanti 58.  
 " Valerianae 107. 145. 165. 166.  
 " Valerianae aetherea 152. 153.

**U.**

- Unguenta 177. 189. 197. 198. 199. 200. 201. 202.  
 205. 206. 209. 210. 212. 220. 224. 232. 233.  
 Unguentum diachylon Hebrae 205.  
 " simplex 198.  
 " Veratrini 177.  
 " Wilkinsonii 210.  
 " Zinci 199.  
 Uvae ursi folia 124.

**V.**

- Valerianae radix cfr. tinct. Valerian.  
 Vaselinum 197  
 Veratrinum. Alkaloid aus rhizoma Veratri. cfr. ungt  
 Veratrini.  
 Vinum Ipecacuanhae 19.  
 " Lusitanicum faetitium 154.  
 " stibiatum 24. 63.

**X. Y. Z.**

- Zineum oxydatum == Flores Zinci 163. 194. 199.  
 " sulfocarbolicum 225.  
 " sulfuricum 43. 221. 225.  
 " valerianicum 164.