


EESTI NSV TERVISHOIUMINISTEERIUMI APTEEKIDE PEÄVALITSUS
ГЛАВНОЕ АПТЕЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЭСТОНСКОЙ ССР

MÜRGISTE JA KANGETOIMELISTE
RAVIMITE SUURIMATE ANNUSTE JA
VASTUMÜRKIDE TABELID

ТАБЛИЦЫ ВЫСШИХ ДОЗ ЯДОВИТЫХ
И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
И ПРОТИВОЯДИЙ

EESTI RIIKLIK KIRJASTUS
TALLINN 1955



A-20297

EESTI NSV TERVISHOIAMINISTEERIUMI APTEEKIDE PEAVALITSUS
ГЛАВНОЕ АПТЕЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ ЭСТОНСКОЙ ССР

MÜRGISTE JA KANGETOIMELISTE
RAVIMITE SUURIMATE ANNUSTE JA
VASTUMÜRKIDE TABELID

ТАБЛИЦЫ ВЫСШИХ ДОЗ ЯДОВИТЫХ
И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
И ПРОТИВОЯДИЙ

EESTI RIIKLIK KIRJASTUS
TALLINN 1955

KOOSTANUD JA TÕLKINUD I. PODOLSKI

TARTU ÜLIKOOLI
RAAMATUKOGU

E E S S Ö N A

Mürgiste ja kangetoimeliste ravimite õige kasutamise otstarbel ja eksituste ning õnnetuste ärahoidmiseks nende ebaõigel säilitamisel ja kasutamisel omab väga suurt tähtsust NSV Liidu Tervishoiu-ministeeriumi mürgiste ja kangetoimeliste raviainetete säilitamise, arvestamise ja väljastamise reeglitest kinnipidamine.

Hiljuti vaadati NSV Liidu Tervishoiuministeeriumi poolt uuesti läbi mürgiste ja kangetoimeliste ravimite säilitamise, arvestamise ja väljastamise korra kohta apteekides ja raviautustes kehtinud käskkirjad. Selle tulemusena anti välja NSV Liidu Tervishoiu-ministeeriumi uus käskkiri 11. veebruarist 1954. a. nr. 77 «Mürgiste ja kangetoimeliste ainete säilitamise, arvestamise ja väljastamise korra».* Nimetatud käskkirja lisades avaldatud juhiste kohaselt peavad ravi-profülaktilise asutuse igas osakonnas ja kabinetis olema käsitamiseks mürgiste ja kangetoimeliste ning mürgistuste puhul tarvitata-vate vastumürkide tabelid.

Arvestades asjaolu, et paljud raviautused ei oma Riikliku Farmakopöa VIII väljaannet, kus nimetatud tabelid on ära toodud, tekkis vajadus neid tabeleid välja anda eribrošüürina.

Käesolevas brošüüris on ära toodud eesti ja vene keeles järgmised tabelid Riikliku Farmakopöa VIII 1952. a. väljaande ja selle esimese täiendi järgi:

1. Mürgiste ja kangetoimeliste ravimite suurimad ühekordsed ja ööpäevased annused täiskasvanuile.
2. Mürgiste ja kangetoimeliste ravimite suurimad ühekordsed annused lastele.
3. Tilgatabel.
4. Ravimid, mida rakendatakse abiandmiseks ägedate mürgistuste puhul.
5. Vastumürkide ja mürgistustel tarvitata-vate vahendite tabel.

I. Podolski,

ENSV Tervishoiuministeeriumi Apteekide
Peavalitsuse ülem asetäitja.

* Eesti NSV-s on välja antud kooskõlas selle käskkirjaga Eesti NSV tervishoiu-ministri käskkiri 24. aprillist 1954. a. nr. 104.

247833

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work. It is a very interesting and informative account of the work done during the year. The second part of the report deals with the results of the work done during the year. It is a very interesting and informative account of the work done during the year. The third part of the report deals with the results of the work done during the year. It is a very interesting and informative account of the work done during the year.

2. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work. It is a very interesting and informative account of the work done during the year. The second part of the report deals with the results of the work done during the year. It is a very interesting and informative account of the work done during the year. The third part of the report deals with the results of the work done during the year. It is a very interesting and informative account of the work done during the year.

3. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work. It is a very interesting and informative account of the work done during the year. The second part of the report deals with the results of the work done during the year. It is a very interesting and informative account of the work done during the year. The third part of the report deals with the results of the work done during the year. It is a very interesting and informative account of the work done during the year.

**MÜRGISTE (A) JA KANGETOIMELISTE (B) RAVIMITE
SUURIMAD ÜHEKORDESED JA ÖÖPÄEVASED ANNUSED
TÄISKASVANUILE**

(Annused tähendavad sissevõtmiseks (*per os*) määratud koguseid ja on märgitud kas grammides, või kus see tähendatud, milliliitrites ja tilkades)

(NSV Liidu Riikliku Farmakopöa 1952. a. VIII väljaande järgi)

Jrk. nr.	Preparaadi nimetus	Mürgised (A) ja kangetoime- lised (B)	Suurim annus	
			Ühekordne	Ööpäevane
1	Acetylcholinum chloratum nahaalusi	B	0,2	0,6
2	Acidum arsenicosum	A	0,003	0,01
3	„ hydrochloricum pu- rum dilutum		20 tilka	60 tilka
4	„ nicotinicum nahaalusi	B	0,1	0,3
5	„ pronarconi	B	0,5	1,0
6	„ rectoni	B	0,5	1,0
7	„ sönbutali	B	0,5	1,0
8	„ sulfuricum purum di- lutum		15 tilka	45 tilka
9	Acrichinum	B	0,2	0,6
10	Adalinum	B	1,0	2,0
11	Adonilenum	B	30 tilka	60 tilka
12	Adonisidum nahaalusi	B	1 ml	2 ml
13	Adrenalinum solum (1 : 1000) nahaalusi	B	1 ml	—
14	Adrenalonum nahaalusi . . .	B	0,01	—
15	Aether	B	20 tilka	60 tilka
16	Amygdalinum	B	0,02	0,06
17	Amylium nitrosum (inhalat- sioon)	B	5 tilka	30 tilka
18	Anaesthesinum	B	0,5	1,5
19	Analginum		1,0	3,0
20	Antifebrinum	B	0,3	1,0
21	Antipyrinum	B	1,0	3,0
22	Apomorphinum hydrochlori- cum	A	0,01	—
23	Apomorphinum hydrochlori- cum nahaalusi	A	0,005	—
24	Aqua Amygdalarum amara- rum	B	30 tilka	60 tilka
25	Arecolinum hydrobromicum .	A	0,0005	0,0015

Jrk. nr.	Preparaadi nimetus	Mürgised (A) ja kangeitoime- lised (B)	Suurim annus	
			Ühekordne	Ööpäevane
26	Argentum colloidalē (Collar- golum) veenisisesi	B	0,25	0,5
27	Argentum nitricum	A	0,03	0,1
28	Arrhenalum nahaalusi	A	0,06	0,2
29	Atropinum sulfuricum	A	0,001	0,003
30	Barbamyllum	B	0,5	1,0
31	Bijochinolum lihasesisesi . .	B	3 ml	—
32	Bismutum salicylicum basi- cum		1,0	3,0
33	Bromuralum		0,6	1,0
34	Bulbus Scillae	B	0,3	1,5
35	Carbocholinum	A	0,001	0,003
36	Carbocholinum nahaalusi . .	A	0,0005	0,001
37	Carboneum tetrachloratum . .	B	3 ml	3 ml
38	Chloralum hydratum	B	2,0	6,0
39	Chloroformium	B	0,5 ml	1,0 ml
40	Cocainum hydrochloricum . .	A	0,03	0,03
41	Codeinum phosphoricum . .	B	0,1	0,3
42	„ purum	B	0,05	0,2
43	Coffeinum	B	0,3	1,0
44	„ natrio-benzoicum	B	0,5	2,0
45	„ natrio-salicylicum	B	0,5	2,0
46	Convallenum nahaalusi . . .	B	1 ml	2 ml
47	Convasidum veenisisesi . . .	B	0,5 ml	1 ml
48	„ nahaalusi	B	1 ml	2 ml
49	Cordiaminum nahaalusi . . .	B	1 ml	2 ml
50	„ sissevõtmiseks	B	30 tilka	90 tilka
51	Corazolum	B	0,1	0,3
52	Creosotum	B	10 tilka	30 tilka
53	Cuprum sulfuricum oksenda- misvahendina	B	0,5	—
54	Diaethylamidum acidi nicoti- nici solutum	B	30 tilka	90 tilka
55	Diaethylamidum acidi nicoti- nici solutum nahaalusi . . .	B	1 ml	2 ml
56	Dicainum nahaalusi	A	0,015	0,03
57	Digalen-Neo	B	1 ml	3 ml
58	Diginormum	B	20 tilka	80 tilka
59	Dioninum	A	0,03	0,1
60	Disulfanum	B	2,0	7,0
61	Diuretinum		1,0	6,0

Jrk. nr.	Preparaadi nimetus	Mürgised (A) ja kangeitoime- lised (B)	Suurim annus	
			Ühekordne	Ööpäevane
62	Emetinum hydrochloricum nahaalusi	B	0,05	0,1
63	Ephedrinum hydrochloricum .	B	0,05	0,15
64	Extractum Belladonnae sic- cum	B	0,05	0,15
65	Extractum Belladonnae spis- sum	B	0,05	0,15
66	Extractum Cannabis indicae .	B	0,1	0,3
67	Extractum Filicis maris aethe- reum	B	8,0	—
68	Extractum Hyoscyami siccum et spissum	B	0,1	0,3
69	Extractum Ipecacuanhae sic- cum	B	0,2	0,4
70	Extractum opii siccum . . .	A	0,05	0,3
71	Extractum Secalis cornuti fluidum	B	25 tilka	50 tilka
72	Extractum Secalis cornuti pro injectionibus (Ergotinum) nahaalusi	B	1 ml	3 ml
73	Extractum Secalis cornuti spissum	B	0,3	1,0
74	Extractum Strychni	B	0,012	0,05
75	Flavacridinum hydrochlori- cum	B	0,2	0,8
76	Folium Belladonnae	B	0,2	0,6
77	Folium et flos Convallariae majalis	B	0,5	1,5
78	Folium Digitalis	B	0,1	0,5
79	„ Hyoscyami	B	0,4	1,2
80	„ Stramonii	B	0,2	0,6
81	Gitalenum	B	25 tilka	50 tilka
82	Harminum hydrochloricum nahaalusi	B	0,01	0,03
83	Herba Adonidis vernalis . .	B	0,8	10,0
84	„ Cannabis indicae . . .	B	0,2	0,6
85	„ Thermopsidis	B	0,1	0,3
86	Heroinum	A	0,005	0,015
87	Hexenalum veenisisesi . . .	B	1,0	—
88	Hexylresorcinum	B	1,5	1,5
89	Homatropinum hydrobromi- cum	A	0,001	0,003

Jrk. nr.	Preparaadi nimetus	Mürgised (A) ja kangeitoime- lised (B)	Suurim annus	
			Ühekordne	Ööpäevane
90	Hydrargyrum bichloratum .	A	0,02	0,06
91	„ bijodatum . . .	A	0,02	0,06
92	„ chloratum mite	B	0,6	1,8
93	„ cyanatum et oxycyanatum nahaalusi . .	A	0,01	0,03
94	Hydrargyrum salicylicum li- hasesisesi	A	0,02	0,06
95	Hydrastininum chloratum .	B	0,05	0,15
96	Infusum Ipecacuanhae con- centratum	B	1 ml	4 ml
97	Isapheninum	B	0,025	0,05
98	Jodum	B	0,02	0,06
99	Liquor Kalii arsenicosi . . .	A	3 tilka	10 tilka
100	Lobelinum hydrochloricum nahaalusi	B	0,01	0,02
101	Luminalum	B	0,3	0,6
102	Malilum	B	0,2	0,4
103	Medinalum	B	1,0	2,0
104	Mercusalum lihasesisesi . .	B	2 ml	—
105	Morphinum hydrochloricum .	A	0,03	0,1
106	Myarsenolum lihasesisesi . .	A	0,6	—
107	Narcolanum pärasoolde 1 kg haige kehakaalule	B	0,1	—
108	Natrium arsenicum	A	0,003	0,01
109	„ kakodylicum	A	0,06	0,2
110	„ nitrosum	B	0,3	1,0
111	„ „ nahaalusi	B	0,05	0,15
112	Nitroglycerinum solutum . .	B	4 tilka	10 tilka
113	Norsulfazolum	B	2,0	7,0
114	Novarsenolum veenisisesi . .	A	0,6	—
115	Novocainum nahaalusi . . .	B	0,2	—
116	Omnoponium	A	0,03	0,1
117	Opium	A	0,1	0,3
118	Osarsolum	A	0,25	1,0
119	Papaverinum hydrochloricum	B	0,1	0,2
120	Paraldehydum	B	5 ml	10 ml
121	Parathyreoidinum nahaalusi .	B	5 ml	—
122	Phenolum purum	B	0,1	0,3
123	„ liquefactum	B	2 tilka	6 tilka
124	Physostigminum salicylicum .	A	0,001	0,003
125	Pilocarpinum hydrochloricum nahaalusi	A	0,01	0,02

Jrk. nr.	Preparaadi nimetus	Mürgised (A) ja kangeoime- lised (B)	Suurim annus	
			Ühekordne	Ööpäevane
126	Pituitrinum nahaalusi	B	2 ml	4 ml
127	„ siccum	B	—	0,15
128	Plasmocidum	B	0,03	0,06
129	Platyphyllinum bitartaricum .	B	0,01	0,03
130	Podophyllum	B	0,1	0,3
131	Pulvis Ipecacuanhae opiatu .	B	0,5	1,5
132	Pyramidonum	B	0,5	1,5
133	Radix Ipecacuanhae rögalah- tistava vahendina	B	0,1	0,4
134	Radix Ipecacuanhae oksenda- misvahendina	B	1,0	—
135	Rivanolum	B	0,05	0,15
136	Salipyrinum	B	1,0	3,0
137	Salsolinum hydrochloricum .	B	0,1	0,3
138	Santoninum	B	0,1	0,4
139	Scopolaminum hydrobromi- cum	A	0,0005	0,0015
140	Secale cornutum	B	1,0	5,0
141	Solutio pronarconi 10% vee- nisisesi	B	10 ml	—
142	Solutio rectoni 10% pärasool- de	B	5 ml	—
143	Solutio sonbutali 10% veeni- sisesi	B	5 ml	—
144	Sovcainum seljaajukanalisse .	A	0,01	0,01
145	Stibio-kalium tartaricum ok- sendamisvahendina	B	0,1	0,3
146	Streptocidum album	B	2,0	7,0
147	Strychninum nitricum	A	0,002	0,005
148	Stypnonum nahaalusi	B	0,01	—
149	Stypticinum	B	0,1	0,3
150	Sulfacylum	B	2,0	7,0
151	Sulfazolum	B	2,0	7,0
152	Sulfidinum	B	2,0	7,0
153	Tabulettae Aëroni	B	2 tabletti	4 tabletti
154	Theophyllum	B	0,3	1,0
155	Thiocainum nahaalusi	A	0,05	—
156	Thymolum	B	0,5	3,0
157	Thyreoidinum liquidum . . .	B	1 ml	2 ml
158	Thyreoidinum siccum	B	0,3	1,0

Jrk. nr.	Preparaadi nimetus	Mürgised (A) ja kangetoime- lised (B)	Suurim annus	
			Ühekordne	Ööpäevane
159	Tinctura Aconiti	B	8 tilka	20 tilka
160	„ Belladonnae	B	20 „	60 „
161	„ Convallariae majalis		30 „	90 „
162	„ Digitalis	B	20 „	80 „
163	„ Ipecacuanhae	B	15 „	30 „
164	„ jodi 10%	B	8 „	25 „
165	„ jodi 5%	B	15 „	50 „
166	„ opii simplex	B	20 „	50 „
167	„ Strophanthi	A	10 „	20 „
168	„ Strychni	B	15 „	30 „
169	Trypaflavinum	B	0,2	0,8
170	Veronalum	B	0,75	1,5
171	Yatrenum	B	1,0	3,0
172	Zincum sulfuricum oksenda- misvahendina	B	1,0	—

M ä r k u s: 1. Nimekirjas tähendatud mürgiste ja kangetoimeliste ravimite suurimad annused on arvestatud 25-aastastele täiskasvanud inimestele. Mitte-suguküpsetele ja lastele vähendatakse suurimad annused, olenevalt vanusest, ligikaudu järgmiselt:

Noortele inimestele	18-aastastele	— $\frac{3}{4}$ täiskasvanu annusest
„	14 „	— $\frac{1}{2}$ „
Lastele	7 „	— $\frac{1}{3}$ „
„	6 „	— $\frac{1}{4}$ „
„	4 „	— $\frac{1}{6}$ „
„	2 „	— $\frac{1}{8}$ „
„	1 „	— $\frac{1}{12}$ „
„ kuni 1 aasta vanuseni	—	$\frac{1}{24}$ — $\frac{1}{12}$ täiskasvanu annusest

2. Üle 60-ne aastastele isikutele suurimad annused vähenevad kuni $\frac{1}{4}$ ja $\frac{1}{2}$ täiskasvanu annusest.

3. Juhul, kui mürgised ja kangetoimelised ravimid on välja kirjutatud retseptis nimekirjas tähendatud annust ületavas koguses ja seejuures sõnadega välja kirjutamata ja hüüumärgita, peab apteegi juhataja või tema asetäitja astuma kontakti arstiga suuliselt (võib ka telefoni teel) või kirjalikult (kinnises ümbrikus) ja ainult vastuse saamisel väljastama väljakirjutatud ravimit vastavas doseeringus. Kui ühel või teisel põhjusel on võimata saada arstilt seletust, väljastab apteegi juhataja või tema asetäitja väljakirjutatud ravimit nimekirjas suurimana tähendatud annuse pooles suuruses.

MÜRGISTE JA KANGETOIMELISTE RAVIMITE SUURIMAD ÜHEKORSED ANNUSED LASTELE

(NSV Liidu Riikliku Farmakopöa VIII 1952. a. väljaande esimese täiendi järgi)

Nimetus	6 kuuni	6 kuust 1 aastani	2 aastani	3—4 aastani	5—6 aastani	7 aastani	8—14 aastani
1. Acidum hydrochloricum purum dilutum Lahjendatud soolhape . .	1 tilk 1%	1 tilk	2 tilka	3 tilka	5 tilka	7 tilka	8—10 tilka
2. Acrichinum			1%		1,5%		2%
3. Akrihiin	0,0125	0,0125	0,025	0,04	0,05	0,075	0,1
3. Adalinum	Ei määrata	0,1	0,15	0,2	0,2	0,25	0,3
4. Adaliin nahaalusi							
4. Adonilenum	1 tilk	3 tilka	3 tilka	5 tilka	6 tilka	7 tilka	8—15 tilka
5. Adrenalinum solutum Adrenaliinilahus (1:1000)							
6. Antipyrinum	0,1—0,2 ml	0,25 ml	0,3 ml	0,4 ml	0,5 ml	0,6 ml	0,6—1 ml
6. Antipüriin	Ei määrata	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,25—0,3
7. Apomorphinum hydrochloricum							
Apomorfiinhüdrokloriid rõ- galahtistava vahendina . .	Ei määrata		0,001	0,0015	0,002	0,0025	0,003
8. Apomorphinum hydrochloricum							
Apomorfiinhüdrokloriid ok- sendamisvahendina . .	Ei määrata		0,002	0,0025	0,003	0,003	0,003—0,005

Nimetus	6 kuuni	6 kuust 1 aastani	2 aastani	3—4 aastani	5—6 aastani	7 aastani	8—14 aastani
9. Aqua Amygdalarum amararum Mörmandilivesi	Ei määrata						
10. Atropinum sulfuricum Atropiinsulfaat	0,0002	0,0002	0,0002	0,00025	0,0003	0,0004	0,0005
11. Bijochinolum Bijokinool	0,3—0,5 ml	0,8 ml	1 ml	1,25 ml	1,25 ml	1,5 ml	1,5—2 ml
12. Bromuralum Bromuraal	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,3
13. Calomel Kalomel	0,025	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,05—0,075
14. Chloralum hydratum Klooraalhüdraat	0,1	0,15	0,15	0,2	0,25	0,3	0,3—0,5
15. Codeinum phosphoricum Kodeiinfosfaat	Ei määrata	0,002	0,003	0,005	0,005—0,008	0,01	0,015—0,02
16. Codeinum purum Kodeiin puhas	Ei määrata		0,002	0,004	0,005	0,006	0,006—0,01
17. Coffeinum natrio-benzoicum Kofeiin-naatriumbensoaat . .	0,05	0,05	0,06	0,08	0,1	0,15	0,15—0,2
18. Coffeinum purum Kofeiin puhas	Ei määrata	0,025	0,04	0,05	0,06	0,075	0,075—0,1
19. Dioninum Dioniin	Ei määrata		0,003	0,005	0,006	0,0075	0,0075—0,01
20. Diuretinum Diuretiin	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,4—0,5
21. Ephedrinum hydrochloricum Efedriinhüdrokloriid	0,005	0,005	0,006	0,008	0,012	0,015	0,015—0,025
22. Extractum Belladonnae siccum Karumustika-kuivekstrakt .	Ei määrata	0,0025	0,003	0,004	0,005	0,0075	0,01—0,015

Nimetus		6 kuuni	6 kuust 1 aastani	2 aastani	3—4 aastani	5—6 aastani	7 aastani	8—14 aastani
								(Järg)
23.	Extractum Filicis maris aethereum							
	Eeterlik sõnajalaekstrakt	Ei määrata		1,0	1,5—2,0	2,5—3,0	3,5	4,0—5,0
24.	Extractum opii siccum							
	Oopiumi-kuivekstrakt	Ei määrata		Ei määrata		0,01	0,015	0,015—0,02
25.	Folium Digitalis	0,005	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05—0,075
26.	Sõrmkübaralehed							
	Gitaleen	2 tilka	2 tilka	3 tilka	4 tilka	6 tilka	7 tilka	8—14 tilka
27.	Herba Adonidis vernalis							
	Adooniseürt	Ei määrata		0,15	0,2	0,25	0,3	0,3—0,5
28.	Herba Thermopsisidis							
	Termopsisiseürt	0,01	0,01	0,01	0,015	0,02	0,025	0,03
29.	Hexylresorcinum							
	Heksüülresortsiin ¹	Ei määrata		0,2	0,4	0,6	0,7	0,8—1,0
30.	Liquor arsenicalis Fowleri							
	Fauleri lahus	Ei määrata		1 tilk	1½ tilka	2 tilka	2½ tilka	3 tilka
31.	Lobelinum hydrochloricum							
	Lobeliinhüdrokloriid naha-	0,0025	0,0025	0,003	0,004	0,006	0,0075	0,01
32.	Luminalum							
	Luminaal	0,01	0,02	0,03	0,05	0,06	0,07	0,1
33.	Medinalum							
	Medinaal	0,03	0,075	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3
34.	Mercusalum							
	Merkusaal	0,1 ml	0,2 ml	0,25 ml	0,3 ml	0,5 ml	0,75 ml	1 ml
35.	Morphinum hydrochloricum							
	Morfiinhüdrokloriid	Ei määrata		0,001	0,0015	0,0025	0,003	0,003—0,006

¹ Ööpäevane annus on võrdne ühekordsega.

4 Ühe süste kohta. Alustada väiksematest annustest (esimene arv) ja viia suurimateni (teine arv).

Nimetus	6 kuuni	6 kuust 1 aastani	2 aastani	3—4 aastani	5—6 aastani	7 aastani	(Järg)	
							8—14 aastani	
47. Strychninum nitricum Strühninnitrat	Ei määrata		0,00025	0,0003	0,0005	0,0006	0,00075— —0,001	
48. Sulfazolum Sulfazool	0,2	1 kilogrammi	kehakaalule	ööpäevas				
49. Sulfidinum Sulfidiin	0,2	1 kilogrammi	kehakaalule	ööpäevas				
50. Tinctura Belladonnae Karumustikatinktuur	1 tilk	1 tilk	2 tilka	3 tilka	3 tilka	4 tilka	4—6 tilka	
51. Tinctura Convallariae majalis Pitbelehetinktuur	1 tilk	2 tilka	2 tilka	4 tilka	6 tilka	7 tilka	8—15 tilka	
52. Tinctura Digitalis Sõrmkübaratinktuur	Ei määrata	1 tilk	2 tilka	4 tilka	6 tilka	7 tilka	8—10 tilka	
53. Tinctura opii simplex Opiumitinktuur	Ei määrata		Pool tilka	1 eluaasta kohta				
54. Tinctura Strychni Strühnosetinktuur	Ei määrata		1 tilk	2 tilka	3 tilka	5 tilka	5—6 tilka	
55. Veronalum Veronaal	0,03	0,075	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	

TILGATABEL

Tilkade arv vedelate ravimpreparaatide 1 g-s ja 1 ml-s 20° juures
loetult normaaltilgutajaga

(NSV Liidu Riikliku VIII Farmakopöa 1952. a. väljaande järgi)

Preparaadi nimetus	Tilkade arv 1 grammis	Tilkade arv 1 milliliitris
1. Acidum hydrochloricum dilutum	20	21
2. Adonilenum	35	34
3. Adonisidum	33	32
4. Adrenalinum hydrochloricum solutum (1 : 1000)	25	25
5. Aether purus	85	61
6. Amylium nitrosum	68	59
7. Aqua Amygdalarum amararum	40	38
8. „ destillata	20	20
9. Chloroformium	56	83
10. Cordiaminum	29	29
11. Convasidum	37	36
12. Extractum Frangulae fluidum	42	44
13. „ Secalis cornuti fluidum	35	37
14. Gitalenum	37	36
15. Infusum Adonidis vernalis concentratum (1 : 2)	39	40
16. Liquor ammonii anisatus	58	50
17. Liquor kalii arsenicosi	31	31
18. Oleum Menthae piperitae	51	47
19. Phenolum purum liquefactum	36	38
20. Solutio nitroglycerini 1%	64	52
21. Spiritus vini 95°	65	52
22. „ „ 90°	62	51
23. „ „ 70°	56	50
24. „ „ 40°	47	45
25. Tinctura Aconiti	54	49
26. „ Belladonnae	48	46
27. „ Cannabis indicae	61	51
28. „ Convallariae majalis	46	44
29. „ Digitalis	47	45
30. „ jodi 10%	63	56
31. „ jodi 5%	49	48
32. „ opii benzoica	54	49
33. „ opii simplex	44	43
34. „ Strophanthi	59	53
35. „ Strychni	56	50
36. „ Valerianae simplex	56	50

RAVIMID, MIDA RAKENDATAKSE ABIANDMISEKS ÄGEDATE MÜRGISTUSTE PUHUL

(NSV Liidu Riikliku VIII Farmakopöa 1952. a. väljaande järgi)

Ravimid	Ravimvormid, annused, tarvitamisviisid ja otstarve
Adonileen	<i>Adonilenum</i> — suu kaudu 2—3 korda päevas 20—25 tilka. Südamevahend.
Adrenaliinhüdrokloriid	<i>Sol. adrenalini hydrochlorici</i> 0,1% — nahaalusi 0,5—1 ml. Veresooni ahendav.
Amüülinitrit	<i>Amylium nitrosum</i> — 3—5 tilka taskurätile või vatile sissehingamiseks. Veresooni laiendav.
Anestesiin	<i>Anaesthesinum pulveratum</i> 0,5 g — puistepulber haavale. Paikselt valutustav.
Apomorfiinhüdrokloriid	<i>Sol. apomorphini</i> 0,5% — nahaalusi 1 ml. Oksendamisvahend.
Askorbiinhape	<i>Acidum ascorbinicum</i> — suu kaudu 0,05—0,25 g.
Atropiinsulfaat	<i>Sol. Atropini sulfurici</i> 0,1% nahaalusi 0,5—1 ml.
Barbamüül	<i>Barbamylum</i> — suu kaudu 0,1—0,5 g; 10% — lihasesisesi või nahaalusi 5 ml. Krampide lõpetamiseks ja uinutina.
Diginorm	<i>Diginormum</i> — suu kaudu 3 korda päevas à 20 tilka. Südamevahend.
Dikaiin	<i>Sol. dicaini</i> 2% — 2—3 tilka silmadesse ja nina, kurgu limaskestadele määrimiseks. Paikselt valutustav.
Dioniin	<i>Dioninum</i> — suu kaudu 0,01—0,03 g. Kõhavaigistaja.
Diuretiin	<i>Diuretinum</i> — suu kaudu 0,5—1 g. Diureetiline.
Glükoos	<i>Sol. glucosi isotonicæ</i> (s.o. 5% lahus) — nahaalusi 500 ml või veenisesesi 100 ml 40% (hüpertooniline) lahus — 10—20 ml veenisesesi.
Heksenaal	<i>Hexenalum in ampullis</i> à 0,5 või 1 g, valmistada 10% lahus, veenisesesi 10 ml või 4% — klistiiriks (25 ml). Krampide lõpetamiseks.
Kaaliumatsetaat	<i>Liquor kalii acetici</i> — suu kaudu à 1—3 ml korraga mikstuurides. Diureetiline.
Kaaliumpermanganaat	<i>Sol. kalii hypermanganici</i> 1:1000 — maoloputuseks; 0,4% suu kaudu teelusikaviisi 10—15 minuti järel, 1% — nahaalusi 2—3 ml (ussi hammustuse puhul). Neutraliseerib mürke (oksüdeerib).
Kaltsiumkloriid	<i>Sol. calcii chlorati</i> 5—10% — veenisesesi 10—20 ml
Kamper	<i>Oleum camphoræ</i> 20% — nahaalusi 1—2 ml. Tugevdab südametegevust ja hingamist.
Karbogeen	<i>Carbogenum</i> — süsihappe (5—7%) segu hapnikuga (100%-ni) sissehingamiseks. Erutab hingamist ja parandab vereringet.

Ravimid	Ravimvormid, annused, tarvitamisviisid ja otstarve
Kloraalhüdraat	<i>Chloralum hydratum</i> — suu kaudu: lahustada 4 g 50 ml-s vees, lisada <i>Mucilago Gummi arabici</i> 15 ml; sisse võtta supilusikaviisi poole tunni—tunni järel krampide lakkamiseni. 1,5 g kloraalhüdraati lahustada 30 ml-s vees, lahusele lisada <i>Mucilago Gummi arabici</i> ja juhtida klistiirina pärasoolde. Krampide lakkamiseni.
Kodeiin, puhas	<i>Codeinum purum</i> — suu kaudu 0,02—0,05 g 2—3 korda päevas. Vaigistab kõha.
Kofeiin-naatriumbensoaat	<i>Sol. coffeini natrio-benzoici</i> 10—20% — nahaalusi 1 ml. Tugevdab hingamist, parandab vereringet.
Kokaiinhüdrokloriid	<i>Sol. cocaini hydrochlorici</i> 1—2% — silmadesse 2—3 tilka ja nina, kurgu jt. limaskestadele määrimiseks. Paikselt anesteseeriv.
Korazool	<i>Sol. corazoli</i> 10% — nahaalusi 1—2 ml. Erutab kesknärvisüsteemi, tugevdab hingamist ja parandab vereringet.
Kordiamiin	<i>Cordiaminum</i> — nahaalusi 0,5—1 ml. Erutab kesknärvisüsteemi, tugevdab hingamist ja parandab vereringet.
Limakeedised	<i>Mucilago Salep</i> või <i>Mucilago Gummi arabici</i> — suu kaudu 15—20 ml, lahendatult veega (200 ml) ja 15—20 g suhkru lisandiga. Sisse võtta supilusikaviisi 5—10 minuti järel. Kattev aine.
Lobeliinhüdrokloriid	<i>Sol. lobelini hydrochlorici</i> 1% veenisisesi 0,5—1 ml. Erutab hingamist.
Lubjavesi	<i>Aqua calcis</i> — suu kaudu 5—10 minuti järel 1 supilusikatäis; 100 ml lubjavett lahendatult veega 1 liitrini — maoloputuseks. Muudab mürgid kahjutuks.
Magneesium, põletatud	<i>Magnesia usta</i> — suu kaudu 30—50 g klaasis vees üheks korraks või korduvalt 1—2 tunni järel. 50—70 g põletatud magneesiumi suspensioon 600—800 ml vees maoloputuseks. Muudab mürgid kahjutuks ja adsorbeerib neid.
Magneesiumsulfaat	<i>Magnesium sulfuricum</i> — suu kaudu 20—30 g korraga lahustatult 1—2 klaasis vees või juhtida sondi kaudu lahusega maku, Lahtisti.
Metüleensinine	<i>Sol. methyleni coerulei</i> 1% — veenisisesi 50—100 ml. Muudab mürgid kahjutuks (sinihape).
Morfiinhüdrokloriid	<i>Sol. morphini hydrochlorici</i> 1% — nahaalusi 1—2 ml. Valustav.
Naatriumbikarbonaat	<i>Sol. natrii bicarbonici</i> 2—2,5% suu kaudu supilusikaviisi; 1—2% — maoloputuseks; 2—4% — veenisisesi 500—1000 ml. Muudab mürgid kahjutuks.
Naatriumkloriid	<i>Sol. natrii chlorati</i> 0,85% (<i>isotonica</i>) — nahaalusi või veenisisesi 1—2 l. Muudab mürgid kahjutuks, asendab aadrilaskmisel eemaldatud verd. <i>Sol. natrii chlorati</i> 2—5% — maoloputuseks või teelusikaviisi joomiseks iga 10 minuu järel (hõbenitraatmürgistuse puhul).

Ravimid	Ravimvormid, annused, tarvitamisviisid ja otstarve
Naatriumsulfaat	<i>Natrium sulfuricum</i> — suu kaudu 20—30 g, lahustada 1—2 klaasis vees ja korraga ära juua. Lahusti.
Naatriumtiosulfaat	<i>Sol. natrii sulfurici</i> 1% — maoloputuseks; 3% veenisisesi — 10 ml (baarium-mürgistuse puhul). <i>Sol. natrii hyposulfurosi</i> 0,5% — maoloputuseks 700—1000 ml; 5% — nahaalusi 100 ml; 10—30% — veenisisesi 20—50 ml. Muudab mürgid kahjutuks.
Nitroglütseriin	<i>Nitroglycerinum solutum</i> — suu kaudu — 2—3 tilka. Veresooni laiendav.
Omnopoon	<i>Sol. omnoponi</i> 2% — nahaalusi 1—2 ml. Valutustav.
Oopium	<i>Opium pulveratum</i> — suu kaudu 0,02—0,05 g; 3—4 korda päevas. <i>Tinctura Opii simplex</i> — suu kaudu 6—12 tilka 3 korda päevas. Valutustav ja likvideerib kõhulahtisuse.
Papaveriinhydrokloriid	<i>Sol. papaverini hydrochlorici</i> 2% — nahaalusi 1—2 ml. Kõrvaldab veresoonte spasmid ja soolevoolmed.
Strofantus	<i>Tinctura Strophanthi</i> — suu kaudu 3—5 tilka. <i>Sol. Strophanthini</i> 0,1% — veenisisesi 0,25—0,5 ml. Südamevahend.
Strühniinnitraad	<i>Sol. strychnini nitrici</i> 0,1% — nahaalusi 0,5—1 ml. Erutab kesknärvisüsteemi, tugevdab südametegevust, tõstab organismi vastupanu alkoholimürgistusel.
Süsi, aktiveeritud	<i>Carbo activatus</i> — suu kaudu 1 supilusikatäie aktiveeritud söe suspensioon 2 klaasis vees; maoloputuseks 1 supilusikatäie söe suspensioon 500 ml vees. Adsorbeerib mürke.
Tanniin	<i>Sol. acidi tannici</i> 2% — suu kaudu 100—200 ml; sisse võtta supilusikaviisi iga 5 minuti järel. — 0,2% — maoloputuseks. Muudab mürgid kahjutuks (alkaloidid ja raskemetallid).
Tsütitoon	<i>Cytitonum</i> — veenisisesi 0,5—1 ml. Erutab hingamist ja tõstab vererõhku.
Valguvesi	Üks munavalge loksutada segi 1 klaasis vees. Kattev aine.
Vasksulfaat	<i>Sol. cupri sulfurici</i> 1% — suu kaudu supilusikaviisi iga 5 minuti järel kuni oksendamiseni. Oksendamisvahend.
Vastumürk, arseeni	<i>Antidotum arsenici</i> — suu kaudu supilusikaviisi iga 5 minuti järel kuni oksendamise lakkamiseni (enne tarvitamist loksutada). Neutraliseerib mürke.
Vastumürk, metallide	<i>Antidotum metallorum</i> — suu kaudu 50—100 ml või 200 ml lahjendatult 800 ml veega maoloputuseks. Neutraliseerib mürke (raskemetallid, arseen).
Veresool, kollane	<i>Sol. kalii ferrocyanati</i> 0,1% — maoloputuseks 600—1000 ml. Muudab mürgid kahjutuks (vask).
Äädikaklistiirid	1 osa äädikat (6% äädikhape) ja 3 osa vett (1—2 klaasi).

VASTUMÜRKIDE JA MÜRGISTUSTEL TARVITATAVATE VAHENDITE TABEL

(NSV Liidu Riikliku VIII Farmakopöa 1952. a. väljaande järgi)

Preparaadi nimetus	Abi mürgistusel
Adonileen, adonisiid	vt. Sõrmkübar
Adoonis	vt. Sõrmkübar
Adrenaliin, efedriin	Täielik rahu, ettevaatlikult lasta sisse hingata amüülnitritit (tilgutades 3—5 tilka vatile või taskurätile). 0,5—0,8 g kloraalhüdraati klistiirina. Nahaalusi — 1—2 ml 2% papaveriinhüdrokloriidilahust. Aadrilaskmine. Hapniku sissehingamine.
Aeroon	vt. Atropiin
Akaatsia kollane — <i>Cytisus laburnum</i> , tsütisiin	Maoloputus söe-vegisuspensiooniga. Suu kaudu soollahtisti. Krampide korral — seepidiselts kloraalhüdraat või barbamüül. Keha soojendamine. Täielik rahu.
Akonitiin	vt. Kääking.
Akrihiin	Maoloputus kaaliumpermanganaadilahusega 1:1000 või 0,2—0,5% tanniinilahusega. Suu kaudu soollahtisti. Rikkalikult leelisest jooki. Kõhule kehasoojendaja. Nahaalusi — kofeiin, kamper. Pimendatud tuba. Voodirežiim.
Akritsiid	vt. Rivanool
Alkohol, etüül-, amüül-, metüül-, puskaröli	Oksendamisvahend — apomorfiin, vasksulfaat või tsinksulfaat. Maoloputus sooja veega. Näopunetusel — pea kõrge asend, jää. Soe vann koos külma dušiga. Klistiir äädikaga või naatriumkloriidiga. Jäsemetele sinepiplaastrid.
Ammoniaak	Nuuskpiirituse sissehingamine (ettevaatlikult näo põletamise vältimiseks). Nahaalusi — kofeiin, kamper, strühniin. Suu kaudu — nuuskpiiritus (10 tilgani) veega. Aadrilaskmine. Hapniku või karbogeeni sissehingamine. Erutusel — morfiin, kloraalhüdraat või barbamüül. Voodirežiim.
Amügdaliin	vt. Nuuskpiiritus
Amüülnitrit	vt. Sinihape
Anabasiin	Värske öhk. Hingamise nõrgenemisel või seisakul — kunstlik hingamine, hapniku või karbogeeni sissehingamine. Nahaalusi — kofeiin, kamper. Ägeda methemoglobineemia korral — aadrilaskmine ja vereülekanne. Veenisisese — glükoos. Voodirežiim.
	Sissevõtmisel: oksendamisvahend — apomorfiin või vasksulfaat. Maoloputus söe-vegisuspensiooniga. Suu kaudu — soollahtisti. Hapniku või karbogeeni sissehingamine. Nahaalusi või veenisese — glükoos. Krampide korral — suu kaudu kloraalhüdraat või barbamüül. Täielik rahu.
	Nahale sattumisel eemaldada viivitamata riietus ja hoolikalt pesta kahjustatud kohta sidrun- või

Preparaadi nimetus	Abi mürgistusel
Analgiin	äädikhappega hapestatud sooja veega. Hapniku või karbogeeni sissehingamine. Nahaalusi või veenisisesi — glükoos. Krampide korral — suu kaudu kloraalhüdraat või barbamüül. Täielik rahu.
Aniliin (aniliinvärvid, antifebriin, fenatsetiin, nitrobensool, toluidiin).	vt. Antipüriin . Sissehingamisel või imendumisel naha kaudu — värske õhk, hapniku või karbogeeni sissehingamine. Kunstlik hingamine. Ägeda methemoglobineemia korral — aadrilaskmine koos järgneva vereülekandegaga. Veenisisesi — glükoos, adrenaliin. Nahaalusi — kofeiin, kamper, korazool. Sissevõtmisel: oksendamisvahend — apomorfiin, vasksulfaat, Maoloputus. Soollahtisti. Muus osas abi sama mis mürgistusel sissehingamisel. Vastunäidustatud on seepidistelt: rasvad, rasvolid piim, alkohol, eeter.
Aniliinvärvid	vt. Aniliin
Antifebriin	vt. Aniliin
Antimon ja tema preparaadid	vt. Okseviinakivi
Antipüriin , analgiin, päramidoon	Oksendamisvahend — apomorfiin. Maoloputus söe-veesisuspensiooniga. Suu kaudu — soollahtisti. Nahaalusi — kofeiin, kamper, isotooniline naatriumkloriidilahus. Krampide korral — suu kaudu kloraalhüdraat. Keha soojendamine. Vältida rasvu ja alkoholi.
Apomorfiin	Säilitada oksendamist, andes sisse suurtes kogustes sooja piima või limakeedist. Maoloputus. Suu kaudu — söe-veesisuspensioon, kange tee või kohvi, supilusikaviisi 2% tanniinilahust. Nahaalusi — kofeiin, kamper, strähniin. Voodirežiim.
Arekoliin	vt. Muskariin
Arreanaal	vt. Arseen
Arseen , valge arseen või arseenishape (tema anhüdriid), arseenhape ja nende soolad. Fauleri lahus, naatriumkakodülaad, arreanaal, prantsuse (pariisi) roheline, atoksüül.	Rikkalik maoloputus söe-veesisuspensiooniga, põletatud magneesiumi suspensiooniga (20,0—1 liitrile veele). Suu kaudu — anda korduvalt 5 minuti järel 1 teelusikaviisi arseeni vastumürki <i>Antidotum arsenici</i> või metallide vastumürki <i>Antidotum metallorum</i> ja põletatud magneesiumi. Soollahtistid. Piim, õliemulsioonid. Keha soojendamine, kõhule kehasoojendajad. Nahaalusi — kamper, kofeiin, adrenaliin. Veenisisesi — glükoos, naatriumtisulfaat.
Arseenvesinik	Veenisisesi — adrenaliin, isotoonilised glükoosi- ja naatriumkloriidilahused. Nahaalusi kofeiin või korazool. Maoloputus söe-veesisuspensiooniga. Keha soojendamine. Rahu. Voodirežiim.
Aspiriin	vt. Salitsüülhape
Atoksüül	vt. Arseen

Preparaadi nimetus	Abi mürgistusel
Atropiin , karumustikas — <i>Atropa Belladonna</i> , põõrirohi — <i>Hyoscyamus niger</i> , okasõnn — <i>Datura stramonium</i> , hüostüamiin, homatropiin, platüfülliin, aeroon.	Maoloputus sõe-veisisuspensiooniga või kaaliumpermanganaadilahusega 1 : 1000 järgneva soollahtisti manustamisega sondi kaudu. Rahu. Teravalt väljendatud erutuse korral — klistiir kloraalhüdraidiga. Nahaalusi — 1 ml 1% morfiinhüdrokloriidilahust, 1 ml 1% pilokarpiinhüdrokloriidilahust korduvalt kuni kuivatunde kadumiseni suus. Pea peale asetada külma. Ägeda nõrkuse korral — kofeiin, kamper. Voodirežiim.
Atsesaal	vt. Salitsüülhape
Atsetüülkoliinkloriid	vt. Muskariin
Baarium ja tema ühendid — lahustuvad soolad, baariumhüdrosüüd.	Maoloputus 1% naatriumsulfaadilahusega. Suu kaudu — naatriumsulfaadilahus (20,0—200,0) supilusikaviisi iga 5 minuti järel. Veenisisi — 10 ml 3% naatriumsulfaadilahust. Nahaalusi — kamper, kofeiin, kordiamiin. Tahhükardia korral — ravimküünlad 0,2 g hiniiniga.
Belladonna	vt. Atropiin
Bensiin	vt. Bensool
Bensool , bensiin, petrooleum	Mürgistusel aurudega: värske õhk, kunstlik hingamine, hapniku või karbogeeni sissehingamine. Nahaalusi — kofeiin, kamper. Keha soojustamine. Mürgistusel suu kaudu, peale eelpoolnimetatute, oksendamisevahend — apomorfiin. Maoloputus sõe-veisisuspensiooniga. Riitsinusöli. Suu kaudu — must kohv, kuum piim.
Bertolee sool	Maoloputus sõe-veisisuspensiooniga koos järgneva soollahtisti andmisega. Rikkalik leelisest jookide või 0,5—1% naatriumbikarbonaadilahuse joomine. Vereülekanne peale eelnevat rikkalikku aadrilaskmist (500—600 ml). Veenisisi — korduvalt 10 ml 20% naatriumhüposulfitilahust. Isotoonilise naatriumkloriidi- või glükoosilahuse süstimine. Kollapsi korral — nahaalusi kofeiin, kamper. Vastunäidustatud on happed, sidrunid, alkohol.
Beetanaftool	vt. Naftaliin
Boorhape	Oksendamisevahend — apomorfiin. Maoloputus sõe-veisisuspensiooniga. Suu kaudu — põletatud magneesium, lubjavesi, valguvesi, piim. Sollahtisti. Nahaalusi — isotooniline naatriumkloriidilahus.
Bromuraal	vt. Veronaal
Broom , broomvesi	Mürgistusel aurudega: värske õhk. Hingata sisse veeauru väheste nuuskpiirituse lisandiga. Soodalahuse inhalatsioon. Hapnik. Mürgistusel suu kaudu: maoloputus 0,5% naatriumtiosulfaadilahusega. Suu kaudu — valguvesi, leelised joogid, põletatud magneesium veega, tärgliskliister, piim, jäätükikesed. Välispidiselt — puistata põletatud kohad üle anestesiini ja talgi seguga ning määrada lanoliiniga.
Digaleen-neo	vt. Sõrmkübar
Diginorm	vt. Sõrmkübar

Preparaadi nimetus	Abi mürgistusel
Digitaalis	vt. Sõrmkübar
Dikaiin	vt. Kokaiin
Diklooramiin	vt. Kloor
Dioniin	vt. Morfiin
Diuretiin	vt. Kofeiin
Eeter	Värske õhk. Hapniku või karbogeeni sissehingamine. Kunstlik hingamine. Nahaalusi — strühniin, tsütiitoon või lobeliin, kofeiin, kamper, adrenaliin. Isotooniline glükoosi- või naatriumkloriidilahus. Hingamise aeglustamisel anda nuusutada nuuskiiritust.
Efedriin	vt. Adrenaliin
Elargool	vt. Flavargiin
Elavhõbe	vt. Sublimaat
Emetiin	vt. Ipekakuanja
Ergotoksiin	vt. Tungaltera
Eseriin	vt. Füsostigmiin
Euforbium	vt. Kolokvint
Fenamiin	Aadrilaskmine järgneva isotoonilise naatriumkloriidilahuse süstimisega. Suu kaudu — naatriumbikarbonaat. Veenisisesi — 20 ml 40% glükoosilahust. Nahaalusi — omnopoon. Kloraalhüdraat või barbamüül seepidisel või klistiiris. Täielik rahu.
Fenatsetiin	vt. Aniliin
Fenool , karboolhape, kreosoolid, lüsool, kreoliin, parakloorfenool, pürokatehiin, resortsiin, hüdrokiinon, pürogallool, kreosoot, guajakool, heksüülresortsiin.	Maoloputus söe-veesisuspensiooniga, põletatud magneesiumiga või naatriumtioosulfaadiga (30,0 — 1 l veele) fenooli lõhna kadumiseni. Soollahtisti. Suu kaudu — lubjavesi või põletatud magneesium (20,0—200,0) ä 1 supilusikatäis 5 minuti järel, jäätükikesed, limajook, valguvesi. Nahaalusi — kofeiin, kamper või korazool. Keha soojendamine. Soodalahuse inhalatsioon. Häälepilu ahenemisel — trahheotoomia. Intubatsioon. Vastunäidustatud on seepidiselt: koor, piim, või, rasvad, alkohol.
Flavargiin , kollargool, elargool, protargool.	Märkus. Vedel karboolhape eemaldatakse kehapiinnalt viivitamatult, pestes teda ära alkoholiga, vaseliiniga või mingisuguse rasvõliga.
Fluorvesinikgaas	Mürgistuse korral peale preparaadi sissevõtmist või lihasesisest süstimist viivitamatult glükoos nahaalusi või veenisisesi. Nahaalusi kofeiin, kamper, korazool, tsütiitoon või lobeliin. Kunstlik hingamine karbogeeni sissehingamisega.
	Veenisisesi — kaltsiumkloriid ja glükoos. Nahaalusi — kofeiin, korazool. Kunstlik hingamine. Karbogeeni sissehingamine.

Preparaadi nimetus	Abi mürgistusel
Formaliin (formaldehüüd)	Aurude sissehingamisel — värske õhk. Hingata sisse nuuskpiirituse lisandiga veeaurusid. Nahaalusi kofeiin, kamper, tsütitoon või lobeliin. Sissevõtmisel — maoloputus lahjendatud 3% naatrium-atsetaadi- või -karbonaadilahusega. Soollahtisti, sügavad klistiirid. Suu kaudu korduvalt à 20 tilka ammoniaak-aniisitolku või supilusikaviisi 15% ammoniumatsetaadilahust. Iga 2 tunni järel 1,0—2,0 karbamiidi. Valguvesi, munavalge, piim. Nahaalusi — kofeiin, kamper.
Fosfor	Sagedased korduvad maoloputused 0,1—0,5% vask-sulfaadi- või 0,04% kaaliumpermanganaadilahusega. Suu kaudu — iga 5 minuti järel teelusikaviisi 1% vasksulfaadilahust kuni oksendamiseni või 0,1% kaaliumpermanganaadilahust supilusikaviisi 15 minuti järel. Limakeedised, leelised joo-gid. Soollahtisti. Voodirežiim. Märkus. Fosforitükikeste sattumisel nahale pesta need ära veega ja asetada põletatud kohtadele 5% vasksulfaadi- või 5% naatriumbikarbonaadilahusega immutatud mähis, vahetades neid mähiseid vaheldumisi valude lõppemiseni. Vastunäidustatud on: rasvad, õlid, piim, munad.
Füsostigmiin. Proseriin.	Eseriin. Nahaalusi — viivitamatult atropiin. Oksendamisvahend — apomorfiin. Maoloputus kaaliumpermanganaadilahusega (1 : 1000), söe-veesisuspensiooniga, tanniinilahusega (1 : 500). Suu kaudu — soollahtisti, süsi. Nahaalusi — kamper, tsütitoon või lobeliin, kofeiin. Kunstlik hingamine. Kram-pide korral — ettevaatlik kloroformi sissehinga-mine.
Gaasid, ohtlikud: vesigaas, generaatorigaas.	Abi sama, mis on mürgistusel vingugaasiga. vt. Vingugaas
Gaasid, plahvatus-	Värske õhk, kunstlik hingamine koos hapniku või karbogeeni-ga. Nahaalusi — tsütitoon või lobeliin, kamper või korazool, kofeiin. Suu kaudu — kange tee või kohvi. Rahu. Keha soojendamine.
Gitaleen	vt. Sõrmkübar.
Guajakool	vt. Fenool.
Happed	Mürgistusel suu kaudu on vastunäidustatud oksendamisvahendid ja leeliskarbonaatide sissevõtmine. Võimalikult varajane ja rikkalik maoloputus vee-ga. Suu kaudu — põletatud magneesium (20,0—200,0), lubjapiim, munavalk, limakeedised. Põleta-tud suu ja kurgu limaskestast määrada 2% ko-kaiini- või dikaiinilahusega. Nahaalusi — morfiin, kofeiin, kamper, isotooniline naatriumkloriidilahus. Veenisisese — 10 ml 10% kaltsiumkloriidilahust. Kõhule asetada jääd. Inhalatsioon soodalahusega. Neelata jäätükikesi. Happe sattumisel nahale eemal-dada see suure hulga veega või vee ja seebiga, või lubjaveega, või nõrga (0,5—1%) leelisela-husega pesemise teel.

Preparaadi nimetus	Abi mürgistusel
Kroomhape Lämmastikhape Oblikhape	vt. Väävelhape vt. Väävelhape Peale hapete all mainitu (vt. Happed) tuleb viivitamata sisse anda 0,6—1,0 kaltsiumkloriidi lahustatult pooles klaasis vees; juua lubjapiima, lubjaveet, kriidi-vesisuspensiooni. Suu kaudu — kaaliumatsetaati, diuretiini. Veenisisi — glükoos, isotooniline naatriumkloriidilahus. Nahaalusi — kofeiin, kamper, korazool.
Pikriinhape	Peale hapete all mainitu (vt. Happed), suu kaudu — soollahtisti. Veenisisi — glükoos.
Soolhape Triklooräädikhape Väävelhape ja sipelghape	vt. Happed. vt. Väävelhape Puhta kontsentreeritud väävelhappe sattumisel nahale tuleb see viivitamatult ära pesta suure hulga külma veega. Põletatud suu ja kurgu limaskestast määrada 2% kokaiini- või dikaiinilahusega.
Äädikhape ja äädikaessents. Hasiš	vt. Väävelhape Maoloputus kaaliumpermanganaadilahusega 1 : 1000, sooja keedusoolalahusega või söe-vesisuspensiooniga. Nahaalusi — kofeiin või korazool, tsütiin või lobeliin. Soojad vannid pea ülevaalsega külma veega. Kunstlik hingamine koos hapniku või karbogeeni sissehingamisega. Voodirežiim.
Heksüülresortsiin Heroiin	vt. Fenool vt. Morfiin
Hiniin	Maoloputus söe-vesisuspensiooniga või 0,2—0,5% tanniinilahusega. Suu kaudu riitsinusõli. Nahaalusi — kofeiin, kamper. Soojad vannid külmade ülevaalsega. Krampide korral — kloraalhüdraat. Veresoonte spasmi korral — sisse hingata amüülnitritit.
Hispaania kärbes. <i>Cantharides</i> või <i>Lytta vesicatoria</i> — kantariidiin.	Rikkalik maoloputus. Oksendamisevahend — apomorfiin. Sollahtisti. Suu kaudu — limakeedised, valguvesi. Valude korral — neelata jäätükikesi. Nahaalusi — morfiin või omnopoon, kofeiin, korazool. Voodirežiim. Vastunäidustatud on seepidiselt: piim, õlid, rasvad, eeter, happed.
Histoon-tsink-insuliin Homatropiin Höbenitraat — <i>Argentum nitricum</i>	vt. Insuliin vt. Atropiin Maoloputus 2% naatriumkloriidilahusega järgneva soollahtisti andmisega. Suu kaudu — iga 5 minuti järel 1 supilusikatäis 5% naatriumkloriidilahust. Valguvesi, piim, õliemulsioonid, limakeedised. Piimklistiirid koos naatriumkloriidiga, õliklistiirid. Kõhule asetada jääd. Tugevate valude korral — morfiin. Kollapsi puhul nahaalusi — kofeiin, kamper.
Hüdrokiinon Hüostüamiin	vt. Fenool vt. Atropiin

Preparaadi nimetus	Abi mürgistusel
Insuliin , histoon-tsink-insuliin, triprotamiin-tsink-insuliin.	Kergetel juhtudel suu kaudu 20—40 g suhkrut, 200 g valget leiba; rasketel juhtudel veenisisesi 100—200 ml 10% glükoosilahust või nahaalusi 50—100 ml isotoonilist glükoosilahust; klistiirina anda 50 ml 20% glükoosilahust. Nahaalusi adrenaliini, 1 ml pituitriini.
Ipekakuanja — <i>Cephaelis ipecacuanha</i> , emetiin	Oksendamise korral — säilitada seda sooja vee ja piima joomisega. Maoloputus 0.2—0.5% tanniinilahusega või sõe-veesisuspensiooniga. Suu kaudu — limasupid, piim, opium, jäätükikesed, rohke joomine, soodavesi või selters. Nahaalusi — kofeiin, kamper, glükoos.
Jodoform	Viivitamatult kõrvaldada jodoformside, tampoon või puistepulber. Veenisisesi — 50—100 ml 5—20% naatriumtisulfaadilahust. Juua leeliseseid jooke.
Jood , joodtinktuur, Lugoli lahus.	Sissevõtmisel: maoloputus 0,5% naatriumtisulfaadilahusega või juua klaasiviisi (2—3) 5% naatriumtisulfaadilahust, vedelat, tärklise- või jahukeedist, piima, valguvett, limakeediseid. Suu kaudu — 20—30 g sõe-veesisuspensiooni, 20 g põletatud magneesiumi. Juua leeliseseid jooke. Nahaalusi — isotoonilist glükoosilahust ja 5% naatriumsulfaadilahust. Mürgistusel joodiaurudega: värske õhk, 5% naatriumtisulfaadilahuse või 2% naatriumbikarbonaadi pihustatud lahuse inhalatsioonid. Korduvalt pesta ja loputada nina, suud ja kurku 2% naatriumbikarbonaadilahusega. Valude korral silmades pesta neid puhta veega ja tilgutada kummagisse silma 2—3 tilka 2% kokaiinhüdrokloriidi- või dikaiinilahust.
Juustumürk	vt. Ptomaiinid.
Kaaliumhüdroksüüd	vt. Sööbeleelised
Kaaliumsalpeeter , potas.	Maoloputus. Soollahtisti. Juua limakeediseid, piima, leeliseseid jooke. Valude korral maos — neelata jäätükikesi; nahaalusi — morfiin või omnopoon, kofeiin, kamper või korazool. Voodirežiim, suu kaudu — diuretiin.
Kaaliumtsüaniid	vt. Sinihape
Kalamürk	vt. Ptomaiinid
Kalomel	vt. Sublimaat
Kamper	Oksendamisvahend. Maoloputus. Suu kaudu — soollahtisti. Krampide korral — seepidiselt või klistiirina kloraalhüdraat või barbamüül. Kooma korral — kofeiin. Keha hõõrumine, jäsemetele sinapiplaastrid. Rahu, voodirežiim. Vältida rasvu ja alkohoolseid jooke.

Preparaadi nimetus	Abi mürgistusel
Kantaridiin	vt. Hispaania kärbes
Karbokoliin	vt. Muskariin
Karboolhape	vt. Fenool
Karumustikas	vt. Atropiin
Kasakakadaka eeterlik õli.	vt. Kasakakadakamarjad
Kasakakadakamarjad — <i>Juniperus Sabina</i> , k. ka- daka eeterlik õli.	Oksendamisvahend — apomorfiin, vasksulfaat või tsinksulfaat. Maoloputus. Sügavad klistiirid. Sool- lahtistid. Limajookide rikkalik joomine. Rasvu mitte anda. Diureetilised vahendid. Nahaalusi — kofeiin, kamper või korazool, glükoos, isotooniline naatriumkloriidilahus.
Kinaver	vt. Sublimaas
Kloor, kloorvesi, pleek- ehk kloorlubi, naatrium- hüpokloriid, žavelli vesi, kloorvesinik, klooramiin, diklooramiin B, kloor- atsiid, pantotsiid.	Mürgistuse korral sissehingamise teel — evakueeri- mine mürgistatud atmosfäärist lamavas asendis. Soojendamine. Veenisisesi — 5—10 ml 10% kalt- siumkloriidilahust. Aadrilaskmine (400—600 ml) järgneva 100 ml 40% glükoosilahuse süstimisega veenisisesi. Hapniku sissehingamine. Nahaalusi — kamper, kofeiin. Silmade ärritusel — pesemine 2% soodalahusega. Sisse hingata sooja veeauru nuuskiirituse lisandiga. Südamenõrkuse korral — suu kaudu strofantusetinktuur, strofantiin veenisi- sesi. Täielik rahu. Voodirežiim. Sissevõtmisel: maoloputus 2% naatriumtiosulfaadilahusega ja edaspidiselt veega. Suu kaudu — 5—15 tilka nuuskiiritust veega, valguvesi, soodalahus, piim. Oksendamisvahend — apomorfiin. Täielik rahu, voodirežiim.
Klooraalhüdraat	Korduv maoloputus. Soollahtisti. Korduvalt sügavad klistiirid. Suu kaudu — kange tee või kohvi. Nahaalusi — kofeiin, kamper või korazool, strüh- niin, tsütitoon või lobeliin. Veenisisesi — glükoos adrenaliiniga. Kunstlik hingamine. Hapniku või karbogeeni sissehingamine. Voodirežiim. Keha soojendamine.
Klooramiin	vt. Kloor.
Klooratsiid	vt. Kloor
Kloorlubi	vt. Kloor
Kloorvesi	vt. Kloor
Klooretoon	vt. Kloroform
Klooretüül	vt. Kloroform
Kloroform, klooretüül, klooretoon.	Mürgistuse korral sissehingamise teel — lõpetada narkoos. Värske õhk. Kunstlik hingamine koos karbogeeni sissehingamisega. Veenisisesi — 2 l keha temperatuurini soojendatud isotoonilist naatriumkloriidilahust. Soojendamine. Naha- alusi — kofeiin, kamper. Südamemassaaž. Sissevõtmisel — maoloputus. Soollahtisti. Kunstlik hingamine. Nahaalusi — atropiin, adrenaliin, kofeiin, kamper. Veenisisesi — 20 ml 40% glükoos- ilahust, samaaegselt korduvalt 5 TŮ insuliini.

Preparaadi nimetus	Abi mürgistusel
Kodeiin	vt. Morfiin
Kofeiin (kohvi, tee), diuretiin	Maoloputus 0,2% tanniinilahusega. Seespidiselt — kloraalhüdraat või barbamüül, süsi, soollahtistid. Sisse hingata amüülnitritid või suu kaudu — nitroglütseriin. Soojad vannid.
Kogrits — <i>Helvella esculenta</i> .	Oksendamisvahend — apomorfiin. Maoloputus söe-veisisuspensiooniga. Suu kaudu — riitsinusõli emulsioonina. Nahaalusi — kofeiin, kamper või korazool. Veenisisesi — glükoos, isotooniline naatriumkloriidilahus. Vastunäidustatud on seespidiselt: happed, äädikas.
Kokaiin , dikaiin, sovkaaiin, tiokaiin, novokaiin.	Sissevõtmisel — maoloputus söe-veisisuspensiooniga või kaaliumpermanganaadilahusega (1 : 1000). Suu kaudu — tanniin. Sisse hingata amüülnitritid (3—4 tilka taskurätile) või anda sisse nitroglütseriini (2—3 korda à 2—3 tilka). Erutuse ja krampe korral — 1,0—2,0 kloraalhüdraati (vältida morfiini!). Ettevaatlikult hingata sisse kloroformi. Aadrilaskmine järgneva isotoonilise naatriumkloriidilahuse süstimisega. Soojendamine. Kuum kohvi, vein. Nahaalusi — kofeiin, kamper. Kunstlik hingamine. Hapnik. Süstimise korral nahaalusi, peale eelpool mainitu, jäsme kinnisurumine ülalpool süstimise paika, kuid mitte pulsi lakkamiseni.
Kollargool	vt. Flavargiin
Kolokvindivil , <i>Fructus Colocythidis</i> , kolotsüntiin, podofülliin, euforbium.	Maoloputus. Suu kaudu — süsi, limajook, kange tee. Nahaalusi või veenisisesi — isotoonilised naatriumkloriidi- ja glükoosilahused. Suu kaudu — 4—6 korda päevas à 1 g aluselist vismutnitraati. Seespidiselt — korazool, diginorm. Voodirežiim.
Kolhitsiin , sügislilleseemned — <i>Colehicum autumnale</i> .	Maoloputus. Suu kaudu — 15—20 g sütt veisisuspensioonina. Maoloputus 0,2% tanniinilahusega või söe-veisisuspensiooniga. Soollahtisti. Kange tee, piima, limakeediste rikkalik joomine. Valude korral maos — 10 tilka oopiumitinktuuri või nahaalusi morfiini, omnopooni. Nahaalusi — kofeiin, kamper, 100 ml isotoonilist naatriumkloriidilahust. Mähkimine, keha soojendamine.
Konvasiid	vt. Sõrmkübar
Konvalleen	vt. Sõrmkübar
Koniin	vt. Surmaputk
Korazool	Maoloputus söe-veisisuspensiooniga. Seespidiselt või klistiirina — kloraalhüdraat või barbamüül. Nahaalusi — morfiin. Rahu. Veenisisesi — glükoos. Voodirežiim.
Kordiamiin	Abi sama, mis mürgistusel korazooliga, — vt. Korazool
Kreoliin	vt. Fenool
Kreosoot	vt. Fenool
Kresool	vt. Fenool

Preparaadi nimetus	Abi mürgistusel
Kroomhape	vt. Happed
Krootonõli , krootoniseemned — <i>Semen Crotonis tiglii</i> .	Krootonõli sattumisel nahale — ära pesta eetriga, bensiiniga või teiste orgaaniliste lahustitega. Allaneelatud seemned või õli eemaldada maoloputusega. Suu kaudu — limakeedised, sõe-veesisuspensioon, piim. Nahaalusi — morfiin, glükoos, isotooniline naatriumkloriidilahus. Rahu. Voodirežiim.
Kukolvaniseemned	vt. Pikrotoksiin
Käoking , <i>Aconitum napellus</i> ja teised liigid: akonitiin.	Korduv maoloputus sõe-veesisuspensiooniga, 0,2% tanniinilahusega või kaaliumpermanganaadilahusega (1 : 1000) järgneva soollahtisti andmisega. Suu kaudu sõe-veesisuspensioon, kange tee või kohvi, strofantusetinktuur. Nahaalusi — kofeiin, kamper, atropiin. Keha soojustamine, soojad vannid. Kunstlik hingamine. Hapniku või karbogeeni sissehingamine.
Kärbseseen , valge — <i>Amanita phalloides</i> , kevadine valesampinjon — <i>Amanita phalloides var vernalis</i> , valesampinjon, kollane — <i>Amanita phalloides mappa</i> .	Oksendamisvahend — apomorfiin. Maoloputus sõe-veesisuspensiooniga. Aadrilaskmine järgneva isotoonilise glükoosilahuse süstimisega. Nahaalusi — kofeiin, korazool. Kunstlik hingamine.
Lobeliin	Maoloputus sõe-veesisuspensiooniga. Seespidiselt — süsi. Veenisisi — isotooniline naatriumkloriidi- või glükoosilahus. Hingamise seisakul — kunstlik hingamine koos hapniku või karbogeeninga. Krampide korral — suu kaudu kloraalhüdraat või barbamüül. Täielik rahu.
Loorberkirsivesi	vt. Sinihape
Lubi , kustutamata	Võimalikult varajane ettevaatlik maoloputus äädikhappega hapestatud veega. Suu kaudu — 1% sidrun- või äädikhappelahus, piim, munavalk. Nahaalusi — kofeiin, kamper.
Lugoli lahus	vt. Jood
Lumiinaal	vt. Veronaal
Lämmastikalahapend	Kestev kunstlik hingamine, hapniku või karbogeeni sissehingamine. Veenisisi — glükoos. Nahaalusi — tsütiit või lobeliin, kofeiin või korazool, isotooniline naatriumkloriidilahus.
Lämmastikhape	vt. Happed
Lüsool	vt. Fenool
Maikelluke	vt. Sõrmkübar
Malüül	vt. Veronaal
Medinaal	vt. Veronaal
Merkusaal	vt. Sublimaalt
Metüülsaltsülaat	vt. Salitsüülhape
Monosept	vt. Sublimaalt

Preparaadi nimetus	Abi mürgistusel
Morfiin , tema soolad, kodeiin, nartseiin, dioniin, heroiin, oopium, omnoopoon.	Korduv maoloputus (ka peale süstimist nahaalusi) sõe-vevisuspensiooniga, kaaliumpermanganaadilahusega 1 : 1000, 0,2% tanniinilahusega. Nahaalusi — korduvalt atropiin. Suu kaudu — soollahtisti. Aadrilaskmine koos järgneva isotoonilise naatriumkloriidilahuse süstimisega. Hapniku või karbogeeni sissehingamine. Nahaalusi — tsütitoon või lobeliin, kofeiin, korazool või kamper. Kestev kunstlik hingamine. Soodad klistiirid äädikalahusega. Pea peale jää. Jälgida kusepõit — kateteriseerimine. Rahu. Voodirežiim. Vastunäidustatud on oksendamisvahendid.
Muskariin , kärbseseen — <i>Agaricus muscarius</i> , arekoliin, atsetüülkoliinkloriid, karbokoliin.	Nahaalusi — atropiin. Sissevõtmisel: oksendamisvahend — apomorfiin. Maoloputus sõe-vevisuspensiooniga. Soollahtistid. Sügavad klistiirid. Kollapsi nähete korral — nahaalusi kamper, kofeiin või korazool, tsütitoon või lobeliin. Hapniku või karbogeeni sissehingamine. Tugeva erutuse korral — suu kaudu või klistiirina: kloraalhüdraat või barbamüül. Pea peale külmad kompressid. Vastunäidustatud suu kaudu: happed, sidrunid, äädikas.
Mõrumandel Mõrumandlivesi Müarsenool Mürkputk — <i>Cicuta virosa</i>	vt. Sinihape vt. Sinihape vt. Novarsenool Oksendamisvahend — apomorfiin. Maoloputus sõe-vevisuspensiooniga. Suu kaudu süsi, soollahtisti. Sügavad klistiirid. Nahaalusi — kofeiin, kamper või korazool. Veenisisese glükoos. Krampide korral — eetri või kloroformi sissehingamine (ettevaatlikult!), suu kaudu — kloraalhüdraat. Hingamise seisakul — kunstlik hingamine.
Naatriumfluoriid , naatriumsilikofluoriid.	Maoloputus. Suu kaudu — soollahtisti, lubjavesi, limakeedised, valguvesi. Veenisisese kaltsiumkloriidi (korduvalt 1—2 tunni järel).
Naatriumhüdrosüüd Naatriumnitrit , nitroglütseriin.	vt. Sööbeleelised Värske õhk. Maoloputus. Soollahtistid. Ägeda methemoglobineemia korral — aadrilaskmine koos järgneva vereülekandegaga. Süstida veeni isotoonilist naatriumkloriidilahust. Veenisisese — glükoos. Kunstlik hingamine koos hapniku või karbogeeniga.
Naatriumkakodülaat Naatriumsilikofluoriid Naatriumtsüaniid Naftaliin , naftool, beeta-naftool.	vt. Arseen vt. Naatriumfluoriid vt. Sinihape Rohke maoloputus sõe-vevisuspensiooniga. Oksendamisvahend — apomorfiin. Soollahtistid. Nahaalusi — kofeiin, kamper või korazool. Veenisisese — glükoos. Vastunäidustatud on: rasvad, õlid, alkohol.
Naftool	vt. Naftaliin

Preparaadi nimetus	Abi mürgistusel
Narkolaan	Nahaalusi — kordiamiin, tsütitoon või lobeliin, kofeiin. Kunstlik hingamine koos hapniku või karbogeeni-ga. Veenisisesi — glükoos. Jämesoole-loputus.
Neosalvarsaan	vt. Novarsenool
Nikotiin	vt. Tubakas
Nitrobensool	vt. Aniliin
Nitroglütseriin	vt. Naatriumnitrit
Novarsenool, neosalvar- saan, müarsenool, sal- varsan.	Veenisisesi — 10 ml 10% kaltsiumkloriidilahust, 15—40 ml 5% naatriumtiosulfaadilahust, 20 ml 40% glükoosilahust. Pea peale asetada jää. Keha soojendamine. Suu kaudu — diuretiin. Nahaalusi — kofeiin, kamper või korazool. Krampide korral — kloraalhüdraat või barbamüül. Voodirežiim.
Novokaiin	vt. Kokaiin
Nuuskpiiritus, ammoniak.	Võimalikult varajane, ettevaatlik, rohke maoloputus (sond hästi õlitada) veega või nõrga sidrun-, viin- või äädikhappelahusega. Suu kaudu — 1% viin-, äädik- või sidrunhappelahust.
	Veenisisesi või nahaalusi — isotoonilised glükoosi- või naatriumkloriidilahused. Morfiin. Mürgistusel ammoniaagiaurudega hingata sisse sooja veeauru või pihustatud isotoonilist naatriumkloriidilahust. Kunstlik hingamine.
Oblikhape	vt. Happed
Oksõun	vt. Atropiin
Okseviinakivi ja teised antimonipreparaadid	Säilitada oksendamist sooja vee, piima, limakee- diste jootmisega. Maoloputus söe-veesisuspensioo- niga või 0,2% tanniinilahusega. Suu kaudu — piim, valguvesi, jäätükikesed, oopiumitinktuur. Nahaalusi — kofeiin, kamper. Soollahtisti. Kõhule — kehasoojendaja. Voodirežiim. Keha soojendamine.
Oopium	vt. Morfiin
Pantotsiid	vt. Kloor
Parakloorfenool	vt. Fenool
Piibeleht	vt. Sõrmkübar
Piiritus	vt. Alkohol
Pikriinhape	vt. Happed
Pikrotoksiin, kukulvan ehk kalamarjad — <i>Fructus Cocculi</i>	Oksendamisvahend — apomorfiin. Maoloputus söe- veesisuspensiooniga. Suu kaudu — süsi, sool- lahtisti. Nahaalusi — atropiin. Krampide korral — suu kaudu kloraalhüdraat või barbamüül. Aadri- laskmine koos järgneva isotoonilise glükoosi- või naatriumkloriidilahuse süstimisega veenisisesi. Kunstlik hingamine.
Pilokarpiin	Maoloputus söe-veesisuspensiooniga. Nahaalusi — atropiin korduvalt 10 minuti järel kuni 3 korda. Kofeiin, kamper. Rahu. Voodirežiim. Keha soojen- damine. Suu kaudu — diuretiin. Kunstlik hinga- mine.

Preparaadi nimetus	Abi mürgistusel
Plasmotsiid	Täielik rahu. Voodirežiim. Rohke leelisest jookide joomine. Aadrilaskmine koos järgneva isotoonilise glükoosilahuse süstimisega korduvalt. Glükoos tilkklistiirina. Suu kaudu — strofantusetinktuur või adonileen. Soojad vannid. Nahaalusi — kofeiin, kamper. Silmasümptomide korral — retrobulbaarsed atropiini süstimid. Pimendatud tuba.
Platüfülliin	vt. Atropiin.
Pleeklubi	vt. Kloor
Podofülliin	vt. Kolokvindikivi
Potas	vt. Kaaliumsalpeeter
Prantsuse roheline	vt. Arseen
Pronarkoon	vt. Veronaal
Proseriin	vt. Füsostigmiin
Protargool	vt. Flavargiin
Ptomaiinid , juustumürk, kalamürk, vorstimürk.	Lihasesisesi 50—100 ml spetsiifilist botulismivastast seerumit. Oksendamisvahend — apomorfiin või vasksulfaat. Maoloputus kaaliumpermanganaadilahusega 1:1000 või 0,2% tanniinilahusega või söe-veesisuspensiooniga. Jämesooleloputus sifooneklistiiriga. Soollahtisti. Suu kaudu — süsi, kange tee ja kohvi. Nahaalusi kofeiin, kamper või korazool. Nahaalusi või veenisisesi — glükcos. Keha soojendamine. Voodirežiim.
Puskarõli	vt. Alkoholid
Puupiiritus	vt. Alkoholid
Pöörirohi	vt. Atropiin
Põrgukivi	vt. Hõbenitraat
Püramidoon	vt. Antipüriin
Pürogallool	vt. Fenool
Pürokatehiin	vt. Fenool
Rebasekakk	vt. Strühniin
Rektoon	vt. Veronaal
Resortsiin	vt. Fenool
Riitsinusesemned	vt. Riitsiin
Riitsiin , riitsinuseseeme — <i>Semen Ricini</i>	Oksendamisvahend — apomorfiin. Maoloputus söe-veesisuspensiooniga. Suu kaudu — limakeedised. Sügavad klistiirid. Nahaalusi — kofeiin, kamper või korazool. Köhu soojendamine, tugevate valude korral — nahaalusi morfiin. Pea peale külmad kompressid. Voodirežiim.
Rivanool	Maoloputus isotoonilise naatriumkloriidilahusega. Rohke piima ja leelisest jookide joomine. Suu kaudu — diuretiin, kofeiin, kamper, tsütitoon või lobeliin. Kunstlik hingamine koos hapniku või karbogeeninga.
Sabadilla	vt. Veratriin
Sabiina (kasakakadakas)	vt. Kasakakadakamarjad

Preparaadi nimetus	Abi mürgistusel
Skopolamiin	Maoloputus 0,2% tanniinilahusega või söe-veesisuspensiooniga. Soollahtisti. Sügavad klistiirid. Hal-lutsinatsioonide korral — pea peale külma. Hin-gamise pärssimisel nahaalusi — kofeiin, tsütitoon või lobeliin. Kunstlik hingamine.
Sonbutaal Soolhape Sovkaliin Streptotsiid, punane Streptotsiid, valge Strofantus	vt. Veronaal vt. Happed vt. Kokaiin vt. Sulfamiidpreparaadid vt. Sulfamiidpreparaadid vt. Sõrmkübar
Strühniin , tema soolad, strühnose <i>Strychnos nux vomica</i> seemned ehk rebasekakk.	Enne mürgistuse sümptomide algust — teha maoloputus söe-veesisuspensiooniga ja kutsuda esile oksendamine (apomorfiin). Soollahtisti. Suu kaudu — tanniin, süsi, kloraalhüdraat (2,0—5,0) klistiirina. Veenisisesi — 50 ml 2% magneesiumsulfaadilahust; lihasesisesi — 20 ml 25% magneesiumsulfaadilahust. Krampide lekkimisel — ettevaatlik kloroformeerimine. Voodirežiim. Absoluutne rahu. Pimendatud tuba. Vastunäidustatud on hapete, hapude jookide, äädika sisseandmine.
Sublimaat , kalomel, elavhõbe, tema soolad, kinaver, monosept, merku-saal.	Mürgistuse korral suu kaudu — viivitamatult anda sisse 100 ml metallide vastumürki — <i>Andidotum metallorum</i> , peale selle 10 minuti möödumisel loputada magu sama vastumürgi vesilahusega (100 ml vastumürki 2—4 l vees). Vastumürgi puudumisel teha maoloputus söe- või põletatud magneesiumi veesisuspensiooniga. Suu kaudu — piim, valguvesi, limakeedised, suur kogus vedelikku. Nahaalusi — kofeiin, kamper või korazool. Veenisisesi — 20 ml 40% glükoosilahust või 10 ml 5% naatriumtiosulfaadilahust. Loputada suud iga tund vesinikülhapendi- või kaaliumpermanganaadilahusega. Keha soojendamine, soojad vannid, higistamine. Mürgistuse korral nahaalusi või veenisisesi süstitud mürgiga on abiandmise vahendid samad, välja arvatud metallide vastumürgi sisseandmine. Vastunäidustatud on naatriumkloriidi (keedu-soola), hapete ja igasuguste soolatud toiduainete (heeringas, sink jm.) sisseandmine.
Sulfamiidpreparaadid: streptotsiid, valge ja punane lahustuv, disulfaan, sulfazool, sulfiidiin jt.	Lõpetada preparaadi andmine. Voodirežiim. Loputada magu söe-veesisuspensiooniga. Suu kaudu — riitsinusõli, rohkesti juua, eriti leeliseid jooke. Soolade tilkklistiirid. Veenisisesi — 40% glükoosilahust isotoonilises naatriumkloriidilahuses. Nahaalusi — 5 ml 1% nikotiinhappelahust 3 korda päevas. Suu kaudu — piibelehetinktuur, diuretiin, kofeiin. Methemoglobineemia korral — veenisisesi glükoosilahust. Hapniku sissehingamine. Korduv vereülekanne. Mitte anda alkohoolseid jooke. Maksa kahjustusel — veenisisesi 40% glükoosilahust ja samaaegselt 10 ühikut insuliini. Vastunäidustatud on barbituraadid (uinutina).

Preparaadi nimetus	Abi mürgistusel
Sulfazool Sulfidiin Surmaputk — <i>Conium maculatum</i> , koniin.	vt. Sulfamiidpreparaadid vt. Sulfamiidpreparaadid Oksendamisvahend — apomorfiin. Maoloputus 0,2% tanniinilahusega või kaaliumpermanganaadilahusega 1 : 1000. Suu kaudu — süsi, soollahtisti. Nahaalusi — kofeiin, kamper, korazool, strühniin. Veenisisesi — glükoos. Värske õhk. Soe mähkimine, vannid. Vereülekanne. Kunstlik hingamine.
Sõnajalg , tema ekstrakt — <i>Extractum Filicis maris aethereum</i>	Maoloputus söe-veisuspensiooniga. Suu kaudu — soollahtisti. Nahaalusi — kofeiin, kamper või korazool. Voodirežiim. Soojad vannid, kehasoojendajad. Krampide korral — kloraalhüdraat või barbamüül. Vastunäidustatud on: piim, riitsinus-õli ja teised õlid ning rasvad.
Sõrmkübar — <i>Digitalis purpurea</i> , <i>D. ambigua</i> , <i>D. ferruginea</i> , <i>D. lanata</i> . Digaleen-neo, gitaleen, adoonis — <i>Adonis vernalis</i> , adonileen, adoni- siid, piibeleht — <i>Convallaria majalis</i> , konva- siid, konvalleen, meri- sibul — <i>Bulbus Scillae</i> , strofantuseseeme — <i>Semen Strophanthi</i> .	Täielik rahu. Voodirežiim. Maoloputus söe-veisuspensiooniga, 0,2—0,5% tanniinilahusega. Sool- lahtistid. Nahaalusi — atropiin, kamper, kofeiin. Veenisisesi — isotooniline naatriumkloriidilahus või 40% glükoosilahus. Nahale — sinepiplaastrid. Oksendamise korral — jäätükikeste neelamine. Oksendamisvahendeid mitte anda.
Sööbeleelised , sööbekaa- lium, sööbenaatrium, ammoniaak, nuuskiipiri- tus, roheline seep.	Võimalikult varajane ettevaatlik maoloputus äädik- happega hapestatud veega (sond hästi õlitada). Suu kaudu — 1% viin-, äädik- või sidrunhappe- lahust supilusikaviisi korduvalt 5 minuti järel. Limajook samade hapete lisandiga. Rikkalik piima, õliemulsioonide joomine. Valude kor- ral — neelata jäätükikesi. Inhalatsioon sooda- lahusega. Nahaalusi — morfiin või omnopoon, kofeiin, kamper või korazool. Voodirežiim. Lee- liste sattumisel nahale pesta need ära veega ja asetada põletatud kohtadele mähis 5% äädik-, sid- run- või viinhappelahusega.
Söövitusvesi	Abiandmisvahendid samad, mis mürgistusel vää- velhappega. *Vt. Väävelhape.
Sügislill — <i>Colchicum autumnale</i> , tema seemned, kolhitsiin.	vt. Kolhitsiin
Süsinikoksüüd Termopsis — <i>Thermopsis lanceolata</i> .	vt. Vingugaas Säilitada oksendamist sooja piimaga, valguveega. Maoloputus 0,2% tanniinilahusega või söe-veisuspensiooniga (korduvalt). Krampide korral — seepidiselt kloraalhüdraat. Üldise pärssimise korral — nahaalusi kofeiin, kamper või korazool, isotooniline glükoosi- või naatriumkloriidilahus. Keha soojendamine. Kunstlik hingamine. Voodi- režiim.

Preparaadi nimetus	Abi mürgistusel
Tetrakloormetaan	vt. Tetrakloorsüsinik
Tetrakloorsüsinik , tetra- kloormetaan	Mürgistuse korral sissehingamise teel — värske õhk, nahaalusi — kofeiin, korazool, lobeliin. Veenisisi — glükoos, kaltsiumkloriid. Kestev kunstlik hingamine. Hapniku või karbogeeni sissehingamine. Mürgistuse korral allaneelamise teel — viivitamatult suu kaudu vasksulfaati või nahaalusi — apomorfiini. Maoloputus söe-veesisuspensiooniga. Suu kaudu — soollahtisti, süsi. Peale selle rakendada kõik, mis märgitud ülalpool mürgistuse korral selle mürgi sissehingamisel.
Tinaoksüüd	vt. Seatina
Tiokaiin	vt. Kokaiin
Toluidiin	vt. Aniliin
Triklooräädikhape	vt. Happed
Triprotamiin-tsink-insuliin	vt. Insuliin
Tsink , tsinksulfaat ehk tsingivitriol, tsinkvalge, tsinkkloriid jt. tsingisoolad.	Säilitada oksendamist sooja piima ja valguvee joomisega. Maoloputus 2% naatriumbikarbonaadi lahusega või 0,2% tanniinilahusega. Suu kaudu — leelised joogid, limakeedised, piim, munavalge, hiljem — oopium. Soollahtisti. Nahaalusi — kofeiin, kamper või korazool. Veenisisi — glükoos, naatriumkloriid. Kõhule — kehasoojendaja või soojendavad kompressid.
Tsüaangaas	vt. Sinihape
Tsüaanvesinik	vt. Sinihape
Tsütisiin	vt. Akaatsia kollane
Tubakas — <i>Nicotiana rustica</i>	Mürgistuse korral taime osadega oksendamise vahend — apomorfiin, vasksulfaat või tsinksulfaat. Maoloputus söe-veesisuspensiooniga. Suu kaudu — soollahtisti. Mürgistuse korral nikotiiniga ja suitsetamisel — külm kompress pea peale, maoloputus söe-veesisuspensiooniga. Mõlemal mürgistusjuhtumil — nahaalusi digaleen-neo või konvasiid, atropiin. Kõhule — soojendavad kompressid, juua sooja piima. Veresoonte spasmi korral — amüülnitriti sissehingamine. Krampide korral — heksenaal või barbamüül lihasesisesi. Veenisesi 20—40 ml 10% naatriumatsetaadi lahust.
Tungaltera — <i>Secale cornutum</i> , ergotoksiin	Oksendamise vahend — apomorfiin, vasksulfaat või tsinksulfaat. Maoloputus söe-veesisuspensiooniga või 0,2% tanniinilahusega. Soollahtisti. Krampide korral — soojad vannid. Klistiiris kloraalhüdraat. Amüülnitriti sissehingamine (2—3 tilka taskurätile). Kooma korral nahaalusi — kofeiin, kamper.
Tärpentiinõli	Oksendamise vahend — apomorfiin. Maoloputus söe-veesisuspensiooniga, süsi, limajook, jää tükikesena, soollahtisti. Nahaalusi — kofeiin, korazool, morfiin või omnopoon.

Preparaadi nimetus	Abi mürgistusel
Upsujuurikas, valge	vt. Veratriin
Ussihammustuse	vt. Ussimürk
Ussimürk	Peale ussi hammustust viivitamatult — nahaalusi polüvalentse ussivastase seerumi süstimine (1 osa seerumit lahustada 10 osas steriilses vees). Hammustuse korral jäsemesse siduda kõvasti kinni ülalpool hammustuse kohta. Mürgi väljaimemine haavast kupuklaasi abil. 2—3 ml 2—5% kaaliumpermanganaadilahuse süstimine nahaalusi hammustuse piirkonda. Nahaalusi — isotooniline naatriumkloriidilahus, kofeiin, kamper, strühniin. Rohke kuuma kange tee või kohvi joomine.
Vasevitriol	vt. Vasksulfaat
Vasevärvid	vt. Vasksulfaat
Vasksulfaat, vasevitriol jt. vasesoolad, vasevärvid	Säilitada oksendamist rikkaliku sooja piima, valguvee, limakeediste joomisega. Maoloputus 0,1% kollase veresoola lahusega või kaaliumpermanganaadilahusega 1:1000. Suu kaudu — 1% kaaliumpermanganaadilahus iga 15 minuti järel à 1 supilusikatäis või põletatud magneesium (30,0); valguvesi, soollahtisti. Kõhule — kehasoojendajad. Nahaalusi — kofeiin, strühniin. Valude korral — morfiin või omnopoon. Vastunäidustatud on: happed, rasvad ja õlid.
Veratriin, sabadilliseeme — <i>Semen Sabadillae</i> , protoveratriin, upsujuurikas — <i>Veratrum Lobelianum</i> .	Maoloputus 0,2% tanniinilahusega või söe-veesisuspensiooniga. Soollahtisti. Neelata jäätükikesi. Suu kaudu — tanniin. Nahaalusi — kofeiin, kamper. Voolmete korral — opium, omnopoon. Kunstlik hingamine. Preparaadi sattumisel ninasse, silmadesse, kurku ja teistele limaskestadele — pesta neid hästi ja määrida 2% kokaiinhüdrokloriidi või dikaiinilahusega.
Veronaal, bromuraal, medinaal, luminaal, barbamüül, malüül, hekse-naal, sonbutaal, pronarkoon, rektoon.	Korduv maoloputus. Soollahtisti. Korduvalt sügavad klistiirid. Suu kaudu — kange tee või kohvi. Hapniku või karbogeeni sissehingamine. Aadri-laskmine koos järgneva isotoonilise naatriumkloriidilahuse süstimisega. Nahaalusi — korazool või kordiamiin, tsütitoon või lobeliin, kofeiin, kamper. Kunstlik hingamine. Jäsemetele sinepiplaast-rid. Keha soojendamine. Voodirežiim.
Ving	vt. Vingugaas
Vingugaas, süsinikoksüüd, valgustusgaas, ving, plahvatusgaasid.	Värske õhk. Kestev kunstlik hingamine. Hapniku või karbogeeni sissehingamine. Nuuskiirituse sissehingamine. Pea peale jää. Suu kaudu — kohvi, kange tee. Nahaalusi — tsütitoon või lobeliin, kofeiin, glükoos, isotooniline naatriumkloriidilahus. Veenisisese — 50—100 ml 25% glükoosilahust. Jäsemetele — sinepiplaastrid või kehasoojendajad. Voodirežiim.

Preparaadi nimetus	Abi mürgistusel
Vismutsalitsülaad	Maoloputus söe-veesisuspensiooniga või 0,2% tanniinilahusega. Suu kaudu — <i>Antidotum metallorum</i> (metallide vastumürk). Soollahtisti. Veenisisesi — naatriumtiosulfaat, glükoos. Sügavad klistiirid. Suuloputus.
Vorstimürk	vt. Ptomainid
Väävelhape	vt. Happed
Vääveldioksüüd	vt. Väävlishape
Väävlishape, vääveldioksüüd, väävlishappeanhüdrid, väävligaas.	Värske õhk. Kunstlik hingamine. Hapniku või karbogeeni sissehingamine. Suu kaudu — kodeiin või dioniin. Pihustatud 2% naatriumbikarbonaadi lahuse inhalatsioon. Suu kaudu — supilusikaviisi 2% naatriumbikarbonaadi lahust. Limaskestade loputus sama lahusega. Nahaalusi — kofeiin või korazool.
Väävelvesinik	Värske õhk. Kunstlik hingamine. Hapniku või karbogeeni sissehingamine. Nahaalusi — kamper või korazool. Kopsuturse nähtude korral — rohke aadrilaskmine koos järgneva isotoonilise naatriumkloriidilahuse või glükoosi süstimisega. Vereülekanne. Sääremarjadele sinepiplaastrid. Pea ülevallamine külma veega. Keha soojeandamine.
Väävelsüsinik	Värske õhk, kunstlik hingamine koos hapniku või karbogeeni sissehingamisega. Nahaalusi — kofeiin, kamper või korazool. Aadrilaskmine koos järgneva isotoonilise glükoosi- või naatriumkloriidilahuse süstimisega. Vereülekanne. Kui mürk on juhitud makku, siis peale eespoolmainitud abinõude, maoloputus söe-veesisuspensiooniga. Nahaalusi — apomorfiin.
Äädikaessents	vt. Happed
Äädikhape	vt. Happed
Zavelli vesi	vt. Kloor

ПРЕДИСЛОВИЕ

В целях обеспечения правильного применения ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств и во избежание ошибок и несчастных случаев от их неправильного хранения и использования, Министерство здравоохранения СССР придает крайне важное значение соблюдению правил хранения, учета и использования таковых.

Недавно Министерством здравоохранения СССР были вновь пересмотрены приказы, касающиеся хранения, учета и использования ядовитых и сильнодействующих средств в аптечной сети и лечебных учреждениях. В результате этого был издан новый приказ по Министерству здравоохранения СССР от 11 февраля 1954 г. № 77 «О порядке хранения, учета и отпуска ядовитых и сильнодействующих веществ». *) Согласно правилам, приведенным в приложениях к приказу, в каждом отделении и кабинете лечебно-профилактических учреждений должны быть для руководства таблицы высших разовых и суточных доз ядовитых и сильнодействующих веществ и противоядий при отравлениях.

Учитывая то обстоятельство, что многие лечебные учреждения не имеют Государственной Фармакопеи VIII издания, где приведены требуемые таблицы, возникла необходимость издать их отдельной брошюрой.

В настоящей брошюре приводятся на эстонском и русском языках следующие таблицы по Государственной Фармакопеи VIII издания 1952 г. и 1 дополнению к ней:

1. Высшие разовые и суточные дозы ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств для взрослых;
2. Высшие разовые дозы ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств для детей;
3. Таблица капель;
5. Лекарственные вещества, применяемые для оказания помощи при острых отравлениях;
5. Таблица противоядий и пособий при отравлениях.

И. Подольский

Зам. Начальника Главного аптечного
управления Министерства здравоохра-
нения ЭССР

*) В Эстонской ССР издан, согласно этому приказу, приказ Министра здравоохранения ЭССР от 24 апреля 1954 г. № 104.

ВЫСШИЕ РАЗОВЫЕ И СУТОЧНЫЕ ДОЗЫ ЯДОВИТЫХ (А) И СИЛЬНО-ДЕЙСТВУЮЩИХ (Б) ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

(Дозы означают приемы внутрь (*per os*) и выражены либо в граммах, либо, где это указано, в миллилитрах и каплях).

(По Государственной Фармакопее VIII издания 1952 г.)

№№ п. п.	Наименование лекарственных средств	Ядовитые (А) и сильно-действующие (Б)	Высшие дозы	
			разовая	суточная
1	Acetylcholinum chloratum под кожу	Б	0,2	0,6
2	Acidum arsenicosum	А	0,003	0,01
3	„ hydrochloricum purum dilutum		20 капель	60 капель
4	„ nicotinicum под кожу	Б	0,1	0,3
5	„ pronarconi	Б	0,5	1,0
6	„ rectoni	Б	0,5	1,0
7	„ sonbutali	Б	0,5	1,0
8	„ sulfuricum purum dilutum		15 капель	45 капель
9	Acrichinum	Б	0,2	0,6
10	Adalinum	Б	1,0	2,0
11	Adonilenum	Б	30 капель	60 капель
12	Adonisidum под кожу	Б	1 мл.	2 мл.
13	Adrenalinum solutum (1:1000) под кожу	Б	1 мл.	—
14	Adrenalonum под кожу	Б	0,01	—
15	Aether	Б	20 капель	60 капель
16	Amygdalinum	Б	0,02	0,06
17	Amylium nitrosus вдыхание	Б	5 капель	30 капель
18	Anaesthesinum	Б	0,5	1,5
19	Analginum		1,0	3,0
20	Antifebrinum	Б	0,3	1,0
21	Antipyrinum	Б	1,0	3,0
22	Apomorphinum hydrochloricum	А	0,01	—
23	Apomorphinum hydrochloricum под кожу	А	0,005	—
24	Aqua Amygdalarum amara- rum	Б	30 капель	60 капель
25	Arecolinum hydrobromicum	А	0,0005	0,0015
26	Argentum colloidalе (Collar- golum) в вену	Б	0,25	0,5

№№ п. п.	Наименование лекарственных средств	Ядовитые (А) и сильно- действую- щие (Б)	Вышие дозы	
			разовая	суточная
27	Argentum nitricum	А	0,03	0,1
28	Arrhenalum под кожу	А	0,06	0,2
29	Atropinum sulfuricum	А	0,001	0,003
30	Barbamylum	Б	0,5	1,0
31	Bijochinololum в мышцу	Б	3 мл	—
32	Bismutum salicylicum basi- cum	Б	1,0	3,0
33	Bromuralum		0,6	1,0
34	Bulbus Scillae	Б	0,3	1,5
35	Carbocholinum	А	0,001	0,003
36	Carbocholinum под кожу	А	0,0005	0,001
37	Carboneum tetrachloratum	Б	3 мл	3 мл
38	Chloralum hydratum	Б	2,0	6,0
39	Chloroformium	Б	0,5 мл	1,0 мл
40	Cocainum hydrochloricum	А	0,03	0,03
41	Codeinum phosphoricum	Б	0,1	0,3
42	„ purum	Б	0,05	0,2
43	Coffeinum	Б	0,3	1,0
44	„ natrio-benzoicum	Б	0,5	2,0
45	„ natrio-salicylicum	Б	0,5	2,0
46	Convallenum под кожу	Б	1 мл	2 мл
47	Convasadum в вену	Б	0,5 мл	1 мл
48	„ под кожу	Б	1 мл	2 мл
49	Cordiaminum под кожу		1 мл	2 мл
50	„ внутрь	Б	30 капель	90 капель
51	Corazolum	Б	0,1	0,3
52	Creosotum	Б	10 капель	30 капель
53	Cuprum sulfuricum внутрь как рвотное	Б	0,5	—
54	Diaethylamidum acidi nico- tinici solutum	Б	30 капель	90 капель
55	„ „ под кожу	Б	1 мл	2 мл
56	Dicainum под кожу	А	0,015	0,03
57	Digalen-Neo	Б	1 мл	3 мл
58	Diginormum	Б	20 капель	80 капель
59	Dioninum	А	0,03	0,1
60	Disulfanum	Б	2,0	7,0
61	Diuretinum		1,0	6,0
62	Emitinum hydrochloricum под кожу	Б	0,05	0,1
63	Ephedrinum hydrochloricum	Б	0,05	0,15

№ п. п.	Наименование лекарственных средств	Ядовитые (А) и сильно- действую- щие (Б)	Высшие дозы	
			разовая	суточная
64	Extractum Belladonnae sic- cum	Б	0,05	0,15
65	Extractum Belladonnae spis- sum	Б	0,05	0,15
66	Extractum Cannabis indicae .	Б	0,1	0,3
67	Extractum Filicis maris aethe- reum	Б	8,0	—
68	Extractum Hyoscyami siccum et spissum	Б	0,1	0,3
69	Extractum Ipecacuanhae sic- cum	Б	0,2	0,4
70	Extractum opii siccum	А	0,05	0,3
71	Extractum Secalis cornuti fluidum	Б	25 капель	50 капель
72	Extractum Secalis cornuti pro injectionibus (Ergotinum) под кожу	Б	1 мл.	3 мл.
73	Extractum Secalis cornuti spissum	Б	0,3	1,0
74	Extractum Strychni	Б	0,012	0,05
75	Flavacridinum hydrochlori- cum	Б	0,2	0,8
76	Folium Belladonnae	Б	0,2	0,6
77	Folium et flos Convallariae majalis	Б	0,5	1,5
78	Folium Digitalis	Б	0,1	0,5
79	„ Hyoscyami	Б	0,4	1,2
80	„ Stramonii	Б	0,2	0,6
81	Gitalenum	Б	25 капель	50 капель
82	Harminum hydrochloricum под кожу	Б	0,01	0,03
83	Herba Adonidis vernalis . .	Б	0,8	10,0
84	„ Cannabis indicae	Б	0,4	0,6
85	„ Thermopsidis	Б	0,1	0,3
86	Heroinum	А	0,005	0,015
87	Hexenalum в вену	Б	1,0	—
88	Hexylresorcinum	Б	1,5	1,5
89	Homatropinum hydrobromi- cum	А	0,001	0,003
90	Hydrargyrum bichloratum . .	А	0,02	0,06
91	„ bijodatum	А	0,02	0,06

№№ п. п.	Наименование лекарственных средств	Яловитые (А) и сильно- действующие (Б)	Высшая доза	
			разовая	суточная
92	Hydrargyrum chloratum mite	Б	0,6	1,8
93	„ cyanatum et охусуанатум под кожу . .	А	0,01	0,03
94	Hydrargyrum salicylicum в мышцу	А	0,02	0,06
95	Hydrastininum chloratum . .	Б	0,05	0,15
96	Infusum Ipecacuanhae con- centratum	Б	1 мл	4 мл
97	Isaphehinum	Б	0,025	0,05
98	Jodum	Б	0,02	0,06
99	Liquor Kalii arsenicosi . .	А	3 капли	10 капель
100	Lobelinum hydrochloricum под кожу	Б	0,01	0,02
101	Luminalum	Б	0,3	0,6
102	Malilum	Б	0,2	0,4
103	Medinalum	Б	1,0	2,0
104	Mercusalum в мышцу	Б	2 мл	—
105	Morphinum hydrochloricum .	А	0,03	0,1
106	Myarsenolum в мышцу . . .	А	0,6	—
107	Narcolanum в прямую киш- ку на 1 кг веса больного	Б	0,1	—
198	Natrium arsenicum	А	0,003	0,01
109	„ kakodylicum	А	0,06	0,2
110	„ nitrosum	Б	0,3	1,0
111	„ „ под кожу	Б	0,05	0,15
112	Nitroglycerinum solutum . .	Б	4 капли	10 капель
113	Norsulfazolum	Б	2,0	7,0
114	Novarsenolum в вену	А	0,6	—
115	Novocainum под кожу	Б	0,2	—
116	Omnoponum	А	0,03	0,1
117	Opium	А	0,1	0,3
118	Osarsolum	А	0,25	1,0
119	Papaverinum hydrochloricum	Б	0,1	0,2
120	Paraldehydum	Б	5 мл	10 мл
121	Parathyreodinum под кожу .	Б	5 мл	—
122	Phenolum purum	Б	0,1	0,3
123	„ liquefactum	Б	2 капли	6 капель
124	Physostigminum salicylicum .	А	0,001	0,003
125	Pilocarpinum hydrochloricum под кожу	А	0,01	0,02
126	Pituitrinum под кожу	Б	2 мл	4 мл
127	„ siccum	Б	—	0,15

№№ п. п.	Наименование лекарственных средств	Ядовитые (А) и сильно- действующие (Б)	Высшая доза	
			разовая	суточная
128	Plasmocidum	Б	0,03	0,06
129	Platyphyllinum bitartaricum .	Б	0,01	0,03
130	Podophyllum	Б	0,1	0,3
131	Pulvis Ipecacuanhae opiatu .	Б	0,5	1,5
132	Pyramidonum	Б	0,5	1,5
133	Radix Ipecacuanhae как от- харкивающее	Б	0,1	0,4
134	Radix Ipecacuanhae внутрь как рвотное	Б	1,0	—
135	Rivanolum	Б	0,05	0,15
136	Salipyrinum	Б	1,0	3,0
137	Salsolinum hydrochloricum .	Б	0,1	0,3
138	Santoninum	Б	0,1	0,4
139	Scopolaminum hydrobromi- cum	А	0,0005	0,0015
140	Secale cornutum	Б	1,0	5,0
141	Solutio pronarconi 10% в вену	Б	10 мл	—
142	Solutio rectoni 10 % в пря- мую кишку	Б	5 мл	—
143	Solutio sonbutali 10% в вену	Б	5 мл	—
144	Sovcainum в спинно-мозго- вой канал	А	0,01	0,01
145	Stibio-kalium tartaricum как рвотное	Б	0,1	0,3
146	Streptocidum album	Б	2,0	7,0
147	Strychninum nitricum	А	0,002	0,005
148	Stypnonum под кожу	Б	0,01	—
149	Stypticinum	Б	0,1	0,3
150	Sulfacylum	Б	2,0	7,0
151	Sulfazolum	Б	2,0	7,0
152	Sulfidinum	Б	2,0	7,0
153	Tabulettae Aëroni	Б	2 таблетки	4 таблетки
154	Theophyllum	Б	0,3	1,0
155	Thiocainum под кожу	А	0,05	—
156	Thymolum	Б	0,5	3,0
157	Thyreoidinum liquidum . . .	Б	1 мл	2 мл
158	Thyreoidinum siccum	Б	0,3	1,0
159	Tinctura Aconiti	Б	8 капель	20 капель
160	„ Belladonnae	Б	20 „	60 „
161	„ Convallariae majalis . . .		30 „	90 „

№ п. п.	Наименование лекарственных средств	Ядовитые (А) и сильнодействующие (Б)	Высшая доза	
			разовая	суточная
162	Tinctura Digitalis	Б	20 капель	80 капель
163	" Ipecacuanhae	Б	15 "	30 "
164	" jodi 10%	Б	8 "	25 "
165	" jodi 5%	Б	15 "	50 "
166	" Opii simplex	А	20 "	50 "
167	" Strophanthi	А	10 "	20 "
168	" Strychni	Б	15 "	30 "
169	Trypaflavinum	Б	0,2	0,8
170	Veronalum	Б	0,75	1,5
171	Yatrenum	Б	1,0	3,0
172	Zincum sulfuricum внутрь как рвотное	Б	1,0	—

Примечания: — 1. Высшие дозы ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств, указанные в списке, рассчитаны для взрослых людей достигших 25-летнего возраста. Для невозмужавших и для детей высшие дозы уменьшаются в зависимости от возраста, приблизительно так:

Для молодых людей	18 лет.	— $\frac{3}{4}$	дозы для взрослых
" "	14 "	— $\frac{1}{2}$	" " "
" детей	7 "	— $\frac{1}{3}$	" " "
" "	6 "	— $\frac{1}{4}$	" " "
" "	4 "	— $\frac{1}{6}$	" " "
" "	2 "	— $\frac{1}{8}$	" " "
" "	1 года	— $\frac{1}{12}$	" " "
" "	до 1 "	— $\frac{1}{24}$ — $\frac{1}{12}$	дозы для взрослых.

2. Высшие дозы уменьшаются до $\frac{3}{4}$ и $\frac{1}{2}$ приема для взрослых также и для лиц, перешедших 60-летний возраст.

3. Если ядовитые или сильнодействующие лекарственные средства прописаны в рецепте в дозе, превышающей указанную в списке и притом не прописью и без восклицательного знака, то заведующий аптекой или его заместитель обязан снести с врачом словесно (можно по телефону) или письменно (в запечатанном конверте) и лишь после получения ответа отпустить прописанное лекарство в соответствующей дозировке.

В случае невозможности по той или иной причине объясниться с врачом заведующий аптекой или его заместитель отпускает прописанное средство в половине той дозы, которая указана в списке как высшая.

ВЫСШИЕ РАЗОВЫЕ ДОЗЫ ЯДОВИТЫХ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

(По 1-му дополнению к Гос. Фармакопей VIII изд.)

Наименование	До 6 месяцев	От 6 месяцев до 1 года	2 года	3—4 года	5—6 лет	7 лет	8—14 лет
1. Acidum hydrochloricum purum dilutum Разведенная соляная кислота	1 капля 1 %	1 капля 1 %	2 капли 1 %	3 капли 1,5 %	5 капель 1,5 %	7 капель 2 %	8—10 капель 2 %
2. Acrichinum Акрихин	0,0125	0,0125	0,025	0,04	0,05	0,075	0,1
3. Adalinum Адалин под кожу	Не назначается	0,1	0,15	0,2	0,2	0,25	0,3
4. Adonipinum Адонилен	1 капля	3 капли	3 капли	5 капель	6 капель	7 капель	8—15 капель
5. Adrenalinum solutum Раствор адреналина (1 : 1000) под кожу	0,1—0,2 мл.	0,25 мл	0,3 мл	0,4 мл	0,5 мл	0,6 мл	0,6—1 мл
6. Antipyrinum Антипирин	Не назначается	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,25—0,3
7. Aromorphinum hydrochloricum Аморфин хлористоводородный как отхаркивающее	Не назначается	Не назначается	0,001	0,0015	0,002	0,0025	0,003
8. Aromorphinum hydrochloricum Аморфин хлористоводородный как рвотное	Не назначается	Не назначается	0,002	0,0025	0,003	0,003	0,003—0,005

Наименование	До 6 месяцев	От 6 месяцев до 1 года	2 года	3—4 года	5—6 лет	7 лет	8—14-лет
По 1 капле на 1 год жизни							
9. Aqua Amygdalatum amargum Горькоминдальная вода	Не назначается						
10. Atropinum sulfuricum Атропин сернокислый	0,0002	0,0002	0,0002	0,00025	0,0003	0,0004	0,0005
11. Bijochnolum Биохинол	0,3—0,5 мл	0,8 мл	1 мл	1,25 мл	1,25 мл	1,5 мл	1,5—2 мл
12. Bromuralum Бромурал	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,3
13. Calomel Каломель	0,025	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,05—0,075
14. Chloralum hydratum Хлоралгидрат	0,1	0,15	0,15	0,02	0,25	0,3	0,3—0,5
15. Codeinum phosphoricum Кодеин фосфорнокислый	Не назначается	0,002	0,003	0,005	0,006—0,008	0,01	0,015—0,02
16. Codeinum purum Кодеин чистый	Не назначается		0,002	0,004	0,005	0,006	0,006—0,01
17. Coffeinum patrio-benzoicum Кофеин бензоат-натрия	0,05	0,05	0,06	0,08	0,1	0,15	0,15—0,2
18. Coffeinum purum Кофеин чистый	Не назначается	0,025	0,04	0,05	0,06	0,075	0,075—0,1
19. Dioninum Дионин	Не назначается		0,003	0,005	0,006	0,0075	0,0075—0,01
20. Diuretinum Диуретин	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,4—0,5

Наименование	До 6 месяцев	От 6 месяцев до 1 года	2 года	3—4 года	5—6 лет	7 лет	8—14 лет
21. Ephetrium hydro- chloricum Эфедрин хлористоводород- ный	0,005	0,005	0,006	0,008	0,012	0,015	0,015—0,025
22. Extractum Belladonnae siccum Экстракт красавки сухой .	Не наз- начается	0,0025	0,003	0,004	0,005	0,0075	0,01—0,015
23. Extractum Filicis maris aethereum Эфирный экстракт мужско- го папоротника	Не назначается		1,0	1,5—2,0	2,5—3,0	3,5	4,0—5,0
24. Extractum opii siccum Экстракт опия сухой	Не назначается	Не назначается			0,01	0,015	0,015—0,02
25. Folium Digitalis Листья наперстянки	0,005	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05—0,075
26. Gitaleum Гитален	2 капли	2 капли	3 капли	4 капли	6 капель	7 капель	От 8 до 14 капель
27. Herba Adonidis vernalis Трава чернойгорки	Не назначается		0,15	0,2	0,25	0,3	0,3—0,5
28. Herba Thermopsisidis Трава термopsisа	0,01	0,01	0,01	0,015	0,02	0,025	0,03
29. Hexylresorcinum Гексилрезорцин ¹⁾	Не назначается		0,2	0,4	0,6	0,7	0,8—1,0
30. Liquor arsenicalis Fowleri Раствор Фаулера	Не назначается		1 капля	1½ капли	2 капли	2½ капли	3 капли

1) Суточная доза равна разовой.

Наименование	До 6 месяцев	От 6 месяцев до 1 года	2 года	3—4 года	5—6 лет	7 лет	8—14 лет
31. Lobelinum hydrochloricum Лобелин хлористоводород- ный под кожу	0,0025	0,0025	0,003	0,04	0,003	0,0075	0,01
32. Lumina'um Луминал	0,01	0,02	0,03	0,05	0,06	0,07	0,1
33. Medina'um Мединал	0,03	0,075	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3
34. Mercusalum Меркузал	0,1 мл	0,2 мл	0,25 мл	0,3 мл	0,5 мл	0,75 мл	1 мл
35. Morphinum hydro- chloricum Морфин хлористоводород- ный	Не назначается		0,001	0,015	0,0025	0,003	0,003—0,006
36. Myarsenol'um Миарсенол	С м. н о в а р с е н о л						
37. Natrium kakodylicum Какодилат натрия	Не назначается		0,003	0,01	0,015	0,02	0,025
38. Novarsenolum Новарсенол ¹⁾	0,03—0,15	0,05—0,15	0,05—0,2	0,1—0,3	0,1—0,3	0,1—0,3	0,1—0,3
39. Oleum Chenopodii Хеноподиевое масло как противоглистное . . .	Не назначается		2 капли	4 капли	6 капель	7 капель	8—12 капель
40. Otporonum Омнопон	Не назначается		0,002	0,004	0,006	0,007	0,008—0,01

¹⁾ На одно влияние. Начинать с меньших доз (первая цифра) и доводить до высших (вторая цифра).

Наименование	До 6 месяцев	От 6 месяцев до 1 года	2 года	3—4 года	5—6 лет	7 лет	8—14 лет
41. Osarsolum Осарсол как противоглист- ное			Не назна- чается		0,08	0,09	0,11—0,19
42. Paraverinum hydro- chloricum Папаверин хлористоводо- родный	Не наз- начается	0,005	0,01	0,015	0,02	0,02	0,03
43. Pulvis Doveri, Pulvis Ipecacuanhae oriatius Доверов порошок	Не назначается		0,05	0,1	0,1	0,15	0,15—0,25
44. Pyramidonum Пирамидон	0,025	0,05	0,05	0,1	0,1	0,15	0,2—0,3
45. Radix Ipecacuanhae Корень ипекакуаны	0,01	0,01	0,01	0,015	0,02	0,02	0,025
46. Streptosidum album Стрептоцид белый			0,2 на 1 кг веса на сутки				
47. Strychninum nitricum Стрихнин азотнокислый	Не назначается		0,00025	0,0003	0,0005	0,0006	0,00075— 0,001
48. Sulfazolum Сульфазол			0,2 на 1 кг веса на сутки				
49. Sulfidinum Сульфидин			0,2 на 1 кг веса на сутки				
50. Tinctura Belladonnae Настойка красавки	1 капля	1 капля	2 капли	3 капли	3 капли	4 капли	4—6 капель
51. Tinctura Convallariae majalis Настойка ландыша	1 капля	2 капли	2 капли	4 капли	6 капель	7 капель	8—15 капель

Наименование	Продолжение						
	До 6 месяцев	От 6 месяцев до 1 года	2 года	3—4 года	5—6 лет	7 лет	8—14 лет
52. Tinctura Digitalis Настойка наперстянки . . .	Не назна- чается	1 капля	2 капли	4 капли	6 капель	7 капель	8—10 капель
53. Tinctura opii simplex Настойка опия	Не назна- чается	По полкапли на 1 год жизни					
54. Tinctura Strychni Настойка чилибухи	Не назначается	1 капля	2 капли	3 капли	5 капель	5—6 капель	
55. Veronalum Веронал	0,03	0,075	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3

ТАБЛИЦА КАПЕЛЬ

КОЛИЧЕСТВО КАПЕЛЬ В 1 Г И 1 МЛ ЖИДКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ ПРИ 20° ПО НОРМАЛЬНОМУ КАПЛЕМЕРУ

(По Государственной Фармакопее VIII изд. 1952 г.)

Наименование препарата	Количество капель в 1 г	Количество капель в 1 мл
1. Acidum hydrochloricum dilutum	20	21
2. Adonilenum	35	34
3. Adonisidum	33	32
4. Adrenalinum hydrochloricum solutum (1 : 1000)	25	25
5. Aether purus	85	61
6. Amylium nitrosum	68	59
7. Aqua Amygdalarum amararum	40	38
8. „ destillata	20	20
9. Chloroformium	56	83
10. Cordiaminum	29	29
11. Convasidum	37	36
12. Extractum Frangulae fluidum	42	44
13. „ Secalis cornuti fluidum	35	37
14. Gitalenum	37	36
15. Infusum Adonidis vernalis concentratum (1 : 2)	39	40
16. Liquor ammonii anisatus	58	50
17. Liquor kalii arsenicosi	31	31
18. Oleum Menthae piperitae	51	47
19. Phenolum purum liquefactum	36	38
20. Solutio nitroglycerini 1%	64	52
21. Spiritus vini 95°	65	52
22. „ „ 90°	62	51
23. „ „ 70°	56	50
24. „ „ 40°	47	45
25. Tinctura Aconiti	54	49
26. „ Belladonae	48	46
27. „ Cannabis indicae	61	51
28. „ Convallariae majalis	46	44
29. „ Digitalis	47	45
30. „ jodi 10%	63	56
31. „ jodi 5%	49	48
32. „ opii benzoica	54	49
33. „ opii simplex	44	43
34. „ Strophanthi	59	53
35. „ Strychni	56	50
36. „ Valerianae simplex	56	50

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПРИ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ

(По Государственной Фармакопее VIII изд. 1952 г.)

Лекарственные вещества	Лекарственные формы, дозы, способы и цель применения
Адонилен	<i>Adonileum</i> — внутрь по 20—25 капель 2—3 раза в день. Сердечное.
Адреналин хлористово-дородный	<i>Sol. adrenalini hydrochlorici</i> 0,1% — под кожу 0,5—1 мл. Сосудосуживающее.
Амилнитрит	<i>Amylium nitrosum</i> — 3—5 капель на платок или вату для вдыхания. Сосудорасширяющее.
Анестезин	<i>Anaesthesinum pulveratum</i> 0,5 — присыпка на рану. Местное обезболивающее.
Апоморфин хлористово-дородный	<i>Sol. apomorphini</i> 0,5% — под кожу 1 мл. Рвотное.
Аскорбиновая кислота	<i>Acidum ascorbinicum</i> — внутрь 0,05—0,25.
Атропин сернокислый	<i>Sol. Atropini sulfurici</i> 0,1% — под кожу, 0,5—1 мл.
Белковая вода	Один яичный белок разболтать в стакане воды. Обволакивающее.
Барбамил	<i>Barbamylum</i> — внутрь 0,1—0,5 г; 10% — внутримышечно или подкожно 5 мл. Для прекращения судорог и как снотворное.
Гексенал	<i>Hexenalum in ampullis a</i> 0,5 г или 1 г, приготовить 10% раствор, внутримышечно 10 мл или 4% — в клизме (25 мл). Для прекращения судорог.
Глюкоза	<i>Sol. glucosi isotonicae</i> — (т. е. 5% раствор) — под кожу 500 мл или внутривенно 100 мл 40% (гипертонический раствор) — 10—20 мл внутривенно.
Дигинорм	<i>Diginormum</i> — внутрь по 20 капель 3 раза в день. Сердечное.
Дикаин	<i>Sol. dicaini</i> 2% — в глаза по 2—3 капли и для смазывания слизистых носа, горла. Местное обезболивающее.
Дионин	<i>Dioninum</i> — внутрь 0,01—0,03. Успокаивающее кашель.
Диуретин	<i>Diuretinum</i> — внутрь 0,5—1 г. Мочегонное.
Желтая кровяная соль	<i>Sol. kalii ferrocyanati</i> 0,1% — для промывания желудка 600—1000 мл. Обезвреживает яды (медь).
Известковая вода	<i>Aqua calcis</i> — внутрь по 1 столовой ложке через 5—10 минут; 100 мл известковой воды, разведенные водой до 1 л для промывания желудка. Обезвреживает яды.
Калий марганцовокислый	<i>Sol. kalii hypermanganici</i> 1:1000 — для промывания желудка; 0,4% — внутрь чайными ложками через 10—15 минут, 1% — под кожу 2—3 мл (при змеином укусе). Нейтрализует яды (окисляет).
Калий уксуснокислый	<i>Liquor kalii acetici</i> — внутрь по 1—3 мл на прием, в микстурах. Мочегонное.
Кальций хлористый	<i>Sol. calcii chlorati</i> 5—10% — внутривенно 10—20 мл.

Лекарственные вещества	Лекарственные формы, дозы, способы и цель применения
Камфора	<i>Oleum camphorae</i> 20% — под кожу 1—2 мл. Усиливает сердечную деятельность и дыхание.
Карбоген	<i>Carbogenum</i> — смесь углекислоты (5—7%) с кислородом (до 100%) — для дыхания. Возбуждает дыхание и улучшает кровообращение.
Кодеин чистый	<i>Codeinum purum</i> — внутрь 0,02—0,05 2—3 раза в день. Успокаивает кашель.
Кокаин хлористоводородный	<i>Sol. cocaini hydrochlorici</i> 1—2% — по 2—3 капли в глаза и для смазывания слизистых носа, горла и т. д. Местное анестезирующее.
Коразол	<i>Sol. corazoli</i> 10% — под кожу 1—2 мл. Возбуждает центральную нервную систему, усиливает дыхание и улучшает кровообращение.
Кордиамин	<i>Cordiaminum</i> — под кожу 0,5—1 мл. Возбуждает центральную нервную систему, усиливает дыхание и улучшает кровообращение.
Кофеин бензоат-натрия	<i>Sol. coffeini natrio-benzoici</i> 10—20% — под кожу 1 мл. Усиливает дыхание, улучшает кровообращение.
Лобелин хлористоводородный	<i>Sol. lobelini hydrochlorici</i> 1% — в вену 0,5—1 мл. Возбуждает дыхание.
Магнезия жженая	<i>Magnesia usta</i> — внутрь 30—50 г в стакане воды на один прием или повторно через 1—2 часа. Взвесь 50—70 г жженой магнезии в 600—800 мл воды для промывания желудка. Обезвреживает и адсорбирует яды.
Магний сернокислый	<i>Magnesium sulfuricum</i> — внутрь 20—30 г на прием в 1—2 стаканах воды или ввести в виде раствора в желудок зондом. Слабительное.
Медь сернокислая	<i>Sol. magnesiæ sulfurici</i> 25% — под кожу или внутримышечно 10 мл как наркотическое.
Метиленовый синий	<i>Sol. cupri sulfurici</i> 1% — внутрь чайными ложками каждые 5 минут до наступления рвоты. Рвотное.
Морфин хлористоводородный	<i>Sol. methyleni coerulei</i> 1% — внутривенно 50—100 мл. Обезвреживает яды (синильная кислота).
Натрий двууглекислый	<i>Sol. morphini hydrochlorici</i> 1% под кожу 1—2 мл. Обезболивающее.
Натрий сернокислый	<i>Sol. natrii bicarbonici</i> 2—2,5% — внутрь столовыми ложками; 1—2% — для промывания желудка; 2—4% — внутривенно 500—1000 мл. Обезвреживает яды.
Натрий хлористый	<i>Natrium sulfuricum</i> — внутрь 20—30 г растворить в 1—2 стаканах воды и выпить за один раз. Слабительное.
	<i>Sol. natrii sulfurici</i> 1% — для промывания желудка; 3% внутривенно — 10 мл (при отравлении барием).
	<i>Sol. natrii chlorati</i> 0,85% (<i>Isotonica</i>) — под кожу или внутривенно 1—2 мл. Обезвреживает яды, замещает кровь, удаленную при кровопускании.
	<i>Sol. natrii chlorati</i> 2—5% — промывания желудка или для питья столовыми ложками каж-

Лекарственные вещества	Лекарственные формы, дозы, способы и цель применения
Нитроглицерин	дые 10 минут (при отравлении азотнокислым серебром). <i>Nitroglycerinum solutum</i> — внутрь по 2—3 капли. Сосудорасширяющее.
Омнопон	<i>Sol. omnoponi</i> 2% — под кожу 1—2 мл. Обезболивающее.
Опий	<i>Opium pulveratum</i> — внутрь 0,02—0,05 3—4 раза в день. <i>Tinctura Opii simplex</i> — внутрь 6—12 капель 3 раза в день. Обезболивающее и прекращающее поносы.
Папаверин хлористоводородный	<i>Sol. papaverini hydrochlorici</i> 2% — под кожу 1—2 мл. Устраняет спазмы сосудов и кишечные колики.
Противоядие от металлов	<i>Antidotum metallorum</i> — внутрь 50—100 мл или 200 мл, разбавив в 800 мл воды; для промывания желудка. Нейтрализует яды (тяжелые металлы, мышьяк).
Противоядие от мышьяка	<i>Antidotum arsenici</i> — внутрь по 1 столовой ложке каждые 5 минут до прекращения рвоты (перед употреблением взбалтывать). Нейтрализует яды.
Слизистые отвары	<i>Mucilago Salep</i> или <i>Mucilago Gummi arabici</i> — внутрь 15—20 мл, разведя водой (200 мл) и добавив 15—20 г сахара. Принимать столовыми ложками через 5—10 минут. Обволакивающее.
Стрихнин азотнокислый	<i>Sol. strychnini nitrici</i> 0,1% — под кожу по 0,5—1 мл. Возбуждает центральную нервную систему, усиливает работу сердца, повышает сопротивляемость организма при отравлении алкоголем.
Строфант	<i>Tinctura Strophanthi</i> — внутрь 3—5 капель, <i>Sol. Strophanthini</i> 0,1% — внутривенно 0,25—0,5 мл. Сердечное.
Танин	<i>Sol. acidi tannici</i> 2% — внутрь 100—200 мл; принимать столовыми ложками каждые 5 минут, 0,2% — для промывания желудка. Обезвреживает яды (алкалоиды и тяжелые металлы).
Тиосульфат натрия	<i>Sol. natrii hyposulfurosi</i> 0,5% — для промывания желудка 700—1000 мл. 5% — под кожу 100 мл; 10—30% — внутривенно 20—50 мл. Обезвреживает яды.
Уголь активированный	<i>Carbo activatus</i> — внутрь взвесью из 1 столовой ложки активированного угля в 2 стаканах воды; для промывания желудка взвесью из 1 столовой ложки угля в 500 мл воды. Адсорбирует яды.
Уксусные клизмы	1 часть уксуса (6% уксусная кислота и 3 части воды (1—2 стакана).
Хлоралгидрат	<i>Chloralum hydratum</i> — внутрь 4 г растворить в 50 мл воды, добавить <i>Mucilago Gummi arabici</i> 15 мл. Принимать столовыми ложками через полчаса — 1 час до прекращения судорог.

Лекарственные вещества	Лекарственные формы, дозы, способы и цель применения
Цититон	1,5 г хлоралгидрата растворить в 30 мл воды, к раствору прибавить <i>Mucilago Gummi arabici</i> и ввести в клизме в прямую кишку. Для прекращения судорог. <i>Cytitonum</i> — в вену 0,5—1 мл. Возбуждает дыхание и повышает кровяное давление.

ТАБЛИЦА ПРОТИВОЯДИЙ И ПОСОБИЙ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ

(По Государственной фармакопее VIII изд. 1952 г.)

Название препарата	Помощь при отравлении
Адонисен, адонизид	См. Наперстянка
Адонис	См. Наперстянка
Адреналин, эфедрин	Полный покой, осторожно давать вдыхать амилнитрит (накапав 3—5 капель на вату или платок). 0,5—0,8 г хлоралгидрата в клизме. Подкожно — папаверин хлористоводородный 1—2 мл 2% раствора. Кровопускание. Вдыхание кислорода.
Азотная кислота	См. Кислоты
Азотносеребряная соль	См. Нитрат серебра
Акация желтая, ракитник или золотой дождь — <i>Cytisus laburnum</i> , цитизин	Промывание желудка взвесью угля с водой. Внутрь — солевое слабительное. При судорогах — внутрь хлоралгидрат или барбитамил. Согревание тела. Полный покой.
Аконит, аконитин	См. Борец
Акрихин	Промывание желудка раствором марганцовокислого калия 1 : 1000 или 0,2—0,5% раствором танина. Внутрь — солевое слабительное. Обильное щелочное питье. Грелка на живот. Под кожу — кофеин, камфора. Затемненная комната. Постельный режим.
Акрицид	См. Риванол
Алкоголь винный, амиловый, древесный	См. Спирты
Амигдалин	См. Синильная кислота
Амилнитрит	Свежий воздух. При ослаблении или остановке дыхания — искусственное дыхание, вдыхание кислорода или карбогена. Под кожу — кофеин, камфора. При резкой метгемоглобинемии — кровопускание и переливание крови. Внутривенно — глюкоза. Постельный режим.
Аммиак	См. Нашатырный спирт
Анабазин	При приеме внутрь: рвотное — апоморфин или сернокислая медь. Промывание желудка взвесью угля с водой. Внутрь — солевое слабительное. Вдыхание кислорода или карбогена. Подкожно или внутривенно — глюкоза. При судорогах — внутрь хлоралгидрат или барбитамил. Полный покой.
Анальгин	При попадании на кожу немедленно снять одежду и тщательно обмыть место поражения теплой водой, подкисленной лимонной или уксусной кислотой. Вдыхание кислорода или карбогена. Под кожу или внутривенно — глюкоза. При судорогах — внутрь хлоралгидрат или барбитамил. Полный покой.
Анилиин (анилиновые краски, антифебрин, нитробензол, толуидин, фенацетин)	См. Антипирин
	При вдыхании или всасывании через кожу — свежий воздух, вдыхание кислорода или карбогена. Искусственное дыхание. При резкой метгемоглобинемии — кровопускание с после-

Название препарата	Помощь при отравлении
Анилиновые краски	дующим переливанием крови. Внутривенно — глюкоза, адреналин. Под кожу — кофеин, камфора, коразол.
Антипирин, аналгин, пирамидон	При приеме внутрь: рвотное — апоморфин, сернокислая медь. Промывание желудка. Солевое слабительное. В остальном помощь, как при отравлении путем вдыхания. Противопоказаны внутрь: жиры, масла, молоко, спирт, эфир.
Антифебрин	См. Анилин
Апоморфин	Рвотное — апоморфин. Промывание желудка взвесью угля с водой. Внутрь — солевое слабительное. Под кожу — кофеин, камфора, изотонический раствор хлористого натрия. При судорогах — внутрь хлоралгидрат. Согревание тепла. Избегать жиров и алкоголя
Ареколин	См. Анилин
Арrenal	Поддерживать рвоту, давая внутрь большие количества теплого молока или слизистого отвара.
Аспирин	Промывание желудка. Внутрь — водная взвесь угля, крепкий чай или крепкий кофе, 2% раствор таннина по столовой ложке. Под кожу — кофеин, камфора, стрихнин. Постельный режим.
Атоксил	См. Мускарин
Атропин, красавка — <i>Atropa Belladonna</i> , белена — <i>Hyoscyamus niger</i> , дурман — <i>Datura stramonium</i> , гиосциамин, гоматропин, платифиллин, аэрон.	См. Мышьяк
Ацесал	См. Салициловая кислота
Ацетилхолин хлорид	См. Мышьяк
Аэрон	Промывание желудка водной взвесью угля или раствором марганцовокислого калия 1:1000 с последующим введением через зонд солевого слабительного. Покой. При резко выраженном возбуждении — клизма с хлоралгидратом. Под кожу — 1 мл 1% раствора хлористоводородного морфина, 1 мл 1% раствора хлористоводородного пилокарпина повторно до исчезновения сухости во рту. Холод на голову. При резкой слабости — кофеин, камфора. Постельный режим.
Барбамил	См. Салициловая кислота
Барий и его соединения — растворимые соли; барий едкий	См. Мускарин
Безвременник осенний — <i>Colchicum autumnale</i> его семена, колхицин	См. Атропин
Белена	См. Веронал
Белильная известь	Промывание желудка 1% раствором сернокислого натрия. Внутрь — раствор сернокислого натрия (20,0—200,0) по столовой ложке каждые 5 минут. Внутривенно — 10 мл 3% раствора сернокислого натрия. Под кожу — камфора, кофеин, кордиамин. При тахикардии — свеча с 0,2 г хинина.
Белладонна	См. Колхицин
	См. Атропин
	См. Хлор
	См. Атропин

Название препарата	Помощь при отравлении
Бензин Бензол , бензин, керосин	См. Бензол При отравлении парами: свежий воздух, искусственное дыхание, вдыхание кислорода или карбогена. Под кожу — кофеин, камфора. Согревание тела. При отравлении через рот, кроме вышеуказанного, рвотное — апоморфин. Промывание желудка водной взвесью угля. Касторовое масло. Внутрь — черный кофе, горячее молоко. Промывание желудка водной взвесью угля с последующим введением солевого слабительного. Обильное питье щелочных вод или 0,5—1% раствора двууглекислого натрия. Переливание крови после предварительного обильного (500—600 мл) кровопускания. Внутривенно — 10 мл 20% раствора гипосульфита натрия — повторно. Вливание изотонического раствора хлористого натрия или глюкозы. При коллапсе — под кожу кофеин, камфора. Противопоказаны: кислоты, лимоны, спирт.
Бетанафтол Бледная поганка Борец , аконит — <i>Aconitum napellus</i> и др. виды; аконитин	См. Нафталин См. Поганка бледная Повторное промывание желудка водной взвесью угля, раствором 0,2% таннина или раствором марганцовокислого калия (1:1000) с последующим введением солевого слабительного. Внутрь — водная взвесь угля, крепкий чай или кофе, настойка строфаната. Под кожу — кофеин, камфора, атропин. Согревание тела, теплые ванны. Искусственное дыхание. Вдыхание кислорода или карбогена. Рвотное — апоморфин. Промывание желудка водной взвесью угля. Внутрь — жженая магнезия, известковая вода, белковая вода, молоко. Солевое слабительное. Под кожу — изотонический раствор хлористого натрия.
Борная кислота	При отравлении парами: свежий воздух. Вдыхать водяные пары с небольшой примесью нашатырного спирта. Ингаляция содового раствора. Кислород. При отравлении через рот: промывание желудка 0,5% раствором тиосульфата натрия. Внутрь — белковая вода, щелочные воды, жженая магнезия с водой, крахмальный клейстер, молоко, лед кусочками. Снаружи — обожженные места присыпать анестезином с тальком и смазать ланолином.
Борная кислота	См. Веронал Промывание желудка 0,2% раствором таннина или водной взвесью угля. Солевое слабительное. Глотать кусочки льда. Внутрь — таннин. Под кожу — кофеин, камфора. При коликах — опий, омнопон. Искусственное дыхание. При попадании препарата в нос, глотку и на другие сли-
Бромурал Вератрин , вширое семя — <i>Semen Sabadillae</i> про- товератрин, чемери- ца — <i>Veratrum Lobe- lianum</i>	

Название препарата	Помощь при отравлении
Веронал , бромурал, ме- динал, люминал, бар- бамил, малил, гексе- нал, сонбутал, пронар- кон, ректон	зистые оболочки — хорошо промыть их и сма- зать 2% раствором хлористоводородного ко- каина или дикаина. Повторное промывание желудка. Солевое слаби- тельное. Повторно высокие клизмы. Внутрь — крепкий чай или кофе. Вдыхание кислорода или карбогена. Кровопускание с последующим вливанием изотонического раствора хлористого натрия. Под кожу — коразол или кордиамин, цититон или лобелин, кофеин, камфора. Искус- ственное дыхание. Горчичники на конечности. Согревание тела. Постельный режим.
Вех ядовитый Висмут салициловокис- лый	См. Омег водяной Промывание желудка водной взвесью угля или 0,2% раствором таннина. Внутрь — Antidotum metallosum (противоядие от металлов). Соле- вое слабительное. Внутривенно — тиосульфат натрия, глюкоза. Высокие клизмы. Полоскание рта.
Вода горьких миндалей Газы взрывные	См. Синильная кислота Свежий воздух, искусственное дыхание с кисло- родом или карбогеном. Под кожу — цититон или лобелин, камфора или коразол, кофеин. Внутрь — крепкий чай или кофе. Покой. Согре- вание тела.
Газы опасные: водяной газ, генераторный газ Гашиш	Помощь, как при отравлении угарным газом, — см. Угарный газ Промывание желудка раствором марганцовокис- лого калия 1:1000, теплым раствором повар- енной соли или водной взвесью угля. Под ко- жу — кофеин или коразол, цититон или лобе- лин. Теплые ванны с холодным обливанием го- ловы. Искусственное дыхание с вдыханием ки- слорода или карбогена. Постельный режим.
Гваякол Гексенал Гексилрезорцин Героин Гидрохинон Гиосциамин Гистон-цинк-инсулин Гитален Гоматропин Горчица — <i>Brassica nig-</i> <i>ra</i> , <i>Brassica juncea</i> (семена); горчичная мука, эфирное горчич- ное масло	См. Фенол См. Веронал См. Фенол См. Морфин См. Фенол См. Атропин См. Инсулин См. Наперстянка См. Атропин Промывание желудка, солевые слабительные. Внутрь — повторно 5—8 капель нашатырного спирта с водой. Вдыхать пары воды с неболь- шим количеством нашатырного спирта. Пить слизистые отвары. Под кожу — кофеин, кам- фора, морфин или омнопон. При попадании эфирного горчичного масла на кожу — об- мыть ее.
Горчичное эфирное мас- ло Горький миндаль	См. Горчица См. Синильная кислота

Название препарата	Помощь при отравлении
Грибы ядовитые	См. Поганка бледная, мушкетер (мухомор), строчок
Двуокись серы	См. Сернистая кислота
Дигален-нео	См. Наперстянка
Дигинорм	См. Наперстянка
Дигиталис	См. Наперстянка
Дикаин	См. Кокаин
Дионин	См. Морфин
Диуретин	См. Кофеин
Дихлорамин	См. Хлор
Древесный спирт	См. Спирты
Дурман	См. Атропин
Едкий барий	См. Барий и его соединения
Едкий натр	См. Щелочи едкие
Едкое кали	См. Щелочи едкие
Жавелева вода	См. Хлор
Закись азота	Длительное искусственное дыхание, вдыхание кислорода или карбогена. Внутривенно — глюкоза. Под кожу — цититон или лобелин, кофеин или коразол, изотонический раствор хлористого натрия.
Зелень французская	См. Мышьяк
Змеиный яд	Немедленно после укуса змеи — под кожу впрыскивание поливалентной противозмеиной сыворотки (1 часть сыворотки растворить в 10 частях стерильной воды). При укусе в конечность туго перетянуть выше места укуса. Отсасывание яда из ранки кровососной банкой. Впрыскивание под кожу вокруг места укуса 2—3 мл 2—5% раствора марганцовокислого калия. Под кожу — изотонический раствор хлористого натрия, кофеин, камфора, стрихнин. Обильное питье горячего крепкого чая или кофе.
Золотой дождь	См. Акация желтая
Известь негашеная	Возможно раннее осторожное промывание желудка водой, подкисленной уксусной кислотой. Внутрь — 1% раствор лимонной или уксусной кислоты, молоко, яичный белок. Под кожу — кофеин, камфора.
Инсулин, гистон-цинк-инсулин, трипротамин-цинк-инсулин.	В легких случаях внутрь — 20—40 г сахара, 200 г белого хлеба; в тяжелых случаях внутривенно — 100—200 мл 10% раствора глюкозы или под кожу — 50—100 мл изотонического раствора глюкозы; в клизме ввести 50 мл 20% раствора глюкозы. Под кожу адреналин, 1 мл питуитрина.
Иод, настойки иода, раствор Люголя	При приеме внутрь: промывание желудка 0,5% раствором тиосульфата натрия или пить стаканами (2—3) 5% раствор тиосульфата натрия, жидкий крахмальный клейстер или мучной отвар, молоко, белковую воду, слизистые отвары. Внутрь — 20—30 г угля в водной взвеси, 20 г жженой магнезии. Пить щелочные воды.

Название препарата	Помощь при отравлении
Иодоформ	Под кожу — изотонический раствор глюкозы и 5% раствор тиосульфата натрия. При отравлении парами йода: свежий воздух. Ингаляция 5% раствора тиосульфата натрия или распыленного 2% раствора двууглекислого натрия. Повторно промывать и прополаскивать нос, рот и глотку 2% раствором двууглекислого натрия. При болях в глазах промыть чистой водой и ввести по 2—3 капли 2% раствора хлористоводородного кокаина или дикаина в каждый глаз. Немедленно убрать иодоформную повязку или присыпку, или тампон. Внутривенно — 50—100 мл 5—20% раствора тиосульфата натрия. Пить щелочные воды.
Ипекакуана — <i>Cephaelis ipecacuanha</i> , эметин	При рвоте — поддерживать ее питьем теплой воды и молока. Промывание желудка 0,2—0,5% раствором танина или водной взвесью угля. Внутрь — слизистые супы, молоко, опий, лед кусочками, обильное питье, содовая или сельтерская вода. Под кожу — кофеин, камфора, глюкоза.
Какодиловый натрий Каломель Камфора	См. Мышьяк См. Сулема Рвотное. Промывание желудка. Внутрь — солевое слабительное. При судорогах — внутрь или в клизме хлоралгидрат или барбитал. При коме — кофеин. Растирание тела, горчичники на конечности. Покой, постельный режим. Избегать жиров и спиртных напитков.
Кантаридин Карболовая кислота Карбохолин Киноварь Кислоты	См. Шпанские мушки См. Фенол См. Мускарин См. Сулема При отравлении через рот противопоказаны рвотные и прием внутрь углекислых щелочей. Возможно раннее и обильное промывание желудка водой. Внутрь — жженая магнезия (20,0—200,0), известковое молоко, яичный белок, слизистые отвары. Обожженную слизистую рта и глотки смазывать 2% раствором кокаина или дикаина. Под кожу — морфин, кофеин, камфора, изотонический раствор хлористого натрия. Внутривенно 10 мл 10% раствора хлористого кальция. Лед на живот. Ингаляция содовым раствором. Глотать лед кусочками. При попадании кислот на кожу смыть их большим количеством воды или водой с мылом, или известковой водой, или слабым (0,5—1%) раствором щелочей.
Кислота азотная Кислота пикриновая	См. Серная кислота Кроме вышеуказанного о кислотах (см. Кислоты), внутрь — солевое слабительное. Внутривенно — глюкоза.

Название препарата	Помощь при отравлении
Кислоты серная и муравьиная	Чистую концентрированную серную кислоту при попадании на кожу надлежит немедленно смыть большим количеством холодной воды. Обожженную слизистую рта и глотки смазать 2% раствором кокаина или дикаина.
Кислота соляная	См. Кислоты При отравлении парами: свежий воздух, вдыхание распыленных водяных паров с примесью нашатырного спирта.
Кислота трихлоруксусная	См. Серная кислота
Кислота уксусная и уксусная эссенция	См. Серная кислота
Кислота хромовая	См. Серная кислота
Кислота щавелевая	Кроме вышеуказанного о кислотах (см. Кислоты), немедленно следует вводить еще внутрь 0,6—1,0 хлористого кальция, растворив его в полустакане воды; пить известковое молоко, известковую воду, взвесы мела в воде. Внутрь — уксуснокалиевая соль, диуретин. Внутривенно — глюкоза, изотонический раствор хлористого натрия. Под кожу — кофеин, камфора, коразол.
Клещевины семена	См. Рицин
Кодеин	См. Морфин
Кокаин, дикаин, совкаин, тиакаин, новокаин	При приеме внутрь — промывание желудка водой взвесью угля или раствором марганцовокислого калия (1:1000). Внутрь — танин. Вдыхать амилнитрит (3—4 капли на платок) или давать внутрь нитроглицерин (по 2—3 капли 2—3 раза). При возбуждении и судорогах — хлоралгидрат 1,0—2,0 (избегать морфина!). Осторожно вдыхать хлороформ. Кровапоускание с последующим вливанием изотонического раствора хлористого натрия. Согревание. Горячий кофе, вино. Под кожу — кофеин, камфора. Искусственное дыхание. Кислород. При подкожном введении, кроме вышеуказанного, перетягивание конечности выше места введения, но не до исчезновения пульса.
Колбасный яд	См. Птомаины
Колларгол	См. Фловаргин
Колоцинта плоды — <i>Fructus Colocynthis</i> , колоцинтин, подофиллин, эвфорбий	Промывание желудка. Внутрь — уголь, слизистое питье, крепкий чай. Подкожно или внутривенно — изотонические растворы хлористого натрия и глюкозы. Внутрь — по 1 г основной азотноисмутовой соли 4—6 раз в день. Внутрь — коразол, дигинорм. Постельный режим.
Колхицин, семена осеннего зимовника, безвременника — <i>Colchicum autumnale</i>	Промывание желудка. Внутрь — 15—20 г угля в водной взвеси. Промывание желудка 0,2% раствором танина или водной взвесью угля. Солевое слабительное. Обильное питье крепкого чая, молока, слизистых отваров. При болях в живо-

Название препарата	Помощь при отравлении
Конвазид	те — 10 капель опийной настойки или морфин, омнопон под кожу. Под кожу — кофеин, камфора, 100 мл изотонического раствора хлористого натрия. Укутывание, согревание тела.
Конваллен	См. Наперстянка
Кониин	См. Наперстянка
Коразол	См. Омег пятистый
Кордиамин	Промывание желудка водной взвесью угля. Внутрь или в клизме — хлоралгидрат или барбитал. Под кожу — морфин. Покой. Внутривенно — глюкоза. Постельный режим.
Кофеин (кофе, чай), диуретин	Меры помощи, как при отравлении коразолом, — см. Коразол.
Красавка	Промывание желудка 0,2% раствором танина. Внутрь — хлоралгидрат или барбитал, уголь, солевые слабительные. Вдыхать амилнитрит или внутрь — нитроглицерин. Теплые ванны. Искусственное дыхание.
Крезол	См. Атропин
Кремнефтористый натрий	См. Фенол
Креозот	См. Фтористый натрий
Креолин	См. Фенол
Крепкая водка	См. Фенол
Кротоновое масло, кротоновое семя — <i>Semen Crotonis tiglii</i>	Меры помощи, как при отравлении серной кислотой, — см. Серная кислота.
Кукольвана семена	При попадании кротонового масла на кожу — смывать эфиром, бензином или другими органическими растворителями.
Лавровишневая вода	Проглоченные семена или масло удалить промыванием желудка. Внутрь — слизистые отвары, водная взвесь угля, молоко. Под кожу — морфин, глюкоза, изотонический раствор хлористого натрия. Покой. Постельный режим.
Ландыш	См. Пикротоксин
Лизол	См. Синильная кислота
Лобелин	См. Наперстянка
Люголя раствор	См. Фенол
Люминал	Промывание желудка водной взвесью угля. Внутрь — уголь. Внутривенно — изотонический раствор хлористого натрия или глюкозы. При остановке дыхания — искусственное дыхание с кислородом или карбогеном. При судорогах — внутрь хлоралгидрат или барбитал. Полный покой.
Ляпис	См. Иод
Малил	См. Веронал
Мединал	См. Нитрат серебра
Медные краски	См. Веронал
Медный купорос	См. Веронал
Меркузал	См. Сульфат меди
	См. Сульфат меди
	См. Сулема

Название препарата	Помощь при отравлении
Метиловый эфир салициловой кислоты	См. Салициловая кислота
Миарсенол	См. Новарсенол
Можжевельное эфирное масло казахского можжевельника	См. Можжевельные ягоды казахского можжевельника.
Можжевельные ягоды казахского можжевельника — <i>Juniperus Sabina</i> , можжевельное эфирное масло	Рвотное — апоморфин, сернокислая медь или сернокислый цинк. Промывание желудка. Высокие клизмы. Солевые слабительные. Обильное питье слизистых отваров. Жиров не давать. Мочегонные средства. Под кожу — кофеин, камфора или коразол, глюкоза, изотонический раствор хлористого натрия.
Молочая сок	См. Эвфорбий
Моносефт	См. Сулема
Морфин, его соли, кодеин, нарцеин, дионин, героин, опий, омнопон	Повторное промывание желудка (даже после подкожного применения) водной взвесью угля, раствором марганцевокислого калия 1:1000, 0,2% раствором таннина. Под кожу — атропин повторно. Внутрь — солевое слабительное. Кровапускание с последующим введением изотонического раствора хлористого натрия. Вдыхание кислорода или карбогена. Под кожу — цититон или лобелин, кофеин, коразол или камфора. Длительное искусственное дыхание. Теплые клизмы с раствором уксуса. Лед на голову. Следить за мочевым пузырем — катетеризация. Покой. Постельный режим. Противопоказаны рвотные.
Муравьиная кислота	См. Кислоты — помощь, как при отравлении серной кислотой.
Мускарин, мухомор — <i>Agaricus muscarius</i> ареколин, ацетилхолин хлорид, карбохолин	Под кожу — атропин. При приеме внутрь: рвотное — апоморфин. Промывание желудка водной взвесью угля. Солевые слабительные. Высокие клизмы. При явлениях коллапса — под кожу камфора, кофеин или коразол, цититон или лобелин. Вдыхание кислорода или карбогена. При сильном возбуждении — внутрь или в клизме: хлоралгидрат или барбитал. На голову холодные компрессы.
Мыло зеленое	Противопоказаны внутрь; кислоты, лимоны, уксус.
Мышьяк, белый мышьяк или мышьяковистая кислота (ее ангидрид), мышьяковая кислота и их соли.	См. Щелочи едкие
Фаулеров раствор, какодилат натрия, арренал, французская зелень, атоксил	Обильное промывание желудка водной взвесью угля, раствором жженой магнезии (20,0 на 1 л воды). Внутрь — повторно через 5 минут давать по 1 чайной ложке противоядия от мышьяка <i>Antidotum arsenici</i> или противоядия от металлов <i>Antidotum metallorum</i> и жженую магнезию. Солевые слабительные. Молоко, масляные эмульсии. Согревание тела, на живот грелки. Под кожу — камфора, кофеин, адреналин. Внутривенно — глюкоза, тиосульфат натрия.

Название препарата	Помощь при отравлении
Мышьяковистый водород	Внутривенно — адреналин, изотонические растворы глюкозы и хлористого натрия. Под кожу — кофеин или коразол. Промывание желудка водной взвесью угля. Согревание тела. Покой. Постельный режим.
Наперстянка — <i>Digitalis purpurea</i> D. <i>ambigua</i> , <i>D. ferruginea</i> , <i>D. lanta</i> , Дигален-нео, гитален, горичвет — <i>Adonis vernalis</i> , адонилен, адонизид, ландыш — <i>Convallaria majalis</i> , конвазид, конваллен, морской лук — <i>Bulbus Scillae</i> , семя строфанта — <i>Semen Strophanthi</i>	Полный покой. Постельный режим. Промывание желудка водной взвесью угля 0,2—0,5% раствором таннина. Солевые слабительные. Под кожу — атропин, камфора, кофеин. Внутривенно — изотонический раствор хлористого натрия или 40% раствор глюкозы. На кожу — горчичники. При рвоте — глотание льда кусочками. Рвотных не давать.
Нарколан	Под кожу — кордиамин, цититон или лобелин, кофеин. Искусственное дыхание с кислородом или карбогеном. Внутривенно — глюкоза. Промывание прямой кишки.
Нафталин, нафтол, бета-нафтол	Обильное промывание желудка водной взвесью угля. Рвотное — апоморфин. Солевые слабительные. Под кожу — кофеин, камфора или коразол. Внутривенно — глюкоза. Противопоказаны: жиры, масла алкоголь.
Нафтол	См. Нафталин
Нашатырный спирт, аммиак	Возможно раннее осторожное обильное промывание желудка (зонд хорошо смазать маслом) водой или слабым раствором лимонной, виннокаменной или уксусной кислоты. Внутрь — 1% раствор виннокаменной, уксусной или лимонной кислоты. Внутривенно или под кожу — изотонические растворы глюкозы или хлористого натрия. Морфин. При отравлении парами аммиака вдыхать теплые водяные пары или распыленный изотонический раствор хлористого натрия. Искусственное дыхание.
Неосальварсан	См. Новарсенол
Никотин	См. Табак
Нитрат серебра (азотно-серебряная соль, ляпис)	Промывание желудка 2% раствором хлористого натрия с последующим введением слабительного. Внутрь — 5% раствор хлористого натрия по 1 столовой ложке каждые 10 минут. Белковая вода, молоко, масляные эмульсии, слизистые отвары. Клизмы из молока и хлористого натрия, масляные клизмы. Лед на живот. При сильных болях — морфин. Под кожу при коллапсе — кофеин, камфора.
Нитрит натрия, нитроглицерин	Свежий воздух. Промывание желудка. Солевые слабительные. При резкой метгемоглобинемии —

Название препарата	Помощь при отравлении
Нитробензол Нитроглицерин Новарсенол , неосальварсан, миарсенол, сальварсан	кровопускание с последующим переливанием крови. Введение в вену изотонического раствора хлорида натрия. Внутривенно — глюкоза. Искусственное дыхание с кислородом или карбогеном. См. Анилин См. Нитрит натрия Внутривенно — 10 мл 10% раствора хлористого кальция, 15—40 мл 5% раствора тиосульфата натрия, 20 мл 40% раствора глюкозы. Лед на голову. Согревание тела. Внутрь — диуретин. Под кожу — кофеин, камфора или коразол. При судорогах — хлоралгидрат или барбитал. Постельный режим.
Новокаин Окислы азота	См. Кокаин Помощь, как при отравлении парами соляной кислоты, см. Кислоты — кислота соляная.
Оксид свинца Оксид углерода Омег водяной или болотный , вех ядовитый — <i>Cicuta virosa</i>	См. Свинец См. Угарный газ Рвотное — апоморфин. Промывание желудка водной взвесью угля. Внутрь уголь, солевое слабительное. Высокие клизмы. Под кожу — кофеин, камфора или коразол. Внутривенно — глюкоза. При судорогах — вдыхание эфира или хлороформа (осторожно!), внутрь — хлоралгидрат. При остановке дыхания — искусственное дыхание.
Омег пятнистый или болиголов — <i>Conium maculatum</i> , кониин	Рвотное — апоморфин. Промывание желудка 0,2% раствором таннина или раствором марганцовокислого калия 1:1000. Внутрь — уголь, солевое слабительное. Под кожу — кофеин, камфора, коразол, стрихнин. Внутривенно — глюкоза. Свежий воздух. Теплое обертывание, ванны, переливание крови. Искусственное дыхание.
Омнопон Опий Пантоцид Папоротник , его экстракт — <i>Extractum Filicis maris aethereum</i>	См. Морфин См. Морфин См. Хлор Промывание желудка водной взвесью угля. Внутрь — солевое слабительное. Под кожу — кофеин, камфора или коразол. Постельный режим. Теплые ванны, грелки. При судорогах — хлоралгидрат или барбитал. Противопоказаны: молоко, касторовое масло и другие масла и жиры.
Парахлорфенол Пикриновая кислота Пикротоксин , кукольван или рыбы ягоды — <i>Fructus Cocculi</i>	См. Фенол См. Кислоты Рвотное — апоморфин. Промывание желудка водной взвесью угля. Внутрь — уголь, солевое слабительное. Под кожу — атропин. При судорогах — внутрь хлоралгидрат или барбитал. Кровопускание с последующим внутривенным вливанием изотонического раствора глюкозы и хлористого натрия. Искусственное дыхание.
Пилокарпин	Промывание желудка водной взвесью угля. Под кожу атропин через 10 минут повторно до

Название препарата	Помощь при отравлении
Пирамидон Пирогаллол Пирокатехин Плазмоцид	3 раз. Кофеин, камфора. Покой. Постельный режим. Согревание тела. Внутрь — диуретин. Искусственное дыхание. См. Антипирин См. Фенол См. Фенол
Платифиллин Поганка бледная — <i>Amanita phalloides</i>, шампиньон ложный весенний — <i>Amanita phalloides var vernalis</i>, шампиньон ложный желтый — <i>Amanita phalloides mappa</i>	Полный покой. Постельный режим. Обильное питье щелочных вод. Кровопускание с последующим вливанием изотонического раствора глюкозы повторно. Глюкоза в капельных клизмах. Внутрь — настойка строфанта или адониды. Теплые ванны. Под кожу — кофеин, камфора. При глазных симптомах — ретробульбарные инъекции атропина. Затемненная комната. См. Атропин
Подофиллин Поташ Прозерин Пронаркон Престаргол Птоманы, колбасный яд, рыбий яд, сырный яд	Рвотное — апоморфин. Промывание желудка водной взвесью угля. Кровопускание с последующим вливанием изотонического раствора глюкозы. Под кожу — кофеин, коразол. Искусственное дыхание. См. Колоцинта плоды См. Селитра калийная См. Физостигмин См. Веронал См. Флаваргин
Ракитник Рвотный камень и другие препараты сурьмы	Внутримышечно 50—100 мл специфической противоботулиновой сыворотки. Рвотное — апоморфин или сернистая медь. Промывание желудка раствором марганцовокислого калия 1:1000 или 0,2% раствором таннина, или водной взвесью угля. Промывание толстой кишки сифонными клизмами. Солевое слабительное. Внутрь — уголь, крепкий чай и кофе. Под кожу кофеин, камфора или коразол. Под кожу или внутривенно — глюкоза. Согревание тела. Постельный режим. См. Акация желтая
Резорцин Ректон Риванол	Рвоту поддерживать питьем теплой воды, молока, слизистых отваров. Промывание желудка водной взвесью угля или 0,2% раствором таннина. Внутрь — молоко, белковая вода, лед кусочками, настойка опия. Под кожу — кофеин, камфора. Солевое слабительное. На живот — грелка. Постельный режим. Согревание тела. См. Фенол См. Веронал Промывание желудка изотоническим раствором хлористого натрия. Обильное питье молока и щелочных вод. Внутрь — диуретин, кофеин, камфора, цититон или лобелин. Искусственное дыхание с кислородом или карбогеном.

Название препарата	Помощь при отравлении
Рицин, клещевины семечина — <i>Semen Ricini</i>	Рвотное — апоморфин. Промывание желудка водной взвесью угля. Внутрь — слизистые отвары. Высокие клизмы. Под кожу — кофеин, камфора или коразол. Тепло на живот, при сильных болях — под кожу морфин. На голову холодные компрессы. Постельный режим.
Ртуть	См. Сулема
Рыбий яд	См. Птомаины
Сабадилла	См. Вератрин
Сабина (казацкий можжевельник)	См. Можжевельовые ягоды казацкого можжевельника
Салипирин	См. Салициловая кислота
Салициловая кислота и ее соли, аспирин, салипирин, ацесал, метиловый эфир салициловой кислоты	Рвотное — апоморфин. Промывание желудка 0,3% раствором двууглекислого натрия. Внутрь и в клизмах 2,5% раствор двууглекислого натрия. Под кожу — кофеин, камфора. Согревание тела.
Сальварсан	См. Новарсенол
Сантонин, цитварное семя	Рвотное — апоморфин, серноокислая медь или серноокислый цинк. Промывание желудка водной взвесью угля. Солевое слабительное. Высокие клизмы. Мочегонное. Под кожу — кофеин, камфора. При судорогах — хлоралгидрат или барбамил. Вдыхание хлороформа (осторожно). При коллапсе — кофеин, камфора. Теплые ванны. Противопоказано касторовое масло и другие масла и жиры.
Светильный газ	См. Угарный газ
Свинец, окись свинца, уксуснокислый свинец и другие соединения свинца	Рвотное — апоморфин и одновременно внутрь 20—30 г серноокислого натрия или магнезии. Промывание желудка раствором серноокислого натрия, водной взвесью угля. Внутрь — противоядие от металлов. Солевое слабительное. При болях — под кожу морфин с атропином, папаверин. Под кожу — кофеин, камфора. Теплые ванны. Внутривенно — хлористый кальций, аскорбиновая кислота.
Селитра калийная, поташ	Промывание желудка. Солевое слабительное. Пить слизистые отвары, молоко, щелочные воды. При болях в желудке — глотать лед кусочками; под кожу — морфин или омнопон, кофеин, камфора или коразол. Постельный режим. Внутрь — диуретин.
Серебро азотнокислое	См. Нитрат серебра
Серная кислота	См. Кислоты
Сернистая кислота, или двуокись серы, сернистый ангидрид, сернистый газ.	Свежий воздух. Искусственное дыхание. Вдыхание кислорода или карбогена. Внутрь — кодеин или дионин. Ингаляция распыленного 2% раствора двууглекислого натрия. Внутрь 2% раствор двууглекислого натрия столовыми ложками. Промывание слизистых оболочек тем же раствором. Под кожу — кофеин или коразол.

Название препарата	Помощь при отравлении
Сернистый ангидрид Сернистый газ Сероводород, клоачный газ	См. Сернистая кислота См. Сернистая кислота Свежий воздух. Искусственное дыхание. Вдыхание кислорода или карбогена. Под кожу — камфора или коразол. При явлениях отека легкого — обильное кровопускание с последующим вливанием изотонического раствора хлористого натрия или глюкозы. Переливание крови. Горчичники к икрам. Холодное обливание головы. Согревание тела.
Сероуглерод	Свежий воздух, искусственное дыхание с вдыханием кислорода или карбогена. Под кожу — кофеин, камфора или коразол. Кровопускание с последующим вливанием изотонического раствора глюкозы или хлористого натрия. Переливание крови. Если яд введен в желудок, то, кроме вышеуказанных мер помощи, промывание желудка водной взвесью угля. Под кожу — апоморфин.
Сивушное масло Синильная кислота, горький миндаль, вода горьких миндалей, лавровишневая вода, цианид калия, цианид натрия, цианистый газ, цианистый водород, амигдалин	См. Спирты При отравлении путем вдыхания — немедленно удалить больного из отравленной атмосферы. Свежий воздух. Вдыхание 0,3 мл амилнитрита (можно повторно). Внутривенно — 50 мл 1% раствора метиленового синего в 25% растворе глюкозы. Через 25—40 секунд внутривенно — 50 мл 25% раствора тиосульфата натрия. При приеме внутрь, кроме того, безотлагательное промывание желудка раствором марганцовокислого калия 1:1000 или 1—3% раствором перекиси водорода или 5% раствором тиосульфата натрия. Во всех случаях — вдыхание кислорода или карбогена, при необходимости искусственное дыхание. Под кожу — цититон или лобелин, кофеин, камфора, адреналин. Рвотное — апоморфин. Промывание желудка водной взвесью угля. Внутрь — уголь, слизистое питье, кусочками лед, солевое слабительное. Под кожу — кофеин, коразол, морфин или омнопон.
Скипидар, терпентинное масло	Рвотное — апоморфин. Промывание желудка водной взвесью угля. Внутрь — уголь, слизистое питье, кусочками лед, солевое слабительное. Под кожу — кофеин, коразол, морфин или омнопон.
Скополамин	Промывание желудка 0,2% раствором таннина или водной взвесью угля. Солевое слабительное. Высокие клизмы. При галлюцинациях — холод на голову. При угнетении дыхания — под кожу кофеин, цитион или лобелин. Искусственное дыхание.
Спирты, алкоголь винный, амиловый, древесный спирт, сивушное масло	Рвотное — апоморфин, сернокислая медь или сернокислый цинк. Промывание желудка теплой водой. При красноте лица — высокое положение головы, лед. Теплая ванна с холодным душем. Клизмы с уксусом или хлористым натрием. Горчичники на конечности. Вдыхание нашатырного спирта (осторожно, чтобы не обжечь лицо). Под кожу — кофеин,

Название препарата	Помощь при отравлении
Совкаин	камфора, стрихнин. Внутрь — нашатырный спирт (до 10 капель) с водой. Кровопускание. Вдыхание кислорода или карбогена. При возбуждении — морфин, хлоралгидрат или барбитал. Постельный режим.
Соляная кислота	
Сонбугал	
Спорынья — <i>Secale cornutum</i> , маточные рожки, эрготоксин	
Стрептоцид белый	См. Кокаин
Стрептоцид красный	См. Кислоты
Стрихнин, его соли, семена чилибухи или рвотного ореха — <i>Strychnos nux vomica</i>	См. Веронал
	Рвотное — апоморфин, сернокислая медь или сернокислый цинк. Промывание желудка водной взвесью угля или 0,2% раствором танина. Солевое слабительное. При судорогах — теплые ванны. Хлоралгидрат в клизме. Вдыхание амилнитрита (2—3 капли на платок). Под кожу при коме — кофеин, камфора.
	См. Сульфамидные препараты
	См. Сульфамидные препараты
	До наступления симптомов отравления — промыть желудок водной взвесью угля и вызвать рвоту (апоморфин). Солевое слабительное. Внутрь — танин, уголь, хлоралгидрат (2,0—5,0) в клизме. Внутривенно — 50 мл 2% раствора сернокислого магния; внутримышечно — 20 мл 25% раствора сернокислого магния. При наступлении судорог — осторожное хлороформирование. Постельный режим. Абсолютный покой. Затемненная комната. Противопоказано введение внутрь: кислот, кислых напитков, укуса.
Строфант	См. Наперстянка
Строчок — <i>Helvella esculenta</i>	Рвотное — апоморфин. Промывание желудка водной взвесью угля. Внутрь — касторовое масло в эмульсии. Под кожу — кофеин, камфора или коразол. Внутривенно — глюкоза, изотонический раствор хлористого натрия. Противопоказаны внутрь: кислоты, укусы.
Сулема, каломель, ртуть, ее соли, киноварь, моносепт, меркузал	При отравлении через рот — немедленно внутрь 100 мл противоядия от металлов — <i>Antidotum metallorum</i> после чего минут через 10 промыть желудок водным раствором этого же противоядия (100 мл противоядия в 2—4 л воды). При отсутствии противоядия промыть желудок водной взвесью угля или жженой магнезией с водой. Внутрь — молоко, белковая вода, слизистые отвары, большое количество жидкости. Под кожу — кофеин, камфора или коразол. Внутривенно 20 мл 40% раствора глюкозы или 10 мл 5% раствора тиосульфата натрия. Рот полоскать каждый час раствором перекиси водорода или марганцовокислого калия. Согревание тела, теплые ванны, потенье. При отравлении ядом, введенным под кожу или внутривенно, меры и средства помощи те же, исключая применение внутрь противоядия от

Название препарата	Помощь при отравлении
Сульфазол	металлов. Противопоказано введение внутрь: хлористого натрия (поваренной соли), кислот и каких бы то ни было просоленных продуктов (селедка, ветчина и т. п.).
Сульфамидные препараты: стрептоцид белый, стрептоцид красный растворимый, дисульфан, сульфазол, сульфидин и др.	См. Сульфамидные препараты Прекратить давать препарат. Постельный режим. Промыть желудок водной взвесью угля. Внутрь — касторовое масло, обильное питье жидкостей, особенно щелочных вод. Капельные солевые клизмы. Внутривенно — 40% раствор глюкозы в изотоническом растворе хлористого натрия. Под кожу 5 мл 1% раствора никотиновой кислоты 3 раза в день. Внутрь — настойка ландыша, диуретин, кофеин. При метгемоглобинемии — внутривенно раствор глюкозы. Вдыхание кислорода. Повторное переливание крови. Не давать спиртных напитков. При поражении печени — внутривенно 40% раствор глюкозы и одновременно 10 единиц инсулина. Противопоказаны барбитураты (как снотворное).
Сульфат меди, медный купорос, серномедная соль и другие соли меди, медные краски	Рвоту поддерживать обильным питьем теплого молока, белковой воды, слизистых отваров. Промывание желудка 0,1% раствором желтой кровяной соли или раствором марганцовокислого калия (1:1000). Внутрь — 1% раствор марганцовокислого калия по 1 столовой ложке каждые 15 минут или жженая магнезия (30,0); белковая вода, солевое слабительное. На живот — грелки. Под кожу — кофеин, стрихнин. При болях — морфин или омнопон. Противопоказаны: кислоты, жиры и масла.
Сульфидин	См. Сульфамидные препараты
Сурьма и ее препараты	См. Рвотный камень
Сырный яд	См. Птомаины
Табак — <i>Nicotiana rustica</i>	При отравлении частями растения рвотное — апоморфин или сернокислая медь, или сернокислый цинк. Промывание желудка водной взвесью угля. Внутрь — солевое слабительное. При отравлении никотином и при курении — холодный компресс на голову, промывание желудка водной взвесью угля. И в том и в другом случае отравления — под кожу дигаленео или конвазид, атропин. На живот — согревающие компрессы, пить теплое молоко. При спазме сосудов — вдыхание амилнитрита. При судорогах — гексенал или барбитал внутримышечно. Раствор уксуснокислого натрия 10% 20—40 мл внутривенно.
Термопсис — <i>Thermopsis lanceolata</i>	Рвоту поддерживать теплым молоком, белковой водой. Промывание желудка 0,2% раствором танина или водной взвесью угля (повторно). При судорогах — внутрь хлоралгидрат. При

Название препарата	Помощь при отравлении
Терпентинное масло Тетрахлорметан Тиокаин Толуидин Трипротамин-цинк-инсулин Трихлоруксусная кислота Угар Угарный газ, окись углерода, светильный газ, угар, взрывные газы Углерод четыреххлористый, тетрахлорметан Уксусная кислота Уксусная эссенция Укус змеи Фаулеров раствор Фенамин Фенацетин Фенол, карболовая кислота, крезолы, лизол, креолин, параклорфенол, пирокатехин, резорцин, гидрохинон, пирогаллол, креозот, гваякол, гексилрезорцин	общем угнетении — под кожу кофеин, камфора или коразол, изотонический раствор глюкозы или хлористого натрия. Согревание тела. Искусственное дыхание. Постельный режим. См. Скипидар См. Углерод четыреххлористый См. Кокаин См. Анилин См. Инсулин См. Кислоты См. Угарный газ Свежий воздух. Длительное искусственное дыхание. Вдыхание кислорода или карбогена. Вдыхание нашатырного спирта. Лед на голову. Внутрь — кофе, крепкий чай. Под кожу — цититон или лобелин, кофеин, глюкоза, изотонический раствор хлористого натрия. Внутривенно — 50—100 мл 25% раствора глюкозы. На конечности — горчичники или грелки. Постельный режим. При отравлении путем вдыхания — свежий воздух, под кожу — кофеин, коразол, лобелин. Внутривенно — глюкоза, хлористый кальций. Длительное искусственное дыхание. Вдыхание кислорода или карбогена. При отравлении путем проглатывания — немедленно внутрь сернокислую медь или под кожу — апоморфин. Промывание желудка водной взвесью угля. Внутрь — солевое слабительное, уголь. Кроме того, использовать все, что указано выше при отравлении путем вдыхания этого яда. См. Кислоты См. Кислоты См. Змеиный яд См. Мышьяк Кровопускание с последующим вливанием изотонического раствора хлористого натрия. Внутрь — двууглекислый натрий. Внутривенно — 20 мл 40% раствора глюкозы. Под кожу — омнопон. Хлоралгидрат или барбитал внутрь или в клизме. Полный покой. См. Анилин Промывание желудка водной взвесью угля, жженой магнезией или тиосульфатом натрия (30,0 на 1 л воды) до исчезновения запаха фенола. Солевое слабительное. Внутрь — известковая вода или жженая магнезия (20,0—200,0) через 5 минут по 1 столовой ложке, кусочки льда, слизистое питье, белковая вода. Под кожу — кофеин, камфора или коразол. Согревание тела. Ингаляции содовым раствором. При сужении голосовой щели — трахеотомия.

Название препарата	Помощь при отравлении
	Интубация. Противопоказаны внутрь: сливки, молоко, масло, жиры, спирт. Примечание. Жидкую карболовую кислоту удаляют с поверхности тела немедленно, смывая ее спиртом или вазелином или каким-либо жирным маслом.
Физостигмин. Эзерин. Прозерин	Под кожу — немедленно атропин. Рвотное — апоморфин. Промывание желудка раствором марганцовокислого калия (1:1000), водной взвесью угля, раствором танина (1:500). Внутрь — солевое слабительное, уголь. Под кожу — камфора, цититон или лобелин, кофеин. Искусственное дыхание. При судорогах — осторожное вдыхание хлороформа.
Флаваргин, колларгол, эларгол, протаргол	При отравлении после внутреннего или внутримышечного введения препарата — немедленно глюкоза под кожу или внутривенно. Под кожу — кофеин, камфора или коразол, цититон или лобелин. Искусственное дыхание с вдыханием карбогена.
Формалин (формальдегид)	При вдыхании паров — свежий воздух. Вдыхать водяные пары с примесью нашатырного спирта. Под кожу — кофеин, камфора, цититон или лобелин. При приеме внутрь — промывание желудка разведенным 3% раствором углекислого или уксуснокислого натрия. Солевое слабительное, высокие клизмы. Внутрь по 20 капель нашатырно-анисовых капель повторно или 15% раствор уксуснокислого аммония столовыми ложками. По 1,2—2,0 мочевины через 2 часа. Белковая вода, яичный белок, молоко. Под кожу — кофеин, камфора.
Фосфор	Частые повторные промывания желудка 0,1—0,5% раствором сернокислой меди или 0,04% раствором марганцовокислого калия. Внутрь — 1% раствор сернокислой меди через 5 минут по чайной ложке до наступления рвоты или 0,1% раствор марганцовокислого калия по столовой ложке через 15 минут. Слизистые отвары, щелочные воды. Солевое слабительное. Постельный режим. Примечание. При попадании на кожу кусочков фосфора смыть их водой, а на обожженные места наложить повязку, смоченную 5% раствором сернокислой меди или 5% раствором двууглекислого натрия, чередуя эти примочки до прекращения болей. Противопоказаны: жиры, масла, молоко, яйца.
Французская зелень Фтористоводородный газ	См. Мышьяк Внутривенно — хлористый кальций и глюкоза. Под кожу — кофеин, коразол. Искусственное дыхание. Вдыхание карбогена.
Фтористый натрий, кремнефтористый натрий	Промывание желудка. Внутрь — солевое слабительное, известковая вода, слизистые отвары,

Название препарата	Помощь при отравлении
Хинин	белковая вода. Внутривенно хлористый кальций (повторно через 1—2 часа). Промывание желудка водной взвесью угля или 0,2—0,5% раствором таннина. Внутрь — касторовое масло. Под кожу — кофеин, камфора. Теплые ванны с холодным обливанием. При судорогах — хлоралгидрат. При спазмах сосудов — вдыхать амилнитрит.
Хлор, хлорная вода, белильная или хлориновая известь, хлорноватистокислый натрий, жавелевая вода, хлористый водород, хлорамин, дихлорамин Б, хлорацид, пантоцид	При отравлении путем вдыхания — удаление из отравленной атмосферы в лежащем положении. Согревание. Внутривенно 5—10 мл 10% раствора хлористого кальция. Кровопускание (400—600 мл) с последующим введением внутривенно 40% раствора глюкозы 100 мл. Вдыхание кислорода. Под кожу — камфора, кофеин. При раздражении глаз — промывание 2% содовым раствором. Вдыхать теплые водяные пары с примесью нашатырного спирта. При сердечной слабости — настойка строфанта внутрь, строфантин внутривенно. Полный покой. Постельный режим. При приеме внутрь: промывание желудка 2% раствором тиосульфата натрия и затем водой. Внутрь — 5—15 капель нашатырного спирта с водой, белковая вода, раствор соды, молоко. Рвотное — апоморфин. Полный покой, постельный режим.
Хлоралгидрат	Повторное промывание желудка. Солевое слабительное. Повторно высокие клизмы. Внутрь — крепкий чай или кофе. Под кожу — кофеин, камфора или коразол, стрихнин, цититон или лобелин. Внутривенно — глюкоза с адреналином. Искусственное дыхание. Вдыхание кислорода или карбогена. Постельный режим. Согревание тела.
Хлорамин	См. Хлор
Хлорацид	См. Хлор
Хлориновая известь	См. Хлор
Хлорная вода	См. Хлор
Хлороформ, хлорэтил, хлорэтон	При отравлении путем вдыхания — прекратить наркоз. Свежий воздух. Искусственное дыхание с вдыханием карбогена. Внутривенно — 2 л изотонического раствора хлористого натрия, подогретого до температуры тела. Согревание. Под кожу — кофеин, камфора. Массаж сердца. При приеме внутрь — промывание желудка. Солевое слабительное. Искусственное дыхание. Под кожу — атропин, адреналин, кофеин, камфора. Внутривенно 20 мл 40% раствора глюкозы, одновременно 5 единиц инсулина повторно.
Хлорэтил	См. Хлороформ
Хлорэтон	См. Хлороформ
Хромовая кислота	См. Кислоты
Цианид калия	См. Синильная кислота
Цианид натрия	См. Синильная кислота

Название препарата	Помощь при отравлении
Цианистый водород Цианистый газ Цинк, сульфат цинка или цинковый купорос, цинковые белила, хлорид цинка и другие соли цинка Цитварное семя Цитизин Чемерица Чилибуха Шампиньон весенний Шампиньон желтый Шпанские мушки — <i>Cantharides</i> или <i>Lytta vesicatoria</i>, кантаридин Щавелевая кислота Щелочи едкие, едкое кали, едкий натр, аммиак, нашатырный спирт, зеленое мыло Эвфорбий, сок молочая Эзерин Эларгол Эметин Эрготоксин Эфедрин Эфир	См. Синильная кислота См. Синильная кислота Поддерживать рвоту питьем теплого молока и белковой воды. Промывание желудка 2% раствором двууглекислого натрия или 0,2% раствором танина. Внутрь — щелочные воды, слизистые отвары, молоко, яичный белок, позднее — опий. Солевое слабительное. Под кожу — кофеин, камфора или коразол. Внутривенно — глюкоза, хлористый натрий. На живот — грелки или согревающие компрессы. См. Сантонин См. Акация желтая См. Вератрин См. Стрихнин См. Поганка бледная См. Поганка бледная Обильное промывание желудка. Рвотное — апоморфин. Солевое слабительное. Внутрь — слизистые отвары, белковая вода. При болях — глотать лед кусочками. Под кожу — морфин или омнопон, кофеин, коразол. Постельный режим. Противопоказано внутрь: молоко, масла, жиры, эфир, кислоты. См. Кислоты Возможно раннее осторожное промывание желудка водой, подкисленной уксусной кислотой (зонд хорошо смазать маслом). Внутрь — 1% раствор виннокаменной, уксусной или лимонной кислоты, повторно столовыми ложками через 5 минут. Слизистое питье с прибавлением тех же кислот. Обильное питье молока, масляных эмульсий. При болях — глотать лед кусочками. Ингаляции содовым раствором. Под кожу — морфин или омнопон, кофеин, камфора или коразол. Постельный режим. При попадании щелочей на кожу смыть их водой, а на обожженные места положить примочку с 5% раствором уксусной, лимонной или виннокаменной кислоты. См. Колоцинт См. Физостигмин См. Флаваргин См. Ипекакуана См. Спорынья См. Адреналин Свежий воздух. Вдыхание кислорода или карбона. Искусственное дыхание. Под кожу — стрихнин, цититон или лобелин, кофеин, камфора, адреналин. Изотонический раствор глюкозы или хлористого натрия. При замедлении дыхания давать нюхать нашатырный спирт.

SISUKORD — СОДЕРЖАНИЕ

Eessõna	3
Mürgiste ja kangetoimeliste ravimite suurimad ühekordsed ja ööpäevased annused täiskasvanuile	5
Mürgiste ja kangetoimeliste ravimite suurimad ühekordsed annused lastele	11
Tilgatabel	16
Ravimid, mida rakendatakse abiandmiseks ägedate mürgituste puhul	17
Vastumürkide ja mürgistustel tarvitataivate vahendite tabel	20
Предисловие	39
Высшие разовые и суточные дозы ядовитых (А) и сильнодействующих (Б) лекарственных средств для взрослых	41
Высшие разовые дозы ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств	47
Таблица капель	53
Лекарственные вещества, применяемые для оказания помощи при острых отравлениях	54
Таблица противоядий и пособий при отравлениях.	58

Toimetaja J. Metsar.

Tehniline toimetaja Alb. Ruutsoo.

Korrektorid

P. Hiie, M. Sepp ja N. Kruglova.

Ladumisele antud 10. X 1954.

Trükkimisele antud 5. I 1955.

Trükkimise arv 3000. Paber 60 × 92, 1/16.

Trükipoognaid 5. Arvutuspoog-

naid 6,26. MB-00003. Trükikoda

«Ühiselu», Tallinn, Pikk tän. 40/42,

Tellimise nr. 3740.

На эстонском и русском
языках.

Hind rbl. 3.15

Rbl. 3.15

A
20297

TÜ RAAMATUKOGU



1 0300 00567588 1