

№ 6

Catalogue

des espèces paléarctiques de tribu *Mylabrina*

(Coleoptera, Meloidae)

Par

G. G. Soumacov

Tartus

№ 359.

Tartu, 1980

№ 6

Catalogue
des espèces paléarctiques de tribu
Mylabrina

(Coleoptera, Meloidae)

Par

G. G. Soumacov

Tartu, 1930

EESTI
KIRJANDUSE SELT

TARTU ÜLIKOOLI LOODUSUURIJATE SELTSI ARUANNETEST
TARTU ÜLIKOOLI RAAMATUKOGU

Catalogue

des espèces paléarctiques de tribu

Mylabris

Äratrükk „Tartu ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi aruannetest“
XXXVII, 1—2, 1930

21931926

TARTU ÜLIKOOLI
RAAMATUKOGU

K. Mattieseni trükikoda o/ü., Tartus, 1930.

Catalogue des espèces paléarctiques de tribu Mylabrina (Coleoptera, Meloidae).

G. G. Soumakov.

Préface.

Les mylabrides dont le genre de *Mylabris* occupe une situation dominante par la richesse de leurs espèces sont encore très faiblement étudiées. Laissant de côté la monographie de Bilberg¹⁾, trop vieille, il n'y a de spécialement dédiées aux Mylabrides que deux monographies de Marseul²⁾ parues l'une après l'autre presque en même temps.

Malgré des manques assez importants dans le système et la pauvreté des données sur les limites de divulgations géographiques des espèces, ces deux oeuvres n'ont pas perdu leur signification jusqu'à présent. La connaissance de ces oeuvres est même nécessaire à ceux qui s'intéressent à ce groupe d'insectes.

Soixante années sont passées depuis l'apparition des monographies de Marseul. Durant ce temps beaucoup de nouvelles espèces, variations et aberrations ont été décrites. Une certaine partie des formes décrites a une valeur très douteuse et exige une critique sérieuse. La publication d'une nouvelle monographie semblable à celle de Marseul paraît indispensable. Cependant jusqu'à présent nous n'en avons pas. Outre mon travail³⁾ il n'est paru ni de déterminateur ni de catalogue systématique qui donneraient des renseignements plus ou moins complets sur les espèces paléarctiques de la tribu Mylabrina.

1) Bilberg: *Monographia Mylabridum*, 1813.

2) Marseul: *Monographie des Mylabrides d'Europe*. L'Abeille, VII, 1870. Marseul: *Monographie des Mylabrides*, 1872.

3) Soumakov: *Les espèces paléarctiques du genre Mylabris* F. Horae Soc. Ent. Ross. XLII, 1915.

Pour compléter un des manques sus-mentionnés, je me propose de donner un catalogue systématique en espérant qu'il facilitera à un certain degré à l'avenir une étude plus approfondie du groupe d'insectes qui nous intéresse.

Ce catalogue projeté est en un certain degré une revue de mes travaux antérieurs concernant le système. Il renferme toutes les espèces paléarctiques de la tribu Mylabrina que je connais et se compose des quatre genres suivants: *Calydus* Reitt., *Mylabris* F., *Hycleus* Latr. et *Sitaromorpha* Dokh.

Pour chaque espèce sont indiquées: 1) la littérature qui donne une pleine caractéristique de l'espèce; 2) la synonymie et 3) les données complètes qui fixent les limites géographiques de la divulgation de l'espèce. Les espèces insérées dans ce catalogue sont rangées par ordre systématique selon la ressemblance des symptômes extérieurs. Quant aux espèces qui me sont inconnues en nature cet ordre est peut-être incomplet. En ce cas il faut me rapporter aux auteurs des espèces décrites.

Quant aux termes employés au catalogue: „morphe“ et „aberration“ et aussi aux points d'interrogation devant les dénominations des espèces, des sous-espèces, des morphes, des aberrations et devant les dénominations des lieux où on trouve la forme indiquée, je trouve qu'il me faut donner les explications suivantes.

Il n'y a pas dans la littérature entomologique d'opinion définitive sur les limites des catégories systématiques et surtout sur les catégories inférieures de l'espèce. La morphe, par exemple, comme la comprend A. P. Semenov-Tjan-Shansky, qui était le premier qui proposa ce terme en 1906, est considérée par quelques entomologistes comme une sous-espèce écologique qui s'ajuste à certaines conditions de vie; les autres la considèrent comme une variété non-héréditaire qui est le résultat des influences accidentelles extérieures. Quant à l'aberration les uns la considèrent comme une catégorie inférieure de l'espèce, les autres l'identifient à une race, mais pas dans le sens d'une sous-espèce.

Pour moi, je considère la morphe et l'aberration dans le sens que leur a donné A. P. Semenov-Tjan-Shansky dans son travail très instructif (Таксономическія границы вида и его подраздѣлений. Мém. de l'Ac. Imp. des Sc. de St.-Pet. XXV, 1910), à savoir:

La morphe c'est la forme primordiale de la race non affermie encore par l'hérédité de ses symptômes définitifs et qui n'a

pas d'habitation aréal; si les conditions changent elle reprend facilement sa forme primordiale.

L'aberration c'est le changement individuel de la forme primordiale qui ne s'étend jamais sur tous les indivisibles et qui dépend dans la plupart des cas d'influences accidentelles.

Le point d'interrogation devant les dénominations d'une espèce, d'une sous-espèce et d'une morphe marque le doute de l'indépendance de la forme et exige un examen de ce type; ou bien le point d'interrogation met en doute que la forme donnée soit casée dans la juste catégorie systématique.

Le point d'interrogation devant les mots indiquants l'habitation de l'espèce nommée marque le doute que l'espèce, la sous-espèce ou la morphe données se trouvent en vérité dans le lieu indiqué.

En conclusion je me fais un devoir bien agréable d'exprimer ma reconnaissance la plus profonde aux mes honorés collègues-entomologistes M. Pic et N. Plavilstshikov, qui ont bien voulu prendre la peine de me donner des renseignements nécessaires pour mon catalogue.

Tartu (Jurjev),

2 avril 1930.

I. Gen. **Calydus** Reitt. 1896.

Caloenas Reitt., Deut. E. Z. XXXIII, 1889, p. 34. —
Eschr., *ib.* XXXV, 1891, p. 228.

Calydus Reitt., Wien. E. Z. XV, 1896; Fn. Germ. III,
1911, p. 393.

1. *pulcher* Reitt. 1889.

Caloenas pulcher Reitt., Deut., p. 35. — Eschr., Wien.
E. Z. XV, 1896, p. 123.

Hab: Transcaspia, (prov. Erivan).

2. *semenovi* Eschr. 1896,

Caloenas semenovi Eschr. l. c.

Hab.: Persia.

3. *orniticollis* Eschr. 1896.

Caloenas orniticollis Eschr. l. c.

Hab.: Persia.

4. *escherichi* Reitt. 1898.

Calydus escherichi Reitt., Deut. E. Z. XLII, 1898, p. 351.

Hab.: Asia Minor.

II. Gen. **Mylabris** F. 1775.

Mylabris F., Syst. ent. 1775, p. 261; Ent. syst. I,
P. II, 1792, p. 87. — Ol. Ent. III, 1795, p. 3. — F., Syst.
Eleut. II, 1801, p. 79. — Latr., Gen. Crust. II, 1807, p. 215.
— Ol., Enc. meth. VIII, 1811, p. 88. — Lap.-Cast., Hist.
nat. ins. II, 1840, p. 269. — Muls., Hist. nat. Col. 1857, p.
109 (prt). — Redt., Fn. Austr. 1858, p. 652. — Mrs., L'Ab.
VII, 1870, p. 4; Mon. Myl. 1872, p. 5. — Кенп (Koepp.),
Вредн. насѣк. II, стр. 262. — Beaur, Ins. ves 1890, p. 439.
— Kunt., Käf. Deut. 1912, p. 704. — Порч. (Portsch.), Тр.
Бюро ЭТН. XI, 1914, стр. 12. —

Decatoma Latr., Lap.-Cast. l. c., p. 268 (prt).

Zonabris E. Har., Col. Hft. XVI, 1879, p. 134. — Dokh Hor. S. E. Ross. XXIV, 1889, p. 133. — Reitt., Fn. Germ. III, 1911, p. 393. — Calw., Käfb. II, 1914. p. 754.

Megabris Goz., Recher. esp. typ. 1886.

Decapotoma Voigts, Wien. E. Z. XXI, 1902, p. 177.

Subg. **Mylabris** in sp.

Mrs., L'Ab. VII, 1870, p. 13; Mon. Myl., 1872, p. 17.

1. **hemprichi** Klg. 1845.

Mylabris hemprichi Klg., Symb. phys. IV, 1845, p. 3. — Reiche, Ann. S. E. Fr. 1865, p. 640, n. 55. — Gemm. et Har., Cat. Col. VII, 1870, p. 2138. — Mrs., L'Ab. VII, 1870, p. 155; Mon Myl. 1872, p. 181, n. 168, tb. III, f. 108. — Sum., Hor. S. E. Ross. XLII, 1915, p. 3.

Zonabris hemperichi Eschr., Wien E. Z. XVIII, 1899, p. 88. — Esc., Bol. R. Sc. Esp. IX, 1909, p. 249; Trab. Mus. Nac. Madr. 1914, p. 395.

Hab.: Marocco (Marraquesh), Algeria (El-Archout), Tunisia, Tripolitania, Aegyptus; Syria, Persia mer.

2. **munda** Eschr. 1897.

Zonabris munda Eschr., Stett. E. Z. LVIII, 1897, p. 38.

Mylabris munda Sum. l. c.

Hab.: Asia Minor (Angora).

3. **doriae** Mrs. 1870.

Mylabris doriae Mrs. L'Ab., p. 164. — Gemm. et Har. l. c., p. 2136. — Mrs., Mon. 1872, p. 185, n. 176, tb. III, f. 116. — Sum. l. c., p. 4.

Zonabris doriae Eschr., Wien. E. Z. XVIII, 1899, p. 88. ab. *persicola* Pic.

Zonabris doriae var. *persicola* Pic, L'Ech. XXV, 1909, p. 171.

Zonabris doriae var. *persica* Pic, id. XXIV, 1908, p. 74 (nom. praeocc.).

Mylabris doriae ab. η Sum. l. c.

ab. *boetcheri* Pic

Zonabris doriae var. *boetcheri* Pic, L'Ech. XXV, 1909, p. 171.

Mylabris doriae ab. ϑ Sum. l. c.

ab.: α , β , γ , δ , ϵ , ϵ Sum. l. c.

ab. *centropunctata* Bod.

Zonabris doriae var. *centropunctata* Bod., Deut. E. Z. 1916, p. 112.

ab. *magnificia* Bod.

Zonabris doriae var. *magnificia* Bod. l. c.

ab. *viridibifasciata* Pic

Zonabris doriae var. *viridibifasciata* Pic, L'Ech. XXXVI, n. 400, 1920, p. 13.

ab. *viridifasciata* Pic

Zonabris doriae var. *viridifasciata* Pic, ibid.

ab. *bodoi* Pic

Zonabris doriae var. *bodoi* Pic, ibid (Note).

Zonabris doriae var. *unifasciata* Bod. l. c. (nom. praeocc.).

ab *luristanica* Pic

Zonabris doriae var. *luristanica* Pic, l. c., p. 12.

Hab.: Persia (distr. Teheran et prov. Luristan).

4. *trifascis* Pall. 1773.

Meloe trifascis Pall., Reise II, 1773, p. 721, n. 52.

Meloe trivittis Goeze, Ent. Beitr. I, 1777, p. 702, n. 4.

— Pall., Icon. ins. 1781, p. 92, tb. E, f. 20.

Meloe trifasciata Gmel. in Linn. Syst. Nat. I, P. IV, 1788, p. 2020.

Lytta trivitta Schh., Syn. ins. III, 1817, p. 25, n. 31.

Mylabris trifascis Fisch. J., Tent. 1827, p. 20.

Mylabris pallasii Gebl., Mém. S. N. Mosc. (Nouv.) I,

1829, p. 170, n. 18; in Ledeb. Reise 1830, p. 138, n. 10;

Bull. S. N. Mosc. XX, 1847, p. 502, n. 16. — Gemm. et Har.

l. c., p. 2140. — Mrs., L'Ab., 167; Mon. 1872, p. 186, n.

178, tb. III, f. 118. — Baudi, Berl. E. Z. XXII, 1878, p. 376.

— Beur. Ins. ves. 1890, p. 533. — Sum. l. c.

Mylabris gemmula Dohrn, Stett. E. Z. XXXIV, 1873, p. 73.

Zonabris pallasii Heyd., Cat. Col. Sib. 1881, p. 154.

Hab.: Rossia or. (distr. Uralsk); Sibiria (lac. Zaisan-nor), Turkestan (Semiretshje: Dzharkent; Fergana: Margelan), Bucharia or., prov. Transcaspica (Tedzhen, Kushka) et Persia (Shahrud).

5. *marginata* Fisch.-W. 1844. ¹⁾

1) L. Heyden, et plus tard W. Dokhtourov comptent par méprise *M. marginata* pour synonyme de *M. confluens* Fisch.-W. Il n'y a rien de commun entre ces espèces.

- Mylabris marginata* Fisch.-W., Bull. S. N. Mosc. XVII, 1844, p. 136, n. 154, tb. 3, f. 6. — Mars., L'Ab. VII, 1870, p. 136; Mon. Myl. 1872, p. 168, n. 146, tb. 3, f. 88. — Sum. l. c., p. 5; Sitzungsab. Nat.-Ges. b. Univ. Dorp. XXXI, 1924, p. 80 n. 1.
- Zonabris marginata* Mrs. Heyd., Cat. Col. Sib. 1881, p. 153. — Dokh., Hor. S. E. Ross. XXIV. 1889, p. 165, n. 43. Hab.: Dzhungaria, Dauria, Armenia.
6. *pulchella* Fald. 1833.
- Mylabris pulchella* Fald., Bull. S. N. Mosc. V, 1833, Lég., n. 11, tb. 10, f. 7. — Gemm. et Har., Cat. Col. VII, 1870, p. 2141. — Mrs., L'Ab. VII, 1870, p. 165; Mon. Myl. 1872, p. 185, n. 177, tb. 3, f. 117. — Beaur, Ins. ves. 1890, p. 534. — Sum. l. c.
- Zonabris pulchella* Heyd., Cat. Col. Sib. 1881, p. 154. — Eschr., Wien. Ent. Z. XVIII, 1899, p. 89. Hab.: Des. kirgisorum.
7. ? *sairamensis* Ball. 1878.
- Mylabris sairamensis* Ball., Bull. S. N. Mosc. LIII, 1878, p. 342, n. 184. — Sum., Hor. S. E. Ross. XLII, 1915, p. 6.
- Zonabris sairamensis* Heyd. l. c. — Dokh., Hor. S. E. Ross. XXIV, 1889, p. 167, n. 48, tb. II, f. 55. Hab.: Turkestan (Sajram, prope Tshimkent) Dzhungaria (Kuldzha, Fu-kan).
8. *tenuipicta* Fairm. 1892,
- Mylabris tenuipicta* Fairm., Ann. S. E. Belg. XXXVI, 1892, p. 154. — Sum. l. c., p. 3.
- ab. *marsabensis* Pic
- Zonabris tenuipicta* var. *marsabensis* Pic. Misc. Ent. VI, 1898, p. 73. Hab.: Syria.
9. *isis* Mars. 1876,
- Mylabris isis* Mars., L'Ab. XIV, 1876 p. 28. — Beaur., Ins. ves. 1890, p. 530. Hab.: Aegyptus.
10. *coerulescens* Gebl. 1841.

La faute des auteurs nommés s'explique par la faute d'impression dans le travail de Fischer v. Waldheim (Ehtomogr. II, 1823, tb. XI, f. 10.). Voir Sum. Sitzungsab. l. c.

Mylabris coerulescens Gebl., Bull. Ac. St.-Pet. VIII, 1841, p. 374, n. 18; Bull. S. N. Mosc. XXXII, 1859, p. 486, n. 4. — Gemm. et Har. l. c., p. 2135. — Mrs., L'Ab. VII, 1870, p. 157; Mon. 1872, p. 181, n. 169, tb. III, f. 109. — Beaur. l. c., p. 524. — Sum. l. c., p. 6.

Zonabris coerulescens Heyd., Deut. E. Z. XXV, 1881, p. 327; Cat. Col. Sib. 1881, p. 153. — Dokh. l. c., p. 137, n. 6, tb. II, f. 35. — Heyd., Cat. Col. Sib., Nacht. I, 1893, p. 129. — Eschr. l. c.

Hab.: Desert. Kirgis., Turkestan (Semiretshje et Fergana: Margelan).

11. *speciosa* Pall. 1781.

Meloe festiva var. *a* Pall. Reise 1773, App., p. 721, n. 54. — Goeze, Ent. Beitr. I, 1777, p. 702, n. 6.

Meloe speciosa Pall., Icon. ins. 1781, p. 84, tb. E, f. 9.

Mylabris festiva F., Ent. syst. 1792, p. 85, n. 9. — Reiche, Ann. S. E. Fr. 1865, p. 636, n. 26.

Mylabris speciosa Schh., Syn. ins. III, 1817, p. 41, n. 50. — Fisch.-W., Entomogr. II, 1824, p. 224, n. 1, tb. XL, f. 1. — Fisch. J., Tent. 1827, p. 10, n. 62. — Gebl., Mém. S. N. Mosc. (Nouv.) I, 1829, p. 165, n. 13; in Ledeb. Reise 1830, p. 139, n. 17; Mém. S. N. Mosc. VIII, 1832, p. 57, n. 4. — Gebl., Bull. S. N. Mosc. XX, 1847, p. 501, n. 14. — Gemm. et Har. l. c., p. 2143. — Mrs., L'Ab., p. 161; Mon. 1872, p. 183, n. 173, tb. III, f. 113. — Baudi, l. c., p. 371. — Beaur. l. c., p. 536. — Sum. l. c.

Zonabris speciosa Heyd., Cat., Col. Sib. 1881, p. 153; Deut. E. Z. XXXVI, 1892, p. 107; Cat. Col. Sib., Nacht. I, 1893, p. 131. — Eschr. l. c.

ab. b. Gebl.

Mylabris speciosa var. *b*. Gebl., Bull. S. N. Mosc. XX, 1847, p. 501, n. 14.

ab. c. Gebl. *ibid.*

Zonabris speciosa var. *kenteiana* Pic, L'Ech. XXXII, 1916, p. 7.

Hab.: Sibiria (Semipalatinsk, Tomsk, Minusinsk, Irkutsk, distr. Troitzkosavsk, flum. Onon), Turkestan (prov. Syr-darjensis), Mongolia (Ust-Kiran, Hantshartuj, jugum Kentei) et China (Shan-Si).

12. *brevicornis* Mot. 1872.

Mylabris brevicornis Mot., Bull. S. N. Mosc. XLV, 1872, p. 50.

Zonabris brevicornis Heyd., Cat. Col. Sib. 1881, p. 153; Cat. Col., Nacht. I, 1893, p. 131.

Hab.: Sibiria (Dauria).

13. *mongolica* Dokh. 1887.

Zonabris mongolica Dokh., Hor. S. E. Ross. XXI, 1887, p. 345; XXIV, 1889, p. 192, tb. II, f. 58. — Eschr. l. c.

Mylabris aurora Eschr., Münch. Kol. Z. 1904, p. 34, ff. 1 et 2.

Mylabris mongolica Sum. l. c., p. 7.

ab.: *a* et *β* Sum. l. c.

Hab.: Turkestan chinense (lac. Bggratsh-kul), Mongolia bor.-occ. (Ordos, Alashan) et China (Shan-Si).

14. *ledebouri* Gebl. 1829.

Cantharis festiva Ol. (non. Pall.), Ent. III, 1795, tb. 2. f. 15.

Mylabris ledebouri Gebl., Mém. S. N. Mosc. (Nouv.) I, 1829, p. 166. n. 14 (ibid. var.: *b*, *c*, *d*, *e*); in Ledeb.-Reise 1830, p. 138, n. 5. — Dej., Cat. Col., ed. 3, 1837, p. 245. — Gebl., Bull. S. N. Mosc. XXXII, 1859, p. 487, n. 8. — Reiche, Ann. S. E. Fr. 1865, p. 637, n. 33. — Gemm. et Har., Cat. Col. VII, 1870, p. 2138. — Mrs., L'Ab. VII, 1870, p. 163; Mon. Myl. 1872, p. 184, n. 175, tb. 3. f. 115. — E. Ol., Bull. S. E. Fr. 1875, p. c. 1. v. — Baudi, Berl. E. Z. XXII, 1878, p. 371. — Beaur., Ins. ves. 1890, p. 530. — Sum. l. c.

Zonabris festiva Ol. Bed., Bull. S. E. Fr. 1875, p. c. 1. XIII.

Zonabris ledebouri Heyd., Cat. Col. Sib. 1881, p. 153. — Eschr. l. c. — Reitt. l. c. — Calw. l. c.

ab. *a* et *β* Sum. l. c.

Hab.: Rossia or. (Saratov, Orenburg, Uralsk), Sibiria mer.-occ. (Ajagus, Altaj), Turkestan (lac. Ala-kul) et Mongolia sept.-occ.

15. *cyaneovaria* Reitt. 1889.

Zonabris cyaneovaria Reitt., Verh. nat. Ver. Brünn XXVII, 1889, p. 121. — Eschr., Wien. E. Z. XVIII, 1889, p. 88. — Heyd., Cat. Col. Sib. Nacht. I, 1893, p. 130.

Mylabris cyaneovaria Sum. l. c.

Hab.: Transcaspia (Kushka, Tedzhen, Aschabad).

m. *speciosoides* Sum.

Mylabris cyaneovaria ab. a Sum., Hor. S. E. Ross. XLII, 1915, p. 7.

Zonabris cyanovaria var. *speciosoides* Reitt. in litt.

Hab.: prov. Syr-darjensis (distr. Perovsk).

16. *festiva* Pall. 1773.

Meloe festiva v. β Pall. Reise II, 1773, p. 721, n. 54.

Lytta festiva F., Spec. ins. 1781, p. 329, n. 4. — Ill., Mag. ins. III, 1781, p. 171, n. 15. — F., Mant. ins. I, 1787, p. 216, n. 5. — Gmel., in Linn. Syst. Nat. I (4), 1788, p. 2014, n. 5. — F., Ent. syst. I (2), 1792, p. 85, n. 9; Syst. Eleut. II, 1801, p. 79, n. 15.

Meloe sericea Pall., Icon. ins. 1781, p. 85, t. E. f. 10.

Mylabris sericea Tausch., Mém. S. N. Mosc. III, 1812, p. 141, n. 11, tb. X, f. 13. — Gebl., Mém. S. N. Mosc. (Nouv.) I, 1829, p. 167, n. 15; in Ledeb. Reise 1830, p. 139, n. 15. — Dej., Cat. Col., ed. 3, 1837, p. 245. — Gebl., Bull. S. N. Mosc. XX, 1847, p. 500, n. 12. — Küst., Käf. Eur. XXIV, 1851, p. 86. — Gebl., Bull. S. N. Mosc. XXXII, 1859, p. 489, n. 17. — Gemm. et Har., Cat. Col. VII, 1870, p. 2142. — Mrs., L'Ab. VII, 1870, p. 162; Mon. 1872, p. 184, n. 174, tb. III, f. 114. — Baudi, Berl. E. Z. XXII, 1878, p. 371. — Beaur., Ins. ves. 1890, p. 536. — Vorontz. (Воронц.), Извѣст. Опб. От. П. Г. Об. XXIV, 1914, p. 131, tb. IV, ff. a, b, c, d. — Sum. l. c., p. 8.

Mylabris quatuordecimpunctata v. β (?) Bilb., Mon. Myl. 1813, p. 33, n. 20, tb. IV, f. 4. — Schh., Syn. ins. III, 1817, p. 35 (v. δ ?). — Dej., l. c.

Mylabris gebleri Esch., Dej. l. c.

Mylabris festiva Reiche, Ann. S. E. Fr. 1865, p. 636, n. 27. — Bed., Bull. S. E. Fr. 1875, p. c. l. v.

Zonabris sericea Heyd., Cat. Col. Sib. 1881, p. 153. — Eschr., Wien. E. Z. XVIII, 1899, p. 88. — Reitt. l. c. — Calw. l. c.

Hab.: Romania, Turcia, Graecia, Rossia (Cherson, Tauria, distr. Uralsk, Orenburg), Sibiria (Tomsk. Kolyvan, Altaj, Semipalatinsk), Turkestan (prov. Turgaica: stat. ferrov. Akmir; prov. Syr-darjens.: desert. Kisyl-kum.; Semiretshje: Dzhar-kent), Caucasus (Dagestan), Asia Minor (Anatolia).

17. *chinensis* Friv. 1892.

Zonabris chinensis Friv., Termész. füz. XV, 1892, p. 114.
Hab. China sept. (Liang-tshou-fu).

18. *uhagoni* Mart. 1873.

Mylabris uhagoni Mart., Ann. S. Esp. 1873, p. 66. —
Gorr., Mon. Mel. 1882, p. 129, n. 18. — Sum. l. c.

Zonabris uhagoni Eschr. l. c. — Reitt. l. c. — Calw. l. c.
ab. *perezi* Pic

Zonabris uhagoni var. *perezi* Pic, L'Ech. XXXII, n.
374, 1916, p. 7.

ab. *traizeti* Pic

Zonabris uhagoni var. *traizeti* Pic, ibid.

Hab.: Hispania (Castilia, Madrid, Montaero).

19. *formosa* Well. 1910.

Zonabris decora Friv., A'Magyar Tud. 1835, p. 264,
tb. 6, f. 6 (nom. pracocc.). — Eschr. l. c. — Reitt. l. c. —
Calw. l. c.

— *Mylabris decora* Küst., Käf. Eur. XXIV, 1851, p. 25. —
Gemm. et Har., Cat. Col. VII, 1870, p. 2136. — Mrs., L'Ab.
VII, 1870, p. 194; Mon. Myl. 1872, p. 276, n. 114^a — Beur.,
Ins. ves. 1890, p. 525. — Sum. l. c.

Mylabris formosa Well., Deut. E. Z. 1910, p. 23.

Hab.: Turcia eur. et Graecia (Athenae).

20. *hieracii* Graëlls, 1849.

Mylabris cylindrica Dej., Cat. Col., ed. 3, 1837, p. 245.,

Mylabris hieracii Graëlls, Rev. zool. 1849, p. 621, n. 6;
Ann. S. E. Fr. 1851, p. 27, n. 6; Mém. Ac. Madr. I, 1851,
p. 40; Mém. Map. Zool. 1858, tb. 4, f. 4^a. — Gemm. et Har.
l. c., p. 2138. — Mrs., L'Ab., p. 95; Mon. Myl. 1872, p. 152,
n. 113, tb. II, f. 56. — Baudi, Deut. E. Z. XXII, 1878,
p. 373. — Gorr., Mon. 1882, p. 104, n. 8. — Beur. l. c.,
p. 529. — Sum. l. c.

Mylabris subspiciosa Rosenh., Thire And. 1856, p. 229.

Zonabris hieracii Eschr. l. c. — Reitt. l. c. — Calw. l. c.

Mylabris scabricoliis Chvr. in litt.

ab. *subspiciosa* Rosenh.

Mylabris hieracii var. *subspiciosa* Gemm. et Har. l. c.
— Mrs., Mon. 1872, p. 290. — Beur. l. c.

Mylabris hieracii ab. ♂ Sum. l. c.

ab. a Sum. l. c.

ab. γ Sum. l. c.

Hab.: Hispania, Lusitania, et Gallia mer.

21. **königi** Dokh. 1889.

Zonabris königi Dokh., Hor. S. E. Ross. XXIV, 1889 p. 143, n. 13, tb. II, f. 19. — Heyd., Cat. Col. Sib. Nacht. I, 1893, p. 130.

Mylabris königi Sum. l. c., p. 9.

Hab.: Turkestan (vallis flum. Talas, desert. Mujun-kum), Bucharica occ. (Farab), prov. Transcaspica (desert. Kara-kum).

22. **frolovi** Germ. typ. 1824.

Mylabris frolovi Germ., Spec. Nov. 1824, p. 170, n. 281. — Fisch.-W., Entomogr. II, 1823, p. 226, n. 7, tb. XL, f. 7. — Fisch. J., Tent. 1827, p. 3, n. 8. — Gebl., Mém. S. N. Mosc. (Nouv.) I, 1829, p. 164, n. 12 (ibid. var. a, b, c, d); in Ledeb. Reise 1830, p. 138, n. 3 (part.); Bull. S. N. Mosc. XX, P. I, 1847, p. 496 (prt.). — Reiche, Ann. S. E. Fr. 1865, p. 635, n. 15. — Gemm. et Har. l. c., p. 2137. — Mrs., L'Ab, p. 160; Mon. Myl. 1872, p. 183, n. 172, tb. III, f. 112. — Beaur. l. c., p. 528. — Portsh. (Порч.), Труды Бюро Энт. XI, 1914, p. 56, n. 10, tb. 2, f. 10. — Sum. l. c.

Zonabris frolovi Heyd., Cat. Col. Sib. 1881, p. 153; Deut. E. Z. XXV, 1881, p. 337; id. XXVII, 1883, p. 66; ibid., p. 340. — Dokh. l. c., p. 138, n. 7, tb. II, f. 36. — Heyd., Deut. E. Z. XXXIV, 1890, p. 355; Cat. Col. Sib., Nacht. I, 1893, p. 130. — Eschr., Wien. E. Z. XVIII, 1899, p. 89.

Zonabris heydeni Kr. in litt. Heyd., Deut. E. Z. 1883, p. 66 (Note).

Zonabris sodalis Heyd., Deut. E. Z. XXVII, 1883, p. 65. — Dokh., l. c., p. 140, n. 9, tb. II, f. 38. — Heyd., Deut. E. Z. XXXIV, 1890, p. 355; Cat. Col. Sib., Nacht. I, 1893, p. 131.

Mylabris sodalis Beaur. l. c., p. 536.

ab. *fenestrata* Eschr.

Zonabris frolovi var. *fenestrata* Eschr. l. c., p. 108, n. 23, tb. II, f. 17 a et b.

Mylabris frolovi ab. ε Sum. l. c.

ab. *obtecta* Eschr.

Zonabris frolovi var. *obtecta* Eschr. l. c., n. 24, f. 18.

Mylabris frolovi ab. δ Sum. l. c.

ab. α Sum. l. c.

ab. β Sum. l. c.

Hab.: Sibiria (Tomsk, lac. Zaisan-nor, jugum Tarbagataj, Naryn, Irkutsk), Turkestan (Amu-Darja: Karatshingil; distr. Perovsk, Kasalinsk, Bajgakum, Tshimkent, vall. fluv. Talas, Tashkent; Vernyj; Samarkand, Dzhizak, Osh, Margelan, Kokand), Dzhungaria (Kuldzha), Tian-Shan chinens., Bucharia or. (jugum Hissariense, Tshitshantan), Pamir (Debeba), Transcaspia (desert. Kara-kum, Kushka, Aschabad), Persia.
m. **deserta** Sum. 1829.

Mylabris frolovi m. **deserta** Sum., L'Ech. XLV, n. 435, p. 1.

Hab.: Turkestan (Margelan Dzhizak, Agatshty).

? m. **confluens** Fisch.-W. 1823.

Mylabris confluens Fisch.-W., Entomogr. II, 1823, p. 226, n. 10, tb. XL, f. 10. — Gebl., Mém. S. N. Mosc. (Nouv.) II, 1832, p. 57, n. 1.

Zonabris confluens Heyd., Cat. Col. Sib. 1881, p. 153.

Hab.: Dauria.

? m. **intermedia** Fisch.-W. 1844.

Mylabris intermedia Fisch.-W., Bull. S. N. Mosc. XVII, 1844, p. 132, n. 153, tb. III, f. 5.

Zonabris intermedia Dokh., Hor. S. E. Ross. XXIV, 1889, p. 139, n. 8, tb. II, f. 37. — Eschr. l. c., p. 89.

Hab.: Dzhungaria.

23. **frolovi syr-darjensis** Sum. 1929.

Mylabris frolovi syr-darjensis Sum., L'Ech. XLV, n. 435, 1929, p. 2.

Hab.: Turkestan (distr. Perovsk; Ur-Maral).

24. **frolovi androsovi** Sum. 1929.

Mylabris frolovi m. **androsovi** Sum. *ibid.*, p. 1.

Hab.: Turkestan (Bajkagum).

25. **frolovi shapinskyi** Kus. 1927.

Mylabris frolovi shapinskyi Kus., Rev. Russe d'Ent. XXI, 1927, p. 26.

Hab.: Turkestan (distr. Kopal).

26. **frolovi kopalensis** Sum., 1930, n. n.

Mylabris frolovi shapinskii Sum., l. c. (nom. pracocc.).

Mylabris frolovi kopalensis Sum., L'Ech. XLVI, n. 440,

(Ann.).

Hap.: Turkestan (distr. Kopal).

27. *frolovi aliensis* Kus. 1929.

Mylabris frolovi aliensis Kus. l. c.

Hab.: Turkestan (Semiretshje: Dzharkent).

28. *frolovi staudingeri* Heyd. 1881.

Zonabris staudingeri Heyd., Deut. E. Z. XXV, 1883, p. 328; Cat. Col. Sib. 1881, p. 153. — Dokh. l. c., p. 162, n. 40, tb. II, ff. 28 et 29. — Heyd., Cat. Col. Sib. Nacht. I, 1893, p. 131. — Eschr., Wien. E. Z. XVIII, 1899, p. 89.

Mylabris staudingeri Beur., Ins. ves. 1890, p. 537. — Sum., Rev. Russe d'Ent. XIII, 1913, p. 307. — Kus. l. c.

Hab.: Sibiria (Irkutsk), Turkestan (Semiretshje: distr. Kopal, Naryn, Ala-tau, lac. Issyk-kul; Fergana: Kokand, Margelan), Dzhungaria (Kuldzha).

29. *lucens* Eschr. 1904.

Mylabris lucens Eschr., Münch. Kol. Z. 1904, p. 32. — Sum., Hor. S. E. Ross. XLII, 1915, p. 10; L'Ech. XLV, n. 435, 1929, p. 2.

ab. α Sum.

Mylabris staudingeri var. *apicetenuimarginata* Sum., Rev. Russe d'Ent. XIII, 1913, p. 304, f. 2.

Mylabris staudingeri m. *apicetenuimarginata* Sum., L'Ech. XLV, n. 436, 1929, p. 6.

ab. β Sum.

Mylabris lucens ab. β Sum., Hor. l. c.

Mylabris flexuosa alpinoides Sum., L'Ech. XLII, n. 435, 1929, p. 2.

ab. γ Sum.

Mylabris flexuosa alpinoides ab. α Sum. *ibid.*

ab. δ Sum.

Mylabris flexuosa alpinoides ab. β Sum. *ibid.*

ab. ϵ Sum.

Mylabris lucens ab. β Sum. *ibid.*

Hab.: Turkestan (Semiretshje: distr. Kopal; Samarkand, Turush-Dara), Bucharia (jugum Hissariense et Gardan-Kaftar) et Pamir.

30. *splendidula* Pall. 1781.

Meloe splendidula Pall., Icon. ins. 1781, p. 83, n. E 8, tb. E, f. 8.

Mylabris splendidula Schh., Syn. ins. III, 1817, p. 37, n. 35. — Fisch. J., Tent. 1827, p. 8, n. 44. — Mén., Descr. II, 1848, p. 31. — Gebl., Bull. S. N. Mosc. XXXII, 1859, p. 489, n. 18. — Reiche, Ann. S. E. Fr. 1865, p. 637, n. 36. — Gemm. et Har., Cat. Col. VII, 1870, p. 2140. — Mrs., L'Ab. VII, 1870, p. 158. — Sols., Hor. S. E. Ross. VII, 1871, p. 380. — Mrs., Mon. Myl. 1872, p. 182, n. 170, tb. 3, f. 110. — Beaur. l. c., p. 536. — Sum., Hor. XLII, 1915, p. 10.

Mylabris frolovi Gebl., Mém. S. N. Mosc. (Nouv.) I, 1829, p. 164, n. 12 (prt.). — Dej., Cat. Col., ed. 3, 1837, p. 244. — Gebl., Bull. S. N. Mosc. XX, 1847, p. 496 (prt.).

Mylabris splendidula var. *frolovi* Gebl., Reiche, l. c. — Baudi, Berl. E. Z. XXII, 1878, p. 366.

Zonabris splendidula Heyd., Cat. Col. Sib. 1881, p. 153. — Dokh., Hor. S. E. Ross. XXIV, 1889, p. 169, n. 51, tb. II, f. 51. — Heyd., Cat. Col. Sib., Nacht. I, 1893, p. 131. — Echr., Wien. E. Z. XVIII, 1899, p. 89.

? *Zonabris gebleri* Heyd., Cat. 1881, p. 153; Deut. E. Z. XXVII, 1883, p. 66 (Note).

ab. α Sum.

Mylabris splendidula ab. α Sum. l. c.

ab. β Sum. ibid.

ab. γ Sum. ibid.

ab. σ Sum. ibid.

ab. ϵ (e) Sum., L'Ech. XLV, n. 436, 1929, p. 7.

ab. ζ (e)¹) Sum. ibid.

ab. η nova.²)

Mylabris mutabilis Gebl. in litt.

Hab.: Orenburg; Sibirica (Tomsk, Irkutsk, Transbajcalia: Troitskosavsk; vall. fluv. Onon; flum. Amur super.), Semipalatinsk, Turkestan (desert. Mujun-kum, Vernyj, Przhhevsk, Alaj), Dzhungaria, Mongolia (Urga, lac. Tsagan-nor), China, ? Transcaspia; ? Caucasus.

1) Car il n'y avait pas à l'imprimerie de caractères grecques les aberrations ont été indiquées par des lettres latines; ainsi l'aberration ζ au lieu d'être indiquée par la lettre „f“ a été indiquée par erreur par la lettre „e“.

2) Ab. η n. — Les élytres noires-bleuâtres ornées seulement d'une fascie antéapicale.

31. *bivulnera* Pall. 1781.

Attelabus bimaculatus Pall., It. I, 1771, p. 466, n. 45.

Catharis viridi . . . Lepech., Tageb. I, 1774.

Meloe bivulnera Pall., Icon. ins. 1781, p. 94, E, f. 23.

Cantharis caspica Gmel., in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I, P. IV, 1788, p. 1896, n. 53.

Oenas bivulnerus Tausch., Mém. S. N. Mosc. III, 1812, p. 154, n. 3, tb. X, f. 21. — Schh., Syn. ins. III, 1817, p. 29, n. 6.

Mylabris bivulnera Gebl., Mém. S. N. Mosc. (Nouv.) I, 1829, p. 163, n. 11; in Ledeb. Reise 1830, p. 137, n. 1. — Fald., Mém. Ac. St.-Pet. II, 1835, p. 345. — Dej., Cat. Col., ed. 3, 1837, p. 245. — Gebl., Bull. S. N. Mosc. XX, 1847, p. 494, n. 1. — Mén., Descr. II, 1848, p. 31. — Gebl., Bull. S. N. Mosc. XXXII, 1859, p. 486, n. 2. — Mrs., L'Ab. VII, 1870, p. 159; Mon. Myl. 1872, p. 182, n. 171, tb. III, f. 111. — Baudi, Berl. E. Z. XXII, 1878, 371. — Sum. l. c.

Mylabris splendidula var. *bimaculata* Reiche, l. c. — Beaur. l. c.

Mylabris splendidula var. *bivulnera* Reiche, l. c.

Mylabris bivulnera var. *bimaculata* Mrs. Mon. 1872, l. c.

Zonabris bivulnera Heyd., Cat. Col. Sib. 1881, p. 153.

— Eschr. l. c. — Reitt., Cat. Col. Eur. 1906, p. 447. — Calw., Käferb. II, 1914, p. 754.

ab. *luteosexmaculata* Pic

Zonabris bivulnera var. *luteosexmaculata* Pic, L'Ech. XXXV, n. 396, 1919, p. 21.

m. *monozoma* Well. 1910.

Mylabris unifasciata Ball., Bull. S. N. Mosc. LIII, 1878, p. 343, n. 185. — Beaur., Ins. ves. 1890, p. 538 (nom. praeocc.).

Zonabris splendidula var. *unifasciata* Dokh. l. c., p. 170, tb. II f. 52.

Zonabris unifasciata Eschr. l. c. — Heyd., Cat. Col. Sib., Nacht. I, 1893, p. 153.

Mylabris monozoma Well., Deut. E. Z. 1910 p. 23.

Mylabris bivulnera m. *unifasciata* Sum. l. c.

Hab.: Rossia or. (Saratov, Astrachan, ? Poltava, distr. Uralsk, prov. Kasak. fl. Don); Sibiria (Tomsk, Barnaul, Kolyvan, Altaj, Nertshinsk), prov. Turgaica (stat. ferrov. Tande et Akinir), Semipalatinsk (Ajagus), Turkestan (Karatshingil,

Perovsk; lac. Issyk-kul. Wiernyj, lac. Baskan-kul), Kashgaria (fl. Ak-su), Dzhungaria (Kuldzha) et Mongolia sept.

32. *plurivulnera* Dohrn, 1873.

Mylabris plurivulnera Dohrn, Stett. E. Z. XXXIV, 1873, p. 73. — Beur. l. c., p. 533. — Sum. l. c., p. 11.

Mylabris marseuli Kirsh (non Ball.), Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 77.

Zonabris plurivulnera Heyd., Deut. E. Z. XXV, 1881, p. 327.

Mylabris viridula Mrs., L'Ab XX, 1882, Nouv. Fait. II, p. 170; id. XXI, 1883, p. 178.

Hab.: Persia (Astrabad).

33. *quadrisignata* Fisch.-W. 1823.

Mylabris quadrisignata Fisch.-W., Entomogr. II, 1823, p. 226, n. 9, tb. XL, f. 9. — Gebl., Mém. S. N. Mosc. (Nouv.) I, 1829, p. 161, n. 9; in Ledeb. Reise 1830, p. 139, n. 12. — Dej., Cat. Col., ed. 3, 1837, p. 244. — Fisch.-W., Bull. S. N. Mosc. XVII, 1844, p. 134, n. 155. — Gebl., Bull. S. N. Mosc. XXXII, 1859, p. 488, n. 13. — Gemm. et Har., Cat. Col. VII, 1870, p. 2142. — Mrs., L'Ab. VII, 1870, p. 65; Mon. 1872, p. 129, n. 82, tb. I, f. 34. — Ball., Bull. S. N. Mosc. LIII, 1878, p. 339, n. 181. — Baudi, Berl. E. Z. XXII, 1878, p. 366. — Beur., Ins. ves. 1890, p. 534. — Sum. l. c., p. 12.

Zonabris quadrisignata Heyd., Deut. E. Z. XXV, 1881, p. 327; Cat. Col. Sib. 1881, p. 151. — Dokh. l. c., p. 166, n. 45, tb. II, f. 42. — Heyd., Cat. Col. Sic., Nacht. I, 1893, p. 131. — Eschr. l. c., p. 92.

Mylabris signata Beur. l. c., p. 533.

Mylabris voigtsii Eschr., Münch. Kol. Z. II, 1904, p. 33. — Sum., Rev. Russe d'Ent. XIII, 1913, p. 306.

ab. *voigtsii* Eschr.

Mylabris quadrisignata ab. α Sum., Hor. l. c.

ab. β Sum. ibid.

Mylabris voigtsii forma α Sum., Rev., f. 12.

ab. γ Sum. Hor. l. c.

Mylabris voigtsii forma β Sum., Rev., f. 13.

ab. σ Sum. Hor. l. c.

ab. ε Sum. ibid.

ab. ζ Sum. ibid., p. 12.

ab. η Sum. *ibid.*

ab. *longeundulata* Pic

Zonabris 4-signata var. *longeundulata* Pic, L'Ech. XXXV, n. 396, 1919, p. 18.

Hab.: Sibiria (Tomsk, lac. Zajsan), Turkestan (Semiretshje: Wernyj, Ajagus, Kopal, Naryn; Fergana), Turkest. chinense (lac. Bagratsh-kul), Dzhungaria (Kuldzha, Sajram).

34. *sedilethorax* Sum. 1929.

Mylabris sedilethorax Sum., L'Ech. XLV, n. 435, 1929, p. 3.

Hab.: Transcaucasia (Daratshitshag).

35. *flavipennis* Mot. 1872.

Mylabris flavipennis Mot., Bull. S. N. Mosc. XLV, 1872, p. 50.

Hab.: Transbaikalia.

36. *unicolor* Fald. 1837.

Mylabris unicolor Fald., F. n. Transcauc. II, 1837, p. 127, n. 378, tb. IV, f. 8. — Mén., Cat. Col. 1832, p. 209, n. 928 (nom. nud.). — Dej. l. c., p. 245. — Reiche, Ann. S. E. Fr. 1865, p. 636, n. 30. — Gemm. et Har. l. c., p. 2144. — Mrs., L'Ab., p. 111; Mon. 1872, p. 158, n. 125. — Baudi, l. c., p. 376. — Beaur. l. c., p. 538. — Sum. l. c.

Zonabris unicolor Eschr., Wien. E. Z. XVIII, 1899, p. 90. — Reitt., Deut. E. Z. 1913, p. 661.

Hab.: Transcaucasia (Talish), Persia (Shahrud) et Asia Minor.

37. *externepunctata* Fald. 1837.

Mylabris exteruepunctata Fald. l. c., p. 128, n. 379. — Dej. l. c. — Gemm. et Har. l. c., p. 2137. — Mrs., L'Ab., p. 108; Mon. 1872, p. 156, n. 122, tb. II, f. 65. — Baudi, l. c. — Beaur., p. 527. — Sum. l. c.

Zonabris externepunctata Eschr. l. c. — Pic, Bull. S. Zool. Fr. XXVI, 1901, p. 77. — Reitt., Cat. Col. Eur. 1906, p. 447. — Calw., Käferb. II, 1914, p. 754.

ab. *taurusiensis* Pic

Zonabris externepunctata var. *taurusiensis* Pic, l. c.

Mylabris externepunctata ab. *a* Sum. l. c.

Hab.: Transcaucasia (Elisavetpol), Persia et Asia Minor (Taurus).

? m. *dagestanica* Sum. 1929.

- Mylabris externepunctata* m. *dagestanica* Sum., L'Ech. XLV, N. 436, 1929, p. 6.
Hab.: Caucasus (Dagestan).
38. **tomentosa** Eschr. 1899.
Zonabris tomentosa Eschr. l. c., p. 99, n. 4; *ibid.* p. 90. — Reitt. l. c. — Calw. l. c.
ab. *culpensis* Pic
Zonabris tomentosa var. *culpensis* Pic, l'Ech. XXXV, n. 395, 1919, p. 18.
ab. *externeundulata* Pic
Zonabris tomentosa var. *externeundulata* Pic, l. c., p. 19.
Hab.: Transcaucasia (prov. Erivanica: Kulp).
39. ? **serena** Eschr. 1899.
Zonabris serena Eschr. l. c., tb. II, f. 2; *ibid.*, p. 91. — Reitt. l. c. — Calw. l. c.
Mylabris serena Sum. l. c., p. 13.
Hab.: Transcaucasia (Erivan).
40. **concolor** Mrs.
Mylabris concolor Mrs., L'Ab, p. 112; Mon. 1872, p. 158, n. 126. — Beaur l. c., p. 524. — Sum. l. c.
Zonabris concolor Eschr., Stett. E. Z. LVIII, 1897, p. 44; Wien E. Z. XVIII, 1899, p. 91. — Reitt., Deut. E. Z. 1913, p. 661.
Hab.: prov. Transcaspica (Gaudan, Missune), Transcaucasia or. et Asia Minor (Elma-Dagh).
41. **dejeani** Gyll. 1817.
Mylabris dejeani Gyll., in Schh. Syn. III, App. 1817, p. 35, n. 55. — Fisch. J., Tent. 1827, p. 11. — Waltl, Isis, Heft VI, 1838, p. 465, n. 93. — Reiche, Ann. S. E. Fr. 1865, p. 638, n. 42. — Gemm. et Har., Cat. Col. VII, 1870, p. 2136. — Mrs., L'Ab VII, 1870, p. 104; Mon. 1872, p. 151, n. 120, tb. II, f. 63. — Baudi, Berl. E. Z. XXII, 1878, p. 376. — Gorr., Mon. Mel. 1882, p. 113, n. 12. — Beaur., Ins. ves. 1890, p. 525. — Sum., Hor. S. E. Ross. XLII, 1915, p. 13.
Zonabris dejeani Eschr., Wien. E. Z. XVIII, 1899, p. 103; *ibid.* p. 91. — Pic, l'Ech. XV, 1899, p. 103. — Reitt., Cat. Col. Eur. 1906, 448. — Calw. l. c.
Mylabris elongata Dej. in litt.

Hab.: Portugalia, Hispania (Grenada, Pozuelo), ins. Corsica, ? Italia, Turcia cur., Rossia or. (?Saratov); Transcaucasia (Elisavetpol); ?Aegyptus.

42. *varians* Gyll. 1817.

Mylabris varians Gyll., Schh. Syn. ins. III, App. 1817, p. 34, n. 54. — Dej. l. c., p. 244. — Reiche, Ann. S. E. Fr. 1865, p. 636, n. 22. — Gemm. et Har. l. c., p. 2145. — Mrs., L'Ab, p. 105; Mon. 1872, p. 156, n. 121, tb. II, f. 64. — Baudi, l. c., p. 375. — Gorr. l. c., p. 115, n. 13. — Beaur, l. c., p. 539. — Fuente, Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. 1909, pp. 307—308. — Sum. l. c., pp. 13—14.

Mylabris inconstans Chvr., Guer. Rev. Zool. 1865, p. 393, n. 14.

Mylabris luteipennis Dufour, in litt.

Zonabris varians Eschr. l. c. — Reitt. l. c.

ab. *decimspilota* Chvr.

Mylabris varians var. *decimspilota* Chvr. l. c., n. 15. — Gemm. et Har. l. c. — Mrs., Mon. 1872, tb. II, f. 64^a. — Gorr. l. c. — Beaur. l. c. — Fuente, l. c.

Mylabris varians ab. ♂ Sum. l. c., p. 14.

ab. *luteipennis* Mrs.

Mylabris varians var. *luteipennis* Mrs., L'Ab, p. 106. — Gorr. l. c. — Fuente, l. c.

Mylabris varians ab. ι Sum. l. c.

ab. *unipunctata* Fuente

Mylabris varians var. *unipunctata* Fuente, l. c.

ab. α Sum. l. c., p. 13.

ab. *bipunctata* Fuente, ibid.

Mylabris varians ab. β Sum. l. c.

ab. *fuentei* Pic

Zonabris varians var. *fuentei* Pic., L'Ech. XXV, 1909, p. 171.

Mylabris varians Fuente, l. c. (nom. praeocc.).

ab. *pozuelensis* Pic, l. c.

Mylabris varians var. *4-punctata* Fuente, l. c. (nom. praeocc.).

Mylabris varians ab. γ Sum. l. c., p. 14.

ab. *quinquepunctata* Fuente l. c.

Mylabris varians ab. δ Sum. l. c.

ab. *sexpunctata* Fuente, l. c.

Mylabris varians ab. ϵ Sum. l. c.

ab. *bipunctatafasciata* Fuente, l. c.

Mylabris varians ab. ζ Sum. l. c.

ab. *tripunctatafasciata* Fuente, l. c.

Mylabris varians ab. η Sum. l. c.

Hab.: Hispania (Grenada, Castilia).

43. ***scutellata*** Rosenh. 1856.

Mylabris scutellata Rosenh., Thire And. 1856, p. 231. —
Beaur., Ins. ves. 1890, p. 535. — Sum., Hor. S. E. Ross.
XLII, 1915, p. 14.

Mylabris varians var. *scutellata* Mrs., Mon. 1872, p. 291.

Zonabris scutellata Eschr., Wien. E. Z. XVIII, 1899,
p. 91. — Reitt., Cat. Col. Eur. 1906, p. 448. — Calw., Kä-
ferb. II, 1914, p. 754.

Hab.: Hispania (Grenada).

44. ***geminata*** F. typ. 1798.

Mylabris geminata F., Ent. syst., Suppl. 1798, p. 120,
nn. 9—10; Syst. Elent. II, 1801, p. 84, n. 18. — III., Mag. III,
1802, p. 175, n. 18. — Ol., Enc. meth. VIII, 1811, p. 101,
n. 58. — Bilb., Mon. Myl. 1813, p. 68, n. 47, tb. VII, f. 9;
var. β , f. 10. — Schh., Syn. ins. III, 1817, p. 41, n. 53. —
Fisch. J., Tent. 1827, p. 11, n. 66. — Gebl., Mém. S. N.
Mosc. (Nouv.), I, 1829, p. 156, n. 3; in Ledeb. Reise 1830,
p. 138, n. 4. — Mén., Cat. rais. 1832, p. 207, n. 921. —
Kryn., Bull. S. N. Mosc V, 1832, p. 139, n. 12. — Fald.,
Mém. Ac. St.-Pet. II, 1835, p. 345, n. (9). — Dej. l. c., p.
245. — Lap.-Cast., Hist. nat. II, 1840, p. 271, n. 18. —
Gebl., Bull. S. N. Mosc. XX, 1847, p. 498, n. 7. — Muls.,
Hist. nat. Col. 1857, pp. 138—145; ib. var: α — π . — Gebl.,
Bull. S. N. Mosc. XXXII, 1859, p. 487, n. 7. — Reiche, Ann.
S. E. Fr. 1865, p. 638, n. 41. — Gemm. et Har. l. c., p.
2138. — Mrs., L'Ab. VII, 1870, p. 102; Mon. Myl. 1872, p.
155, n. 119, tb. II, f. 62. — Ball., Bull. S. N. Mosc. LIII,
1878, p. 336, n. 175. — Baudi, l. c.—Gorr. l. c., p. 111, n. 11.
— Beaur. l. c., p. 528. — Portsh. (Порч.), Тр Бюро Этн. XI, 1914,
p. 58, n. 14, tb. II, f. 18. — Vorontz. (Воронц.), Извѣст. Орб. От.
P. Georp. Об. XXIV, 1914, p. 129, tb. I, ff. a, b. — Sum. l. c., p. 15.

Mylabris grisescens Tausch, Mém. S. N. Mosc. 1812, p.
145, n. 15, tb. X, f. 17. — Reiche, l. c., n. 43.

Mylabris geminata var. *grisescens* Dej. l. c.

Mylabris obsoleta Novick., Beschreib. 1872, p. 6.

Zonabris geminata Heyd., Cat. Col. Sib. 1881, p. 152.

— Dokh., Hor. S. E. Ross. XXIV, 1889, p. 152, n. 25, tb. II, f. 40. — Heyd., Cat. Col. Sib., Nacht. I, 1893, p. 130. — Eschr. l. c.; ibid. p. 103. — Reitt. l. c. — Calw. l. c.

Mylabris connata Rey, L'Ech. VIII, 1892, p. 138.

ab. *centropunctata* Baudi

Mylabris geminata var. *centropunctata* Baudi, l. c. — Beur. l. c. — Puel, l'Ech. XXIII, 1907, p. 117.

Mylabris geminata ab. ♂ Sum. l. c.

ab. *obsoleta* Nov.

Zonabris geminata var. *obsoleta* Reitt. l. c. — Puel. l. c., p. 116.

Mylabris geminata ab. ε Sum. l. c.

ab. *connata* Rey

Zonabris geminata var. *connata* Reitt. l. c. — Puel, l. c., p. 117.

Mylabris geminata ab. η Sum. l. c.

ab. *novickii* Puel

Zonabris geminata var. *novickii* Puel, l. c., p. 116.

Mylabris geminata ab. α Sum. l. c.

ab. *pseudobsoleta* Puel

Zonabris geminata var. *pseudobsoleta* Puel, l. c.

Mylabris geminata ab. β Sum. l. c.

ab. *gracilior* Puel

Zonabris geminata var. *gracilior* Puel, l. c., p. 117.

Mylabris geminata ab. ζ Sum. l. c.

ab. *prolongata* Puel

Zonabris geminata var. *prolongata* Puel, l. c.

Mylabris geminata ab. ι Sum. l. c.

ab. *meridionalis* Puel

Zonabris geminata var. *meridionalis* Puel, l. c.

Mylabris geminata ab. κ Sum. l. c.

ab. *pueli* Sum. (= var. *fenestrata* Puel) n. n.¹⁾

Mylabris pueli Sum., L'Ech. XLV, n. 436, 1929, p. 7.

Zonabris geminata var. *fenestrata* Puel, l. c., p. 118

(nom. praecoc.).

1) Sous ce nom Dr. K. Escherich a décrit une variation de *M. frolovi* Germ. (Wien. E. Z. XVIII, 1899, p. 108, n. 23, tb. II, f. 17 a, b). A cause de la coïncidence des noms j'ai donné à cette variation un nouveau nom: *pueli*.

Mylabris geminata ab. λ Sum. l. c.

ab. *eryngii* Puel

Zonabris geminata var. *eryngii* Puel, l. c.

Mylabris geminata ab. μ Sum. l. c.

ab. *camarguensis* Puel

Zonabris geminata var. *camarguensis* Puel, l. c.

Mylabris geminata ab. ν Sum. l. c.

ab. *apicalifrons* Puel

Zonabris geminata var. *apicalifrons* Puel, l. c.

Mylabris geminata ab. \omicron Sum. l. c.

ab. *subobliterata* Pic, L'Ech. XXIV, 1908, p. 72.

Zonabris geminata var. *subobliterata* Pic, L'Ech.

XXIV, 1908, p. 72.

Mylabris geminata ab. π Sum. l. c.

ab. A, Puel, l. c.

Mylabris geminata ab. γ Sum. l. c.

ab. B, Puel, l. c.

Mylabris geminata ab. δ Sum. l. c.

Hab.: Hispania (Grenada), Gallia mer., Italia, Helvetia, Romania, Rossia mer.-or. (Podolia, Cherson, Tauria, Ekaterinoslav, Charkov, Kasan, Saratov, Orenburg, Voronezh, Uralsk, Novorossijsk; Sibiria occ. (Tomsk), Semipalatinsk, Turkestan (Semiretshje: Kopal)? Dzhungaria. Caucasus (prov. Kasak. fl. Terek; Talish)? Persia? Syria¹).

45. *geminata sibirica* Fisch.-W. 1823.

Mylabris sibirica Fisch.-W., Entomogr. II, 1823, p. 225, n. 4, tb. XL., f. 4. — Gebl., Mém. S. N. Mosc. (Nouv.) I, 1829, p. 160, n. 8.; in Ledeb. Reise 1830, p. 139, n. 16; Mém. S. N. Mosc. (Nouv.) II, 1832, p. 57, n. 3. — Kryn., Bull. S. N. Mosc. V, 1832, p. 139, n. 6. — Fald., Mém. Ac. St.-Pet. II, 1835, p. 345 (9). — Dej. l. c. — Gebl., Bull. S. N. Mosc. XX, 1847, p. 500, n. 13. — Mén., Descr. II, 1848, p. 30. — Mot., Mel. Ac. St.-Pet. 3, 1860, p. 442, n. 80; Bull. Ac. St.-Pet. III, 1860, p. 537. — Reiche, l. c., p. 637, n. 32. — Gemm. et Har. l. c., p. 2142. — Mrs., L'Ab., p. 97; Mon. 1872, p. 153, n. 115, tb. II, f. 58. — Baudi, l. c., p. 374. — Beaur. l. c., p. 536. — Portsh. (Порт.) l. c., pp 54—55, n. 5, tb. II, f. 16.

1) Quant à l'indication de l'habitation de cette espèce au sud-est de la Russie et en Asie il faut s'en méfier car on a fait passer d'autres espèces pour celle-ci.

Mylabris sibirica var. *besseri* Mann. Dej. l. c. — Baudi, l. c. — Beur. l. c.

Zonabris sibirica Heyd., Cat. Col. Sib. 1881, p. 152; Deut. E. Z. XXX, 1886, p. 181. — Dokh. l. c., p. 167, n. 47, tb. II, f. 41. — Heyd., Cat. Col. Sib., Nacht. I, 1893, p. 131. — Eschr., Wien. E. Z. XVIII, 1899, p. 91.

Mylabris geminata sibirica Sum. l. c., p. 16.

ab. b. Gebl. l. c.

ab. c. Gebl. ibid.

ab. d. Gebl. ibid.

ab. *luteobiinterrupta* Pic

Zonabris sibirica var. *luteobiinterrupta* Pic, L' Ech. XXXV, n. 395, 1919, p. 19.

Hab.: Rossia eur. (Poltava, Orel, Tula ?Mosqua, Rjasan, Kasan, Simbirsk, Tambov, Samara, Saratov, Orenburg, Uralsk, Astrachan, prov. Kasak. fl. Don, Voronezh); Sibiria (Tomsk, Minusinsk, Irkutsk, Barnaul, Altaj, Transbajkalia), Turkestan (Perovsk, lac. Issyk-kul, Osh).

46. *geminata kushakevitshi* Dokh. 1889.

Zonabris kouschakiewitschi Dokh. l. c., p. 167, n. 46, tb. II, f. 64. — Heyd., Cat. Col. Sib., Nacht. I, 1893, p. 130. — Eschr. l. c.

Zonabris satanula Reitt. in litt. Eschr. l. c.

Mylabris geminata kushakevitshi Sum., L'Ech. XLV, N. 436, 1929, p. 5.

Hab.: Turkestan (Semiretshje: Wiernyj, lac. Issyk-kul, Naryn).

m. *hauseri* Eschr. 1899.

Zonabris hauseri Eschr. l. c., p. 101, n. 10, tb. II, f. 6 a, b; ibid. p. 103 et 91.

Zonabris pilosella Sahl., Öfv. F. Vet.-Soc. Förh. L, 1907, p. 92, n. 135.

Mylabris geminata hauseri Sum., Hor. S. E. Ross. XLII, 1915, p. 16.

Mylabris geminata kuschakewitschi m. *hauseri* Sum., L'Ech. XLV, n. 436, 1929, p. 6.

ab. *a* Sum. Hor. l. c.

Hab.: Turkestan (prov. Syr-darjensis: vall. fl. Talas, Perovsk, Ur-Maral; Semiretshje: Viernyj, lac. Issyk-kul), Dzhungaria (vall. fluv. Kunges).

47. *geminata pauper* Eschr. 1899.
Zonabris pauper Eschr. l. c., p. 100, n. 8, tb. II, f. 5;
 ibid., p. 91. — Reitt., Cat. Col. Eur. 1906, p. 447. — Calw. l. c.
Mylabris geminata pauper Sum. l. c.
 Hab.: Hispania (Grenada, Camargue. Onteniente).
48. ? *neglecta* Eschr. 1899.
Zonabris neglecta Eschr. l. c., p. 102, n. 11, tb. II, f. 7
 a, b.; ibid. p. 103. — Reitt. l. c. — Calw. l. c.
Mylabris neglecta Sum. l. c.
 Hab.: Graecia.
49. ? *beckeri* Eschr. 1890.
Zonabris beckeri Eschr., Wien. E. Z. IX, 1890, p. 24.
 — Reitt. l. c., p. 448. — Calw. l. c.
Mylabris cynachi Beck., Bull. S. N. Mosc. VI, 1892, p. 69.
 Hab.: Rossia or. (Sarepta).
50. *pentheri* Ganglb. 1905.
Mylabris pentheri Gnglb., Ann. Nat. Hofmus. XX, 1905,
 p. 279. — Sum. l. c., p. 18.
 Hab.: Asia Minor (Illany-Dagh).
51. *mannerheimi* Gebl. 1837.
Mylabris mannerheimi Gebl., Mém. Ac. St.-Pet. III,
 1837, p. 103; Bull. Ac. St.-Pet. VIII, 1841, p. 374, n. 21;
 Bull. Phys. Ac. St.-Pet. 1845, p. 103; Bull. S. N. Mosc.
 XXXII, 1859, p. 487, I, n. 9; ibid. II, p. 23. — Gemm. et
 Har., Cat. Col. VII, 1870, p. 2139. — Mrs., L'Ab., p. 100;
 Mon. 1872, p. 154, n. 117, tb. II, f. 60. — Beur., Ins. ves.
 1890, p. 531. — Sum. l. c., p. 18.
Zonabris mannerheimi Heyd., Cat. Col. Sib. 1881,
 p. 152. — Eschr. l. c.
 Hab.: Sibiria, „desert. Kirgisorum“, Bucharia or. (jugum
 Petri Magn.).
52. *undecimnotata* Heyd. 1883.
Zonabris undecimnotata Heyd., Deut. E. Z. XXVII, 1883,
 p. 66. — Dokh., Hor. S. E. Ross. XXIV, 1889, p. 159, n. 35,
 tb. II, f. 16. — Heyd., Cat. Col. Sib., Nacht. I, 1893, p. 131. —
 Eschr. l. c.
Myalaris undecimnotata Beur., Ins. ves. 1890, p. 538. —
 Sum. l. c., p. 17.
 Hab.: Sibiria mer.-occ. (Akmolinsk), Turkestan (lit. or.
 lac. Aral, flum. inferior Syr-darja: Tjulen-Agatsh; desert.

Kisyl-kum. et Mujun-kum; Semiretshje; Samarkand, Golodnaja stepp.: Karaj, Agatsbty, Tash-tjube, Tshilabaj.).

m. *crux* Escher. 1899.

Zonabris crux Eschr. l. c., n. 12, tb. II, f. 8 a, b, c.

Mylabris undecimnotata m. *crux* Sum. l. c.

ab. *opulenta* Eschr.

Mylabris crux var. *opulenta* Eschr., Münch. Kol. Z. 1904, p. 33.

Mylabris undecimnotata m. *crux* ab. *a* Sum. l. c.

ab. *β nova*¹⁾.

Hab.: Turkestan (vall. flum. Talas; Semiretshje; Samarkand, Chodzhent, Pendzhakend, Tair-Teich, Golodnaja stepp.: Karaj), Pamir, Transcaspia (Merv, Kushka, Aschabad), ? Caucasus (Teberda, Dagestan: Chassav-jurt).

53. *undecimnotata turkestanica* Dokh. 1889.

Zonabris turkestanica Dokh. l. c., p. 168, n. 49, tb. II, f. 56. — Heyd., Cat., Nacht. I, 1893, p. 131. — Eschr. l. c., p. 91.

Mylabris undecimnotata turkestanica Sum. l. c.

Hab.: Turkestan (Baldshuan, Mumynobad).

54. *tarbagatajensis* Pic

Zonabris tarbagatajensis Pic, l'Ech. XXXV, n. 395, 1919, p. 18.

Hab.: Sibiria mer., (jugum Tarbagataj).

55. *olivieri* Bilb. 1813.

Mylabris olivieri Bilb., Mon. Myl. 1813, p. 71, n. 50, tb. VII, f. 13. — Schh., Syn. ins. III, 1817, p. 42, n. 57. — Mén., Cat. rais. 1832, p. 208, n. 926. — Sum., Sitzungsber. Nat. Ges. Univ. Dorp. XXXI, 1924, p. 83, n. 3; l'Ech. XLV, n. 436, 1929, p. 7.

Mylabris caspica Mén. l. c., p. 206, n. 914. — Dej. l. c., p. 245.

Mylabris impar Gemm. et Har. l. c., p. 2138. — Baudi, l. c., pp. 372 et 375. — Beaur. l. c., p. 529. — Sum., Hor. S. E. Ross. XLII, 1915, p. 22.

Mylabris grisescens Reiche, Ann. S. E. Fr. 1865, p. 638,

1) ab. *β n.* — Trois fascies sur les élytres: antérieure (parfois divisée en 2 taches), médiane et subapicale se réunissent ensemble par une ligne longitudinale.

n. 43. — Mrs., L'Ab., p. 119; Mon. 1872, p. 162, n. 132, tb. III, f. 74¹).

Zonabris impar Heyd., Cat. Col. Sib. 1881, p. 152. — Eschr., Stett. E. Z. LVIII, 1897, p. 43; Wien. E. Z. XVIII, 1899, p. 91.

Mylabris coherens Fisch. J. in litt.

Mylabris melanura Stv. in litt.

ab. *impexa* Eschr.

Zonabris impar var. *impexa* Eschr., l. c., p. 107, n. 20.

Mylabris impar ab. *a* Sum. l. c.

ab. β Sum. l. c.

ab. γ (c) Sum., L'Ech. XLV, n. 436, 1929, p. 7.

ab. *kopetensis* Pic.

Zonabris impar var. *kopetensis* Pic, id. XLVI, n. 439, 1930, p. 2.

Hab.:? Sicilia²), Rossia eur. (Odessa, Saratov, Uralsk, Astrachan); Transcaspia (Repetck), Transcaucasia (Mzchet, Elisavetpol, Erivan, Batum), Asia Minor (Angola).

56. *sinuata* Klg. 1845.

Mylabris sinuata Klg., Symb. phys. IV, 1845, p. 19, tb. XXXII, f. 7. — Gemm. et Har. l. c., p. 2143. — Mrs., L'Ab., p. 102; Mon. 1872, p. 30, n. 118^a; ibid. p. 291, n. 118^a, tb. II, f. 61^a. — Baudi, l. c., p. 376. — Beaur l. c., p. 536. — Sum. l. c. p. 14.

? ab. *akbesiana* Reitt.

Zonabris akbesiana Pic, B. S. E. Fr. XXVI, 1901, p. 77.

Hab.: Syria et ins. Cyprus.

57. *diversesignata* Pic

Zonabris diversesignata Pic, L'Ech. XXXV, n. 395, 1919, p. 18.

Hab.: Tunisia.

58. *sobrina* Graëll. 1851.

Mylabris sobrina Graëll., Ann. S. E. Fr. 1851, p. 20; Mém. Mapa Zool. 1858, p. 103, tb. IV, f. 5. — Reiche, Ann. S. E. Fr. 1865, p. 637, n. 40. — Gemm. et Har. l. c. p. 2143. — Mrs., L'Ab., p. 96; Mon. 1872, p. 152, n. 114,

1) *M. grisescens* Tausch. = *M. geminata* Ol. M. Marscul sous le nom de *M. grisescens* donne la caractéristique de *M. olivieri* Bilb.

2) L'indication de la Sicile est douteuse. Probablement quelque forme souple de *M. geminata* Ol. a été prise pour *M. olivieri* Bilb.

tb. II, f. 57. — Baudi, Berl. E. Z. XXII, 1878, p. 376. — Gorr., Mon. Mel. 1882, p. 106, n. 9. — Beaur. l. c., p. 536. — Sum. l. c., p. 17.

Zonabris sobrina Eschr. l. c. — Reitt., Cat. Col. Eur. 1906, p. 448. — Calw., Käferb. II, 1914, p. 754.

Hab.: Hispania (Grenada, S. Guadar), Portugalia.

59. *italica* Sum. 1929.

Mylabris italica Sum., L'Ech. XLV, n. 436, 1929, p. 6.

Hab.: Italia (Basilicata: monte Valtorino).

60. *sexnotata* Redt. 1843.

Mylabris sexnotata Redt. Kotsky, Col. Syr. et Cypr. 1843, p. 987, n. 22, tb. 22. — Gemm. et Har. l. c., p. 2142. — Mrs., L'Ab., p. 110; Mon. 1872, p. 157, n. 124, tb. II, f. 67. — Baudi, l. c. — Beaur. l. c. — Sum. l. c., p. 18.

Zonabris sexnotata Eschr., Wien. E. Z. XVIII, 1899, p. 91.

Hab.: Transcaucasia (Erivan), Syria.

61. *flexuosa* Ol. typ. 1811.

Mylabris flexuosa Ol., Enc. meth. VIII, 1811, p. 101, n. 56. — Bilb., Mon. Myl. 1813, p. 39, n. 25, tb. IV, f. 13 (f. typ.), f. 14 (var. β), f. 15 (var. γ). — Schh., Syn. ins. III, 1817, p. 36, n. 28. — Fisch. J., Tent. 1827, p. 7, n. 37. — Mén., Cat. rais. 1832, p. 208, n. 925. — Gebl., Bull. S. N. Mosc. VI, 1833, p. 290. — Dej., Cat. Col., ed. 3, 1837, p. 244. — Mén., Descr. ins. II, 1848, p. 30. — Muls., Hist. nat. Col. Fr. 1857, pp. 145—148, n. 7. — Gebl., Bull. S. N. Mosc. XXXII, 1859, p. 487, n. 6. — Reiche, l. c., n. 34. — Gemm. et Har. l. c. p. 2137. — Mrs., L'Ab., p. 62; Mon. 1872, p. 154, n. 118, tb. II, f. 61. — Baudi, l. c., p. 368. — Gorr. l. c., p. 118, n. 10. — Beaur. l. c., p. 527. — Sum., Hor. S. E. Ross. XLII, 1915, p. 19.

Zonabris flexuosa Heyd., Cat. Col. Sib. 1881, p. 152. — Dokh., Hor. S. E. Ross. XXIV, 1889, p. 169, n. 50, tb. II, f. 45. — Reitt., Verh. nat. Ver. Brünn, XXVII, 1889, p. 120. — Heyd., Cat. Col. Sib., Nacht. I, 1893, p. 130. — Eschr. l. c. — Reitt., Cat. Col. Eur. 1906, p. 448. — Calw. l. c.

ab. *cassetensis* Pic

Zonabris flexuosa var. *cassetensis* Pic, L'Ech. XXIV, 1908, p. 72.

Mylabris flexuosa ab. a Sum, l. c.

ab. *inflexuosa* Pic

- Zonabris flexuosa* var. *inflexuosa* Pic, l. c.
Mylabris flexuosa ab. β Sum. l. c.
 ab. *rarissima* Pic
Zonabris flexuosa var. *rarissima* Pic. l. c.
Mylabris flexuosa ab. γ Sum. l. c.
 ab. *pyrenaea* Pic
Zonabris flexuosa var. *pyrenaea* Pic, p. 74.
Mylabris flexuosa ab. δ Sum. l. c.
 ab. *luteosubapicalis* Pic.
Zonabris flexuosa var. *luteosubapicalis* Pic, l'Ech. XLVI, n. 439, 1930, p. 3.
 Hab.: Hispania, Gallia mer., Helvetia, Italia bor.-occ., ins. Sicilia, Hungaria, Romania, Rossia eur. (Vjatka: distr. Malmyzh, Saratov, Ekaterinoslav, Charkov, Poltava, Tauria, Uralsk); Sibiria occ. (Akmolinsk, Ajagus, Barnaul, lac. Zaisanor), Turkestan (prov. Syr-darjensis, Semiretshje), prov. Transcaspica et Caucasus.
62. *flexuosa alpina* Mén. 1832.
Mylabris alpina Mén., Cat. rais. 1832, p. 208, n. 927. — Gemm, et Har. l. c., p. 2133. — Mrs., L'Ab., p. 98; Mon. 1872, p. 153, n. 116, tb. I, f. 59. — Baudi, l. c. — Beur. l. c., p. 520.
Mylabris flexuosa var. *alpina* Dej. l. c.
Zonabris alpina Eschr. l. c. — Reitt. l. c. — Calw. l. c.
Mylabris flexuosa m. *alpina* Sum. l. c., p. 20.
 Hab.: Caucasus (Dagestan: Derbent).
63. *flexuosa furcimacula* Sum. 1915.
Mylabris flexuosa m. *furcimacula* Sum. l. c.
 Hab.: Transcaucasia (Daratshitshag et Artvin).
64. *flexuosa apicefasciata* Sum.
Mylabris flexuosa apicefasciata Sum., l'Ech. XLV, n. 435, 1929, p. 3.
 Hab.: Transcaspia (Gaudan).
65. *flexuosa abrupta* Sum. 1915.
Mylabris flexuosa abrupta Sum., Hor. S. E. Ross. XLII, 1915, p. 19.
 ab. *a* (a) Sum., l'Ech. XLV, n. 435, 1929, p. 3.
 ab. β (b) Sum., ibid.
 ab. γ (c) Sum., ibid.
 Hab.: Italia (Abruzzo et Umbria).

66. *laevicollis* Mrs. 1870.

Mylabris laevicollis Mrs., L' Ab. VII, 1870, p. 109. — Gemm. et Har. l. c., p. 2138. — Mrs., Mon. Myl. 1872, p. 157, n. 123, tb. II, f. 66. — Beur. l. c., p. 530. — Sum. l. c.

Zonabris laevicollis Dokh. l. c., p. 153, n. 26, tb. II, f. 62. — Heyd., Cat. Col. Sib., Nacht. I, 1893, p. 130. — Eschr., Wien. E. Z. XVIII, 1899, p. 91; *ibid.*, p. 103. — Reitt. l. c. — Calw. l. c.

Hab.: prov. Transcaspica, Transcaucasia (Tiflis, Erivan, Borzhom., Abasstuman, Artvin). Asia Minor (jug. Erdscias); Graecia.

67. *karačævica* Roub. 1914.

Mylabris karačævica Roub., Kol. Rundschau 1914, p. 145.

Hab.: Caucasus (Teberda, Elborus, Kachethia) et Transcaspia (Aschabad).

68. *pusilla* Ol. 1811.

Mylabris pusilla Ol., Enc. meth. VIII, 1811, p. 101, n. 57. — Tausch., Mém. S. N. Mosc. III, 1812, p. 137 n. 5, tb. X, f. 7. — Schh., Syn. ins. III, 1817, p. 33, n. 17. — Fisch. J., Tent. 1827, p. 5, n. 25. — Gebl., Mém. S. N. Mosc. (Nouv.) I, 1829, p. 159, n. 7; in Ledeb. Reise 1830, p. 139, n. 11. — Kryn., Bull. S. N. Mosc. V, 1832, p. 139. — Fald., Mém. Ac. St.-Pet. 1835, p. 345, n. 9. — Dej., Cat. Col., ed. 3, 1837, p. 244. — Gebl., Bull. S. N. Mosc. XX, P. I, 1847, p. 498, n. 10; *ibid.* var.: à, c. d. — Reiche, Ann. S. E. Fr. 1865, p. 637, n. 31. — Gemm. et Har., Cat. Col. VII, 1870, p. 2144. — Mrs., L'Ab. VII, 1870, p. 66; Mon. Myl. 1872, p. 129, n. 83, tb. I, f. 35. — Baudi, Berl. E. Z. XXII, 1878, p. 366. — Beur., Ins. ves. 1890, p. 534. — Vorontz. (Воронц.), Извѣст. Опб. От. P. Георг. Общ. XXIV, 1914. p. 129, tb II, ff. a, b, c. — Sum., Hor. S. E. Ross, XLII, 1915, p. 21.

Zonabris pusilla Heyd., Cat. Col. Sib. 1881, p. 151. — Eschr., Wien. E. Z. XVIII, 1899, p. 92. — Reitt., Wien. E. Z. XXII, 1903, p. 230; Cat. Col. Eur. 1906, p. 448. — Müll., Wien. E. Z. XXVI, 1907, p. 10. — Lebed. (Лебед.), Hor. S. E. Ross. XXXVII, 1907, p. 402.

Hab.: Italia med. et mer., Dalmatia, Bosnia, Hercegovina, Montenegro, Rossia eur. (Podolia, Kiev, Poltava, Ekaterinoslav, Charkov, Orel, Tambov, Kasan, Samara, Saratov, Orenburg, Astrachan, prov. Kasak. fl. Don; Sibiria (Tobolsk, Tomsk,

Minussinsk, Semipalatinsk), Turkestan (Kopal, Tashkent, vall. Alaj), Caucasus (Tiflis, Erivan, Manglis), Syria.

? m. *bosnica* Reitt. 1903.

Zonabris bosnica Reitt., Wien. l. c.; Cat. l. c.

Mylabris pusilla m. *bosnica* Sum. l. c.

ab. *decipiens* Müll.

Zonabris bosnica var. *decipiens* Mull. l. c.

ab. *montenegrina* Pic

Zonabris bosnica var. *montenegrina* Pic, L'Ech.

XXVII, n. 323, 1911, p. 178.

Mylabris pusilla m. *bosnica* ab. a Sum. l. c.

Hab.: Bosnia, Hercegovina, Montenegro.

69. *liliputana* Eschr. 1899.

Zonabris liliputana Eschr. l. c., p. 106; *ibid.*, p. 92.

Mylabris liliputana Sum. l. c.

Hab.: Turkestan (vall. fluv. Talas, Semiretshje, jugum Transalajense, Susamyr) et Pamir.

70. *axillaris* Bilb. 1813.

Mylabris axillaris Bilb. l. c., p. 24, n. 14, tb. III, f. 2. — Gemm. et Har. l. c., p. 2134. — Mrs., L'Ab., p. 194; Mon. 1872, p. 273, n. 44^a, tb. I, f. 7-a.

Hab.: ? Syria, Aegyptus.

71. *variabilis* Pall. 1781.

Cantharis fasciata Imp. Fer. Hist. nat. 1695, p. 901, n. 921. T. f. Aa. . .

Meloe cichorii L., Syst. Nat., ed. 12, II, 1767, p. 680, n. 5¹⁾. — Lepech., Tagenb. I, 1768.

Meloe fasciata Fuessl., Verz. Schweiz, 1775, p. 20, n. 398, T. f. 1 a.

Meloe variabilis Pall., Icon. ins. I, 1781, p. 81, n. E 7, tb. E, f. 7 (f. typ), ff. 14 a, b (var. β). — Villers, L. Ent. I, 1789, p. 399, n. 4 (in parte).

Mylabris cichorii Petagna, Spec. ins. Calabr. 1787, p. 27, n. 135. — Dorth., Mém. Ac. Paris 1787, p. 67, n. 68, tb. f. 5. — Ol., Ent. III, 1795, p. 7, n. 7, tb II, f. 13 (?);

1) Linné a décrit sa *M. cichorii* d'après les matériaux qui enferment deux espèces très éloignées l'une de l'autre. L'une de ces espèces, dont les représentants se trouvent en Europe méridionale et en Sibérie, a été décrite par Pallas sous le nom *variabilis*, l'autre, proprement *cichorii* L., habite en Chine et à l'Inde.

Nouv. Dict. ins. XV, 1803, p. 308. — Tausch., Mém. S. N. Mosc. III, 1812, p. 136, n. 4, tb. X, f. 6. — Cuvier, Reg. Anim. 1817, p. 416, tb. 54, f. 7. — Ol., Nouv. Dict. hist., ed. 2, XXII, 1818, p. 12, n. 1. — Guer., Dict. class. Hist. XI, 1827, p. 363. — Muls., Lettr. II, 1830, p. 298, n. 1. — Lap.-Cast., Hist. nat. ins. Col. II, 1840, p. 271, n. 16.

Mylabris fasciata Ol., Enc. meth. VIII, 1811, p. 97, n. 31.

? *Mylabris fasciato-punctata* Tausch. l. c., n. 1, f. 1.

Mylabris variabilis Bilb., Mon. Myl. 1813, p. 25, n. 15, tb. III, f. 3, f. 4 (var. β), f. 5 (var. γ), f. 6 (var. δ). — Schh., Syn. ins. III, 1817, pp. 32—33. — Germ., Reise Dalm. 1817, p. 211, n. 163. — Fisch. J., Tent. 1827, p. 4, f. 17. — Kryn., Bull. S. N. Mosc. V, 1832, p. 139, n. 2. — Mén., Cat. rais. 1832, p. 206, n. 913. — Brullé, Exp. Mor. 1832, p. 229, n. 406. — Mén., Descr. ins. II, 1848, p. 30. — Muls., Hist. nat. Col. Fr. 1857, pp. 120—125, n. 2. — Reiche, Ann. S. E. Fr. 1865, p. 635, n. 19. — Gemm. et Har. l. c., p. 2144. — Mrs., L'Ab., p. 67; Mon. 1872, p. 131, n. 85, tb. I, f. 36; ibid. var. a, var. b (*armeniaca* Fald.), var. c (*tricincta* Chvr.), f. 36^a, var. d (*guerini* Chvr.), f. 36^b, var. e (*rubripennis* Chvr.)¹), var. f (*lacera* Fisch. J.), f. 36^c, var. g (*mutabilis* Dej.). — Baudi, Berl. E. Z. XXII, 1878, p. 364. — Gorr., Mon. Col. Mel. 1882, p. 88, n. 2. — Коерр. (Керр.), Вредн. насѣк. II, Ч. I, 1882, p. 265, n. 3. — Beaur. l. c., p. 539. — Seidl., Fn. Transsylv. 1891, p. 584. — Portsh. (Порч.), Труды Бюро Энт. XI, 1914, pp. 53—54, n. 4, tb. I, f. 15. — Voronz. (Воронц.), Извѣстн. Орб. От. Р. Георг. Об. XXIV, 1914, p. 134, tb. IX, ff. a, b, c, d, e, f, p, g, m, l, t. — Sum. l. c., pp. 20—21; ibid. ab.: α , β et γ ; Sitzungsab. Nat.-Ges. Univ. Dorp. XXXI, 1924, p. 81, n. 2.

Mylabris lacera Fisch. J., Tent. 1827, p. 6, n. 25. — Küst. Käf. 1846, p. 49.

Mylabris mutans Guer., Dict. V, 1837, p. 554, tb. 397, f. 5.

Mylabris mutabilis Dej., Cat. Col., ed. 3, 1837, p. 244.

Mylabris sturmi Stenz., Strm. Cat. Käf. 1843, p. 172.

Mylabris semilaris Muls. l. c., p. 125.

Mylabris maculosopunctata Graëll., Map. geol. 1858, p. 113. — Gorr. l. c., p. 93, n. 4.

1) Les variétés b, c, d, e sont fautiveusement attribuées par Marscul à *M. variabilis* Pall. Voir pp. 37, 39.

- Mylabris disrupta* Baudi, Atti Torino XIII, 1878, p. 1160.
- Mylabris pelletieri* Dej. (nom. nud.) Baudi, Berl. E. Z. XXII, 1878, p. 364.
- Mylabris angulosa* Dufour (nom. nud.) Baudi, ibid.
- Zonabris variabilis* Heyd., Cat. Col. Sib. 1881, p. 152.
 — Schils., Syst. Verz. Käf. Deut. 1888, p. 95. — Reitt., Verh. nat. Ver. Brünn. XXVII, 1889, p. 120. — Heyd., Cat., Nacht. I, 1893, p. 131. — Eschr., Stett. E. Z. LVIII, 1897, p. 41, Wien. E. Z. XVIII, 1899, p. 92. — Reitt., Wien. E. Z. XXII, 1903, p. 230; Cat. Col. Eur. 1906, p. 448; Fn. Germ. III, 1911, p. 394. — Calw., Käferb. II, 1914, p. 754. — Escal., Trab. Mus. Nac. Madr. 1914, p. 397.
- Mylabris postica* Mot. in litt.
- ab. *mutabilis* Dej.
- Mylabris variabilis* var. *mutabilis* Mrs., Mon. 1872, p. 132.
- Zonabris variabilis* var. *mutabilis* Reitt. l. c. — Calw. l. c.
- Mylabris variabilis* ab. *a* Sum. l. c.
- ab. *lacera* Fisch.-J.
- Mylabris variabilis* var. *lacera* Mrs., L'Ab. p. 70; Mon. 1872, p. 132, n. 85, tb. I, f. 36^c. — Baudi, l. c.
- Zonabris variabilis* var. *lacera* Reitt., Cat., l. c. — Calw. l. c.
- Mylabris variabilis* ab. *β* Sum. l. c.
- ab. *sturmi* Stenz.
- Mylabris variabilis* var. *sturmi* Baudi, l. c.
- Zonabris variabilis* var. *sturmi* Rtt. l. c. — Calw. l. c.
- ? ab. *erivanica* Pic.
- Zonabris erivanica* Pic, Bull. S. Zool. Fr. XXVI, 1901, p. 77.
- ab. *djebelina* Pic
- Zonabris variabilis* var. *djebelina* Pic, L'Ech. XVIII, 1902, p. 72.
- ab. *disrupta* Baudi
- Zonabris variabilis* var. *disrupta* Reitt. l. c. — Calw. l. c.
- ab. *maculosopunctata* Graëll.
- Zonabris variabilis* var. *maculosopunctata* Reitt. l. c. — Calw. l. c.
- ab. *nigrosuturata* Escal.

Zonabris variabilis var. *nigrosuturata* Escal l. c.ab. γ Sum. l. c.ab. *luteointerrupta* Pic*Zonabris variabilis* var. *luteointerrupta* Pic, L'Ech.

XXXV, n. 395, 1919, p. 18.

ab. δ	} ab. n. ¹⁾
ab. ε	
ab. ζ	
ab. η	

Hab. : Hispania (Madrid, Escorial), ins. Corsica, ins. Sicilia, Italia, (Neapoli), Gallia med. et mer., Germania mer., Helvetia, Austria, Hungaria, Transsylvania, Tirol, Dalmatia, Croatia, Bosnia, Herzegovina (Mostar, Jablanica, vall. Igbar), Bolgaria, Graecia, Rossia eur. (Volynia, Poltava, Kiev, Char-kov, Tauria, Ekaterinoslav, Voronesh, prov. Kasakor. fluv. Don (Rostov), Astrahan, Uralsk, Saratov (Sarepta), Orenburg; Sibiria (Tomsk, Barnaul, Irkutsk), Mantshzhuria (Tzhalan-Tun), Turkestan (prov. Syr-darjensis), Transcaspia (Kisyl-Arvat, Aschabad), Bucharica (Karshi), Persia (jugum. Elburs et Luristan), Caucasus (Armavir, Stavropol, Groznyj, Derbent, Baku, Lenkoran, Aslanduz, Karjagin, Elisavetpol, Tiflis, Kodzhary, Koutais, Borzhom, Erivan), Asia Minor (Angora); Aegyptus, Tunisia, Algeria, Marocco (Teluet en Dar-el-Caid el Glaui).

72. *quadripunctata* L. 1767.

Meloe quadripunctata L., Syst. Nat. II, 1767, p. 680, n. 6. — Goeze, Ent. Beitr. I, 1777, p. 698, n. 6. — Villers., L. ent. I, 1789, p. 400, n. 5. — Thnb., Nov.-ins. Spec. VI, 1791, p. 113, f. 6.

Meloe fasciatus Fuessl., Verz. Schweiz. Ins. 1775, p. 20, n. 398, tb. f. 1. b.

1) Ab. δ n. — Elytres avec une petite tache humérale et une fascie apicale.

Ab. ε n. — Dessin des élytres comme dans l'ab. précédente; mais tache humérale manque.

Ab. ζ — Elytres avec une tache humérale et deux fascies: l'une médiane, l'autre apicale.

Ab. η n. — Elytres avec deux fascies: l'une antérieure large, prolongée par la suture jusqu'à l'écusson, l'autre apicale; fascie médiane manque, parfois cette fascie remplacée par quelques petites hachures.

Meloe melanura Pall., Icon. ins. I, 1781, p. 86, n. 12, tb. H, f. E. 12. — Gmel., L. Syst. Nat. I, P. IV, 1788, p. 2020, n. 30. — Villers l. c., p. 364.

Mylabris decimpunctata F., Spec. ins. I, 1781, p. 331, n. 5; Mant. ins. 1787, p. 216, n. 5; Ent. Syst. II, 1792, p. 89, n. 9. — Ol., Ent. III, 1795, p. 12, n. 15, tb. I, f. 4, tb. II, f. 18. — F., Syst. Eleut. II, 1801, p. 84, n. 14. — Tigny, Hist. VII, 1802, p. 129; Ol., Nouv. dict. hist. nat. XV, 1803, p. 308. — Latr., Hist. X, 1804, p. 369, n. 1; Gen. Crust. II, 1807, p. 216, n. 1. — Lam., Hist. nat. IV, 1817, p. 431, n. 3. — Latr., Nouv. hist. II, 1818, p. 128, tb. 9, ff. 14 et 23. — Muls., Lettr. II, 1830, p. 298, n. 2.

Mylabris quadripunctata Dorth., Obs. Mém. Soc. Agr. Paris 1787, p. 68, f. 6. — Tausch., Mém. S. N. Mosc. III, 1812, p. 133, n. 2, tb. X, ff. 2 et 4. — Bilb., Mon. Myl. 1813, p. 27, n. 16, tb. III, ff. 7 et 8 (f. typ.), f. 9 (var. β), f. 11 (var. γ), f. 12 (var. δ). — Schh., Syn. ins. III, 1817, p. 34, n. 18. — Brullé, Exped. Mor. 1832, p. 229, n. 408. — Mén., Cat. rais. 1832, p. 207, n. 917. — Rosenh., Thire And. 1856, p. 229. — Muls., Hist. nat. Col. Fr. 1857, pp. 125—131, n. 3. — Reiche, Ann. S. E. Fr. 1865, p. 636, n. 20. — Gemm. et Har., Cat. VII, 1870, p. 2141. — Mrs., L'Ab. VII, 1870, p. 71; Mon. Myl. 1872, p. 132, n. 86, tb. I, f. 37. — Ball., Bull. S. N. Mosc. LIII, 1878, p. 335, n. 172. — Baudi, Berl. E. Z. XXII, 1878, p. 364 (v. *melanura* Pall.). — Koepp. (Кёпп.), Вред. нас. II, Ч. I, 1882, p. 264, n. 2. — Gorr., Mon. Col. Mel. 1882, p. 96, n. 5. — Beur., Ins. ves. 1890, p. 534 (var. *melanura*). — Sum., Rev. Russe Ent. XIII, 1913, p. 305. — Portsh. (Порч.), Тр. Бюро Энт. XI, СПб. 1914, p. 52, n. 2, tb. I, ff. 6 et 7. — Vorontz. (Воронц.), Извѣст. Орб. Отд. Р. Георг. Общ. XXIV, 1914, p. 133, tb. VIII, ff. a—n. — Sum., Hor. S. E. Ross. XLII, 1915, p. 22.

Mylabris melanura Petagna, Spec. ins. Calabr. 1787, p. 27, n. 134. — Fisch.-W., Entomogr. II, 1824, p. 225, n. 3, tb. XL, f. 3. — Fisch. J., Tent. 1827, p. 6, n. 24. — Gebl., Mém. S. N. Mosc. (Nouv.) I, 1829, p. 158, n. 6; in Ledeb.-Reise 1830, p. 138, n. 7. — Kryn., Bull. S. N. Mosc. V, 1832, p. 139, n. 1. — Chvr., in Silb. Rev. V 1837, p. 272, n. 6. — Walzl., Isis, Hf. VI, 1838, p. 465, n. 95. — Gebl., Bull. S. N. Mosc. XX, P. I, 1847, p. 498, n. 8. — Mén.

Descr. II, 1848, p. 30. — Dufour, Excurs. II, 1854, p. 440.
 Gebl., Bull. S. N. Mosc. XXXII, 1859, p. 487, n. 10. — Mot.,
 Mel. Biol. III, 1860, p. 442; Bull. Ac. St.-Pet, III, 1860,
 p. 537.

Mylabris duodecimpunctata Licht., Cat. Hamb. 1795, p. 75.

Mylabris octopunctata Ol., Enc. meth. VIII, 1811, p.
 95, n. 20.

Mylabris adamsi Fisch.-W., Entomogr. II, 1824, p. 224,
 n. 2, tb. XL, f. 2.

Mylabris fasciatopunctata Ad. (non Tausch.) *ibid.* (nom.
 praecoc.).

Mylabris armeniaca Fald., Fn. Transcauc. II, 1837, p.
 125, n. 377.

Mylabris maldinesi Chvr., Rev. Zool. 1865, p. 393, n. 13.

Zonabris quadripunctata Heyd., Deut. E. Z. XXV, 1881,
 p. 327; Cat. Col. Sib., p. 152; Deut. E. Z. XXXI, 1887, p.
 306. — Dokh., Hor. S. E. Ross. XXIV, 1889, p. 143, n. 12,
 tb. II, f. 26. — Heyd., Deut. E. Z. XXXIV, 1890, p. 355;
 Cat. Col. Sib., Nacht. I, 1893, p. 131. — Eschr., Stett. E. Z.
 LVIII, 1897, p. 41; Wien E. Z. XVIII, 1899, p. 92. —
 Bodem., Quer durch Kl. As. 1900, p. 121. — Reitt., Cat. Col.
 Eur. 1906, p. 448; Fr. Germ. III, 1911, p. 394. — Calw.,
 Kaferb. II, 1914, p. 754.

Mylabris beauregardii Gorr., Bull. R. Ac. Barcel. 1884.

Zonabris armeniaca Reitt., Verh. nat. Ver. Brünn XXVII,
 1889, p. 120.

Mylabris rubra Parreysl. in litt.

Mylabris quadripunctata var. *tetraspilota* = *M. quadri-*
punctata Bilb. (nom. praecoc.) Well., Deut. E. Z. 1910, p. 22.
 ab. b Fuessl. l. c.

Mylabris 4-punctata v. γ Bilb. l. c.

ab. β Bilb. *ibid.*

ab. δ Bilb. *ibid.*

Mylabris 4-punctata var. *adamsi* Fisch.-W. Mrs.,
 L'Ab., p. 72; Mon. 1872, p. 132, n. 86.

Zonabris 4-punctata var. *adamsi* Heyd., Deut. E. Z.
 XXVII, 1883, p. 566. — Dokh. l. c. tb. II, f. 27. — Heyd.,
 Cat. Col. Sib., Nacht. I, 1893, p. 131. — Eschr., Stett. l. c.
 — Bodem. l. c. — Reitt. l. c.

Mylabris quadripunctata ab. *a* Sum. l. c.

ab. *armeniaca* Fald.

Zonabris variabilis var. *armeniaca* Dokh. l. c., p. 151, n. 21.

Zonabris cincta var. *armeniaca* Calw., l. c.

Mylabris quadripunctata var. *antefasciata* Sum., Rev. Russe d'Ent. XIII, 1913, p. 305, f. 1.

Mylabris quadripunctata ab. β Sum., Hor. l. c.

ab. *maldinesi* Chvr.

Mylabris 4-punctata var. *maldinesi* Mrs., Mon. Myl. 1872, tb. II, f. 37^a.

Mylabris quadripunctata ab. δ Sum. l. c.

ab. γ Sum. l. c.

ab. *chobautiana* Sum. n. n.

Mylabris 4-punctata var. *vareillesi* Chob. in Cat. Col. Provence de Caillol III, 1921, p. 280 (nom. praeocc.)¹⁾.

ab. *gilana* Pic

Zonabris 4-punctata race *gilana* Pic, L'Ech. XXXIX, n. 417, 1924, p. 26.

m. *emiliae* Eschr. 1899.

Zonabris emiliae Eschr., Wien. E. Z. XVIII, 1899, pp. 92 et 105, n. 15, tb. II, ff. 11 a, b. — Reitt., Cat. Col. Eur. 1906, p. 448. — Calw., Käferb. II, 1914, p. 754.

Zonabris steppensis (non Dokh.) Eschr., Stett. E. Z. LVIII, 1897, p. 42.

Mylabris quadripunctata emiliae Sum. l. c.

ab. *a* Sum. ibid.

Hab.: Portugalia, Hispania (Cuença), ins. Corsica, Italia (Calabria, Abrutia, Aquila), Gallia mer., Germania (Hannover), Austria, Tirol, ins. Corcyra, Bolgaria, Turcia eur., Graecia, ins. Creta, Rossia eur. (Podolia, Poltava, Kiev, Odessa, Nicolaev, Cherson, Tauria (Alupka), Charkov, Ekaterinoslav, Voronezh, prov. Kasakor. fluv. Don. (Rostov), Uralsk, Astrachan, Tzaritzyn, Saratov, Samara, Orenburg; Sibiria (Enisejsk, Omsk, Tomsk, Kolyvan, Loktevsk, Minusinsk, Semipalatinsk, lac Zajsan-nor Ajaguz), Turkestan (prov. Turgaica: stat. ferrov. Tande; prov. Syr-darjensis: vall. fluv. Talas, desert. Kisylkum: Kara-Mulla et Kajdak, Tshimkent, jugum Alexandri, de-

1) Sous ce nom a été déjà décrit par Dr. Chobaut une variation de *M. saharica* (Bull. S. E. Fr. 1901, p. 280). A cause de la coïncidence des noms j'ai donné à cette variation un nouveau nom: *chobeautiana*.

sert. Mujun-kum: Akur-tjube, Tashkent; prov. Semiretshje: Viernyj, distr. Kopal, Ur-Maral, lac. Ala-kul, jugum Terskej; Samarkand, Dzhizak, Tashlau; Soch, Margelan), Bucharia (jugum Hissariense: Kshtur), Transcaspia (Chodzha-kala, Aschabad), Dzhungaria (Kuldzha, lac. Sajram), Mongolia (lac. Kosogol), Caucasus (Beshtau, Groznyj, Aljat, lenkoran, Dzhevat, Aslan-duz, Muganskaja stepp; Elisavetpol, Karabach, Geok-topa, Tiflis, lac. Lisi, Mtzchet, Kodzhary, Manglis, Erivan, Dara-tshitshag, Artvin), Persia, Asia Minor (Tokat, Angora, jugum. Ak-dagh, Bulgar-Maaden), Syria, Mesopotamia; ? Aegyptus, ? Tunisia, ? Algeria et ? Marocco.

73. ***quadripunctata angustata*** Sum. 1915.

Mylabris quadripunctata angustata Sum. l. c., pp. 22 et 72.

Zonabris postscutellata Reitt. in litt.

Hab: Bucharia orientalis.

74. ***quadripunctata apicenigra*** Sum. 1915.

Mylabris quadripunctata apicenigra Sum. l. c., p. 24.

Hab.: Persia (Luristan).

75. ***quadripunctata dokhturovi*** Eschr. 1899.

Zonabris dokhtouroffi Eschr., Wien. E. Z. XVIII, 1899, p. 104, n. 14.

Mylabris quadripunctata dokhturovi Sum. l. c.

ab. *coalescens* Voigts.

Zonabris dokhtouroffi var. *coalescens* Voigts, Wien, E. Z. XXI, 1902, p. 178.

Zonabris dokhtouroffi var. *confluens* Eschr. l. c. (nom. praeocc.).

Mylabris dokhtouroffi var. *integra* Well., Deut. E. Z. 1910, p. 22.

Mylabris dokhturovi ab. *a* Sum. l. c.

ab. β Sum. ibid

ab. γ Sum. ibid.

ab. δ nova. ¹⁾

Hab.: Turkestan (Samarkand), Bucharia (jugum Hissariense et Baba-tau, Tavaling, Baldzhuan, vall. fluv. Ak-su, Hargovat) et Pamir.

1) ab. δ n. Fascie médiane réunie avec bordure apicale près de la suture.

76. *quadripunctata tricineta* Chvr. 1837.

Mylabris tricineta Chvr., in Silb. Rev. V, 1837, p. 270, n. 2. — Dej., Cat. Col., ed. 3, 1837, p. 244. — Reiche, Ann. S. E. Fr. 1865, p. 635, n. 18.

Mylabris variabilis var. *tricineta* Gemm. et Har., Cat. Col. VII, 1870, p. 2144. — Mrs., L'Ab., p. 69; Mon. 1872, p. 132, n. 85 et p. 28, tb. I, f. 36^a — Baudi, Berl. E. Z. XXII, 1878, p. 363. — Beaur. l. c.

Zonabris variabilis var. *tricineta* Escal., Trab. Mus. Nac. Madr. 1914, p. 398.

Mylabris quadripunctata tricineta Sum. l. c.

Hab.: Hispania (Castilia), Marocco (Imi-n' Tanut, Amismiz, Glaui, Tanger et Larash), Algeria (Kabylia, Tlemcen).
m. *guerini* Chvr. 1837.

Mylabris guerini Chvr. l. c., p. 271, n. 5.

Mylabris rubripennis Chvr. l. c., p. 270, n. 3. —

Mylabris variabilis var. (d.) *guerini* Mrs., Mon. 1872, p. 132.

Mylabris variabilis var. (e.) *rubripennis* Mrs. l. c.

Mylabris quadripunctata tricineta m. *guerini* ab. α Sum. ab. β Chvr. l. c.

Mylabris rubripennis var. β Chvr. l. c.

ab. γ Chvr. ibid.

ab. δ Chvr. ibid.

Hab.: Algeria (Sidi-bel-Abess, Lambeze, Ras-el-ma) et Tunisia (Ain-Draham).

77. *quadripunctata restricta* Mot. 1849.

Mylabris restricta Mot., Bull. S. N. Mosc. XXII, n. 3, 1849, p. 133. — Mrs., L'Ab. VII, 1870, p. 195; Mon. Myl. 1872, p. 274, n. 86^a. — Gorr., Col. Mel. 1882, p. 99, n. 5^a.

Mylabris hispanica Mnnh. (nom. nud.) Mot. l. c.

Mylabris quadripunctata var. *hispanica* Beaur. l. c.

Zonabris rosinae Eschr., Wien. E. Z. XVIII, 1899, p. 104, n. 13, tb. II, f. 9.¹⁾ — Reitt., Cat. Col. Eur. 1906, p. 448. — Calw., Käferb., II, 1914, p. 754.

Zonabris quadripunctata var. *restricta* Reitt. l. c.

ab. *unicincta* Voigts.

1) *M. rosinae* Eschr. est identique avec *M. restricta* Mot. En comparant ces deux espèces on n'aperçoit aucune différence.

Zonabris rosinae var. *unicincta* Voigts, Wien. E. Z.

XXI, 1902, p. 178.

Zonabris rosinae var. *tricincta* Eschr. l. c. (nom. pracocc.) — Reitt. l. c. — Calw. l. c.

Hab.: Hispania (Grenada, Cadix); Algeria (Magenta).

78. ? *steppensis* Dokh. 1889.

Zonabris steppensis Dokh., Hor. G. E. Ross. XXIV, 1889, p. 137, n. 5, tb. II, f. 18.

Hab.: Samarkand.

79. *parumpicta* Heyd. 1883.

Zonabris parumpicta Heyd., Deut. E. Z. XXVII, 1883, p. 353; Cat. l. c., p. 129. — Eschr. l. c.

Mylabris parumpicta Beur., Ins. ves. 1890, p. 533.

Mylabris quadripunctata parumpicta Sum. l. c., p. 23. ab. α Sum. ibid.

ab. β Sum. ibid.

ab. γ Sum. ibid.

Hab.: Turkestan et Persia (Astrabad: Shach-ku; Luristan).

80. *ciliciensis* Eschr. 1899.

Zonabris ciliciensis Eschr. l. c., p. 106, n. 16, tb. II, f. 12; ibid. p. 92.

Mylabris ciliciensis Sum. l. c., p. 21.

ab. α Sum. ibid.

Hab.: Asia Minor (vall. Tshakit).

81. *tachari* Escal. 1909.

Zonabris tachari Escal., Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. IX, 1909, p. 246; Trab. Mus., Nac. Cien. Nat. Madr. 1914, p. 396.

Mylabris tachari Sum. l. c., p. 25.

Hab.: Marocco (Marraquesh).

82. *madani* Escal. 1909.

Zonabris madani Escal., Bol. l. c.; Trab. l. c.

Mylabris madani Sum. l. c.

ab. *transversalis* Escal.

Zonabris madani var. *transversalis* Escal. ibid.

Hab.: Marocco (Tarudant, Ait-Agia).

83. *schreibersi* Reiche 1865.

Mylabris terminata Chvr., Silb. Rev. V, 1837, p. 276, n. 18.

- Mylabris 4-notata* Ziegl. Dej., Cat. Col., ed. 3, 1837, p. 244.
- Mylabris schreibersi* Reiche, Ann. S. E. Fr. 1865, p. 336, n. 23. — Gemm. et Har., Cat. Col. VII, 1870, p. 2142. — Mrs., L'Ab. VII, 1870, p. 74; Mon. Myl. 1872, p. 133, n. 88, tb. II, f. 39. — Baudi, Berl. E. Z. XXII, 1878, p. 364. — Beaur. l. c., p. 535. — Sum. l. c.
- Zonabris schreibersi* Eschr. l. c. — Reitt. l. c. — Escal., Bol. l. c., p. 247; Trab. l. c. — Calw. l. c.
- Hab.: ins. Sicilia, ins. Sardinia; Marocco (Maroquesh, Glau, Melilla, Rabat, Beni-Mguild), Algeria (Yakouren, Oudja), Tunisia, Aegyptus; Syria.
84. *modesta* Eschr. 1899.
- Zonabris modesta* Eschr. l. c., p. 99, n. 7, tb. II, f. 4. — Reitt. l. c. — Calw. l. c.
- Mylabris modesta* Sum. l. c.
- Hab.: Transcaucasia (vall. fluv. Arax).
85. *inculta* Eschr. 1899.
- Zonabris inculta* Eschr., Wien. E. Z. XVIII, 1899, p. 98, n. 3.
- Mylabris inculta* Sum. l. c., p. 26.
- Zonabris plagifrons* (♀) Reitt., Deut. E. Z. 1913, p. 662. ? ab. *plagifrons* Rtt.
- Zonabris inculta* ? var. *plagifrons* Pic, Deut. E. Z. 1914, Hf. III, p. 318.
- Mylabris inculta* ab. *a* Sum. l. c.
- Hab.: Armenia (lac. Vann), Syria.
86. *tauricola* Mrs. 1870.
- Mylabris tauricola* Mrs., L'Ab., p. 73. — Gemm. et Har. l. c., p. 2143. — Mrs., Mon. 1872, p. 133, n. 87, tb. II, f. 38. — Beaur. l. c., p. 537. — Sum. l. c.
- Hab.: Asia Minor (Taurus) et Syria.
87. *amori* Graëll. 1858.
- Mylabris amori* Graëll., Mém. Mapa zool. Esp. 1858, p. 76, tb. IV, f. 6. — Gemm. et Har. l. c., p. 2134. — Mrs., L'Ab., p. 94; Mon. 1872 p. 152, n. 112, tb. II, f. 55. — Baudi, l. c., p. 373. — Gorr., Mon. Mel. 1882, p. 102, n. 7. — Beaur. l. c., p. 526. — Sum., Hor. S. E. Ross. XLII, 1915, p. 25.

- Zonabris amori* Eschr., Wien. E. Z. XVIII, 1899, p. 91. — Reitt. l. c. — Calw. l. c.
 ab. α Sum. l. c.
 ab. β)
 ab. γ ab. n.¹⁾
 ab. δ)
- Hab.: Portugalia, Hispania (Madrid, Cuença).
 ? m. **korbi** Eschr. 1891.
Zonabris korbi Eschr., Wien. E. Z. X, 1891, p. 53. — Reitt., Cat. Col. Eur. 1906, p. 447. — Calw., Käferb. II, 1914, p. 754.
 Hab.: Hispania.
88. **mohtari** Escal. 1910.
Zonabris mohtari Escal., Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. X, 1910, p. 284; Trab. Mus. Nac. Cienc. Madr. 1914, p. 397.
Mylabris mohtari Sum. l. c., p. 26.
 Hab.: Marocco (Marraquesh).
89. **abdelcaderi** Escal. 1909.
Zonabris abdelcaderi Escal., Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. 1909, p. 246; Trab. l. c.
Mylabris abdelcaderi Sum., p. 24.
 Hab.: Marocco (Tarudant, Marraquesh, El Glaui).
90. **oleae** Lap.-Cast. 1840.
Mylabris oleae Chvr., in Silb. Rev. V, 1837, p. 269, n. 1 (nom. nud.). — Lap.-Cast., Hist. nat. ins. col. II, 1840, p. 270, n. 5. — Er., in Wagn. Reise III, 1841, p. 185, n. 34, tb. VIII. — Luc., Hist. nat. Alg. 1846, p. 387. — Küst., Käf. III, 1846, p. 54. — Reiche, Ann. S. E. Fr. 1865, p. 634, n. 12. — Gemm. et Har. l. c., p. 2140. — Mrs., L'Ab., p. 40; Mon. 1872, p. 99, n. 47, tb. I, f. 12. — Baudi, l. c., p. 362. — Gorr., Mon. Col. 1882, p. 86, n. 15. — Beur., Ins. ves. 1890, p. 532. — Sum. l. c., p. 27.
Mylabris maroccana Dej., Cat. Col., ed. 3, 1837, p. 244.
Zonabris oleae Pic, Rev. sc. Bourb. 1897, p. 1 (Extrait).

1) Ab. β n. Tache médiane interne sur les élytres manque.

Ab. γ n. Tache antéapicale manque.

Ab. δ n. La même position des taches comme dans la ab. α , mais tache antéapicale manque.

ab. *rimosa* Mrs.

Mylabris oleae var. *rimosa* Mrs., L'Ab., p. 40; Mon. 1872, p. 24, tb. I, f. 12^a.

Zonabris oleae var. *rimosa* Pic, Rev. sc. Bourb. 1897, p. 1 (Extrait); L'Ech. XXXVI, 1921, p. 24.

Mylabris oleae ab. α Sum. l. c.

ab. *separata* Pic

Zonabris oleae var. *separata* Pic, Rev. l. c.; L'Ech l. c.

ab. *multinotata* Pic

Zonabris oleae var. *multinotata* Pic, L'Ech. XXII 1906, p. 26; id. XXXI, 1921, p. 24.

ab. ι Sum. l. c.

ab. *harterti* Pic

Zonabris oleae var. *harterti* Pic, L'Ech. (XXXVI, 1921, p. 23.

ab. κ Sum. l. c.

ab. *bireductenotata* Pic, L'Ech. XXX, 1914, p. 1; id. XXXVI, 1921, p. 24.

ab. *hipponensis* Pic, *ibid.*, p. 23.

ab. *obliterata* Baudi, Pic, *ibid.* (Note).

ab. *drahamensis* Pic, *ibid.*, p. 24.

ab. *laghouatensis* Pic, *ibid.*

ab. *diversedivisa* Pic, *ibid.*

var. A. (olim) Pic, Rev. l. c.

ab. β Sum. l. c.

ab. *unidivisa* Pic, L'Ech. l. c.

var. B. (olim) Pic, Rev. l. c.

ab. *postdivisa* Pic, L'Ech. l. c.

var. C. (olim) Pic, Rev. l. c.

ab. δ Sum. l. c.

ab. *bidivisa* Pic, L'Ech. l. c.

ab. *tridivisa* Pic, *ibid.*

ab. *latenigra* Pic, *ibid.*

var. F. (olim) Pic, Rev. l. c.

ab. η Sum. l. c.

ab. *bisbireducta* Pic, L'Ech. l. c.

var. G. (olim) Pic, Rev. l. c.

ab. θ Sum. l. c.

ab. *mediobliterata* Pic, L'Ech. l. c.

var. E. (olim) Pic, Rev. l. c.

ab. ζ Sum. l. c.

Hab.: Hispania, Marocco (Marraquesh, Mogador, Tanger, Amismiz, Mequinez), Algeria (Laghouat, Bou-Saada, Ghardaia, Mecheria), Tunisia (Gafsa, Aïn-Draham).

91. **atrofasciata** Pic, 1921.

Zonabris atrofasciata Pic, L'Ech. XXXVI, n. 403, 1921, p. 4.

Hab.: Persia.

92. **soubironi** Pic, 1921.

Zonabris soubironi Pic, L'Ech. XXXVII, n. 404, 1921, p. 5.

Hab.: Algeria mer.

93. **tenebrosa** Lap.-Cast. 1840.

Mylabris tenebrosa Chvr., in Silb. Rev. V, 1837, p. 275, n. 16 (nom. nud.) — Lap.-Cast. l. c., n. 14. — Reiche, Ann. S. E. Fr. 1865, p. 634, n. 13. — Mrs., L'Ab. VII, 1870, p. 48. — Gemm. et Har. l. c., p. 2143. — Mrs., Mon. Myl. 1872, p. 108, n. 57, tb. I, f. 18. — Baudi, l. c., p. 368. — Beaur l. c., p. 537. — Sum. l. c.

Mylabris luctuosa Dej. l. c. nom. nud.

Mylabris damascena Reiche, l. c., n. 14. — Gemm. et Har. l. c., p. 2136. — Mrs., L'Ab., p. 47; Mon. 1872, n. 56, tb. I, f. 17. — Baudi, p. 376. — Beaur. l. c., p. 525.

Mylabris baulnyi Mrs., L'Ab., p. 49. — Gemm. et Har. l. c., p. 2144. — Mrs., Mon., p. 109, n. 58, tb. II, f. 19.

Zonabris tenebrosa var. *baulnyi* Bed., Ann. S. E. Fr. 1885, p. 87.

Zonabris tenebrosa Pic, Rev. sc. Bourb. 1897, p. 2 (Extrait). — Eschr., Wien. E. Z. XVIII, 1899, p. 91. — Pic, L'Ech. XXXVI, 1921, p. 24.

Zonabris damascena Eschr. l. c.

Zonabris baulnyi Eschr. ibid.

ab. *uniluteofasciata* Pic

Zonabris tenebrosa var. *luteofasciata* Pic, L'Ech. XXXVII, n. 404, 1921, p. 6.

ab. *postluteofasciata* Pic

Zonabris tenebrosa var. *postluteofasciata* Pic, ibid.

ab. *triluteofasciata* Pic

Zonabris tenebrosa var. *triluteofasciata* Pic, ibid.

ab. *soufensis* Pic

Zonabris tenebrosa var. *soufensis* Pic, ibid.

ab. *postluteonotata* Pic

Zonabris tenebrosa var. *postluteonotata* Pic, *ibid.*

Hab.: Algeria (Sidi-bel-Abess, Ghardaia, Biskra, Ras-el-ma, Chellala, Bou-Saada, El-Kantara, Lalla-Maghrnia), Tunisia (oasis Gafsa), Tripolitania, Aegyptus; Sinaj, Syria, (Jericho), Persia; Graecia.

m. *longipilis* Pic, 1897.

Zonabris tenebrosa longipilis Pic, *Rev. sc. Bourb.* 1897, p. 124; *L'Ech.* XXXVI, n. 403, 1921, p. 24.

Mylabris tenebrosa m. *longipilis* Sum. l. c.

ab. *unifenestrata* Pic, *L'Ech.* XXXI, n. 361, 1915, p. 2.

Hab.: Aegyptus.

94. *syriaca* Klg. 1845.

Mylabris intersecta Latr. *Dej., Cat. Col.*, ed. 3, 1837, p. 244. — Reiche, *Ann. S. E. Fr.* 1857, p. 274, n. 189.

Mylabris gebleri Fald., *Fn. Transcauc.* II, 1837, p. 124, n. 376, tb. 4, f. 9. — *Dej. l. c.* — *Mrs., L'Ab.*, p. 44; *Mon.* 1872, p. 105, n. 52^a.

Mylabris dioscoridis A. Rich., *Elem. hist. nat. med.*, ed. 3, 1838, p. 300.

Mylabris syriaca Klg., *Symb. phys.*, IV, 1845, tb. XXXII, f. 1. — Reiche, *Ann. S. E. Fr.* 1865, p. 633, n. 7. — *Gemm. et Har. l. c.*, p. 2143. — *Mrs., L'Ab.*, p. 43; *Mon.* 1872, p. 104, n. 52, tb. I, f. 14. — *Baudi, l. c.*, p. 362. — *Beaur. l. c.*, p. 537. — *Bed., Bull. S. E. Fr.* 1891, p. VII — *Sum. l. c.*

Zonabris syriaca Eschr. l. c. — *Reitt., Cat. Col. Eur.* 1906, 448. — *Calw., Käferb.* II, 1914, p. 754.

ab. *gebleri* Fald.

Mylabris syriaca var. *gebleri* Baudi, l. c., p. 366.

ab. *leseleuci* Pic

Zonabris syriaca var. *leseleuci* Pic, *L'Ech.* XV, 1898, p. 2.

ab. *smyrnensis* Eschr., *Wien. E. Z.* XVIII, 1899, p. 109, n. 25, tb. II, f. 19.

Hab.: ? Romania, Graecia (Athenae); Asia Minor (vall. Tshakit), Syria (Akbes), Persia occ.; Aegyptus, Nubia (Senaar).

m. *suturalis* Pic, 1890

Zonabris suturalis Pic, Miscel. Ent. VI, 1898, p. 2¹).

ab. *morgani* Pic

Zonabris suturalis var. *morgani* Pic, L'Ech. XXXVI, 1920, p. 12.

Hab.: Syria.

95. ***interrupta*** Ol. 1811.

Mylabris interrupta Ol., Enc. meth. VIII, 1811, p. 93, n. 7. — Fisch. J., Tent. 1827, p. 4, n. 14. — Luc., Hist. nat. Alg. 1846, p. 387, tb. 33, f. 7. — Gemm. et Har., Cat. Col. VII, 1870, p. 2138. — Mrs., L'Ab., p. 41; Mon. 1872, p. 104, n. 51, tb. I, f. 13. — Baudi, Berl. E. Z. XXII, 1878, p. 362. — Beaur., Ins. ves. 1890, p. 529. — Sum. l. c.

Mylabris excelens Redt., Denkschr. Ac. Wiss. Wien. I, 1850, p. 49, n. 19.

Zonabris interrupta Eschr. l. c.

ab. *subunifasciata* Pic

Zonabris interrupta var. *subunifasciata* Pic, L'Ech. XXXVI, n. 400, 1920, p. 13.

ab. *mediounifasciata* Pic

Zonabris interrupta var. *mediounifasciata* Pic, ibid.

Hab.: Persia (Luristan); Aegyptus, Nubia, Algeria.

96. ***diversepunctata*** Pic, 1921.

Zonabris diversepunctata Pic, L'Ech. XXXVII, n. 404, 1921, p. 5.

Hab.: Syria (Aleppo).

97. ***cincta*** Ol. 1811.

Mylabris cincta Ol. l. c., n. 9. — Fisch. J. l. c., n. 1. — Dej. l. c. — Reiche, Ann. S. E. Fr. 1865, p. 634, n. 11. — Gemm. et Har. l. c., p. 2135. — Mrs., L'Ab., p. 51; Mon. 1872, p. 110, n. 60, tb. I, f. 21. — Baudi, l. c., p. 363. — Beaur. l. c., p. 524. — Portsh. (Порч.), Тр. Бюро Энт. XI, 1914, p. 56, n. 11, tb. II, f. 12. — Sum. l. c.

Mylabris tiplensis Bilb., Mon. Myl. 1813, p. 13, n. 5, tb. III, f. 1. — Schh., Syn. ins. III, 1817, p. 31, n. 6. — Dej. l. c. — Mrs., Mon. Myl. 1872, p. 112, n. 63, tb. V, f. 43.

Mylabris interrupta Latr. Dej. l. c.

1) L'absence des marques caractéristiques chez cette espèce, excepté la suture obscurcie sur les élytres, ne donne pas de fondement assez suffisant pour regarder *M. suturalis* comme une espèce séparée.

- Mylabris matthesi* Fald., Fn. Transcauc. II, 1837, p. 120, n. 373. —
- Mylabris taeniata* Waltl, Isis VI, 1838, p. 465, n. 91.
- Mylabris bicolor* Waltl, ibid.
- Mylabris militaris* Klg., Strm. Cat. 1843, p. 172.
- Mylabris conspicua* Helf., Strm. l. c.
- Mylabris jugatoria* Reiche, l. c., p. 633, n. 8. — Gemm. et Har. l. c., p. 2138. — Mrs., L'Ab., p. 50; Mon. 1872, p. 109, n. 59, tb. I, f. 20. — Baudi, l. c. — Beur. l. c., p. 530.
- Mylabris fasciatopunctata* Fald. Baudi, l. c.
- Zonabris cincta* Eschr., Stett. E. Z. LVIII, 1897, p. 43; Wien. E. Z. XVIII, 1899, p. 91. — Bodem., Quer durch Kl. As. 1900, p. 121. — Reitt., Cat. Col. Eur. 1906, p. 448. — Calw., Käferb. II, 1914, p. 754. — Escal., Trab. Mus. Nac. Madr. 1914, p. 396.
- Zonabris jugatoria* Calw. l. c.
ab. *matthesi* Fald.
- Mylabris cincta* var. *matthesi* Dej. l. c. — Gemm. et Har. l. c., p. 2135. — Mrs. l. c., p. 283, n. 60. — Baudi, l. c. — Beur. l. c.
- Mylabris cincta* ab. *a* Sum. l. c.
ab. *algerica* Pic
- Zonabris jugatoria* var. *algerica* Pic, Miscel. Ent. VI, 1898, p. 3.
ab. *gafsaensis* Pic
- Zonabris jugatoria* var. *gafsaensis* Pic, L'Ech. XXXI, 1915, p. 2.
ab. β Sum. l. c.
- ab. *rufofasciata* Pic
- Zonabris jugatoria* var. *rufotrifasciata* Pic, L'Ech. XXXVII, 1921, n. 404, p. 5 (Note).
ab. *alfierii* Pic
- Zonabris jugatoria* v. *alfierii* Pic, Bull. S. R. E. d'Egypte XIII, 1921, p. 45.
ab. *rufobifasciata* Pic
- Zonabris jugatoria* var. *rufobifasciata* Pic, ibid.
ab. *rufomaculata* Pic
- Zonabris jugatoria* var. *rufomaculata* Pic, ibid.
- Hab.: Graecia (Athenae, Aetolia), Asia, Minor (Ak-dagh), Caucasus (prov. Kasakor. fluv. Kuban, Dagestan, Aresh, vall.

fl. Pirsagat, Erivan, vall. fl. Arax), Armenia (Olty), Persia (Luristan), Syria (Akbes, Hierosolyma, vall. fluv. Jordanes); Aegyptus, Tunisia, Algeria et Marocco (Marraquesh).

98. *cincta schrenki* Gebl. 1841.

Mylabris schrenki Gebl., Bull. Ac. St.-Pet. VIII, 1841, p. 374, n. 17; Bull. S. N. Mosc. XXXII, 1859, p. 488, n. 15. — Gemm. et Har., Cat. Col. VII, 1870, p. 2142. — Mrs., L'Ab. VII, 1870, p. 52; Mon. Myl. 1872, p. 110, n. 61, tb. I, f. 22. — Ball., Bull. S. N. Mosc. LIII, 1878, p. 335, n. 171. — Beaur., Ins. ves. 1890, p. 535. — Sum., Hor. S. E. Ross. XLII, 1915, p. 29.

Zonabris schrenki Heyd., Deut. E. Z. XXV, 1881, p. 327; Cat. Col. Sib. 1881, p. 151; Deut. E. Z. XXVII, 1883, p. 68. — Dokh., Hor. S. E. Ross. XXIV, 1889, p. 134, n. 1, tb. II, f. 2. — Heyd. Cat. Col. Sib., Nacht. I, 1893, p. 131. — Eschr. l. c.

ab. α Sum. l. c.

ab. β Sum. l. c.

ab. γ Sum. l. c.

ab. σ nova¹).

Hab.: Sibiria mer.-occ. (Semipalatinsk, lac. Balchash), Turkestan (prov. Syr-darjensis: vall. fluv. Talas; Semiretshje; Samarkand; Fergana: Margelan), Bucharia (Baldzhuin, Darvaz, jugum Hissariense), Dzhungaria et Pamir (Dabeba).

99. ? *reitteri* Dokh. 1889.

Zonabris reitteri Dokh., Hor. S. E. Ross. XXIV, 1889, p. 157, n. 33, tb. II, f. 5. — Eschr., Wien. E. Z. XVIII, 1899, p. 91.

Hab.: Turkestan, Transcaspia (Arman-Saada) et Persia Chorasani).

100. *omocrates* Mot. 1872.

Mylabris axillaris Mot. (nom. praeocc.) l. c.

Zonabris axillaris Heyd., Cat. Col. Sib. 1881, p. 152.

Mylabris omocrates Well., Deut. E. Z. 1910, p. 23.

Hab.: Dauria, Mongolia.

101. *tlemceni* Pic

Zonabris tlemceni Pic, L'Ech. XLVI, n. 439, 1930, p. 3.

1) ab σ n. Dessin des taches sur les élytres comme dans l'espèce typique, mais fascie antérieure remplacée par deux taches de forme arrondie.

ab. *subnigromarginalis* Pic, ibid.

Hab.: Tripolitania, Algeria (Tlemcen).

102. *calida* Pall. 1781.

Chrysomela cichorii Hasselq., Iter Palaest. 1757, p. 410, n. 101.

Meloe calida Pall., Icon. ins. 1781, p. 85, tb. E, f. 10.

Mylabris maculata Ol., Ent. III, 1795, p. 7, n. 6, tb. I, f. 9. — Bilb., Mon. Myl. 1813, p. 53, n. 41, tb. VI, f. 10, f. 11 (var. β), f. 12 (var. γ). — Fisch.-W., Entomogr. II, 1823, p. 225, tb. XL, f. 5. — Gebl., Mém. S. N. Mosc. (Nouv.) II, 1832, p. 57, n. 2. — Mén., Cat. rais. 1832, p. 207, n. 918. — Walzl, Isis, 1838, p. 465, n. 97. — Mot., Mel. biol. Ac. St.-Pet., 3, 1860, p. 442; Bull. Ac. St.-Pet. III, 1860, p. 537. — Reiche, Ann. S. E. Fr. 1865, p. 638, n. 48. — Gemm. et Har. l. c., p. 2139. — Sols., Hor. S. E. Ross. VI, 1871, p. 380. — Baudi, Berl. E. Z. XXII, 1878, 372.

Mylabris bimaculata Ol., Enc. meth. VIII, 1811, p. 94, n. 12. — Fisch. J., Tent. 1827. — Dej., Cat. Col., ed. 3, 1837, p. 245. — Jacq.-Duv., Gen. Col. Eur. 1868, tb. 93, f. 463.

Mylabris decora Ol. l. c., n. 14.

Mylabris calida Tausch., Mém. S. M. Mosc. III. 1812, p. 138, n. 7, tb. X, f. 9. — Gebl., Mém. S. N. Mosc. (Nouv.) I, 1829, p. 156, n. 4; in Ledeb. Reise, 1830, p. 138, n. 6. — Krynn., Bull. S. N. Mosc. V, 1832, p. 139, n. 7. — Gebl., Bull. S. N. Mosc. XX, 1847, p. 495, n. 2. — Mén., Descr. II, 1848, p. p. 31. — Gebl., Bull. S. N. Mosc. XXXII. 1859, p. 486: n. 3. — Mot., Col. Sib. or. II, 1860, p. 144. — Mrs., L'Ab. VII, 1870, p. 114; Mon. Myl. 1872, p. 159, n. 128, tb. II, f. 71. — Ball., Bull. S. N. Mosc. LIII, 1878, p. 339, n. 178. — Beur., Ins. ves. 1890, p. 522. — Portsh. (Порт.), Тр. Бюро Энт. XI, 1814, p. 54, n. 6, tb. II, f. 11. — Sum. l. c.; Sitzungsab. Nat.-Ges. Univ. Dorp. XXXI, 1924, p. 84, n. 4.

Mylabris maura Chvr., in. Silb. Rev. V, 1837, p. 273. n. 10.

Mylabris contigua Strm., Cat. 1843, p. 172.

Mylabris niligena Reiche, l. c., n. 49.

Zonabris calida Heyd., Cat. Col. Sib. 1881, p. 152. — Dokh., Hor. S. E. Ross. XXIV, 1889, p. 135, n. 2, tb. II, f. 3. — Heyd., Deut. E. Z. XXXIV, 1890, p. 354; Cat. Col. Sib., Nacht. I, 1893, p. 129. — Eschr., Stett. E. Z. LVIII,

1897, p. 43; Wien. E. Z. XVIII, 1899, p. 91. — Calw., Käferb. II, 1914, p. 754.

Zonabris maculata Heyd. l. c., p. 151. — Reitt., Verh. nat. Ver. Brünn XXVII, 1889, p. 120. — Eschr. l. c. — Reitt., Cat. l. c. — Calw. Käf. l. c.

Mylabris calida var. d, Gebl. l. c.

„ „ ab. β Sum. l. c.

ab. *niligena* Reiche.

Mylabris maculata var. *niligena* Gemm. et Har. l. c.

Mylabris calida var. *niligena* Mrs. l. c.

Mylabris calida ab. a Sum. l. c.

ab. *maculata* Ol.

Mylabris calida var. *maculata* Mrs. l. c.

Mylabris maculata var. *calida* Baudi, l. c.

Zonabris calida var. *maculata* Heyd., Deut. E. Z. XXV, 1881. — Dokh. l. c., p. 136, tb. II, f. 4. — Heyd., Cat., Nacht. I, 1893, p. 129. — Escal. l. c.

Mylabris calida var. *bimaculata* Beur. l. c.

Zonabris calida var. *maura* Escal. l. c.

Mylabris calida ab. γ Sum. l. c.

ab. *latifasciata* Pic

Zonabris calida var. *latifasciata* Pic, L'Ech. XII, 1896, p. 62; Rev. Bourb. 1897, p. 3 (Extrait).

Mylabris calida ab. ϑ Sum. l. c.

ab. *bijuncta* Pic

Zonabris calida var. *bijuncta* Pic, Misc. Ent. V, 1897, p. 2.

ab. *transcaspica* Eschr.

Zonabris maculata var. *transcaspica* Eschr. Wien, p. 107, n. 18.

Mylabris calida ab. ι Sum. l. c.

ab. δ Sum. l. c.

ab. ϵ Sum. ibid.

ab. η Sum. ibid.

ab. *baicalica* Pic.

Zonabris calida var. *baicalica* Pic, L'Ech. XXXV, n. 396, 1919, p. 22.

Hab.: Graecia (Attica et Aetolia), Rossia eur. (Tauria, Astrachan); Sibiria (Tobolsk, Tomsk, Enisejsk, Transbajcalia, prov. Amurens.), Mantshzhuria, Korea, Dzhungaria, Turkestan

(prov. Turgaica, prov. Syr-darjensis, Semiretshje, Samarcand, Fergana), Bucharia, prov. Transcaspica (Balchan Mag., Geok-Tepe), Persia (Luristan), Caucasus (Dagestan: Petrovsk; Tiflis, Baku, Erivan, Dzhulfa, Etshmiadzin), Asia Minor (Angora), Syria (Libanon), Sinaj; Aegyptus, Tunisia, Algeria (Chellala).
m. *posticalis* Dokh. 1889.

Zonabris posticalis Dokh. l. c., f. 1. — Heyd., Cat. l. c.

Zonabris maculata var. *maroccana* Eschr. l. c., n. 19, tb. II, f. 14.

Zonabris calida var. *maroccana* Escal. l. c.

Mylabris calida ab. ♂ Sum. l. c.

? ab. *bimaculaticeps* Pic

Zonabris bimaculaticeps Pic, L'Ech. XXXVI, n. 400, 1920, p. 13.

Hab.: Turkestan (Dzhizak, Osh), Dzhungaria, Persia (Luristan), Algeria (Oran), Marocco (Tanger).

103. *breviapicalis* Pic, 1919.

Zonabris breviapicalis Pic, L'Ech. XXXV, n. 396, 1919, p. 21.

Hab.: Asia Minor (Tokat).

104. ? *heydeniana* Dokh. 1889.

Zonabris heydeniana Dokh. l. c., p. 145, n. 15, tb. II, f. 23. — Heyd., Cat. Col. Sib., Nacht I, 1893, p. 130.

Mylabris magnoguttata ab. ♀ Sum., Hor. S. E. Ross. XLII, 1915, p. 30.

ab. a Dokh.

Zonabris heydeniana var. a Dokh. l. c., p. 146.

ab. ♂ Sum. l. c.

Hab.: Turkestan (Margelan).

105. *magnoguttata* Heyd. 1881.

Zonabris magnoguttata Heyd., Deut. E. Z. XXV, 1881, p. 329; Cat. Col. Sib. 1881, p. 153; Deut. E. Z. XXVII, 1883, p. 68. — Dokh., Hor. S. E. Ross. XXIV, 1889, p. 146, n. 16, tb. II, f. 21. — Heyd., Cat. Col. Sib., Nacht. I, 1893, p. 130.

Zonabris margarithae Reitt., Verh. nat. Ver. Brünn 1889, p. 120. — Heyd., Cat. Col. Sib. 1893, l. c. (v. ? Margarithae).

Mylabris magnoguttata Beur. l. c., p. 531. — Sum. l. c. ab. *aschabadensis* Voigts.

Zonabris magnoguttata var. *aschabadensis* Voigts,
Wien. E. Z. XXI, 1902, p. 178.

Zonabris magnoguttata ? var. *fasciculata* Eschr. Wien.
E. Z. XVIII, 1899, p. 108, n. 22, tb. II, f. 16 (nom. praeocc).

ab. α Sum. l. c.

ab. β Sum. l. c.

ab. *disjuncteguttata* Pic

Zonabris magnoguttata var. *disjuncteguttata* Pic,
L'Ech. XXXV, n. 395, 1919, p. 19.

Hab. Turkestan (Samarkand; stat. ferrov. „Golodnaja
stepp“; Fergana: Osh, Margelan), Bucharica (Baldzhuan), Trans-
caspi^a (Tedzhen, Chodzha-kala), Dzhungaria (Kuldzha), ? Cau-
casus¹⁾ (Dagestan); Rossia or. (distr. Uralsk)²⁾.

? m. *excisofasciata* Heyd. 1883.

Zonabris excisofasciata Heyd., Deut. XXVII, 1883, p.
68. — Dokh. l. c., p. 148, n. 19, tb. II, ff. 32—34. —
Reitt. l. c.

ab. *oschensis* Heyd.

Zonabris excisofasciata var. *oschensis* Heyd. l. c.

Mylabris magnoguttata ab. ϱ Sum., Hor. S. E. Ross.
XLII, 1915, p. 31.

ab. a Dokh.,

Zonabris excisofasciata var. a Dokh. l. c.

ab. α Sum. l. c.

ab. a' Dokh. l. c., p. 149.

ab. λ Sum. l. c.

ab. b Dokh. l. c.

ab. μ Sum. l. c.

ab. c Dokh. l. c.

ab. ν Sum. l. c.

ab. d Dokh. l. c.

ab. ξ Sum. l. c.

ab. e Dokh. l. c.

ab. π Sum. l. c.

Hab.: Turkestan (Samarkand; Fergana: Osh, Namangan,
Margelan) et Transcaspi^a (Merv, Murgab, Sary-Jasy).

106. *kushkensis* Pic

1) Teste Radde.

2) Teste Zhuravskij.

Zonabris kusckensis Pic, L'Ech XXXV, n. 396, 1919, p. 21.

ab. α }
 ab. β } ab. n. Sum.¹⁾
 ab. γ }

Hab : Transcaspia (Kushka), Bucharica (Farab), Turkestan (Kasalinsk, Dzhizak), Persia (Luristan).

107. *Sumacovi* Pic²⁾.

Zonabris sumakovi Pic, L'Ech. XLVI, n. 439, 1930, p. 1.

Mylabris magnoguttata ab. δ Sum., Hor. S. E. Ross. XLII, 1915, p. 30.

ab. α }
 ab. β } ab. n. Sum.³⁾

Hab.: Transcaspia (Tshardzhuj), Bucharica (Farab), Turkestan (Perovsk).

108. *fabricii* Sum. typ. 1924.

Mylabris decimpunctata Petag., Spec. ins Calabr. 1787, p. 27, n. 134. — Ill., Mag. III, 1801, p. 175, n. 14. — Goldf., Handb. 1805, p. 335. — Ol., Enc. meth. VIII, 1811, p. 99, n. 42. — Tausch., Mém. S. N. Mosc. III, 1812, 140, n. 9, tb. X, f. II. — Bilb., Mon. Myl. 1813, p. 65, n. 44, tb. VI, f. 17; f. 18 (var. β); — Schh., Syn. ins. III, 1817, p. 40, n. 49. — Fisch. J., Tent. 1827, p. 12. — Mén., Cat. rais. 1832, p. 207, n. 919. — Krynn., Bull. S. N. Mosc. V,

1) ab. α n. — Dessin des élytres comme dans l'espèce typique, mais tache médiane remplacée par une fascie transversale complète.

ab. β n. — Dessin comme dans l'aberration précédente, mais taches antérieures se confluent ensemble.

ab. γ n. — Dessin comme dans l'ab. α , mais tache antéapicale remplacée par une fascie complète.

2) *M. sumakovi* et *M. kushkensis* Pic se rapprochent de très près l'un de l'autre; la différence est seulement dans le dessin: chez la *sumakovi* les élytres se finissent par une large fascie. L'une de ces espèces n'est — elle pas la morpho de l'autre? C'est dommage qu'on ne puisse trancher cette question au moyen de matériaux de collection.

3) ab. α n. — Taches antérieures internes se confluent sur la suture, formant une tache cordiforme.

ab. β n. — Taches antérieures remplacées par une fascie raccourcie en dehors et en dedans.

1832, p. 139, n. 8. — Brullé, Exped. Mor. 1832, p. 229. — Chvr., in Silb. Rev. V, 1837, p. 276, n. 17. — Waltl, Isis VI 1838, p. 465, n. 96. — Muls., Hist. nat. Col. Fr. 1857, p. 131, n. 4. — Reiche, Ann. S. E. Fr. 1865, p. 638, n. 48. — Gemm. et Har., Cat. Col. VII, 1870, p. 2136. — Mrs., L'Ab. VII, 1870, p. 127; Mon. Myl. 1872, p. 165, n. 139, tb. III, f. 83. — Baudi, Berl. E. Z. XXII, 1878, p. 374. — Gorr., Mon. Mel. 1882, p. 122, n. 16. — Beaur., Ins. ves. 1890, 525. — Portsh. (Порч.), Тр. Бюро Энт. XI, 1914, p. 56, n. 9, tb. I, f. 8. — Voronz. (Воронц.), Извѣст. Опб. От. Р. Георг. Об. XXIV, 1914, p. 132, tb. V, ff. a, b, c, d. — Sum., Hor. S. E. Ross. XLII, 1915, p. 31.

Meloe decimpunctata Gmel., in L. Syst. Nat., ed. 13, 1788, p. 2018, n. 6.

Mylabris forti Muls. l. c., p. 133, n. (5). — Gemm. et Har. l. c., p. 2137. — Beaur. l. c., p. 528.

Mylabris decimpunctata var. *forti* Baudi, l. c.

Zonabris bisquinquepunctata Friv. Baudi, l. c.

Zonabris decimpunctata Heyd., Cat. Col. Sib. 1881, p. 153. — Schils., Syst. Verz. Kaf. Deut. 1888, p. 95. — Dokh. l. c., p. 147, n. 18, tb. II, f. 25. — Heyd., Cat. Col. Sib., Nacht. I, 1893, p. 130. — Esch., Stett. E. Z. LVIII, 1897, p. 41. — Bodem., Quer durch Kl. As. 1900, p. 121.

Mylabris fabricii Sum., Sitzungsab. Nat. Ges. Univ. Dorp. XXXI, 1924, p. 86, n. 5.

ab. *deficiens* Fuente

Myalabris decimpunctata var. *deficiens* Fuente, Bol. R. Esp. Hist. X, 1910, p. 445.

ab. *a* Sum. l. c.

ab. *salmaticensis* Red.

Mylabris decimpunctata var. *salmaticensis* Red. Broteriã XIII, 1915, p. 31.

ab. *arapilensis* Red. ibid. p. 30.

Hab.: Hispania, Gallia mer., Italia, Tirol, Turcia eur., Graecia (Attica) Rossia eur. (Podolia, Cherson, Tauria, Ekaterinoslav, Charkov, Voronezh, prov. Kasakor. fl. Don, Astrachan, Saratov, Samara, Kasan, Orenburg; Sibiria, Turkestan (Tjulen-Agatsh, vall fluv. Zarevshan) Persia, Caucasus (Kauchor, Tidem, Groznyj, Achty, Elisavetpol, Dzhevat, Aresh, Lagodechi, Manglis, Zangezur).

109. ? *fabricii signata* (Fald.) Mrs. 1870.

Mylabris signata Fald. (nom. nud.) — Gemm. et Har. l. c., p. 2143. — Mrs., L'Ab., p. 129; Mon. 1872, p. 166, n. 140, tb. III, f. 82.

*Mylabris persica*¹⁾ Beaur., Bull. S. E. Fr. IX, 1889, p. l. c. XIII.

Mylabris decimpunctata signata Sum. l. c.

ab. a Sum l. c.

m. *incertepunctata* Sum. 1915.

Mylabris decimpunctata m. *incertepunctata* Sum. l. c., pp. 32 et 73.

Hab.: Transcaucasia (Elisavetpol, Erivan), Persia (Tavris, Luristan), Asia Minor (Ak-dagh., Bos-dagh, Bulgar-Maaden, Angora).

110. ? *crocata* Pall. 1781.

Meloe lutea Pall., Iter II, 1773. App, p. 722, n. 54^b. — Goeze, Ent. I, 1777, p. 702, n. 7.

Meloe crocata Pall., Icon. ins. I, 1781, p. 87, tb. E, f. 13.

Lytta lytea Gmel., in L. Syst. Nat., ed. 13, 1788, p. 2016, n. 19.

Mylabris crocata Ol., Enc. meth. VIII, 1811, p. 98, n. 39. — Bilb. l. c., p. 67, n. 46, tb. VII, f. 8. — Schh., Syn. ins. III, p. 41, n. 51. — Fisch. J., Tent. 1827, p. 11, n. 60. — Gebl., Mém. S. N. Mosc. (Nouv.) I, 1829, p. 157, n. 5; in Ledeb. Reise 1830, p. 137, n. 2. — Mén., Cat. rais. 1832, p. 207, n. 920. — Kryn. l. c., n. 9. — Waltl, l. c., n. 99. — Gebl., Bull. S. N. Mosc. XX, 1847, p. 495, n. 3. — Mén., Descr. II, 1848, p. 31. — Küst., Käf. Eur. XXIV, 1852, p. 86. — Muls. l. c., p. 137, n. 5^a. — Gebl., Bull. S. N. Mosc. XXXII, 1859, n. 5. — Mrs., L'Ab., p. 127; Mon. 1872, p. 164, n. 137, tb. III, f. 79. — Ball., Bull. S. N. Mosc. LIII, 1878, p. 339, n. 179. — Portsh. (Порч.) l. c., n. 9, tb. II, f. 9. — Vorontz. (Воронц.) l. c., p. 133, tb. VII, ff.: a, b, c, d, e, f, p, q, m.

Mylabris duodecimpunctata Tausch., Mém. S. N. Mosc. III, 1812, p. 139, n. 8, tb. X, f. 10.

Mylabris spectabilis Fald. Dej., Cat. Col., ed. 3, 1837, p. 245.

1) Sum., Hor. S. E. Ross. XLII, 1915, p. 4, note.

Mylabris daurica Mnn. Dej. l. c.

Mylabris lutea Reiche, l. c., n. 44. — Gemm. et Har. l. c., p. 2139. — Baudi, Berl. E. Z. XXII, 1878, p. 374. — Beaur. l. c., p. 521.

Zonabris lutea Heyd., Cat. Col. Sib. 1881, p. 153.

Zonabris crocata Dokh., Hor. S. E. Ross. XXIV, 1889, p. 152, n. 24, tb. II, f. 39. — Heyd., Cat. Col. Sib., Nacht. I, 1893, p. 130. — Eschr. l. c. — Bodem. l. c. — Reitt., Cat. Col. Eur. 1906, p. 447; Fn. Germ. III, 1911, p. 393. — Calw. l. c.

Mylabris decimpunctata m. *crocata* Sum. l. c.

ab. *daurica* Mnn.

Mylabris lutea var. *daurica*. Baudi, l. c., p. 372.

ab. *spectabilis* Fald.

Mylabris lutea var. *spectabilis*. Baudi, l. c.

ab. *brunnea* Pic

Zonabris crocata var. *brunnea* Pic, L'Ech. XIII, 1897, p. 41.

Mylabris decempunctata ab. δ Sum. l. c., p. 32.

ab. α Sum. l. c.

ab. β Sum. l. c.

ab. γ Sum. l. c.

ab. ε nova.¹⁾

Hab.: Hispania, Germania (Hanau, Meklenburg), Hungaria, Turcia eur., Graecia (Attica), Romania, Rossia eur. (Char'kov, Saratov, Orenburg, distr. Uralsk, Astrachan: Vladimirovka, lac. Baskuntshak; Sibirica (Omsk, Kolyvan, Loktevsk, Buchtarma, Semipalatinsk, Irkutsk, Troitzkosavsk), prov. Turgaica (stat. ferrov. Akmir, Ak-Tjube), Turkestan (lit. orient. lac. Aral, ostium flum. Syr-darja: Tjulen-Agatsh; distr. Perovsk, desert. Kisyl-Kum et Mujun-kum, Ur-Maral, Kopal, Golodnaja stepp.: Tshilabaj; jugum Hissariense: Kshtur; Iskander-darja, Kok-Dzhida), Dzhungaria (Kuldzha), Mongolia (lac. Elotaj), Mantshzhuria (jugum Hingan Magn.), Caucasus (Terekli, Manglis), Persia, Syria.

111. *impressa* Chvr. 1337.

Mylabris impressa Chvr., in Silb. Rev. V, 1837, p. 275, n. 14. — Reiche, Ann. S. E. Fr. 1865, p. 638, n. 46. —

1) ab. ε n. — Taches externes: médiane et antéapicale manquent.

Gemm. et Har., Cat. VII, 1870, p. 2138. — Mrs., L'Ab. VII, 1870, p. 124; Mon. Myl. 1872. p. 164, n. 136, tb. III, f. 78. — Gorr., Mon. Col. Mel. 1882, p. 117, n. 14. — Beur., Ins., ves. 1890, p. 529. — Sum., Hor. S. E. Ross. XLII, 1915, p. 42.

Mylaris stillata Baudi, l. c., p. 375.

Zonabris impressa Eschr., Wien. E. Z. XVIII, 1899, pp. 90 et 101: Reitt., Cat. Col. Eur. 1906, p. 447. — Escal., Trab. Mus. Nac. Madr., 1914, p. 396. — Calw. l. c.

ab. *stillata* Baudi

Mylabris impressa var. *stillata*. Beur. l. c.

Zonabris impressa var. *stillata* Reitt. l. c. — Calw. l. c.

ab. *oranensis* Pic

Zonabris impressa var. *oranensis* Pic., L'Ech. XXV, 1909, p. 185.

Mylabris impressa ab. *oranensis* Sum. l. c.

Hab.: Sicilia, Hispania, Portugalia, Marocco (Marraquesh, Imi-n'Tanut), Algeria.

112. ***aulica*** Mén. 1832.

Mylabris aulica Mén., Cat. raes. 1832, p. 208, n. 924. — Fald., Fn. Transcauc. II, 1837, p. 129, n. 380. — Mrs., Mon. Myl. 1872, p. 277, n. 137^a. — Baudi, l. c., p. 371. — Beur., Ins. ves. 1890, p. 522. — Sum., Hor. S. E. Ross. XLII, 1915, p. 32.

Mylabris crocata var. *aulica* Mrs. l. c. p. 292, tb. III, f. 79^a.

Zonabris crocata var. *aulica* Reitt., Cat. Col. Eur. 1906, p. 447.

ab. α Sum. l. c.

ab. β Sum. l. c.

ab. γ Sum. l. c.

Hab.: Sibiria or. (Minusinsk, Irkutsk, prov. Ussuriens.), Mong. bor.-or. (lac. Elotaj), Mantshzhuria (jugum Hingan M.), China (vall. Liu-li-cho, a 60 km. ab Pekin).

113. ***javeti*** Mrs. 1870.

Mylabris javeti Mrs., L'Ab. VII, 1870, p. 63. — Gemm. et Har. l. c., p. 2133. — Mrs., Mon. 1872, p. 125, n. 77, tb. I, f. 31. — Beur. l. c. p. 530. — Sum. l. c., p. 33.

Zonabris javeti Heyd., Deut. E. Z. XXVII, 1883, p. 356. — Dokh. l. c., p. 156, n. 31, tb. II, f. 10. — Reitt.,

Verh. nat. Ver. Brünn. XXVII, 1889 p. 120. — Heyd., Cat. Col. Sib., Nacht. I, 1893, p. 130.

Hab.: Transcaspia (Aschabad), Persia.

114. *triangulifera* Heyd. 1883

Zonabris triangulifera Heyd. l. c., p. 359. — Dokh. l. c., p. 136, n. 4, tb. II, f. 6. — Heyd. Cat. l. c.

Mylabris triangulifera Beaur. l. c., p. 538. — Sum. l. c.

Hab.: Transcaspia (Merv, Geok-Tepe), Bucharia (Tshardzhuj).

115. *colligata* Redt. 1850.

Mylabris colligata Redt., Denkschr. Ac. Wiss. Wien. 1850, p. 49, n. 22. — Mrs., L'Ab., p. 61. — Gemm. et Har. l. c., p. 2135. — Mrs., Mon. 1872, p. 124, n. 75, tb. I, f. 29. — Baudi, l. c., p. 365. — Beaur. l. c., p. 524. — Sum. l. c.

Mylabris succincta Fald. Baudi, l. c.

Hab.: Persia (Shiraz).

116. ? *bimaculata* Klg. 1845.

Mylabris bimaculata Klg., Symb. phys. IV, 1845, p. 32, n. 2. — Mrs., L'Ab., p. 62; Mon. 1872, n. 76, tb. I, f. 30. — Baudi, l. c. — Sum. l. c.

Hab.: ? Tauria, Caucasus, Persia, Syria et Asia Minor.

117. *cingulata* Fald. 1837.

Mylabris cingulata Fald., Fn. Transcauc. II, 1837, p. 122, n. 374, tb. IV, f. 10. — Gemm. et Har., l. c. — Mrs., L'Ab., p. 60; Mon. 1872, p. 123, n. 74, tb. I, f. 28. — Baudi, l. c. — Beaur. l. c. — Sum., l. c., p. 34.

Zonabris cingulata Dokh. l. c., n. 32, tb. II, f. 11. — Heyd., Cat. 1893, p. 129. — Reitt., Cat. 1906, p. 447. — Calw., Käferb. 1914, p. 754.

ab. *flavipennis* Rtt.

Zonabris cingulata var. *flavipennis* Reitt. Dokh. l. c., p. 157.

Hab.: Transcaucasia, Persia et Arabia.

118. *husseini* Redt.

Mylabris husseini Redt. l. c., p. 23. — Gemm. et Har. l. c., p. 2138. — Mrs., L'Ab., p. 53; Mon. 1872, p. 13, n. 64, tb. I, f. 23. — Baudi, Berl. E. Z. XXII, 1878, p. 376. — Beaur. l. c., p. 529. — Sum. l. c.

Hab.: Persia (Shiraz); Aegyptus.

119. *apicipennis* Reiche, 1865.

Mylabris apicipennis Reiche, Ann. S. E. Fr. 1865, p. 635, n. 17. — Gemm. et Har. l. c. — Mrs., L'Ab., p. 64; Mon. 1872, p. 126, n. 79, tb. I, f. 33. — Baudi, l. c., p. 365. — Beur. l. c., p. 521. — Sum. l. c.

Zonabris apicipennis Eschr., Wien. E. Z. XVIII, 1899, p. 91.

Mylabris aegypticica Dej. (nom. nud.).

Mylabris apicalis Sol. in litt.

Mylabris luxorii Sol. in litt.

ab. *innesi* Pic

Zonabris apicipennis var. *innesi* Pic, L'Ech. XXVIII, 1912, p. 1.

ab. *fourtani* Pic

Zonabris apicipennis var. *fourtani* Pic, Bull. S. E. d'Eg.

Hab.: Aegyptus.

120. *sexmaculata* Ol. 1811.

Mylabris sexmaculata Ol. l. c., p. 98, n. 38. — Mrs., L'Ab., p. 58; Mon. 1872, p. 123, n. 73, tb. I, f. 27. — Sum. l. c.

Mylabris superba Fald. l. c., p. 123, n. 375. — Gemm. et Har. l. c., p. 2143. — Baudi l. c., p. 372. — Beur. l. c., p. 537.

Mylabris ledereri Mrs., L'Ab., p. 57; Mon. 1872, p. 123, n. 72, tb. I, f. 26. — Beur. l. c., p. 530. — Portsh. (Порч.), Тр. Бюро Энт. XI, 1914, pp. 57—58, n. 13, tb. II, f. 13.

Zonabris ledereri Dokh. l. c., p. 147, n. 17, tb. II, f. 20. — Heyd., Cat. Col. Sib., Nacht. I, 1893, p. 130. — Eschr. l. c., p. 90.

Zonabris sexmaculata Reitt. l. c. — Calw. l. c.

ab. *ledereri* Mrs.

Zonabris sexmaculata var. *ledereri* Reitt. l. c. — Calw. l. c.

Zonabris ledereri var. *sexmaculata* Eschr. l. c.

Mylabris sexmaculata ab. *a* Sum. l. c.

ab. *onerata* Eschr.

Zonabris ledereri var. *onerata* Eschr. l. c., p. 109, n. 26, tb. II, f. 20.

Mylabris sexmaculata ab. β Sum. l. c.

Hab.: Rossia eur. (Cherson); Turkestan, Persia, Caucasus

(Dagestan, Elisavetpol, Aresh, Ordubad, Erivan), Syria, Asia Minor (Taurus).

121. *filicornis* Mrs. 1870.

Mylabris filicornis Mrs., L'Ab., p. 64. — Gemm. et Har. l. c., p. 2137. — Mrs., Mon. 1872, p. 125, n. 78, tb. I, f. 32. — Beaur. l. c., p. 527. — Sum. l. c., p. 35.

Hab.: Aegyptus.

122. *praeusta* F. 1793.

Mylabris praeusta F., Ent. syst. II, 1793, p. 88, n. 3; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 82, n. 5. — Ol., Enc. meth. VIII, 1811, p. 97, n. 33. — Bilb., Mon. Myl. 1813, p. 70, n. 49, tb. VII, f. 12. — Schh., Syn. ins. III, 1817, p. 42, n. 55. — Chvr., in Rev. Silb. V, 1837, p. 277, n. 21. — Küst., Käf. Eur. III, 1846, p. 5. — Reiche, Ann. S. E. Fr. 1865, p. 637, n. 38. — Gemm. et Har., Cat. Col. VII, 1870, p. 2144. — Mrs., L'Ab. VII, 1870, p. 55; Mon. 1872, p. 122, n. 71, tb. I, f. 25. — Baudi, Berl. E. Z. XXII, 1878, p. 369. — Beaur., Ins. ves. 1890, p. 533. — Sum., Hor. S. E. Ross. XLII, 1915, p. 35.

Mylabris apicalis Chvr. l. c., p. 22.

Mylabris contexta Chvr. l. c., p. 23.

Zonabris praeusta Reitt., Cat. Col. Eur. 1906, p. 447.
ab. *apicalis* Chvr.

Mylabris praeusta var. *apicalis* Mrs., L'Ab., p. 57;
Mon., p. 27.

Mylabris praeusta ab. ϵ Sum. l. c.

ab. *contexta* Chvr.

Mylabris praeusta var. *contexta* Mrs., L'Ab., p. 56;
Mon., l. c., tb. I, f. 25^a.

Mylabris praeusta ab. α Sum. l. c.

ab. *nigrita* Mrs.

Mylabris praeusta var. *nigrita* Mrs., L'Ab., p. 57;
Mon. p. 26.

Mylabris praeusta ab. ζ Sum. l. c.

ab. *semirufa* Mrs.

Mylabris praeusta var. *semirufa* Mrs., L'Ab. l. c.;
Mon. p. 27, tb. I, f. 25^b.

Mylabris praeusta ab. β Sum. l. c.

ab. *superflua* Mrs.

Mylabris praeusta var. *superflua* Mrs., L'Ab. l. c.;
Mon. p. 288, tb. I, f. 25°.

Mylabris praeusta ab. γ Sum. l. c.

ab. δ Sum. l. c.

Hab.: Hispania, Algeria (Lambessa, Boghari, Oued Zargua, Oran, Konstantina, Ouarsenis), Tunisia.

123. *wagneri* Chvr. 1837.

Mylabris wagneri Chvr., in Silb. Rev. V, 1837, p. 274, n. 13. — Reiche, l. c., p. 640, n. 53. — Mrs., L'Ab., p. 120; Mon. 1872, p. 162, n. 133. — Sum., Sitzungsab. Nat.-Ges. Univ. Dorp. XXXI, 1924, p. 88, n. 6.

Mylabris curta Chvr. l. c., p. 277, n. 28. — Luc., Hist. nat. Alg. I, 1846, p. 391. — Reiche, l. c., p. 638, n. 51. — Gemm. et Har. l. c., p. 2136. — Mrs., L'Ab., l. c.; Mon. l. c., tb. III, f. 75. — Baudi, l. c. — Sum. l. c., p. 36.

Zonabris insignipennis Pic., Bull. S. Zool. Fr. XXVI, 1901, p. 77.

Mylabris insignipennis Sum. l. c.

Zonabris wagneri Pic, Rev. Sc. Bourb. 1905, p. 170; Deut. E. Z. 1910, pp. 194—195.

Zonabris curta Pic, l. c., p. 167; Deut. l. c.

Mylabris mauricci Well., Deut. E, Z. 1910, p. 23.

Mylabris brevis Well. l. c.

ab. *ernesti* Pic

Zonabris wagneri var. *ernesti* Pic, Rev. l. c.

Hab.: Algeria, Tunisia.

124. *peyerimhoffi* Pic, 1929.

Zonabris peyerimhoffi Pic, Bull. S. E. Fr. 1929, p. 127.

Hab.: Algeria mer. (Hoggar: Tamonda; Temasrinin).

125. *polymorpha* Pall. typ. 1771.

Attelabus polymorphus Pall., Iter. I, 1771, App., p. 465, n. 44^a. — Goeze, Ent. Beitr. I, 1777, p. 422, n. 2.

Meloe fasciatus Fuessl., Verz. Schweiz. Ins. 1775, p. 20, n. 398, tb. f. I, e; Arch. V, 1784, p. 147, n. 3.

Meloe floralis Pall., Icon. ins. I, 1781, p. 82, n. E 8, tb. H, f. E. 8. — Harr., Besch. 1784, n. 394.

Meloe cichorii Schrk., En. ins. Austr. 1781, p. 222, n. 410.

Mylabris octomaculata Vill., in Linn. Ent. 1789, p. 404.

Mylabris cichorii Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 240, n. 595 (var. β).

Mylabris fuesslini Pz., Fn. Germ. XXXI, ed. 1, 1793, p. 18. — Schrk., Fn. Boic. I, 1798, p. 537, n. 644. — Bilb., Mon. Myl. 1813, p. 23, n. 12, tb. II, f. 12; f. 13 (var. β). — Schh., Syn. ins. III, 1817, p. 33, n. 13. — Fisch. J., Tent. 1827, p. 22, n. 12. — Brullé, Exped. Mor. 1832, p. 228, n. 104. — Kryn., Bull. S. N. Mosc. V, 1832, p. 139. — Lap.-Cast., Hist. nat. ins. II, 1840, p. 271, n. 17. — Küst., Käf. Eur. III, 1846, p. 55. — Gebl., Bull. S. N. Mosc. XX, 1847, p. 497, n. 6. — Muls., Hist. nat. Col. Fr. 1857, pp. 114—120, n. 1. — Redt., Fn. Austr., ed. 2, 1858, p. 653. — Jac.-Duv., Gen. III, 1861, tb. 93, f. 464. — Mrs., L'Ab. VII, 1870, p. 76; Mon. Myl. 1872, p. 134, n. 90, tb. II, f. 41. — Ball., Bull. S. N. Mosc. LIII, 1878, p. 335, n. 174. — Köpp. (Кенп.), Вредн. нас. II, 1882, p. 263, n. 1. — Gorr., Mon. Mel. 1882, p. 91, n. 3. —

Mylabris variabilis Ol., Ent. III, 1795, p. 10, n. 11, tb. II, f. 14 a, b. — Latr., Hist. nat. ins. X, 1804, p. 369, n. 2. — Ol., Enc. VIII, 1811, p. 95, n. 19. — Tausch., Mém. S. N. Mosc. III, 1812, p. 135, n. 3, tb. X, f. 5. — Mén., Cat. rais. 1832, p. 206, n. 913.

Mylabris tenera Germ., Fn. Ins. Eur. II, 1817, tb. 5.

Mylabris spartii Germ., Reise Dalm. 1817, p. 210, n. 162, tb. 10, f. 4.

Mylabris tauscheri (Esch. in litt.) Gebl. (non. Fisch.-W.), Mém. S. N. Mosc. (Nouv.) I, 1829, p. 153, n. 1; in Ledeb. Reise 1830, p. 138, n. 18; Bull. S. N. Mosc. XXXII, 1859, p. 489, n. 19.

Mylabris dahli Mén., Cat. rais. 1832, p. 206, n. 923.

Mylabris australis St. Dej., Cat. Col., ed. 3, 1837, p. 244.

Mylabris ononis Dahl., Strm. Cat. 1843, p. 173.

Mylabris floralis Mén., Descr. II, 1848, p. 30. — Reiche, Ann. S. E. Fr. 1865, p. 636, n. 37. — Gemm. et Har., Cat. VII, 1870, p. 2137. — Baudi, Berl. E. Z. XXII, 1878, p. 367. — Beur., Ins. ves. 1890, p. 527. — Seidl., Fn. Transs. 1891, pp. 584—585. — Portsh. (Порч.), Тр. Бюро Энт. XI, 1914, pp. 51—52, n. 1, tb. I, f. 5. — Vorontz. (Воронц. Извѣстн. Орб. От. П. Г. Общ. XXIV, 1914, p. 130, tb. III, ff. a, b, c, d.

Zonabris floralis Heyd., Cat. Col. Sib. 1881, p. 152; Deut. E. Z. XXIX, 1885, p. 303. — Schils., Verz. Käf. Deut. 1888, p. 95. — Heyd., Cat., Nacht. I, 1893, p. 130. — Eschr.,

Stett. E. Z. LVIII, 1897, p. 44. — Bodem., Quer durch Kl. As. 1900, p. 121. — Reitt., Cat. Col. Eur. 1906, p. 448; Fn. Germ. III, 1911, p. 394. — Calw. Käf. II, 1914, p. 754.

Zonabris fuesslini Dokh., Hor. S. E. Ross. XXIV, 1889, p. 171, n. 54, tb. II, f. 53.

Mylabris polymorpha Sum., Hor. S. E. Ross. XLII, 1915, pp. 36—37.

Mylabris aequalis in litt.

ab. *tauscheri* Gebl.

Mylabris tauscheri var. b, c, d, e. Gebl. l. c.

Mylabris 14-punctata var. *tauscheri* Mén. l. c., n. 922. — Mrs. Mon. 1872, p. 130.

ab. *quadrifaria* Mrs.

Mylabris fuesslini var. *quadrifaria* Mrs., L'Ab., p. 79; Mon. l. c., tb. II, f. 41^a.

Zonabris floralis var. *quadrifaria* Reitt. l. c.

Mylabris polymorpha ab. β Sum. l. c., p. 37.

ab. *spartii* Germ.

Mylabris fuesslini var. *spartii* Mrs., Mon. 1882, p. 134.

Zonabris floralis var. *spartii* Reitt. l. c.

Mylabris polymorpha ab. *a* Sum., p. 36.

ab. *agilis* Friv. in litt. Baudi.

Mylabris floralis var. *agilis* Baudi, l. c.

ab. *australis*

Mylabris floralis var. *australis* Baudi, l. c.

ab. *nigrita* Baudi

Mylabris floralis var. *nigrita* Baudi, l. c.

ab. *mulsanti* Pic

Zonabris floralis var. *mulsanti* Pic, L'Ech. XLI, n. 422, 1925, p. 13.

ab. *alpestris* Pic, ibid.

ab. *baregesius* Pic, ibid.

ab. *pelissieri* Pic, ibid.

ab. *monetierensis* Pic, ibid.

ab. *viturati* Pic, ibid.

ab. *subjuncta* Pic, L'Ech. XLV, n. 435, 1929, p. 2.

ab. *multidispuncta* Pic, ibid.

Hab.: Hispania, Gallia, Italia, Germania tota, Helvetia, Moravia, Austria, Hungaria, Tirol, Dalmatia, Stiria, Illyria, Hercegovina, Turcia eur., Graecia (Attica), Rossia eur. (Po-

125. *dolia*, Cherson, Ekaterinoslav, Poltava, prov. Kasak. fl. Don, Astrachan, Uralsk, Saratov, Kazan, Orenburg; Sibiria (Tobolsk, Tomsk, Akmolinsk, Semipalatinsk, Dauria, prov. Amurensis), Semirethje, Dzungcharia (Kuldzha, Sajram), Transcaspia, Caucasus (Stavropol, prov. Kubanica, Dagestan, Elisavetpol, Tiflis, Erivan), Syria, Asia Minor (Angora) et Algeria.

126. ***polymorpha zebraea*** Mrs. 1870.

Mylabris zebraea Mrs., L'Ab., l. c. — Gemm. et Har. l. c., p. 2145. — Mrs., Mon. 1872, p. 135, n. 91, tb. II, f. 42. — Beaur. l. c., p. 539.

Zonabris zebraea Heyd., Deut. E. Z. XXV, 1881, p. 327; Cat. Sib. 1881, p. 152. — Dokh. l. c., p. 160, n. 37, tb. II, f. 43. — Heyd., Cat., Nacht., I, 1893, p. 131.

Zonabris scabiosae var. *zebraea* Eschr., Wien E. Z. XVIII, 1899, p. 90.

Mylabris kotskyi Kol. in litt.

ab. *tenenbaumi* Pic

Zonabris sebraea var. *tenenbaumi* Pic, L'Ech. XLIV, n. 432, 1928, p. 5.

ab. *brevifasciata* Sum.

Mylabris polymorpha zebraea m. *brevifasciata* Sum., L'Ech. XLV, n. 436, 1929, p. 5.

Hab.: Turkestan (Margelan, Kara-Mulla), Transcaspia (Geok-Tepe), Transcaucasia (Tiflis, Mtzehet, Elisavetpol, Aresh, Shusha) et Asia Minor.

127. ***polymorpha biguttata*** Gebl. 1841.

Mylabris biguttata Gebl., Bull. Ac. St.-Pet. VIII, 1841, p. 374, n. 19; Bull. S. N. Mosc. XXXII, 1859, p. 486, n. 1. —

Mylabris atrata var. *biguttata* Mrs., L'Ab., p. 79; Mon. 1872, p. 290, n. 92.

Zonabris pullata Heyd., Deut. E. Z. XXVII, 1883, p. 65. — Dokh. l. c., p. 140, n. 10, tb. II, f. 47. — Heyd., Deut. E. Z. XXXIV, 1890, p. 355; id. XXXVI, 1892, p. 106; Cat., Nacht. I, 1893, p. 131.

Mylabris polymorpha m. *biguttata* Sum. l. c., p. 38.

ab. *fasciculata* Dokh.

Zonabris pullata var. *fasciculata* Dokh. l. c.

Mylabris polymorpha m. *biguttata* ab. β Sum. l. c.

ab. *similis* Voigts.

Zonabris pullata var. *similis* Voigts, Wien. E. Z. XXI, 1902, p. 178.

Zonabris pullata var. *sexmaculata* Dokh. l. c., p. 141 (nom. pracocc.).

Mylabris polymorpha m. *biguttata* ab. *a* Sum. l. c.

Hab.: Turkestan (distr. Samarkand, Katta-Kurgan), Bucharia or. (Darvaz, Feisabad, Karategin), Pamir (Dubeba) et Tibet (Dotshu-tan).

m. *karateginensis* Sum. 1915.

Mylabris polymorpha biguttata m. *karateginensis* Sum. l. c., p. 73.

ab. *a* et *β* Sum. l. c.

Hab.: Buch. or. (prov. Karategin).

128. *polymorpha regeli* Sum. 1929.

Mylabris polymorpha regeli Sum., L'Esch. XLV, n. 436, 1929, p. 5.

ab. *a* Sum. *ibid.*

ab. *β* Sum. *ibid.*

Hab.: Bucharia or. (Muninabad).

129. *atrata* Pall. 1773.

Meloe atrata Pall., Reise II, 1773, Append., p. 722, n. 55. — Goeze, Ent. Beitr. I, 1777, p. 702, n. 8. — Pall., Icon. ins. I, 1781, p. 90, n. E 16, tb. E, f. 22. — Gmel., in L. Syst. Nat., ed. 13, I, P. IV, 1788, p. 2020, n. 23.

Mylabris atrata Ol., Ent. III, 1795, p. 20, n. 15, tb. I, f. 6. — F., Syst. Eleuth. II, 1801, p. 83, n. 12. — Ol., Enc. meth. VIII, 1811, p. 100, n. 51. — Bilb., Mon. Myl. 1813, p. 43, n. 29, tb. V, f. 2. — Reiche, Ann. S. E. Fr. 1865, p. 637, n. 35. — Gemm. et Har. l. c. — Mrs., L'Ab., p. 80; Mon. 1872, p. 135, n. 92, tb. II, f. 43. — Ball., Bull. S. N. Mosc. LIII, 1878, p. 335.

Mylabris minuta F., Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 121, n. 12; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 85, n. 21. — Bilb. l. c. p. 11, n. 27, tb. IV, f. 18. — Schh., Syn. ins. III, 1817, p. 37, n. 30. — Gebl., Mém. S. N. Mosc. (Nouv.) I, 1829, p. 162, n. 10; in Ledeb. Reise 1830, p. 138, n. 8. — Kryn., Bull. S. N. Mosc. V, 1832, p. 139, n. 4. — Gebl., Bull. S. N. Mosc. XX, 1847, p. 498, n. 9; id. XXXII, 1859, p. 488, n. 11.

Mylabris karelini Fisch.-W., Cat. Col. Karel. 1842, p. 25.

Mylabris floralis v. *atrata* Baudi, l. c.

Mylabris floralis v. *minuta* Baudi, l. c. — Beur., l. c., p. 527.

Zonabris atrata Heyd., Cat. Col. Sib. 1881, p. 152. — Dokh., Hor. S. E. Ross. XXIV, 1889, p. 161, n. 39, tb. II, f. 63. — Heyd., Cat. Col. Sib., Nacht. I, 1893, p. 129. — Reitt., Cat. Col. Eur. 1906, p. 448. — Calw., Käferb. II, 1914, p. 754.

Mylabris polymorpha m. *atrata* Sum., Hor. S. E. Ross. XLII, 1915, p. 37.

Hab.: Sibiria (Kolyvan, Loktevsk, Ajagus), Turkestan (vall. fluv. Talas, jugum Ala-tau, lac. Ala-kul, Wiernyj, Myn-tshukur, fluv. Udzhaz, Karategin, Osh), Dzhungaria (Kuldzha, Sajram).

130. ?*atrata metatarsalis* Mrs. 1870.

Mylabris metatarsalis Eschsch. in litt.

Mylabris atrata var. *metatarsalis* Mrs., L'Ab., p. 81; Mon. 1872, p. 290, n. 91, tb. II, f. 43^a.

Mylabris confluens Mot. in litt.

Hab.: Rossia (Cherson, Ekaterinoslav, prov. Kasak. fl. Don, Voronezh, Astrachan, Samara), Turkestan (vall. fl. Talas, Ala-tau, Wiernyj, Ben-tshogur, Osh), Caucasus (stepp. Nogaicae, Kasikopperan, stepp. Mugan.).

?m. *dahli* Mén. 1832.

Mylabris dahli Mén., Cat. rais. 1832, p. 207, n. 927.

Mylabris fuesslini var. *dahli* Mrs., Mon. 1872, p. 134, n. 90.

Hab.: Hungaria (Uj-Pest, lac. Platten).

131. *atrata mediomaculata* Sum. 1929.

Mylabris polymorpha mediomaculata Sum., L'Ech. XLV, n. 435, 1929, p. 4.

Hab.: Transcaucasia (Daratshitshag).

132. *talyshensis* Sum. 1929.

Mylabris talyshensis Sum. ibid., p. 3.

Hab.: Transcaucasia (distr. Lenkoran).

133. ?*zoufali* Reitt. 1908¹).

Zonabris zoufali Reitt., Wien. E. Z. XXVII, 1908, p. 272. — Calw. l. c.

1) Espèce douteuse. D'après la description peu satisfaisante cette espèce ressemble beaucoup à *M. polymorpha* ab. *quadrifaria* Mrs. N'est pas une aberration de *M. polymorpha*?

Hab.: Hercegovina (Mostar).

134. *solonica* Pall. 1781.

Meloe solonica Pall., Icon. ins. I, 1781, p. 87, n. E 12, tb. H, f. E 12.

Mylabris solonica Fisch. J., Tent. 1827, p. 7, n. 32. — Waltl, Isis VI, 1838, p. 465, n. 92. — Reiche, Ann. S. E. Fr. 1865, p. 636, n. 25. — Gemm. et Har., Cat. Col. VII, 1870, p. 2143. — Mrs., L'Ab., p. 89; Mon., p. 150, n. 108, tb. II, f. 51. — Sum. l. c., p. 38.

Mylabris famelica Mén., Mot. Et. ent. 1854, p. 36.

Zonabris solonica Heyd., Cat. Col. Sib. 1881, p. 152. — Dokh. l. c., p. 159, n. 36, tb. II, f. 31. — Heyd., Cat., Nacht. I, 1893, p. 131.

ab. *dianae* Sahl.

Zonabris solonica var. *dianae* Sahl., Ofv. F. Vet. Soc. Förh. LV, 1913, p. 196.

Hab.: ?Turcia eur., ?Graecia; ?Asia Minor; ?Turkestan¹⁾ Sibiria (Irkutsk, Dauria).

135. *solonica humerosa* Eschr. 1899.

Zonabris humerosa Eschr., Wien. E. Z. XVIII, 1899, p. 97, n. 1, tb. II, f. 1. — Reitt. l. c. — Calw. l. c.

Hab.: Graecia; Asia Minor (Amasia, Smyrna), Syria, Transcaucasia (Tiflis, Elisavetpol, Aresh, Bagrat-topa, Shusha), Transcaspia (Aschabad).

136. *quatuordecimpunctata* Pall. typ. 1781.

Attelabus polymorphus var. β Pall., Iter I, 1771, p. 465, n. 44.

Meloe quatuordecimpunctata Pall., Icon. ins. I, 1781, p. 80, n. E. 6, tb. H, f. E. 6. — Thnb., Diss. ent. VI, 1791, p. 110, f. 9.

Mylabris quatuordecimpunctata Ol., Ent. III, 1795, p. 13, n. 17, tb. II, f. 22 a, b. — Tausch., Mém. S. N. Mosc. III, 1812, p. 143, n. 12, tb. X, f. 14. — Bilb., Mon. Myl. 1813, p. 32, n. 20, tb. IV, ff. 2, 3 et 4 (var. β). — Schh., Syn. ins. III, 1817, pp. 34—35, n. 22. — Fisch. J., Tent. 1827, p. 6, f. 30. — Gebl., Mém. S. N. Mosc. (Nouv.)

1) Il est bien douteux que *M. solonica* Pall. se trouve dans les pays annotés. Bien possible que *M. solonica humerosa* Eschr. avait été reconnue pour *M. solonica* Pall.

I, 1829, p. 154, n. 2; in Ledeb. Reise 1830, p. 139, n. 13. Mén., Cat. rais. 1832, p. 207, n. 922. — Gebl., Bull. S. N. Mosc. XX, 1847, p. 499, n. 11. — Mén., Descr. II, 1848, p. 30. — Küst., Käf. XXIV, 1852, n. 84. — Gebl., Bull. S. N. Mosc. XXXII, 1859, p. 488, n. 14. — Reiche, Ann. S. E. Fr. 1865, p. 636, n. 28. — Gemm. et Har. l. c., p. 2142. — Mrs., L'Ab., p. 90; Mon. 1872, p. 150, n. 109, tb. II, f. 52. — Baudi, Berl. E. Z. XXII, 1878, p. 371. — Köpp. (Кенп.), Вред. насѣк. II, ч. I, 1882, p. 266, n. 4. — Beaur., Ins. ves. 1890, p. 535. — Portsh. (Порч.), Тр. Бюро Энт. XI, 1914, p. 51, n. 3, tb. II, f. 15. — Vorontz. (Воронц.), Извѣст. Опб. От. Р. Г. Общ. XXIV, 1914, p. 132, tb. VI, ff.: a, b, c, d, e, f.: Sum. l. c., p. 39.

Mylabris meliloti Ol., Enc. meth. VIII, 1811, p. 99, n. 46.

Mylabris combusta Tausch. l. c., n. 13, tb. X, f. 15.

Mylabris confusa Fisch. J., Tent., p. 6.

Mylabris setigera Waltl, l. c., p. 446, n. 98.

Mylabris quatuordecimpunctata var. *combusta* Gemm. et Har. l. c. — Beaur. l. c.

Zonabris quatuordecimpunctata Heyd., Cat. 1881, p. 152. — Reitt., Cat., 1906, p. 447. — Calw., Käferb. II, 1914, p. 754.

Zonabris quatuordecimpunctata var. *combusta* Heyd. l. c.

” ” var. *meliloti* Heyd. l. c.

” ” var. *polymorpha*, b. Heyd. l. c.

ab. β Bilb.

Mylabris 14-punctata var. β Bilb. l. c.

ab. γ Bilb. ibid.

ab. c Gebl.

Mylabris 14-punctata var. c. Gebl., Mém. Mosc. 1829, p. 154, n. 2.

Mylabris 14-punctata var. d. Gebl. ibid.

” ” ab. a Sum. l. c.

ab. e Gebl. ibid.

ab. σ (β) Sum.

Mylabris quatuordecimpunctata ab. β Sum. l. c.

ab. ϵ (γ) Sum.

Mylabris quatuordecimpunctata ab. γ Sum., ibid.

Hab.: Rossia eur. (Podolia, Kiev, Cherson, Charkov, Ekaterinoslav, Voronezh, prov. Kasak. fl. Don., Astrachan, Uralsk,

Saratov, Samara, Kazan, Orenburg; Sibiria (Tomsk, Enisejsk, Akmolink, Semipalatinsk, Minusinsk, Altaj), Turkestan (Semiretshje: Kopal, Ber-Tshogur; Samarkand), Caucasus (Stavropol, Dagestan, Erivan) et Persia.

137. *quatuordecimpunctata chodshentica* Ball. 1878.

Mylabris chodshentica Ball., Bull. S. N. Mosc. LIII, 1878, p. 337, n. 177. — Beaur. l. c., p. 524.

Zonabris chodshentica Heyd., Cat. Col. Sib. 1881, p. 154.

Zonabris khodjentica Ball. Dokh., Hor. S. E. Ross. XXIV, 1889, p. 144, n. 14, tb. II, f. 22.

Zonabris chodshentica Ball. Heyd., Cat., Nacht. I, 1893, p. 129.

Mylabris quatuordecimpunctata khodjentica Sum. l. c. ab. *diabolica* Eschr.

Zonabris khodjentica var. *diabolica* Eschr., Wien. E. Z. XVIII, p. 108, n. 21, tb. II, f. 15.

Mylabris khodjentica ab. ζ Sum. l. c.

ab. *mediojuncta* Pic

Zonabris khodjentica var. *mediojuncta* Pic, Bull. S. Zool. Fr. XXVI, 1901, p. 78.

Mylabris khodjentica ab. α Sum. l. c.

ab. *mediopunctata* Pic, l. c.

Mylabris khodjentica ab. β Sum. l. c.

ab. *subinterrupta* Pic, l. c.

Mylabris khodjentica ab. σ Sum. l. c.

ab. *ataensis* Pic, l. c., p. 111.

Mylabris khodjentica ab. ε Sum. l. c.

ab. γ Sum. l. c.

Hab.: Turkestan (prov. Syr-darjensis: vall. fluv. Talas, Tshimkent; Semiretshje: Wernyj, Tokmak; Samarkand, Chodshent; Fergana), Alaj, Tian-Shan, Dzhungaria (Kuldzha, Kash), Transcaspia (Gaudan), ? Transcaucasia (Talish)¹⁾.

138. *dufourii* Graëll. 1849.

Mylabris dufouri Graëll., Rev. zool. 1849, p. 621, n. 6; Ann. S. E. Fr. 1851, p. 16. — Reiche, Ann. S. E. Fr. 1865, p. 636, n. 24. — Gemm. et Har. l. c., p. 2136. — Mrs., L'Ab. VII, 1870, p. 92; Mon. 1872, p. 151, n. 111, tb. II,

1) La trouvelle de cette espèce au Caucase est douteuse. Peut-être on a pris pour cette espèce *M. humerosa*.

f. 54. — Gorr., Mon. Mel. 1882, p. 100, n. 6. — Beur. l. c., p. 526.

Zonabris dufouri Reitt, l. c. — Calw. l. c.

Mylabris quatuordecimpunctata dufouri Sum., Hor. S. E. Ross. XLII, 1915, p. 39.

Hab.: Portugalia, Hispania (Grenada).

139. *fusca* Ol. 1811.

Mylabris fusca Ol., Enc. meth. VIII, 1811, p. 100, n. 49. — Fisch. J., Tent. 1827, p. 11, n. 64. — Reiche, l. c., n. 29. — Gemm. et Har. l. c., p. 2137. — Mrs., L'Ab., p. 91; Mon. 1872, p. 151, n. 110, tb. II, f. 53. — Beur. l. c., p. 528. — Sum., Rev. Russe d'Ent. XIII, 1913, p. 302 et 307; Hor. l. c.

Zonabris fusca Eschr., Wien. E. Z. XVIII, 1899, p. 90.

— Bodem., Quer d. Kl. As. 1900, p. 121.

ab. *deleta* Mrs.

Mylabris fusca var. *deleta* Mrs., L'Ab., p. 92.

Zonabris fusca var. c Eschr., Stett., p. 40.

ab. *galatiensis* Eschr. *ibid.*, p. 39.

Mylabris fusca ab. ϑ Sum. l. c.

ab. a Eschr. l. c., p. 40.

ab. b Eschr. l. c.

Mylabris fusca ab. η Sum. l. c.

ab. a Sum., Rev. l. c., f. 14; Hor. l. c.

ab. *circascutellaris* Pic

Zonabris fusca var. *circascutellaris* Pic, L'Ech. XXX, 1914, p. 77.

ab. β Sum., Rev., f. 15; Hor. l. c.

ab. γ Sum., Hor. l. c.

ab. *aliena* Sahl.

Zonabris fusca var. *aliena* Sahl., Ofv. F. Vet. S. Förh. LV, 1913, p. 196.

ab. σ Sum. l. c.

ab. ε Sum. *ibid.*

ab. ζ)

ab. ι) ab. n.¹⁾

1) ab. ζ n. — Taches: antéro-interne, médianes et antéapicale manquent.

ab. ι n. — Taches médianes et antéapicale manquent.

Hab.: Turkestan (Semiretshje), Transcaspia, Persia (Sergende, Sultanabad, Tegeran, Luristan, Farsistan), Transcaucasia (Aresh, Elisavetpol, Erivan: vall. fluv. Arax), Syria et Asia Minor (Konia, Bulghar-Maaden, Ak-dagh, Angora).

140. ? *posticata* Fairm. 1892.

Mylabris posticata Fairm., Ann. S. E. Belg. XXXV, 1892, p. 154.

Zonabris fusca var. *posticata* Eschr., Wien. l. c.

Hab.: Syria.

141. *subparallela* Pic, 1919.

Zonabris subparallela Pic, L'Ech. XXXV, n. 395, 1919, p. 19. Hab. Persia.

142. *scabiosae* Ol. 1811.

Mylabris scabiosae Ol. l. c., p. 99, n. 45. — Fisch. J. l. c., p. 6, n. 26. — Reiche, l. c., n. 39. — Gemm. et Har. l. c. p. 2142. — Mrs., L'Abe p. 84; Mon. 1872, p. 148, n. 104, tb. II, f. 47. — Baudi, Berl. E. Z. XXII, 1878, p. 370. — Beaur. l. c. — Sum., Rev. l. c., p. 305¹⁾; Hor. S. E. Ross. XLII, 1915, p. 41.

Zonabris scabiosae Heyd., Deut. E. Z. XXV, 1881, p. 327; Cat. Col. Sib. 1881, p. 152; Deut. XXVII, 1883, p. 357. — Dokh., Hor. S. E. Ross. XXIV, 1889, p. 151, n. 22, tb. II, f. 46. — Heyd., Deut. XXXIV, 1890, p. 355; Cat., Nacht. I, 1893, p. 131. — Eschr., Stett. E. Z. LVIII, 1897, p. 44. — Calw. l. c.

ab. *auliensis* Pic

Zonabris scabiosae var. *auliensis* Pic, Bull. S. Zool. Fr. 1901, p. 111.

Mylabris scabiosae ab. γ Sum. Hor. l. c.

ab. α Sum. ibid.

ab. β Sum. ibid.

ab. δ } ab. n. 2)

ab. ϵ }

1) Est fautivelement nommé *euphratica* au lieu *scabiosae*.

2) ab. δ n. — Elytres avec cinq taches: trois antérieures, une médiane près du bord latéral et une antéapicale sur le bord latéral.

ab. ϵ n. — Elytres avec quatre taches: une sur l'épaule, deux près du bord latéral et une sur le bord latéral.

?m *euphratica* Mrs. 1870.

Mylabris euphratica Mrs., L'Ab. VII, 1870, p. 84; Mon. Myl. 1872, p. 148, n. 103, tb. II, f. 46. — Beur., Ins. ves. 1890, p. 526.

Mylabris marseuli Ball., Bull. S. N. Mosc. LIII, 1878, p. 336, n. 176.

Zonabris marseuli Heyd., Cat. Col. Sib. 1881, p. 154; Cat., Nacht. I, 1893, p. 130. — Dokh. l. c., p. 164, n. 42, tb. II, f. 30.

Zonabris alienigera Heyd., Deut. E. Z. XXVII, 1883, p. 67 (nom. nud.).

Zonabris scabiosae var. *marseuli* Eschr., Wien. E. Z. XVIII, 1899, p. 90.

Zonabris scabiosae var. *euphratica* Eschr. ibid.

Mylabris scabiosae m. *euphratica* Sum. l. c.

ab. *maracandensis* Dokh.

Zonabris marseuli var. *maracandensis* Dokh. l. c. — Heyd., Cat. Col. Sib. Nacht. I, 1893, p. 130.

Mylabris scabiosae m. *euphratica* ab. *a* Sum. l. c.

ab. *sicheri* Fleisch.

Zonabris alienigera var. *sicheri* Fleisch., Wien. E. Z., 1921, p. 42.

ab. *transcapicensis* Pic

Zonabris euphratica var. *transcapicensis* Pic, XLIV, n. 422, 1928, p. 5.

Hab.: Bolgaria, Graecia, Turcia eur., Rossia eur. (Novorosijsk, Saratov); Sibiria mer.-occ. (Akmolinsk), Turkestan (prov. Syr-darjensis: vall. fluv. Talas; Semiretshje; Samarkand, Golodnaja stepp: Tash-Kisket, Tashljau; Fergana), Bucharia (jugum Hissariense: Kshtur, Farab), Dzungaria (Kuldzha), Pamir, Transcaspia (Tshardzhuj, Kizyl-Arvat, Geok-Tepe), Persia (Luristan, Sultanabad), Transcaucasia (Tiflis, Elisavetpol, Ordubad, Etshmiadin), Syria (Libanon), Mesopotamia, Asia Minor, ? Algeria¹⁾.

143. *silbermanni* Chvr. 1837.

Mylabris silbermanni Chvr., in Silb. Rev. V, 1837, p. 277, n. 19. — Reiche, Ann. S. E. Fr. 1865, p. 638, n. 46. —

1) L'indication de l'Algerie est douteuse. Probablement de *M silbermanni* a été pris pour *M scabiosae*.

Gemm. et Har., Cat. Col. VII, 1870, p. 2143. — Mrs., Mon. 1872, n. 105, tb. II, f. 48. — Beaur. l. c., p. 536. — Sum. l. c., p. 42.

Mylabris vicina Luc., Hist. nat. Alg. I, 1846, p. 389.

Mylabris affinis Luc. l. c., tb. 34, f. 2.

Zonabris silbermanni Eschr. l. c.

ab. *saidensis* Pic

Zonabris silbermanni var. *saidensis* Pic, Rev. sc. Bourb. VII, 1897, p. 124.

Hab.: Marocco (El Tigui, Mazagán, Glaui, Imi-n'Tanut, Tanger), Algeria (Dzhebel -Amour, Oran, Bon) et Syria.

144. ***curticornis*** Pic

Zonabris curticornis Pic, L'Ech. XXXV, n. 395, 1919, p. 19.

Hab.: Armenia.

145. ***mediobipunctata*** Pic

Zonabris mediobipunctata Pic, ibid.

Hab.: Persia.

146. ***postbilunata*** Pic

Zonabris postbilunata Pic, L'Ech. XXXV, n. 396, 1919, p. 21.

Hab.: Kurdistan.

?m. ***kurdistanica*** Pic

Zonabris kurdistanica Pic, ibid.

Hab.: Kurdistan.

147. ***duodecimpunctata*** Ol. 1811.

Mylabris crocata Ol., Ent. III, 1795, p. 11, n. 14, tb. II, f. 23.

Mylabris duodecimpunctata Ol., Enc. meth. VIII, 1811, p. 98, n. 40. — Fisch. J., Tent. 1827, p. 11, n. 70. — Chr., in Silb. Rev. V, 1837, p. 272, n. 7. — Muls., Hist. nat. col. Fr. 1857, p. 134, n. 5. — Reiche, l. c., p. 636, n. 45. — Gemm. et Har. l. c., p. 2136. — Mrs., L'Ab., p. 126; Mon. 1872, p. 165, n. 138, tb. III, f. 80. — Baudi, Berl. E. Z. XXII, 1878, p. 373. — Gorr., Mon. Mel. 1882, p. 120, n. 15. — Beaur. l. c. — Sum. l. c., p. 43.

Zonabris duodecimpunctata Eschr. l. c., p. 101. — Reitt., Cat. Col. Eur. 1906, p. 447. — Esc., Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. IX, 1909, p. 246. — Reitt., Fn. Germ. III, 1911, p. 393. — Calw., Käferb. II, 1914, p. 754.

ab. *massiliensis* Pic

Zonabris duodecimpunctata var. *massiliensis* Pic,
L'Ech. XVIII, 1902, p. 9.

Zonabris duodecimpunctata var. *fasciata* Fuente, Bol.
R. S. Esp. Hist. Nat. X, 1910, p. 444.

Mylabris duodecimpunctata ab. β Sum. l. c.

ab. α Sum. l. c.

ab. γ n. ¹⁾

m. *cyanescens* (Ill.) Rosenh. 1856 ²⁾.

Mylabris cyanescens Rosenh., Thire And. 1856, p. 231.

Hab.: Andalusia, Hispania (Grenada, Cardenas), Gallia,
(Tulusa, Camargue), Italia, ? Germania; Algeria (El. Kantara,
Lambeze).

148. *brevicollis* Baudi 1878.

Mylabris brevicollis Baudi, l. c. — Beur., Ins. ves. 1890,
p. 523. — Sum., Hor. S. E. Ross. XLII, 1915, p. 43.

Zonabris brevicollis Eschr., Wien. E. Z. XVIII, 1899,
pp. 90 et 101. — Escal., Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. IX,
1909, p. 246; Trab. Mus. Nac. Madr. 1914, p. 396.

ab. *beauprei* Pic

Zonabris brevicollis var. *beauprei* Pic, L'Ech. XXV,
n. 300, 1909, p. 185.

Mylabris brevicollis ab. α Sum. l. c.

ab. *mediobisbijuncta* Pic

Zonabris brevicollis var. *mediobisbijuncta* Pic, L'Ech.
XXXII, n. 374, 1916, p. 7.

Hab.: Gallia mer., ? Italia (Liguria); Marocco (Melilla),
Algeria (Oran, El-Kantara) et Tunisia.

149. *diversipilis* Sum. 1915.

Mylabris diversipilis Sum. l. c., p. 42.

Hab.: Syria.

150. *concinna* Mrs. 1870.

Mylabris concinna Mrs., L'Ab. VII, 1870, p. 191; Mon.
Myl. 1872, p. 274, n. 106^a. — Beur., Ins. ves. 1890, p. 524.

Hab.: Syria (Palaestina).

1) ab. γ n. — Tache antéapicale iuterne sur les élytres manque.

2) Beaucoup d'auteurs comptent *M. cyanescens* pour synonyme de *M. 12-punctata* Ol. Tandis que cette espèce diffère de *12-punctata* par le pronotum plus étroit, couvert de poils noirs. On peut la compter plus tôt pour l'espèce isolée.

151. **mediofasciatella** Pic, 1908.
Zonabris mediofasciatella Pic, L'Ech. XXIV, 1908, p. 33.
Mylabris mediofasciatella Sum. l. c., p. 55.
 ab. *massariensis* Pic
Zonabris mediofasciatella var. *massariensis* Pic, l. c.
Mylabris mediofasciata ab. *a* Sum. l. c.
 ab. *heluanensis* Pic, l. c.
Mylabris mediofasciatella ab. β Sum. l. c.
 ab. *sesostrisi* Pic
Zonabris mediofasciatella var. *sesostrisi* Pic, L'Ech. XLVI, n. 439, 1930, p. 2.
 Hab.: Aegyptus.
152. **impressithorax** Pic
Zonabris impressithorax Pic, ibid.
 Hab.: Palaestina (Jericho).
153. **ragusae** Pic, 1898.
Zonabris ragusae Pic, Nat. Sic. II, 1898, p. 217. — Eschr. l. c., p. 90. — Reitt., Cat. Col. Eur. 1906, p. 447. — Calw. l. c.
Mylabris ragusae Sum. l. c.
 Hab.: Sicilia.
154. **plagiella** Escal. 1914.
Zonabris plagiella Escal., Trab. l. c., p. 398.
 Hab.: Hispania (Alcazar); Marocco (Rabat) et Algeria.
155. **hirtipennis** Raffr. 1873.
Mylabris hirtipennis Raffr., Rev. et Mag. Zool. Deyrolle I, 1873, p. 379. — Beaur. l. c., p. 529. — Chob., Bull. S. E. Fr. 1902, p. 164. — Sum. l. c.
Zonabris kabylica Eschr. l. c., pp. 100—101, n. 9.
Zonabris hirtipennis Escal. l. c., p. 398.
 ab. *leprieuri* Pic
Zonabris hieracii var. *leprieuri* Pic, L'Ech. XII, 1896, p. 62.
Zonabris hirtipennis var. *leprieuri* Pic, id. XXV, 1909, p. 185.
 ab. *a* Sum. l. c.
 ab. *hoggarensis* Pic
Zonabris hoggarensis Pic, Bull. S. E. Fr. 1929, p. 127.
 Hab.: Marocco (Sidi Rahal, Glaui, Marraquesh, Mogador, Casablanca), Algeria.

156. *vaucheri* Escal. 1914.
Zonabris vaucheri Escal. l. c., p. 400.
 Hab.: Marocco (Rabat, Marraquesh, Glaui).
157. *nigribasis* Escal. 1914.
Zonabris nigribasis Escal. ibid., p. 399.
 ab. *multibijuncta* Pic
Zonabris nigribasis var. *multibijuncta* Pic, L'Ech. XXXVII, n. 404, 1921, p. 5.
 Hab.: Marocco (Marraquesh, El-Kureimat, Zoco l'Arba de Haha).
158. *aini* Pic
Zonabris aini Pic, L'Ech. XXXVI, n. 403, 1921, p. 4.
 Hab.: Algeria.
159. *saharica* Chob. 1901.
Mylabris saharica Chob., Bull. S. E. Fr. 1901, p. 280. — Sum., Hor. S. E. Ross. XLII, 1915, p. 43.
 ab. *oasium* Chob.
Mylabris saharica var. *oasium* Chob. l. c.
 „ „ ab. α Sum. l. c.
 ab. *mayeti* Chob. l. c.
Mylabris saharica ab. β Sum. l. c.
 ab. *vareillesi* Chob. l. c.
Mylabris saharica ab. γ Sum. l. c.
 Hab.: Algeria (Biskra, Ghardaia, Tougourt) et Tunisia (Oum-Ali).
160. *madoni* Mrs. 1883.
Mylabris madoni Mrs., L'Ab. XXI, 1883, Nouv. et faits, p. 178. — Beur. l. c., p. 531. — Sum. l. c., p. 44.
Zonabris madoni Mrs. Eschr., Wien. E. Z. XVIII, 1899, p. 91.
 ab. *lividiana* Pic
Zonabris madoni var. *lividiana* Pic, L'Ech. XXVII, n. 323, 1911, p. 178.
Mylabris madoni ab. α Sum. l. c.
 Hab.: Cyprus.
161. *lichtensteini* Gorr. 1882.
Mylabris lichtensteini Gorr., Mon. Mel. 1882, p. 124, n. 17. — Beur. l. c., p. 530. — Sum. l. c.
Zonabris lichtensteini Reitt., Cat. 1906., p. 148. — Calw., Käferb. II, 1914, p. 754.

Hab.: Hispania.

162. *heteroclita* Pic

Zonabris heteroclita Pic, L'Ech. XXXV, n. 396, 1919, p. 21.

Hab.: Rossia (prov. Saratov.: Sarepta).

163. *aegyptiaca* Mrs. 1870.

Mylabris conjugata Dej., Cat. Col., ed. 3, 1837, p. 244 (nom. nud.).

Mylabris aegyptiaca Mrs., L'Ab. VII, 1870, pp. 142—143; Mon. 1872, p. 171, n. 153, tb. III, f. 25. — Beur. l. c., p. 520. — Sum. l. c.

ab. *conjugata* Baudi

Mylabris aegyptiaca var. *conjugata* Baudi, Berl. E. Z. XXII, 1878, p. 369.

ab. *chakouri* Pic

Zonabris aegyptiaca var. *chakouri* Pic, L'Ech. XXIII, 1907, p. 161.

Hab.: Aegyptus.

164. *ruficornis* F. 1798.

Mylabris ruficornis F., Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 121; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 84, n. 19. — Ol., Enc. meth. VIII, 1811, p. 100, p. 50. — Bilb., Mon. Myl. 1813, p. 72, n. 51, tb. VII, f. 14^a. — Schh., Syn. ins. III, 1817, p. 42, n. 58. — Fisch. J., Tent. 1827, p. 12, n. 77. — Chvr., in Silb. Rev. V, 1837, p. 272, n. 8. — Reiche, Ann. S. E. Fr. 1865, p. 639, n. 54. — Gemm. et Har., Cat. Col. VII, 1870, p. 2142. — Mrs., L'Ab., p. 150; Mon. 1872, p. 176, n. 162, tb. III, f. 103. — Baudi, Berl. E. Z. XXII, 1878, p. 371. — Beur., Ins. ves. 1890, p. 535. — Sum. l. c.

Zonabris ruficornis Escal., Trab. Mus. Nac. Madr. 1914, p. 395.

ab. *tangeriana* Pic

Zonabris ruficornis var. *tangeriana* Pic, L'Ech. XIX, 1903, p. 114, — Escal. l. c.

Hab.: Marocco (Tanger, Larash, Casablanca, Mazagan, Mogador) et Tunisia.

165. *maelaini* Escal. 1909.

Zonabris maelaini Escal., Bol. R. Soc. Esp. His. Nat. IX, 1909, p. 249; Trab. l. c.

Mylabris maelaini Sum., Hor. S. E. Ross. XLII, 1915, p. 45.

Hab.: Marocco (Tiznit, Ksima).

166. *rufipalpis* Escal. 1909.

Zonabris rufipalpis Escal. l. c.

Mylabris rufipalpis Sum. l. c.

Hab.: Marocco (Tarudant, Ksima, Tiznit, Agadir, Mogador).

167. *igneopubescens* Escal. 1909.

Zonabris igneopubescens Escal., Bol., pp. 249—250; Trab., p. 395.

Mylabris igneopubescens Sum. l. c.

Hab.: Marocco (Tiznit, Ksima).

167. *raphaël* Mrs. 1876.

Mylabris raphaël Mrs., L'Ab. XIII, 1876, p. 28. — Beur. l. c.

Hab.: Persia.

169. *brunnipes* Klgl. 1845.

Mylabris brunnipes Klgl., Symb. phys., IV, 1845, pp. 32—33. — Reiche, l. c., p. 640, n. 58. — Gemm. et Har. l. c., p. 2144. — Mrs., L'Ab. VII, 1870, p. 136; Mon. 1872, p. 168, n. 147, tb. III, f. 89. — Baudi, l. c. — Beur. l. c., p. 523. — Sum. l. c.

Zonabris brunnipes Eschr., Wien. E. Z. XVIII, 1899, p. 92.

ab. *letourneuxi* Pic

Zonabris brunnipes var. *letourneuxi* Pic., L'Ech. XII, 1896, p. 62.

Mylabris brunnipes ab. γ Sum. l. c.

ab. *subrupta* Well.

Zonabris brunnipes var. *interrupta* Pic (nom. praecoc.), l. c.

Mylabris brunnipes var. *subrupta* Well., Deut. E. Z.

1910, p. 23.

Mylabris brunnipes ab. δ Sum. l. c.

ab. α Sum. l. c.

ab. β Sum. l. c.

Hab.: Algeria et Aegyptus.

170. *tekkensis* Heyd. 1883.

Zonabris tekkensis Heyd., Deut. E. Z. XXVII, 1883, p. 360. — Reitt., Verh. nat. Ver. Brünn. XXVII, 1889, p. 120. — Dokh., Hor. S. E. Ross. XXIV, 1889, p. 160, n.

38, tb. II, f. 44. — Heyd., Deut., XXXIV, 1890, p. 355; Cat. Col. Sib., Nacht. I, 1893, p. 131. — Eschr. l. c., p. 90.

Mylabris tekkensis Beaur. l. c., p. 537. — Portsh. (Порч.), Тр. Бюро Энт. XI, 1914, p. 58, n. 15, f. 19. — Sum. l. c., p. 46.

ab. *latebifasciata* Pic

Zonabris tekkiensis var. *latebifasciata* Pic, L'Ech. XXXV, n. 395, 1919, p. 18.

Hab.: Turkestan (Perovsk, Tshimkent, Tashkent, Chodzhent, Samarkand, Golodnaja stepp: Tash-Kisket), Transcaspia (Tedzhen, Geok-Tepe, Aschabad, Tshardzhuj).

171. *aurociliata* Eschr. 1899.

Zonabris aurociliata Eschr. l. c., p. 98.

Mylabris aurociliata Sum. l. c.

Patria ignota.

172. *fimbriata* (Dej.) Mrs. 1870.

Mylabris galamensis Petit. Dej., Cat. Col., ed. 3, 1837, p. 245.

Mylabris fimbriata Mrs., L'Ab. p. 83; Mon. 1872, p. 147, n. 102, tb. II, f. 45. — Baudi, Berl. E. Z. XXII, 1878, p. 371. — Beaur., Ins. ves. 1890, p. 527. — Sum., Hor. S. E. Ross. XLII, 1915, p. 46.

Hab.: Aegyptus, Senegal.

173. *batnensis* Mrs. 1870.

Mylabris batnensis. Mrs., L'Ab., p. 121; Mon. 1872, p. 163, n. 134, tb. III, f. 76. — Baudi l. c., p. 376. — Beaur. l. c., p. 522. — Sum l. c., p. 47.

Hab.: Algeria (Biskra).

174. *undecimpunctata* Fisch.-W. 1844.

Mylabris undecimpunctata Fisch.-W., Cat. Col. Karel. 1842, p. 17, n. 120, (nom. nud.); Bull. S. N. Mosc. XXVII, 1847, p. 131, n. 151, tb. III, f. 3. — Gemm. et Har., Cat. Col. VII, 1870, p. 2144. — Mrs., L'Ab. p. 140; Mon. 1872, p. 170, n. 150, tb. III, f. 92. — Beaur. l. c., p. 538. — Sum. l. c.

Zonabris undecimpunctata Heyd., Deut. E. Z. XXV, 1881, p. 327; Cat. Col. Sib. 1881, p. 153; Deut. E. Z. XXIX, 1885, 281. — Dokh. l. c., p. 153, n. 27, tb. II, f. 17. — Reitt., Verh. nat. Ver. Brünn XXVII, 1889, p. 120. — Heyd., Cat. Col. Sib. Nacht. I. 1893, p. 131.

ab. *septempunctata* Pic

Zonabris undecimpunctata var. *septempunctata* Pic,
Bull. S. Zool. Fr. XXVI, 1901, p. 78.

ab. *a* Sum. l. c.

Hab.: Turkestan (prov. Syr-darjens.; Semiretshje; Tashkent; Fergana; Samarkand), prov. Transcaspia, Dzhungaria (Kuldzba) ? Aegyptus.

175. *quatuordecimmaculata* Dokh. 1889.

Zonabris quatuordecimmaculata Dokh., Hor. S. E. Ross. XXIV, 1899, p. 150, n. 20, tb. II, f. 61. — Heyd., Cat. Col. Sib., Nacht. I, 1893, p. 131.

Mylabris quatuordecimmaculata Sum. l. c.

Hab.: Turkestan.

176. *quatuordecimsignata* Mrs. 1870.

Mylabris quatuordecimsignata Mrs., L'Ab, VII, 1870, p. 133; Mon. Myl. 1872, p. 167, n. 143, tb. III, f. 85. — Beaur. l. c., p. 535. — Sum. l. c.

ab. *pharia* Pic

Zonabris 14-signata var. *pharia* Pic, L'Ech. XXXII, n. 374, 1916, p. 7.

Hab.: Aegyptus (Cair).

177. *sedecimpunctata* Gebl. typ. 1825.

Mylabris sedecimpunctata Gebl., in Humm. Ess. ent. IV, 1825, p. 49; Mém. S. N. Mosc. (Nouv.) I, 1829, p. 168, n. 16; in Ledeb. Reise 1830, p. 139, n. 14; Bull. S. N. Mosc. XX, 1847, p. 502, n. 16. — Mén., Descr. II, 1848, p. 30. — Gebl., Bull. S. N. Mosc. XXXII, 1859, p. 488, n. 16. — Mrs., L'Ab., p. 130; Mon. 1872, p. 166, n. 141, tb. III, f. 83. — Beaur. l. c., p. 536. — Sum., Rev. Russe d'Ent. XIII, 1913, p. 305; Hor. S. E. Ross. XLII, 1915, p. 48.

Zonabris sedecimpunctata Heyd., Deut. E. Z. XXV, 1881, p. 327; Cat. Col. Sib. 1881, p. 153. — Dokt. l. c., p. 154, n. 29, tb. II, f. 7. — Heyd., Cat. Sib., Nacht. I, 1893, p. 131.

Zonabris tenue-punctata Dokh. l. c., p. 165, n. 44, tb. II, f. 50.

ab. *tenuipunctata* Dokh.

Zonabris 16-punctata var. *tenuipunctata* Dokh. l. c.

Mylabris sedecimpunctata ab. γ Sum. l. c.

ab. *a* Sum., Rev., f. 7. = ab. δ Hor. l. c.

ab. β Sum. ibid., f. 6. = ab. ξ l. c.

ab. ε Sum., Hor. l. c.

ab. η Sum. ibid.

Hab.: Sibiria mer.-occ. (Semipalatinsk, lac. Zajsan-nor), Turkestan (Tjulen-Agatsh, Perovsk, Bajgakum, Tshimkent, vall. fl. Talas, desert. Mujun-Kum; Ala-kul; Samarkand, Golodnaja stepp: Tashljau; vall. super. fl. Zaravshan; Osh, Margelan), Bucharia (Kafirnagan, Nur-Oty, jugum Baba-tau). Dzhungaria, Transcaspia (Tshardzhuj, Tedzhen) et Persia (Luristan; Shahkuh).

m. *wilkinsi*, Dokh.

Zonabris 16-punctata var. *wilkinsi* Dokh. l. c., p. 155, f. 8.

Zonabris sedecimpunctata var. *wilkinsi* Heyd., Cat., Nacht. I. 1893, p. 131.

Mylabris sedecimpunctata ab. α Sum. l. c.

Hab.: Turkestan (Perovsk).

m. *quindecimpunctata* Sum.

Mylabris 16-punctata var. *15-punctata* Sum., Sitzungsber. Nat. Gesell. Univ. Jurjew XVII, 1909, p. 220, n. 127.

Mylabris sedecimpunctata ab. β Sum. l. c.

ab. α n. Sum. 1)

Hab.: Turkestan (vallis flum. Talas).

178. *sedecimpunctata klugi* Redt. 1850.

Mylabris klugi Redt., Denkschr. Ac. Sc. Wien. 1850, p. 49, n. 20. — Mrs., L'Ab., p. 138; Mon. 1872, p. 169, n. 148, tb. III, f. 90. — Baudi, Berl. E. Z. XXII, 1878, p. 376. — Beaur, l. c., p. 350.

Zonabris klugi Eschr., Wien E. Z. XVIII, 1899, p. 90.

Mylabris sedecimpunctata m. *klugi* Sum. l. c.

Mylabris subocellata Redt. in litt.

Mylabris argus Klg. (Col. Mus. d. Brux.).

Hab.: Transcaspia (Aschabad), Persia (Luristan; Shahkuh) et Aegyptus.

179. *ocellata* Pall. 1773.

Meloe ocellata Pall., Iter II, 1773, App., p. 721, n. 93. — Goeze, Ent. I, 1777, p. 702, n. 5. — Pall., Icon. ins. I, 1781, p. 89, n. E 15, tb. E, f. 15.

1) Ab. α n. — Tache médiane interne sur les élytres manque.

Lytta ocellata Gmel., in L. Syst. Nat., ed. 13, I, P. IV, 1788, p. 2016, n.20.

Mylabris argus Ol., Enc. meth. VIII, 1811, p. 98, n. 37.

Mylabris ocellata Tausch., Mém. S. N. Mosc. III, 1812, p. 44, n. 14, tb. X, f. 16. — Schh., Syn. ins III, 1817, pp. 42—43, n. 59. — Gebl., Mém. S. N. Mosc. (Nouv.) I, 1829, p. 169, n. 17; in Ledeb. Reise 1830, p. 138, n. 9. — Gemm. et Har., Cat. VII, 1870, p. 2140. — Mrs., L'Ab, VII, 1870, p. 138; Mon. 1872, p. 169, n. 149, tb. III, f. 91. — Baudi, l. c., p. 370. — Beaur. l. c., p. 532. — Sum. l. c., p. 48.

Mylabris pupillata Schh., Syn. ins. l. c., n. 60.

Zonabris ocellata Heyd., Cat. Col. Sib. 1881, p. 153; Deut. E. Z. XXV, 1881, p. 327; id. XXVII, 1883, p. 68; id. XXIX, 1885, p. 281. — Dokh., Hor. S. E. Ross. XXIV, 1889, p. 154, n. 28, tb. II, f. 15. — Heyd., Cat., Nacht. I, 1893, p. 130. — Eschr., Wien. E. Z. XVIII, 1899, p. 90. — Reitt., Cat. 1906, p. 447. — Calw., Käferb. II, 1914, p. 754.

Mylabris ocellata ab. α n. Sum.²)

Hab.: Rossia mer.-or. (Uralsk); Turkestan (prov. Turgaica: desert. Malyja Barsuki; litus or. lac. Aral; desert. Mujun-Kum; Samarkand; Fergana: Namangan, Margelan), lac. Zajsan-nor, Transcaspia (Murgab, Serachs), Kuldzha.

? m *octonotata* Fisch.-W. 1844.

Mylabris octonotata Fisch.-W., Bull. S. N. Mosc. XVII, 1844, p. 132, n. 152. — Gebl., Bull. S. N. Mosc. XXXII, 1859, p. 448, n. 12. — Mrs., L'Ab., p. 131; Mon. 1872, p. 106, n. 142, tb. III, f. 84. — Ball., Bull. S. N. Mosc. LIII, 1878, p. 339, n. 18. — Beaur. l. c., p. 532.

Zonabris octonotata Heyd., Cat. Col. Sib. 1881, p. 153. — Dokh. l. c., p. 155, n. 30, tb. II, f. 9. — Heyd., Cat. Nacht. I, 1893, p. 130.

Zonabris 16-punctata var. *8-notata* Eschr. l. c.

Mylabris ocellata m. *octonotata* Sum. l. c., p. 49.

Hab.: lac. Balchash, Dzungcharia (lac. Sairam).

180. *impedita* Heyd. 1883.

Zonabris impedita Heyd., Deut. E. Z. XXVII, 1883, p. 66. — Dokh. l. c., p. 141, n. 11, tb. II, ff. 12—14. — Heyd., Cat. 1893, p. 130. — Eschr. l. c.

2) ab. α n. — Taches médianes (ou seulement tache interne) manquent.

- Mylabris impedita* Beur., Ins. ves. 1890, p. 529. —
Sum. l. c.
- Zonabris undulata* Sahl., Ofv. F. Vet.-Soc. Förh. L,
1908, p. 90, n. 134.
- Mylabris undulata* Sum., Rev. Russe d'Ent. XIII,
1913, p. 306.
- ab. *undulata* Sahl.
- Mylabris impar* ab. η Sum., Hor., p. 49.
- ab. a Dokh.
- Zonabris impar* var. a Dokh. l. c.
- Mylabris impar* ab. α Sum. l. c.
- ab. b Dokh. l. c.
- ab. β Sum.
- Mylabris undulata* forma β Sum., Rev., f. 11.
- Mylabris impar* ab. β Sum., Hor. l. c.
- ab. γ Sum. ibid.
- ab. d Dokh. l. c.
- ab. e Dokh. ibid.
- Mylabris impar* ab. δ Sum. l. c.
- ab. g Dokh. l. c.
- Mylabris impar* ab. ε Sum. l. c.
- ab. h Dokh. l. c., tb. II, f. 14.
- Mylabris impar* ab. ε Sum. l. c.
- ab. ϑ Sum. ibid.
- Mylabris undulata* forma α Sum., Rev., f. 9.
- ab. ι Sum. Hor. l. c.
- Mylabris undulata* forma α Sum., Rev., f. 10.
- Hab.: Turkestan (prov. Syr-darjensis; Perovsk; vallis
flum. Talas et desert. Mujun-Kum; Samarkand).
181. *laticollis* Eschr. 1899.
- Zonabris laticollis* Eschr. l. c., p. 99, n. 6, tb. II, f. 3.
- Mylabris laticollis* Sum., Hor. S. E. Ross. XLII, 1915,
pp. 49 et 50.
- Hab.: Transcaspia.
182. *gratiosa* Mrs. 1870.
- Mylabris gratiosa* Mrs., L'Ab., p. 135; Mon. 1872, p.
168, n. 145, tb. III, f. 87. — Baudi, l. c., p. 370. — Sum.
l. c., p. 53.
- Hab.: Aegyptus et Senegal.
183. *punctofasciata* Fairm. 1875.

Mylabris punctofasciata Fairm., Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 531. — Beaur., Ins. ves. 1890, p. 534. — Sum. l. c., p. 50.

Hab.: Tunisia.

184. *amoenula* Mén. 1849.

Mylabris amoenula Mén., Ac. St.-Pet. VI, 1849, p. 247, tb. IV, f. 13. — Beaur. l. c., p. 526. — Sum. l. c.

Zonabris amoenula Heyd., Cat. Col. Sib. 1881, p. 154. — Dokh. l. c, p. 171, n. 53. — Heyd., Cat. Nacht. I, 1893, p. 129.

ab. *angelicae* Reitt.

Zonabris margarithae var. *Angelicae* Reitt., Verh. nat. Ver. Brünn XXVII, 1889, p. 121.

Mylabris amoenula ab. *a* Sum. l. c.

Hab.: Transcaspia (Chodzha-Kala).

185. *mediozigzaga* Pic

Zonabris mediozigzaga Pic, L'Ech. XXXIX, n. 417, pp. 25—26.

Hab.: Persia.

186. *boghariensis* Raffr. 1873.

Mylabris boghariensis Raffr., Rev. et Mag. zool. (3) I, 1873, p. 380. — Beaur. l. c., p. 513. — Sum. l. c.

Had.: Algeria.

187. *elegantissima* Zubk. 1837.

Mylabris elegantissima Zubk., Bull. S. N. Mosc. X, 1837, p. 70, tb. IV, f. 4. — Fisch.-W., Bull. S. N. Mosc. XVII, 1844, p. 130, n. 149, tb. III, f. 2. — Mén., Deser. II, 1848, p. 31. — Reiche, Ann. S. E. Fr. 1865, p. 640, n. 59. — Gemm. et Har., Cat. Col. VII, 1870, p. 2136. — Mrs., L'Ab. VII, 1870, p. 144; Mon. 1872, p. 173, n. 156, tb. III, f. 97. — Baudi, l. c. — Beaur. l. c., p. 526. — Sum. l. c., p. 51.

Mylabris formosissima Karoly in litt.

Mylabris elegans Karel. in litt.

Zonabris elegantissima Heyd., Cat. Col. Sib. 1881, p. 153. — Dokh. l. c., p. 163, n.: 41. — Reitt., Verh. nat. Ver. Brünn XXVII, 1889, p. 120. — Heyd., Cat., Nacht. I, 1893, p. 130. — Eschr., Wien. E. Z. XVIII, 1899, p. 90.

ab. *anteactus* Pic

Zonabris elegantissima var. *anteactus* Pic, Bull. S. Zool. Fr. 1901, p. 78.

- Hab.: Turkestan (prov. Syr-darjensis; Semiretshje), Transcaspia (Repetek, Aschabad, Sary-Jasy) et Persia.
188. *theryi* Ab.-Perr. 1894.
Zonabris theryi Ab.-Perr., Bull. S. E. Fr. 1894, p. c. XXXII.
Mylabris theryi Sum. l. c.
 Hab.: Algeria.
189. *elegans* Ol. 1811.
Mylabris elegans Ol., Enc. meth. VIII, 1811, p. 101, n. 55. — Gemm. et Har. l. c. — Mrs., L'Ab., p. 149; Mon. 1872, p. 175, n. 161, tb. III, f. 102. — Baudi, l. c. — Beur. l. c. — Sum. l. c.
Zonabris elegans Eschr. l. c.
Mylabris caudata Walzl, in litt.
Mylabris tenella Walzl, in litt.
 ab. *nefischensis* Pic
Zonabris elegans var. *nefischensis* Pic, Bull. S. E. Eg. 1925, p. 229.
 Hab.: Syria; Aegyptus et Algeria (Ghardaia, Ain-Sefra).
190. *andresi* Pic, 1911.
Zonabris andresi Pic, L'Ech. XXVII, 1911, p. 162. — Bull. S. E. d'Eg. II, 1912, p. 132.
 Hab.: Aegyptus.
191. *octodecimmaculata* Mrs. 1870.
Mylabris octodecimmaculata Mrs., L'Ab., p. 147; Mon. 1872, p. 174, n. 159, tb. III, f. 100. — Sum. l. c., p. 52.
 Hab.: Algeria (Ain-Sefra, Sidi-bel-Abbes, Guelt-es-Stel, Hodna), Tunisia, Aegyptus.
192. *allardi* Mrs. 1870.
Coryna allardi Mrs., L'Ab., p. 193; Mon. 1872, p. 272, n. 19^a.
Mylabris allardi Baudi, l. c., p. 376.
Mylabris (Cor.) *allardi* Beur. l. c., p. 520. — Sum. l. c.
 Hab.: Algeria.
193. *semifasciata* Pic, 1895.
Zonabris 18-punctata var. *semifasciata* Pic, L'Ech. XI, 1895, p. 81.
Mylabris bicolorepilosa Sum., Rev. Russe d'Ent. XIII, 1913, pp. 473—474; Hor. S. E. Ross. XLII, 1915, p. 52.
Mylabris bicolorepilosa ab. *a* Sum. ibid.

Zonabris semifasciata Pic, Bull. S. E. Fr. 1914, pp. 203—204. — Sum., L'Ech. XLV, n. 436, 1929, p. 5.

Zonabris subargentata Reitt. in litt.

ab. *tunisea* Pic

Zonabris 18-punctata var. *tunisea* Pic, L'Ech. XXII, 1906, p. 22.

ab. *bicolorepilosa* Sum.

Mylabris semifasciata ab. *bicolorepilosa* Sum. L'Ech. l. c.

Hab.: Algeria (Biskra, Ain-Sefra, Bou.-Saada).

194. *tigripennis* Mrs. 1870.

Mylabris tigripennis Mrs., L'Ab., p. 143; Mon. 1872, p. 173, n. 155, tb. III, f. 96.¹⁾ — Sum. l. c.

ab. *obscurior* Pic

Zonabris tigripennis var. *obscurior* Pic, Rev. sc. Bourb. 1897, p. 125.

Mylabris tigripennis ab. *a* Sum. l. c.

Hab.: Aegyptus (Cair).

195. *pallidomaculata* Redt. 1850.

Mylabris pallidomaculata Redt., Denkschr. Ac. Wien. I, 1850, p. 49, n. 18. — Mrs., L'Ab., p. 113; Mon. 1872, p. 158, n. 127, tb. II, f. 70. — Sum. l. c., p. 53.

Zonabris pallidomaculata Eschr., Wien. E. Z. XVIII, 1899, p. 90.

Hab.: Persia mer. et Aegyptus.

196. *audouini* Mrs. 1870.

Mylabris audouini Mrs., L'Ab. pp. 141—142; Mon. 1872, p. 170, n. 152, tb. I, f. 154. — Ball., Bull. S. N. Mosc. LIII, 1878, p. 342, n. 182. — Beur., Ins. ves. 1890, p. 522. — Sum. l. c.

Zonabris audouini Heyd., Cat. Col. Sib. 1881, p. 153; Deut. E. Z. XXV, 1881, p. 327; id. XXVII, 1883, p. 68; id. XXX, 1886, p. 181. — Dokh., Hor. S. E. Ross. XXIV, 1889, p. 159, n. 34, tb. II, f. 60. — Eschr. l. c. — Reitt., Cat. 1906, p. 447. — Calw., Käferb. II, 1914, p. 754.

ab. *bangi* Heyd.

Zonabris audouini var. *bangi* Heyd., Deut. E. Z. XXX, 1886, p. 181; Cat. Nacht. I, 1893, p. 129.

1) M. Marseul donne fautivelement la discription de *tigripennis* sous le nom de *M. tigrinipennis* Latr.

ab. *a* Dokh. l. c.

Mylabris audouini ab. *a* Sum. l. c.

ab. *b* Dokh. l. c.

Mylabris audouini ab. β Sum. l. c.

Hab.: Rossia mer.-or.; Turkestan (prov. Turgaica: descrt. Malye Barsuki; prov. Syr.-darjensis: Abukhair, Tshili; jugum Alatau; Samarkand; Chodzhent) et Dzhungaria (Kuldzha).

197. *chudeani* Bed. 1921.

Zonabris chudeani Bed., Bull. S. E. Fr. 1921, p. 199.

Hab.: Sahara centr. (Uhggar).

198. *myrmidon* Mrs. 1870.

Mylabris myrmidon Mrs., L'Ab., pp. 154—155; Mon. 1872, p. 179, n. 166, tb. II, f. 107. — Beaur. l. c., p. 532. — Sum. l. c.

Hab.: Algeria.

199. *sisymbrii* Klg. 1845.

Mylabris sisymbrii Klg., Symb. phys. IV, 1845, p. 12, 1b. XXXI, f. 12. — Reiche, Ann. S. E. Fr. 1865, p. 641, n. 64. — Gemm. et Har., Cat. Col. VII, 1870, p. 2143. — Mrs., L'Ab. VII, 1870, p. 152; Mon. 1872, p. 178, n. 164, tb. III, f. 105. — Baudi, Berl. E. Z. XXII, 1878, p. 370. — Beaur. l. c., p. 536. — Sum., Hor. S. E. Ross. XLII, 1915, p. 54.

Zonabris sisymbrii Eschr., Wien. E. Z. XVIII, 1899, p. 89.

Hab.: Aegyptus et Nubia.

200. *przewalskii* Dokh. 1887.

Zonabris przewalskii Dokh., Hor. S. E. Ross. XXI, 1887, p. 341; id. XXIV, 1889, p. 120, ff. 11 et 12.

Mylabris goutelli Fairm., Ann. S. E. Fr. (6) 1889⁶ p. 48; Ann. S. E. Belg. XXXV, 1891, p. xxxviii.

Zonabris przewalskii Eschr. l. c., p. 92.

Mylabris przewalskii Sum. l. c.

Hab.: Tibet (Amdo).

201. *abiadensis* Mrs. 1870.

Mylabris abiadensis Mrs., L'Ab., pp. 29—30; Mon. 1872, p. 42, n. 4, tb. I, f. 2. — Beaur. l. c. p. 520. — Sum. l. c.

Hab.: Aegyptus.

202. *macilenta* Mrs. 1872.

Mylabris basalis Mot. in litt.

Mylabris macilenta Mrs., Mon. Myl. 1872 p. 129, n. 84
tb. V, f. 51'. — Sum. l. c.

Hab.: India bor. (jugum Himalaya).

203. *japonica* Sum. 1813.¹⁾

Mylabris japonica Sum., Rev. Russe d'Ent. XIII, 1913,
pp. 474—475; Hor. S. E. Ross. XLII, 1915, p. 55. — Pic,
Bull. S. E. Fr. 1914, p. 204.

Hab.: Japonia (Hakodate).

204. *varia* Ol. 1811.

Mylabris varia Ol., Enc. meth. VIII, 1811, p. 96,
n. 24. — Gemm. et Har., Cat. Col. VII, 1870, p. 2144. —
Mrs., L'Ab., p. 82; Mon. 1872, p. 141, n. 97, tb. II, f. 44. —
Baudi, l. c. — Beaur. l. c., p. 538. — Sum. l. c., p. 56.

Mylabris colon Schh. Dej., Cat. Col., ed. 3, 1837, p. 244.

Hab.: Aegyptus.

205. *schoenherri* Bilb. 1813.

Mylabris schoenherri Bilb., Mon., Myl. 1813, p. 14, n. 6,
tb. II, f. 1. — Schh., Syn. ins. III, 1817, p. 31, n. 7. —
Dej., Cat. Col., ed. 3, 1837, p. 244. — Gemm. et Har. l. c.,
p. 2142. — Mrs., Mon., p. 111, n. 62, tb. V, f. 42¹. — Beaur.
l. c., p. 537.

Hab.: China.

206. *cichorii* L. 1767.

Meloe cichorii L., Syst. Nat., ed. 12, 1767, II, p. 680,
n. 5. — Müll., Nat. I, 1774, p. 381, n. 5. — Gmel., in L.
Syst. Nat., ed. 13, 1788, p. 2018, n. 5. — Thunb., Nov.
ins. spec. VI, 1791, p. 113, f. 10.

1) D'après l'opinion de M. Pic (Bull. Sc. Ent. Fr. 1914, p. 203 et 204)
M. japonica Sum. n'est pas une espèce séparée, mais une variété de *M. indica*
Fuessl. Que cet avis est faux, nous pouvons en être convaincus en faisant la
comparaison suivante de ces deux espèces:

1 (2) Le corps assez plan. Antennes plus épaisses au bout; trois
derniers articles beaucoup plus larges que précédents (7 et 8), formant une
espèce de masse; dernier article des antennes en pointe obtuse. Elytres
sans bordure basale noire.

M. japonica Sum.

2 (1) Le corps assez convexe. Antennes médiocrement épaisses au
bout; trois derniers articles de même largeur que les précédents (7 et 8),
ne formant pas de masse; dernier article des antennes terminé en pointe
longue et assez aigüe. Elytres avec bordure (assez large, trilobée) sur la
base noire.

M. indica Fuessl.

Meloe fasciatus Fuessl., Verz. Schweiz. Ins. 1775, p. 20, n. 398, f. I c.

Mylabris cichorii F., Syst. ent. 1775, p. 261, n. 2; Spec. ins. I, 1781, p. 330, n. 2; Mant. ins. I, 1787, p. 216, n. 2. — Roem., Gen. ins. 1789, p. 51, n. 84, tb. VII, f. 11. — F., Ent. Syst. I, P. II, 1792, p. 88, n. 2. — Ol., Ent. III, 1795, p. 7, n. 7, tb. I, f. 1 a, b, c, d. — F., Syst. Eleuth. I, 1801, p. 81, n. 2. — Latr., Hist. nat. X (an. XII), 1804, p. 370, n. 4; Gen. Crust. II, 1807, p. 216, n. 1. — Ol., Enc. meth. VIII, 1811, p. 94, n. 16. — Tausch., Mém. S. N. Mosc. III, 1812, p. 136, n. 4, tb. X, f. 6. — Bilb., Mon. Myl. 1813, p. 11, n. 4, tb. I, f. 8; f. 9 (var. β), f. 10 (var. γ), f. 11 (var. δ). — Schh., Syn. ins. III, 1817, p. 31, n. 4. — Fisch. J., Tent. 1827, p. 4, n. 12. — Lam., Hist. nat. IV, 1835, p. 614, n. 1. — Lap.-Cast., Hist. nat. ins. II, 1840, p. 271, n. 16. — Mrs., Mon. Myl. 1872, p. 88, n. 39, tb. IV, f. 31¹. — Beaur. l. c., p. 524. — Sum., Sitzungsber. Nat.-Ges. Univ. Dorp. XXXI, 1924, p. 89, n. 7.

Cantharis cichorii Deg., Abh. z. Gesch. d. Ins. V, 1781, p. 244, n. 2, tb. XIII, f. 2.

ab. α Bilb.

Mylabris cichorii Bilb. l. c., f. 8.

ab. β Bilb. l. c., f. 9.

ab. γ Bilb. l. c., f. 10.

Mylabris cichorii Mrs. l. c.

Hab.: China, India orientalis.

207. *phalerata* Pall. 1781.

Meloe phalerata Pall., Icon. I, 1781, p. 78, tb. E, f. 3^b.

Mylabris sidae F., Supp. Ent. Syst. 1798, p. 120, n. 7; Syst. El. II, 1801, p. 83, n. 10. — Bilb., Mon. 1813, p. 7, n. 1, tb. I, f. 1; f. 2 (var. β), f. 3 (var. γ), f. 4 (v. δ), f. 5 (var. ϵ). — Ill., Mag. III, 1804, p. 173, n. 10. — Schh., Syn. ins. III, 1817, p. 30, n. 1. — Fisch. J., Tent. 1827, p. 3, n. 5. — Dej., Cat. Col. ed. 3, 1837, p. 244. — Mrs., Mon. 1872, p. 86, n. 38, tb. IV, f. 30¹.

Mylabris patruelis Strm., Cat. Col. 1843, p. 172.

Mylabris moquiana Ferr., Guer. Rev. et Mag. Zool. 1859, p. 539, tb. 21, f. 8.

Mylabris phalerata Gemm. et Har., Cat. Col. VII, 1870,

p. 2140. — Beur. l. c. 1890, p. 533. — Sum., Hor. S. E. Ross. XLII, 1915, p. 56.

ab. *moquinia* Ferr.

Mylabris phalerata var. *moquinia* Gemm. et Har. l. c. — Beur. l. c.

Mylabris sidae var. *moquiniana* Mrs. l. c., f. 30^{1a}.

Mylabris phalerata ab. *a* Sum. l. c.

Hab.: China, India (Bombay, Assam: Sind; Kashmir) et ins. Timor.

208. ***pustulata*** Thnb. 1791.

Meloe biundulata Pall. l. c., tb. H, f. E 4.

Mylabris undulata Hrbst., Arch. VIII, 1781, p. 179, n. 8.

Meloe undulata Gmel., in L. Syst. Nat., ed. 13, 1788, p. 2019.

Meloe pustulatus Thnb., Nov. ins. Spec. VI, 1791, p. 113, f. 13.

Mylabris pustulata Ol., Ent. III, 1795, p. 4, n. 2, tb. I, f. 1 et tb. II, f. 20; Enc. meth. VIII, 1811, p. 92, n. 2. — Bilb. l. c., p. 9, n. 2, tb. I, f. 6. — Schh. l. c., n. 2. — Lap.-Cast., Hist. nat. col. II, 1840, p. 269, n. 1. — Gemm. et Har. l. c., p. 2141. — Mrs., Mon. 1872, p. 89, n. 40, tb. IV, f. 32. — Beur. l. c., p. 534.

Mylabris cleroides Lichtenst., Cat. Hamb. 1795, p. 74.

Hab.: India et China.

209. ***schah*** Reiche, 1865.

Mylabris schah Reiche, Ann. S. E. Fr. 1865, p. 692, n. 4. — Gemm. et Har. l. c., p. 2142. — Mrs., L'Ab. VII, 1870, p. 39; Mon. 1872, p. 97, n. 45, tb. I, f. 11. — Beur. l. c., p. 535. — Sum. l. c.

Hab.: Persia mer.-or. (Tshaakend).

210. ***maculiventris*** Klg. 1845.

Mylabris maculiventris Klg., Symb. phys. IV, 1845, p. 4, tb. XXXI, f. 2. — Reiche, l. c., n. 3. — Gemm. et Har. l. c., p. 2139. — Mrs., L'Ab., p. 30; Mon. 1872, p. 51, n. 11, tb. I, f. 3. — Baudi, Berl. E. Z. XXII, 1878, p. 362. — Beur. l. c., p. 531. — Sum. l. c.

Mylabris bicincta Klg. Dej., Cat. Col., ed. 3, 1837, p. 244.

Zonabris rubronotatithorax Pic, L'Ech. XXVII, 1911, p. 146.

Hab.: Aegyptus, Nubia, Arabia.

211. *ligata* Mrs. 1870.

Mylabris ligata Mrs., L'Ab., pp. 31—32; Mon. 1872, p. 54, n. 13, tb. I, f. 4. — Baudi, l. c. — Beaur. l. c., p. 530. — Sum., Hor. S. E. Ross. XLII, 1915, p. 57.

Hab.: Aegyptus, Nubia (Chartum).

212. *infasciculata* Pic

Zonabris infasciculata Pic, L'Ech. XLV, n. 438, 1929, p. 14.

Hab.: Arabia.

213. *zonata* Klg. 1845.

Mylabris zonata Klg. l. c., f. 5 ♂. — Reiche, l. c. — Gemm. et Har., p. 2145. — Mrs., L'Ab. l. c.; Mon. 1872, n. 14, tb. I, f. 5 ♂. — Baudi, l. c., — Beaur. l. c., p. 540.

Mylabris duplicata Klg. l. c., f. 4 ♀.

Hab.: Aegyptus et Arabia.

214. *cruentata* Klg. 1845.

Mylabris cruentata Klg. l. c., f. 1. — Mrs., L'Ab., p. 36; Mon. 1872, p. 61, n. 21, tb. I, f. 8. — Sum. l. c.

Hab.: Senegal, Aegyptus; Arabia.

215. *tristis* Reiche, 1847.

Mylabris tristis Reiche, Ent. voyage Abiss. 1847, p. 379, tb. 23, f. 5. — Mrs., Mon. Myl, 1872, p. 55, n. 16, tb. IV, f. 10. — Baudi, l. c. — Beaur, l. c., p. 538.

Hab.: Aegyptus, Abessinia.

216. *bipartita*, Mrs. 1872.

Mylabris bipartita Mrs. l. c., p. 67, n. 25, tb. IV, f. 17'. — Beaur. l. c., p. 522. — Sum. l. c.

ab. *rollei* Pic

Zonabris bipartita var. *rollei* Pic, L'Ech. XXIII, 1907, p. 119.

Hab.: Aegyptus, Nubia et Africa mer.

217. *terminata* Ill. 1800.

Mylabris terminata Ill., Wied. Arch. I, 1800, p. 143, n. 36. — Chvr., Rev. Silb. V, 1837, p. 276, n. 18. — Gemm. et Har. l. c., p. 2143. — Baudi, l. c. — Beaur. l. c., p. 537.

Mylabris afzelli Bilb., Mon. Myl. 1813, p. 48, n. 33, tb. V, f. 11. — Schh., Syn. ins. III, 1817, p. 58, n. 37. — Mrs. l. c., p. 60, n. 19, tb. IV, f. 13'.

Mylabris haemorrhoea Klg., Erm. Reise 1835, p. 41.

- Mylabris bifasciata* Bilb., Dej., Cat. Col., ed. 3, 1837, p. 244.
- Mylabris bertrandi* Lap.-Cast., Hist. nat. II, 1840, p. 270, n. 12. — Gemm. et Har. l. c., p. 2134. — Mrs., l. c., p. 62, n. 21^a.
- Mylabris bilbergi* Strm., Cat. 1843, p. 172.
- Mylabris ustulata* Reiche, Ann. S. E. Fr. 1865, p. 633, n. 6. — Gemm. Har. l. c., p. 2144. — Mrs., L'Ab. VII, 1870, p. 37; Mon. 1872, p. 73, n. 28, tb. I, f. 9. — Sum. l. c.
- Mylabris afceli* var. *terminata* Mrs. Mon. l. c.
- " " var. *haemorrhoea* Mrs. ibid.
- ab. *afceli* Bilb. (f. typ.) l. c.
- ab. β Bilb. ibid. f. 12.
- ab. γ Bilb. ibid. f. 13.
- ab. σ Bilb. ibid. f. 14.
- Hab.: Senegal, Guinea, Siera-Leone; Algeria et Aegyptus.
218. *dubiosa* Mrs. 1870.
- Mylabris dubiosa* Mrs., L'Ab., p. 35; Mon. 1872, p. 61, n. 20, tb. I, f. 7. — Beur., Ins. ves. 1890, p. 526. — Sum. l. c.
- ab. *a* Sum. l. c.
- Hab.: Aegyptus et Abessinia (Harrar).
219. *femorata* Klg. 1845.
- Mylabris femorata* Klg., Symb. phys. IV. 1845, tb. XXXI, f. 8. — Baudi, Berl. E. Z. XXII, 1878, p. 362. — Beur. l. c., p. 527.
- Mylabris pallidicornis* Deyr. Beur. l. c.
- Hab.: Arabia (Dzhedda).
220. *arabica* Pall. 1781.
- Meloe arabica* Pall., Icon. I, 1781, p. 89, n. E 15, tb. H, f. E 15.
- Mylabris arabica* Schh., Syn. ins. III, p. 39, n. 45. — Fisch. J., Tent. 1827, 10, n. 57. — Klg. l. c., n. 7. — Mrs., L'Ab., p. 38; Mon. 1872, p. 74, n. 29, tb. I, f. 10. — Baudi, l. c. — Beur. l. c., p. 521.
- Mylabris erythroceras* Dej., Cat. Col., ed. 3, 1837, p. 243.
- Hab.: Arabia (Aden, ins. Perim).
221. *nubica* Mrs. 1872.
- Mylabris nubica* Mrs., Mon. Myl. 1872, p. 79, n. 33, tb. IV, f. 25.

Hab.: Senegal, Nubia.

222. *aestuans* Klg. 1845.

Mylabris aestuans Klg. l. c., f. 3 ♂. — Mrs., L'Ab., p. 33; Mon. 1872, p. 55, n. 15, tb. I, f. 3 — Baudi, l. c., p. 363. — Beaur. l. c., p. 520.

Mylabris scapularis Klg. l. c., f. 6 ♀. — Mrs., Mon, l. c. (var.).

Hab.: Arabia.

223. *rugosissima* Pic

Zonabris rugosissima Pic, L'Ech. XXV, 1909, p. 130.

Hab.: Arabia.

224. *lactea* Mrs. 1870.

Mylabris lactea Mrs., L'Ab., p. 140; Mon. 1872, p. 170, n. 151, tb. I, f. 93. — Beaur. l. c. p. 530. — Sum. l. c. p. 58.

Hab. Aegyptus.

225. *fischeri* Gebl. 1847.

Mylabris tauscheri Fisch.-W. (non Gebl.), Bull. S. N. Mosc. XVII, 1844, p. 130, n. 150, tb. III, f. 4, (nom. praeocc.). — Mrs., L'Ab., p. 123; Mon. 1872, p. 163, n. 135, tb. III, f. 77. — Baudi, l. c., p. 362. — Sum. l. c.

Mylabris fischeri Gebl., Bull. S. N. Mosc. XX, 1847, p. 501, n. 15. — Gemm. et Har., Cat. Col. VII, 1870, p. 2137. — Beaur., Ins. ves. 1890, p. 527. — Sum., Sitzungsber. Nat.-Ges. Univ. Dorpat XXXI, 1824, p. 89, n. 8.

Dies 8-maculatus Mon. Baudi l. c.

Zonabris tauscheri Dokh., Hor. S. E. Ross. XXIV, 1889, p. 150, n. 20, tb. II, f. 61

Zonabris komarovi Reitt., Verh. nat. Ver. Brünn XXVII, 1889, p. 121. — Heyd., Cat. Col. Sib., Nacht. I, 1893, p. 130. — Reitt., Deut. E. Z. XXXVIII, 1894, p. 51. — Eschr., Wien. E. Z. XVIII, 1899, p. 89.

ab. *pilimana* Reitt.

Zonabris komarovi var. *pilimana* Reitt., l. c.

Mylabris tauscheri ab. α Sum. Hor. l. c.

ab. *connecticornis* Reitt. l. c.

Mylabris tauscheri ab. β Sum. l. c.

Hab.: ? Rossia mer (Cherson)¹⁾; Sibiria (Tomsk, Irkutsk),

1) L'indication sur la Russie méridionale est impossible; une autre espèce a été probablement prise pour *M. fischeri* Gebl.

Turkestan (prov. Syr-darjens.: Perovsk, desert. Kisyl-Kum (Baibek), Bucharia et Transcaspia (Repetek, Karaul-Kuju, Dort-Kuju).

226. *delarouzei* Reiche, 1865.

Mylabris delarouzei Reiche, Ann. S. E. Fr. 1865, p. 639, n. 52. — Gemm. et Har., Cat. Col. VII, 1870, p. 2136. — Mrs., L'Ab., p. 134; Mon. 1872, p. 167, n. 144, tb. III, f. 86. — Beaur., l. c., p. 525. — Sum. l. c.

Zonabris delarouzei Eschr. l. c.

ab. *a* Sum. l. c.

ab. *nedjalensis* Pic

Zonabris delarouzei var. *nedjalensis* Pic., L'Ech. XXXVI, n. 400, 1920, p. 13.

ab. *sancta* Pic, *ibid.*

Hab.: Syria (Palaestina: Jaffa).

227. *goryi* Mrs. 1870.

Mylabris goryi Mrs., L'Ab., p. 88; Mon. 1872, p. 149, n. 107, tb. II, f. 50. — Baudi, Berl. E. Z., XXII, 1878, p. 362. — Beaur. l. c., p. 528. — Sum. l. c., p. 59.

Zonabris goryi Eschr. l. c.

Hab.: Persia, Arabia, India.

228. *wartmanni* Pic, 1896.

Zonabris wartmanni Pic, L'Ech. XII, 1896, p. 62; Rev. sc. Bourb., VII, 1897, p. 124. — Eschr. l. c.

Zonabris henoni Bed. in litt.

Mylabris abrupta Well., Deut. E. Z. 1910, p. 22. — Pic, *ibid.* pp. 194—195.

Mylabris wartmanni Sum. l. c.

ab. A. Pic

Zonabris wartmanni var. A. Pic, Rev. sc. Bourb. 1897, p. 2 (Extrait).

Mylabris wartmanni ab. *a* Sum. l. c.

ab. B. Pic, l. c., p. 3.

ab. β Sum. l. c.

ab. C. Pic, l. c.

ab. γ Sum. l. c.

ab. *nigripennis* Pic, L'Ech. l. c.

ab. δ Sum. l. c.

ab. ϵ n. Sum.¹⁾

Hab. : Algeria (Ain-Sefra, El-Arhouat).

229. *sanguinolenta* Ol. 1811.

Mylabris sanguinolenta Ol., Enc. meth. VIII, 1811, p. 95, n. 18. — Fisch. J., Tent. 1827, p. 10, n. 56. — Dej., Cat. Col., ed. 3, 1837, p. 244. — Reiche, Ann. S. E. Fr. 1865, p. 640, 56. — Gemm. et Har. l. c., p. 2142. — Mrs., L'Ab., p. 75; Mon. 1872, p. 134, n. 89, tb. II, f. 40. — Beaur. l. c., p. 535. — Sum. l. c.

Mylabris latreillei Bilb., Mon. Myl. 1813, p. 36, n. 22, tb. IV, f. 10. — Schh., Syn. ins. III, 1817, p. 36, n. 25. — Klg., Symb. phys. IV, 1845, tb. XXXII, f. 4.

Mylabris incerta Klg. ibid., f. 5. — Gemm. et Har. l. c., p. 2138. — Mrs., L'Ab., p. 87; Mon. 1872, p. 149, n. 106, tb. II, f. 49. — Baudi, l. c., p. 369.

Mylabris angulata var. *incerta* Reiche, Ann. S. E. Fr. 1865, p. 640, n. 57. — Beaur. l. c., p. 521.

Mylabris usta Baudi, Atti Torino 1878, p. 1143.

Zonabris sanguinolenta Eschr. l. c.

Zonabris incerta Eschr. ibid.

Mylabris angulata m. ? *incerta* Sum. l. c., p. 60.

ab. *usta* Baudi

Mylabris incerta var. *usta* Baudi l. c.

ab. *notatipennis* Pic

Zonabris sanguinolenta var. *notatipennis* Pic, Rev. sc. Bourb. 1897, p. 124.

Mylabris sanguinolenta ab. *a* Sum. l. c.

ab. *unijuncta* Pic.

Zonabris incerta var. *unijuncta* Pic, Misc. Ent. V, 1897, p. 2.

ab. *guardaiensis* Pic, ibid.

ab. *adolphi* Pic

Zonabris incerta var. *adolphi* Pic, L'Ech, XXVIII, 1912, p. 90.

Zonabris incerta var. *andresi* Pic, Bull. S. E. d'Eg. II, 1911, p. 74 (nom. praeocc.).

ab. *margensis* Pic

1) Ab. ϵ n. — Fascie antémédiane et ligne de points postmédiane existantes sur les élytres; fascie humérale manque.

Zonabris incerta var. *margensis* Pic, L'Ech. XXXIX, n. 418, 1924, p. 30.

m. *paykulli* Bilb.

Mylabris trifasciata Pz., ed. Voet. Cat. IV, 1798, p. 120?

Cantharis rubrofasciatus Voet., Cat. Col. II, 1804—1806, p. 75, tb. 48, f. 5 β .

Cantharis flavofasciatus Voet. l. c., f. 4 β .

Mylabris paykulli Bilb. l. c., p. 63, n. 43, tb. VII, f. 1. — Schh. l. c., p. 40, n. 47. — Fisch. J., Tent. 1827, p. 10, n. 59. — Chvr., Rev. Silb. V, 1837, p. 275, n. 15. — Gemm. et Har. l. c., p. 2140. — Beur. l. c., p. 533.

Mylabris angulata Klg. l. c., f. 6. — Reiche, l. c. — Gemm. et Har. l. c. — Baudi, l. c., p. 370. — Beur. l. c., p. 521. — Sum. l. c.

Mylabris sanguinolenta var. *paykulli* Reiche, l. c., p. 56.

Mylabris gilvipes var. *angulata* Mrs., Mon. 1872, p. 160, n. 130.

Mylabris nigripes Walzl. Baudi, l. c.

Zonabris paykulli Pic, Misc. Ent. V, 1897, p. 2. — Eschr. l. c.

Zonabris incerta var. *paykulli* Pic, Bull. S. E. d'Eg. II, 1911, p. 74.

ab. β Bilb. l. c., tb. VII, f. 2.

ab. γ Bilb. *ibid.*, f. 3.

ab. δ Bilb. *ibid.*, f. 4.

ab. ϵ Bilb. *ibid.*, f. 5.

ab. ζ Bilb. *ibid.*, f. 6.

ab. α Sum. l. c.

m. *gilvipes* Chvr.

Mylabris gilvipes Chvr. l. c., p. 273, n. 9. — Dej., Cat. Col., ed. 3, 1837, p. 245. — Mrs., L'Ab., p. 118; Mon. 1872, 160, n. 130, tb. III, f. 73. — Bed., Ann. S. E. Fr. XLI, 1887, p. 200. — Sum. l. c., p. 61.

Mylabris angulata var. *gilvipes* Baudi, l. c.

Mylabris diffinis Ab.-Perr., Bull. Toul. 1880, p. 238; Ann. S. E. Fr. XXXIX, 1885.

Mylabris lameyi Mrs., L'Ab. XXII, 1885, Nouv. fait, p. CXLVII, n. 36.

Zonabris gilvipes Eschr., Wien. E. Z. XVIII, 1899, p. 89.

Zonabris lameyi Eschr. *ibid.*

Mylabris pizzeta Chvr. in litt.

ab. *mediodestituta* Pic

Zonabris gilvipes var. *mediodestituta* Pic, L'Ech XXXV, n. 395, 1919, p. 18.

Hab.: Algeria (Ain-Sefra, Biskra, Ghardaia, Zahrez-Rharbi), Tunisia, Tripolitania, Aegyptus; Sinaj, Arabia, Syria (Palaestina: vall. fl. Jordanes), ? Persia, ? Graecia.

230. *quadrizonata* Fairm. 1875.

Mylabris quadrizonata Fairm., Ann. Mus. Genova VII, 1875, pp. 530—531. — Beaur., Ins. ves. 1890, p. 535. — Sum., Hor. S. E. Ross. XLII, 1915, p. 60.

Hab.: Algeria (Taguin, Zahrez-Rharbi, Messram) et Tunisia.

231. *litigiosa* Chvr. 1837.

Mylabris litigiosa Chvr., Rev. Silb. V, 1837, p. 271, n. 4. — Gemm. et Har., Cat. Col. VII, 1870, p. 2139. — Mrs., L'Ab. VII, 1870, p. 46; Mon. Myl. 1872, p. 107, n. 55, tb. II, f. 16. — Beaur. l. c., p. 530. — Sum. l. c.

Zonabris litigiosa Eschr. l. c.

ab. *islamita* Mrs.

Mylabris litigiosa var. *islamita* Mrs., Mon., 1872, f. 16^a.

Mylabris litigiosa ab. *a* Sum. l. c.

Hab.: Senegal, Algeria (Biskra, Ghardaia), Tunisia, Aegyptus; Sinaj, Arabia.

232. *circumflexa* Chvr. 1837.

Mylabris circumflexa Chvr., in Rev. Silb. V, 1837, p. 273, n. 11. — Luc., Expl. sc. Alg. I, 1846, p. 389, n. 11, tb. 33, f. 8. — Reiche, Ann. S. E. Fr. 1865, p. 639, n. 50. — Gemm. et Har. l. c., p. 2135. — Mrs., L'Ab., p. 116; Mon. 1872, p. 160, n. 129, tb. III, f. 72. — Baudi, Berl. E. Z. XXII, 1878, p. 369. — Beaur. l. c., p. 524. Sum. l. c.

Mylabris scapularis Chvr. l. c., p. 278, n. 24.

Mylabris bissexpunctata Latr. Dej., Cat. Col., ed. 3, 1837, p. 244.

Mylabris distincta Dej. l. c. (nom. nud.). — Baudi, l. c.

Mylabris variegata Dej. l. c. (nom. nud.). — Baudi, l. c.

Mylabris goudoti Chvr., in Rev. Silb. V, 1837, p. 274, n. 12 (nom. nud.). — Lap.-Cast., Hist. nat. II, 1840, p. 270, n. 13. — Baudi, l. c., p. 368. — Beaur. l. c., p. 528.

Zonabris circumflexa Eschr. l. c. — Escal., Bol. R. Soc. Esp. IX, 1909, pp. 244—249; Trab. Mus. Nac. Madr. 1914, p. 396.

ab. *borealis* Voigts.

Zonabris circumflexa var. *borealis* Voigts, Wien. E. Z. XXI, 1902, p. 178.

Mylabris circumflexa var. *scapularis* Chvr. Mrs., L'Ab., 1870, p. 117.

Mylabris circumflexa ab. ♂ Sum. l. c.

ab. *goudoti* Lap.-Cast.

Mylabris circumflexa var. *goudoti* Gemm. et Har. l. c. — Mrs. L'Ab. l. c.

Mylabris circumflexa var. *variegata* Gemm. et Har. l. c.

ab. *distincta* Dej.

Mylabris circumflexa var. *distincta* Baudi l. c.

ab. *tlemcensis* Pic

Zonabris circumflexa var. *tlemcensis* Pic, L'Ech. XXXI, n. 366, 1915, p. 22.

ab. *biquinquenotata* Pic, *ibid.*

ab. *subapicalis* Pic

Zonabris circumflexus var. *subapicalis* Pic, L'Ech. XXXVI, n. 403, 1921, p. 21.

ab. *nigrojuncta* Pic, *ibid.*

ab. *atrojuncta* Pic, *ibid.*

Mylabris circumflexus ab. γ Sum. l. c.

ab. *edoughensis* Pic, l. c.

ab. *postbifasciata* Pic, *ibid.*

ab. *unireducta* Pic, *ibid.*

ab. *oranensis* Pic, *ibid.*

ab. *subfasciata* Pic, *ibid.*

ab. *apicecincta* Pic, *ibid.*

ab. *diversenotata* Pic, *ibid.*

ab. *mediofasciata* Pic, *ibid.*

ab. *alegensis* Pic, *ibid.*

ab. *posticefasciata* Pic, *ibid.*

ab. *discojuncta* Pic, *ibid.*

ab. *postrinotata* Pic, *ibid.*

ab. *abbesensis* Pic, *ibid.*

ab. *7-notata* Pic, *ibid.*

ab. *antetrinotata* Pic, *ibid.*

- ab. *antebinotata* Pic, ibid.
 ab. *quinquenotata* Pic, ibid.
 ab. *6-signata* Pic, ibid.
 ab. *antequadrinotata* Pic, ibid.
 ab. *mediotrinotata* Pic, ibid.
 ab. *reghaiensis* Pic, ibid.
 ab. *fontainei* Pic, ibid.
 ab. *comtei* Pic, ibid.
 ab. *subexternepunctata* Pic, ibid.
 ab. *aumalensis* Pic, ibid.
 ab. *rufoapicalis* Pic, ibid.
 ab. *destituta* Pic, ibid.
 ab. α Sum. l. c.
 ab. β Sum. ibid.

Hab.: Andalusia; Marocco (Melilla, Mazagan, Casablanca, Mogador, Marraquesh et Tanger), Algeria (Sidi-bel-Abbes, Perregaux, Alger, Bou-Khanefis, Aumale, Bon, Endough Constantina, Bou-Saada, Biskra, Teniet, Ain-Sefra, Mecheira, Ghardaia, Zahrez-Kharbi), Tunisia (Feriana, Mezouna), Tripolitania, Aegyptus (Cair); Sinaj, Syria (vall. flum. Jordanes: Abu-Obede et Jerichon), Arabia, ? Persia, ? Graecia.

233. *alepensis* Pic, 1913.

Zonabris alepensis Pic, L'Ech. XXIX, 1913, p. 185.

Mylabris alepensis Sum., Hor. S. E. Ross. XLII, 1915, p. 62.

Hab.: Syria (Aleppo).

234. *tigrinipennis* Latr. 1827.

Mylabris tigrinipennis Latr., in Caill. Voyage MÉR. IV, 1827, p. 286. — Dej. l. c., p. 245. — Bed., Ann. S. E. Fr. VII, 1887, p. 200. — Beaur., Ins. ves. 1890, p. 538.

Mylabris menthae Klg., Sym. phys. IV, 1845, p. 12, tb. XXXI, f. 11. — Reiche, Ann. S. E. Fr. 1865, p. 641, n. 65. — Gemm. et Har. l. c., p. 2139. — Mrs., L'Ab., p. 153; Mon. 1872, p. 178, n. 165, tb. III, f. 106. — Baudi, l. c., p. 370. — Sum. l. c.

Zonabris menthae Eschr. l. c.

ab. *bisbiflexuosa* Pic

Zonabris menthae var. *bisbiflexuosa* Pic, Bull. S. E. II, d'Eg. 1911, p. 73.

ab. *luxorensis* Pic, ibid., p. 74.

ab. *bieliflexuosa* Pic, id., 1912, p. 134.

ab. *luxori* Pic, ibid.

ab. *a* Sum. l. c.

Hab.: Algeria (Ghardaia, Biskra, El-Onâh-el-Bahrych),
Aegyptus (Cair, Luxor) et Nubia.

235. ***diversithorax*** Pic, 1910.

Zonabris diversithorax Pic, L'Ech. XXVI, 1910, p. 18.

Mylabris diversithorax Sum. l.

Hab.: ? Senegal ? Aegyptus.

236. ***fulgurita*** Reiche.

Mylabris fulgurita Reiche, l. c., p. 640, n. 60. —

Gemm. et Har. l. c., p. 2137. — Mrs., L'Ab., p. 145; Mon.
1872, p. 174, n. 157, tb. III, f. 98. — Baudi, Berl. E. Z.
XXII, 1878, p. 376. — Beaur. l. c., p. 528. — Sum. l. c.

Zonabris fulgurita Eschr. l. c.

ab. *subundulata* Pic

Zonabris fulgurita var. *subundulata* Pic, L'Ech.
XXXV, n. 395, 1919, p. 18.

ab. *bisbiinterrupta* Pic, ibid.

Hab.: Algeria (Ain-Sefra), Aegyptus (Cair).

237. ***vigintipunctata*** Ol. 1811.

Mylabris vigintipunctata Ol., Enc. meth. VIII, 1811,
p. 97, n. 35. — Klg., Symb. phys. IV, 1845, tb. XXXI, f. 10.

— Reiche, l. c., p. 641, p. 63. — Gemm. et Har. l. c., p.
2145. — Mrs., L'Ab., p. 148; Mon. 1872, p. 175, n. 160,
tb. III, f. 101. — Baudi, l. c., p. 370. — Beaur. l. c., p. 539.
— Sum. l. c., p. 63.

Zonabris vigintipunctata Eschr. l. c.

Hab.: Aegyptus (Cair); Sinaj, Syria.

238. ***albilanea*** Bed. 1899.

Zonabris albilanea Bed., Bull. S. E. Fr. 1899, p. 382.

Mylabris albilanea Sum. l. c.

Hab.: Algeria (Ain-Sefra, Bou-Saada, Biskra).

239. ***bedeli*** Bleuse, 1899.

Zonabris bedeli Bleuse, Bull. S. E. Fr. 1899, p. 383.

Mylabris bedeli Sum. l. c.

ab. *ainensis* Pic

Zonabris bedeli var. *ainensis* Pic, L'Ech. XXXV, n.
395, 1919, p. 17.

ab. *croisi* Pic

Zonabris bedeli s.-sp. *Crosi* Pic, *ibid.*

Hab.: Algeria (Ain-Sefra).

240. *nigriplantis* Klg. 1845.

Mylabris nigriplantis Klg. l. c., f. 9. — Gemm. et Har. l. c., p. 2140. — Mrs., L'Ab., p. 151; Mon. 1872, p. 179, n. 166, tb. III, f. 104. — Beaur. l. c., p. 532. — Sum. l. c.

Zonabris nigriplantis Eschr., Wien. E. Z. XVIII, 1899, p. 89.

Hab.: Senegal, Aegyptus, Nubia, Arabia.

241. ? *fuscicornis* Drap. 1821.

Mylabris fuscicornis Drap., Ann. sc. phys. Brux. VIII, 1821, p. 277, tb. CXXVII, f. 6. — Gemm. et Har. l. c., p. 2137. — Mrs., Mon. 1872, p. 281. — Beaur. l. c., p. 528.

Hab.: China.

242. *scabrata* Klg. 1845.

Mylabris scabrata Klg. l. c., p. 33, tb. XXXII, f. 10. — Gemm. et Har., Cat. Col. VII, 1870, p. 2142. — Mrs., L'Ab. VII, 1870, p. 172; Mon. 1872, p. 223, n. 9, tb. VI, ff. 9 et 9^a. — Beaur., Ins. ves. 1890, p. 525. — Sum. l. c., p. 64.

Hab.: Aegyptus; Sinaj, Arabia.

243. *duodecimmaculata* Ol. 1811.

Mylabris duodecimmaculata Ol., Enc. meth. VIII, p. 98, n. 41. — Chvr., Rev. Silb. 5, 1837, p. 272, n. 7. — Gemm. et Har. l. c., p. 2136. — Mrs., L'ab., p. 173; Mon. 1872, p. 232, n. 15, tb. VI, f. 15. — Beaur, l. c., p. 526. — Sum. l. c.

Zonabris duodecimmaculata Escal., Trab. Mus. Nac. Madr. 1914, p. 395.

Hab.: Marocco (Larache, Marraquesh, Casablanca, Mazagan, Mogador).

244. *novemdecipunctata* Ol. 1811.

Mylabris novemdecipunctata Ol. l. c., n. 36. — Reiche, Ann. S. E. Fr. 1865, p. 641, n. 62. — Gem. et Har. l. c., p. 2140. — Mrs., L'Ab., p. 174; Mon. 1872, p. 233, n. 17, tb. VI, f. 17. — Baudi, Berl. E. Z. XXII, 1878, p. 370. — Beaur. l. c., p. 532. — Sum. l. c.

Mylabris octodecimpunctata Klg. l. c., f. 11.

Zonabris argenteopubescens Escal., Bol. R. S. Esp. Hist. Nat. IX, 1909, p. 447.

Zonabris octodecimpunctata Escal. l. c.

Hab.: Marocco (Melilla, Mazagan, Arjaiat, Uxda), Algeria, Aegyptus (Alexandria).

245. *argentifera* Pic, 1895.

Zonabris argentifera Pic, L'Ech. XI, 1895, p. 81; Bull. S. E. Fr. 1897, p. 150.

Mylabris henoni Fairm., Bull. S. E. Fr. 1897, p. 121.

Mylabris argentifer Sum. l. c.

ab. *auberti* Chob.

Decatoma argentifera var. *auberti* Chob., Rev. d'Ent Fr. XVII, 1898, p. 87.

Mylabris (*Dec.*) *argentifer* ab. *a* Sum. l. c.

Hab.: Algeria (Oran, Ghardaia).

246. *kraazii* Heyd. 1881.

Decatoma kraatzii Heyd., Deut. E. Z. XXV, 1881, p. 329.

Mylabris (*Dec.*) *kraatzii* Beaur. l. c., p. 530. — Sum. l. c., p. 65.

ab. *a* Sum. l. c.

Hab.: Persia (Shachrud).

247. *coeruleomaculata* Redt. 1843.

Mylabris coeruleomaculata Redt., Illustr. et descr. col. nov. Syr. 1843, p. 987, n. 21, tb. 21. — Gemm. et Har. l. c., p. 2135. — Mrs., L'Ab., p. 175; Mon. 1872, p. 234, n. 18, tb. II, f. 18. — Beaur. l. c., p. 524. — Sum. l. c.

ab. *viridiflua* Mrs.

Mylabris (*Dec.*) *coeruleomaculata* var. *viridiflua* Mrs., Mon. 1872, p. 211.

?*Zonabris* (*Dec.*) *coeruleomaculata* var. *subhumeralis* Pic (nom. praeocc.), L'Ech. XXIV, 1908, p. 74.

Mylabris (*Dec.*) *coeruleomaculata* ab. *a* Sum. l. c.

Hab.: Persia (Suse), Syria (Libanon).

248. *smaragdina* Gebl. 1841.

Mylabris smaragdina Gebl., Bull. S. N. Mosc. XIV, 1841, p. 597, n. 22. — Gemm. et Har. l. c., p. 2143. — Mrs., L'Ab., p. 177; Mon. 1872, p. 234, n. 19, tb. VI, f. 19. — Beaur. l. c., p. 536. — Sum. l. c.

Decatoma smaragdina Heyd., Cat. Col. Sib. 1881, p. 151.

Hab.: Sibiria (flum. Irtysh ultra lac. Zajsan-nor).

Subg. **Ceroctis** Mrs.

Mrs., L'Ab. VII, 1870, p. 168; Mon. Myl. 1872, p. 186. —
Sum., Hor. S. E. Ross. XLII, 1915, p. 2.

249. **corynoides** Reiche, 1865.

Mylabris corynoides Reiche, Ann. S. E. Fr. 1865, p. 631,
n. 2. — Gemm. et Har., Cat. Col. VII, 1870, p. 2135.

Mylabris (Ceroct.) corynoides Mrs., L'Ab., p. 168; Mon.
1872, p. 195, n. 183, tb. III, f. 119. — Baudi, Berl. E. Z.
XXII, 1878, p. 361. — Beaur., Ins. ves. 1890, p. 525. —
Sum. l. c.

Mylabris alternans Walzl, Baudi, l. c.

Ceroctis corynoides Pic, Rev. sc. Bourb. 1897 (Extrait)
p. 4.

Ceroctis tricincta (Reiche?) Escal., Trab. Mus. Nac.
Madr. 1914, p. 400.

Zonabris (Ceroct.) corynoides Pic, L'Ech. XXXV, 1919,
p. 18.

Mylabris serricornis Mot. in litt.

ab. *trizonata* Reiche.

Mylabris trizonata Reiche, l. c., n. 1.

Zonabris (Ceroct.) corynoides var. *trizonata* Reiche,
Pic, l. c.

ab. *binotata* Pic

Ceroctis corynoides var. *binotata* Pic, Rev. sc. Bourb.
1897, p. 126; L'Ech. XXXV, 1919, p. 18.

ab. *biinterrupta* Pic

Ceroctis corynoides var. *biinterrupta* Pic, Ann. S. E.
Fr. 1898, p. 224; L'Ech., l. c.

Ceroctis corynoides var. *interrupta* Pic (error typo-
graphique) Rev. sc. Bourb. 1897, p. 126; L'Ech. l. c.

ab. *subhumeralis* Pic

Ceroctis corynoides var. *subhumeralis* Pic, L'Ech.
XIX, 1903, p. 114; id. XXXV, 1919, p. 18.

ab. *breveinterrupta* Pic

Zonabris (Ceroct.) corynoides var. *breveinterrupta*
Pic, L'Ech. l. c.

ab. *mediodivisa* Pic

Zonabris (Ceroct.) corynoides var. *mediodivisa* Pic, *ibid.*

ab. *subdivisa* Pic

Zonabris (Ceroctis) corynoides var. *subdivisa* Pic, *ibid.*

ab. *gamondana* Pic

Zonabris (Ceroct.) corynoides var. *gamondana* Pic, *ibid.*

ab. *gafsana* Pic

Zonabris (Ceroct.) corynoides var. *gafsana*, Pic, *ibid.*

ab. *setafana* Pic

Zonabris (Ceroct.) corynoides var. *setafana* Pic, *ibid.*

Hab.: Marocco (Restinga), Algeria (Ain-Sefra, St.-Denis d. Sig., Bou-Saada, Laghauat, Setafa), Tunisia (Bled Gamanda, Gafsa) et Aegyptus (Mokattan, Cair).

250. *yerburyi* Gah. 1896.

Mylabris yerburyi Gan., *Ann. a. Mag. Nat. Hist. Lond.*

(6) XVIII, 1896, p. 456.

Hab.: Arabia.

251. *theresae* Pic

Zonabris theresae Pic, *L'Ech.* XXIV, 1908, p. 33.

Hab.: Arabia.

252. *coronata* Mrs. 1870.

Mylabris (Ceroct.) coronata Mrs., *L'Ab.*, p. 170; *Mon.* 1872, p. 196, n. 184, *tb.* III, f. 120. — *Sum. l. c.*, p. 64.

Mylabris coronata Gemm. et Har. *l. c.* — *Beaur. l. c.*

Hab.: Aegyptus.

III. Genn. **Hycleus** Latr. 1817.

Coryna Bilb., *Mon. Myl.* 1813, p. 73. — Mrs., *Mon. Myl.* 1872, p. 235.

Hycleus Latr. in *Icon. Règne anim. d. Cuvier* III, 1817, p. 317. — *Lap.-Cast., Hist. Nat. ins.* II, 1840, p. 267.

Dices Dej., *Cat. Col.*, ed. 3, 1837, p. 243.

1. *birecurvus* Mrs. 1870.

Coryna birecurva Mrs., *L'Ab.*, p. 184; *Mon.* 1872, p. 256, n. 16, *tb.* VI_{III}, f. 16. — *Gemm. et Har., Cat. Col.* VII, 1870, p. 2132. — *Baudi, Berl. E. Z.* XXII, 1878, p. 360.

Mylabris (Coryna) birecurva *Beaur., Ins. ves.* 1890, p. 522. — *Sum., Hor. S. E. Ross.* XLII, 1915, p. 65.

Hab.: Syria (Alexandreta).

2. *latus* Reiche, 1865.

Coryna lata Reiche, Ann. S. E. Fr. 1865, p. 629, n. 5.
— Gemm. et Har. l. c., p. 2133. — Mrs., L'Ab., p. 185;
Mon. 1872, p. 257, n. 17, tb. II_{III}, f. 17. — Baudi, l. c.

Mylabris (Cor.) lata Beur. l. c., p. 530. — Sum.
l. c., p. 66.

Dices fasciatus Klg. Baudi, l. c.

Hab.: Algeria, Aegyptus (Cair).

3. *confluens* Reiche, 1865.

Coruna confluens Reiche, l. c. — Gemm. et Har. l. c.
Mrs., L'Ab., p. 186; Mon. 1872, p. 257, n. 18, tb. I_{III}, f. 18.
— Baudi, l. c., p. 361.

Mylabris (Cor.) confluens Beur. l. c., p. 524. — Sum. l. c.

Zonabris (Hycl.) confluens Reitt., Cat. Col. Eur. 1906,
p. 449.

ab. *picta* Baudi

Corina confluens var. *picta* Baudi, l. c.

Hab.: Rumelia, Turcia eur.; Asia Minor, Sinaj, ? Da-
gestan.

4. *ottomanus* Eschr. 1899.

Coryna ottomana Eschr., Wien. E. Z. XVIII, 1899, p.
109, tb. II, f. 21.

Zonabris (Hycl.) ottomana Reitt. l. c.

Mylabris (Cor.) ottomana Sum. l. c.

ab. *mediodisjuncta* Pic

Coryna ottomana var. *mediodisjuncta* Pic, L'Ech.
XLVI, n. 439, 1930, p. 1.

Hab.: Turcia eur. (Constantinopol); Asia Minor (Smyrna,
Angora).

5. *denticulatus* Mrs. 1871.

Coryna denticulata Mrs., L'Ab. VIII, 1871, p. 418. —
Pic, Rev. sc. Bourb. XI, 1898, p. 17; id. XXVI, 1913, p. 2.

Hab.: Arabia.

6. *denticulatus suturiferus* Pic, 1896.

Coryna denticulata var. *suturifera* Pic, Misc. Ent. IV,
1896, p. 42; Rev. sc. Bourb. X, 1897, p. 126 (Note).

Coryna bleusei Chob., Bull. S. E. Fr. 1896, p. 376. —
Pic, Rev. l. c.

Coryna suturifera Pic, Rev. sc. Bourb. XXVI, 1913, p. 2.
ab. *alfredi* Pic.

Coryna suturifera var. *alfredi* Pic, l. c.
ab. *bleusei* Chob.

Coryna suturifera var. *bleusei* Chob. Pic, ibid.
Mylabris (*Cor.*) *bleusei* Sum. l. c.

ab. *vaulogeri* Pic

Coryna suturifera var. *vaulogeri* Pic, l. c.
ab. *indenticulata* Pic

Corina suturifera var. *indenticulata* Pic, ibid.

Hab.: Algeria (Ain-Sefra, Laghouat, Bou-Saada, Souf.).

7. ***sefrensis*** Pic, 1895.

Coryna sefrensis Pic, Rev. sc. Bourb. VIII, 1895, p. 12.
Hab.: Algeria.

8. ***rotroui*** Pic, 1930.

Coryna rotroui Pic, L'Ech. XLVI, n. 439, 1930, p. 1.
Hab.: Algeria (Titen Yaya).

9. ***mylabroides*** Lap.-Cast. 1840.

Hycleus mylabroides Lap.-Cast., Hist. nat. ist. II, 1840,
p. 268, n. 4.

Mylabris lanuginosa Gerstr., Monatsbl. Berl. Ac. 1854,
p. 695. — Pet., Reise Mozamb. 1862, p. 303, tb. XVIII, f. 4.

Coryna mylabroides Reiche, Ann. S. E. Fr. 1865, p
629, n. 4. — Gemm. et Har., Cat. Col. VII, 1870, p. 2133.
— Mrs., L'Ab. VII, 1870, p. 182; Mon. Myl. 1872, p. 247,
n. 8, tb. VI, f. 8. — Baudi, Berl. E. Z. XXII, 1878, p. 360.

Dices fimbriatus Dej. Baudi, l. c.

Mylabris (*Cor.*) *mylabroides* Beaur., Ins. ves. 1890, p.
p. 531. — Sum. l. c., p. 68.

Hab.: Senegal, Angola, Mozambik, Caffraria, Aegyptus.

10. ***tigrinus*** Klg. 1845.

Mylabris tigrina Klg., Symb. phys. IV, 1845, tb. XXXII,
f. 12. — Bear. l. c.

Coryna tigrina Reiche, l. c., p. 628, n. 3. — Gemm.
et Har. l. c. Mars., L'Ab. p. 183; Mon. 1872, p. 247, n. 9,
tb. VI, f. 9. — Baudi, l. c.

Dices erythrocerus Dej. Baudi, l. c.

Mylabris (Cor.) tigrina Sum. l. c.

Dices reichei Dej. in litt.

Hab.: Aegyptus; Sinaj, Arabia (Obok).

11. **ornatus** Reiche, 1865.

Coryna ornata Reiche, l. c., p. 630, n. 9. — Mrs., L'Ab., p. 187; Mon. 1872, p. 258, n. 19, tb. VI, f. 19.

Mylabris (Cor.) ornata Beur. l. c., p. 533. — Sum. l. c.; ibid. ab. α (= var. *latebijuncta* Pic) et β (= var. *berytensis* Pic).

ab. *latebijuncta* Pic

Coryna ornata var. *latibijuncta* Pic, Bull. S. E. Fr. 1912, p. 177.

ab. *berytensis* Pic

Coryna ornata var. *berytensis* Pic, ibid.

Hab.: Syria.

12. **rubricollis** Mrs. 1875.

Coryna rubricollis Mrs., L'Ab. XII, 1875 (Nouv.), p. xxiv. — Pic, l. c. p. 176.

Hab.: Arabia.

13. **bilbergi** Gyll. 1817.

Coryna bilbergi Gyll., in Schh. Syn. ins. III, App., p. 33, n. 53. — Fisch. J., Tent. 1827, p. 2, n. 2. — Reiche, l. c. n. 8. — Gemm. et Har. l. c., p. 2132. — Mrs., L'Ab. VII, 1870, p. 190; Mon. 1872, p. 259, n. 22, tb. VI, f. 22. — Baudi, l. c., p. 362. — Gorr., Mon. Col. Mel. 1882, p. 136, n. 19.

Dices clavicornis Dumer., Dict. sc. nat. 1825, p. 13. — Dej., Cat. Col. ed. 3, 1837, p. 243.

Hycleus bilbergi Latr., in Règne anim. d. Cuvier, ed. 2, IV, 1829, p. 63. — Lap.-Cast. l. c., n. 5. — Muls., Hist. nat. Col. Fr. 1857, p. 109, n. 1.

Dices bilbergi Dej. l. c.

Mylabris (Cor.) bilbergi Beur., Ins. ves. 1890, p. 522. — Sum. l. c., p. 67; ibid. ab. α , β , (γ)¹.

1) L'aberration γ a été attribuée par erreur à *C. bilbergi* au lieu de *C. pincta* Chor.

Zonabris (Hycl.) bilbergi Reitt., Cat. Col. Eur. 1906, p. 449. — Calw., Käferb. II, 1914, p. 754.

ab. *circumfusa* Baudi

Coryna circumfusa Baudi, Atti Torino XIII, 1878, p. 1062.

ab. *gallica* Pic

Coryna bilbergi var. *gallica* Pic, L'Ech. XXXII, n. 374, 1916, p. 7.

ab. *a* Muls.

Hycleus bilbergi v. *a* Mls. l. c.

ab. β Muls. *ibid.*

ab. γ Muls. *ibid.*

ab. σ Muls. *ibid.*

ab. ε Muls. *ibid.*

ab. ξ Muls. *ibid.*

ab. η Muls. *ibid.*

Hab.: Sicilia, Italia, Gallia mer. Hispania (Madrid, Cadix) Portugalia, Marocco (Tanger), Algeria, Tunisia, ? Syria.

14. ***peyroni*** Reiche, 1865.

Coryna peyroni Reiche, l. c., n. 10. — Gemm. et Har. l. c., p. 2133. — Mars., L'Ab., p. 188; Mon. 1872, p. 258, n. 20, tb. VI, f. 20.

Mylabris (Cor.) peyroni Beur. l. c., p. 533. — Sum. l. c.

Coryna pompejopolis Peyr. in litt.

Hab.: Sinaj, Syria (vall. flum. Jordanes), Asia Minor.

15. ***distinctus*** Chvr. 1837.

Hycleus distinctus Chvr., in Silb. Rev. ent. V, 1837, p. 269, n. 1; *ibid.* var.: β , γ , δ et ε .

Coryna distincta Reiche, l. c., p. 629, n. 7. — Gemm. et Har. l. c., p. 2132. — Mrs., L'Ab., p. 189; Mon. 1872, p. 259, n. 21, tb. VI, f. 21. — Baudi, l. c., p. 361.

Mylabris (Cor.) distincta Beur. l. c., p. 526. — Sum. l. c., p. 68.

Zonabris (Hycl.) distincta Reitt. l. c. — Calw. l. c.

Hycleus distincta Escal., Trab. Mus. Nac. Madr. 1914, p. 400.

ab. *sicula* Baudi

Corina distincta var. *sicula* Baudi, l. c.

Zonabris (Hycl.) distincta var. *sicula* Reitt. l. c. —
Calw. l. c.

ab. γ Sum.

Mylabris (Cor.) bilbergi ab. γ Sum. l. c., p. 67.

Coryna distincta s. sp. *hafidi* Pic, L'Ech. XXXII, n.
374, 1916, p. 7.

ab. *beccariana* Pic

Corina distincta var. *beccariana* Pic, l. c.

ab. *andalusica* Pic

Corina distincta var. *andalusica* Pic, ibid.

ab. *galloisi* Pic

Corina distincta var. *galloisi* Pic, ibid.

Hab.: Sicilia, ? Corsica; Marocco (Melilla, Tanger, Mar-
raquesh, Glaiu, Haha, Imi-n'Tanut, Larache) Algeria (Char-
daia, Biskra, Saïda, Yakouren); ? Syria.

16. ***septempunctatus*** Baudi, 1878.

Coryna septempunctata Baudi, Atti Torino XIII, 1878,
p. 1059.

Mylabris (Cor.) septempunctata Beur. l. c., p. 536. —
Sum. l. c.

Hab.: Algeria (Biskra).

17. ***dolens*** Mrs. 1871.

Coryna dolens Mrs., L'Ab. 1871, p. 417.

Mylabris (Cor.) dolens Sum. l. c., p. 67.

Hab.: Algeria.

18. ***caudaluteus*** Pic, 1930.

Coryna caudalutea Pic, l'Ech. XLVI, n. 439, 1930, p. 1.

Hab.: Palaestina (Jerichon).

19. ***contaminatus*** Ab.-Perr. 1880.

Coryna contaminata Ab.-Perr. l. c., p. 236.

Mylabris (Cor.) contaminata Beur. l. c., p. 525.

Hab.: Syria.

20. ***cauda-niger*** Ab.-Perr. 1880.

Coryna cauda-nigra Ab.-Perr., Bull. Toulouse XIV,
1880, p. 237.

Mylabris (Cor.) cauda-nigra Beaur. l. c., p. 523.

Hab.: Syria.

21. *ocellaris* Ol. 1795.

Cerocoma ocellaris Ol., Ent. III, 1795, p. 6, n. 3, tb. I, f. 7.

Hycleus ocellatus Lap.-Cast., Hist. nat. ins. II, 1840, p. 267, n. 2.

Coryna pavonina Reiche, Ann. S. E. Fr. 1865, p. 628, n. 2. — Gemm. et Har. l. c., p. 2133.

Coryna ocellaris Mrs., L'Ab., p. 180; Mon. 1872, p. 238. n. 1, tb. VI, III, f. 1. — Baudi, l. c.

Mylabris (Cor.) ocellaris Beaur. l. c., p. 522. — Sum. l. c. p. 68; ibid. ab. α (= var. *multijuncta* Pic).

ab. *multijuncta* Pic

Corina ocellaris var. *multijuncta* Pic, L'Ech. XXIV, 1908, p. 34.

Hab.: Senegal, Aegyptus.

22. *argentatus* F. 1792.

Mylabris argentata F., Ent. syst. II, 1792, p. 90, n. 12; Syst. Eleut. II, 1801, p. 85, n. 22.

Cerocoma ocellata Ol., Enc. meth. VIII, 1811, p. 397, n. 4.

Coryna argentata Bilb., Mon. Myl. 1813, p. 73. — Reiche, l. c., n. 1. — Mrs., L'Ab., p. 181; Mon. 1872, p. 238. n. 2, tb. VI^{III}, f. 2. — Baudi, l. c.

Mylabris argentata Schh., Syn. ins. III, 1817, p. 42, n. 61.

Hycleus argentatus Lap.-Cast. l. c., n. 1.

Mylabris (Cor.) argentata Beaur., l. c., p. 521. — Sum. l. c., p. 69; ibid. ab.: α , β (= var. *caroli* Pic) et γ (= var. *externepunctata* Pic).

Coryna semiocellata Mot. in litt.

ab. *caroli* Pic

Coryna argentata var. *caroli* Pic, L'Ech. XXIV, 1908, p. 34.

ab. *externepunctata* Pic

Coryna argentata var. *externepunctata* Pic, ibid. (nom. praeocc.).

Hab.: Senegal, Benguela, Aegyptus super., Abyssinia; Arabia (Oboc).

IV. Gen. **Sitaromorpha** Dokh. 1899.

Sitaromorpha Dokh., Hor. S. E. Ross. XXIV, 1889, p. 190.

wilkinsi Dokh. 1889.

Sitaromorpha wilkinsi Dokh. l. c., pp. 190—191. —
Heyd., Cat. Col. Sib., Nacht. I, 1893, p. 133.

Hab.: Turkestan.

Table alphabétique

des genres, des espèces, des sous-espèces et des morphes.

<p><i>abdelcaderi</i> Escal. 42</p> <p><i>abiadensis</i> Mrs. 87</p> <p><i>aegyptiaca</i> Mrs. 77</p> <p><i>aestuans</i> Klg. 93</p> <p><i>aini</i> Pic 76</p> <p><i>albilanea</i> Bed. 100</p> <p><i>alepensis</i> Pic 99</p> <p><i>allardi</i> Mrs. 85</p> <p><i>amoenula</i> Mén. 84</p> <p><i>amori</i> Graëll. 41</p> <p><i>andresi</i> Pic 85</p> <p><i>apicipennis</i> Reiche 59</p> <p><i>arabica</i> Pall. 92</p> <p><i>argentatus</i> F. 110</p> <p><i>argentifera</i> Pic 102</p> <p><i>atrata</i> Pall. 65</p> <p><i>atrata mediomaculata</i> Sum. 66</p> <p><i>atrata metatarsalis</i> Mrs. 66</p> <p><i>atrofasciata</i> Pic 44</p> <p><i>audounii</i> Mrs. 86</p> <p><i>aulica</i> Mén. 57</p> <p><i>aurociliata</i> Eschr. 79</p> <p><i>axillaris</i> Bilb. 31</p> <p><i>batnensis</i> Mrs. 79</p> <p><i>beckeri</i> Eschr. 25</p> <p><i>bedeli</i> Bleuse 100</p> <p><i>bilbergi</i> Gyll. 107</p> <p><i>bimaculata</i> Klg. 58</p> <p><i>bipartita</i> Mrs. 91</p> <p><i>birecurvus</i> Mrs. 104</p> <p><i>bivulnera</i> Pall. 16</p> <p><i>boghariensis</i> Fairm. 84</p> <p><i>m. bosnica</i> Rtt. 31</p> <p><i>breviapicalis</i> Pic 51</p> <p><i>brevicollis</i> Baudi 74</p> <p><i>brevicornis</i> Mot. 8</p> <p><i>brunnipes</i> Klg. 78</p> <p><i>calida</i> Pall. 49</p> <p><i>Calydus</i> Rtt. 4</p> <p><i>caudalutens</i> Pic 109</p> <p><i>cauda-niger</i> Ab.-Perr. 109</p> <p><i>Ceroctis</i> Mrs. 103</p> <p><i>chinensis</i> Friv. 11</p> <p><i>chudeani</i> Bed. 87</p> <p><i>cichorii</i> L. 88</p> <p><i>ciliciensis</i> Eschr. 40</p> <p><i>cincta</i> Ol. 46</p> <p><i>cincta schrenki</i> Gebl. 48</p> <p><i>cingulata</i> Fald. 58</p> <p><i>circumflexa</i> Chvr. 97</p> <p><i>coeruleomaculata</i> Redt. 102</p>	<p><i>coerulescens</i> Gebl. 7</p> <p><i>colligata</i> Redt. 58</p> <p><i>concinna</i> Mrs. 74</p> <p><i>concolor</i> Mrs. 19</p> <p><i>m. confluens</i> Fisch.-W. 13</p> <p><i>confluens</i> Redt. 105</p> <p><i>contaminatus</i> Ab.-Perr. 109</p> <p><i>coronata</i> Mrs. 104</p> <p><i>corynoides</i> Reiche 103</p> <p><i>crocata</i> Pall. 55</p> <p><i>cruentata</i> Klg. 91</p> <p><i>m. cruz</i> Eschr. 26</p> <p><i>curticornis</i> Pic 73</p> <p><i>cyaneovaria</i> Rtt. 9</p> <p><i>m. cyanescens</i> Rosenh. 74</p> <p><i>m. dagestanica</i> Sum. 18</p> <p><i>m. dahl</i> Mén. 66</p> <p><i>dejeani</i> Gyll. 19</p> <p><i>delarouzei</i> 94</p> <p><i>denticulatus</i> Mrs. 105</p> <p><i>denticulatus seturiferus</i> Pic. 105</p> <p><i>m. deserta</i> Sum. 13</p> <p><i>distinctus</i> Chvr. 108</p> <p><i>diversepunctata</i> Pic 46</p> <p><i>diversesignata</i> Pic 27</p> <p><i>diversipilis</i> Sum. 74</p> <p><i>diversithorax</i> Pic 100</p> <p><i>dolens</i> Mrs. 109</p> <p><i>doriae</i> Mrs. 5</p> <p><i>dubiosa</i> Mrs. 92</p> <p><i>dufourii</i> Graëll. 69</p> <p><i>duodecimmaculata</i> Ol. 101</p> <p><i>duodecimpunctata</i> Ol. 73</p> <p><i>elegans</i> Ol. 85</p> <p><i>elegantissima</i> Zubk. 84</p> <p><i>m. emiliae</i> Eschr. 37</p> <p><i>escherichi</i> Rtt. 4</p> <p><i>m. euphratica</i> Mrs. 72</p> <p><i>m. excisofasciata</i> Heyd. 52</p> <p><i>externepunctata</i> Fald. 18</p> <p><i>fabricii</i> Sum. 53</p> <p><i>fabricii signata</i> Mrs. 55</p> <p><i>femorata</i> Klg. 92</p> <p><i>festiva</i> Pall. 10</p> <p><i>filicornis</i> Mrs. 60</p> <p><i>fimbriata</i> Mrs. 79</p> <p><i>fischeri</i> Gebl. 93</p> <p><i>flavipennis</i> Mot. 18</p> <p><i>flexuosa</i> Ol. 28</p> <p><i>flexuosa abrupta</i> Sum. 29</p> <p><i>flexuosa alpina</i> Mén. 29</p>
--	--

<i>flexuosa apicefasciata</i> Sum.	29	<i>macilenta</i> Mrs.	87
<i>flexuosa furcimacula</i> Sum.	29	<i>maculiventris</i> Klg.	90
<i>formosa</i> Well.	11	<i>madani</i> Escal.	40
<i>frolovi</i> Germ.	12	<i>madoni</i> Mrs.	76
<i>frolovi aliensis</i> Kus.	14	<i>maelaini</i> Escal.	77
<i>frolovi androsovi</i> Sum.	13	<i>magnoguttata</i> Heyd.	51
<i>frolovi kopalensis</i> Sum.	13	<i>mannerheimi</i> Gebl.	25
<i>frolovi shapinskyi</i> Kus.	13	<i>marginata</i> Fisch.-W.	6
<i>frolovi syr-darjensis</i> Sum.	13	<i>mediobipunctata</i> Pic	73
<i>frolovi staudingeri</i> Heyd.	14	<i>mediofasciata</i> Pic	75
<i>fulgurita</i> Reiche	100	<i>mediozigzaga</i> Pic	84
<i>fusca</i> Ol.	70	<i>modesta</i> Eschr.	41
<i>fuscicornis</i> Drap.	101	<i>mohtari</i> Escal.	42
<i>geminata</i> F.	21	<i>mongolica</i> Dokh.	9
<i>geminata kushakevitshi</i> Dokh.	24	<i>m. monozoma</i> Well.	16
<i>geminata pauper</i> Eschr.	24	<i>munda</i> Eschr.	5
<i>geminata sibirica</i> Fisch.-W.	23	<i>Mylabris</i> F.	4
<i>gilvipes</i> Chvr.	97	<i>mylabroides</i> Lap.-Cast.	16
<i>goryi</i> Mrs.	94	<i>myrmidon</i> Mrs.	87
<i>gratiosa</i> Mrs.	83	<i>neglecta</i> Eschr.	25
<i>m. guerini</i> Chvr.	39	<i>nigribasis</i> Escal.	76
<i>m. hauseri</i> Eschr.	24	<i>nigriplantis</i> Klg.	101
<i>hemprichi</i> Klg.	5	<i>novemdecimpunctata</i> Ol.	101
<i>heteroclita</i> Pic	77	<i>nubica</i> Mrs.	92
<i>heydeniana</i> Dokh.	51	<i>ocellaris</i> Ol.	110
<i>hieracii</i> Graëll.	11	<i>ocellata</i> Pall.	81
<i>hirtipennis</i> Raffr.	75	<i>octodecimmaculata</i> Mrs.	85
<i>huseini</i> Redt.	58	<i>m. octonotata</i> Fisch.-W.	82
<i>Hycleus</i> Latr.	104	<i>oleae</i> Lap.-Cast.	42
<i>igneopubescens</i> Escal.	78	<i>olivieri</i> Bilb.	26
<i>impedita</i> Heyd.	82	<i>omocrates</i> Well.	48
<i>imprensa</i> Chvr.	56	<i>ornatus</i> Reiche	107
<i>impressithorax</i> Pic	75	<i>orniticollis</i> Eschr.	4
<i>m. incertepunctata</i> Sum.	55	<i>ottomanus</i> Eschr.	105
<i>inculta</i> Eschr.	41	<i>pallidomaculata</i> Redt.	86
<i>infasciculata</i> Pic	91	<i>parumpicta</i> Heyd.	40
<i>m. intermedia</i> Fisch.-W.	13	<i>m. paykulli</i> Bilb.	96
<i>interrupta</i> Ol.	46	<i>pentheri</i> Gangl.	25
<i>isis</i> Mrs.	7	<i>peyerimhoffi</i> Pic	61
<i>italica</i> Sum.	28	<i>peyroni</i> Reiche	108
<i>japonica</i> Sum.	88	<i>phalerata</i> Pall.	89
<i>javeti</i> Mrs.	57	<i>plagiella</i> Escal.	75
<i>m. karateginensis</i> Sum.	65	<i>plurivulnera</i> Dohrn.	17
<i>karačævica</i> Rub.	30	<i>polymorpha</i> Pall.	61
<i>königi</i> Dokh.	12	<i>polymorpha biguttata</i> Gebl.	64
<i>m. korbi</i> Eschr.	42	<i>polymorpha regeli</i> Sum.	65
<i>kraatzii</i> Heyd.	102	<i>polymorpha zebraea</i> Mrs.	64
<i>m. kurdistanica</i> Pic	73	<i>postbilunata</i> Pic	73
<i>kuschensis</i> Pic	52	<i>m. posticalis</i> Dokh.	51
<i>lactea</i> Mrs.	93	<i>posticata</i> Fairm.	71
<i>laevicollis</i> Mrs.	30	<i>præusta</i> F.	60
<i>latus</i> Reiche	105	<i>przewalskii</i> Dokh.	87
<i>laticollis</i> Eschr.	83	<i>pulchella</i> Fald.	7
<i>ledebouri</i> Gebl.	9	<i>pulcher</i> Rtt.	4
<i>lichtensteini</i> Rosenh.	76	<i>punctofasciata</i> Fairm.	83
<i>ligata</i> Mrs.	91	<i>pusilla</i> Ol.	30
<i>liputana</i> Eschr.	31	<i>pustulata</i> Thnb.	90
<i>litigiosa</i> Chvr.	97	<i>quadripunctata</i> L.	34
<i>m. longipilis</i> Pic	45	<i>quadripunctata angustata</i> Sum.	38
<i>lucens</i> Eschr.	14	<i>quadripunctata apicenigra</i> Sum.	38

<i>quadripunctata dokhturovi</i> Eschr.	38	<i>solonica humerosa</i> Eschr.	67
<i>quadripunctata restricta</i> Mot.	39	<i>souberoni</i> Pic	44
<i>quadripunctata tricincta</i> Chr.	39	<i>speciosa</i> Pall.	8
<i>quadrisignata</i> Fisch.-W.	17	<i>m. speciosoides</i> Sum.	10
<i>quadrizonata</i> Fairm.	97	<i>splendidula</i> Pall.	14
<i>quatuordecimpunctata</i> Pall.	67	<i>steppensis</i> Dokh.	40
<i>quatuordec. chodshentica</i> Ball.	69	<i>subparallela</i> Pic	71
<i>quatuordecimmaculata</i> Dokh.	80	<i>sumakovi</i> Pic	53
<i>quatuordecimsignata</i> Mrs.	80	<i>m. suturalis</i> Pic	45
<i>m. quindecimpunctata</i> Sum.	81	<i>syriaca</i> Klg.	45
<i>ragusae</i> Pic	75	<i>tachari</i> Escal.	40
<i>raphaël</i> Mrs.	78	<i>talyshensis</i> Sum.	66
<i>reitteri</i> Dokh.	48	<i>tarbagatajensis</i> Pic	26
<i>rotrovi</i> Pic	106	<i>tauricola</i> Mrs.	41
<i>rubricollis</i> Mrs.	107	<i>tekkensis</i> Heyd.	78
<i>ruficornis</i> F.	77	<i>tenebrosa</i> Lap.-Cast.	44
<i>rufipalpis</i> Escal.	78	<i>tenuipicta</i> Fairm.	7
<i>rugosissima</i> Pic	93	<i>terminata</i> Ill.	91
<i>saharica</i> Chob.	76	<i>theryi</i> Ab.-Perr.	85
<i>sairamensis</i> Ball.	7	<i>theresae</i> Pic.	104
<i>sanguinolenta</i> Ol.	95	<i>tigrina</i> Klg.	106
<i>scabiosae</i> Ol.	71	<i>tigrinipennis</i> Latr.	99
<i>scabrata</i> Klg.	101	<i>tigripennis</i> Mrs.	86
<i>schoenherr</i> Bilb.	88	<i>tlemceni</i> Pic	48
<i>schreibersi</i> Reiche	40	<i>tomentosa</i> Eschr.	19
<i>scutellata</i> Rosenh.	21	<i>triangulifera</i> Heyd.	58
<i>sedecimpunctata</i> Gebl.	80	<i>trifascis</i> Pall.	6
<i>sedecimpunctata klugi</i> Redt.	81	<i>tristis</i> Reiche	91
<i>sedilethorax</i> Sum.	18	<i>uhagoni</i> Mart.	11
<i>sefrensis</i> Pic	106	<i>undecimnotata</i> Heyd.	25
<i>semenovi</i> Eschr.	4	<i>undecimn. turkestanica</i> Dokh.	26
<i>semifasciata</i> Pic	85	<i>undecimpunctata</i> Fisch.-W.	79
<i>septempunctatus</i> Baudi	109	<i>unicolor</i> Fald.	18
<i>serena</i> Eschr.	19	<i>varia</i> Ol.	88
<i>sexmaculata</i> Ol.	59	<i>variabilis</i> Pall.	31
<i>sexnotata</i> Redt.	28	<i>varians</i> Pyll.	20
<i>shah</i> Reiche	90	<i>vaucheri</i> Escal.	76
<i>silbermanni</i> Shvr.	72	<i>vigintipunctata</i> Ol.	100
<i>sinuata</i> Klg.	27	<i>wagneri</i> Chr.	61
<i>sisymbrii</i> Klg.	87	<i>wartmanni</i> Pic.	94
<i>Sitaromorpha</i> Dokh.	111	<i>m. wilkinsi</i> Dokh.	81
<i>smaragdina</i> Gebl.	102	<i>wilkinsi</i> Dokh.	111
<i>sobrina</i> Graëll.	27	<i>yerburi</i> Gah.	104
<i>solonica</i> Pall.	67	<i>zoufali</i> Rtt.	66

ESTICA

A-13415

6.

i21931926