Direktions-
Zimmer.
X
895,

Ludi Scheidegger Thuring. myp.
Burgers.

ICONES STIRPIUM

IO. Kentmani: quas

Con. Gesnero communicauit, ad eiꝰ exemplar depictas

Zumal der Churfürstlichen stadt Torgaw medicus,

1561.

Conradꝰ Gesnerꝰ Tigurinus. bibliopola. 1561. ann. nat. 48.

1563. Marcio ad me scribit ex Augusta ex domo accepi,

et respondi.

Pictoris errata. 4 fol. 76. ne amoveas.

Tigurini Cal. 1564. Septembris 5

1565 Junio.

impressa (S. Gesn.

BIBLIOTH:
ACADEM:
DORPAT.

K. 1. 1.

Palma major



Ad condenda scripta historica
quorum e communicarunt

A.
Egidij Tschudy.

D.
Didymy Obsopoei Argentinen
doctoris.

H.
Hieronymi Wolfij Lauingani.

M

Q.

V.
Vlysses Aldrouandi Tybis
ad Zoo. amicè mis.
et suæ figulæ iudicio

R.

E.

Antonij Schmeltzeij
missis quibusd. e Polonia.

Ionby Mosellan.
d. Io. Cogelij.

S.

I.
Io. Kentmanni q. cum
hoc nomine vixit.
Io. Thomæ Scriba
medici Wormiacij
Io. Fabricij Cuneij missus
Isaac Keller cl. Basilien.

F

Sebastiani Horcia Schi Elij
pharmacopolæ Tigurij
m. Seb. Fabricij.
Scripta Gesneri
et alia missa de q. alib.

Felix platerus.

N

Lac. Dalechampij
e medio unodo, m
nominatus
quidē multi.
Io. Bauhini.
Iac. Gumaeri.
Iac. Zuinalij.
Io. Portesalla.
Iac. Antonij Cortesij.
Ioach. Strecchij
pharmacopolæ Tergesti.

B.
Balthasar Hummel phar
macopola Brasilien.
Bernd. Mayr
Arabij.

posuimus
d. Gaspare Lindemayr medici
Guil. Quarantani.

O

Ge. Æmylij.
Ge. Sigismundi Alcmari
macopola Augustæ
Videlicet
Ge. Clausneri.

L

Laurentij Jonbertus
Professor [illegible] Mospelij. Rotomagi d. Rodolphi.
1564. mihi ad me scripsit
aliqui ep.
d. Laurentij Hiel medici
Antwerp.

T.
Theodori Zwingeri
Thobiae Egli.

Thomas Jordanus
Med. natus Vngarica
communicauit
Crationem.

Q.
Caspar Wolfij
Caspar Collinus Vallesianus. Helv.
Christophorus Pipinus Vesti
minister in Sigriswyl.

Con. Forerus plurimum
tibi amice salutat.

P.

Petrus Bellonius.
Petrus Boaistuau Armoricus
non. pharmacopeus.
Petrus Figulus Lutherus.
Petrus Coldenstein.

Valerandi Dorneci in Belgia
Adolphi Mennerus.

Thomas circa
Mospelium
studiosus
babui

1. Ipse collegit anno 41.
2. ab Isaaco Kellero
3. à Balthasare pharma
copola
4. à Forero.
5. à d. Wolfio.
6. à d. Boaistuano plurima
7. à d. Fr. Valesio.
8. à Valerando.

Iunctim primum verbis nec missarum libr
alijs mirifice ex facultatibus communicamus
alij.

Alij libri adhuc sunt penes Valerandum Dornecium
Lovanij morantem.

x Professore illo Mospelio Ionby.

palma elata.

Ἐλάτη I. 8. K.

Misit ex Io. Cæius unà cũ
spatha & semine seorsim
positis. omnino est oasis, ut
descripsimus Caij et Konmanni
ostendũt licet figura. qꝑ ad folia
convincat exorta videatur manifesta.


ein Unkraut im
hirs3 allen meist.
Semina pro lac
mycro. Villica
mea nom.

V:220 /.

Tulipa Turcica semina misit Clusius, lanceolata, rubra, similia seminib. pseudoasphodeli nostri. / Ipse Sarganio triphyllon esse ait.

V. et effer. cu Tulipa rubra, quæ Augustæ vidi: Clusio tb. folijs, flore nubeo etc.

Similis e flos colore et figura, quæ hyacinthi duplicis, q Neapoli nomine missa d. Ulrich Fuggero 1566. sed tamen in plurimis differens. similis potius q ista asphodelo q segq in f. 12. b. 1. ord.

an Sarganio triphyllo et erythrico subdam et ut memoravabo salvo

+ Italica e Nemesio hanc inf. 108. b. similibus floribus sed

est caudæ platicæ

q lanceis folijs et flore.

Similes huic 3r. b. minores, Plenus cum ut hermodactyli.

Tulipa lanceo semine Rasij missa. q marginibus non parum cum nativos, quæ dehiscens, lanugine intus obsidet intus nitentem.

Similis huic e nascula Italiæ oriundi nostri.

Tulipa Turcis K. 1. 16. Cognovere vide 2. 40. K. pingit hgr et infra folio 124. sed minus palpabé. V. Spes Narcissi forte! V. inf. 133. b.

124. vide.

Semi Sena folia esse dobet pue.

Omnia cum bulbosum folia Cæ appiò dicus bulbos hui Cnæ Anemonas et huius modi, excipio sex folia in flore hui: calyce nullo pterygijs: codiamine uerui hc calyce

Tulipa flos alia Cognomine nimis pscorpio vulgaris

Tulipa flos alia

Tulipa flos alia

Tulipa flos alia

Aspalathus K. 1. 46.



Cedrꝰ maior (sm Libani i. cedrelata
plinij) sola Cdemptu abiete conos in
coelu tendit, etc. abiegne sit. dumtaxat
crassiores et multò maiores, Bellonij.
Larix hæc nr fruticꝰ cedrꝰ illa, qua
ps gnia de Coniferæ arboribꝰ pagina
ps. b. — Larix nihil pdest,
nisi coni grandiores essent, et
pleumli e qbꝰ cpdentur, togiores, et
in Lunica nostra tortuosa tunica sit.

+ Dio fruticꝰ ist. unt
in G.

Cedrus K. i. 3.
v. ne Larix. cognata falta

Entlirbe blettle sind etwas
zbuett, vñ zlünzel gspitzt.

Lignū hoc ex America
et cedro accepi Coldato 87.

v. an omnes in se Cedrus
Germanica condant
de vnguentis.

est. simil magis ex sabacus
pro vnguentis
thus ubertas













Glaux K. 147.
alia ē Glauce vel Onobrychis Dodonæi.

♃ Polygalis cognata
mihi pro sua non
similis, sed
duplici aut triplici semine
posteriori sibi nō in illis similia.

sine pūto auriculatæ
siliquæ
ovibi

Semen lente minus
albicans insipidum
comm

undæ ex

calaci nulla &c.

Bifolobæ dyeris, quæ
lobis ... ovi valvidisca ...

ex platea qm D. Amplis. vel me
misit, Leucoidis Germanis nominis non
ex semine pudica. cognita, si bene
frimgea ... sylvæ pumpum ... appetit
subdatis ... Glaux in pabulo minus apposita.

Anagallidem sui
Glaucē in locis descriptis.

V. alia Buphthalmū in E. pmo. cap. 7

Chrysanthemon
Buphthalmy poēt. ex Serapi in mais 194. a. ad *

V. Chrysanth. Dod. Corbmill.

V. quæ scripsi 79. *

Chrysanthemū alterū minimis flōribus

Wirt 3. elnbogen hoch wens stirbt & ist ain dem sam bitter.

Semen tantū facit amarissimū. Cibis nō nocet

Cibus nō nocet frumentū olet ut buphthalmi. 1 amaro valde similis olet nec lactucæ semen

Anglice Goulds vel golds

V. 79. sequentis scripti.

In horto habui a. 58. Aug. missū, foliis sonchinis, cubia nō ē latis: nec flores multi. Semē ē amarissimū, in flore et foliis nulla sine minima ē amaritudo. Cū

Cū corolla pistillū aliqd Cōmune habet.

Rami cū floribus multis pingit in mais alio libro 194. a. das andre.

Anglice Goulds marigolds

Anglice Goulds wirtz wurtz in Brigl gesetzt. 19.

Herba repressa Rom. — v. an Bellis polium
folia hī bellidis maiora &c
flores ... bellis
lutea: m bellis
minora lunae dici
videri possit.
v. in Tragio 143.

A. 55. cognomen
eruca sylvestris illi
usum spirandi vel
sesamoidi in
dicto.



Helleborina
K. 1. 20.

An helleb. niger, sed à nostro diversus,
in caule flores tantum sustinens, nec folia:
ut d. Dmy de vero helleb. nigro mihi narrabat.
differre tamen colore.

Nulli hactenus simile pingi
alia ab hac
Tabernæ flores
in P. 155.



K. 1. 9.

Aconitum . parvo flore
Die Gmain wyllo Eblysblume.
Hideuische in Bernen.— motib, foris,
calyce nullo, floribus parvis
foliis platani.
in Schuppe mit nacht.
folio flos mainsicht.



Narcissus. ne[?] species leucoii Theophrasti porro.

K. 1. 12.



V. 129. b.

folia et radices nihil omnino fere differunt
ab hyacintho supra posito.

Hyacinthus.

K. 1. 13. num die blü[?]
das Fein und roter[?]
wie das 12.

Gefüllt weyß meergenblümer[?]
Leucoion Theophrasti multiplici flore[?]

Narcissi
odoratissi flower.



Alij lunaj & in maio i comitij

Asphodelo
1.95.

*nodus pro pistillo *.

Fibrae grum.

A D. Vldarico Fugg. accepi pistā
Hyacinthi duplicis Constantinopolitani
nomine — Flore foliis serna &c.
et in medio capitis [illegible] viridē
lunei, & serna vocat. (similis
foliis & flos tulipę sed
Caespes a radice valde foliosus
& oblongus et paterę crebrius intactibus
foliis. Ea caules noui exorientes à ca-
dicę tuspi semicadam et plenā vestiente
foliis similes &c. Alioq radix hui
&c. fibris plurimis longis ad lus bulbis
* barbę instar descendit *

v. 274.
v. infra 20.

1.96.

Asphodely alia, foliis ex radicibus nihil
fere à priorib (è regione) differens.

Floribus & spicarum ipsis phalangii
nostri similis &c.

pinxi puer in mais.

Quere in f. in 4) 230.

Asphodelus albus d.
Fuchsij a Sisyrinchi
Dioscoridis.



14

145

Die beid mag man wyssen
zů andern indianischen früchten.

Semen Fasiculus est Guanabani fructus pisi in maris 354. Tenebimby.

Pisum indicū nō pharbitis.

fructus qda
Indici vocatur
Coldeberg, cū multo pinguni et dulci
ingo, nō primitus huc.

Folliculi 617 pisi
in maris 404.

G



Sphera de cabal. (Lunariis pē adnumerat)
1. 85.
Frutex cānus in Hortis nostris. Medica cognata ḡbusq.
Vide ē omithopodio
Vide ē ornithopodio nām, cui odor lactis fauo.
Vinsau 67. b.

Hippoſideros
no cvis.

1 5 7 1. in horto habui gemellis
floſculis, et ſiliquis puto ſemp
gemellis, et foliolis omnino binis,
ouatis
ſapore.
floruhat et ſiliquas ſimū oſtendebat
primū Iunii
folioſo uno, cubitali, iacente.

In monte Balcua plan
coſimile innem. Sed ſiliqua
magis erua inmuſte, et
Semper in ramoſis extremis
T. P. A. 1.
J. Clusius

Sieh auch nicht im K.

Myrtus.
1.100.

M. So nun ein
ästig Stauden.



G

V. inf. sl. b.

folia Cyc. non Gabon fibros
in tubobum

Cinarrhodos mit distichis foliis. ea nidrat Rhus Plinii, herba Sylvestris, q̃ nonnulli ea nominant.

Trifolia spinosa. Cacalos=i. ? liber Fuchsii. mihi siccus
gestum non vise ē cacalos.

v. fol. 178.

1. 83.

capitulū hirsutum.

folia in medio fuscē
rubra cospersa.

Ægilops.

1. 84.

v. Bruntion Dodō. Belgici.

Ægilops matth.

hāc ex Bauhino
Ægilops prima. descr. ? /m
Cordus.

18

Eryngium.
2. 11.



Nux indica.

Cocos.







Eryngium cum caule, nullis à radice foliis: capitula radicis foroso.

Vide è regione.


Eryngio primi anni, sine caule: multis à radice foliis: q caule excrescente ferè ad duas vlnas
Radix dulcis, alba, pastinacæ ferè odore saporis.
Vide à vngione.

Vintra Sq. b.
Corinp-Angmllarp.

Scorilon vulgò in Italia. pseudosiliqua.
vide an Bunias foliosa Lin.
Siliqua illa pumicea arboris inominatæ ex Mospelio.
Apoig
Arbor Indiæ pruni quibusdam
Græcis in cenariis K. 1 nomis

Cürb im G.
die frucht.

v. 117. 209.



v. 274 /

v. supra. 12. /

205

Asphodelus alter.

Asphodelus mas huius generis in horum M. Eiguti, hi flores q̃z singuli sesno hinc folia: et apicem/ bores, cū uno ꝑ medio recremento sine capitulo: calyce nullo. pars media in foliis/ spicis nixa. flos

Duo bulbi sub terra gemelli.

Iacet bulbi vi. bulbuli, p̃ quos ei bulbosis annuis fere

v. Dod in coronaria

Similis pleriq̃ musis d. Ulde. Fuggeri. fert radicibus obtusis, nō bulbosis, in Cramen

in peonia mare. (Quo hinc formam in hac & asphodeli specie fecerim: alterum mare: sicut et peonia distinxi. radicis maximam figuram (et ova.)

94

89
215

Sive q[uod] reliqui putat, caps. poliq Scorpioidis puto. / V. matt. Scorp.

mala descriptio.

Oxyzoa.

1. 88.

~~Lōgè alia oxyzoa Matthioli e placet.~~

Scorpioides Matthioli puto / sed ejq
siliqua inflata cinerea gracile. misit
mihi Aldrov. alio nomine pō.



22





Bellis ramulosa, à D. Axelli missa Germa 1505.

f

Lachryma Lob.
1. 97.

Vide Dodonæi icones in aggluti-
nato huius folio.



Caule striato quadro
et folia.

23

57

230

V. matth.

Tribulo Leuesteis I. 57.
(Vt spizi absi.





Gyn. dorso ros. proueni imagine copia
T. P.

di pagina Ius eare, vel elfe eare, quia ad auriculæ humanæ formā crescit.
T P.

Auricula Elfe eare, vel Ius eare, ad quarundam inflammationes efficax.
In Septentrionali parte frequēs, inde ...
T. P. sculp.

Ad historiā Sambuci.

Fungi Sambuci: missus à d. Alberto Spaine

Ein schöner Baum grossen Holderschwämm.



Ab hac una hac parua adhuc quinobas insunt pilei parui magnitudine.

245 52

Medica — e regione maior f. 1

1.52.

M. 0.

Sata in horto meo germin., floruit 2° dem anno, mense Iunio f. et Iulio. floribus violaceis.

Nascit. circa Lutetiam sponte.

Nascitur etiam spicata et copiose in agro Aurelian. f. T. f.

Vide an eadem sit quae hic vegetat, floribus flavis. nec similiter pure succulosa est, similibus foliis, et saponem coquit.

Syn. cognata T. p.

Dum semen hic das videri bonum Medica mea caerulea // semina ej.

align flowers in corymbis et multo plures vegetat



Dioſpyros.
1. 87. Arn albis.

Sorbus pauua montana.
S. tobãs bitte puo cirom
Ehrbiren Beumenſtz.





Artemisia leptophylla pauc.
Vide in G. 73. 107. 190.
et 141. b. c. radix —

G

2 · 6.

Laudg montana. Valerianę species nidat, flore, caule et foliis ferè. radice verò diuersa differt.

V. matth.

2 · 9.



in Hispania nascit in rupibus. virui Plinij pellitorij.

in rabidę foliis, plu... inginę f. in mo... Branchis: sed m... tali radice.

Lycopsis.
1. 30.



28

285

Myagrum K. 1. 5. — accepit ab Aloysio Ram. stirpium.
Cognata videtur Lunaria
a pagina infra pag. 80. floribus spicatis
et foliis solidis.

V. ne forma delphinii,
flore purpureo, siliquis
foliis accretis
delphini instar:
est mihi incognita
cui dioscoridis si mihi
quidem recte
ἀγριόλαχανον ἀγρία τετράπλευρα
ἀγριόλαχανον, (Theophrasto, Candida, Marcell.)
ἀγριόλαχανον, Sed ἀγριόλαχανον dū.

Cui rectius videatur esse
Barbarea dicenda

Eiusdem in Saxonia
hyemat, et fuit frustra,
a Sfygio destructa omnis subpos
ἀγριόλαχανον saporem acrimoniam
hyt. Bellonii.

et marina sic incanuit
cum Bellonio: videtur
hyt incanuisse delphinio
reserue. Sc. in Delphinio.

Sec. K. spi. minus ficto.

Vidi viola à praecepe dicta nobis cognata
(ro mihi lino, ut Aloysii primum
scribere K.
in Lancoin Turri
(à mense 9 flores
in calino.

* non ut simp. sic retusa

K. 1. 34



Der stengel was im exemplar an einm besunderen blatt, vnd x. finger lang, C̃ finger minder dann ein span.) Das Eum ist der grösse wie im exemplar.

Soll abgehowen syn, die lenge anzůzeigen.

K. 1. 44.

Hemerocallis.

Lilium maximum. Cl. 1. 44. 22 et infra 1 44.

Mopelii pracuratpurat.

habes x puncto tegmen et filigr. — Regel.

Bulbi lirvcales theophr. pharmacopolis vulgò hinc Squilla minora. hos magis qdo Hemerocallidis ejus

Nº. *

convenit haec satis cum cobais Ollingeriani p. 593.

Bulbine theophrasti 1. 38.
an spes minor mas. an folia et planta.



An Viola ~~Calathiana~~ maviana Dod. v in covenantia/
forte puto.

K. 1. 21. Medium Boronig uocant. et 1. 22.

In Kermanī libus duę eiusdē figurę flore diuersę colore differentes.

multo dilutior et obscurior in colore in Kermanī libus, florib (ut gūcid) flaccescēt.

Ego mihi vidi floribus luteis vel cęruleis.

applicà depicta essencia
Cera viridi sul piatt. — forma tabij plante viola — vocat
noce viola mariana —

32





nõ est ♀ — Laurus Alexandrina. K. 1. 19.
T P

an Laurocerasus circa Lauretum? ♀ est — habes flores — Cas.



33

335

Eq. Corydalis Galeni sed mas. spicata. / Vis matt. vbi mihi sepissime
Gli. Split vocat. T. D. Anglus /

Lo 87
Rondy, vulgare nica aristolochia rot.a
Split puto. omnino.

Capnos phuagmites K. 135.
Habeo et alibi ex arida pictu. minutiorem, ac
rotundioribus foliis, an species duæ videant. 181 ♄

Sicca B. multum sodit.
Mihi pingi petenti (radice non placuit)
Ait nasci ppe Lucarnam
Floruit Maij p.o.

34

48

345

plumier K. 1. 48.



35



Dens canis. Est & infra, fol. 133. sed decentius pictus.

K. 1. 17.

Vide Alpinum b. 119. et 120.
ubi Haemodactylus vocat hanc plantam, et
observat duas species affixit,
unam diphyllon, alteram mono-
phyllon: misi foure plantas tum
differunt. (folios pedes
radices seu bulbos & obl
albos, muricatos, dulcis, et
maiores. Bulbi sylvestres
puro.

Haemodactylus
Mesuę, foliis maculosis,
in horto Kentishij
sed semen nullum dedit.

Vide Haemodactylo mas
& haemodactylo mas
ata & ab alter sexu v.
in Tragonio primo an
Mesuę libri & pro Gallico
albo et rubro, ut vix bonus magis ita &
Satyrio nil licabit.

Circa Bergam-
bi ell. nigr. et
et alibi
excelsa oppo
Benomia in
more.

Ferè sep
foliis flexis, ut
apicis deprehendat
vagi primo
flore.

* primo anno habet folia v. duo folia. 2. t.p.

An Anemone limonia placat.

primo anno unica & folia.
2°. bina cum flore.

An mihi duas species?

Vide alia similis maiores 3. b.

Satyrio erythraico missa ex Tragonio, ex pictura B. Texeira sed flores roseos.

bolides qz folia seu. ex quinq; esse puto: nec ne sup pictus, sana.

Sed cf. & 133. b. sane folia pinxit: ut in iconibus Tragonis qs missa Calceolaris. Vt penitus dicere nu possim

K. 1. 17.

E libro Ioannis Monspelio:
qui adscripsit ei nomen
Hermodactyli.



forte Helleborine.

365

Anemonę, (vel ranunculi (sp.)

K. 1. 39.



37

Anemone diuersif.
1. 42.



38

Anemone.

K. 2. 7.

Anemone viderj potest: modo no sucq croci colore

acris desit radici. —

V. 73. b

Vide in Leucojo
cognata.



Similis Papaveri flori.
Vocat am[illegible] papaverina q[uo]d
ochroma, et sotto no[mi]ne
Anemones —
Cerulea: no[n] p[ro]ximi
sed chelidonie magis
= p[ro]mia = ochroma
nominâ.
(Chelidonia et omnino
papaveri alijs q[uo]q[ue] visa
Leguntur apud Athenæum
in Damascenis q[uo]q[ue].
an marrubij tubæ radix
q[uo]d[am] pars: et mango
nille vocat eo[rum]
ocnilæ effigiem
in hirundines adnatam.

39

Anemony huic sitia foeniculi folia hr

ista 73.

a. Dioscorides scribit Anemonen hanc non capimus (papaver enim anemone hinc) sed tangit id quod in summo asparagi est: colicolo similem, nisi ramosa, (longiusculum et ingrate sapit) quo cum a. hic queunt.

In Ellab. nigra Argyrus et Stellaria ad Anemonas referri videntur: flore magno, quinis ad summum petalis et molli folio dauciis: ad Solis ortum nitescit: sapore nitrosi: semen et folia ut a. hinc habet: sed maiusculum, rotundius, et triangula sacra similia. Sed hic calycis quinque foliola. Anemony cornuta Tournefortii est ipsa species Anemony cui folia non dissimilia hr.

Aliter figura in apographo Guilandini cum ea quae extat in h. 73. 6.

a.


phillyrea · an philyca?
K. 1. 98.
An alaternus? ἔλαιόπρινος?
phillyrea seu lonicera
Alaterny q. nonnulli
Galli
an talia ut elegans, qualacunque spec.
Conditi, palmarib
Cenchrus 9 fer.
folia qui modica
appropinquat pro.

88

415

Cedrus (minor.) oxycedrus · Cæsalpin.

1.89.



Fructus hic differt ab inferiori qui in fructicis est cognitus tri puto.

Fructus hic differt a duobus sequentibus

Oxycedri fructus: cum cupressi a regione B. in eo genere pro melioris plurimi fiunt: cum A. aut quod in summo distinguendi et notata cum incisa.

Cedri lycia Gallo Cade vocata Gallis) baccas, à Rasis missas melius quàm A. minores et plures gignit.

Oxycedri nomine missis Rasis: multum minor sed intus hic minor hic fructus et sapidior, nucleus fusi-

Fructus imperfecti varietas missa cl. Belonio

V. an Abbrev.

93

425 Ranunculus

3 Ranunculus niger purpureus radice ut ossa longior
2 Ranunculus niger luteus, pinge de Dem Cresten f. 162.
1 Ranunculus niger ♀ albus, ♂ Trag. in tab. 161. et in Dodonæo.



Vide an congruat tuba illa ♂ cicuta sepes et temetum nasci nobis et Ranunculi à quibus ad mutuandas.

Huius plantæ tres sunt species tantæ differentes, oes vetino tempore flovent et ideo coster dicunt Ranunculi vernales. nec ut puto improprie, unum ex his flore albo: flore luteo, et flore purpureo ut hic, sed colore magis dilute, oes tres species inveni in sylvis prope Genevam ad radicem montis Saleuæ. primum qui flore albo est primum flovet, deinde qui luteo, postremum qui purpureo. / † P. Anas.

fibræ desert. an mutuandæ.

Radix longior esse debet panis, serpit subterranea et radices mittit fibrosas. V. Plin.

K. 1. 30.
Tiphus. Lobelius 110. b.



~~Sefelis petroph~~ Radix. Rhapontica Apulei et Lonicero.

Ego certe istius plantæ quicquid rodo se
sentire alium cibum aquicui[?] polius ad
Centaureæ maius referre, quamvis
Oribasius unde eam sumpserit plantæ arbitretur
Rha seu Centaureæ magnæ [illegible]
quod ego nō possim probare.
T. P.

444

R in Alpibus nascitur

2. 62

Rhaponticum. Apulei &c. houtten.

V. inter Rhaponticum multos Baldi. 93. b.



Telephium 2. 66.

45

- 2 . 6 8 -

Dioscor. cerus telephiū nō ē

Telephium.
ut et Bellonius. edūc Gal.
sequētes Rom.

Cruciferum genus. —
ut et Lugd. Herwol. ms/tt
et anglā bengbredzūgē p. primer
Anagy

V. ā Cerinthe
Dodonæo; et Aldrovando.
Folia ampla carnosa, circa
radicē plōrā: flos in cacumine
nō obscurum: hæc mihi 1500. q
primo ānō posuit

Anna tha. floruerat mihi
in horto Bonnæ 1500.
Septembris m. ānno eo
mirabilis.

florebat. 1

(Maculosa plōra
folia, semina (sed
mādati) sub
circa ānū rad. 150.
habui ānō 01. nec
floruit p. ānō. in arenoso
nō diphamie. diuersa
ab hac.

Vide a multis Telephiū
maculatū. T. p.

2. 87. ignota.

46





Vida an Castile Anicone aut
Staechio cognata sativa. foliis oblg, gustu nasturtii &c.
pisis abundat in asperis mōtib. iter saxa.
radix alba ē, gustu fervida. folia
olag. † in caulibus minora
stag lini. flower purpurei, lutei.
n igīn odoris.
n videt plantaginis. ribwort. n. illi, multi ramuli ex abscessu, capitula anthemidis.
sorui hedorhysi species, Bell.

~~Rhabarbara folia~~

9 fre ~~c~~ plata à regione

[An leucoïs marina? cognata? co. nomine ~~c~~ alii misere in Camerario f. 47



Hæc planta mihi in horto 1505. semina à radice una quidem semē nō maturauit, ~~q~~ mi postea tamen nata ~~fuerat~~ flores, nō infœcundi: q̄s subsecuta ~~fuerat~~ siliquis rotundis, cauis, in hīs oppressi. Flores nihil olēt. Caulis ~~c~~ tybi.—

Süß im G. auch.

Azadarach Avicenæ ♀.

Lobus K. 1.41. arij amongst a fennig.

[illegible] Sycomor
[illegible] Feigenbaum: alius Platano. — nullâ ratione mihi hic Bellonij in lib.° De
[illegible] no. 6. bona
[illegible] finding.
Arborib. sylvest.

Silvestris species
videtur mihi in
Solano.



485

Pericarpus plinij.
Crocus bl. mier. mit taffelfarb Hulsen & Blumen
K. 1.40
(V. in mais figuris 229.b.

Hyacinthus corticatus flonib. odoratis.
(Cognom. bulbinus flonib. carulcis, pcanis, et purpu. medijs Bulbino

Anguillaris Semblecudex.

Ait Plinius.

An Hyacinthus alius Sic.



2. Or. Rhabarbar.

49



Hyacinthus orientalis è liber Imbert
Monspelios. Banhino no ommino
placet hæc icon.
Vide (48. b.) 118. b.
K.

2. 67

Rhabarbarum.

[V. Folii magnitudo: Sequitur fol. b.



V. matth.

Napus hē
Veneti. nō
differt ab illo
nervosis, nisi figura
foliī.
Rot. fol. lapathi
circa Fulmonē. hē.
et in montib circa Cuiū.
Lapathū vul.
Rhabarbū: n. nec longè absimil
Matth: pingit.

2. 88. Rhabarbari folia.


50.

50



Rhabarbarum pharmacopolarum
huius fere magnitudine





505

268

Rhabarbari folia

Illustrata tota pagina

fol. 2



51

Myrtus umbana et valde odorata.
K. 2. 32. Valva 2 / sup. limbi flavi / 10. b.





525

1 · 5 8 ·

Cyminu.

vide ne sylvestre primū Dioscoridis.

foliola terna.

Vidi Aurelie in horto Vitalis?
Capavo in Pharmacop. dilig[en]tiss.?
T. p.

die q. Flores semoli sind
imen Dun



535

v. 113. [illegible] scripsi

2 : 5.

Heliotropium paruum. Mehispinge. in mais v. 138. vbi opti. ☞ J.

Anagallanga / somina adnatũ ☞ lactea.

Mespili primo natale [illegible] vbi frequẽs.

T. p.



matt här planta sedū arboresc. t. ~~4 9~~ · 2 · 3°

545

Sedū magnum.





Die Zahl Furchen am Ei

555

Citria mâla. hæc folia nullo omnino appendice, cum arrisit folij natura ea epiphyllida hnt. E ut epiphyllidum nomine folia minima quod postremus adnascat, mainsanta quidā in Peruanijs angusto nasco in limonibg.





Limonis
Limonen

565

Poma Arantzia.



a. Flos mali arantij quinq; foliis plurimq; constans,
variis quamuis, condito in medio alijs qdā parvis
foliosq; cādida crocoq; apice [illegible] luteos, et in medio
infra undiq; parvi pomi. Facundo esso flore in obliqū, si pistillo
subiungitur. Floribus n. huius [illegible] o granis, et inguen fructi, ffyrcam
ac fimbrijs, in syreucis ligneis formā. Folijs flore q; supina punctis aliq; notā.
Fructus primo anno inchoans, tercio demū efficit, sine ex imbri. Floribus copio[sus] in
horto fructi plenis nascitur. Iulio mēsis 1562.



Tapur

offen mit dem Samen. cap. 55. blat.



a. b. ein Apfel






ein Apfelbaum.


57 v

I. 49

Mâlus punica.















585

Cyperus 2 ēdī 1 2
pseudocyp[us] ifr[utex] ampelodesmi nostratis. bracteis
an Syriaci? v. imm[ature] radicis a Bauhino datus!



Nodi radicis fibris crassiusculis
fere; p[raesertim] in ubi muscoli reperiuntur.
v. an ex his jam prorepsisse arbitris?

Cyp[eri] Syriaci radix
alibi in mari

Pseudocyp[eri] spp.
mag[nae] adhuc[dum]
(Clusii radices)











Sive qui Tagetem appellant. C. T. p.

595

1. 60.

Flos Indiang.

G









In Aegypto vidimus poma Adami, quæ sunt tantæ paruitatis cucumeres, sapore et dulcedine mirabili, Theophrasto Musa sua Thuidia dic.

2. 69

Faba Ægyptia. Ifolia
vide sequente folio. b.
vide ne sagitta Plinii huic cognata sit, nel nyphea.

Arum Ægyptium polij

Folia fere omnia
Coniugata



Huld. Fructus pirus ad me misit,
et addit cum alba, et sine fissura cauis,
similis capse alba.



È libro Iordani Monspelio: qui adscripsit,
Colocasia, Arum Indicum,

[Colocasiæ folia bis picta. Si figmenta hæc nova est, apparet figmentum Matthioli circa finem. Bauhing.]

615

Fraxinus Aegyptiaca folio. 2. 70
Vide platanum quadrifolio.



625

2.74

Ebenus vel Cacaiacu.





Hos fructus ex Italia mi amicus dedit.

(V. fango q̄busdā.
V. an Diospyri species?)



huius pagīæ fīat. Folia è vestigiis

Vide an Faba Græca, aut ceratia cognata arbor,
(fructu similiter sessili, et calyce simili, et qui mespili
modo cū mali venit, rufescat,) quę Faba Græca
vel Diospyri nomine à Dalechampio mihi missa.

Malus silvestris spinosa V.
& loto africana.

2. 72

Dilyn/a.
Tuipetn





645

Palinurus. K.

Vide ne barba Ionis plinii, vulgò Scoronera Italis.


V. sup. 19. b.




655

2. 77 65

Sparrium.




Veronica spuria

Vid. Horti. fol.
665

2. 71

Scamonia

Alia s. qua Montpelij ostenditur, in maio 74.

V. matth. alii melius est depicta?




Eryngium planum ex horto Banks 1805.
Belgica
Sibth. in Dan.ª 91. b.

polygala.



Nascit apud nos similis, flosculis minoribus, purpureis in asperis
fere & odore quodam lauri, sicciis, laetis fere in collibus siccis.
mal in sumi
V. sept 15. b.

An thalictro cognata?

Quinquefolium
vocat Lobel
sed siliqua &
multum differt.

685

2 · 89 #

Nil dicit K. vide ne gnis Zeg ~~xxxxx~~.

~~Vide~~ · latin.

Vide Manh.: et Dod.: Lobi.



2. 79

Asclepias, vel Apocyno.



· 2 · 83

Καισία συριττώδης.



† Ramis florentibus Floralia
vidit Barbieri. — Floralis nidus
operculo, hic pictus non apparet
dehiscens. Episi in Aug. Sept.

745

2. 81.

Musa.

Vide fruct. sequen. folio.
v. q scripsi in Catalogo plantar. nostro. misit et ex dosc. Io. du Chr



Fol. 185.

Anda: Theuetus picturam unam hr in libro
De orientis rar. alibi in Gallia Antarctica,
Musæ nomine:
nomine tamen barbaro quodam. pingit aut
fructus alios; maiores mihi. K. nimis intumescos pin-
xit, ex Neapoli medios, fructus alios, sfortè puto ne sint fructus
persæ nomine à Dalechā
pio mihi missus.

Musa assurgit
in tenuem cristam
gracilis caprachi, ne crescat
scapus sine folia.

an reliquiæ foliorum q decidunt: ex
pedunc. et. cortex valide reliqui
exsiccat.

725

Musæ fructus.
Vide præcedente folio.







735

2.64 ~~89~~

Anemone



N. matth.
745

2.78

Κεφαλωνία.



2. 93
2. 92

Cicuta aqtica.

Ligusticū aqticū
Tragi. nū pingit
tm.



Fm[illegible] ar
Dod. videt hāc
icone (sine radice nū ita
exprimūt, sed folia)
scripta Cicuta
exhibuisse.
(M. aut alia. Joa.)

Inglüer im,
Gugl gappr.

Anvio duos gustasse
& hac radice
vagi napos, alter
pmu dio obüisse,
alter evasisse nonnullis.

2. 92.
Vide et alia
radice sequēs folio.
Sphondylion Bell.

Der maler hat die farwen all zů tirk von zůsatz
angstrichen, die grüne zů schwartz. nienz kein
glantz. Dermeertail zů Grob vñ zů kolzarb.
die stricke, linien, härle, vnderscheidung mit
anzeigt, oder zůwenig: oder narrhin mit 3 ei
farw ir verzogen.



2 91

Ficaria asplica.
Vida pedetze
folio.





775

Ampelodesmos plinii.



2. 6.

Rhus.

folia satis bene fruitu nō itē

79.

1.66. Xiphium

Die wonen vß dem Matthiolo 445. die zwifach.
Recipies ein xiphium simplici radice, — qd et M. pīgit.
infra 82.b.

Ant. S Jmothy. ait se repisse in aqua, radice quæ
scīzulam appareat, sed ablata pte ambitus
bisecta, intus gemina esse. in Polonia so
inueniri nō sūt in locis, quæ uigent ut
in stagno uiz spū.




Limonia odorata ? Ubr
Lontbi.
Kaoeal vm.
Xte fol.

4.23.

Lunaria · Græca.



Flowers Aprilis initio.

Flores ādrifolii breves in pluribus gracilibus inodori.
cui colore sæ magis rubicundi.
calyx nō inuidi, sed cinereū
fauū colore ē in flores
q̄dripartiti.
Ab una radice mūlti sæpe
caules, succulosi nō ā
simplē fauū foliis ramuli
ann. floæ petioli pedūc.
Caulis ē rotundus, pilis albis
raris hirsutus: — nō cauus,
sed medulla subdulci, flex subtili
cui plurimi. Semine luteū, exiguū,
pōst acre. Flē cum deo ā sanō
anno gaudit.
Cognata huic videt ā
pinguē sup. pag. 28.

V. fol. 82.

V. ibi præscripsi.

Radix est
ō vaginea

Dr. Lunaria 188

nō innotuit
nostris.


Stat ob dem
ovarich, &
in pino wie ama
culum.
Radix Lunariæ q̄ è regione ē:
(colorē nō exact, c
alba sc.)

T. 70. Arbutus.

Crescit in agro mons. in sylvis
T. p.

815



825

Styracis fructus, sibi memini, seu fructy circulo debebar esse in cima a pruna & duræ substantiæ fuscum, intus molle, odorum, pruinis et rugis in ueteri.

Quam hoc nuper inuenit costanzy colonis, inuenit apud pharmacopolas inter cæ styracē calamitē, compressum, alterā partē latā, duram, solidam, dēinde in 2. ptes fragilē, in medio lucētē, uiuingq; colorē ginty sent: 1

Anō amaz ne cassia fist. semē, cui fere simile ē. sed subdulce, glutinosū. (ca ne beschrieben ne singt.)

+ Ein spla mit bisseren Blumen vorüber.

Styracis fructus: sic missa accepi. Cortex lignosus, tenuis, nucleus unus.

V. pag.

Nardi montana.

an uidix nascēt in regnis in hispania? uidica bulbosa.

Matthioli qui sita pingit Florentina indica uocat, Lusitanica

pilulæ passim intus fami cana uolatic formam rhy mamara Cat malzo uocat apud pharmacopolas uagit. comp glo uolūy, nidor.

c.

fructus hūc alii ex pingūt Matthioli. nō calyx ē minor, et fructus in acutū exit.


Saxifraga
Lign
Spina
Crescit in Saletta monte

· 2 · 98 ·

Xiphium K. in Explicatione

Vide ne qd gem ~~Xiphii rotæ forte flore missi Gmelandinæ~~
V. Vitroniata vel Couchi.

Xiphium mon nonihil distat.

V. sup 79. b.

ἀνθη πορφυρᾶ, Sixtus dor
ἀπ' ἀλλήλων διεσπαρτα·
Dioscor. de gladiolo. videre
mihi Sixtus hoc loco mendo
gnasse, cum alterum gladiolo
nū ab uno lacero latissimo ob-
tusoque Acumine
differre, cæt. uno verbo differens,
cæs foliis intermixtis.

G.

das klöyne
Blatt von
gueßen.

Vasculum G volubile, alio gemmiculo,
iq forte

G

84

Matth. hūr vel oiē similis pro Tithimallo
Dendroyde depingit. ~.

845

Tithymally characias.



Lin. ophlj in gbeir
124.

1. 77

φύλλον.

V. in meis 65. similiby foliis. vol 241.

Cordy Giles Jack
Stalky Hoker



24

σατύριον.



Νήριον. Ροδόδενδρον. Ylte fol.

87

Κασιαν umb.





Verb. vera.

E libro d. Lobelii, Mospelio.

Ex hac icone apparet figuram Matthioli qui
sihquas deorsum versus pingit cum tamen
semp, tum in Gallia, non in Italia, sursum
versus viderim, Bauhin.

Matthiolj conuenit ceruus in
maiori herbario.

88

1

69

Thymelæa.

E. in mois 104.



89

1.79

Laburnum.

♄. ☉ in mais. / 2.70.





Τιθύμαλλος πυξοειδής

a. Myrsinites mag 1501.
albicantia cpt? hz folia, nō dentēr
pūctatis: et in caulib? nihil punctat:
sed nesp punctā in caule, ni fallor, folia iterum
nāscigia.

Alia species ē à regione.

a.





Vide ī regione alia specie.

An Turpeto cognata esse dicamus?

Hanc plantā folia nullo ordine in caule disponūt, nec flores accuratam spicam efficiunt, ut in reliquis turpetis, sed in illa vicinas quasi inter siccas cum thymallis ubi semper virent gignitur. Sed ego Turpeto cognatam.

915 A. B. Conizio c/so cognatus Herbæ hic cum suis coloribus picæ: sed specie differunt folia. v. in A. et B. quæ aut plana &c. singula tm si cõponas. sed tm. in radice pro re flores.

paradianthes.

Vide Coralloida Cordi. in libro scripto vij. pag. 73. b.
radice aut albo coralloi simile &c.
Vide infra cap. b.

A.

B.

Radix nuda pars ad D. Amplis.

Dentatio pinnæ et unde quidam mucr.

Vidæ aut eadem cum bi. pinn.

no plants
T-p.
920

2.17

Ἡμερόδοος πολύανθος

nulla tale Matthiolus habet

Videtur dendroides Theophrasti

Sed forsan congruit ad pedes ripas
rivos nascens: cum et nullas radices
fibrosas habeat.

mapsan.

mapsan.

93

935

Rhapontica minor
Baldi.

An idem ac Aphaka supina?

V. sup. Ostruthium = Lapsana 44. b.



Iesaminu.

pixing ī m.





1605

Jasminum Clusii foliis
lanceis

pessime depictum habes
alibi in Ges. melius.
Dod. Trifolium Jasminum
Vocat. V
– sine hoc lib.

Guilandina in balsami descriptione
(quam à Bauhino habui) alicui
jasmino huic paro describit.

Lugduni jasmino huic nostrati, polemonii
Mospelionsis confert cui illo
flores quide similitudine huic,
sed folia minimi V. an
parvum hic

Mospelii sylvestris ♀, polemonium parvum:
Lugduni colitur in hortis, caulem ama folia fert
lanea, sed minus ♀ hic. B. et nostro
jasmino huic, sed
odore carens

255.

? Aconitum pardalianches (e' mon. Balde) ex Aloisii Rom. sententia Germanorum.

in libello de Lunariis 39.
flos C[a]d[em] ut [in] [illegible] sed
femina frigida.
radix optima.

V

Florem etc. vide in libello de Lunariis.

folia hic [illegible] hæc
parum inæqualiter de
ventra intuentibus
coloribus pingenda sunt
hic ut [illegible]

Matrum hanc dixe
runt.

C

Cyclamini folio. V. pag. 127.
his satis similia, sed magna
Matthiol.

Crescit magna copia in
multis locis circa et in montibus
in Gebbendorf. + P. Assf.



Tussilago maior s. Non
Cornuto: d. Quadrio
misit. / tale ut
Farfara omnino.

Caltha maior
Tussilago

Acoma cuius radix plures bulbulos
mulos, appendices longiusculas ha-
ut scorpij candos & nudos: quos
Crangare uidet.
Valtesa misit Casp. Collini mapi:
tota omnino glis hic pinxit.
Radices plane candidae, fibrae,
ramosae et in summa hyacinthos.
piccaferus inuolucrum ad subrufum
colorem adgens.

2 · 4 · 37.

Opuntia plinii.

Anapath. Bell.
pala indica.
palmæ [illegible] – ex Hist. [illegible] Plin




E' libra Ioubeni
Monspelio.
Bauhino hāc icon
cpbat.
is adscribit:
Anapalh, fico Indica,
Opūnia plinii Matth.° cap. de Aloē.
G


Radix fici Indicæ ad mea tempora quæ pēne omnia
1501. martio. C parua sunt & radicas facia
ceruicina superficiei.

V. matt / v. 124.

98v

1572

Aristolochia rotunda.



seō plurespicas

99



1·80

πρῖνος, ilex

v. ne alaternus, ἐλατήριον.

vel potiꝰ q cp phillyrea pīgit. sup pag. 8-40.

[illegible] .i. ilex n aculeata.

aculeata πρῖνος. — Vide ne phillyrea aut alaternus, nīs ilicis cū ilicis folijs et floribus. atra à Fuchsio ho.

Tala hr: unde ex elaterium sup pīs rīs medicinis glandis. Fuchs



1005

1. 7 5

Species pseudalianthe 74.
semini tabis nidet?
Vide sup. pl. 6.



1015

192

Asphodelus minor luteus





1025

Cresõs inter Segetes in agro [illegible]
Copiose. T. Ø. Aug.

V. matth. vbi. alij esu dspitu

χόνδριλλα



folia sua longiora
et ut adsc[illegible]



1035

Vide Lemnium Lemnius et occultas nat. rerum miracul. lib. 3. ca. 9. (Ed. 2ª)

23. Rhamnus. (Germ.)
(Val. Cordo Oleaster Germanicus. Pom.)
Fructu acidi, maturescente
Augusto, arenosis locis circa
Rhenum versus Coloniam.
Sandthorn
Wydonthoren.
V. ne Lycii Indici
Dioscoridis spes.

Sijn blumen
besser von der
farb. die andere
sind zu gemein.

† ad Rhodum
et Arcuar.

Crescit ubique
agro Genevensi
† p. Post.

104

1045

Seseli montanum.

Ballot. Et nidificat in
in mūrib. et in hortis.
Lingostem. passim alib.

Cal
V. foli. 64. . 261
melig.



1. 76

Χαμελαία.

~~Χαμελαία~~ ~~et~~ foliget crass ~~f.~~ f.ta.

Alia ē Chamelea monspessulana.

~~alia pmo thymelæa adnumerat~~
ipse nisi ~~f~~ berezitanū: nisi
prem hīc omnia sunt sm
fauces: nā lanceolæ alpīæ

Hor.
Thymelea alpina nitro pē

V. in mois S.

+ an fauces ei rubeus, oblongæ?

nihil sec se pingēs.

Similia folia apud vtriusq; ~~pter~~ q̄ infima rustici, (se d rectæ) sup̄ spectæ: De eadē selin. ~~ex~~ phthisin

106v

videß anver[illegible]

1·81

[illegible]

~~populus (alba) [illegible]~~

v. ne populus · omnino.

in Tragio 1123 · maßholder.



G. pseudo.

Acer

Acer maius

Acer maius
II

G

Acer maius
Ov. fol. 7.
107

Ἐλύσ εαρ



μυοσώρος v. do. Crescit inter segetes
= agro Amelia nisi / ex = in Anglia =
agro Calabriensi = T. : P.

C. Fourn. ſ è Valeſia attulit, ♄ſpicis brevioribus ♃ hîr pingit
Herba avida ♃ hîr erat odoris: ſæp floſculi (ut in gramine apparent)
flaveſcebãt. Radix craſſiuſcula, carnoſa, fibris ſubnixa, intus
albicans, nullo ſtigni ſapore, ♃ hîr vn. Foliola in gemina ſeorſum poſita,
ſtellatim, hîr numerosè exeũt, digitos longa duos aut iij: ſæp
♃ medium caliculi ſpiciformi eminent. Si radix cet paulò tamen
Cinq foliis ad holoſteũ deſcriptionẽ proximè accedet.
(accepi eadẽ anno aliã ſeriem è Hoſia.) = holoſteũ



Reginaldj Aquis sextiis missus Scabiosa ranuncula vis dulcis ac ignem mordentis.

Foliola incurvata primo ~~aussi~~ ab ~~ipsum~~ deinde sic extenduntur ut prae- cisa primis, nec in foliolis sed interius in singulari sorte pilos appareat.

Chamæpitys corymbata.

G

forte Satyrium.
108v

2. 40

Narcissus

An anemone Limonia, cum vagina?
V. 124. b. Cor. 3. b. 4 adsc.



flore delapso bruce virgulta
seorsum apposuere.

E libro Lonicerii, monspelio.
qui ad scribit, Narcissi luteo roman.
[Alius tulipa: alius Oculus dia, si bene memini.
satis bene depicta, Bauhing.]

1095

Ornithogalon.

Tabe ex M. pum pixis. Lo gè dissimile illi q[uod] habeo in horto: cui caulis lgnus sine foliis. folia tota obtusa, in terra solum prin, circa radicem.

V. 365.



1105

Lupi flos, gbusda.



No midi ita
subhumen hinc
Horæ, sed sæp
cadidu.
Vocem perdit
Anemone
palustris / an Anemone
calyciby, semi carot.?
Lebblümle.

Ls. G. bosser.

v. fol. 9. in pictura
Gesn. ubi melig esse /
depicta.
Haec pictura Splenem.
† p

Vnicu folium in Lizuna: non
nimis q in caule simq unicu oppiâ:
nam circa radicem satis plura sunt.

2. 90.
1115

Ranunculi arvensis species.

h. Furhii in 8.° 86.



112



113



1135

2

22 / fol perpetuo virent ☞ Theophrastus aut lib. 1° Cap. 11. de Caus. plant. /.

Rhamnus /



114

1145

Squammaria.
Ægolethros Gesneri.
V. in meis 53. & 52.



2 40

2 Ranunculus (Caltha flos luteus)
et barbarorum similis C.






In agro monspel. Hypecistus ad radices hujus plantæ invenitur. p. Aug.
54
λᾶ δορ.
1165
Cibot 1843.
hæc pr puto ex Matthiola facta ℞ // sa nō adeo malè. /
GT
+ Mas
GT
Cibot fam.
+
GT
Adiungā hīc hyp. laudam., qū hō ō B. nully d. pixid.

1 ~~A~~ 43

1175

Oxyacantha

Matthyoly in summis ramulis terna facit folia. ℞ pbo.

Est in Matthyolo 72.
aliqñ nidi bina nō folia i
uno surculo, alt tauna,
alt plurea: usqs ad
ordinas quinqs. nec
sup è regione
exhibet sinistra bia.

G

1185

f. 1. 27

Antirrhinum.
Vide aliud 130.



folia paulo secus togiora.
f. p.



Spes pulo Narcissi Ker.
maior.
an in nives sin-
guli in flores
in mo cante?

B. midia c. 12.
flonis

V. 129. b



Hyacinthi
species
Vide superius pulo.
49. b.

v. ma molto
fruticosa.

1195

1065

Morus alba /



120

120

Ημεροκαλλίς

V. lib. 2. c.



121

2
59

Patronicon.

Alia duo genera cuplis: unum nous Baldi. alterū Apulei: quę certe inter se no differunt. Alter uero differe, et in nostris montibus rarus reperit.

Aristolochia maior rotundifolia sinuata.

Crescit vbiq; in maritimis / v. Dod. 82 matth / 2. 41

Been ruber

tripolium aborton.

monspel. tripolium vocat. /

matth. Limonium. v.

1325

G



123



Hāc plantā à figura Columnā vocarē doner aptius nomē occurrat. † P. Angel.

1235

Gf.

Vide fol. 354. vbi alia est similis

2. 3 6

Ignota. vide ne Euphrasiam quidē species.

Similis mihi d. Lonic. Hist. 1563. Appuli. inuenta supra inundationem cuiusdā Eufratidis sed tribus floribus in summo.



124

1245

1. 16

Tulipa Turcis. maly Figii Sup folio 3. b.
Cogenoch vide 2. 40.

V. 108. b.

Vik



125

1255

1.67

Iris.



1260



radix puto melius fuerit si in mea pictura no ita singulare et

3



2



127

Ad ficus flores.



Tab. 36.

2
2 6

Κυκλάμινος



† Flores huic color, ex roseo et puniceo mixtus, nihil nitet, brumbyssarbi vel ut J. Camerario visus videbat ex Turquino et morello.

folij color ab aliarum parum pingat.

b. folia

Hæc cū altera spicata sæpius
vidi Salernæ. † P. Aegl.

Sin aliqby spicata
ps minus rubea.

b. hic plus qd ad colorē,
nihil picta, qñ a. Colossinus
color patet.

128

1285

62

Γεράνιον



Herr Gerhard spec.
Crescit copiose in monte Sorlenca
et multis aliis locis Austriae.
4 - p.

129



in meine Garten gar viel

Cincinnati
1295

Crescit in agris prope Tolosam.

Hyacinthus



V. III. 11. b. ubi Narcissus vocatur.
V. III. 8. b.

130

1305

V. superius

34
35

Antirrhinum triplici flore differentia /

Vide aliud 116?

Videt & Dodonæus hoc nolmisse figurare, sed infeliciter.

M. Antirrhinum cum dimanis & ab his & hortensium minus pictum vidi, sed male pictum priùs.



Vidi Antirrhinum flore luteo floribus in horto D. Bauhini pict. dolose

~~vidi~~ flore purpureo crescit in agro mons. et Pirenæo &c. vbiq. præsertim in rupibus saxosis & muris.

V. pict.



2.38

Δίκταμνος.

Die blätter wy[illegible]
ungefar ein wenigk gbarwet

Talia capitula habet
Origanum Creticum ferè:
ut illi cognam hoc videat.

rotbrünen

Rubeta Dod. in lib. Gesn. 342.
arbi melis.

1 · 90

φλόμος · ~~an φλομὶς~~ nide ne Stachys.
~~no f. Stachys.~~



133

1335

Dens canis.

pulchug e supra pagina 35.

Similis specie et numero foliorum flos videtur supra 3. b.

Similis pene e ea Satyrio Cypriaco

An calli flex apices coeruleos, ne istic

Ad tanganitio missio



Sub hoc latet sequens folio.

nō bene depictum ... crede ...

1345

2.44

Ruta sylvestris.

+ Harmal.

Alba nūpeli fluuiib. humeis, noby
et nūnullib. foliis nasciē.

V. ā bzr qm
Conuersij missic.
nūpeli alias 2. diplos
bnē.



135

2. 48

Νάρκισσος.

Cordiani seu



1.25

Napellus Aricenę

V. matth.

Es ist zů schwarz
es soltent von der mitten durch alle blatter uff
wysse strych zů tůn vnd radij.



137

1370

v. in lib Ges. fol. 272. /

1. 91

φλόμος.





1385


Fistulania.
Herba sancta.
Eadē pueri q̄ et campestris, et
herba S. Barbarę.
Ich haus me Aengelica andere nuncupant.

Fistula Lampsana Dod. V

Das ganz Kraut
G. 382.



139



Ignota.

1503.
Reginaldy Agnis Scarijs misit.
cū floribꝰ bicolor.
inodora, insipida
suffruticosa hirsuta
folia parvula, bipinnata, segmenta
foliis setis, basi vestita setis, breviora.

jm Regal 402. 404.

R 1/4

monsp. Anchusae speciem facit.
+ sp.

nil [illegible]

1395

2·18

Ἀνεμώνη

an Anagyris alia

an Anagyris alia tertia Theophrasti

an Hordeolum

An sena folia nulla
sex animo vis. sed
quinq; aut nulla reperiuntur

(sex aut folia
bulbosa = folia)

b

G


offen wie cörn vilber
mongges, in jenem
gewächs.
die grün cron kepfli

1405

2. 63

Hyacinthus racem. = fallax. T. P.





243

Pronominata · describit in Annotationib.

Antophoros cognitus

Plinij est tibi quæ
fumaria cucumeri folio
dicta. Cerastes folia
è Gallia veri




2. 24

1425



143




1435

Κάππαρις.

Pinax 82 in M. pub.
D. Matth. vb.
malus.



† Capparis spinosa sativa.



1445

2.42.

nõ vgs bene depicta D. matth. /
v. in Cæs. 117 et Turnero. /

Cardiaca [illegible]
Eryngium latifolium /

Eryngium marinum ♀



145



1455

Γεράνιον





146r

228

Terhorn.

Gentiana in pīs humidis.

In palustribus ad lacunas, ad duos pedes altitudinis. Caules edibiles suaves.

Cin anders in mine 143.



Wurtzel Darzu samen.

Wurtzel das samen hülsichte Darzu.

Gentiana vulgaris pliny I. p.

HACTENVS ex libro Io. Kentmanni.

Lachryma Iobi

147a

Vide fol. 22. b.




Dodonæi. nō ē in
impsso. & capit ab eo
Cl. Belonio. ei missa.
1564.

147b

Gemp. lla peregrina

(Rubra capsula Mospelū putat Valerandus Tap.

Vide in meis icon. fol. 172. b.



Rubra capsula
V. an Capsula mōs
Mospelū secun.

Dodon. Iobi
Cl. Belonio

polemonia monspe.