

A. MUUGA

EESTI NSV SÕÖTADE
KEEMILINE KOOSTIS
JA TOITEVÄÄRTUS

TABELID

1980. AASTA KOKKUVÕTE

A-20131

A. MUUGA

EESTI NSV SÖÖTADE
KEEMILINE KOOSTIS JA
TOITEVÄÄRTUS

TABELID



EESTI RIIKLIK KIRJASTUS
TALLINN 1954

29846

N

Tartu Riikliku Ülikooli
Raamatukogu

29846

TARTU ÜLIKOOLI
RAAMATUKOGU

EESTI NSV SÖÖTADE KEEMILINE KOOSTIS JA TOITEVÄÄRTUS

Jrk. nr.	Söödarühmade ja -liikide nimetus	Keemiline koostis %-des						Analüüsitud proovide arv	Seedekoefitsiendid				Seeduvad toitained					Kg ühe söötühiku kohta	Seeduvat proteiini söötühiku kohta g-des	Ühe kg sööda kohta			Jrk. nr.
		Kuivaine	Toorproteiin	Rasv	N-ta e.a.	Toorkiud	Tuhk		Toorproteiin	Rasv	N-ta e.a.	Toorkiud	Seeduv proteiin	Seeduv valk	Rasv	N-ta e.a.	Kiud			Ca g-des	P g-des	Karotiini mg-des	
1. KARJAMAA- JA HALJASSÖÖDAD																							
a) Karjamaalt ja niidult:																							
1.	Koplirohi, keskmiselt	23,2	4,0	0,7	10,6	5,6	2,3	7	67	32	71	67	2,7	2,1	0,2	7,5	3,8	5,1	137	1,7	0,7	1	
2.	Koplirohi, noor	16,9	2,5	0,6	8,5	4,0	1,3	2	72	34	78	70	1,8	1,4	0,2	6,6	2,8	6,0	109			2	
3.	Koplirohi, vana	25,6	4,7	0,7	11,0	7,6	1,6	1	62	30	64	63	2,9	2,5	0,2	7,0	4,8	5,1	150			3	
4.	Rohuädal, koplist	24,7	3,7	0,8	11,3	7,1	1,8	1	65	51	77	69	2,4	1,9	0,4	8,7	4,9	4,4	106	1,2	0,7	4	
5.	Niiduädal	35,0	4,4	0,9	17,4	9,8	2,5	5	50	43	56	48	2,2	1,8	0,4	9,7	4,7	4,7	104			5	
6.	Hürehernes, haljas	24,4	5,7	0,6	8,9	7,6	1,6	3	69	60	68	45	3,9	2,6	0,4	6,1	3,4	6,1	238			6	
7.	Orashein, haljas	25,9	5,2	0,8	10,0	7,7	2,2	2	55	39	65	65	2,8	1,1	0,3	6,5	5,0	5,9	165			7	
b) Põllult:																							
8.	Haljassegatis (kaer + pelusk)	13,1	2,8	0,5	4,9	3,4	1,5	10	71	58	67	54	2,0	1,1	0,3	3,3	1,9	10,4	207	1,3	0,5	8	
9.	Haljasvikk	15,5	3,7	0,4	6,7	3,3	1,4	2	69	60	68	45	2,6	1,6	0,3	4,6	1,5	8,5	218	1,6	0,7	9	
10.	Ristikuädal	17,5	3,3	0,6	7,6	4,2	1,8	9	74	72	78	58	2,4	2,0	0,4	5,9	2,5	6,1	147			10	
11.	Lutserniädal	20,2	3,9	0,5	7,3	6,3	2,2	4	74	50	66	50	2,9	1,9	0,3	4,8	3,2	7,5	217			11	
12.	Haljasrukis	14,0	2,2	0,4	5,7	4,6	1,1	2	70	56	67	65	1,6	0,7	0,2	3,8	3,0	9,4	150			12	
13.	Valge mesikas, haljas	16,5	3,4	0,4	5,9	5,1	1,7	6	75	43	60	60	2,6	1,8	0,2	3,5	3,1	8,4	219			13	
14.	Päevalill, haljas	14,2	1,6	0,3	7,2	3,6	1,5	5	50	67	60	60	0,8	0,5	0,2	4,3	2,2	9,4	75			14	
15.	Haljasmais	14,5	1,3	0,3	8,0	3,9	1,0	7	66	72	78	57	0,9	0,6	0,2	6,2	2,2	7,3	66			15	
16.	Haljasmalva	15,0	2,1	0,5	5,2	5,2	2,0	2	50	67	60	60	1,1	0,6	0,3	3,1	3,1	10,7	117			16	
17.	Sojauba, haljas	23,6	2,9	0,6	12,3	5,5	2,3	1	77	54	75	45	2,3	1,9	0,3	9,3	2,5	4,9	112			17	
2. KÖRSSÖÖDAD																							
a) Põldhein:																							
18.	Põldhein, üldine keskmine	77,5	8,3	1,7	37,0	25,5	5,0	98	60	37	64	49	5,0	4,3	0,6	23,7	12,5	2,2	112	7,3	1,5	18	
19.	Põldhein, kuni 25% ristikeina	78,1	7,0	1,7	39,1	26,0	4,3	22	60	37	64	49	4,2	3,7	0,6	25,0	12,7	2,3	96	4,6	1,1	19	

Jrk. nr.	Söödarühmade ja -liikide nimetus	Keemiline koostis %-des						Analüüsitud proovide arv	Seedekoeffitsiendid				Seeduvad toitained					Kg ühe söötühiku kohta	Seeduvat proteiini söötühiku kohta g-des	Ühe kg sööda kohta			Jrk. nr.
		Kuivaine	Toorproteiin	Rasv	N-ta e.-a.	Toorkiud	Tuhk		Toorproteiin	Rasv	N-ta e.-a.	Toorkiud	Seeduv proteiin	Seeduv valk	Rasv	N-ta e.-a.	Kiud			Ca g-des	P g-des	Karotiini mg-des	
20.	Põldhein, sama, enne õitsemist	75,0	6,2	1,5	38,1	25,2	4,0	5	66	40	69	70	4,1	3,5	0,6	26,3	17,6	1,8	73				20
21.	Põldhein, sama, täisõites	75,0	6,8	1,9	34,2	27,2	4,9	4	60	37	64	49	4,1	3,7	0,7	21,9	13,3	2,5	101				21
22.	Põldhein, 25—50% ristikeina	78,2	8,0	1,8	37,2	26,2	5,0	16	60	37	64	49	4,8	3,9	0,7	23,8	12,8	2,3	109	7,4	1,2		22
23.	Põldhein, 50—75% ristikeina	76,1	9,0	1,6	35,8	24,6	5,1	28	60	37	64	49	5,4	4,6	0,6	22,9	12,0	2,3	124	8,9	1,2		23
24.	Põldhein, sama, enne õitsemist	76,0	9,9	1,9	31,8	25,9	6,5	3	66	40	69	70	6,5	5,3	0,8	21,9	18,1	1,9	124				24
25.	Põldhein, sama, täisõites	76,2	8,4	1,6	36,1	25,0	5,1	13	60	37	64	49	5,0	4,3	0,6	23,1	12,3	2,3	116				25
26.	Põldhein, 75—100% ristikeina	75,0	10,3	1,7	32,0	25,0	6,0	10	60	37	64	49	6,2	5,2	0,6	20,5	12,3	2,4	152	9,9	1,6		26
27.	Põldhein, sama, enne õitsemist	74,6	9,8	1,6	32,8	23,9	6,5	3	66	40	69	70	6,5	5,1	0,6	22,6	16,7	1,9	123				27
28.	Põldhein, sama, täisõites	75,7	10,7	1,8	29,7	26,9	6,6	4	60	37	64	49	6,4	5,6	0,7	19,0	13,2	2,6	167				28
29.	Põldhein, 75% lutserni	81,1	9,7	1,5	35,2	29,9	4,8	1	75	44	70	41	7,4	4,7	0,7	24,6	12,3	2,4	175	12,9	1,1		29
30.	Timothein	80,9	7,6	2,0	42,3	24,7	4,3	2	58	56	61	51	4,4	3,0	1,1	25,8	12,6	2,1	91	4,2	1,8	15	30
31.	Segatishein (kaera 90%)	81,3	8,8	1,8	29,7	36,0	5,0	2	66	60	60	50	5,8	4,1	1,1	17,8	18,0	2,9	165	5,3	1,8		31
32.	Põldhein, 35—50 ts ha-lt, kuni 50% ristikeina	80,3	7,9	1,8	39,2	26,4	5,0	5	60	37	64	49	4,8	4,1	0,7	25,1	12,9	2,1	101	6,8	1,7	19	32
33.	Põldhein, 40—50 ts ha-lt, üle 50% ristikeina	75,8	9,3	1,6	32,8	26,1	6,0	4	60	37	64	49	5,6	4,8	0,6	21,0	12,8	2,4	134	8,5	1,9	23	33
b) Niiduhein:																							
34.	Kultuurniiduhein, keskmiselt	83,2	9,5	2,3	42,1	24,7	4,6	21	56	42	60	60	5,3	3,9	1,0	25,3	14,8	1,9	102	7,1	1,5		34
35.	Kultuurniiduhein, varakult koristatud	77,1	9,0	1,8	38,2	23,7	4,4	7	62	43	65	81	5,6	4,1	0,8	24,8	19,2	1,7	94				35
36.	Kultuurniiduhein, hilja koristatud	83,5	7,9	1,9	39,3	30,4	4,0	3	56	40	62	69	4,4	3,0	0,7	24,3	20,9	1,9	83	8,2	1,7	6	36
37.	Kultuurniiduhein, 36—52 ts ha-lt	80,0	9,4	1,8	40,2	24,3	4,3	4	62	43	65	81	5,8	4,4	0,8	26,1	19,7	1,6	94	8,3	1,6	19	37
38.	Kultuurkoplihein, varakult koristatud	79,8	11,2	2,7	45,4	16,0	4,5	1	69	50	82	77	7,7	6,0	1,4	37,2	12,3	1,3	99	8,5	2,0		38
39.	Aasahein	81,0	8,7	2,2	41,8	23,3	5,0	20	58	54	57	46	5,0	3,6	1,2	23,8	10,7	2,2	113	8,1	1,2	20	39
40.	Aruniiduhein	79,3	8,2	2,2	40,9	23,2	4,8	9	40	52	60	46	3,3	2,7	1,1	24,5	10,7	2,3	75	9,1	1,0		40
41.	Puisniiduhein, keskmiselt	80,0	8,2	2,7	41,7	22,8	4,6	52	40	52	60	46	3,3	2,6	1,4	25,0	10,5	2,2	72	8,0	0,8		41
42.	Kuivpuisniiduhein	79,9	8,2	2,7	41,5	22,2	5,3	11	40	52	60	46	3,3	2,6	1,4	24,9	10,2	2,2	72	10,3	1,0		42
43.	Märgpuisniiduhein	81,2	8,0	2,9	43,0	23,0	4,3	26	40	52	60	46	3,2	2,6	1,5	25,8	10,6	2,1	68	7,4	0,7		43
44.	Metsahein	78,8	8,3	2,3	40,9	22,9	4,4	21	40	52	60	46	3,3	2,8	1,2	24,5	10,5	2,3	74	7,3	0,9		44
45.	Luhahein	79,9	9,4	2,1	40,1	23,3	5,0	52	50	42	54	47	4,7	4,3	0,9	21,9	10,9	2,4	112	5,0	1,0		45
46.	Soohein	81,0	8,4	2,5	41,9	23,7	4,5	76	45	46	51	47	3,8	3,3	1,1	21,4	11,2	2,5	94	6,6	0,9		46
47.	Rannahein	79,6	7,9	2,3	40,4	22,7	6,3	14	45	33	50	47	3,5	2,9	0,7	20,2	10,7	2,7	94	4,2	0,9		47
c) Põhk:																							
48.	Talirukkipõhk	81,1	3,7	1,0	34,4	37,6	4,5	15	23	36	39	55	0,9	0,4	0,4	13,4	20,1	4,5	38				48
49.	Talinisupõhk	83,2	3,0	1,3	38,3	36,2	4,4	2	17	33	37	50	0,5	0,3	0,4	14,2	18,1	4,8	25				49

Jrk. nr.	Söödarühmade ja -liikide nimetus	Keemiline koostis %-des						Analüüsitud proovide arv	Seedekoefitsiendid				Seeduvad toitained					Kg ühe söötühiku kohta	Seeduvat proteiini söötühiku kohta g-des	Ühe kg sööda kohta			Jrk. nr.
		Kuivaine	Toorproteiin	Rasv	N-ta e.-a.	Toorkiud	Tuhk		Toorproteiin	Rasv	N-ta e.-a.	Toorkiud	Seeduv proteiin	Seeduv valk	Rasv	N-ta e.-a.	Kiud			Ca g-des	P g-des	Karotiini mg-des	
50.	Suvinisupõhk	82,5	3,8	1,6	37,2	35,3	4,6	13	23	31	37	50	0,9	0,6	0,5	13,8	17,6	4,8	42				50
51.	Odrapõhk	78,0	3,8	1,5	35,9	31,8	5,0	25	27	39	53	54	1,0	0,7	0,6	19,0	17,2	3,1	32	3,4	1,0		51
52.	Kaerapõhk, keskmiselt	79,3	3,7	1,9	35,4	33,6	4,7	68	53	25	47	50	2,0	1,6	0,5	16,6	16,8	3,7	72	3,1	1,0		52
53.	Kaerapõhk, niiske	71,5	4,7	1,6	29,9	30,1	5,2	1	53	25	47	50	2,5	2,1	0,4	14,0	15,1	4,2	105	2,7	0,9		53
54.	Kaerapõhk, kuiv	87,8	3,7	3,1	37,7	39,0	4,3	1	53	25	47	50	2,0	1,3	0,8	17,7	19,5	3,5	68	3,4	1,1		54
55.	Kaerapõhk, savimuldadelt	79,7	3,5	1,9	35,7	33,9	5,0	8	53	25	47	50	1,8	1,5	0,5	16,8	16,8	3,7	68				55
56.	Kaerapõhk, liivsavi- ja saviliivmuldadelt	79,1	3,7	1,9	36,0	33,0	4,5	9	53	25	47	50	2,0	1,6	0,5	16,9	16,5	3,4	67				56
57.	Kaerapõhk, liivmuldadelt	83,5	5,2	2,2	37,2	34,1	4,8	5	53	25	47	50	2,7	1,9	0,5	17,5	17,0	3,4	93				57
58.	Segaviljapõhk	78,0	5,1	1,6	33,1	33,3	4,9	30	39	36	50	51	2,0	1,8	0,6	16,6	17,0	3,5	71				58
59.	Herneapõhk	78,1	6,8	1,5	32,7	30,9	6,2	2	48	44	55	38	3,3	2,8	0,7	18,0	11,7	3,8	125	6,1	1,1		59
60.	Kõrsheinapõhk	79,0	5,9	1,7	39,9	26,4	5,1	3	29	14	45	55	1,7	0,8	0,2	18,0	14,5	3,3	56	13,6	0,7		60
61.	Lepa-lehissööt	69,6	14,5	3,2	34,0	14,1	3,8	1	46	42	50	25	6,7	6,3	1,3	17,0	3,5	2,9	194				61
d) Aganad:																							
62.	Rukkiaganad	84,1	6,6	1,8	37,2	30,5	8,0	4	31	31	39	50	2,1	1,3	0,6	14,5	15,3	2,6	53				62
63.	Nisuaganad	84,5	5,2	1,6	40,9	28,3	8,5	4	30	30	45	48	1,6	1,0	0,5	18,4	13,6	2,3	36				63
64.	Odraaganad	82,6	5,0	2,7	38,2	30,0	6,7	3	28	30	36,5	48	1,4	0,8	0,8	13,9	14,4	2,7	38	5,2	1,2		64
65.	Kaeraaganad	81,7	7,0	3,0	38,5	23,3	9,9	11	38	54	50	46	2,7	2,0	1,6	19,3	10,7	2,1	56	6,2	1,7		65
66.	Segaviljaaganad	83,2	7,6	2,8	38,1	24,4	10,3	5	42	51	54	46	3,2	2,4	1,4	20,6	11,2	2,0	64	13,3	1,9		66
67.	Suviviljaaganate segu	80,4	5,9	2,3	38,4	26,8	7,0	3	33	42	43	47	2,0	1,3	1,0	16,5	12,6	2,5	48				67
68.	Ristikuaganad	80,6	14,2	2,1	32,3	24,0	8,0	2	70	66	75	50	9,9	6,9	1,4	24,2	12,0	1,6	155				68
3. MAHLAKAD SÖÖDAD																							
a) Silo:																							
69.	Segatisesilo	15,7	2,4	1,0	4,8	4,9	2,6	28	89	87	72	52	2,2	1,0	0,8	3,5	2,6	8,4	182	2,1	0,8		69
70.	Ristikuädala-silo	18,2	3,4	0,9	5,9	5,8	2,2	9	53	66	77	57	1,8	0,8	0,6	4,6	3,3	7,7	138				70
71.	Põldheinaädala silo	15,2	2,5	0,8	6,1	3,8	2,0	6	66	64	67	46	1,7	0,9	0,5	4,1	1,7	9,2	155				71
72.	Lutsernisilo	21,0	3,5	0,8	6,4	7,2	3,1	9	51	63	55	55	1,8	0,2	0,5	3,6	4,0	9,9	176				72
73.	Mesikasilo	18,3	2,7	0,7	5,5	5,4	4,0	12	63	50	68	49	1,7	0,5	0,4	3,7	2,7	10,6	178				73
74.	Maisisilo	14,8	1,5	0,7	6,8	4,1	1,7	9	56	74	73	62	0,9	0,3	0,5	5,0	2,6	8,0	72				74
75.	Päevalillesilo	14,5	1,7	0,7	6,2	3,7	2,2	6	59	78	63	43	1,0	0,5	0,5	3,9	1,6	10,2	103				75
76.	Malvasilo	15,7	2,0	0,9	5,0	5,1	2,7	2	76	61	75	46	1,5	0,6	0,5	3,8	2,4	10,1	150				76
77.	Sojasilo	21,4	2,4	0,9	8,5	5,7	3,9	1	65	59	67	52	1,6	0,7	0,5	5,7	2,9	7,2	115				77
78.	Kultuurniidu-ädala silo	19,6	2,4	1,0	8,0	6,4	1,8	2	66	64	67	46	1,6	0,3	0,6	5,4	3,0	8,0	128				78
79.	Niiduädalasilo (kuivainerikas)	40,1	5,1	1,4	18,7	11,7	3,2	9	54	61	50	52	2,8	1,6	0,9	9,4	6,1	4,5	125				79
80.	Peedipealsete silo	19,6	2,3	0,7	6,5	2,3	7,9	13	79	77	85	74	1,8	1,0	0,5	5,5	1,7	7,2	130				80
81.	Kaalikaपालsete silo	14,6	2,4	0,8	5,4	2,4	3,6	4	68	40	79	53	1,6	0,5	0,3	4,3	1,3	10,2	162	4,9	0,6		81
82.	Söödapeedi- ja porgandipealsete silo	19,8	4,0	0,7	5,0	2,5	7,6	1	72	67	75	65	2,8	1,7	0,5	2,8	1,6	8,3	232	4,1	0,7		82

Jrk. nr.	Söödarühmade ja -liikide nimetus	Keemiline koostis %-des						Analüüsitud proovide arv	Seedekoefitsiendid				Seeduvad toitained					Kg ühe söötühiku kohta	Seeduvat proteiini söötühiku kohta g-des	Ühe kg sööda kohta			Jrk. nr.
		Kuivaine	Toorproteiin	Rasv	N-ta e.-a.	Toorkiud	Tuhk		Toorproteiin	Rasv	N-ta e.-a.	Toorkiud	Seeduv proteiin	Seeduv valk	Rasv	N-ta e.-a.	Kiud			Ca g-des	P g-des	Karotiini mg-des	
83.	Kartulipealsete silo	16,9	2,3	1,0	6,4	3,6	3,6	5	38	44	55	39	0,9	0,1	0,4	3,5	1,4	13,8	124				83
84.	Söödakapsasilo	14,4	2,1	0,6	6,7	2,4	2,6	2	72	72	75	67	1,5	0,4	0,5	5,1	1,6	8,4	125				84
85.	Söögikapsajääkide silo	13,1	1,7	0,6	5,3	2,1	3,4	9	73	43	100	66	1,3	0,3	0,3	5,3	1,4	8,7	113				85
86.	Toorkartulisilo, mahlavaene	31,6	1,7	0,1	27,5	0,7	1,6	6	73	20	85	—	1,2	0,6	—	23,4	—	2,5	30				86
87.	Keedetud kartuli silo	24,2	1,8	0,1	20,5	0,6	1,2	5	80	—	99	82	1,5	1,0	—	20,3	0,5	2,8	40				87
88.	Peedipealsete ja ristikuädala-silo	15,9	2,3	0,9	5,7	4,7	2,3	1	60	56	66	56	1,4	0,8	0,5	3,8	2,6	9,1	126				88
89.	Peedipealsete ja söödakapsa-silo	13,4	1,6	0,7	5,0	2,3	4,2	3	76	74	80	70	1,2	0,3	0,5	4,0	1,6	9,7	116				89
90.	Põldheinaädala ja peedipealsete silo, kuiv-ainerikas	20,9	1,8	0,8	9,8	4,6	3,9	1	72	70	76	60	1,3	0,7	0,5	7,4	2,8	5,8	76				90
91.	Kultuurniiduädala ja peedipealsete silo	19,0	2,5	0,7	6,1	2,4	7,3	1	73	71	76	60	1,8	0,8	0,5	4,6	1,4	8,5	152				91
92.	Kapsa-, peedi- ja kartulipealsete silo	14,5	1,7	0,3	4,2	2,3	6,0	1	63	64	72	63	1,1	0,5	0,2	3,1	1,5	12,7	135				92
93.	Keedetud kartuli ja haljassööda-silo	24,5	2,1	0,3	16,6	1,6	3,9	1	70	64	80	56	1,5	0,9	0,2	13,3	0,9	4,0	59				93
94.	Mesika- ja suhkrupeedisilo	11,9	1,7	0,6	4,4	3,5	1,8	3	67	50	81	41	1,1	0,5	0,3	3,6	1,4	11,9	132				94
95.	Umbrohusilo, kuivainerikas	25,1	4,4	0,7	10,6	7,1	2,3	1	53	64	56	51	2,3	1,6	0,4	5,9	3,6	6,4	147	5,2	0,8		95
b) Juurviljad:																							
96.	Söödapeet, Eesti NSV keskmine	11,0	1,1	0,1	8,0	0,8	1,0	167	66	—	89	60	0,7	0,3	—	7,1	0,5	10,6	75				96
97.	Söödapeet, savimuldadelt	11,4	1,0	0,1	8,5	0,8	1,0	52	66	—	89	60	0,7	0,3	—	7,6	0,5	9,0	60				97
98.	Söödapeet, liivsavi- ja saviliivmuldadelt	10,8	1,1	0,1	7,7	0,8	1,1	107	66	—	89	60	0,7	0,4	—	6,9	0,5	10,8	75				98
99.	Söödapeet, suur, väga vesine	6,7	1,2	0,1	3,7	0,7	1,0	2	66	—	89	60	0,8	0,2	—	3,3	0,4	21,5	170				99
100.	Söödapeet, väga kuivainerikas	21,5	2,8	0,1	14,8	1,6	2,2	1	66	—	89	60	1,9	0,3	—	13,1	0,9	5,8	110				100
101.	Söödapeet, sort <i>ekendorj</i>	11,3	1,1	0,1	8,3	0,8	1,0	139	66	—	89	60	0,7	0,3	—	7,3	0,5	10,3	70				101
102.	Söödapeet, sort <i>barres</i>	10,6	1,0	0,1	7,8	0,7	1,0	5	66	—	89	60	0,6	0,3	—	6,9	0,5	10,9	65				102
103.	Söödapeet, 500—850 ts ha-lt	11,0	1,4	0,1	7,4	0,8	1,3	5	66	—	89	60	0,9	0,5	—	6,6	0,5	10,9	98	0,3	0,3		103
104.	Söödakaalikas, Eesti NSV keskmine	11,6	1,1	0,1	8,6	1,1	0,7	29	83	—	84	44	0,9	0,6	—	7,3	0,5	8,5	76				104
105.	Söödakaalikas, savimuldadelt	11,9	1,1	0,1	8,9	1,1	0,7	11	83	—	84	44	0,9	0,6	—	7,5	0,5	8,3	75				105
106.	Söödakaalikas, liivsavi- ja saviliivmuldadelt	11,8	1,2	0,1	8,6	1,1	0,8	13	83	—	84	44	0,9	0,6	—	7,3	0,5	8,5	76				106
107.	Söödakaalikas, veerikas	8,4	1,1	0,1	5,8	0,9	0,5	2	83	—	84	44	0,9	0,5	—	4,8	0,4	12,3	108				107
108.	Söödakaalikas, kuivainerikas	15,1	1,1	0,2	11,8	1,3	0,7	1	83	—	84	44	0,9	0,6	—	9,9	0,6	6,4	57				108
109.	Söödakaalikas, sort <i>bangholm</i>	11,6	1,1	0,1	8,6	1,1	0,7	27	83	—	84	44	0,9	0,6	—	7,2	0,5	8,6	78				109
110.	Söödakaalikas, sort <i>bangholm</i> 950 ts ha-lt	9,3	1,5	0,1	5,5	1,3	0,9	2	83	—	84	44	1,3	1,0	—	4,7	0,5	11,5	149	0,6	0,5		110
111.	Söödaporgand, Eesti NSV keskmine	12,2	1,0	0,2	9,0	1,1	0,9	11	67	50	96	54	0,6	0,4	0,1	8,7	0,6	7,2	47				111
112.	Söödaporgand, savimuldadelt	12,5	0,9	0,1	9,4	1,1	1,0	4	67	50	96	54	0,6	0,4	0,1	9,1	0,6	7,0	43				112

Jrk. nr.	Söödarühmade ja -liikide nimetus	Keemiline koostis %-des						Analüüsitud proovide arv	Seedekoefitsiendid				Seeduvad toitained					Kg ühe söötühiku kohta	Seeduvat proteiini ühiku kohta g-des	Ühe kg sööda kohta			Jrk. nr.
		Kuivaine	Toorproteiin	Rasv	N-ta e.-a.	Toorkiud	Tuhk		Toorproteiin	Rasv	N-ta e.-a.	Toorkiud	Seeduv proteiin	Seeduv valk	Rasv	N-ta e.-a.	Kiud			Ca g-des	P g-des	Karotiini mg-des	
113.	Söödaporgand, liivsavi- ja saviliivmuldadelt	11,6	1,0	0,2	8,3	1,1	1,0	4	67	50	96	54	0,7	0,3	0,1	8,0	0,6	7,8	53				113
114.	Söödaporgand, liivmuldadelt	12,5	0,9	0,1	9,5	1,1	0,9	3	67	50	96	54	0,6	0,4	0,1	9,1	0,6	6,9	42				114
115.	Söödaporgand, veerikas	10,4	0,8	0,1	7,8	0,8	0,8	2	67	50	96	54	0,5	0,3	0,1	7,5	0,4	8,5	45				115
116.	Söödaporgand, kuivainerikas	15,6	1,0	0,2	12,0	1,4	1,0	1	67	50	96	54	0,6	0,4	0,1	11,5	0,7	5,5	35				116
117.	Söödaporgand, sort <i>tšampion</i>	12,1	0,9	0,1	9,1	1,1	0,9	7	67	50	96	54	0,6	0,4	0,1	8,7	0,6	7,2	44				117
118.	Söödaporgand, sort <i>belgia valge</i>	12,7	1,3	0,2	8,5	1,3	1,4	1	67	50	96	54	0,8	0,6	0,1	8,2	0,7	7,1	57	0,7	0,5		118
119.	Söödanaeris, Eesti NSV keskmine	8,9	1,0	0,1	5,9	1,1	0,8	11	67	—	92	36	0,7	0,4	—	5,5	0,4	12,3	86				119
120.	Söödanaeris, savimuldadelt	8,5	0,9	0,1	5,8	1,0	0,7	6	67	—	92	36	0,6	0,3	—	5,4	0,3	12,7	76				120
121.	Söödanaeris, liivsavi- ja saviliivmuldadelt	9,4	1,3	0,2	5,8	1,2	0,9	4	67	—	92	36	0,8	0,5	—	5,4	0,4	12,3	98				121
122.	Söödanaeris, liivmuldadelt	9,5	1,0	0,1	6,6	1,0	0,8	3	67	—	92	36	0,6	0,4	—	6,1	0,4	11,2	67				122
123.	Söödanaeris, veerikas	6,9	0,8	0,1	4,6	0,8	0,6	1	67	—	92	36	0,6	0,3	—	4,3	0,3	15,8	94				123
124.	Söödanaeris, kuivainerikas	11,6	2,1	0,2	5,8	2,0	1,5	1	67	—	92	36	1,4	0,7	—	5,4	0,7	11,4	157				124
125.	Söödanaeris, sort <i>östersundom</i>	9,2	1,1	0,1	6,0	1,1	0,9	7	67	—	92	36	0,7	0,4	—	5,5	0,4	12,3	86				125
126.	Söödanaeris, sort <i>östersundom</i> 1250 ts ha-lt	8,2	0,9	0,1	4,2	0,9	2,1	1	67	—	92	36	0,6	0,3	—	3,8	0,3	17,6	106	0,4	0,3		126
127.	Suhkrupeet	22,5	1,6	0,1	18,5	1,4	0,9	6	79	—	95,4	49	1,3	0,8	—	17,6	0,7	4,0	52				127
128.	Söödakapsas	12,4	1,9	0,3	6,8	1,9	1,5	4	71	44	78	35	1,3	0,7	0,2	5,3	0,7	10,0	130				128
129.	Söödakapsas, hästi mahlane	9,5	1,7	0,2	5,4	1,2	1,0	1	71	44	78	35	1,2	0,6	0,1	4,2	0,4	11,9	143				129
c) Kartul:																							
130.	Kartul, Eesti NSV keskmine	22,4	1,7	0,1	19,0	0,6	1,0	127	84	—	91	—	1,4	1,0	—	17,2	—	3,5	49	0,2	0,5		130
131.	Kartul, savimuldadelt	21,8	1,8	0,1	18,4	0,6	0,9	46	84	—	91	—	1,5	1,0	—	16,8	—	3,6	54				131
132.	Kartul, saviliiv- ja liivsavimuldadelt	22,5	1,7	0,1	19,0	0,6	1,1	64	84	—	91	—	1,4	1,0	—	18,3	—	3,3	46				132
133.	Kartul, liivmuldadelt	23,4	1,7	0,1	20,1	0,6	0,9	17	84	—	91	—	1,4	1,0	—	18,3	—	3,3	46				133
134.	Kartul, tärkliserikas	29,3	2,0	0,1	25,4	0,6	1,2	2	84	—	91	—	1,7	1,4	—	23,1	—	2,5	41				134
135.	Kartul, väga veerikas	13,0	1,3	—	10,7	0,4	0,6	2	84	—	91	—	1,1	0,7	—	9,7	—	5,6	59				135
136.	Kartul, sort <i>jõgeva piklik</i>	22,0	1,7	0,1	18,7	0,5	1,0	2	84	—	91	—	1,4	1,0	—	17,0	—	3,3	47				136
137.	Kartul, sort <i>jõgeva kollane</i>	22,8	1,6	0,2	19,3	0,6	1,1	6	84	—	91	—	1,3	0,9	—	17,6	—	3,3	44				137
138.	Kartul, sort <i>majestik</i>	23,9	1,8	0,1	20,5	0,6	0,9	2	84	—	91	—	1,5	1,0	—	18,7	—	3,2	48				138
139.	Kartul, sort <i>kungla</i>	19,1	1,6	0,1	16,1	0,5	0,8	6	84	—	91	—	1,3	0,9	—	14,7	—	4,1	54				139
140.	Kartul, sort <i>parnassia</i>	23,3	1,5	0,1	20,1	0,6	1,0	3	84	—	91	—	1,2	0,9	—	18,3	—	3,3	40				140
141.	Kartul, keedetud	23,2	1,9	—	19,0	0,7	1,6	4	80	—	99	82	1,5	1,2	—	18,8	0,5	2,9	43				141
142.	Kartul, kõrgete saakidega põldudel, 250 kuni 290 ts ha-lt	21,8	2,0	0,1	17,4	0,6	1,7	8	84	—	91	—	1,3	0,9	—	15,8	—	3,5	45	0,2	0,4		142
d) Pealsed:																							
143.	Söödapeedipealsed	12,9	2,1	0,2	4,5	1,6	4,5	10	83	13	74	54	1,7	1,3	0,1	3,3	0,9	12,0	205				143

Jrk. nr.	Söödarühmade ja -liikide nimetus	Keemiline koostis %-des						Analüüsitud proovide arv	Seedekoefitsiendid				Seeduvad toitained					Kg ühe söötühiku kohta	Seeduvat proteiini söötühiku kohta g-des	Ühe kg sööda kohta			Jrk. nr.
		Kuivaine	Toorproteiin	Rasv	N-ta e.-a.	Toorkiud	Tuhk		Toorproteiin	Rasv	N-ta e.-a.	Toorkiud	Seeduv proteiin	Seeduv valk	Rasv	N-ta e.-a.	Kiud			Ca g-des	P g-des	Karotiini mg-des	
144.	Kaalikapealsed	10,3	2,1	0,3	4,2	1,5	2,2	2	68	40	79	53	1,4	0,9	0,1	3,3	0,8	12,8	180				144
145.	Kartulipealsed	12,6	1,8	0,3	4,9	3,3	2,3	5	56	29	61	43	1,0	0,7	0,1	3,0	1,4	13,8	140				145
146.	Kapsalehed	12,0	1,8	0,4	6,2	1,8	1,8	10	72	57	80	70,8	1,3	0,8	0,2	5,0	1,3	8,8	114				146
e) Tehnilise töötlemise jäätmed:																							
147.	Kartulipraak, keskmiselt	4,7	1,0	0,1	2,4	0,6	0,6	10	55	30	79	35	0,6	0,5	0,02	1,9	0,2	24,2	143				147
148.	Kartulipraak, kuivem	6,0	1,0	0,1	3,7	0,7	0,5	2	55	30	79	35	0,6	0,4	0,02	3,0	0,2	18,1	108				148
149.	Kartulipraak, väga vesine	3,1	0,8	0,1	1,3	0,4	0,5	2	55	30	79	35	0,4	0,3	0,003	1,0	0,2	41,7	166				149
150.	Suhkruppeedi kuivlõigud	86,3	6,8	0,5	57,3	18,0	3,7	2	51	50	86	72	3,4	3,1	0,3	49,3	12,9	1,3	40				150
151.	Linnase-eod	92,3	22,6	0,7	50,5	13,2	5,3	2	80	73	73	55	18,1	10,7	0,5	36,9	7,5	1,5	267				151
4. JÕUSÖÖDAD																							
a) Söödateravili:																							
152.	Oder, Eesti NSV keskmine	85,7	11,7	1,7	64,0	6,0	2,3	978	70	91	92	33	8,2	7,2	1,5	58,9	2,0	0,9	70	0,5	3,4		152
153.	Oder, P.-Eesti keskmine	85,9	11,3	1,7	64,6	5,9	2,4	466	70	91	92	33	7,9	7,0	1,5	59,4	1,9	0,9	67				153
154.	Oder, L.-Eesti keskmine	85,6	12,1	1,7	63,5	6,0	2,3	511	70	91	92	33	8,5	7,4	1,5	58,4	2,0	0,9	68				154
155.	Oder, täisteraline, keskmiselt	85,3	11,6	1,6	64,6	5,3	2,2	363	72	89	95	45	8,4	7,7	1,4	61,4	2,4	0,8	68				155
156.	Oder, täisteraline, P.-Eestist	85,1	11,0	1,7	65,1	5,1	2,2	151	72	89	95	45	7,9	7,6	1,5	61,8	2,3	0,8	64				156
157.	Oder, täisteraline, L.-Eestist	85,4	12,0	1,6	64,3	5,4	2,1	212	72	89	95	45	8,6	7,6	1,4	61,1	2,4	0,8	71				157
158.	Oder, täisteraline, rähkmuldadelt	85,8	10,9	1,7	65,8	5,2	2,2	95	72	89	95	45	7,9	7,0	1,5	62,5	2,3	0,8	63				158
159.	Oder, täisteraline, L.-Eesti leetmuldadelt	85,3	12,0	1,7	64,1	5,4	2,1	147	72	89	95	45	8,6	7,7	1,5	60,9	2,4	0,8	71				159
160.	Oder, kõhnem, keskmiselt	85,3	12,3	1,7	61,7	7,0	2,6	385	73	88	89	22	8,6	7,5	1,6	56,8	2,3	0,9	76				160
161.	Oder, kõhnem, P.-Eestist	85,1	12,1	1,7	61,2	7,4	2,7	152	73	88	89	22	8,5	7,4	1,6	56,3	2,4	0,9	75				161
162.	Oder, kõhnem, L.-Eestist	85,4	12,4	1,7	62,1	6,7	2,5	233	73	88	89	22	8,7	7,6	1,6	57,1	2,2	0,9	76				162
163.	Oder, kõhnem, rähkmuldadelt	85,8	12,1	1,7	61,9	7,4	2,7	96	73	88	89	22	8,5	7,3	1,6	57,0	2,4	0,9	75				163
164.	Oder, kõhnem, L.-Eesti leetmuldadelt	85,3	12,4	1,7	61,8	6,9	2,5	163	73	88	89	22	8,7	7,5	1,6	56,9	2,3	0,9	77				164
165.	Oder, savimuldadelt	87,3	10,8	1,9	67,1	5,3	2,2	90	70	91	92	33	7,6	6,6	1,7	61,7	1,7	0,8	62				165
166.	Oder, saviliiv- ja liivsavimuldadelt	86,8	10,7	1,8	66,8	5,3	2,2	64	70	91	92	33	7,5	6,5	1,7	61,5	1,7	0,8	62				166
167.	Oder, liivmuldadelt	87,6	10,7	1,9	67,3	5,4	2,3	74	70	91	92	33	7,5	6,7	1,7	61,9	1,8	0,8	62				167
168.	Oder, väetatud muldadelt	85,4	12,2	1,8	63,2	6,0	2,2	114	72	89	95	45	8,8	7,8	1,6	60,0	2,7	0,8	72				168
169.	Oder, sort <i>abedi maja</i> , keskmiselt	85,5	9,0	1,8	67,9	4,7	2,1	9	70	91	92	33	6,3	5,5	1,6	62,5	1,5	0,8	53	0,6	3,5		169
170.	Oder, sort <i>abedi maja</i> , täisteraline	85,5	9,8	1,5	67,0	5,0	2,2	3	72	89	95	45	7,1	6,3	1,3	63,7	2,3	0,8	59				170
171.	Oder, sort <i>abedi maja</i> , kõhnem	85,5	11,4	1,7	61,1	8,4	2,9	3	73	88	89	22	8,3	7,4	1,5	54,4	1,9	0,9	77				171
172.	Oder, sort <i>kuldoder</i> , keskmiselt	86,3	11,7	1,7	64,7	5,7	2,5	67	70	91	92	33	8,2	7,3	1,5	59,5	1,9	0,9	74				172
173.	Oder, sort <i>jõgeva 453</i> keskmiselt	85,6	11,3	1,7	64,1	6,1	2,4	36	70	91	92	33	7,9	7,0	1,5	59,0	2,0	0,9	71				173
174.	Oder, sort <i>jõgeva 707</i>	86,0	8,9	1,6	69,5	4,2	1,8	2	70	91	92	33	6,2	5,4	1,5	63,9	1,4	0,8	51	0,4	3,2		174
175.	Oder, 20—40 ts ha-lt	85,5	10,8	1,7	66,0	4,9	2,1	35	72	89	95	45	7,8	6,5	1,5	62,7	2,4	0,8	63				175
176.	Oder, 30—40 ts ha-lt	85,5	10,9	1,6	66,1	4,9	2,0	6	72	89	95	45	7,9	5,7	1,5	62,8	2,2	0,8	65	0,6	3,1		176

Jrk. nr.	Söödarühmade ja -liikide nimetus	Keemiline koostis %-des						Analüüsitud proovide arv	Seedekoefitsiendid				Seeduvad toitained					Kg ühe söötühiku kohta	Seeduvat proteiini söötühiku kohta g-des	Ühe kg sööda kohta			Jrk. nr.
		Kuivaine	Toorproteiin	Rasv	N-ta e.-a.	Toorkiud	Tuhk		Toorproteiin	Rasv	N-ta e.-a.	Toorkiud	Seeduv proteiin	Seeduv valk	Rasv	N-ta e.-a.	Kiud			Ca g-des	P g-des	Karotiini mg-des	
177.	Kaer, Eesti NSV keskmine	86,5	10,1	4,5	58,4	10,7	2,8	681	78	83	77	25	7,9	6,7	3,7	45,0	2,7	1,0	80	1,0	3,3	177	
178.	Kaer, P.-Eesti keskmine	86,1	9,8	4,8	58,3	10,5	2,7	311	78	83	77	25	7,6	6,5	4,0	44,9	2,6	1,0	78			178	
179.	Kaer, L.-Eesti keskmine	86,8	10,4	4,3	58,5	10,8	2,8	336	78	83	77	25	8,1	7,0	3,6	45,0	2,7	1,0	83			179	
180.	Kaer, rähkmuldadelt	86,5	9,9	4,6	58,3	10,7	3,0	192	78	83	77	25	7,7	6,6	3,8	44,9	2,7	1,0	79			180	
181.	Kaer, L.-Eesti leetmuldadelt	86,7	10,5	4,6	58,1	10,7	2,8	248	78	83	77	25	8,2	7,0	3,8	44,7	2,7	1,0	83			181	
182.	Kaer, savimuldadelt	86,2	10,1	4,6	58,3	10,5	2,7	227	78	83	77	25	7,9	6,7	3,8	44,9	2,6	1,0	81			182	
183.	Kaer, saviliiv- ja liivsavimuldadelt	86,7	10,3	4,5	58,5	10,6	2,8	238	78	83	77	25	8,0	6,8	3,8	45,0	2,7	1,0	81			183	
184.	Kaer, liivmuldadelt	86,5	10,0	4,5	58,4	10,9	2,7	206	78	83	77	25	7,8	6,6	3,8	45,0	2,7	1,0	79			184	
185.	Kaer, väetatud muldadelt	87,0	11,3	4,4	58,4	10,1	2,8	19	76	83	79	26	8,6	7,4	3,7	46,1	2,6	0,98	85			185	
186.	Kaer, sort jõgeva koit	85,6	9,0	5,0	61,8	8,4	2,4	9	78	83	77	25	7,0	5,9	4,2	47,6	2,1	0,98	69			186	
187.	Kaer, sort võit	86,3	9,7	4,3	59,1	10,5	2,7	32	78	83	77	25	7,6	6,5	3,6	45,5	2,6	1,0	74			187	
188.	Kaer, sort kuldvoihm	86,6	10,1	4,5	57,9	10,5	2,7	36	78	83	77	25	7,9	6,8	3,7	44,6	2,6	1,0	81			188	
189.	Kaer, sort kehra saagirikas	86,5	10,5	4,7	58,0	10,6	2,7	36	78	83	77	25	8,2	7,1	3,9	44,7	2,6	1,0	83			189	
190.	Kaer, sort jõgeva roostekindlam	85,1	11,0	4,6	56,5	10,4	2,6	6	78	83	77	25	8,5	7,5	3,8	43,5	2,6	1,0	84			190	
191.	Kaer, 20—45 ts ha-lt	85,6	9,9	4,4	58,4	10,2	2,7	44	76	83	79	26	7,6	6,6	3,7	46,1	2,7	1,0	75			191	
192.	Kaer, 30—45 ts ha-lt	86,2	10,1	4,4	58,7	10,4	2,6	6	76	83	79	26	7,7	5,3	3,7	46,3	2,7	1,0	77			192	
193.	Segavili (2/3 kaera + 1/3 peluskit)	86,3	16,3	3,3	54,4	9,1	3,2	13	79	80	83	45	12,7	11,3	2,6	45,2	4,1	0,95	123	1,0	3,1	193	
194.	Segavili (1/2 kaera + 1/2 peluskit)	86,7	18,7	2,9	53,0	8,5	3,6	2	79	80	83	45	14,8	12,6	2,3	44,0	3,8	0,93	138			194	
195.	Segavili (90% kaera + 10% vikki)	84,7	13,8	4,2	54,5	9,6	2,6	1	83	86	84	45	11,5	10,7	3,6	45,8	4,3	0,92	105			195	
196.	Segu (15% kaera + 70% otra + 15% rukkeid)	85,5	11,7	2,3	63,5	5,3	2,7	1	73	86	90	35	8,6	8,2	2,0	57,1	1,9	0,85	74			196	
197.	Mais	85,0	8,9	4,6	67,6	2,2	1,7	1	75	86	95	65	6,7	5,7	3,9	64,3	1,5	0,8	50			197	
198.	Uba	80,4	24,7	1,0	44,2	6,9	3,6	5	87	80	91	58	21,5	19,8	0,8	40,3	4,0	0,95	205			198	
199.	Pelusk	82,3	22,8	1,0	49,9	5,8	2,8	13	80	73	94	86	18,2	16,4	0,8	46,9	5,0	0,9	162			199	
200.	Hernes	86,0	27,1	1,6	45,1	9,2	3,0	1	86	63	93	46	23,3	20,0	1,0	41,9	4,2	0,9	210			200	
201.	Sojauba	79,9	37,1	6,3	27,3	4,7	4,5	1	84	82,3	74	74	31,1	29,3	5,2	20,2	3,5	0,95	295			201	
202.	Lupiin (<i>Lupinus polyphyllus</i>)	82,8	37,4	7,2	24,4	10,3	3,5	1	89	84	86	90	33,3	29,7	6,0	21,0	9,3	0,9	300			202	
b) Jahvatusjäätmel:																							
203.	Nisukliid, keskmiselt	85,1	14,6	3,9	52,7	8,8	5,1	24	72	70	75	42	10,5	9,3	2,8	39,6	3,7	1,3	138	1,1	11,2	203	
204.	Nisukliid, niisked	79,7	12,0	3,6	51,8	8,3	4,0	2	72	70	75	42	10,5	9,5	2,5	38,8	3,4	1,4	147	1,0	10,5	204	
205.	Hernekoored	85,8	5,4	0,4	40,8	36,0	3,2	1	86	63	93	46	4,6	4,0	0,3	37,9	16,5	1,1	51			205	

Jrk. nr.	Sõodarühmade ja -liikide nimetus	Keemiline koostis %-des						Analüüsitud proovide arv	Seedekoefitsiendid				Seeduvad toitained					Kg ühe söötühiku kohta	Seeduvat proteiini söötühiku kohta g-des	Ühe kg sööda kohta			Jrk. nr.
		Kuivaine	Toorproteiin	Rasv	N-ta e.-a.	Toorkiud	Tuhk		Toorproteiin	Rasv	N-ta e.-a.	Toorkiud	Seeduv proteiin	Seeduv valk	Rasv	N-ta e.-a.	Kiud			Ca g-des	P g-des	Karotiini mg-des	
c) Olikoogid:																							
206.	Linakook, keskmiselt	87,1	31,7	9,0	30,8	8,9	6,7	29	86	92	81	49	27,3	24,8	8,3	25,0	4,4	0,85	232				206
207.	Linakook, kuivem	91,4	35,0	7,4	33,8	8,6	6,6	2	86	92	81	49	30,1	27,7	6,8	27,4	4,2	0,8	240				207
208.	Linakook, niiske	81,6	32,9	9,0	25,3	8,6	5,9	1	86	92	81	49	28,3	27,0	8,2	20,5	4,2	0,9	249				208
209.	Päevalillekook, keskmiselt	91,2	40,8	8,2	21,2	14,5	6,5	14	92	90	70	26	37,6	36,1	7,3	14,9	3,8	0,9	338	2,7	11,0		209
210.	Päevalillekook, kuivem	95,0	43,4	9,9	18,2	16,6	6,9	2	92	90	70	26	39,9	38,5	8,9	12,7	4,3	0,85	338	2,8	11,5		210
211.	Päevalillekook, niiske	84,8	36,7	8,0	20,5	13,6	6,0	1	92	90	70	26	33,7	33,5	7,2	14,4	3,5	0,9	321	2,5	10,3		211
212.	Puuvillakook, keskmiselt	90,3	38,2	7,2	27,2	11,5	6,2	15	84	95	75	37	32,1	30,4	6,9	20,4	4,3	0,9	283	2,7	11,1		212
213.	Puuvillakook, kuivem	95,0	41,4	8,8	26,8	11,5	6,5	2	84	95	75	37	34,8	32,0	8,4	20,1	4,3	0,8	289	2,8	11,7		213
214.	Puuvillakook, niiske	82,9	32,4	4,2	29,5	11,4	5,4	1	84	95	75	37	27,2	26,4	4,0	22,2	4,2	1,0	272	2,5	10,2		214
215.	Sojakook, keskmiselt	89,5	40,9	5,7	30,3	6,3	6,3	16	90	88	94	78	36,8	35,4	5,0	28,5	4,9	0,8	294	2,5	6,6		215
216.	Sojatangud, keskmiselt	83,9	43,8	0,7	28,3	5,2	5,9	9	90	95	97	94	39,4	38,3	0,7	27,5	4,9	0,9	352	2,4	6,8		216
217.	Maapähklikook	89,3	44,7	9,4	22,4	6,5	6,3	2	90	90	84	15	39,8	39,0	8,4	18,6	1,0	0,8	319				217
218.	Kookoskook	88,7	20,2	9,3	42,1	11,4	5,7	4	78	96	83	63	15,8	14,9	8,9	34,9	7,2	0,8	126				218
5. Loomsed söödad																							
a) Piim- ja piimatalitus- jäätmelised:																							
219.	Lehma täispiim ¹ , Eesti NSV keskmine	12,2	3,0	3,6	4,8	—	0,7	60	95	100	100	—	2,9	2,9	3,6	4,8	—	3,1	88				219
220.	Lõss (kooritud piim), rõõsk	8,9	3,1	0,1	5,0	—	0,7	17	95	100	100	—	3,0	3,0	0,1	5,0	—	6,2	184				220
221.	Lõss (kooritud piim), hapu	8,6	2,9	—	4,9	—	0,8	13	95	100	100	—	2,8	2,8	—	4,9	—	6,6	183				221
222.	Juustuvesi (vadak)	4,3	0,5	0,03	3,4	—	0,4	1	90	100	100	—	0,5	0,5	—	3,4	—	12,8	64				222
223.	Kaseiinivesi	5,0	0,6	0,01	4,0	—	0,4	1	90	100	100	—	0,5	0,5	—	4,0	—	11,0	55				223
b) Liha- ja kalajahu:																							
224.	Lihajahu	95,0	59,5	19,0	1,2	—	15,3	5	75	93	—	—	44,6	33,5	17,7	—	—	0,8	356				224
225.	Räimejahu	90,0	63,0	14,9	—	—	12,1	2	91	45	—	—	57,3	50,8	6,7	—	—	0,9	515				225
226.	Tursajahu	89,9	50,2	1,8	2,4	—	35,5	4	92	68	—	—	46,2	37,8	1,2	—	—	1,5	693				226
227.	Peipsi tindikala, keskmiselt	71,3	44,8	6,2	0,4	—	19,9	9	90	76	—	—	40,3	35,5	4,7	—	—	1,3	529				227
228.	Peipsi tindikala, soolamata	74,0	49,8	6,6	0,5	—	17,1	7	90	76	—	—	44,9	39,6	5,0	—	—	1,2	538				228
229.	Peipsi tindikala, soolatud	62,0	29,4	5,1	0,1	—	27,4	7	90	76	—	—	26,4	23,3	3,9	—	—	1,9	501				229
6. Mineraalsöödad																							
		Pro 1 kg g-des																					
230.	Eesti söödakriit	99,2	Ca	P	N																		
231.	Söödakondijahu	86,5	395	—	—																		
232.	Fosforiin	95,1	291	138	4																		
			313	161	—																		

¹ Piimsöötade väärtust on suurendatud Üleliidulise Loomakasvatuse Teadusliku Uurimise Instituudi uurimiste alusel 20% võrra.

Toimetaja A. Kruus
Tehniline toimetaja I. Vahre
Korrektorid E. Toots ja S. Ridala

Ladumisele antud 22. IV 1954. Trükkimisele antud 12. VI 1954. Trükiarv 1500. Paber 60:92, 1/16. Trükipoognaid 0,25 + 8 lisa. Arvutuspoognaid 1.88. MB-10904. Trükikoda „Pioneer“, Tartu, Kastani 38. Tellimise nr. 1131.

На эстонском языке.

A. Мууга. Химический состав и питательность кормов Эстонской ССР
Таблицы

Hind rubl. 3.60

4—10

TRÜKIKODA «PIONEER»
Tartu, Kastani 38.

KONTROLL NR. 2

Raamatus leiduva defekti korral
palume raamat tagastada ümber-
vahetamiseks ühes selle etiketiga.

100000

A
20131

4745229

TÜ RAAMATUKOGU



1 0300 00474528 9