

DE
PHTHISI LARYNGEA
TUBERCULOSA.

DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA

QUAM
CONSENSU ATQUE AUCTORITATE AMPLISSIMI
MEDICORUM ORDINIS

UNIVERSITATE CAESAREA LITERARUM
DORPATENSI,

UT GRADUM

DOCTORIS MEDICINAE

RITE ADIPISCATUR.

LOCO CONSUETO PUBLICE DEPENDET

AUCTOR

ERNESTUS CARLBLOM,

ESTHONIA ORIUNDUS.

DORPATI LIVONORUM

TYPIS J. C. SCHÜNMANNI, TYPOGRAPHI ACADEMICI,

MDCCCXXVI.



Imprimatur.
ea tamen conditione, ut, simulac typis excusa fuerit haec
dissertatio, septem exemplaria collegio, cui censura libro-
rum mandata est, tradantur.

Dorpati Livonor. d. v. mens. Jun. MDCCCXVI.

Dr. Martinus Ernestus Styx,
h. t. Decanus.

MDCCCXVI

D 16600

Fratribus suis carissimis

Petro,

olim sacerdoti ecclesiae Sti. Mathiae et sanctae
Crucis in Estonia,

Friderico,

sacerdoti ecclesiae Sti. Olai Fellini,

Johanni,

sacerdoti ecclesiae Stae Catharinae in Nukoe
peninsulae Esthoniae,

Interprete suis carissimis

Petro,

cum sacerdoti ecclesiae Sive Catholicae in Turku

Commissarius

Fridrico,

sacerdoti ecclesiae Sive Catholicae in Turku

Johanni,

sacerdoti ecclesiae Sive Catholicae in Turku

Commissarius

Augusto,

inter praecipuos primarios gymnasii Dorpatensis
religionis disciplinam et linguam hebraicam
graecamque docenti,

Paulo,

Theologiae candidato

D. D. D.

Auctor.

Introductio.

Quamvis in tanta autorum de phthisi frequentia, quantam Ploucquetus (1) indicat, juveni, artis medicae vestibula modo ingresso, haud videatur congruum, imo inutile ac temerarium consilium, qualiacunque in medium proferendi, quae sive ad mere theoreticam sive ad practicam ejus rei notitiam promovendam conducant, praesertim si is majus quoddam praestare cupiat, quam aliena scripta compilare atque in suum usum convertere; nihilominus tamen, omnibus, quae a proposito mentem avertere potuissent, rationibus rite perpensis ac ponderatis, causam meam aequis arbitris me probaturum haud despero. Argumentis enim minime contemnendis

1) Bibliotheca medica digesta.

evinci posse puto, de materia speciali, in hac dissertatione mihi proposita, in universum paucas tantum prodidisse commentationes, easque ejusmodi, quae partim consilio meo in hoc penso suscipiendo parum responderent, partim ob nimiam breviter, vel manca omnino conditionem, vel confusam et inconditam artis praeceptorum adumbrationem nullam fere utilitatem commodumque promitterent. Quae cum ita sint, jam fiducia ac spiritus ei potest accedere, qui affectionem morbosam novi fere generis, in qua multa adhuc sunt obscura nec satis expedita, tractare instituit. Quatenus vero instituti mei rationem re vera servaverim, num porro in tanta propriae experientiae inopia, quae exponenda erant, quantum per vires fecerim, probe et dilucide exposuerim, nec in ea vitia incidere, quae scientiae tenuitatem comitari solent, vel ex alia quacunque causa nascuntur, ea quidem omnia non mei sunt iudicii, sed praeceptoribus carissimis dijudicanda ac decernenda relinquo.

Ne autem temere a me dicta videantur, quae supra de suppellectilis literariae in hoc nostro argumento defectu proferre ausus sum, jam commemorare juvat, me librorum numerum, quem Ploucquetus in opere citato exhibet, diligenter perscrutasse. Inter hos tres tantum libellos de phthisi laryngea perfunctorie mentionem injicientes reperire mihi contigit, quos vero propter manca et sine omni symptomatologia institutas observationes vix quibus animus advertatur dignos

conseo. Duos horum libellorum, a Boneto (2) et Lanzonio (3) editos, ipse evolvi; pluraque in his de consideranda esse luce clarius perspexi; de tertio, cujus auctor est Petit Radel ad Machride, quem examinandi copia mihi non est data, ad Sachsium (4) testem provoco. Praeterea libros didacticos, medicinam practicam illustrantes, medicorum celeberrimorum, e.g. G. Richteri, Haasti, Conradi, Haeckeri aliorumque, scripta itidem Portali et Lieutaudi, quae posteriora observationum ubertate multis aliis sunt anteposenda, non neglexi, neque tamen et in his perlustrandis dubium mihi fuit, quin multa deficerent ad accuratorem de phthisi laryngea cognitionem pertinentiam. Tingenue potius mihi est fatendum, illos ob expositionis breviter, hos multosque alios viros, in coeva literatio disciplinae nostrae notissimos, quos nominatim laudare hujus loci non est ideoque supervacuum esset, nequaquam mihi satisfacisse. Ita nequaquam erat cur mirarer, si casus morbi descriptos inveniret, v. c. a. D. D. Holstio (5) et Seidlero (6), qui, secun-

- 1) Sepulchretum, Lib. II., Sect., VII. Observatio 9.
- 2) Opera omnia, Lausannae 1788. Tom. II.
- 3) Beiträge zur genaueren Kenntniss und Unterscheidung der Kehlkopf- und Luftröhren-Schwindsuchten, Hannover 1821, pag. 83 et. 84.
- 4) Hufelandi Journal, tom. VII., Segmentum IV., pag. 429.
- 5) Ruati Magazin, IV. Band, pag. 429.

dum symptomata allata considerati, nomen phthiseos laryngeae falso prae se ferrent (multa enim, et quaedam praecipua hujus phthiseos symptomata aberant, atque remedia, quibus malum removere conabantur, nullum statum morbosum indicare mihi visa sunt), neque silentio praetereundum, sane quidem nostri generis causis expositos legi, sed qui nomine phthiseos laryngeae tuberculosa, revera congruo, careant, uti e. g. apud Brisbane, Anglum (7), et Joerdensium (8) videre licet. W. Sachsii libellus jam memoratus, cum accurata diagnosi, tum casuum multorum enumeratione conspicuus, mentione omnino dignus est, et, quoad dicta momenta, debita gaudet laude: sed haec bonae notae commentatio unica quidem in eo genere exstat, atque, si a momentis aetiologicalis, hic illic allatis, et curandi praecceptis discesseris, quae posteriora, finis sibi propositi memor, innuere potius, quam persequi maluis auctor, arctioribus limitibus circumscripta est, nec ubique in usum vocari potest.

Quum igitur, quae hucusque in lucem prodierunt, morbi nostri, nulli parentis aetati ac corporis constitutioni, frequentissime obvii pluribusque in casibus periculum minantis, expositiones variis laborent

7) Auserlesene Fälle der ausübenden Arznei. Kunst, Altona 1777, pag. 17 et 19.

8) Hüfelands Journal, X. Band, III. Stück; pag. 84

incommodis, cum mancae sint et imperfectae, consilium accuratius de eo disserendi haud vituperabunt lectores. Nihil quidem ad rem ex sententia considerandam mihi suppetit praeter voluntatem et studium, cavendi, ne quid, quod ab aliis omissum vel peccatum est, mihi in culpam vertatur. Sed hoc ipsum studium aequi bonique consulens rerum periti, quae vero in argumenti explanatione me nescio vitia irrepserint, juveni tironi benevoli iudices condonabunt, praesertim si eae perpenderit, quam arduum sit ac multilaboris, deficiente plerumque propria experientia, e divissimis scriptorum de argumento nobis propositis sententiis optima quaeque et verissima colligere. Quilibet hujus difficultatis haud immemor, si qua peccata animadvertet, eam nobis non denegabit indulgentiam, quam imploravimus.

U. vero in tota morbi imagine exprimenda perspicuitatis et evidentiae ratio, cui pro virili parte studii, tibi constaret non praeter rem theoreticæ et practicae spectatam egisse putavi, si, in diagnosi adumbranda atque in universum hac phthiseos specie describenda eandem, quam in phthisi pulmonali tuberculosa adoptare solent, distinctionem secutus essem, atque totum morbi decursum trium stadiorum terminis inclusi. Illa quidem hic minus firma et idonea apparent, quatenus non semper tam constanti modo ad conspicuum, quam in phthisi pulmonali tuberculosa, observantur; quod tamen cum aliqua tantummodo et

ceptione dici potest, de primo videlicet et ultimo stadio, et hucusque in nonnullis paucisque duntaxat casibus animadversum est, cui rei titim causa, intensive magis in corpus vim noxiam exerens, tum etiam consensualis nervorum affectio in organo aegroti, majori vel minori gradu obvia, nec minus peculiaris hujus et angusta conformatio ansam praebuit. Sententiam, qua morbum hunc, statu morbozo jam excolto, tanquam sequelam affectionis tuberculosae in partibus glandulosis laryngis considero et idcirco in certa tum stadia describendum censeo, ex ipsa morbi imagine, e causis, curationis modis et cadaverum sectionibus repetiti, tum vero etiam ex iis, quae de tali laryngis affectione in morbi casibus magno numero a Sachtio in libello laudato narratis, item in aliorum scriptorum illustrium, ut Lorinseri (9), Haasii (10), Meisneri (11), Caroli Belli (12) operibus annotata inventi. Posterior disertis verbis: „Glandulosa,“ inquit, „in laryngis conformatio hujus morbi sedes est; glandulae crescunt, tum pus effundunt ac fluidum purulentum ejiciunt.“

9) Ueber die Entzündungen der Lungen, Berlin 1835. pag. 64.

10) Specielle Therapie, IV. Band, pag. 125.

11) Specielle Therapie, II. Band, pag. 1209.

12) Rheinische Jahrbücher der Medicin und Chirurgie, II. Band, II. Stück, pag. 58.

Pro instituto et consilio meo jam, quantum in meo sumum erit, in dissertatione mea componenda hanc viam inibo, ut primo e symptomatibus morbi casuum, quos duce Professore, clarissimo eodemque praecceptore carissimo, Dr. Struvio, observare licuit et e casu quodam a me ipso observato accuratam hujus formae morbosae diagnosis deducam, simul symptomata nonnulla principalia, ea praesertim, quae hucusque neglecta, a Sachtio vero morbo nostro omnino propria ac primaria habita sunt, respicere et examini epicritico subjicere constitui. Tum in animo est, ostendere, quatenam sit aptissima hujus morbi divisio, quatenus ab aliis morbis in affinibus differat, quatenam hominum aetate quam frequentissime occurrat suaeque tributa exigat. Denique quid e cadaverum sectionibus prodeat, quae momenta aetiologicalia huic morbo sint attribuenda, quomodo prognosin omnia hinc derivanda atque cura ex meo quidem iudicio aptissime sit instituenda, docebo. Antequam vero ad specialem morbi diagnosis progrederer, cum diligentius rem tractarem, diagnosis universalem praemittendam esse putavi, i. e. operam dedi, ut symptomata primaria, huic affectioni propria, indicarem, e quibus ejus indelem phthisin referre cognoscatur. Praeterea hoc loco breviter monere libet, hanc passionem nunquam quae in habitu quodam phthisico positam considerari posse, sed semper potius ex universali quodam vel locali statu morbozo originem ducere.

Ita enim phthiseos nomen, quod forsitan in singulis morbi conditionibus nonnullis saltem videri possit, probatur, quatenus videlicet, ut experientia docet, et nondum quidem manifesta, sed jure praesumenda suppuratio partium glandularum organi aegroti, jam sine hecticae affectionis praesentia mortis periculum adferre potest.

Quodsi vero conditiones ejusmodi, quarum mentio supra facta est, praesto erant, nihil aliud de iis existimandum, quam harum causam in vomitibus plane excultis quarendam esse, quae, infausto exitu superveniente, prius quam hectica affectio, cum omnibus symptomatibus eam comitantibus, excelli poterat, suffocatione aut paralyti (13) vitae finem imponunt, qui eo citius adest, quo gravius ac fortius causa pestiverat, simul cum suppuratione ultra semper procedente, in corpus agit.

His ita constitutis, et illis conditionibus phthiseos nomen haud inepte concedi posse arbitror.

Sed haec jam sufficienter praelogomena, quae in hunc spei jucundissima animo meo obversantur, ut in tractando argumento nondum satis explorata, et passim lectori humanitatis incipiente, adhuc sit, digna motum, certum esse, et si non...

1) Rheinische Jahrbücher der Medicin und Chirurgie, II. Band, II. Stück, pag. 57. — Charles Bell,

nino, aliqua tamen ex parte prohibent. Nimis vero severos ac difficiles speciminis mei iudices rogo atque oro, ut memores sint veteris sententiae: „Quod potui, feci, faciant moliora potentes.“

Diagnosis in genere.

Morbus ille, quem Phthisin laryngeam tuberculosam vocamus, in univrsum hic potissimum signis ac symptomatibus distinguitur: Raucitate qualibet, post diatheses phlogisticas membranarum pituitariorum et glandularum laryngis partium orta, cuius habere, si vero collum tangitur vel circumagitur, aucta et pungente dolore in certo quodam laryngis loco conjuncta, hujus tumore, deglutiendi facultate impedita, saepe vero penitus sublati, tussis brevis, iatransiens, pauca, et ulciferi progressu magis vexante, tussis inaequalis membranae adhaerentis, respiratione stridente, abrupta, fluidi purulenti subbrunei, e luteo ravi, viridis, interit, passim cum sanguine commixta expectoratione, odore puris ex ore, voce infirma acuta, sonante, postea rauca, blaesa, spicillata, mane vero penitus propemodum exstincta, febre hectica principio leni vel nulla,

serius vero plane exulta, corporis macie ac debilitate
universali, omnis denique generis colliquationibus.

Diagnosis in specie.

1. Stadium inflammatorium. Hocce stadium in universum dignoscitur statu sub-inflammatorio in organis palati molliis, faucium ac laryngis (14), cum quo conjungitur partium glandulosarum subnascentis durities, proinde tuberculorum formatio (15), item resolutio et condensatio (16) membranarum mucosarum, utique vero laryngis, quae conditiones probabiliter inflammationem per longum temporis spatium agentem, vel adhuc dum permanentem sequuntur, atque durante toto reliquo morbi decursu plus vel minus e symptomatibus cognoscuntur. Hinc igitur liquet, primum stadium nihil aliud esse, quam exitum irritationis chronico-inflammatoriae organorum glandulosorum et membranae mucosae laryngis, seu, ut aliis verbis utar, exitum catarrhi chronici in laryngis, qui partim diuturnitate et aegroti negligentia membra-

(14) Thomanni Annali instituti medico-chirurgici, Wirseburgensis, volumen 1., pag. 163. — Delpitii Dictionnaire des sciences médicales, tom. XXVII., pag. 267.

(15) Marci Specielle Therapie, II. Band, § 1103.

(16) Lorenzeri Krankheiten der Lungen, Berlin 1803, pag. 64.

nis pituitariis in consuetudinem jam transit, partim vero etiam organorum respirationis, praesertim laryngis, tenui debilique structurae organicae, cum magno ejusdem irritabilitate ac sensibilitate consociatae, originem debet. Haec autem, quam dixi, irritabilitas vel innata, vel serius ob varias causas, e. g. scrophulas, exanthemata etc., inprimis vero catarrhorum saepius redeuntium ope comparata esse potest (17), atque hoc in statu ad indurationem partium glandulosarum laryngis provocandam valde est proclivis (18), quae praesente inflammatione tandem in suppurationem abeunt, eoque illam progenerant phthisin. Jure equidem hocce stadium pro primo phthiseos laryngeae tuberculosae habendum censeo, cum primo symptomata, postea afferenda, tuberculorum formationem et membranarum laryngis condensationem innuant, deinde ea ipsa symptomata durante toto morbi decursu perseverent, cum denique in enumerandis phthiseos laryngeae symptomatibus Sachsus, Thomanus et Cheyneus (19) illa quidem in universum probe respexerunt, sed tali distinctione supersedere posse existimarint. Elapsis enim nonnullis hebdomadibus, mensibus, imo annis, prout nova catarrhalis affectio

(17) Richter's Specielle Therapie, II. Band, pag. 97.

(18) Richter's Specielle Therapie, II. Band, pag. 94.

(19) Pathology of the membrane of the Larynx, Edinburgh 1809, pag. 161.

vel morbosa quaedam organorum remotorum irritatio laryngis organis, quoad temperationem et excitabilitatem mutatis, se communicaverit (20), observamus affectiones phlogisticas palati, faucium et laryngis, item nodulos, grani miliaris magnitudinem aequantes, in posteriori faucium pariete, earum porro et laryngis (21) siccitatem, mane praecipue priusquam e lecto aegroti surgunt (quae vero per reliquum diei tempus vario gradu, verum non tam perspicue et manifesto percipitur), leve impedimentum, interdum etiam sensum in deglutendis cibis dolentem (22), quem mane excreando removere student, quique pari passu cum siccitate incedit, tensionem ac sensum injucundum et prementem in regione laryngis (23), quae per vices cum doloribus volatilibus et sensationibus dolorosis ac pungentibus ibidem commutantur (24), nonnunquam

20) Dr. Ficker in Hufelandi Journal, XLVIII. Band, IV. Stück, pag. 26.

21) Thomanni Annales instituti medico-clinici Würzburgensis, volumen I., pag. 163.

22) Delpitii Dictionaire des sciences medicales, tom. XXVII, pag. 267. — Thomanni Annales instituti medico-clinici Würzburgensis, volumen I., pag. 163.

23) Dr. Ficker, in Hufelandi Journal, XLVIII. Band, IV. Stück, pag. 27. — Richteri Specielle Therapie, IV. Band, pag. 738.

24) Sachsus in opere suo jam citato, pag. 51. — Delpitii Dictionaire des sciences medicales, tom. XXVII, pag. 267.

omnino cessare solent, sensum dolenter titillantem in larynge, qui capitis declinatione et circumactione, loquendo, deglutendo et pressione externa augetur (25), sive etiam frigidum aërem inspirando, loquendo, vel potum, inprimis frigidum, sorbendo, in tussiculam transit cum excreatione junctam (26). Quae tussicula principio levis et sicca est (27), interdum adeo nihil aliud, quam nisus plane irritis aliquid excreandi, ut et impedimentum, quod sensu percipitur, tollatur et titillationis molestia mitigetur; deinde tussis oritur catarrhalis (28) levis, quae nullius propemodum videtur momenti, simul tamen spasitice erumpit cum expectoratione fluidi niveo-gelatinosi, mucosi (29), modo sub-albi, modo ravi, modo coerulei, vel nigri (30), quod per diem parva tantummodo quantitate, mane vero aucta copia excreatur. Thomannus pressionem etiam sub sterno affert, quod Delpitius in libro, qui inscribitur: Dictionaire des sciences medicales — Tom. XXVII, p. 267, confir-

25) Schmalzii Diagnostica de dicta morbosa affectione.

26) Dr. Ficker in Hufelandi Journal, XLVIII. Band, IV. Stück, pag. 27.

27) Richteri Specielle Therapie, IV. Band, pag. 738.

28) Sachsus in opere suo jam allegato, pag. 51.

29) Dr. Ficker ibidem, ut apud numerum 26).

30) Richteri Specielle Therapie, IV. Band, pag. 738. — Hassii Specielle Therapie, IV. Band, pag. 227.

mat, ubi haec leguntur: „Bientôt une douleur se déclare à la partie supérieure du sternum.“ Hae affectiones morbosae sane quidem per temporis aliquid intervallum perseverant, nonnunquam fiunt mitiores et aegrotus bene se habere videtur, donec tandem post frigus corpore exceptum, vel in edendo ac bibendo intemperantiam, symptoma appareat, ad illud usque temporis momentum nondum observatum, raucitatem dico, quae modo remittit, modo crescit (31), postremo stabilis permanet, eademque, quamvis reliqua symptomata in universum levia sint iudicanda atque sanitas parum labefactetur, jure tamen ex ipsa patientis sententia symptomatis periculum minantis speciem induit, saltem majoris est habenda momenti quam simplex catarrhus. — Durante hac raucitate, praeterlapso jam aliquo ab ejus initio tempore, secundum incipit stadium,

II. Stadium suppurationis, atque adeo nova symptomatum series conspicitur. Hic vero duo casus sunt distinguendi: sive enim suppuratio in decursu magis chronico affectionum morbosarum, supra memoratarum, sine symptomatum periculum minantium praesentia, quae illius quasi sint praenuncia, statim post glandularum morbosarum singulis locis obviatur, ac superficiei occupationem tanquam suppu-

ratio ex ulcere aperto orta prodit, atque ita communem formam saepiusque occurrentem sistit, 1) phthisin quippe laryngeam exulceratam, — sive etiam in decursu magis acuto, postquam in altum penetraverat, pluresque glandulas lymphaticas simul corripuerat, tanquam suppuratio e vomica plane ex-culta originem ducens, observatur, eoque modo constituit; 2) phthisin laryngeam a vomica. De hac postmodum!

Cum hac enim raucitate, quae per temporis spatium sine intermissione perseveraverat, status quidam febrilis consociatur, qui principio lenis est, verum tamen, si expectorationis exiguitatem respicias, citato gradu procedit. Cum horripilatione, aestu et rubore genarum fugaci, praesertim lateris affecti, per vices vespere adest, pulsus in eo admodum fit debilis et acceleratus (32), neque tamen ita diu perdurare consuevit, aegrotoque propterea non omnem detrahit somnum. Tempore vero matutino fortes apparent sudores, qui patientem mox debilitant macieque extenuant, fluidi porro male olentis, discoloris, lutei, rari, viridis, revera puriformis, cum striis sanguineis mixta fit ejectio, vel expectoratio e massis globosis constans, ceu pura saliva cum floccis purulentis, qui in aqua fundam perant, ceu spuma (33),

31) Ut apud numerum 31).

32) Sachsus in opere suo de vomica pag. 324.

ceu fragmenta pseudo-membranarum, ceu ipsa vera cutis (34), denique ceu fragmenta cartilaginea separata, quae ad instar spongiae expansa sunt, vel cornu indolem referunt (35), apparet. Mane inprimis erumpit, cum sensu, ac si non e profundo veniat, vel cum tussi vehemente, sonante, stridente, imo latrante, ut in angina membranacea, quae quocunque cibi paulum liquidi usu, celeri devoratione, quavis atmosphaera pulvere et fumo repleta etc. spastice saepiusque provocatur (36). Interim ob organi exiguitatem parva tantum quantitate excreatio locum habet, quae per diem indolem magis spumose retinet. Simul etiam puris odor infestus ex ore provenit (37), qui, morbo ulterius progrediente, saepe circumstantibus et ipso aegrotis, licet munditiae studiosissimo, intolerabilis videtur. Membrana pituitaria faucium rubrum colorem induit, et vel magis fit soluta, atque glandulae parvae, granum milii referentes, tumidae dehiscentes, ulcuscula formant lentium magnitudinem aequantia; vox insigniter mutatur, primo fit acuta, serius rauca, debilis, spirans, sibilans et, ut verbis

34) Ut apud numerum 33.

35) Sachsus, pag. 77. — Morgagni de sed. E., pag.

36) Sachsus, pag. 51.

37) Richteri Specielle Therapie, IV. Band, pag. 759. — Schmidt's Diagnostica ejusdem morbi.

Caroli Belli utar, „cum sonitu stridulo siliquae vel „arundinis comparari potest,“ quid? quod ab ipsis circumstantibus vix exauditur, horis matutinis in magna laryngis siccitate fere exstinguitur et tum demum redit, si aegrotus fluidi quidquam sorbuerit (38). Respiratio, quamvis in mera laryngis affectione pectus libere extendi posset, quasi abrupta (39), anxiosa, spastica, stridens observatur, ita fere, ac si aer per fistulam siccam et angustam (40) vi penetraret, aegrotique sensum constringentem queruntur et spiritum attrahendo impedimentum quoddam in larynge accusant. Sensus injucundi, prementes, transitorii, dolorosi, pungentes, titillantes in regione laryngis, qui initio morbi aderant, in dolorem revera permanentem abeunt, cujus sedes plerumque a patiente loco quodam circumscripto indicatur, nec nisi in casibus rarioribus per totum laryngem diffunditur, nonnunquam vero consensu nervorum magis deorsum in tracheam, vel sursum ad linguae radicem propagatur, ubi in faucibus vehementer urere dicitur (41). Nocturno tempore augetur magna faucium et laryngis

38) Sachsus, pag. 54.

39) Sachsus, pag. 33.

40) Richteri Specielle Therapie, pag. 51. — Cheyne: Pathology of the membrane of the Larynx, Edinburg 1869, pag. 178.

41) Sachsus, pag. 54.

siccitate, tactu ac pressione, improvido capitis flexu et conversione, loquendo etcet. Impedimentum, glutinandi negotio obstans, principio exiguum, hoc in stadio summopere adaugetur, aegroti in cibis devorandis saepius offendunt (42), et hanc ob causam alimenta solida praeferunt, et ista tamen anxie quodammodo ac sollicite deglutire conantur, ne maiorem tussis impetum vel dolores in parte laryngis patiente cibis praeterlabentibus provocent, quin imo epiglottide quidem vehementer affecta quilibet liquidus vel solidus cibus sumendi conatus plane irritus erit et per nasum et os rursus eicientur, ita ut aegrotus, rebus sic comparatis, facile fame consumatur. Porro totalem sive partialem tumorem laryngis, tumorem et indurationem glandularum lymphaticarum in collo (43) et ob vehementem glandularum irritationem in universum et salivationem animadvertimus (44). Postremo duo adhuc in hoc stadio symptomata, a Sachsio primariis adnumerata et in casibus ab eo descriptis semper obvia, sunt consideranda, quae, licet ab eo solo hucusque sint observata, notatu tamen dignissima sunt. Etenim

42) Dr. Ficker in Hufelandi Journal, XLVIII. Band, IV. Stück, pag. 28.

43) Sachsus, pag. 49. — Dr. Ficker ibidem, ut apud numerum 42).

44) Sachsus, pag. 52 et 67.

si ejus auctoritatem sequimur (45), post peractum certum quoddam temporis spatium vehemens et spasmodica sternutatio praesto est, quae vel tussi excitatur, vel hujus est praenuncia: subito erumpit saepe decies continua serie, atque dolorem in larynge magnopere cumulat, insignem aegrotis languorem adferens. A sternutatione consuecta eo discrepat, quod non cum profunda inspiratione et hanc sequenti expiratione sonante consociata est, sed e pluribus, cito se subsequenibus aëris ejaculationibus constat, ita fere, ac si felis, avide cibis calidis inhians, eoque gustu explorans, sternutet.

Praeterea idem tanquam symptoma non minus attentione dignum affert, dimidiam partem linguae in aegrotis obduotam esse, quae res sic se habet: in eo latere, ubi patients dolores queritur, lingua ad medium usque per totam ejus longitudinem muco et flavo albo obtegatur, altera parte vero, quae plane separata sit, rubrum colorem retinente *)

45) Sachsus, pag. 33 et 252.

*) Mihi quidem duo morbi casus hujus generis in conspectum venerunt. Prior locum habebat in puella, cujus tractus intestinalis multa pituita oppletus erat, quare magna ventriculi debilitate, cum morbo pectoris statu conjuncta, laborabat. Ibi lingua e parte sinistra per totam ejus longitudinem muco albido obtegeta reperiebatur, dextera parte colorem insigniter rubrum retinente. Posterior casus in juvene quodam observabatur, qui ex phthisi laryngea tuberculosa laborabat, ubi linguam ita omnino, ut Sachsus indicavit, reperi,

Crassa illa, quae linguam obducit, materia in radice linguae flava est, ulterius vero versus apicem magis alba, quam alioquin in linguis obductis deprehenditur. Inprimis hic albus color tum notabilis est, si reliqua lingua etiam obducta sit, et si ille color non totam linguae dimidium occupet, sed inde a radice ad medium usque pateat, ac conii instar excurrat. Linguae radix itidem mutatur: fit crassior, rubra, papillae ejus alte eminent, et in basi sua ita mucro ex albo luteo obtegitur, ac si jam in suppurationem abierit.

Has modo dictas morbi in larynge conditiones vel status colliquativus cum symptomatibus eum stipantibus consequitur, vel alius status, jam prius memoratus, praecedit, qui a Flormanno (46): *Cynanches laryngeae* (47) nomine primo accuratius descriptus, sed, uti jure mihi videor existimare, a Sachtio (48) falso tanquam species quaedam degenerata phthiseos laryngeae tuberculosae consideratus est. De vomica videlicet, quae in larynge perfecte excolatur, sermo est, quam, quatenus tantummodo e causa intensive magis vim noxiam exerente oritur et saccum

46) Schwedische Abhandlungen, Jahrgang 1790, IV. Quart., Nr. 7.

47) Salzburgische medicinisch-chirurgische Zeitung, Jahrgang 1815, 1. Band, pag. 55 et 56.

48) Pag. 133.

clausum sistit, glandulas lymphaticas suppuratione affectas, ligamenta et cartilagine continentem, haud immerito ad stadium hoc secundum referendam putamus, cum utique, docente experientia, in fauste ejus exitu phthisis, quae talis, ut supra jam commemoravi, pateat. Post symptomatum in primo stadio enumeratorum decursu sive statu, singulis morbois conditionibus, quae formationem tuberculorum innuere possint, non adeo apparentibus, prout causa quaedam noxia majori vel minori vehementia in corpus egerit, omnia, uti consentaneum est, signa, ad vocis mutationem in casibus communiter obviis pertinentia, conspiciuntur; respirationis vero molestiae clariores sunt. Cum saepe utique omne internum laryngis spatium puris sacculo sit oppletum et aëri transitus claudatur, aegroti vel in periculum suffocationis incurrunt (quae et idcirco locum habet, quia cura sacculum rumpendi irrita fuit, et eo quod post rupturam ob magnam copiam per rimam glottidis non tam cito evacuari potest), vel cum humeris jam altum sublatis cum magno brachiorum motibus, supra oculis rigentibus, sub palpebris superioribus absconditis, cum perpetuo et spasmodico laryngis huc illuc motu, denique cum sono semper anxio, stridulo, etique, qui in angina membranacea editur, visibili, respirare coguntur (49). Loquela etiam patientis

49) Hawkinsius in Salzburgische medicinisch-chirurgische Zeitung, Jahrgang 1824, IV. Band, pag. 56.

valde impeditur et si caput paululum in anteriorem partem incurrat, omnino loqui non potest. Ob acutum magis causae pestiferae impetum ideoque simul semper praesentem irritationem phlogisticam ac membranarum pituitariarum condensationem plura adsunt signa verae anginae laryngeae, anginae membranaceae et aucti insultus rursus, raucae, vexantis, sonum anginae membranaceae imitantis, qui facile mortem adducunt (50), quibusque ad proprium est et peculiare, quod, antequam puris sacculus rumpitur, modo mere spumosa, muco commixta, modo vero purulenta quadam expectoratione sunt commixta, prout ulcera aperta praesto sunt sive minus. Pus in sacculo contentum hic tam male olens (51) reperitur, ut odor per membranas clausas penetrare dicatur (52). Deglutitio in quovis casu semper admodum est difficilis, prout puris folliculus major vel minor est, ipsa ciborum liquidorum devoratio quam maximam habet difficultatem, aegrotumque gravissimis exponit cruciatibus. Lingua, docente Flormanno, impura est, pulsus semper parvus et acceleratus, debilitas indies increscit, facies pallet anxiamque praese fert speciem,

50) Krause et Hampe in nota 131, ad Radham de Bronchitide, pag. 227.

51) Lieutaudi Historia anatomico-medica, tom. II, Observatio 65.

52) Sachsus, pag. 134.

larynx, valde sensibilis, summo vexatur dolore, dolorque iste communiter sedem mali complectitur. Nec deest interdum febris cum sudoribus nocturnis, vires penitus exhaustientibus conjuncta. Ancipiti huic et revera periculosae conditioni multis in casibus forma phthiseos syphilitica subest, quae in decursu satis acuto bubonem purulentum et clausum suscit, seriusocius rumpentem, tum vero formam vulgarem manifestantem. Hawkinsius ceu bubonis sequelam tres diversas ulcerum species statuit, quae in larynge formari soleant, et quatenus haec symptomata nobis offerunt, e quibus bubonem simul adesse facile colligitur, ut de vomicarum formatione disserens jam commemoravi, has diversas species breviter hic tangam. Prima horum ulcerum species in decursu celeri admodum passu procedit magisque acutae est indolis, secunda species lentius decurrit, tertia, rarius occurrens, multis cum doloribus est juncta. Auctor his tribus speciebus nomina acuti, chronici et dolorosi ulcers imponit. Decursus istorum ulcerum in tres periodos distingui potest, quorum in primo suppuratio ad fauces duntaxat pertinet, in secundo ad laryngem usque porrigitur, in tertio denique, nisi prius jam morbus vitae finem attulerit, trachea et pulmones in passionis consensum trahuntur.

Haec morbi conditiones, postquam per temporis spatium perseverarunt et quoad molestias locales cito increverunt, jam, modo serius, modo occlus, causa-

rum praegressarum et febris in totum corpus vi pestifera, colliquatio apparet. Tum vero plurimis utique in casibus ad extrema ventum est, vitaque misera et aerumnosa cum morte commutatur. Hic status ultimum ad ducit stadium,

III.) stadium colliquativum. Febris geminatur (53); cumque ea conjunguntur diarrhoeae faeculentae, sudores profusi viresque summopere exhaustientes (54), aphthae in ore (55), simul etiam desluvium capillorum, gryphosis, extremitatum tumores oedematosi, decubitus, pressio et sensus dolentes sub sterno (cum vel extravasatis seu fluidi in pectoris cavum effusio contigerit (56), vel si pulmones imperfectu in- et expiratione rite expandi nequeant), summa in faucibus et in larynge siccitas, ac plurimis omnino in casibus totalis vocis defectus. Sive tali igitur morbi exitu aegroti communiter fato perfunguntur, sive continuo musculorum laryngis stimulo, horum irritabilitas tali modo augetur et ejusmodi spasmus in coilo efficitur, ut plerumque ne ex

53) Haasii Specielle Therapie, IV. Band, pag. 127.

54) Delpitii Dictionaire des sciences medicales, tom. XXVII, pag. 267, ubi haec verba leguntur: „Enfin la diarrhée, les sueurs colliquatives, l'enflure oedemateuse des extremités“.

55) Richter's Specielle Therapie, IV. Band, pag. 739.

56) Rheinische Jahrbücher für Medicin und Chirurgie, IV. Band, pag. 68.

dimidia quidem parte fiat inspiratio, quantumcunque thorax transitum aëris promovere annitatur, corpusque ita conficitur, nervorum vis ita labefactatur, ut patientes saepissime status colliquativi terminum non attingant, sed vel apoplexia nervosa, vel angina suffocentur, vel, ut Sachsii imagine utar, „lucernae instar exstinguantur“, si vis nervorum in trachea fracta est et sic eorum cum respirationis musculis consensus tollitur. Quodsi e contrario patiens ad convalescentiam revertitur, sensim sensimque sane conditiones febriles et colliquativae evanescent, tussis, expectoratio ac molestiae morbosae in larynge cum irritatione inflammatoria decrescunt, vox rursus fit clarior, longius tamen praeterlabitur temporis spatium, antequam prior vis ei resituatur, aegreque omnino justam claritadinem recipit. —

Haec ergo imago est morbi, qui quidem haud raro observatur, sed in rerum natura non tam stricte quam hic in charta, secundum certa stadia dispesci potest; unum potius stadium ex improvise in alterum transit, itemque symptomata quaedam hoc vel illo casu constanter adsunt, in aliis vero vix animadvertuntur. Sic, e. g. morbi casus quidam narratur (57), ubi licet larynge magnopere confecto, diebus nonnullis ante mortem demum dolores in larynge persentire-

57) Hornii Archiv, Jahrgang 1815, pag. 548.

bantur, ubi porro in raucitate per octo annos perseverante, et quamquam initio anni ante obitum ultimi, magnum adfuerat suffocationis periculum, tussis et expectoratio, cum reliquis passionibus comparatae, minori gradu erant conspicuae.

Ponamus igitur, diversis in casibus unum alterumve symptoma aut deficere aut accedere, quo morbus quoad singula quidem symptomata sed minime profecto, quoad universalem ejus diagnosin phthisin indicantem immutabitur, cum utique secundum complicationem suam cum aliis morbis, secundum causas, corporis constitutionem, aetatem ac singularem cuiusque habitum sita definiendus; (haec enim potissimum eius mutationi subesse sunt existimanda); in quovis tamen casu haec modificatio, quatenus ad ipsam morbi naturam pertineat, sive minus, medici scientiae adjuvicio relinquatur. Imago illa morbi, quam ego ad describere studui, formam ejus plurimis in casibus occurrentem, sine complicationibus sistit; desumpta est ex morbi historiis, quas mox expositurus sum, ut et ex illis, quae Sachsus, Thomannus aliique auctores jam citati circa diagnosin protulerunt. Attamen etiam cum similibus affectionibus pharyngis et columnae vertebrae, cum phthisi tracheali ac pulmonali associatis apparet, quae te, uti consentaneum est, diagnosin quidem turbatur, sed quatenus haec desunt symptomata praecipue ac primaria, cognoscendo morbo nostro inservientia, nequaquam tollitur.

Quatenus vero ea, de qua loquimur, morbi forma praecipue cum affectionibus ipsius pharyngis et partium, inter pharyngem ac laryngem sitarum, cum inflammationibus chronicis membranarum mucosarum laryngis, cum struma, denique cum phthisi tracheali confundi et permutari posset, signa sequentia enumerando, quomodo distinguantur, ostendam.

1) Quod ad affectiones ipsius pharyngis partiumque inter pharyngem et laryngem sitarum attinet, sive positae sint in conditionibus chronico-inflammatoriis, sive in excrescentiis polyposis vel steatomatosis, sive in indurationibus, quin in ipsis suppurationi procesibus, jam mox morbo incipientem majores in deglutiendo molestiae, dolores versus posteriorem magis partem post cibum devoratum locum habentes, versus siccitatis in pharynge, vomitio fluidi puriformis, postquam per oesophagum in ventriculum intraverit, aut prius jam ob stimulum in pharynge, vel conatu quodam molesto, vel vomitu evacuatum fuerit, lingua ex toto mucosae oblecta, loquela plurimie in casibus satis distincta et expressa, quae continuam raucitatem, neque vocis defectum pedissequam habeat, tumor laryngis vix sub sensum cadens, qui potius lateris regionem occupat et manifesto inter laryngem ac pharyngem sentiri potest, haec omnia, inquam, indicia insufficiunt ad affectiones istas nostrae morbi formae distinguendas.

2) Quod porro formationem strumae et inflamo-

inflammationem chronicam membrandarum mucosarum laryngis spectat, ex mea sententia, prior, statu omnino jam extincto, vix cum phthisi laryngea tuberculosa confundi poterit, sane vero interdum durante ipsa formatione, permixta est, cum raucitas diutius permanens, tussis, fluidi mucosi expectoratio, sensus dolentes ac pungentes, pressione in laryngis regione facta, ejus esse comites perhibeantur; sed partim hi fugaces et per consensum orti fuerint, partim dolorum ipsorum sedes magis in circumjacentibus laryngi locis, praecipue in glandula thyreoidea esse potuerit, tum vero imprimis tumor citius se excolens, qui in nulla cum phthisi, sensim se evolvendi, est ratione, et magnitudo ejus enormis optimum praebent discrimen. Quatenus porro inflammationum chronicarum membranae pituitosae solius laryngis ejusdemque phthiicos permutatio locum habuit, sequentibus, meo iudicio, symptomatibus dignoscuntur: leves, saepe forsitan nulli dolores in larynge, vox rauca quidem, sed quae facile transeat, neque diu plerumque perseveret, neque in ulteriori decursu tam languida appareat, quam in phthisi, tussis fortis, humide sonans, cum expectoratione copiosa, mucosa, imprimis matutino tempore, respiratio gravis magis et oppressa, lingua albida materia multum obiecta ac motus febri-

254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683

vinii potatoribus (60), dolor magis est obtusus, passim remittit et perspicue magis in inferiori tracheae parte sentitur, plerumque vero in bifurcationis regione, quia hic ulcers sedes est (61), nunquam sursum ascendit, sed semper in bronchia descendit, ibi sensum prementem, dolentem excitans; tussi praecedit excretio, ipsa tussis continua est, ita ut in morbi decursu aegrotum omni noctis quiete privet, e profusio veniens ac temperata, cum strepitu crepitante (62), ut, ut fallor, in bronchitide, nec unquam stridula. In ciborum deglutitione tum demum excitatur, si pharyngem jam transierint, quo facto locum affectum praeterlabantur necesse est; tum vero efficitur quoque, ut cibi ejiciantur vel evomantur. Si aliqua extussio, jam cessant insultus, et ad hoc producendum requiritur, ut pectus in altum tollatur. In quibusdam casibus augeatur; si patiens ad lectum se confert. Expectoratio, salivam magis referens, filiformis est, quandoque vitis puris, nec pellucidis, in aqua subsidentibus commixta (63), et hebdomades aliquot ante mortem demum mere fit purulenta multoque aquosa

60) Sachsus, pag. 205.

61) Delpitii Dictionnaire des sciences médicales. Tom. XXVII. pag. 178, ubi haec dicta sunt: „Ordinairement à sa partie postérieure, et à peu de distance de sa bifurcation“.

62) Sachsus, pag. 222.

63) Sachsus, pag. 226.

laticae est temperata; ubi ceu faeces cerevisiae subaudit (64). Respiratio omnino et hic continuo molesta est, temporibus vero indefinitis horrendis suffocationis insultibus impeditur, ita ut patientes sedentes tantum, vel sine motu stantes respirare possint, fere ut in angina pectoris. Hi insultus subitanei sunt et vel per aliquot horas morantur, in ulteriori vero decursu non pro ratione morbi augeantur, imo versus finem passionis passim evanescent. Nunquam respiratio ceu spasmus in modum abrupta vel stridens apparet, sed semper asperum crepitantemque sonum refert (65). Febris post pluriam demum annorum molestias aegrotum aggreditur statimque indicia colligationis prae se fert. Decursus multo magis est chronicus. Quae quidem symptomata sufficiant, ut doceatur, ambas morbi formas signis sane characteristicis a se invicem posse distingui, qua de re plures medici Francogallici dubitasse videntur, e. g. Doubelius, Delpitius etc. Posterior in libro saepius jam a me citato (Dictionnaire des sciences médicales) Tom. XLIII pag. 171 haec tantum habet: „Elle doit surtout être distinguée de la phthisie laryngée, avec laquelle on l'a confondue jusqu'à présent: ces deux maladies se différencient non seulement par leur siège, mais encore par leurs symptômes, et peut-être aussi par“.

64) Sachsus, pag. 227.

65) Sachsus, pag. 230.

„leure causes“, — tomio vero XXVII pag. 268 affirmat: „La difference est encore aujourd' hui difficile à établir“, — quin imo tomio postremo allegato pag. 369 ait; „Les signes, qui distinguent la phthisie laryngée des tracheales, sont equivoques et obscurs. „Les principes, sur lesquels se fondent les indications curatives, sont les mêmes“. — Tabellari forma Sachiüs, quomodo ambae accurate a se invicem dignosci possint, in libro suo diagnostico a me jam laudato exposuit, ad quem lectores relegamus.

Morbi historiae.

I.

Liso, puella decem annos nata, constitutione debili, scrophulosa, cachectica, secundum ejus narrationem, festo Paschatis anno 1825, post forte frigus corpore exceptum, pectoris doloribus, imprimis vero vehementibus doloribus in regione laryngis, tussi valida, rauca, continua; cum expectoratione copiosa conjuncta, violenta denique febre, vespertino tempore exacerbata, correpta fuit. Peractis 14 diebus omnes affectiones quoad robur et vehementiam decrevisse videbantur, tussi tantum sicca, levi in deglutiendo impedimento, et passim redeuntibus, sensibus dolentibus, pungentibus, titillantibus in

larynge relictis. Jam aegrotata se plenam sanitatem recuperavisse autumavit; sed mense Majo, ejus conditio in pejus abire coepit: apparebat videlicet raucitas, ac tenuis expectoratio massae foetentis, puriformis, fragmenta globosa exhibentis. Haec phaenomena consociata erant cum foetore purulento ex ore, respiratione stridente et abrupta, tussi, fistulae sonum immitante, rauca, ei, quae anginam membranaeaeam indicare solet, simili, quae praesertim mane vehemens erat, porro cum dolore circumscripto, fixo, pungente in regione laryngis et sensibus dolentibus in variis thoracis locis, tumore externo laryngis, insigni molestia in deglutiendo, et in latice quocunque sorbendo cum magna perperam glutiendi proclivitate. Rebus sic comparatis, die VI. Augusti ejusdem anni in nosodochium hujus Universitatis literariae recepta est, ubi jam et sequentia symptomata prodibant: facies pallida, subflava, macie confecta, litigna materia subluteo-alba obducta, rubor palati ac faucium, cutis humida, pulsus parvus, frequens, subdurus, febris geminata hectica cum sudoribus vehementibus, vires frangentibus, tempore matutino intrantibus, totalis debilitatio et magna corporis macies. Inde a die VI. Augusti ad IX. usque Septembris anni commemorati, adhibitis pluribus remediis, mutationes in statu aegrotatae insignes animadverti poterant. Remedia illa adhibita consistebant e Sale ammoniaco depurato, e Calomel., Sulphure

rat. antimon., e Vesicatorio et serina e Se-
laceo in loco affecto, porro e vaporibus mol-
liantibus florum Ohamomill., Acet. vini
et aquae fervidae, ex Infuso cort. Chinae
cum Acid. phosph. dilut., extracto Chinae
aquis., extracto Trifol. fibrini. Quae vero
in patiente observabantur conditiones mutatae, se-
quentes erant: vox minus rauca, clarior, acutior,
magisque sonora apparebat, impedimenta in degluti-
enda fere omnia evanuerant, dolor in larynge levis
duntaxat, magis sensum obtusum, prementem aemul-
labatur, tussis et expectorationis non nisi tenues
aderant reliquiae, foetor purulentus ex ore nullus
jam sentiebatur, respiratio liberior facta est ac stre-
pentior, pulsus lentior, plenior; sudores matutini
jam modum tenebant, facies albidiorum ac blandiorum
prae se ferebat speciem. Ad usque diem XVII. Septembris
febris, in fine periodi prius memoratae leniter tantum
sudoribus matutinis, continuans, post continuatum cum
Chinae cum Acid. phosphor. dilut. usum
omnino evanuerat, nunc vero inhalationes va-
porum picis liquidae et salis ammoniac.
depurati propinatio auctis dosibus ad diem XX.
Octobris usque adhiberi pergebantur, ita ut aegrotans
postremo quater quotidie ʒj Salis ammoniaci sumeret,
quae facta durante hac periodo, haec in patiente
et valeudine mutabantur: vox propemodum ad per-
fectam claritatem redierat, respiratio sine omni im-

pedimento procedebat, tussis et expectoratio nullae
jam erant, ut patetis omnia comprehendam, aegrotans
nullo amplius affectionis cuiusdam localis sensu ex-
cruciabatur. Die XXI. post adhibitos picis liquidae
vapores momentaneus suffocationis insultus quidem
conspiciebatur, qui tamen, quamvis periculum minae-
retur, horis aliquot elapsis fellester transiit, irritati-
ones quasdam locales solummodo relinquens, contra
quas Emulsiō semin. papaveris albi cum
Extracto hyoscyami praescripta est. Horum
remediorum usus per aliquot dies adhuc continuaba-
tur, tum vero puella cum euphoria dimissa.
Postea saepius visa optime se habere professae est.
Vox vel clarior apparebat, quam cum e clinico esset
dimissa, nec unquam de tussi querebatur; levis tan-
tum proclivitas ad symptomata pectoris catarrhalis
suppererat.

II.

Anna, mulier Esthona 37 annorum, inde 2^o vice
geimo viro nupta, constitutione nervosa, die XIV.
Aprilis anni 1834. in sectionem medicam clinici Hōstii
recepta est. Septem ante hebdomadibus hinc inde
ab uberibus removerat, et non ita diu post catarrhus
eam invaserat cum symptomatibus huic propriis, tussis
et expectoratione, quae interdum sanguine commixta
fuerat. Simul dolores in larynge ac trachea, et, tussis

impetu vehementius eam petente, iudem in pectore senserat. Febrem comitantem non adeo molestam perceperat. Quae affectiones aliquamdiu perduraverant, dein expectoratio cessare coeperat et tussicula sicca facta erat. Dolores in larynge ac trachea majori quam unquam vehementia jam eam vexabant. Sensim magna faucium siccitas, deglutitionis difficultas et expectoratio pituitosa, puriformis, in universoni vero hand magna quantitate praesto fuerant. Raucitas semper increscens ex eo inde tempore aegrotam non deseruerat; puris odor ex ore perspicue animadverti poterat, nec non periodici febris insultus apparuerant, in primis vesperem versus et noctu, qui nocte ad finem vergente, inter sudores copiosos et insignem languorem afferentes, passim remittebant. Hoc in statu clinicum nostrum adiit. Raucitas ejus modam fere excedebat, vix, ac ne vix quidem, quod loqueretur, intelligi poterat, lingua materia subflavo-alba oblecta, palatum ac fauces rubescentia conspiciebantur, inspiratio sibilans erat, stridula et tanquam abrupta, pressione tentata, in larynge et superiori tracheae parte dolor manifestus, item sensus premens, dolorosus sub sterno percipiebatur, tussis erat rauca, laryns et modica ejectione stipata, pulsus mollis et valde acceleratus (140 propemodum ictus conficiebat), cutis humida, febris hectica valde acuta, sudores insigniter copiosi. Praeterea mag-

nam eamque universalem debilitatem querabatur: se et excretiones satis normaliter procedebant.

A die XIV. usque ad XXX. haec in ejus conditione mutabantur, postquam Calomel, Sulphur aurat., Digit. purpur., Acid. phosphor. dilut., China et Vericavoria, loco affecto applicata, adhibita fuerant: vocis raucitas parum remiserat, difficultates in deglutiendo et inspirando minores erant; tussis, quoad vim et vehementiam, decreverat, expectoratio magis pituitosa tantum et minori quam antea copia apparebat, puris odor ex ore, dolores in larynge, in trachea et pectore, ut et febris hectica, sensim disparuerant, pulsus frequentia et debilitas universalis imminutae erant. Diebus VIII elapsis, cum reditus ad salutem, nominatim quoad affectiones locales, adjuvari hand viderentur, ad applicationem setacei in larynge progressum est, imperataque ei sunt catapota e mixtione Sulphur aurat. antimon., Digital. purpureae et Extracto cicutae confecta, quibus porrectis, affectiones locales aliquatenus in melius mutatae videbantur. Ceterum de statu valetudinis ejus alteri doctores certiores facere non possum, cum pueris postquam ut ei petenti satisfaceretur, e nosocomio dimissa fuerit.

III.

Liso, puella XV annorum, constitutione phlegmatica, scrophulosa, quae saepius pravae coeli tempo-

rieli exposita fuerat atque eo catarrhum faucium ac laryngis sibi contraxerat, qui, cum debilitas membranae pituitariae horum organorum ei esset propria, cum continua momenta noxia in eam agerent, et, quae in tali conditione observanda sunt, negligenter, jam inveteraverat, tandemque in catarrhum huius in regionibus endemicum cum ulceribus faucium, syphiliti similibus, transierat, — haec puella, inquam, illo morbo affecta, initio mensis Julii anni 1824 in sectionem medicam nosocomii Academici recepta, et adhibito decocto Lign. nec non oratione ope Lactis in fini mensis Septembris ejusdem anni penitus sanata dimissa est. Primis mensis Januarii diebus anni 1825, posteaquam eadem momenta noxia de novo exposita fuerat, cum ulceribus faucium et phthisi laryngeae tuberculosa penitus expressa, ad institutum nostrum clinicum revertebatur. Symptomata hoc confirmantia haec erant: raucitas perfrax cum voce submissa, debili, sibilante, expectoratio fluidi puriformis, pituita commixti, copiosa, puris odor ex ore, locus circumscriptus dolens in dextro latere cartilagineae cricoideae, tumor satis conspicuus laryngis, tussis vexans, rauca, ei, quae angina membranacea oppressi laborant, similis, respiratio impedita, stridens, difficilis deglutitio, manus pharyngis siccitas, qui simul insigniter rubescebaty febri hectica cum exacerbationibus vesperinis et sudoribus viscosis exhaurientibus. In fine mensis Februarii

arii ejusdem anni omnes affectiones morbosae, si recte exceperis, quae ad pristinam puritatem ac claritatem reduci non poterat, usu Digitalis purpureae, Sulphuris aurat. antimon., Extracti hyoscyami, Chinae, Acid. phosphor. dilut., et adhibitis in loco affecto, festibus per Venationia derivationibus, evanuerant, et, si a voce discesseris, cenaeata dimissa est. Attamen, initio mensis Augusti ejusdem anni cum eadem passione, quae tantum ob constitutionem ita debilitatam, et cum adeo frequenter momenta noxia in eam egerint, ulterius quam antea progressa erat, in clinicum nostrum revertebatur. Conditio ejus jam non solum imaginem phthiseos laryngeae perfecte excultae exhibebat, sed et phthiseos trachealis praesentiam inde colligere haud erat alienum. Nam dolor pressione in trachea infra laryngem facta, auctus, respiratio gravis, postea sibilans, fluidi subflavo viridis, stridis sanguineis mixti, expectoratio, quae quandoque e profundo oriri videbatur, insultus suffocationis momentanei huic conjecturae respondebant. Quod ad phthisin laryngeam attinet, praesertim deglutitio difficilis (quatenus semper, quoties alimenta deglutienda erant, perperam deglutiebantur, eoque tussis vehementer excitabatur), sputa magnopere mutata et copiosiora, febrisque hectica duplicata eadem faciebant, morbum ulterius, quam antea progressum sistebant. Adhibitis omnibus remediis supra commemoratis, et

applicato laryngi setaceo, tamen morbus, mense Augusto vix exacto, exitum habuit lethalem.

Sectio cadaveris.

Parietes laryngis ut et tracheae materia mucosa, puriformi obiecti, cutis interna laryngis tuberculatum et ulcerum sanatorum plena erat ac singulae glandulae pituitariae, quae in suppurationem abierant, erosionum speciem prae se ferebant. Id praecipue in pariete posteriori musculo animadverti poterat. Epiglottis, excepta parva, leviter rubente, inflatione, quae reliqua remanserat, tota erat destructa, sed cicatrice obducta, et parum tantummodo versus regionem posteriorem occludebat partem, ubi aditus in laryngem est. Sacculi laryngis ac ligamenta rimae glottidis plane confecta erant, nunc vero non amplius ulcerosa, sed parvae, crassae, suborbiculares eminentiae solummodo observabantur. In latere dextro posteriori cartilaginis cricoideae ulcus conspiciebatur, quod in larynge pateret, cuiusque fundus cartilagineum contingeret. Recta sub laryngis erosio plurimum membranarum mucosarum suppurantium, trium circiter pollicum longitudine, in tracheam usque porrigebatur, quae subtilissimis suis ramificationibus inflammata erat. Pulmones cum pleurae et diaphragmate firmiter coaluerant, minusque excelsi et distincti erant. In pulmonis parenchymate non

tictus, nec induratio apparebat. Cor statum erat normale, pericardium cum diaphragmate cohaerens, ventris intestina omnia probae erant conditionis.

IV.

Adamus, puer rusticus, 13 annos natus, constitutione corporis phthisica ac scrophulosa, initio mensis Decembris anni 1825 tussi rauca, vehementi, secundum parentum narrationem, cum expectoratione, fragmentorum et membranarum plena, conjuncta raucitate, vehementibus in larynge doloribus, tumore glandularum colli praecipue in sinistra parte glandulae submaxillaris et parotidis, febreque torripiebatur. Tali in conditione puer, continuo momentis noxiis expositus, propemodum per tres hebdomades vivebat, naturae penitus commissus, sine medicorum auxilio et recta cura. Prout consentaneum est, malum igitur ulterius processit et vitae ejus, si phlogistica magis indole fuisset, diebus aliquot finis esset impositus, nisi hic decursus magis chronicus passionem effecisset, quae, omnibus symptomatibus rite consideratis, phthisis laryngea erat existimanda, et ita tribus hebdomadibus elapsis, exitum lethalem adduxit. Notandum adhuc est, quae tempore maxime in regione, ubi aegrotus debebat, febrem scarlatinam epidemice invadisse, eamque ante cum parentum illum inter alios infantes in casa tunc

tica a scarlatina remansisse immunem, huius loco vero affectionibus colli ac laryngis modo memoratis obnoxium fuisse, quae in universonum saepius cum scarlatina alternare videbantur. Porro multo minor laryngis affectio in iis aegrotis animadvertebatur, quibus scarlatina jam prorumpbat, quam in casu contrario, ita ut jam satis certo ex hoc symptomate colligi potuerit, num scarlatina omnino eruptura esset, nec ne. Hoc igitur tempore, tribus jam ab initio phthiseos laryngea, praeterlapsis hebdomadibus, aegrotus in conspectum mihi venit, statumque eius talem reperi: Parotis sinistra penitus in suppurationem abierat cavumque formabat magnum, ichore repletum, glandula submaxillaris nonnullaeque aliae in collo rupturam jam minabantur; manifesta fluctuatio in eis percipi poterat. Vox per diem rauca, debilis, mane, uti narrabant circumstantes, vix exaudienda erat; tussis erat vexans, rauca, latrans, cum expectoratione foetente, saniosa, luteo-subviridi, conjuncta, quae, quotiescunque tussis fortem faciebat impetum, incredibili copia eijceretur, atque aërem aegrotum cingentem adeo inficeret, ut vel nolentes se avertere cogerentur, tussis in cibo qualicunque deglutendo vehementius ciebatur, cibusque partim e naso et ore proficiebatur; respiratio stridens erat, rhoncho notabilis, et quasi abrupta videbatur, larynx insigniter intumuerat et versus partem sinistram in regione cartilagineae thyreoideae cum dolore

admodum mobilis, ita ut stridor manifestus auribus percipi posset; cavum faucium siccum erat, multaque locis membranae pituitariae in suppurationem transiisse videbantur; lingua materia alba obducta erat et in radice insigniter tumida apparebat. Porro obvia erant: sensus dolens sub sterno, summa enervatio ac macies, tanquam si figura ossea conspiceretur, decubitus in ambobus femoribus in regione genu, febris gemina hectica cum sudoribus nocturnis ac matutinis summo perecolliquis. Postremo et fistulam, quae inde a parotide suppurante ad laryngem usque porrigebatur, observare mihi visus sum, sed deficiente bono specillo brevi ductaxat acu ad regionem laryngis pertingere potui. Ut vero hoc statuerem, inducebar expectoratione mirum in modum copiosa, aurae meatu, quem inspirando et expirando animadvertere existimabam et puris in parotide eruptione, quoties tussis vehementior esset. Parotidem suppurantem pulvere Carbonum, decubitum decocto Quercus deligavi, et in usum internum grj Plumb. acet. ac grs Opii puti praescripsi. Quo facto discessi, eo quidem consilio, ut proximo mane redirem, verumtamen prius jam de morte pueri certior sum factus. Precibus etiam parentes adii, ut sectionem mihi permitterent, sed superstitiosis opinionibus imbuti, hanc mihi non concesserunt.

Epicrisis nonnullorum symptomatum.

Cum igitur in phthisi laryngea tuberculosa rau-
 citas, et in uterioti morbi decursu vocis omni-
 no defectus tanquam symptomata semper obvia,
 in phthisi tracheali contra vocis asperitas semper ob-
 serventur, jam reliquum est, ut ostendam et demon-
 strarem, quatenus ambae istae morbosae affectiones per
 se singulae in hisce passionibus laborantibus nun-
 quam non inveniuntur. Respicientibus vero totius
 arteriae asperae conformationem et diversam usus,
 nervorum distributionis ope, receptivitatem, et hic
 credo explicatio sufficiens inventu non erit difficilis.
 Ut sonus altus seu acutus producat, secundum prae-
 cepta physiologica opus est, ut larynx simul cum tra-
 chea valide sursum tollatur. Cum autem in tracheae
 affectione, ubi non solum organa glandulosa estusque
 membrana pituitaria, sed etiam, in passione gravio-
 ri, fibrae musculares longitudinales, quae subjacent,
 inapparabile sunt arrosa, larynx in altum attolli tan-
 tum non possit, quantum requiritur, sed potius irri-
 tatione morbosa in fibris muscularibus modo dictis,
 cum simul morbosa contractio augetur, vel magis
 deorsum detrahatur, proxime hinc consequitur, ut
 trachea brevior fiat, et ambae cartilagineae arytenoi-
 deae a se invicem removeantur, eoque vox gravis
 aspera efficiatur. Huc accedit, quod trachea multo
 minorem ostendit irritabilitatem ob pauciores, quo

accipit nervos, quam larynx, et quod in passione
 non mixta rami recurrentes nervi vagi solummodo
 correpti esse possunt. Horum vero, observante Mon-
 ro (66), partim pressionem asperitas duntaxat vocis
 et incisionem ipsam nunquam vocis defectus sequeba-
 tur, partim, observante Magendie (67), in muscu-
 los distribuuntur eos, qui ad dilatandam rimam glot-
 tidis conferant, contra autem rami laryngei superio-
 res nervi vagi in eos, qui rimam glottidis contra-
 hant. Ergo dilatatio et relaxatio contractione prae-
 valent et vox gravis fit et aspera. Quodsi contra af-
 fectionem laryngis respicimus, vocis mutationes hic
 multo graviores ac notabiliores reperiantur necesse
 est, cum primo affectio ipsum vocis apparatus cor-
 riperit, secundo vero ob majores nervorum ra-
 mificationes eorumque graviolem correptionem major
 ad stimulos, magna copia obvios, excipiendos locum
 habeat. Experientia quoque sufficienter demonstrat,
 quoties non solum rami laryngei superiores nervi
 vagi, sed etiam rami laryngei nervi sympathici, qui
 utrique proxime ad vocis modulationem conferunt,
 afficiuntur, toties statim etiam, prout affectio organa
 laryngis leviter tantum vel graviter corripuerit, rau-
 citatem, mox vero enormem debilitatem, imo defectum

66) Ueber Structur und Verrichtungen des Nervensy-
 stems, Leipzig 1787, pag 87.

67) Grundriss der Physiologie, 1. Theil, pag. 206.

tum vocis conciliari. Sic etiam in dilatatione ac contractione rimae glottidis status ei contrarius, qui in phthisi tracheali obtinet, locum habeat oportet, i. e. contractio dilatatione praevalebit, idque sonum stridulum ac respirationem quasi abruptam efficit. Posse vero raucitatem adesse sine directa laryngis affectione nemo sane in dubium vocabit. Ita e. g. apud Sachsium (68) casum quendam notatum invenimus, ubi sectio ulcus in regione bifurcationis, et go phthisi tracheali praesente, demonstrabat, ubique hominis vivente raucitas observata erat. Sed simul etiam inflammatio in membranis pituitariis tracheae reperiebatur, quae propemodum ad laryngem usque pertingebat. Quodsi hoc post mortem demonstratum est, inflammationem in vita vel ulterius propagatam fuisse commode statui potest, neque deest vocis mutationis sufficiens explicatio. Praeterea, ubi ejusmodi raucitas, imo vocis defectus locum habuit, post mortem animadvertemus excrescentias, ut polypos, steatomata et cet. (69), huic defectui causas subfuisse, pressionem, sive in pulmonibus sive in trachea obvia essent, in nervum recurrentem seu vagum exercendo, et sic aut ipsius trunci affectione per consensum reliquas ramificationes simul affici, consentaneam erat, aut vice versa affectio e ramificationibus ad ipsam truncum

68) Pag. 251.

69) Pötsch, II. Band, pag. 59.

propagabatur. Scimus denique stimulis a vermibus profectis (70), in tam variis feminarum molestiis hysteriis et quam frequentissime eo tempore, quo catamenia fluunt, item in colica Pictaviensi (71) saepe vocis mutationem per sympathiam produci, neque tamen inde directam laryngis passionem concludi posse.

Dolor, quatenus in altera affectione magis pungens et urens, in altera magis obtusus magnisque remissionibus insignis est, unice majori vel minori aegroti organi sensibilitate adducitur. Deglutitionis impedimenta atque in ulteriori decursu saepe obveniens prava deglutitio ipsa, quae semper utique in phthisi laryngea observantur, pari passu cum affectione epiglottidis incedunt; quanto magis haec destructa est, tanto majores illae sunt molestiae. His haec subest ratio: Ponamus, sententiam illam physiologicam, qua adstruitur, epiglottidem pontem quasi versatilem formare, ut cibus ac potus super laryngem in gulam transeat, falsam esse (quae revera a Magendie (72) oppugnata, a Meyero (73) hac observatione confirmata est: „Die Epiglott-

70) Sachsus, pag. 208.

71) Sachsus, pag. 207.

72) Grundriss der Physiologie, II. Theil, pag. 59.

73) Salzburgerische medicinisch-chirurgische Zeitung, Jahrgang 1824, III. Band, pag. 183 et 184.

„sich legt sich beim Schlücken nicht nur ganz über den heraufsteigenden Larynx herüber, sondern zieht sich an den Seiten so stark zusammen, daß die Ränder desselben eine neue Aushöhlung bilden, zumi sich der nun zugespitzten Form des Larynx anzupassen.“), in affectione musculorum laryngis tamen rima glottidis contrahitur, vel ubi epiglottis patitur, contractio et occlusio laryngis ob tumorem aut substantiae jacturam, imperfecta duntaxat erit, eamque ob causam prava deglutitio frequenter apparebit, qua re, uti in parte dissertationis diagnostica ostensum est, casibus periculosis obviis ipse cibus per os ac nasum rursus ejicitur.

Quoad sternutationem, quam Sachsius tanquam symptoma quoddam principale in medium affert, ac tum demum apparere perhibet, cum molestiae catarrhales prorsus disparuerint, haec statui oportere credo: cum in toto morbi decursu affectiones inflammatoriae plerumque plus vel minus perseverent, — iis in casibus, quibus illa apparebat, affectiones inflammatoriae, quamvis magis deorsum in tracheam propagari possent, hic magis sursum ferebantur et membranam pituitariam nasi corripiebant, talique modo, ceu symptoma ad nasi catarrhum pertinens, sternutationem excitabant. Hinc qua consensualis affectio tantummodo, et quoad phthisin laryngeam tantquam accidentalis consideranda est, quatenus phthisis non unicum malum aderat. Verum enimvero

sternutatio etiam secundum Sachsii (74) sententiam nisus naturae existimari potest, quo aliquando perfectam pectoris expansionem et ita liberam circulationem efficere, impedimentumque in rima glottidis obvium superare contendit, quoniam in sternutatione inspiratio plena ac profunda obtinet, quam expiratio fortis et vehemens subsequitur, hic non adeo magna vi, quam in statu sano, conspicua ideoque saepius altera post alteram repetita.

Quod denique obductionem dimidiae linguae partis et mutationes in ejus radice attinet, cum Sachsius censeo, non absolute necessarium esse, ut prior semper affectionis tractus intestinorum sit sequela, sed frequenter utique tanquam passio ratione consensuali cum larynge juncta consideranda est, praesertim cum amborum organorum obductio similis sit, et tanta necessitudine consocientur. Nonne statui posset, quum communiter ea linguae pars quoque afficiatur, ubi larynx morbo correptus est, membranarum pituitariarum laryngis jam in suppuratione versantibus atque hac jam latius vagante, hic in lingua indurationes glandularum pituitariarum cum aucta sublueteo-albida secretionem formari, indeque obductionem in dimidia linguae parte originem ducere? Mutationes in ejus radice unice aucta eo humorum congestionem eorundemque stagnationem

perficiuntur; inprimis vero inde major ampliorque prominentia papillarum vallatarum prodit.

Quamvis in universum phthisis laryngea frequenter sit observata et, quantum plurimis in casibus vitae periculum ininetur, neminem fugiat, restat tamen ut dijudicemus, quinam sexus, quae vitae aetas qualisque corporis constitutio potissimum ad hunc morbum sit proclivis. Ex *Sachsi* sententia (75) universim hominem quemcunque adoritur, marem et feminam, juvenem et senem, vigore corporis integrum et sanitatis speciem falso prae se ferentem, languescentem et cachecticum. Attamen eodem auctore affirmante (76) inprimis mediam aetatem raroque tantum infantilem, secundum observationes *I. Frankii* (77) vero sexum duntaxat masculinum corripere solet. Contra posteriorem opinionem haud immerito pugnam observationes *Sachsi* ac *P. Frankii*, nec minus morbi historiae hoc loco literis mandatae. Prior ipse in opere suo citato tres narrat morbi historias, ubi aegrotantes feminini fuerunt sexus (73). Quoad autem aetatem infantilem *Sachsi* praesumptioni, eam raro hoc morbo affici, vix

75) Pag. 26.

76) Pag. 26.

77) Acta instituti clinici Vienensis, An. II., Cap. XI.

78) Pag. 40, 67 et 128.

calculus erit adjiciendus. Rationes enim, quas affert, infantes videlicet, cum ob magnam ad exsudationes lymphaticas propensionem, tum ob non minorem ad convulsiones proclivitatem, quibus mors prius adducatur, quam ulcus quoddam excoli possit, hoc morbo neque affici neque exstingui posse, ei rei probandae non semper sufficient, et experientia saepe contrarium docuit. Quid? quod, contenderim potius, ipsam hanc organismi infantilis conditionem, qua ad exsudationes lymphaticas pronus est, insignem huic morbo opportunitatem praebere, quoniam his maxime annis inter corporis incrementa et usque ad plenam pubertatem systema reproductivum majorem in agendo vim exserit, quam serius, materiaeque secernuntur, ad organa sensim sensimque excolenda, necessariae. Quae materiae vasis exhalantibus parantur et ejiciuntur, atque praecipue in omnibus membranis pituitariis valentiores majorisque apparent momenti (79). Quodsi organon qualecunque, ut hic e. g. larynx, qui hac in vitae periodo profecto in majori se excolendi nisu et actione versatur (quod quidem mutata ejus forma et, quae adest, vocis commutatio luculenter demonstrant), stimulis phlogisticis corripitur, vel si in universum infantes dyscrasiae affectionibus, v. c. scrophulis, lepra etc. etc., uti

79) Horn's Archiv, Jahrgang 1812, II, Band, pag. 505.

proh dolor! saepissime contingit, laborantes continuo momentis pestiferis, epidemicis et endemicis, expositi sunt (ubi tam facile membrana pituitaria organi commemorati morbose adficitur, ac, semel debilitata, posthac semper fortasse male se habet), tum, illo organo in se excolendi negotio quasi semper occupato, materiae secernentes haud amplius vim plasticam recipiunt, ut forsitan in angina membranacea, sed sunt liquidiores, serosiores, purulentiores, erosiones et ulcera gignunt, atque adeo phthiseos imaginem in conspectum producant. E contrario dyscrasiis locum non habentibus, ut in infantibus robustis et succi plenis communiter videre licet, per noxia momenta status inflammatorius sthenicus exoritur, cum eoque simul ad exsudationem lymphaticam propensio, quae, rebus ita comparatis, plerumque anginam membranaceam exprimit. Facili autem negotio inflammatio, sibi relicta, nisi mors prius jam advenerit, irritatione justum modum excedente vel longiori mora in suppurationem abire solet, ideoque phthisin efficit, eam forsitan, quae vomicae originem debet, quaeque decursum exhibet magis acutum, symptomatibus anginam membranaceam referentibus semper comitata, quod quidem experientia saepius confirmatum conspicimus. Huic sententiae favent observationes virorum illustrium P. Frankii (80) et

80) Interpretationes clinicae Tübingenses, 1812, pag. 54.

Lechevrelly (81). Proclivitatem igitur ad exsudationem lymphaticam et auctam ad convulsiones opportunitatem in causis esse, cur phthisis laryngea tuberculosa in infantibus raro occurrat, quam sententiam Sachsus tuetur, nec verisimile est, nec omnino statuendum.

Hujus, de qua sermo nobis est, morbi formae frequentia in veterum scriptis vestigia invenimus, v. c. in Hippocrate (82), in Galeno (83), Aëtio (84), Marcello Donato (85). Prior, postquam phthisin pulmonalem descripserat et disertis verbis dixerat „Vox clara et sine dolore emittitur“ sic pergit: „Alius morbus. Si pulmonis fistula ulcere fervido et superficiali laborarit, febris lenis detinet, medio pectore dolor vexat et totius corporis pruritus, vox raucescit, sputum liquidum ac tenue exspuit, interdum etiam crassum ac velut ptisanæ succum. In ejus ore gravis odor, qualis ex piscibus crudis, suboritur, subindeque in sputo dura quaedam, velut fungi frustula, ex ulcere apparent.“ — Porro si observationes Cel-

81) Dictionnaire des sciences médicales, Tom. XLII., pag. 297.

82) Opera omnia, editit Foesius, recensuit Ernestius, a. 1596, pag. 475.

83) Methodus medendae, Cap. II. et III.

84) Medic. tetrah. II, serm. IV., cap. 46.

85) De medic. histor. mirabil. Lib. III, cap. I.

Lientandii in Historia anatomico-medica Tom. II. respicimus, symptomatologia quidem in observationibus No. 67. — 71 valde manca ac brevis est, interim ea, quae de sectionibus referuntur, omnia phthisin laryngeam tuberculosam indicant. Observatio 65 phthisin exulceratam et e vomica exortam simul exhibet. Haec enim sunt relationis verba. „Mulier octogenaria spirandi et diglutiendi difficultate cum faucium ardore laborabat. Sputa erant cruenta et spurulenta. Ingravescente demum spirandi difficultate interiit. In tracheae tergo infra laryngem tumor excreverat ad magnitudinem avellanae, putrida refertus materia.“ Denique in veterum recentiorumque auctorum scriptis de argumento a me tractato multas adhuc observationes reperimus, sed partim obscure tantum et incondite expressas, partim, ut jam dixi, breves admodum ideoque haud sufficientes, quas e libro Sachsii saepius jam laudato cognoscent lectores. Quum vero scripta illa perlustrare mihi non contigerit, ab eis nominatim afferendis consulto abstinui.

Causa proxima.

Phthisis laryngea tuberculosa pendet e statu quodam inflammatorio glandularum pituitariarum ac

lymphaticarum, quibus peculiaris in tuberculo ab ubi atque materias corpori extrinsecis ad receptionem et assimilationem adiectas peculiari quodam, distinctivo et abnormi processu in organo aegroto pituitaris specie evacuandi proclivitas propria est, quare igitur conveniens ac necessaria materiae commutatio locum amplius habere non potest, item conspicua substantiae jactura et corporis macies efficitur. Huic organi affecti prophetati tanquam conditio partim subest consensualis nervorum affectio et huic adhaerens magna vasorum debilitas, partim eadem processibus toxicis inflammatoriis in circumferentia loci suppurationis, denique suppuratione semper procedente per masses emortuas progeneratas sustentatur, quae, cum stimuli alieni, nocenter tantum et exitiose in corpus agere possunt.

Sectiones cadaverum.

Haec ubique inflammationes, indurationes, suppurationes et destructiones organorum laryngis ostendunt. Inprimis vero morbosae istae conditiones pertinent ad cuticulam laryngem cingentem cum glandulis mucosis et lymphaticis in hoc obviis, porro ad epiglottidem et rimam glottidis cum musculis suis et ligamentis, denique ad cartilagineas in larynge repe-

osidas, quae multis in casibus carie prorsus sunt destructae atque massas sistunt orbiculares, resolutas, spongiam referentes, quaeque vel liberae jam in loco suppurante natant, vel locis quibusdam adhuc sunt agglutinatae. Epiglottis, quae omnibus fere destructionis modis obnoxia est, modo ob condiciones pathologicas in membranis primitiis frequenter obviae et in sequentem horum organorum suppurationem singulis locis suppurata, in aliis vero enormiter conapissata et aucta est, modo etiam ob suppurationem nunquam cessantem prorsus non agnoscenda, noduli tantum magnitudinem aequans, vel etiam penitus confecta, ita quidem, ut ne vestigium ejus praesto sit. Rima glottidis, quae communiter post mortem formam suam crassam amittere solet, hanc vel post obitum ostendit, et quidem modo peculiari auctoque ambitu (86). Cartilaginee arytenoideae cum musculis ac ligamenti vel leviter suppuratione sunt affectae, vel affectio altius penetrat, cariem adducit, resolutionem eoque perfectam cartilagineum excretionem, ita ut partim loca ulcerosa, partim peculiaris carnis frustula tantum conspici possint, nulla vero ad artem composita rima glottidis forma. Quoad vero sacculos utrimque sitos, quodcumque latus praecipue affectum fuerit, vel unum vel alterum destructum reperitur. In eorum ambitu vel sanguinis massae montium

86) Saeboius, pag. 54.

instar ac vallium conspiciuntur, quae vero solidae sunt, neque excrescentiarum spongiosarum speciem exhibent, occultius etiam ad illas usque condensationes extenduntur, quae in posteriori laryngis pariete forma semper magis acuminata deorsum vergunt, clareque demonstrant, eas, quae pseudo-membranas in ulceris ambitu ex inflammationibus ortas, in massas carnosomembranaceas transisse, vel frequenti inflammatione pseudomembranis repletas sunt (87). Sic quoque in anteriori laryngis pariete similes invetustissimas destructiones, suppuratione productas, quae ad glandulas, etiam ac cartilagineas pertinentes modo superficiem, modo profunditatem corripuerunt, idemque sive organon multipliciter transformatum ac mutatum, sive penitus mutilatum sistunt. — Hi status pathologici omnes omnino semper praegressam antea suppurationem glandulosarum laryngis partium sequuntur. Fieri non potest, ut, quae de conditione cadaverum sectorum referuntur, omnia ea contineant, quibus morbus iste explicetur, et norma quaedam constitatur, ad quam ejus phaenomena sint exigenda, cum pro causis agentibus, pro constitutione aegroti, pro gradu mali, quod in singulo homine locum habuit et cetera nunquam non reperita varie ac mutabilia videri possint. Quocirca

87) Thomadni Abthals Instituti medico-clinici Würzburgensis, 1800, pag. 165 — 170.

supra allatae et inventae cadaverum in larynge conditiones, quae multis in casibus, ut indicatae sunt, occurrunt; hoc loco sufficiant.

Aetiologia.

Quaevs gravis externa laesio, praevalente constitutione scrophulosa, quae contusionem partium internarum sequelam habet, phthisi causam potest subministrare. Vapores materiarum acrium et irritantium, continuo inspiratae, inflammationes et indurationes in partibus glandulosis provocare valent, quae postea in suppurationem abeunt et tali modo phthisin adducunt. Haemorrhagiae regressae et suppressae, ut haemorrhoides, menses, cum actionem morbosam vicariam in laryngis organis provocant, quibus porro congestionis status ipse, magnis stagnationibus et indurationibus in organis abdominis effectus, ut in hypochondriacis ex haemorrhoidibus laborantibus saepe reperitur, frequenter destruendo agit in membranas pituitarias et glandulas laryngis, qua de re exempla adducit Dr. Ficker (88). Exanthemata formae acutae, quatenus peculiari quadam cutis debilitate et irritabi-

litate, subito cutis refrigeratione, prava curandi methodo et cet. facile vaga fieri solent, et ita cutem internam ac glandulas laryngis morbose corripunt, ipsa cutis nimia sensibilitas, secretionem materiarum impediens, talique modo dyscrasit in corpore oriundis occasionem praebens (89), haec omnia, inquam, inter phthiseos causas sunt numeranda. Ejusmodi dyscrasibus accenseri in primis debent rheumatica, arthritica, leprosa, herpetica, quae modo superficiem laedunt et indurationes, nodos et exanthema ad unam alteramque formam peculiariter pertinens progenerant, modo etiam partes magis internas, praesertim membranas pituitarias organorum respirationes invadere et inflammationes, indurationes, auctam mucii excretionem et ulcerum formas excitare possunt (90). Catarrhus porro chronicus, quatenus diurnitate vel negligentia, in primis debili respirationis organorum habitu praevalente (91), et ubi nulla vel imperfecta tantum crisis locum habuit, in organismi quasi consuetudinem transit, subitaque frigoris ac caloris vicissitudine, praesertim si cum humore conjuncta est atque per momenta noxia epidemica et endemica demum jam fortius jam minus graviter excitatur, talis catarrhus multis certe in casibus formationi tubercu-

88) Sachsius, pag. 58.

89) Sachsius, pag. 59, 60 et 62.

90) Sachsius, pag. 59, 60 et 62.

91) Richter's Specielle Therapie, II. Band, pag. 93.

88) In Hufelands Journal XLVIII. Band, IV. Stück, pag. 26. etc.

lorum ansam praeber, qui deinde in suppurationem abeunt et sic phthisin laryngeam plane excultam inducunt (92). Quaelibet laryngis inflammatio caractere hypersthenico, synochali conspicua, ut laryngitis acuta, angina membranacea et cet., itidem phthisin partis memoratae provocare valet, vasa lymphatica ac glandulas corripiendo, et malo in exitu praecipue in suppurationem posteriorum organorum transeundo. Plurimis in casibus acuto suo decursu vomitum gignit, quae postea rumpitur et exulceratam consuetam ob oculos ponit. Syphilis, sive manifesto appareat, sive occulti veneni instar in corpore serpat (93), non semper, more suo usitato membranam pituitariam faucium, sed modo serius modo ocus eam quoque laryngis occupat, et tali ratione phthisin quandam generat, de qua viri celeberrimi Althenhoferus (94), Josephus Louvrier (95) H. Hawkinsius (96), Carolus

92) Richter: Specielle Therapie, II. Band, pag. 94. — Bieneri Dissertatio de catarrho, Kienberg, 1801, pag. 26. — Winnekisi Dissertatio de catarrho, Berolini 1821, pag. 35. — Marci Specielle Therapie, II. Band, §. 1109. Lorgneri opus, Ueber die Krankheiten der Lungen, Berolini 1823, pag. 64.

93) Sachsus, pag. 108.

94) Russische Sammlungen für Naturwissenschaft und Heilkunst, I. Band, I. Stück, pag. 36.

95) Darstellung syphilitischer Krankheitsformen, Wien und Krems 1819, pag. 363.

96) Salzburgerische medicinisch-chirurgische Zeitung, 1824, IV. Band, pag. 36.

Bellius (97) exempla idonea afferunt. Porro quilibet copiosus Mercurii usus, quatenus febrem mercurialem, ulcera ac magnam membranae mucosae debilitatem gignere potest, causa et ratio phthiseos laryngeae existere potest (98). Quod denique scrophulaa attinet, haec sane tanquam causa frequentissima phthiseos sunt considerandae, cum partes glandulosas directe aggrediantur.

Prognosis

Haec in universum sequitur constitutionem corporis et aetatem aegroti, causas nocenter agentes actionemque continuantes, malum plus vel minus progressum, complicationes cum aliis morbis, denique quali conditione sit aeger, et num valetudinem suam bene vel male tueatur et foveat, diligenter respicit. Speciali modo sic colligitur: quo valentior ac robustior constitutio, quo minor opportunitas ad phthisin in universum et habitum scrophulosum adest, et quo magis homo juvenili aetate viget, eo major quoque

97) Rheinische Jahrbücher für Medicin und Chirurgie, II. Band, II. Stück, pag. 57.

98) Sachsus, pag. 29. — H. Hawkinsius in Salzburgerische medicinisch-chirurgische Zeitung, IV. Band, 1824, pag. 56.

spei apparatus foeta, ut ulterior mali progressus inhibeatur. Quodsi contraria criteria praesto sunt, afflicto omnibus, utique et celebratissima remedia peritiositer, etiam, atque modo, serius modo, ocius cum omnibus symptomatibus, colligationi propria, morte terminatur. Porro, quo simplicius passio ex affectionibus phlogisticis glandularum mucosarum ac lymphaticarum evolvitur, sine dyscrasiis praegressis et per annorum spatia in corpore obviis, eo meliora sunt omnia. Quo maturius malum agnoscitur, quo diligentius aegroti omnibus momentis nocentibus epidemicis et endemicis se subtrahunt, quo exactiori cura medica frui possunt, eo certius sanitate recuperata gaudebunt. Quo citius malum ingruit, sine affectionibus phlogisticis in membranis pituitariis laryngis, diu jam praegressis, quas communiter insignis subsequitur debilitas, eo majoris momenti ac symptomatibus distinctius expressus morbus initio videbitur, sed simul ac non deest maturum auxilium, profecto facilius erit sanabilis, quoniam major vis et energia in organis suppetit, qua causis nocentibus meliori successu occurratur. Quo complicatius malum prodit, eo magis anceps ac turbata prognosis, quo altius ascenderit, eo magis res erunt dubiae. Phthisis exulcerata minus periculi habet, quam ea, quae e vomica

993 Baume J. c. T. I., pag. 291. — Richeri Spéciale Therapie, IV. Band, pag. 603.

est. In infantibus morbus periculosior est, quam in adultis. Phthisis e causis syphyliticis orta propter certam et constitutam curandi rationem praesertim quavis alia diversis e causis nata optimis fortasse gaudeat auspiciis, nisi experientia obvenitum venereum in corpore non prius extirpatum, sed inde occultam mali naturam diagnoscosque majorem difficultatem peioribus silem faceret vaticiniis, nisi praeserea in manifesta laryngis per ulcera syphylitica affectione exitum saepius lethalem doceret, ut e. g. Altkhofers affirmat (100): se inter 1200 aegrotos in nosocomio publico morantes 25 cito semper cum morte hoc in morbo conflictantes vidisse. Si porro experientia remedium antivenerorum vim minus sufficientem in posterum confirmaverit, uti Cullerius contendit (101), bona secundaque omnia an sint adfuturum indubium vocari poterit, praesertim cum, quod equidem sciam, paucis tantum in casibus morbum hunc feliciter esse sanatum compertum nobis sit.

100) In Russische Sammlungen für Naturwissenschaft und Heilkunst, I. Band, I. Stück, pag. 36.

101) Dictionaire des sciences medicales, tom. IV, pag. 528, ubi Cullerius primum ait: „Chancres avoit son siège au bord inferieur du cartilage thyroïde, qui étoit un peu carié et échancré dans ces endroits. postea vera sic pergit: „N'ai trouvé d'indices qu'une phthisie laryngée fut venerienne, et que je n'ai vu aucune amélioration produite par les antiveneriens. Unum autem tantum casum observavi!

Cura.

Hinc, prima indicationem sequenti, pro-
posita est: curare cum occasionalium remotione,
equae indicatio ideomaximi propemodum est momen-
ti, quia ex illa haud neglecta plurimum valet, pa-
rum vero, vel nihil, si morbus jam penitus est excul-
tatus. Hoc loco de causis principalibus et quomode-
sint tollendae, disseram. Quatenus igitur phthisis
tanquam syphilitis sequela toto morbi decursu, ac ut
magis forma insignis est, ut in diagnosi dictum,
vel ceu hube clausus, aliis verbis, ceu romica, vel
exuberantiae specie apparet, extractioni tractatione the-
rapeutica dignam tam iudicari, quam reliquae cau-
sa postea commemorandas. Simul enim ostendere
libet, causam quaeque non eolum tanquam in
singulis ac locale organa nocenter agentem, sed
longiori mora tanquam statum morboe universalis ipsi
quasi inhaerentem considerandam esse. Forma phthi-
seos syphilitica adeo plurimis in casibus profecto
num unicum et exclusivum mercurialium exposcit,
eamque ob causam sententiae a Culleriero prolatae
(103), accedere dubito, qui nullam medendi rationis
antivenereae indicationem invenisse fatetur, si qua
mercuriana nihil conducere asserit. Observationes

(104) Dictionnaire des sciences medicales, Tom. IV,
pag. 528.

potius Sachsii (103), Josephi Frankii (104), Josephi
 Louvrierii (105) et Hawkinsii (106) me hi quoque sua-
 dent ut usum mercurialium haud rejiciamus. Nihilomi-
 nus exstant conditiones, quas Mercurii usum plane
 interdicit, et g. inimia debilitas, quae et ipso ve-
 neno syphilitico (107) et idcirco et continuo que Mer-
 curii usu, viro syphilitico nondum deletis, progeneri
 rari potest, malum nimis progressum, febris valde
 hectica cum colliquationibus conjuncta, Sic etiam
 Josephus Frankus (108) Mercurium, inquit, saluta-
 rem non esse, si jam ulterius morbus sit progressus
 et Hawkinsius (109) acutam ulcerum in laryn-
 ge formam, ubi simul virium totius organismi de-
 fectio adest, remedia excitantia requirere censet,
 quorum usus vero ob statum phlogisticum in larynge
 obvisum magnam desideret cautionem. Stradet igitur,
 ut vapor fol. Cicutae virosae inspirari habeatur, quae
 dissecta alendo apta observentur. Secundum est, ut

 (103) Pag. 69.
 (104) Annales clinicae, pag. 48.
 (105) Darstellungen syphilitischer Krankheitsformen,
 pag. 365.
 (106) Salzburgerische medicinisch-chirurgische Zeitung,
 IV. Band, 1824, pag. 65.
 (107) H. Hawkinsius, in Salzburgerische medicinisch-
 chirurgische Zeitung, 1824, IV. Band, pag. 56.
 (108) Pag. 49.
 (109) Salzburgerische medicinisch-chirurgische Zeitung,
 1821, IV. Band pag. 65.

sentiam optima remedia interna sunt Ammonium et Sassaaparilla, cujus posterioris syrupum commendat. In forma magis chronica indem Sassaaparillam, verum etiam inhalationem vaporum Mercurii praecip. rubr. et Zinnabaris adhibet. In forma dolerosa denipue usum Mercurii omnino vetat, contra vero prosperum successum animadvertisse credit ex usu Opii, magnis dosibus porrecti, nec minus ex adhibitis vaporibus decocti Opii et Acidi nitrici, aqua diluti. In adjumentum etiam Hirudines et Vesicatoria adhibere posse putat. Pessimis casibus, imo si bubonis suppurantis praesentia sit praesumenda, Emeticum propinari potest, ut pus evacuetur, vel et chirurgica operativa suas agit partes. Larynx videlicet aperitur, bubo compungitur, ulcus optimo cum successu solutione quadam lapidis infernalis adpergitur. Thomassius de usu Mercurii sequentibus verbis judicat (110): „In crescente itaque febre sub lenteascentis forma, accretio in trachea dolore, accedentibus mucis purulenti, excreatione, passim et tussi majoribus circa fauces, exulcerationibus facile conspicuis, difficiliore deglutitione, voce exili seu clangosa, auxilium praestitere grana unum Mercurii dulcis cum dimidio Opii per diem exhibitum, per reliquum vero diei tempus decoctum Lichenis Islandici, passim et decoctum Corticis Peruviani et vapores et inunctiones.“ Tum

demum in usu remedium roborantium ac nutrientium acquiescit, si omnia symptomata in pejus abierint, potus sorbitio suffocationem minatur, vox tenuissima ac loquelae defectus apparet. Ubi colliquationes praesto sunt, nihil praeter Opiam adhibet, ut passio leniatur. Richteris (111) sententiam suam his verbis explicat: „Da Schwäche der Schleimhaut meistens die Veranlassung ist, daß das venerische Gift die Lungen ergreift, und nicht seinen gewöhnlichen Ablagerungsort im Rachen, so verbinde man hier mit dem Merkur örtliche, das kranke Organ stärkende Mittel, als Lichen Islandicus, Radix Poligalae amarae et Cortex Chinae, wenn anders der Zustand nicht etwas Entzündliches hat.“ Cullerierii (112) ratio, cur ea, quae supra commemoravi, statuat, partim posita est in praecceptis ejus opinione, quod ulcus syphiliticum raro admodum in larynge deprehendatur, partim in ea, quae et in vita, arti salutari per 26 annos exercendae dicata, obigit experientia, qua unum tantum morbi casum hujus generis ei oblatum observavit. Ipsa ejus verba haec sunt: „Je n'en ai vu contre qu'un seul sur environ quatre-vingt mille malades, que j'ai soignés depuis vingt-six ans.“ Sächsius affirmat (113), vanum esse tiorem, quo

111) Specielle Therapie, IV. Band, pag. 666.

112) Dictionnaire des sciences médicales, tom. IV. pag.

praesumatur, febrem hecticam usum Mercurii omnino excludere. Sic igitur sententiae virorum celeberrimorum, quorum hic mentio est injecta, quoad Mercurii usum in syphiliticis phthiseos formis differunt. Nihilominus placitum illud certum ratumque esse credo, quod malum haud per longum temporis spatium perseverans in corporis constitutione alioquin bona; quamvis febris hectica jam adsit, curandi rationem mere antivenericam, eamque adeo vehementiorem, admittat eventumque utique salutarem polliceatur. In affectione contra diutius morante, ubi vel venenum syphiliticum per annos in corpore serpessit tandemque debilitate praevalente laryngem eadem firmiter elegerit, vel ubi diuturno Mercurii usu contra alias membranae pituitariae laryngis passiones partim debilitatae in his totoque corpore, partim veris syphilitici valde similis morbus mercurialis procreata sunt, phthisin Mercurii, uti consentaneum videtur, abstinendum est in ea curatione, qua aegroti remedia roborantia, nutrientia symptomatibusque respondentia exhibentur, acquiescendum est. A cura subtrahentis et diaetetica cum idoneo modo adhibitis liquorum decoctis profecto prosperi successus esset expectandus. In Catarrhus modo remedia requiritur agitabilitatem systematis vasorum directe deprimentia, sicut Nitras, Sal ammoniacum depuratum, Salis medicos et neutrales, Balsam Tamarindorum et Cassiae, Mucilago ginnosae et Oleum modo vero etiam ejusmodi medicamenta,

quae sensibilitatem eoque indirecte systema quoque vasorum deprimant. Quae talia consideranda sunt narcotica, extractum Belladonnae, Hyocyami, Cicutae virosae, Digitalis purpurea atque in coacibus rei accommodatis ipsum Opium, porro Acidum hydrocyanicum, Aqua lauro-cerasi et cetera. Modo postulat remedia resolventia et expectorationem promoventia, ut Mercurialia, et Antimonialia modo Diaphoretica, modo revulsiva, ut Ipecacuanham et Tartar. emetic, in dosi refracta, Extrinsecus commendanda sunt inhalationes vaporum solidorum, emollientium, florum Chamomillae, florum Sambuci et cetera, in ipso loco affecto Hirudines, Vesicantia et s. p. Denique catarrhato remoto remedia adhibemus membranarum pituitariam laryngis roborantia, ut Chinam, Lichenem Islandicum, Polygalam amaram et Senegam. — Stagnationes et indurationes in abdomine possunt modo extrahentia et resolventia, ut extractum Graminis, Taraxaci, cum Salibus medicis et neuralibus conjunctum, modo remedia fortiter resolventia, ut extractum Belladonnae, Cicutae virosae, Chelidonii majoris, Acidum hydrocyanicum, et aquam lauro-cerasi, Mercurialia et Antimonialia, modo drastica; postremo demum tonica porrigimus, sicut Ferri praeparata. Ex astheniata acuta et chronica regressa, et relictantibus requirunt remedia diaphoretica et valide revulsiva, sicut Scrophularia denique exigua antiscrophularia cum modis revulsivis et roborantibus consociata. —

Secunda indicatio in eo versatur, ut, si nulla adhuc praesto sit suppuratio, haec praevaleatur. Pertinet igitur ad primum morbi stadium. Quatenus hoc phlogisticum est, apparatus antiphlogisticus, sed ob minorem, quam in laryngitide acuta, vehementiam modo tantum circumscripto adhibetur. Pro gradu inflammationis exhibemus Nitrum cum Emulsionibus et extracto Hyoscyami junctum, Sal ammoniacum depuratum, et quidem fausto admodum successu, dosibus ad ʒjv quotidie ascendentibus, Acidum hydrocyanicum, narcotica, Antimonialia et Mercurialia, diversa Sulphuris praeparata et cet., vapores calidos, emollientes flor. Chamomill., Sambuci, Malvae et cet., cum Spiritu vini et Acido acet. conjunctos, inhalare jubemus, Hirudines et Vesicantia loco adfecto admovemus, calida pediluvia et integra balnea praescribimus. Victus ratio magis sit refrigerans, quam nutriens. Hac medela statim quoque utimur, si conditiones inflammatoriae intercurrentes in suppuracionis stadio locum habent. Quodsi omnibus remediis, quae allata sunt, adhibitis, nihilominus primum stadium in secundum transierit, tum

tertiaae indicationi is finis propositus est, ut benigni puris productio promoveatur et, si fieri possit, ulcus ad formandam cicatricem cogatur. Ad sustentandum igitur et adjuvandam gradum energiae sufficientem ac neces-

sarium in systemate irritabili, ex quo boni puris productio tota pendet, Tonica sunt inprimis, quae huic indicationi respondeant. Talia sunt extracta amara, haud calefacientia, ut et radix Polygalae amarae, magis adhuc lingum Quassiae, radix Colombo, praesertim vero Chinae infusa et decocta et Lichen Islandicus. Porro ad tollendum statum febrilem et bonam puris secretionem parandam, et ut ulceris cicatrizatio adjuvetur, cum remediis roborantibus Acida mineralia conseciamus, praecipue Acid. phosphoric. dilut., Acid. sulphur., Acid. muriaticum.

Quodsi hac ratione indicationi, quam posui, tertiae, satisfacere contenderimus, quia cum phthisi laryngea semper aucta laryngis receptivitas ac tussis pertinax, molesta, spasmodica conjuncta esse solet, quae, quo minus ulcus claudatur, impedit, praeter tonica omnino remedia mitigantia et narcotica sunt adhibenda. Hanc ob causam medicamentis memoratis inprimis Ipecacuanham in dosi refracta, Acidum hydrocyanicum (114), Hyoscyamum, Digitalidem purpuream et Opium interponimus. Ad removendum indurationem in ulceris ambitu, quatenus sanationi ejus impedimentum infert, efficacissimis utimur resolventibus, ut Conio maculato, extracto Aconiti et Belladonnae, Hepate Sulphuris salino et Antimonialibus,

(114) Schaefferus in Hufelandi Journal, LIII. Band, V. Stück, pag. 34.

propre nata etiam Mercurialibus, cum Opio vel Hyoscyami nuptis, et ceteris. Porro, irritatione phlogistica penitus sublata, commendatur inhalatio pulveris carbonici, vaporum picis liquidae, item herbae Chenopodii ambrosioidis (115), ut partim ulceris ambitus a pure foetido repurgetur et arctioribus limitibus circumscribatur, partim ut eo ipsum ulcus ad sanitatem perducatur. Extrinsicus in collo modo Linimentum camphoratum, et Unguentum Neapolitanum, modo Fonticulos, modo Setaceum ac Moxas adhibemus (116). In ipsis casibus pessimis faustissimum eventum conspicimus ex usu Cauterii actualis, vel facta laryngotomia, si locus ulceratus ipse solutione Lapidis caustici et lapidis infernalis conspergitur (117). Vomicae simul obviis has aperire solemus.

Diaeta semper mitis, nutriens ac roborans, sit oportet. Regredientibus tantummodo conditionibus phlogisticis cum antiphlogistica permutanda est. Tanquam remedium diaeteticum utique commendandum admodum celebratur semen haelecum salitorum, cuius, ventriculo adhuc vacuo, unum vel duo frustula sunt sumenda. Per tres hebdomades solo hoc reme-

(115) Dr. Ficker in Hufelandi Journal, XLVIII. Band, IV. Stück, pag. 29.

(116) Delphinii Dictionnaire des sciences médicales, pag. 270.

(117) Charles Bell in Rheinische Jahrbücher für Medicin und Chirurgie, II. Band, II. Stück, pag. 59.

dio adhibito, phthisis quaedam laryngea radicitus sanata fuisse fertur (118). Efficaciam suam vel maxime multae, quam continet, gelatinae ac mucilaginis copiae acceptam refert. Porro hic sunt commendanda varia lactis genera, praesertim lac equarum et asinarum.

Postremo quartam eamque ultimam indicationem sequentibus propositum est: incommoda aegrotorum minuere et symptomatibus molestis pro virili parte occurrere. Quatenus haec indicatio ad singula symptomata et periculum minitanti refertur, medendi ratio mere symptomata est. Hinc mox tussim pertinacem, vehementem ac spasmodicam lenire nitimur, dum patientibus decocta mucilaginosa radice Altheae, Salep, Sago, florum Verbasci, Tapsi, emulsiones calidas, cum Opio vel extracto Hyoscyami junctas porrigimus. Expectoratione gravi, difficili, stagnante, obvia haec remedia utique etiam cum parvis dosibus Sulphuris aurati Antimonii ac Vino emet. consociamus. Attamen hac in periodo sane pauca, saepe nulla omnino medicamenta liquida sumi poterunt, ideoque ad inspirationem vaporum calidorum, mollientium, ad cibos solidos magis et gelatinosos cum Opio et extracto Hyoscyami curam sic circumscribendo confugi-

(118) Dr. Sumserling in Hufelandi Journal, LIII. Band, III. Stück, pag. 115 — 123.

endum erit. Nocturnae quietis defectum et insomniam Opio levamus, sudores colliquativos operimentis refrigeratoriis, cybra hnteorum ac lectorum permutatione, usu interuo Acidorum mineralium, nominatim Acid. phosphor. dilut., Elixirii acid. Halleri et Mynsichti, vehiculis mucilaginosi praebitis, seris aluminosis et remediis e Saturnio paratis. Alvi profluvia colliquativa desiderant Gummi Kino, Cascariilam, corticem Simarubae et linguum Campechiense, extrinsecus enemata adstringentia enspimenta aromatica in abdomine. Decubitus postulat libonematum Aquis adstringentibus e Cortice Chinae, Salicis, Quercus Posterioris remedii praecipitatum Plumbo acetico effectum vulgo sumitur, vel etiam omnia in substantia adhibentur. Aphthae denique gargarismata, eaque adstringentia, cum Acido muriatico nupta, requirunt.