

155,543. ^a

*Изъ Гигіенической Лабораторіи Императорскаго Юрьевскаго
Университета.*

Матеріалы

къ изученію химическаго состава нѣкоторыхъ горько-
соленыхъ озеръ степей — Соляной, Абаканской,
Сагайской и Качинской, Минусинскаго округа
Енисейской губерніи.

ДИССЕРТАЦІЯ

на степень

магистра фармаціи

Ф. В. Людвига.



Юрьевъ.

Печатано въ типографіи К. Маттисена.

1903.

№ 342.331

Печатано съ разрѣшенія медицинскаго факультета ИМПЕРАТОР-
СКАГО Юрьевского университета.

Деканъ В. Курчинскій.

Г. Юрьевъ, 10 декабря 1902 года.
№ 1940.



D 168046

Предисловіе.

Въ теченіе болѣе 3-хъ лѣтъ моего пребыванія въ городѣ Красноярскѣ, Енисейской губ., я неоднократно имѣлъ случай слышать о цѣлебномъ свойствѣ воды озера Ши́ра, извѣстность о которомъ за послѣднее время распространилась далеко за границы Сибири, а также объ озерахъ Тагарскомъ и Шунетѣ. Водой изъ озера Ши́ра пользуются какъ для внутренняго употребленія, такъ и для купанія; озера же Тагарское и Шунетъ оказываютъ благотворное вліяніе на здоровье человѣка исключительно при купаніи, при чемъ главную роль играетъ илъ, находящійся на днѣ ихъ. Озера Ши́ра и Шунетъ расположены въ сѣверо-западной части Качинской соляной степи, а Тагарское въ Соляной степи близъ Минусинска, — всѣ три въ Минусинскомъ округѣ Енисейской губерніи.

Изъ всѣхъ озеръ Ши́ра далеко превосходитъ всѣ остальные, во-первыхъ своимъ лечебнымъ дѣйствіемъ при весьма многихъ болѣзняхъ, во-вторыхъ, своими размѣрами сравнительно съ другими, въ-третьихъ, прозрачностью и чистотою воды, дѣлающею купанье въ немъ пріятнымъ и, наконецъ, содержаніемъ значительнаго количества свободной углекислоты, маскирующей непріятный горькій вкусъ, присущій всѣмъ слабительнымъ водамъ. Этотъ богатѣйшій источникъ минеральной воды, представляющій собою цѣлое озеро, до 25 верстъ въ окружности, довольно значительной глубины,

быть недавно еще недоступенъ больнымъ, ибо онъ окруженъ со всѣхъ сторонъ глухой степью, гдѣ вблизи его не было ни одного домика, ни одной даже юрты. Благодаря неутомимымъ трудамъ Красноярскихъ врачей и въ особенности А. Г. Куркутова и В. М. Крутовскаго — въ настоящее время при этомъ озерѣ возникъ курортъ, который ежегодно посѣщаютъ до 600 лицъ; очень многія изъ нихъ получаютъ здѣсь излеченіе или, по крайней мѣрѣ, облегченіе отъ своихъ страданій. Само собою понятно, что благоустройство названнаго курорта находится въ зачаточномъ состояніи; объ удобствахъ или увеселеніяхъ, какія находятся въ хорошо устроенныхъ курортахъ, здѣсь не приходится говорить. Но если принять во вниманіе, что все устройство предпринято частными лицами, почти безъ всякой матеріальной поддержки со стороны правительства, то нужно быть весьма благодарнымъ этимъ лицамъ и за то, что сдѣлано. Употребленіе Ширинской воды съ лечебною цѣлью имѣетъ мѣсто не только на курортѣ: эта вода стала въ послѣдствіи продаваться и въ аптекахъ ближайшихъ городовъ, напр., въ Красноярскѣ; она такимъ образомъ сдѣлалась доступной всѣмъ жителямъ ближайшихъ мѣстностей. Точно также поступила въ продажу и выпаренная изъ нея соль, которая довольно часто отправлялась въ другіе города, даже въ Петербургъ. Въ Красноярскѣ Ширинская вода почти вытѣснила всѣ другія слабительныя средства и приобрѣла многихъ потребителей, остающихся ею очень довольнымъ. Впрочемъ при долгомъ храненіи ея въ бутылкахъ замѣчается одно неудобство: она теряетъ углекислоту, принимаетъ непріятный горькій вкусъ, вмѣстѣ съ тѣмъ въ ней появляются микроорганизмы, результатомъ жизнедѣятельности которыхъ является тухлый запахъ и вкусъ воды. Если бы наполненіе бутылокъ водою происходило на самомъ озерѣ и закупориваніе ихъ совершалось плотно при помощи машинки, то весьма возможно, что упомянутое измѣненіе воды не имѣло бы мѣста. Въ настоящее же время практикуется слѣдующій способъ разлива воды:

на озерѣ наполняютъ баллоны и разливаютъ изъ нихъ по мѣрѣ надобности въ аптекахъ. Въ бытность мою управляющимъ одной изъ аптекъ, имѣя въ своемъ распоряженіи машину для приготовленія минеральныхъ водъ, я попытался прекратить это неудобство слѣдующимъ образомъ: немедленно по полученіи Ширинская вода разливалась въ бутылки для минеральныхъ водъ, предварительно слегка насыщенная угольной кислотой, — относительно вкуса и запаха результаты получались удовлетворительные, и я не думаю, чтобы небольшой избытокъ углекислоты вліялъ на физиологическое дѣйствіе воды. Къ сожалѣнію, такой способъ наполненія бутылокъ на мѣстѣ, конечно въ большемъ числѣ, при первобытномъ состояніи путей сообщенія, почти не применимъ въ силу экономическихъ причинъ: это повысило бы цѣну вѣроятно вдвое — и тогда Ширинская вода оказалась бы недоступной, въ особенности бѣднымъ и потеряла бы отчасти свое значеніе для края. Принимая во вниманіе такое значеніе для края Ширинской минеральной воды, извѣстность которой все болѣе и болѣе росла, я рѣшился отправиться въ вышеупомянутую степь — съ цѣлью сдѣлать тщательное и точное химическое изслѣдованіе водъ озеръ Ширы и Шунетъ, самыхъ важныхъ между всѣми другими. Въ виду этого я обратился въ Министерство Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ съ просьбою о пособіи для приобретенія нужныхъ химическихъ и физическихъ аппаратовъ. Моя просьба была оставлена безъ послѣдствій, при чемъ было сообщено, что вмѣсто меня для изслѣдованія водъ вышеупомянутыхъ озеръ Министерствомъ назначенъ проф. И. Залѣскій. Хотя собственные мои средства были недостаточны, однако я не хотѣлъ отказаться отъ своего намѣренія, предполагая найти благодарное поприще для моихъ изслѣдованій соляныхъ озеръ, расположенныхъ въ вышеупомянутой и соосѣднихъ степяхъ, тѣмъ болѣе, что химическій составъ ихъ водъ пока былъ почти не извѣстенъ.

5-го іюля 1899 года, снабженный нужными стеклянками,

аппаратами и реактивами, отправился я изъ Красноярска, держа свой путь, подробное описаніе котораго помѣщаю ниже, сначала на югъ — въ Минусинскъ; отсюда я и началъ, собственно говоря, свое путешествіе по степи, какъ это видно изъ приложенной карты. Здѣсь же я хочу дать слѣдующее краткое обзорѣніе моего пути. Изъ Минусинска я отправился на югъ черезъ Соляную степь до села Каменки, при чемъ я дорогою посѣтилъ Тагарское озеро; у этого села я переправился черезъ Енисей и вступилъ въ Абаканскую соляную степь; направившись на юго-западъ, я посѣтилъ и изслѣдовалъ озера Алтайское и Кизиль-Куль; послѣ этого я направился на сѣверо-западъ и прибылъ въ Сагайскую степь къ Бейскому озеру. Отсюда, направлясь на сѣверъ, прошелъ черезъ южную часть Качинской соляной степи мимо озеръ Доможакова, Джемакуль и многихъ другихъ, совершенно высохшихъ, чтобы въ сѣверо-западной части той же степи предпринять изслѣдованія озеръ Шунеть и Билью. Направляясь на востокъ, я возвратился къ Енисею, изслѣдовавъ дорогою Горькое озеро, и сѣлъ близъ деревни Батеней на пароходъ, на которомъ пріѣхалъ обратно въ Красноярскъ.

Я имѣлъ сначала намѣреніе собранный матеріалъ работать въ одной изъ аптекъ Красноярска собственными несовершенными аппаратами, пользуясь краткими руководствами. Однако мнѣ представился благопріятный случай произвести свои изслѣдованія при Юрьевскомъ университетѣ, именно въ Гигіеническомъ Институтѣ подъ руководствомъ многоуважаемаго профессора Григорія Виталиевича Хлопина, охотно дававшего свои совѣты и всегда имѣвшего время и терпѣніе интересоваться моей работой, за что я считаю долгомъ изъяснить здѣсь сердечную благодарность высокоуважаемому господину профессору Гр. В. Хлопину.

I.

Географическія и геогностическія свѣдѣнія.

Минусинскій округъ, Енисейской губерніи, въ которомъ расположены нами изслѣдованныя и описанныя озера, занимаетъ громадное пространство въ 77640 кв. верстъ и лежитъ между 53—55° с. ш. и 107—111° в. долготы.

Интересующая насъ часть этого громаднаго, плодороднаго и весьма богатаго природными сокровищами округа, холмиста и имѣетъ совершенно степной характеръ. Во многихъ мѣстахъ этого плоскогорья земля покрыта солянымъ слоемъ; тамъ и сямъ сверкаютъ соляныя озера, или однообразность голой степи прерывается холмами, покрытыми лѣсомъ. Если мы разсмотримъ карту Минусинскаго округа, составленную Людвигомъ Шварцомъ, главнымъ астрономомъ Сибирской Экспедиціи Императорскаго Русскаго Географическаго Общества въ 1864 г., или же петрографическую карту того же округа, составленную К. Гревингомъ, то мы увидимъ, что все громадное степное пространство раздѣлено на четыре отдѣльныя степи, имѣющія каждая свое названіе. На востокъ отъ Енисея, около города Минусинска, между рѣками Шуба и Оя, на картѣ указана Соляная степь и находящіеся въ ней озера: Тысы-Куль, озеро Солдатово и Уртюпское. Къ сожалѣнію, названія находящихся въ этихъ степяхъ озеръ и расположеніе ихъ не одинаковы въ разныхъ картахъ. Такъ, напр., кромѣ упомянутыхъ картъ я имѣю

подъ руками карту, составленную топографами Енисейской губ. и отличающуюся очень большими размѣрами; на ней Соляная степь вовсе не упомянута, а вмѣсто вышеперечисленныхъ озеръ здѣсь помѣщены — Тагарское озеро и Кизилульскія озера. Это объясняется отчасти тѣмъ обстоятельствомъ, что количество воды во многихъ соляныхъ озерахъ весьма непостоянно; нѣкоторыя высыхаютъ лѣтомъ совершенно, весною же переполнены. Далѣе несогласіе показаній картъ зависитъ и отъ времени года, въ которое путешественникъ посѣщаетъ эти озера, и отъ пути, по которому онъ слѣдуетъ (такъ какъ врядъ-ли кто посѣтитъ всякое мѣсто этой страны), — наконецъ, отъ цѣли его посѣщенія и отъ размѣровъ составляемой карты. Вслѣдствіе этого я буду придерживаться картъ Шварца и Гревингга, вполне согласныхъ другъ съ другомъ, и только въ случаѣ надобности пополнять ихъ своими свѣдѣніями.

На западъ отъ Енисея простираются три степи. Изъ нихъ самая южная, между Енисеемъ и Абаканомъ, называется Абаканской соляной степью. Въ ней расположены озера: Горькое, Тамагашъ, Черное и Соляное. Первое изъ нихъ, вѣроятно, есть то Алтайское озеро, которое я посѣтилъ; въ водѣ его содержится много растворенной глауберовой соли. Последнее (Соляное озеро) я посѣтилъ въ той же степи и изслѣдовалъ подъ именемъ озера Кизилъ-Куль; оно было совершенно безъ воды, но посредствомъ буренія можно было добыть сильно соленую воду. По лѣвой сторонѣ Абакана, между рѣчками Аскизъ и Уйбать, простирается Сагинская или Сагайская степь, въ которой по картѣ находится лишь озеро Буланъ-Куль; однако здѣсь, при сліяніи рѣкъ Бея съ Абаканомъ, находится еще Бейское озеро, при которомъ въ настоящее время находится солеварня. Самая сѣверная и обширная изъ этихъ степей есть Качинская соляная степь, естественныя границы которой составляютъ: на сѣверѣ Чулымъ, на востокѣ р. Енисей, на западѣ рр. Черный и Бѣлый Юсь и на югѣ рр. Абаканъ и Уйбать. Эту степь

въ свою очередь можно раздѣлить на двѣ части: на сѣверную и южную. Между тѣмъ какъ въ послѣдней встрѣчаются по большей части небольшія, маловажныя или даже совершенно высохшія, сильно соленыя озера, изъ которыхъ на нашей картѣ обозначены озера Акъ-куль, Кизилъ-куль и Ючъ-куль и къ которымъ я желалъ бы еще присоединить озера Доможаково и Джемакуль, — сѣверная часть переполнена, наоборотъ, большими многоводными озерами, вода которыхъ мало соленая, или въ нѣкоторыхъ изъ нихъ, какъ, напр., Иткуль, даже совершенно прѣсная, употребляется жителями и богата рыбою. Въ этой же части помѣщены на картѣ большія озера: Ши́ра, Иткуль, Билёю, кромѣ того малыя озера: Черное, Фыркалово, Тустукуль, Орлово, Матаракъ, Бей-Булукъ и Аткуль; къ нимъ я могу еще присоединить озеро Шунеть — въ нѣсколькихъ верстахъ отъ озера Иткуль — и маленькое сильно горько-соленое озеро Горькое — по дорогѣ къ Енисею, т. е. на востокъ отъ вышепоименованныхъ.

Эти краткія географическія свѣдѣнія я желалъ бы пополнить нѣкоторыми геогностическими данными, добытыми профессоромъ Гревингомъ¹⁾ въ 1864 году; ими можно воспользоваться для объясненія происхожденія этихъ соляныхъ озеръ. Такъ между прочимъ названный изслѣдователь пишетъ: „Извѣстно, что геогностическій характеръ обширныхъ пространствъ въ Азіатской Россіи почти вездѣ отличается однообразіемъ; тоже самое повторяется и въ Минусинскомъ округѣ. Здѣсь можно указать много большихъ пространствъ, состоящихъ изъ солонцоватыхъ степей, простирающихся болѣею частью съ С.-В. на Ю.-З. Степная поверхность часто соединяется съ плоскогоріями. Что касается до малозслѣдо-

1) Шварцъ, Людвигъ. Труды Сибирск. Экспедиціи Императ. Русск. Географ. Общества. — Матем. отд. 1864. Приложение: Геогностическая часть путешествія Л. Шварца по Минусинскому окр. Восточной Сибири, составл. профессоромъ Дерптскаго университета, Докторомъ К. Гревингомъ.

ваннаго вопроса о количествѣ поваренной, глауберовой и горькой солей, которыя находятся въ степной почвѣ и въ соляныхъ озерахъ, — то должно замѣтить, что и верхняя почва нѣкоторыхъ горныхъ цѣпей заключаетъ вышеупомянутыя соли. Подлѣ степной почвы, происхожденіе которой, по нашему мнѣнію, надобно полагать ранѣе эрратической эпохи, по всему бассейну Енисея попадаютъ песчаники, похожіе на сѣрую вакку, известняки и даже сланцы; породы эти иногда поднимаются вверхъ изъ равнинъ и особенно ясно видны по краямъ плоскогорій. Но въ собственно гористыхъ мѣстностяхъ названныя выше породы уступаютъ мѣсто массивнымъ камнямъ разнаго рода. Въ томъ же самомъ трудѣ проф. Гревингкъ говоритъ о сравнительной древности горныхъ породъ, встрѣчающихся въ Минусинскомъ округѣ: „Самая древняя порода есть, безъ сомнѣнія, тальковый сланецъ и находящіеся въ связи съ нимъ кремнистые и глинистые сланцы; эти породы подняты протогиномъ и, можетъ быть, даже нѣсколько измѣнены имъ. Близки по древности къ протогину встрѣчающіеся здѣсь въ небольшомъ количествѣ гранитъ и сіенитъ; но если здѣсь встрѣчается первообразный слюдяной гнейсъ и рогово-обманковый гнейсъ, то эти породы надобно, по древности, поставить рядомъ съ тальковымъ сланцемъ.“

За поднятіемъ тальковаго сланца послѣдовало образованіе палеозайскихъ слоевъ (можетъ быть девонской формации): песчаниковъ, известняковъ и сланцевъ; эти горныя породы были подняты вертикально и прорваны діабазовыми породами, а изрѣдка фелозитовымъ порфиромъ. Въ это же время въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ повторилось поднятіе, произведенное протогиномъ и гранитомъ.

Протогинъ и діабазъ принимали главное участіе въ образованіи рельефа Минусинскаго округа. Послѣ поднятія палеозайскихъ сѣровакковыхъ формаций, вновь образовавшееся море покрыло страну къ сѣверу отъ Красноярска и произвело красный мергель, песчаникъ, сѣрый известнякъ и конгломераты — породы, которыя были относимы то къ де-

вонской, то къ юрской формации. Вся же страна стала покрыта вновь водою только послѣ большого промежутка времени, можетъ быть, во время третичной эпохи, и безъ сомнѣнія въ началѣ четвертичной, или новѣйшей эпохи. По волнамъ покрывающаго страну моря носились отдѣльныя ледяныя глыбы съ эрратическими камнями и различныя массы льда. Эти льдины оставили то, что было на нихъ, и даже на тѣхъ точкахъ, которыя въ настоящее время суть самыя высокія.

На вопросъ — „произошло-ли образованіе здѣшнихъ сланцеватыхъ степей въ то же самое время, въ которое была покрыта водою Сарматская равнина, только при другихъ условіяхъ, или произошло оно раньше“ — Гревингкъ отвѣта не даетъ, а только указываетъ, что „точное опредѣленіе древности пластовъ бураго каменнаго угля ниже Красноярска должно имѣть немаловажное значеніе при рѣшеніи изложеннаго вопроса“.

Наконецъ, хочу еще указать на мнѣніе того же автора относительно происхожденія озеръ; на стран. 159 онъ говоритъ слѣдующее: „Подпочва солонцеватыхъ равнинъ, или богатыхъ солью степей, простирающихся на западъ и на юго-западъ отъ этой рѣки (Чулыма), повидимому, состоитъ также изъ песчаныхъ и глинистыхъ сланцевъ. По крайней мѣрѣ гора Учумъ, между селами Ужурскимъ и Копьевымъ, состоитъ наверху изъ песчаниковаго, внизу изъ глинистаго сланца. При подошвѣ этой горы собираются водные источники и, соединившись въ одинъ небольшой ручей, текутъ въ озеро, которому вѣроятно и сообщили мало по малу свою соленость“.

Мало компетентный въ этой отрасли знанія — я не берусь судить о правильности изложеннаго мнѣнія, также не старался я отыскать въ литературѣ новѣйшія работы, трактующія о геологическомъ и геогностическомъ характерѣ Минусинскаго округа, такъ какъ моя задача чисто химическая, что видно изъ заглавія этой работы.

Литература.

Какъ можно было предвидѣть, литература о малолюдномъ и малоислѣдованномъ степномъ краѣ Минусинскаго округа скудна. Хотя многочисленныя соляныя озера, расположенныя въ немъ, съ нѣкоторыхъ поръ и обращали на себя вниманіе путешественниковъ, но послѣдніе ограничиваются описаніемъ лишь наружныхъ признаковъ озеръ, т. е., ихъ длины и ширины, при чемъ степень солености ихъ водъ опредѣлялась по большей части только на вкусъ. Иногда дается и краткое описаніе окружающихъ озеро горныхъ породъ. Химическіе же анализы воды производились очень рѣдко и начались лишь съ тѣхъ поръ, когда изданъ былъ указъ, по которому вода озеръ, изъ коихъ добывается поваренная соль, должна быть подвергася отъ времени до времени химическому анализу въ устроенныхъ особо для этой цѣли лабораторіяхъ. Разумѣется, анализы эти имѣютъ болѣе техническое, чѣмъ научное значеніе.

Знакомясь съ этими скудными литературными данными, мы узнаемъ, что первымъ посѣтилъ Сибирь естествоиспытатель Гмелинъ¹⁾, путешествовавшій въ концѣ первой половины XVIII вѣка. Къ сожалѣнію въ четырехтомномъ объемистомъ описаніи этого путешествія Гмелинъ объ интересующей насъ части Сибири почти ничего не говоритъ, не потому, чтобы онъ этотъ край вовсе не посѣтилъ, ибо онъ нѣсколько разъ бывалъ въ Красноярскѣ и проѣзжалъ черезъ Абаканскую степь, какъ видно изъ приложенныхъ къ сочиненію карты и описанія, а потому, что объ озерахъ нечего было сказать, такъ какъ химическій анализъ ихъ воды не былъ произведенъ. Вторымъ Сибирь посѣтилъ естествоиспытатель Палласъ²⁾. Въ III части описанія его путеше-

1) D. Johann Georg Gmelin. Reise durch Sibirien von dem Jahre 1733—1743 (4 Bde).

2) P. S. Pallas. Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs. III часть. 1772—1773.

ствія, на стр. 323, сообщается, что онъ 19 августа 1772 г., покинувъ Красноярскъ, въ тотъ же день направился къ Саянскимъ горамъ, и, проходя по песчанымъ холмамъ, въ трехъ верстахъ отъ Уюса, встрѣтилъ первое иловатое горько-соленое озеро „Кичи-Куль“, о которомъ говоритъ: „разсолъ по берегамъ и вода немного щелочны“. Немного далѣе, за другой возвышенностью, находится малое, высохшее и безымянное озеро, а перебравшись черезъ довольно высокій и скалистый хребетъ, достигаемъ озера Тусту-Куль. Это продолговатое извилистое озеро — находится въ сухой, плоской долинѣ, окруженной со всѣхъ сторонъ горами изъ песчаника. Хотя вода его весьма солена, однако на берегу нѣтъ слѣдовъ разсола“. „Отъ Тусту-Куля направился я на востокъ черезъ высокое плоскогорье и только ночью прибылъ къ моимъ спутникамъ, которые по прямой дорогѣ отправились было къ юргамъ на берегу „Тарги-чуля“. Тарги-чуль вливается въ Было-Куль, который на этотъ разъ остался по лѣвую сторону. Въ еще большемъ разстояніи осталось по правую сторону расположенное въ трехъ верстахъ отъ Уюса озеро Фыркалово. Пройдя между маленькими озерами Урланкуль и Иткуль и переправившись черезъ ручей Туюнъ, вливающийся въ Было-Куль, а также черезъ Большой Иткуль, вливающийся въ Карышъ — прибылъ я на слѣдующій день въ Карышскій рудникъ“.

„Большой Иткуль вливается въ ручей Туюнъ и, слѣдовательно, въ Было-Куль, черезъ маленькій каналъ и Урланкуль, который у русскихъ называется „березовымъ озеромъ“, вслѣдствіе окружающей его березовой рощи; маленькій Иткуль, имѣющій въ длину не болѣе полверсты, сообщается съ Туюномъ и сосѣднимъ Шаракуль. Каспукуль, наконецъ, вливается въ Карышъ. Всѣ эти рѣки составляютъ соединенную систему озеръ, не имѣющую сообщенія ни съ близкимъ Цосомъ, ни съ Енисеемъ, но главнымъ бассейномъ которой является окруженный открытыми горами „Было-Куль“. Покидая Карышъ, Палласъ пишетъ: „До ручья „Сонъ“

путь мой былъ тотъ же, по которому я слѣдовалъ въ прошломъ году. Маленькое круглое озеро, мимо котораго протекаютъ сейчасъ за горою, въ которой находится Карышскій рудникъ, татары называютъ „Батерикулемъ“; озеро же, въ которое вливается ручей Сонъ безъ дальнѣйшаго истока, называется „Шира-Куль“ и немного солонцевато“.

Далѣе читаемъ: „отъ ручья Карасукъ до рѣчки Уйбатъ простирается голая, неплодородная степь, не производящая ничего, кромѣ сухихъ травъ, полыни и нѣкоторыхъ другихъ тощихъ растений. Ближе къ Карасуку находятся два очень соленыхъ озера, отдѣленныхъ другъ отъ друга возвышенностью, изъ которыхъ „Ючь-Куль“, имѣющій значительную величину, остается по правую сторону, по лѣвую же маленькое озеро „Кизить-Куль“, кажущееся красноватымъ“.

„Вблизи отъ „Уйбата“ находится еще маленькое озеро, берега котораго покрыты бѣлымъ налетомъ, въ виду чего татары называютъ его Акъ-кулемъ“.

Въ другомъ мѣстѣ Палласъ пишетъ: „На равнинѣ, въ десяти верстахъ отъ Луговскаго завода, немного въ сторонѣ отъ дороги, находится маленькое горько-соленое озеро, съ иловатымъ дномъ. Съ востока на западъ оно продолговато, имѣя въ діаметрѣ 400 сажень, однако вода его въ это время не достигала береговъ. Разсолъ его содержитъ чистую глауберовую соль въ такомъ большомъ количествѣ, что въ холодное осеннее время она кристаллизуется. Во время вчерашней бури на низменный берегъ была выкинута масса маленькихъ кристалловъ глауберовой соли. Западный берегъ озера покрытъ камышемъ. Въ 15-верстахъ отъ этого озера находится село „Минюса“¹⁾. Наконецъ Палласъ упоминаетъ о горько-соленыхъ озерахъ — въ углу между Енисеемъ и Абаканомъ, сообщая, что они малы, топки и рас-

1) Хотя это озеро не обозначено по имени, однако изъ описанія несомнѣнно можно заключить, что Палласъ посѣтилъ „Тагарское озеро“.

положены недалеко другъ отъ друга. „Одно изъ нихъ находится въ тянущейся между скалами на западъ долинь, вблизи дороги, ведущей вдоль Енисея; длиною оно въ 1 версту, а шириною около 400 сажень. Въ восточной части его растетъ камышъ. Къ осени озеро почти совершенно высыхаетъ, и на черномъ иловатомъ днѣ его имѣется осадокъ горькой соли. Другое озеро находится въ той же долинь въ полуверстѣ отъ предыдущаго, имѣетъ ту же величину и сходныя свойства“.

Только что приведенныя описанія подтверждаютъ сказанное нами выше о томъ, что въ первыхъ сообщеніяхъ ничего не говорится о химическомъ изслѣдованіи озеръ; все, что мы узнаемъ объ озерахъ, относится только къ географическому положенію и къ описанію нѣкоторыхъ внѣшнихъ признаковъ. Слѣдующія затѣмъ печатныя сообщенія о вышеупомянутыхъ озерахъ относятся къ 1828 г.¹⁾ Авторъ послѣднихъ, говоря о сибирскихъ соляныхъ источникахъ, раздѣляетъ ихъ на „соляныя самосадочныя озера“ и „солеваренныя заводы“, а далѣе — соляныя самосадочныя озера на „Иртышскія“ и „Енисейскія“. Такъ какъ насъ интересуютъ лишь Енисейскія озера, то я позволю себѣ привести только касающееся ихъ, а именно: „Енисейскія озера лежатъ не въ дальнемъ разстояніи отъ хребта горъ, сопровождающихъ рѣку Енисей и по округѣ называются Красноярскими. Числомъ ихъ всего пять; но добываніе соли производится изъ одного только, именуемаго Степнымъ“.

„Соляныя сибирскіе заводы суть: Троицко-Енисейскій въ Енисейской губ. и т. д.“.

„Соль изъ самосадочныхъ озеръ добывается вольнонаемными людьми; на солеваренныхъ заводахъ всѣ работы производятся ссыльно-рабочими“. Далѣе авторъ говоритъ: „Красноярскія озера, при новомъ раздѣленіи Сибири, оста-

¹⁾ Горный Журналъ за 1828 г. № 5, стр. 109—129. О сибирскихъ соляныхъ источникахъ. (Сообщ. Чайковскимъ).

лись въ предѣлахъ Енисейской губерніи. Ихъ, какъ выше замѣчено, пять, именно: Степное, имѣющее въ окружности — 7, Караловское — 4, Тагарское — 2, Уртютское — 4 и Бейское — 2 версты. Изъ нихъ одно только Степное разрабатывается, прочія остаются неприкосновенными по необходимости и по горькому вкусу ихъ солей; горечь сія примѣтна даже въ соли озера Степного, но она отдѣляется домашнею варкою.

Озеро Степное лежитъ между отлогостями Кузнецкихъ горъ, почва его песчаная, а берега болотисты. Оно удалено отъ лѣсовъ на 30 слишкомъ верстъ. Садка соли началась на немъ съ 1812 года; до того времени, какъ тамошніе старожилы увѣряютъ, не было урожая 40 лѣтъ сряду. Выломка соли производится сосѣдственными крестьянами по условіямъ. Соль садится въ видѣ пласта, толщиною не болѣе полувершка, на черепѣ горькой соли. Работники свободно ходятъ по сему черепу съ деревянными лопатами, обдѣланными по краямъ желѣзомъ, разламываютъ пластъ и сгребаютъ соль въ кучи, потомъ складываютъ въ особые на колесахъ ящики и вывозятъ на берегъ. Въ 1826 году добыча соли здѣсь не производилась, ибо въ запасѣ при озерѣ состояло до 220 тысячъ пудовъ, а въ расходъ вышло въ теченіе сего года не болѣе 38 тысячъ; слѣдовательно затѣмъ въ запасѣ остается до 182 тысячъ пудовъ“.

Разбираемый авторъ знакомитъ насъ съ двумя новыми озерами, о которыхъ Палласъ не упомянулъ, именно, съ „Степнымъ“ и „Караловскимъ“, и одновременно указываетъ на чрезвычайное богатство перваго изъ нихъ поваренной солью, рассказывая, что запасъ въ 220 тысячъ пудовъ могъ накопиться, несмотря на годовой расходъ въ 38 тысячъ пудовъ (въ 1828 г.). Что это озеро въ большомъ количествѣ содержитъ также и глауберовую соль, видно изъ словъ: „соль садится на черепѣ горькой соли“. Итакъ, несмотря на другой, повидимому, составъ воды, это озеро не составляетъ исключенія въ сравненіи съ другими, изъ которыхъ

поваренная соль не добывается, вслѣдствіе горькаго вкуса ея, что, впрочемъ, зависитъ главнымъ образомъ отъ концентрации разсола.

Три года спустя, въ своихъ „Запискахъ объ Енисейской губерніи Восточной Сибири“ пишетъ о соляныхъ озерахъ Минусинскаго округа И. Пестовъ¹⁾. На стр. 10, § 3 онъ даетъ краткое обзорѣніе, при чемъ кромѣ извѣстныхъ намъ уже озеръ — Степное, Каралаевское (должно быть Караловское), Тагарское и Уртютское, указываетъ еще на озера Орицкое, Козугальское, Очитольское и Таркульское. На стр. 61, § 51, говоря о соляныхъ озерахъ, описываетъ Степное озеро, „по 50,000 пудовъ и болѣе могущее давать соли, но оно есть непостоянное озеро, ибо болѣе 40 лѣтъ находилось безъ осадка соли. Въ 1824 и 25 годахъ имѣлось соли, изъ него добытой, около 200,000 пуд., а съ того времени въ 1826, 28, 29 и 30 году садки соли вовсе не было и, судя по содержанію въ немъ прѣснаго разсола отъ 13 до 16 вершковъ въ глубь, надежды скорой садки не предвидится и т. д.“. Относительно Степного озера мы такимъ образомъ находимъ здѣсь почти тѣ же самыя данныя, что и у Чайковскаго.

Въ 1835 году было издано сочиненіе о Енисейской губерніи, написанное губернаторомъ Степановымъ²⁾; въ немъ мы находимъ слѣдующія свѣдѣнія о нѣкоторыхъ рѣкахъ разсматриваемыхъ степей: „Рѣки Тайюмъ и Сонъ изъ горы Кыгъ: одна пала въ озеро Билью, а другая въ озеро Ширы. Карышъ оттуда же, палъ въ озеро Илькуль, но изъ него не вытекаетъ, Палласъ ошибся“. Тамъ же на страницѣ 49 находится подробное описаніе соляныхъ озеръ, сопредѣльныхъ съ степью Сагайскою“. Такъ называемое Степное лежитъ на правомъ берегу „Бѣлаго Уюса“ между горъ. Оно открыто нѣсколько съ В. и болѣе съ З. Въ ок-

1) И. Пестовъ. Записка объ Енисейской губерніи Восточной Сибири. 1831 г.

2) Степановъ. Енисейская губернія. 1835 г.

ружности имѣть 7 верстъ, изъ горъ течетъ въ него ручей прѣсной воды; садка происходитъ рѣдко, ея не было съ 1773 года до 1815, потомъ до 1824 и съ 1825 до 1832. Разсолу въ немъ $1\frac{3}{4}$ аршина, а для садки нужно только $\frac{1}{2}$ онаго“.

„Тагарское между Енисеемъ и устьемъ рѣки Лугажи: окружность его двѣ версты 400 сажень, окрестность составляютъ холмы; берега наполнены прѣсными источниками. Разсолу въ немъ обыкновенно $1\frac{1}{2}$ аршина; соль же осѣдаетъ при уменьшеніи онаго до половины. Свойство сей соли найдено неспособнымъ къ употребленію. Оба сіи озера самосадочныя. Къ нимъ принадлежитъ Каралаевское на лѣвой сторонѣ Енисея, неподалеку отъ устья Тесы, впадающей въ него съ правой стороны. Оно открыто съ трехъ сторонъ; но къ В. стоятъ высокія горы, изъ коихъ текутъ въ него прѣсные источники. Окружность 3 версты 400 сажень; разсолъ, изъ коего можно вываривать соль, показываетъ на глубинѣ 2 аршина. Уртюпское, между отлогихъ возвышенностей — на лѣвомъ берегу Енисея, недалеко отъ устья Абакана; въ окружности 4 версты. Въ жаркое лѣто и зимою покрывается толстымъ слоемъ Сибирской слабительной соли, болѣе или менѣе чистой. Разсолъ, изъ котораго можно вываривать соль, показываетъ на глубинѣ $\frac{3}{4}$ аршина. Бейское между рѣками Беею и Утай; въ окружности 2 версты 400 сажень. Въ немъ бываетъ всегда разсолу 2 аршина — весьма слабого. Изъ холмовъ открытыхъ течетъ въ него ручей прѣсной воды“.

На стр. 120 авторъ возвращается къ описанію Степного озера, сообщая о немъ слѣдующее: „Оно самое лучшее изъ самосадочныхъ озеръ Енисейской губерніи и потому только обращаетъ на себя любопытство; но не менѣе того свойство соли не принадлежитъ къ чистому натру: она имѣетъ силу нѣсколько слабительную и лишена той, какая нужна для сохраненія впрокъ запасовъ. Осадка до того непостоянна, что иногда, какъ сказано было выше, ея не бываетъ въ продолженіе нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ. Сему послѣднему обстоятельству виною, конечно, избытокъ прѣсной воды,

люющей въ озеро черезъ ручей, который, вытекая изъ горъ за 4 версты, хотя не доходитъ до озера около 200 сажень и скрывается въ землю, но за всѣмъ тѣмъ просасывается въ него“.

Хотя свѣдѣнія Степанова не заключаютъ въ себѣ ничего новаго, но они важны тѣмъ, что точно опредѣляютъ географическое положеніе какъ этого, такъ и другихъ озеръ. Особенно для насъ лично интересно описаніе посѣщенныхъ нами озеръ — Тагарское и Бейское, воду которыхъ мы имѣли случай анализировать сами. Особенно важно сопоставленіе данныхъ Степанова съ добытыми нами результатами; укажемъ здѣсь хотя бы на то обстоятельство, что озеро Тагарское, относимое Степановымъ къ самосадочнымъ, въ настоящее время содержитъ соли всего только 2‰.

Въ 1856 году Щукинъ¹⁾ — въ своемъ описаніи Минусинскаго округа — сообщаетъ слѣдующее о степяхъ и озерахъ этой мѣстности: „Равнины, по здѣшнему — степи, разстилаются по теченію рѣкъ и всегда сопровождаются горами. Равнина по теченію рѣки Абакана, по здѣшнему, самая обширная; въ длину простирается верстъ на 150; ширина различная, однакожъ не болѣе 20 верстъ; на нѣкоторыхъ мѣстахъ перепоясываютъ ее отроги горъ и какъ бы дѣлятъ на части; отъ устья рѣки Абакана до рѣчки Аскиза называется она Качинскою степью, а далѣе Сагайскою; поперекъ равнины струятся изъ горъ въ Абаканъ рѣчки — Уйбашъ, Ташебъ, Камышта, Аскизъ и Эсь“.

Въ другомъ мѣстѣ того же сочиненія читаемъ: „Въ одномъ мѣстѣ разстлана на значительномъ пространствѣ щелочная минеральная соль; издали кажется, будто снѣгъ покрылъ землю неожиданно среди лѣта. Вся степь покрыта рѣдкою пожелтѣвшею травою, только въ углубленіяхъ, гдѣ застаивается дождевая вода, зеленѣютъ оазисы ириса съ крупными голубыми цвѣтами“.

1) Щукинъ. Минусинскій округъ. Журналъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ. 1856 г. 18 отд. III кн. 5 и 6.

Любопытно то, что про соляныя озера сдѣлано только слѣдующее коротенькое упоминаніе: „Два соляныхъ озера давно перестали осаждать соль“. Далѣе Шукинъ говоритъ объ инородцахъ, о религіи, промышленности, о правахъ и обычаяхъ, наконецъ, объ историческихъ памятникахъ. Выписки изъ всѣхъ этихъ главъ заняли бы слишкомъ много мѣста; къ тому же его сообщенія относительно этого почти согласны съ монми, помѣщенными въ описаніи моего путешествія; кажется, будто протекшее съ того времени цѣлое пятидесятилѣтіе, со всѣми своими изобрѣтеніями, открытіями и переворотами — прошло безслѣдно для жителей этихъ степей; что и какъ было тамъ 50 лѣтъ назадъ, то и почти такимъ же мы находимъ и въ настоящее время.

Спустя 5 лѣтъ послѣ сообщенія Степанова были изданы „Труды Сибирской Экспедиціи И. Р. Г. Об-ва“. Главною цѣлью экспедиціи, совершенной подъ руководствомъ астронома Людвига Шварца¹⁾, было точное опредѣленіе географическаго положенія нѣкоторыхъ мѣстностей Сибири. Этимъ обстоятельствомъ объясняются весьма краткія замѣчанія объ интересующихъ насъ озерахъ, напр.: „въ 7 верстахъ разстоянія отъ села Бейскаго лежитъ большое соляное озеро между Ути и большою Беею; изъ него и теперь еще добывается соль“.

Пользуясь довольно богатой коллекціею минераловъ и горныхъ породъ Минусинскаго округа, собранныхъ экспедиціей, и основываясь на сообщеніяхъ Палласа, профессоръ Гревингкъ²⁾ написалъ геогностическую часть путешествія, изданную въ видѣ приложенія къ вышеупомянутому сочиненію Л. Шварца. Кромѣ уже приведенныхъ нами геогностическихъ свѣдѣній, мы находимъ въ описаніи Гревингкга нѣкоторыя данныя объ интересующихъ насъ озерахъ, но они

1) Шварцъ, Людвигъ. Труды Сибирской Экспедиціи Имперскаго Географ. Общ. Математич. отдѣлъ. 1864.

2) Opus cit.

вполнѣ согласуются съ данными Палласа, такъ что было бы излишнимъ приводить ихъ въ этомъ мѣстѣ. Первыя изслѣдованія воды озеръ разсматриваемыхъ нами степей мы находимъ въ сочиненіи князя Кострова¹⁾: „Соляныя озера Минусинскаго края“. Названный авторъ знакомитъ насъ съ опытами, произведенными въ 1844 г. гиттенфервальтеромъ Пыльковымъ, командированнымъ туда специально съ этой цѣлью. Князь Костровъ насчитываетъ въ Минусинскомъ округѣ 5 большихъ соляныхъ озеръ и множество малыхъ. Большія называются: 1) Степное, 2) Бейское, 3) Тагарское, 4) Уртюпское и 5) Каралаевское. Подробнѣе описаны лишь два озера — Бейское и Тагарское. О первомъ сказано слѣдующее: „Оно находится между рѣками Беей и Утой, въ 70 верстахъ отъ Главнаго Сабинскаго хребта. Длина его 535 саж., ширина 333 саж., а вся поверхность 2 версты 400 саж.“

„Бейское озеро окружено со всѣхъ сторонъ горами и во время весны и лѣтнихъ дождей постоянно наполняется стекающей съ нихъ прѣсною водою. Сверхъ того, съ сѣверо-восточной стороны озера въ него впадаетъ довольно значительный ключъ, который очень много способствуетъ разжиженію разсоловъ, такъ что эта часть озера, по Ламбертіеву ареометру, содержитъ въ себѣ разсолъ не выше 2‰, между тѣмъ какъ въ другихъ мѣстахъ оно заключаетъ до 6‰“.

„По опытамъ, произведеннымъ надъ разсоломъ этого озера, оказалось слѣдующее: сперва разсолъ, добротою въ 6‰, въ количествѣ восьми ведеръ, подвергнуть былъ испаренію; но отъ этого не получено нисколько такъ называемаго засольника. Потомъ слитый сгущенный отваръ подвергнуть былъ естественному охлажденію, съ усиленіемъ его искусственными средствами, помощью солей, смѣшиваемыхъ со снѣгомъ;

1) Князь Костровъ. Соляныя озера Минусинскаго края. Вѣстникъ Импер. Русск. Географ. Общ. 1859 г. ч. 25, № 3, стр. 17.

но и тутъ кристалловъ соли не оказалось, а только масса воды обращалась въ рыхлый ледъ, который оказывалъ слабый солоноватый вкусъ. При дальнемъ сгущеніи разсола испареніемъ — отъ него отдѣлялось множество пѣны, содержащей въ себѣ гипсъ“.

„Бейское озеро зимою покрывается льдомъ сплошь одинаковаго цвѣта, ровнымъ, гладкимъ и плотнымъ, а это доказываетъ, что въ немъ подземныхъ ключей не находится“.

О Тагарскомъ озерѣ сказано: „Тагарское озеро, окруженное, какъ и Бейское довольно высокими горами, находится между Енисеемъ и устьемъ впадающей въ него рѣчки Лугажи, отъ селенія Каменки въ 12, а отъ Очурскаго въ 25 верстахъ. Вся окружность его до $3\frac{1}{2}$ верстъ“.

„Въ прежнее время Тагарское озеро было значительной глубины, но теперь оно засорено песками и глиною отъ приточной воды и вѣтровъ, такъ что нынѣшняя глубина его не простирается болѣе двухъ вершковъ, считая по длинѣ озера на 100, а по ширинѣ на 50 сажень; прочее его пространство занимаетъ иловатый грунтъ“.

„Разсолъ Тагарскаго озера, по испытанію, содержитъ въ себѣ до 16°. Изъ восьми ведеръ разсола, въ продолженіе суточной варки, съ большимъ трудомъ получено 7 фунтовъ соли — темнаго цвѣта. Соль эта высыхала медленно, а высушенная снова впитывала въ себя воздушную влагу и снова расплывалась. На вкусъ она была горька. Вообще признано, что разсолъ этого озера состоитъ изъ трехъ частей: сѣрно-кислаго натра и одной части сѣрно-кислой магнезій, т. е., имѣетъ $\frac{1}{4}$ постороннихъ частей. Поэтому оно признано негоднымъ и выварка соли на немъ никогда не производилась, тѣмъ болѣе, что и необходимый для этого лѣсъ находится отъ него не менѣе, какъ въ 25 верстахъ за рѣкою Енисеемъ, отъ котораго Тагарское озеро отстоитъ въ 12 верстахъ“.

Эти свѣдѣнія относительно Тагарскаго озера для насъ весьма важны въ томъ отношеніи, что они ясно показываютъ, насколько это озеро подвержено измѣненіямъ. Я хочу ука-

зать здѣсь только на то, что то же Тагарское озеро въ настоящее время имѣетъ глубину въ $2\frac{1}{2}$ метра, какъ это видно будетъ изъ слѣдующей главы, между тѣмъ какъ оно въ 1844 г. было глубиною всего въ 2 вершка; то же самое можно сказать о его размѣрахъ, которые въ настоящее время далеко превышаютъ указанные княземъ Костровымъ.

Изъ письма проф. Эрмана¹⁾, помѣченнаго 1869 годомъ, видно, что Генералъ-Губернаторомъ Восточной Сибири предполагалось снарядить экспедицію для изслѣдованія соляныхъ озеръ Минусинскаго округа; въ своемъ письмѣ проф. Эрманъ предлагаетъ прежде всего выяснить:

„а) Геогностическій возрастъ пластовъ, непосредственно окружающихъ Минусинскія соляныя озера.

б) Геогностическій возрастъ тѣхъ пластовъ, которые содержатъ, или несомнѣнно или же по предположенію, каменную соль, выщелачиваемую подземными ключами и приносимую въ упомянутыя озера.

с) Химическій составъ маточныхъ разсоловъ слѣдуетъ изслѣдовать, какъ при тѣхъ физическихъ условіяхъ, при которыхъ они теперь находятся, такъ — насколько это доступно наблюденію, — при тѣхъ условіяхъ, при которыхъ они находились ближе къ первоначальному состоянію, проходя болѣе глубоко залегающіе пласты; обратить особенное вниманіе на іодъ и бромъ. Еще обратить вниманіе на свѣтящіеся организмы, флору и фауну“.

Здѣсь должно упомянуть, что о томъ, когда именно была совершена предположенная экспедиція, какіе она дала результаты, я не могъ нигдѣ найти указаній; должно полагать, что экспедиція эта не состоялась.

Хотя совѣты проф. Эрмана я читалъ только послѣ того, какъ моя экскурсія уже давно была окончена, тѣмъ не

1) Извѣстія Императ. Русск. Географ. Общ. т. V. 1869. № 6. Нѣсколько указаній для изслѣдованія соляныхъ озеръ Минусинскаго округа (письмо проф. Эрмана).

менѣе и я принималъ во вниманіе все сказанное подъ лит. с) этого письма, т. е. все то, что касалось химической части этихъ изслѣдованій. Здѣсь же я хочу упомянуть то, что свѣтящихся организмовъ на посѣщенныхъ мною озерахъ я нигдѣ не видѣлъ.

Затѣмъ слѣдуютъ первые анализы профессора Карла Шмидта¹⁾. Выпаренный въ чистомъ мѣдномъ котлѣ осадокъ воды нѣкоторыхъ озеръ вышеупомянутой степи былъ ему представленъ г-номъ Докторомъ Думбергъ, врачебнымъ инспекторомъ въ Барнауль, получившимъ его въ свою очередь отъ г-на Мартіанова, Директора и основателя Минусинскаго музея. Результаты анализа приведены въ нижеслѣдующихъ таблицахъ.

1) Выпаренный осадокъ изъ Тагарскаго озера.

Въ 100 частяхъ его содержится

элементарныхъ составныхъ частей:	
Калія К.	0,149
Натрія Na	25,767
Кальція Ca	0,900
Магнія Mg	2,672
Сѣрнаго ангидрида SO ₃	42,168
Хлора Cl	11,918
Брома Br	0,018
Кислорода, эквивалентнаго SO ₃	8,434
Растворимыхъ солей	92,026
Нерастворенной накипи	0,378
При 150° неулетучивающейся воды и немного органическихъ веществъ	3,453
Отъ 120°—150° улетучивающейся воды	0,736
При 120° улетучивающейся воды	3,407
	100,000

1) Bulletin de l'Academie Imperiale des sciences de St.-Petersburg XXVIII F. стр. 477—486. Hydrologische Untersuchungen von Prof. Carl Schmidt in Dorpat. 1883.

Группировка:

Сѣрноокислаго калія K ₂ SO ₄	0,331
„ натрія Na ₂ SO ₄	71,407
„ кальція CaSO ₄	3,061
Хлористаго натрія NaCl	6,648
„ магнія MgCl ₂	10,559
Бромистаго магнія MgBr ₂	0,020
Растворимыхъ солей	92,026
Окиси желѣза F ₂ O ₃	0,126
Глинозема Al ₂ O ₃	}
Ангидрида фосфорной кислоты P ₂ O ₅	
„ кремневой „ SiO ₂	0,046
Магнезиі MgO	0,079
Углекислаго кальція CaCO ₃	0,127
Воды и нѣкоторыхъ органич. веществъ	7,596
	100,000

По поводу приведенныхъ анализовъ профессоръ К. Шмидтъ замѣчаетъ слѣдующее: „Характеристическимъ свойствомъ Тагарскаго озера является высокое содержаніе въ водѣ его глауберовой соли; это озеро можетъ служить типомъ горько-соленыхъ озеръ, происшедшихъ, вѣроятно, вслѣдствіе взаимодѣйствія гипса и соды, продуктовъ вывѣтриванія Саянскихъ горъ“.

2) Соль изъ Минусинскаго сол. озера.

Относительно этой соли авторъ пишетъ: „Г-нъ Мартіановъ приложилъ къ посылкѣ крупно-кристаллизированную пластинку этой соли, толщиною въ 4 сант., покрытую съ верхней стороны кубами изъ поваренной соли, величиною въ 0,6 сс., похожими на соляные пласты Эльтонаго озера, но пронизанными кристаллами глауберовой и горькой соли, свободными отъ гипса и дающими въ водѣ безцвѣтный и прозрачный растворъ“. При анализѣ въ 100 частяхъ высушенной на воздухѣ соли заключалось:

Элементарных составных частей:

Калія K	0,004
Натрія Na	26,467
Магнія Mg	3,669
Сѣрнаго ангидрида SO_3	22,641
Хлора Cl	31,514
Брома Br	0,0003
Кислорода эквивал. SO_3	4,528

Группировка:

Сѣрноокислаго калія K_2SO_4	0,009
„ натрія Na_2SO_4	40,194
Хлористаго натрія NaCl	34,110
„ магнія MgCl_2	14,510
Бромистаго магнія MgBr_2	0,0004
Безводныхъ минеральн. солей	88,823
Гидратн. воды, связан. при 120°	7,299
Кристал. воды, улеч. при 120°	3,878
	100,000

Сравнивая результаты анализа со сдѣланною передъ послѣднимъ замѣткою К. Шмидта, мы находимъ, что крупно-кристаллизованной пластинки горькой соли въ группировкѣ вовсе нѣтъ, между тѣмъ хлористый магній представленъ въ большомъ процентѣ. Здѣсь, повидимому, произошло недоразумѣніе, и я думаю, что замѣченные подъ лупою или микроскопомъ кристаллы — дѣйствительно была кристаллическая горькая соль, хлористый же магній получился при послѣдующей комбинаціи солей изъ найденныхъ анализомъ элементарныхъ составныхъ частей. Стоитъ только группировку совершить иначе, именно, сѣрный ангидридъ соединить съ магніемъ (какъ теперь большею частію дѣлаютъ и какъ я поступилъ впоследствии) — и мы получаемъ около 18% горькой соли, хлористаго же магнія вовсе не оказывается. Такая группировка тѣмъ болѣе справедлива, что анализируемая соль была „самосадочная“, а хлористый магній, какъ

извѣстно, легко растворимъ въ водѣ, такъ что едва-ли онъ можетъ выкристаллизоваться, пока вода находится въ озерѣ. Кромѣ того, анализируемая соль, вслѣдствіе большого содержанія хлористаго магнія, должна была бы быть гигроскопична, о чемъ, однако, нигдѣ не упомянуто. Вѣроятно, мы здѣсь имѣемъ дѣло съ такъ называемымъ „бузуномъ“, который покрываетъ дно почти всѣхъ этихъ озеръ болѣе или менѣе толстымъ слоемъ и выкристаллизовывается во время холода.

3) Бейское соляное озеро.

Проф. Карлъ Шмидтъ анализировалъ два сорта солей изъ этого озера.

А. Самосадочная соль. 100 частей содержать

элементарныхъ составныхъ частей:

При 150° улечивающейся воды	3,222
Калія K	0,0006
Натрія Na	37,102
Магнія Mg	0,510
Кислорода O	0,365
Сѣрнаго ангидрида SO_3	1,824
Хлора Cl	56,974
Брома Br	0,0019
	100,000

Группировка:

Сѣрноокислаго калія K_2SO_4	0,0014
„ натрія Na_2SO_4	3,239
Хлористаго натрія NaCl	91,519
„ магнія MgCl_2	2,017
Бромистаго магнія MgBr_2	0,0022
	96,778
Воды	3,222
	100,000

В. Соль, полученная выпариваніемъ воды Бейскаго озера.
100 частей ея содержатъ

элементарныхъ составныхъ частей:

Улетучивающейся до 150° воды . . .	0,845
Калія K	0,0005
Натрія Na	31,983
Магнія Mg	0,249
Сѣрнаго ангидрида SO ₃	53,990
Хлора Cl	2,130
Брома Br	0,0047
Кислорода O	10,798
	100,000

Группировка:

Сѣрноокислаго калія K ₂ SO ₄	0,0017
„ натрія Na ₂ SO ₄	95,863
Хлористаго натрія NaCl	2,303
„ магнія MgCl ₂	0,982
Бромистаго магнія MgBr ₂	0,0054
Сумма минеральныхъ солей	99,155
Воды	0,845
	100,000

4) Выпаренный осадокъ изъ озера Кизи-Куль
или Билью или Большого слабительнаго
озера — при рѣкѣ Бѣлый Уюсъ.

(Воду озера выпарилъ г-нъ Мартіановъ лѣтомъ 1876 г.)
Сто частей выпареннаго осадка содержатъ

элементарныхъ составныхъ частей:

Калія K	0,0034
Натрія Na	31,023
Магнія Mg	0,499
Сѣрнаго ангидрида SO ₃	54,126
Хлора Cl	0,822
Брома Br	0,0006

Угльной кислоты CO ₂	0,280
Кислорода, эквивал. SO ₃ и CO ₂	10,927
При 150° связанной воды	1,624
„ 150° улетучивающейся воды	0,695
	100,000

Группировка:

Сѣрноокислаго калія K ₂ SO ₄	0,0076
„ натрія Na ₂ SO ₄	95,699
„ магнія MgSO ₄	0,339
Хлористаго магнія MgCl ₂	1,100
Бромистаго магнія MgBr ₂	0,0007
Углекислой магнезіи MgCO ₃	0,535
Безводныхъ минеральн. солей	97,681
При 150° связанной воды	1,624
„ 150° улетучивающейся воды	0,695
	100,000

Къ этому анализу авторъ дѣлаетъ слѣдующую замѣтку:
„На петрографической картѣ Минусинскаго округа, составленной Гревингкомъ, это озеро обозначено подъ названіемъ „Кичи-Куль — Бѣлый или Бѣло-Куль (Палласъ), расположено въ трехъ верстахъ отъ праваго (восточнаго) берега Бѣлаго Уюса, отъ котораго отдѣлено песчаными холмами“.

5) Выпаренный осадокъ изъ солянаго озера
Джабалакъ-Куль.

Такъ какъ въ предыдущемъ изложеніи объ этомъ озерѣ еще не было рѣчи, то я здѣсь помѣщу описаніе географическаго его положенія, приведенное профессоромъ К. Шмидтомъ: „Оно расположено вблизи рѣки Уйбатъ, притока Абакана, вливающагося въ Енисей съ лѣвой стороны, напротивъ Минусинска, — на сѣверномъ склонѣ Саксара; лѣтомъ высыхаетъ. Воду добылъ и выпарилъ г-нъ Мартіановъ лѣтомъ 1876 г.“

100 частей выпаренного осадка изъ озера Джабалакъ-Куль содержатъ

элементарныхъ составныхъ частей:

Калія K	0,0464
Натрія Na	23,222
Кальція Ca	1,022
Магнія Mg	3,287
Окиси желѣза Fe_2O_3	0,057
Глинозема Al_2O_3	0,230
Кремнезема SiO_2	0,380
Сѣрнаго ангидрида SO_3	21,145
Хлора Cl	26,441
Брома Br	0,007
Угольнаго ангидрида CO_2	1,322
Кислорода, экв. SO_3 и CO_2	4,712
Безводн. минер. сост. частей	81,871
Воды	18,129
	100,000

Группировка:

Сѣрноокислаго натрія Na_2SO_4	33,828
„ калія K_2SO_4	0,1033
„ кальція $CaSO_4$	3,479
Хлористаго натрія NaCl	31,114
„ магнія $MgCl_2$	10,148
Бромистаго „ $MgBr_2$	0,0080
Углекислого „ $MgCO_3$	2,524
Безводной глины $(Fe_2O_3, Al_2O_3, SiO_2)$	0,667
Безводн. солей и силикатовъ	81,871
При 180° связанной воды	5,681
„ 120°—180° улетучивающейся воды	3,458
„ 120° улетучивающейся воды	8,990
	100,000

Въ 1885 г. произведенъ былъ анализъ поваренной соли

изъ источника Джемакуль, Минусинскаго округа ¹⁾, находящагося въ южной части Качинской соляной степи.

Въ 100 частяхъ содержится:

Хлора Cl	24,40
Сѣрнаго ангидрида SO_3	33,50
Натра Na	17,34
Натрія	15,84
Извести CaO	0,26
Магнезиі MgO	5,37

Нерастворимыхъ въ HCl:

Неорганич. } веществъ	0,24
Органич. }	
Влажности	2,90
	99,85

На основаніи этихъ простыхъ соединеній можно допустить нижеслѣдующую комбинацію состава солей:

Хлористаго натрія	40,24
Сѣрноокислаго натрія	39,71
Сѣрноокислой извести	0,65
„ магнезиі	16,11

Веществъ нерастворимыхъ въ HCl:

Неорганическихъ }	0,24
Органическихъ }	
Влажности	2,90
	99,85

Хотя данныя приведеннаго анализа отнесены къ поваренной соли изъ источника Джемакуль, однако мнѣ кажется, что изслѣдована была выпаренная до суха рапа, о чемъ свидѣтельствуется съ одной стороны большое содержаніе сѣрно-кислыхъ солей (около 55 проц.), съ другой стороны то об-

1) Извѣстія Восточно-Сибирскаго Отд. Импер. Русск. Геогр. Общ. Томъ XVI, №№ 4—5, 1885 г. Иркутскъ. Анализы А. Ша-марина.

стоятельство, что тамъ завода для выварки соли не имѣется вовсе.

Въ томъ же самомъ сообщеніи А. Шамарина еще помѣщено много анализовъ поваренной соли, соляныхъ и маточныхъ разсоловъ и черепныхъ камней съ сибирскихъ солеваренныхъ заводовъ, какъ Енисейской, такъ и Иркутской губерній; они не касаются затронутого нами вопроса.

Въ 1887 г. появилась въ печати статья П. Попова¹⁾ „Описаніе солянаго озера Ши́ра“. Въ этой статьѣ авторъ говоритъ преимущественно о цѣлебныхъ свойствахъ названнаго озера, описываетъ форму его, вкусъ, цвѣтъ, свойства его воды, окружающія озеро горы и т. п., а также приводитъ анализъ Ширинской воды, произведенный въ Иркутской золотосплавочной лабораторіи химикомъ Шамаринымъ (изъ отчета о дѣйствіи частныхъ золотыхъ приисковъ Ачинскаго, Минусинскаго и Красноярскаго округовъ за 1881 г. сост. г. Боголюбскимъ).

Выпаренный осадокъ изъ озера Ши́ра заключаетъ:

Гигроскопической воды (влажности)	24,70
Хлористаго натрія NaCl	1,41
Сѣрнистаго натрія Na_2SO_4	10,80
Углекислой извести CaCO_3	8,05
„ магнезій MgCO_3	21,44
Глинозема Al_2O_3	2,18
Веществъ органич. и кристал. воды	21,14

Веществъ нерастворимыхъ въ HCl :

(кремень, глина, песокъ)	10,05
Итого	99,77

Далѣе онъ сравниваетъ Ширинскую воду по вкусу и дѣйствию съ Карлсбадской водой, описываетъ обстоятельно явленіе, замѣчаемое на озерѣ — внезапно поднимающіяся

1) Отчетъ Общества врачей Енисейской губ. за 1886—87 гг. Приложение.

сильныя волненія, на подобіе бури, при отсутствіи сильнаго вѣтра и даже при тихой и ясной погодѣ, такъ что плаваніе въ это время по озеру представляло бы величайшую опасность. Въ концѣ статьи онъ упоминаетъ объ озерахъ Било (Били-куль Палласа) и Иткуль, говоря, что первое содержитъ менѣе соли, чѣмъ озеро Ши́ра, между тѣмъ какъ озеро Иткуль почти прѣсное. Въ той же статьѣ находимъ слѣдующее замѣчаніе: „подробнѣйшее описаніе озера Ши́ра и смежныхъ съ нимъ озеръ составить предметъ отдѣльной статьи, которую предназначили для помѣщенія въ имѣющемъ быть въ г. Минусинскѣ „Литературномъ Сборникѣ“. Однако эта статья вовсе не появилась въ печати. — Въ 1889 г. была напечатана статья горнаго инженера Стемпневскаго¹⁾, содержащая обстоятельное описаніе соляныхъ промысловъ Восточной Сибири. Изъ сообщеній автора статьи узнаемъ, что Тагарское озеро для добыванія поваренной соли не особенно пригодно, и съ 1878 по 1885 г., по случаю бывшаго въ то время наводненія, выварка совершенно прекратилась. За все время аренды, начиная съ 1875 г., выварено на одной варницѣ лишь 23,976 пудовъ. Это обстоятельство зависитъ съ одной стороны отъ естественныхъ причинъ, заключающихся въ постепенномъ истощеніи озера, съ другой стороны отъ причинъ экономическихъ, состоящихъ въ уменьшеніи рыночной цѣны соли и въ вздорожаніи топлива. „При этомъ выварка можетъ производиться лишь зимой и при томъ только тогда, когда лѣто было не особенно дождливое; въ противномъ случаѣ большая глубина озера препятствуетъ во время зимнихъ холодовъ выдѣленію постороннихъ примѣсей, главнымъ образомъ мѣшающихъ успѣху солеваренія“. Наконецъ, авторъ сообщаетъ упомянутое нами въ предисловіи, что „разсолъ Тагарскаго озера обладаетъ весьма хорошими цѣлебными свойствами отъ ревматическихъ болѣзней“. Бо-

1) Горн. инж. Стемпневскій. Соляные промыслы Восточной Сибири. Горный Журналъ. 1889 г., стр. 216—291.

лѣе благопріятный отзывъ даетъ авторъ той же статьи о Бейскомъ заводѣ. Достаточно указать на то, что въ немъ уже въ первое время добывалось около 60,000 пудовъ, а затѣмъ, при меньшемъ спросѣ, около 30,000 пуд. ежегодно, и что за все время аренды добыто посредствомъ выварки 375,554 пуда соли. Все это доказываетъ преимущество Бейскаго озера передъ Тагарскимъ.

Далѣе Стемпневскій высказывается, что большинство остальныхъ озеръ этой степи не пригодно для добыванія соли, такъ какъ многія изъ нихъ лѣтомъ совершенно высыхаютъ, другія же содержатъ много горькихъ солей (гуджира). Изъ этихъ озеръ особенно отличается Алтайское озеро, о которомъ авторъ отзывается слѣдующимъ образомъ: „озеро Алтайское, находившееся въ арендѣ съ 1884 года у мѣшанина Сыромятникова, который, за негодностью рапы для выварки соли, отъ пользованія озеромъ отказался. Величина его по окружности достигаетъ 2 1/4 версты, при площади приблизительно въ 125 десятинъ. Въ 1885 году добыто на немъ соли, весьма плохого качества, 2550 пуд., на что употреблено 357 сажень дровъ, или на одну сажень дровъ получено 7 пудовъ соли. Что же касается добычи гуджира, то такового на Алтайскомъ озерѣ съ 1874 по 1882 г. выломано 34 тыс. пудовъ для Мариинскаго стеклотѣлательнаго завода“.

Въ 1890 г. въ „Сибирскомъ Вѣстникѣ“ помѣщена статья Педерко¹⁾ объ озерѣ Шири и Тагарскомъ, гдѣ весьма кратко говорится объ этихъ озерѣ, въ особенности же объ озерѣ Тагарскомъ, которымъ авторъ не можетъ хвалиться. Хвала его относится не только къ дѣйствию воды, но и простирается на находящіеся при озерѣ жилища, ихъ благоустройство, на предоставленныя гостямъ всевозможныя удобства и развлеченія, на красивую окрестность

1) Педерко. Цѣлебный источникъ Минусинскаго округа. Сибирскій Вѣстникъ. 1890 г. № 46.

и т. д. Когда читаешь все это, нисколько не соответствующее дѣйствительности, то не знаешь, служить ли эта статья рекламой, или же это просто иронія. Въ заключеніи своей статьи авторъ помѣстилъ вышеприведенный анализъ профессора Карла Шмидта, но съ ошибками.

Въ томъ же году вышелъ изъ печати весьма обстоятельный трудъ Савенкова¹⁾ объ озерѣ Шири. Опредѣливъ его географическое положеніе подъ 54 1/2° с. ш. и 108° в. д. отъ перваго меридіана (отъ Пулкова 60° в. д.), авторъ сообщаетъ далѣе свои наблюденія, частью петрографическаго и геологическаго, частью же метеорологическаго характера. Химическаго изслѣдованія воды онъ самъ не производилъ, но далъ краткій очеркъ всѣхъ, произведенныхъ до того времени анализовъ воды. Кромѣ анализа Шамарина, здѣсь приведены еще два — одинъ, сдѣланный Меллеромъ, а другой — Арономъ и Смирнитскимъ. Такъ какъ эти послѣдніе два анализа были произведены не научными способами и поэтому дали неточные результаты, то я не привожу ихъ здѣсь. Единственное изслѣдованіе, которое Савенковъ произвелъ самъ надъ водою этого и нѣкоторыхъ другихъ озеръ, состоитъ въ опредѣленіи удѣльнаго вѣса, при чемъ получились слѣдующіе результаты: „Соленость воды озера Шири, произведенная нами по ареометру Боме = 2,75°, почти 3°. Удѣльный вѣсъ Ширинской воды, опредѣленный нами также ареометромъ Боме, при температурѣ воды 14° R. = 1,0165 съ колебаніемъ до 1,0175. Соленость воды озера Билью = почти 1,5 градуса, а удѣльный вѣсъ = 1,009. Соленость воды озера Шунетъ = 19,8° (почти 20°), удѣльный вѣсъ = 1,150. Вода озера Иткуль не вполне прѣсная; удѣльный вѣсъ, по нашимъ ареометрическимъ опредѣленіямъ, около 1,001“.

Содержаніе сѣрководорода H₂S въ илѣ озера Шунетъ авторъ объясняетъ тѣмъ, что міриады маленькихъ краснень-

1) И. Т. Савенковъ. Къ матеріаламъ для медико-топографическаго описанія озера Шири. Прилож. къ протоколамъ Общества врачей Енисейской губ. Красноярскъ. 1890 г.

кихъ рачковъ (рыбы, конечно, нѣтъ) при гніеніи увеличиваютъ количество сѣроводорода, получающагося отъ возстановляющаго дѣйствія органическихъ веществъ на сѣрно-кислыя соли, особенно гипсъ, присутствіе котораго въ водѣ озера Шунеть болѣе, чѣмъ вѣроятно“.

Наконецъ, я хотѣлъ бы привести мнѣніе Савенкова о происхожденіи этихъ озеръ: „Собранный нами матеріалъ склоняетъ насъ къ предварительному заключенію о томъ, что большинство озерныхъ котловинъ, а можетъ быть и весь озерный бассейнъ, по происхожденію своему, должны быть отнесены къ котловинамъ разлива; осѣданіе породъ въ долину озера Ши́ра и другія дислокаціонныя явленія могли произойти вслѣдствіе разрушенія выщелачиваніемъ легко размывающихся породъ, нерѣдко залегающихъ въ нижнихъ горизонтахъ напластованій“.

Годъ спустя опубликовалъ анализы озеръ Ши́ра и Шунеть и рѣчки Солоновки профессоръ Э. Леманъ¹⁾. Такъ какъ рѣчка Солоновка находится въ Томской губерніи, то относящійся къ ней анализъ мы здѣсь не приводимъ. Что же касается анализа озера Ши́ра, то онъ показалъ слѣдующее: „Вода, собранная лѣтомъ 1889 г. около западнаго берега Ши́ра и доставленная въ плотно закупоренной и засмоленной бутылкѣ, была почти безцвѣтна и прозрачна, съ незначительнымъ бурымъ осадкомъ. При раскупориваніи бутылки вода распространяла слабый затхлый запахъ, имѣла горько-соленый вкусъ, щелочную реакцію и удѣльный вѣсъ 1,0135 при 16° С. Сто вѣсовыхъ частей дали 1,95 вѣс. частей кристаллическаго (при обыкновенной комнатной температурѣ высушеннаго) соляного остатка и 1,75 вѣс. частей при нагреваніи до 100° С. Въ 100 вѣсовыхъ частяхъ воды найдено: магнія 0,118, кальція 0,012, стронція — слѣды,

1) Проф. Э. Леманъ. Составъ солей озеръ Ши́ра и Шунеть и рѣчки Солоновки. Извѣстія Импер. Томскаго университета. 1891 г. кн. III. отд. II, стр. 107.

натрія 0,353, калия 0,0035, желѣза 0,00006, алюминія слѣды, амміака — слѣды, фосфорной кислоты — слѣды, сѣрной кислоты SO_2 0,765, кремневой кислоты 0,0023, свободной угольной кислоты — 0, связанной угольной кислоты 0,026, хлора 0,23, брома — слѣды, азотной кислоты — слѣды“.

Относительно озера Шунеть авторъ сообщаетъ, что онъ анализировалъ только соль, полученную выпариваніемъ воды досуха и доставленную ему г. В. М. Флоринскимъ; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ указываетъ на то, что этотъ, какъ и остальные приведенные здѣсь анализы, „не могутъ претендовать на ту степень полноты и точности, которая могли бы быть достигнуты, если бы оказанные матеріалы были собраны съ соблюденіемъ требуемыхъ въ такихъ случаяхъ особыхъ мѣръ осторожности, но всѣ матеріалы доставлены были безъ точнаго обозначенія мѣста, времени года и дня, состоянія въ то время погоды, даже способа добыванія и собиранія“.

Въ той же статьѣ проф. Леманъ пишетъ: „Крайне замѣчательно въ соли Шунетскаго озера громадное преобладаніе глауберовой соли надъ сѣрномагніевой и особенно минимальное содержаніе хлористыхъ соединений“; еще дальше: „помимо врачебнаго интереса, это озеро можетъ имѣть большое значеніе и для промышленности, какъ богатый источникъ глауберовой соли, важной, между прочимъ, при заводскомъ производствѣ соды“. Наконецъ, приводится „вѣроятный качественный и количественный составъ солей“ озеръ Ши́ра и Шунеть въ процентахъ:

	Оз. Ши́ра.	Оз. Шунеть.
Хлористаго натрія NaCl	14,7	1,5
Сѣрнокислаго натра Na_2SO_4	36,0	88,7
Хлористаго калия KCl	0,05	слѣды
Сѣрнокислаго калия K_2SO_4	0,13	слѣды
Хлористаго магнія MgCl_2	1,62	0,5
Сѣрнокислой магнезии MgSO_4	24,0	3,9

Бромистаго магнія $MgBr_2$	слѣды	0
Углекислой магнезии $MgCO_3$	2,5	слѣды
Хлористаго кальція $CaCl_2$	0,08	0,02
Сѣрноокислаго кальція $CaSO_4$	1,62	0,16
Окиси желѣза Fe_2O_3	0,004	слѣды
„ алюминія Al_2O_3	0,011	слѣды
Кремневой кислоты SiO_2	0,05	0,008
Азотноокислаго аммонія NH_4NO_3	слѣды	слѣды
Органическихъ веществъ	0,15	0,42
Кристаллиз. воды и потеря	18	5
Сѣрнистыхъ соединеній	0	0

Процентное содержаніе солей въ водѣ оз. Шира.

Уд. в. 1,0135 при 16° С.

Хлористаго натрія $NaCl$	0,31
Сѣрноокислаго натра Na_2SO_4	0,745
Хлористаго калия KCl	0,0032
Сѣрноокислаго калия K_2SO_4	0,0045
Хлористаго магнія $MgCl_2$	0,032
Сѣрноокислой магнезии $MgSO_4$	0,48
Бромистаго магнія $MgBr_2$	слѣды
Двууглекислой магнезии MgC_2O_5	0,086
Хлористаго кальція $CaCl_2$	0,0012
Сѣрноокислой извести $CaSO_4$	0,032
Двууглекислой извести CaC_2O_5	0,00602
Кремнекислоты SiO_2	0,0012
Двууглекислой закиси желѣза FeC_2O_5	0,00018
Азотноокислаго аммонія NH_4NO_3	слѣды
Сѣрнистыхъ соединеній	0
	1,701

Профессоръ Залѣсскій¹⁾ причисляетъ озеро Шунеть къ типичнымъ озерамъ, содержащимъ глауберовую соль. „Озеро Шунеть“, говоритъ онъ, „заключаетъ въ себѣ до

1) Проф. Ст. И. Залѣсскій. Къ вопросу о содовомъ производствѣ въ Сибири. Вѣстникъ золотопромышленности. 1893 г.

того большія количества естественной очень чистой глауберовой соли и лежитъ настолько далеко отъ Барнаула, что со временемъ можно бы, пожалуй, подумать объ основаніи и здѣсь содоваго завода, однако — въ виду рискованности предприятия — не иначе, какъ послѣ самой строгой оцѣнки мѣстныхъ условий“.

Въ 1895 г. въ „Вѣстникъ золотопромышленности“ горнымъ инженеромъ Боголюбскимъ¹⁾ приведены нѣкоторыя данныя о добычѣ поваренной и горькой солей въ Восточной Сибири, именно:

Бейскій заводъ, Минусинскаго округа, 2 варницы:
 съ 1873 г. до 1 янв. 1883 г. соли . . . 342972 п. 4 ф.
 съ 1883 г. до 1 янв. 1894 г. „ . . . 292212 п. 38 ф.
 635,185 п. 2 ф.

Тагарскій заводъ, вблизи Минусинска, 1 варница:
 съ 1874 г. до 1 янв. 1879 г. соли . . . 29382 п. 9 ф.
 съ 1884 г. до 1 янв. 1887 г. „ . . . 25103 п. —
 54485 п. 9 ф.

Алтайскій заводъ, Минусинскаго округа, 1 варница:
 съ 1884 г. до 1 янв. 1894 г. соли . . . 19376 п. 38 ф.

Въ томъ же самомъ журналѣ за тотъ же годъ (№ 24) А. Н. Богачевымъ²⁾ помѣщено краткое описаніе озера Шунеть и 2 анализовъ соли и черепа; авторъ статьи держится того мнѣнія, что поваренная соль, извлеченная изъ оз. Шунеть, очень чистая, а черепъ можетъ быть употребленъ для медицинскихъ цѣлей и для добыванія соды (по Леблану), при чемъ сѣрноокислый магній можетъ быть превращенъ въ сѣрноокислый натрій обмѣннымъ разложеніемъ съ хлористымъ натріемъ при температурѣ ниже 0. Анализы слѣдующіе:

1) Горн. Инжен. Боголюбскій. Добыча поваренной соли и горькихъ солей Восточной Сибири. Вѣстникъ золотопромышленности. 1895 г.

2) Вѣстн. золотопр. 1895 г. № 24, стр. 417.

1) Поваренная соль, извлеченная изъ оз. Шунеть въ іюлѣ 1895 г.; въ 100 вѣсовыхъ частяхъ обезвоженной соли найдено:

хлористаго натрія NaCl	97,91 %
сѣрноокислаго магнезія MgSO_4 . . .	0,86
„ кальція CaSO_4	0,16
хлористаго магнезія MgCl_2	0,18
нераств. въ водѣ остатка	0,79
	99,90 %

2) Образецъ соли, извлеченной со дна озера Шунеть въ іюлѣ 1895 г. въ видѣ плотной массы, служащей основаніемъ (черепомъ) соляного озера. Въ 100 вѣсовыхъ частяхъ обезвоженной соли найдено:

хлористаго натрія NaCl	3,07 %
сѣрноокислаго натрія Na_2SO	49,48
„ магнезія MgSO_4	43,55
глинозема Al_2O_3	0,19
сѣрноокислаго кальція CaSO_4 . . .	2,70
нерастворим. въ водѣ остатка . . .	1,01
	{ 0,17 орг. вѣщ. 0,84 минер. вѣщ.

Изданная въ 1896 году В. М. Крутовскимъ¹⁾ книжка содержитъ все, что извѣстно объ озерѣ Ши́ра, и имѣетъ цѣлью главнымъ образомъ указать больнымъ окрестныхъ мѣстностей, въ какихъ случаяхъ посѣщеніе озера могло бы быть имъ полезнымъ. Такъ какъ авторъ, нѣсколько лѣтъ состоявшій врачомъ на этомъ курортѣ, сообщаетъ подробно о всемъ, что можетъ интересовать посѣщающихъ озеро больныхъ: о путяхъ сообщенія, климатѣ, жилищахъ, средствахъ пропитанія, а также о платѣ, — то первое изданіе въ скоромъ времени было распродано, и въ 1899 году послѣдовало второе. Въ главѣ о свойствахъ воды озера Ши́ра помѣщены приведенный нами анализъ профессора Лемана, ареометрическое изслѣдованіе Савенкова, и между прочимъ высказано мнѣніе, что „по составу своей воды озеро

1) Врачъ В. М. Крутовскій. Озеро Ши́ра, какъ мѣстный лечебный курортъ. Томскъ. 1896 г.

Ши́ра должно бы быть отнесено къ группѣ горько-соленыхъ и по содержанію сѣрноокислой магнезіи стоитъ на ряду съ знаменитыми водами Франца Іосифа и Гуниади, а по содержанію сѣрноокислаго натра не имѣетъ себѣ равной“.

Въ статьѣ Н. В. Скорнякова¹⁾ находится дополненіе къ анализу А. Н. Богачева въ видѣ сообщенія элементарныхъ составныхъ частей, найденныхъ при анализѣ черепа въ 100 частяхъ соли:

хлора Cl	1,88
сѣрнаго ангидрида SO_3	58,84
окси кальція CaO	1,11
„ магнезія MgO	14,63
глинозема Al_2O_3	0,19
окси натрія Na_2O	21,15
натрія Na	1,19
нерастворим. остатка	1,11
	{ орган. . . . 0,17 минер. . . . 0,84

Затѣмъ слѣдуетъ нами уже приведенная комбинація солей (анализы Богачева), выведенная на основаніи этихъ простыхъ составныхъ частей. Кромѣ того мы здѣсь читаемъ: „Производившееся въ 1850—51 гг. изслѣдованіе отнесло это озеро (Шунеть) къ разряду озеръ, не имѣющихъ никакихъ данныхъ для солеваренія“. Но какой этотъ анализъ и кѣмъ произведенъ, я никакъ не могъ найти.

Въ 1899 г. А. Н. Богачевъ²⁾ опубликовалъ рядъ изслѣдованій, изъ которыхъ приведу лишь относящіеся къ нашей темѣ. Во-первыхъ, слѣдуетъ упомянуть опубликованные еще раньше два анализа озера Шунеть (соли и черепа); затѣмъ анализъ самосадочной поваренной соли озера Шунеть, взятой изъ разныхъ бугровъ добычи 1896 г.³⁾

1) Торгово-Промышленная газета. 1897 г. № 153. О Шунетѣ (Н. В. Скорнякова, Красноярскъ).

2) А. Н. Богачевъ. Полезныя ископаемыя Сибири со стороны химическаго состава. Вѣстникъ золотопромышленности. 1899 г. № 13.

3) Примѣчаніе Богачева: „Озеро сдано казною инородцу Спирину на 15 лѣтъ, съ платою по 1 коп. за каждый добытый пудъ соли. Въ 1896 г. вывoločено самосадочной соли 9206 пудовъ“.

Въ 100 вѣсовыхъ частяхъ соли содержится:

хлористаго натрія NaCl	99,20
сѣрноокислаго натрія Na_2SO_4	0,02
„ кальція CaSO_4	0,08
хлористаго магнія MgCl_2	0,20
„ алюминія AlCl_3	0,28
нерастворимаго въ водѣ остатка	0,05
влажности	0,17

Изъ большого количества другихъ анализовъ я приведу только слѣдующіе.

1) Разсолъ Бейскаго солянаго озера, взятый изъ озера 3 іюля 1895 года.

Удѣльный вѣсъ разсола при 12°R . — 1,15 (Боме); вѣсъ твердаго остатка, высушеннаго при 150°C ., въ литрѣ разсола равняется 230,84 грамма.

Составъ твердаго остатка разсола:

хлористаго натрія NaCl	200,51 грм.
сѣрноокислаго кальція CaSO_4	4,94
„ магнія MgSO_4	2,75
хлористаго магнія MgCl_2	4,54
глинозема Al_2O_3	0,74
органич. нелетуч. веществъ	17,84
	230,84

Въ 100 частяхъ твердаго остатка содержится:

хлористаго натрія NaCl	86,86 %
сѣрноокислаго кальція CaSO_4	2,14
„ магнія MgSO_4	0,98
хлористаго магнія MgCl_2	1,96
глинозема Al_2O_3	0,36
органич. нелетуч. веществъ	7,98
	99,98 %

2) Анализъ разсола Бейскаго солянаго озера, накаченнаго въ запасной ларь въ декабрѣ 1894 г. Удѣльный вѣсъ разсола при $16,5^\circ \text{R}$. равняется 1,15 Боме. Вѣсъ твердаго остатка, высушеннаго при 150°C ., въ литрѣ разсола равняется 197,03.

Составъ твердаго остатка слѣдующій:

		въ процентахъ.
хлористаго натрія NaCl	72,75	36,92
сѣрноокислаго натрія Na_2SO_4	103,23	52,39
„ магнія MgSO_4	15,13	7,67
„ кальція CaSO_4	0,38	0,19
глинозема Al_2O_3	1,66	0,84
органическихъ нелетуч. веществъ	3,88	1,96
	197,03	99,97 %

3) Разсолъ Тагарскаго горько-соленого озера въ Ачинско-Минусинскомъ округѣ. Разсолъ взятъ съ поверхности озера. (Когда и въ какомъ году не сказано). Удѣльный вѣсъ разсола при 15°R . — 1,045 (Боме). Вѣсъ твердаго остатка, высушеннаго при 150°C ., въ литрѣ разсола = 52,67 грам.

Составъ твердаго остатка разсола:

хлористаго натрія NaCl	24,85 грм.
сѣрноокислаго натрія Na_2SO_4	19,49
„ кальція CaSO_4	0,27
„ магнія MgSO_4	7,65
органич. нелетуч. веществъ	0,41
	52,67

Въ 100 вѣс. частяхъ твердаго остатка содержится:

хлористаго натрія NaCl	47,18 %
сѣрноокислаго натрія Na_2SO_4	37,00
„ кальція CaSO_4	0,51
„ магнія MgSO_4	14,52
органич. нелетуч. веществъ	0,77
	99,98

4) Разсолъ Тагарскаго горько-соленого озера, взятый со дна озера.

Удѣльный вѣсъ разсола при $14,5^\circ \text{R}$. — 1,05 (Боме). Вѣсъ твердаго остатка, высушеннаго при 150°C ., въ литрѣ разсола = 53,92 грам.

Составъ твердаго остатка:

хлористаго натрія NaCl	23,69
сѣрноокислаго натрія Na_2SO_4	19,60
сѣрноокислаго кальція CaSO_4	2,32
„ магнія MgSO_4	7,83
органич. нелетуч. веществъ	0,48

Въ 100 вѣсовыхъ частяхъ твердаго остатка содержится:

хлористаго натрія NaCl	43,93%
сѣрноокислаго натрія Na_2SO_4	36,53
„ кальція CaSO_4	4,30
„ магнія MgSO_4	14,52
органич. нелетуч. веществъ	0,89

Еще можно упомянуть о двухъ работахъ Красноярскихъ врачей объ озерахъ Шунетъ и Ши́ра. Авторомъ первой является д-ръ Коноваловъ¹⁾, который, говоря о Шунетѣ, приводитъ сперва все извѣстное о немъ, прибавляя собственныя наблюденія о лечебной силѣ грязи, превосходно дѣйствующей въ особенности при ревматизмѣ; но главною цѣлью его статьи было то, чтобы склонить горное начальство къ отнятію озера отъ инородца Спирина, такъ какъ добыча изъ озера поваренной соли можетъ ослабить разсолъ и этимъ принести ущербъ купающимся. Другая статья принадлежитъ д-ру Куркутову²⁾ и представляетъ отчетъ о лечебномъ сезонѣ на озерѣ Ши́ра за 1899 г., гдѣ авторъ былъ правительственнымъ врачомъ. Помимо весьма аккуратно записанныхъ метеорологическихъ наблюденій, въ этой статьѣ приводятся цѣнныя наблюденія надъ больными, которыя (наблюденія) съ такою наглядностью и полнотою еще не были раньше отмѣчены другими врачами. Въ виду того, что авторъ не химикъ, мы новыхъ анализовъ Ширинской воды не находимъ, поэтому я ограничиваюсь этими немногими словами.

1) Протоколъ и Труды Общ. врачей Енисейской губ. за 1896/97 г. Выпускъ третій, стр. 24.

2) Протоколъ и Труды Общ. врачей Енисейской губ. за 1899 г.

Новый рядъ анализовъ помѣшенъ горн. инж. В. Тихомировымъ¹⁾ въ Горномъ журналѣ за 1899 г.; изъ нихъ приведу здѣсь только тѣ, которые относятся къ озерамъ Минусинскаго округа.

1) Образецъ черепа изъ Минусинскаго самосадочнаго озера содержитъ:

хлора Cl	0,18%
сѣрнаго ангидрида SO_3	49,20
окиси натрія Na_2O	30,08
натрія Na	0,12
окиси кальція CaO	0,45
„ магнія MgO	4,87
„ желѣза Fe_2O_3 }	0,26
„ алюминія Al_2O_3 }	
гигроскопической воды и влажности	14,76
	99,92%,

что соотвѣтствуетъ содержанію въ черепѣ:

хлористаго натрія NaCl	0,30%
сѣрноокислаго натрія Na_2SO_4	68,90
„ кальція CaSO_4	1,90
„ магнія MgSO_4	14,61
окиси желѣза Fe_2O_3 }	0,26
„ алюминія Al_2O_3 }	
гигроскоп. воды и влажности	14,76
	99,92% ²⁾

2) Разсолъ Минусинскаго самосадочнаго озера, Енисейской губ. Крѣпость разсола при 22° С. по ареометру Боме — 10°. Въ 100 куб. сант. содержится:

хлора Cl	2,22 грм.
сѣрнаго ангидрида SO_3	3,47

1) Горный журналъ. 1899 г. т. II. стр. 56. Отчетъ объ аналитическихъ работахъ Иркутской Золотосплавочной лабораторіи съ 1886 по 1898 годъ. Составилъ Горн. Инж. В. Тихомировъ.

2) Вѣрнѣе: 100,73. Авт.

окси натрія Na_2O	0,96 грм.
натрія Na	1,43
окси кальція CaO	0,03
„ магнія MgO	1,09
органическихъ веществъ	1,31

10,51 грм.,

что соотвѣтствуетъ содержанію въ разсолѣ:

хлористаго натрія NaCl	3,65 грм.
сѣрноокислаго натрія Na_2SO_4	2,21
„ кальція CaSO_4	0,07
„ магнія MgSO_4	3,27
органическихъ веществъ	1,31

10,51 грм.

3) Разсолъ Абаканскаго завода, изъ Минусинскаго округа. Крѣпость разсола при 22°C . по ареометру Боме $12\frac{1}{2}^\circ$. Въ 100 куб. сант. содержится:

хлора Cl	7,81 грм.
сѣрнаго ангидрида SO_3	0,73
натрія	4,83
окси кальція CaO	0,22
окси магнія MgO	0,41

14,00 грм.,

что соотвѣтствуетъ содержанію въ разсолѣ:

хлористаго натрія NaCl	12,29
„ магнія MgCl_2	0,47
сѣрноокислаго кальція CaSO_4	0,53
„ магнія MgSO_4	0,63
избытка кислорода O	0,08

14,00

4) Разсолъ¹⁾ Тагарскаго завода, Минусинскаго округа.

Въ 100 куб. сант. содержится:

хлора Cl	8,62
сѣрнаго ангидрида SO_3	0,75

1) Крѣпость разсола по ареометру Боме 13° , при 22°C .

натрія Na	4,48
окси кальція CaO	0,53
окси магнія MgO	0,96

15,34,

что соотвѣтствуетъ содержанію въ разсолѣ:

хлористаго натрія NaCl	11,39
„ магнія MgCl_2	2,29
сѣрноокислаго кальція CaSO_4	1,28
избытка кислорода O	0,38

15,34

5) Разсолъ Алтайскаго солевареннаго завода, Минусинскаго округа. Въ 100 куб. сант. содержится:

хлора Cl	14,01
сѣрнаго ангидрида SO_3	2,25
угольнаго ангидрида CO_2	1,65
окси натрія Na_2O	4,06
натрія	9,04

31,01,

что соотвѣтствуетъ содержанію въ разсолѣ:

хлористаго натрія NaCl	23,04
сѣрноокислаго натрія Na_2SO_4	3,99
углекислаго натрія Na_2CO_3	3,98

31,01

Крѣпость разсола при 22°C . по Боме — 25°

Насколько мнѣ извѣстно, въ предыдущихъ строкахъ приведено все, что имѣется въ литературѣ о системѣ интересующихъ насъ озеръ. Въ заключеніе этой главы я хочу еще указать на два сочиненія, которыя, хотя посвящены исключительно бальнеотерапіи, но сообщаютъ также нѣкоторыя свѣдѣнія объ этихъ озерахъ. Первое, принадлежащее перу профессора Ю. Глакса¹⁾, заимствуетъ свои свѣдѣнія объ

1) Профессоръ Ю. Глаксъ. Руководство къ бальнеотерапіи. 1899 г.

озеръ Ши́ра изъ сочиненія Бертенсона: „Щелочно-глауберовыя озера Устьянцево и Ши́ра, находящіяся въ Сибири, содержатъ глауберовую и поваренную соль въ большомъ количествѣ. Вода ихъ примѣняется наружно въ видѣ ваннъ и внутрь, какъ слабительное.“ Другое сочиненіе, написанное Львомъ Бертенсономъ¹⁾, сообщаетъ намъ, хотя и кратко, обо всемъ интересномъ не только для врачей, но и для публики, при чемъ оно, кромѣ озера Ши́ра, трактуетъ еще объ озерахъ Тагарскомъ и Шунетѣ. Въ упомянутомъ сочиненіи приводится анализъ озера Ши́ра, произведенный профессоромъ Леманомъ, анализъ Тагарскаго озера профессора Карла Шмидта, а объ озерѣ Шунетѣ говорится, что вода его пока не анализована, хотя изслѣдованы выпаренные осадки ея, именно профессоромъ Леманомъ; всѣ эти анализы мною уже приведены выше. Критическую оцѣнку приведенныхъ литературныхъ данныхъ я сдѣлаю въ послѣдующихъ главахъ, частью при сопоставленіи анализовъ, частью при разсмотрѣніи выводовъ относительно каждаго въ отдѣльности озера.

II.

Путевыя замѣтки.

5-го іюня 1899 г. оставилъ я Красноярскъ и отправился съ необходимой посудой для взятія образцовъ воды, ила и т. п. и нѣкоторыми реактивами, на пароходъ „Дѣдушка“, вверхъ по Енисею въ Минусинскъ. Мы подвигались впередъ очень медленно, такъ какъ вода еще не спала и поэтому теченіе было чрезвычайно быстро. Но яркіе солнечные дни,

1) Левъ Бертенсонъ. Лечебныя воды, грязи и морскія купанія въ Россіи и за границей. С.-Петербургъ. 1901.

прекрасный свѣжій воздухъ, особенно пріятный послѣ Красноярской пыли, а больше всего живописные, гористые берега, то отлого, то круто поднимающіеся, то покрытые тайгою, то обнаженные, но всегда свидѣтельствующіе слоистымъ строеніемъ своихъ породъ о дѣятельности здѣсь моря въ болѣе ранніе періоды, — все это дало намъ возможность забыть о времени, и часы шли незамѣтно. Кромѣ того пароходъ, на которомъ обычно бываетъ немного пассажировъ, на этотъ разъ былъ переполненъ интеллигентными людьми, отправлявшимися на озеро Ши́ра¹⁾ съ лечебною цѣлью; почти всѣ пассажиры ѣхали лишь до пристани Батиней²⁾; отсюда до Ши́ра ѣздить уже сухимъ путемъ. Деревень по пути въ Минусинскъ было немного и то большею частью бѣдныя и малолюдныя; поэтому мы останавливались только у нѣкоторыхъ изъ нихъ и то исключительно съ цѣлью запастись дровами. На третьи сутки мы прибыли въ г. Минусинскъ. Здѣсь я посѣтилъ Н. М. Мартынова, основателя Минусинскаго музея, — отчасти имѣя въ виду воспользоваться его любезными разъясненіями при осмотрѣ этого знаменитаго своею полнотою музея, — но главнымъ образомъ, чтобы получить отъ него, какъ отъ лучшаго знатока Минусинскаго округа, планъ мѣстности и нѣкоторыя указанія для дальнѣйшаго пути. Н. М. охотно помогъ мнѣ съ обычной своею любезностью, за что я ему весьма благодаренъ, такъ какъ безъ тѣхъ данныхъ, которыми онъ меня снабдилъ, мнѣ пришлось бы много блуждать, тратя время и деньги, и врядъ ли я сдѣлалъ бы все такъ, какъ это было необходимо для дѣла.

Утромъ 9-го іюня мы отправились на двухъ телѣгахъ изъ Минусинска на поиски намѣченныхъ мною озеръ; на од-

1) Сибирскій курортъ, о которомъ шла выше рѣчь.

2) Село Батени или Батеневское лежитъ надъ Енисеемъ, на разстояніи около 300 верстъ отъ Красноярска, вверхъ по теченію рѣки.

ной телѣгѣ уложена была посуда для собиранія матеріала и ящикъ съ необходимыми реактивами, а на другой телѣгѣ помѣстился я самъ. Нашъ маленькій караванъ двинулся сперва на югъ до Тагарскаго озера, лежащаго въ 15 верстахъ ¹⁾ отъ Минусинска. Мы ѣхали по песчаной дорогѣ, пролежавшей среди усѣянной холмами мѣстности, покрытой скудной растительностью. Въ общемъ — степной ландшафтъ съ бѣлѣющими тамъ и сямъ солончаками.

Тагарское озеро.

Тагарское озеро находится немного въ сторонѣ отъ дороги; оно имѣетъ форму овала, длинникъ котораго направленъ съ NE на SO. Размѣръ его очень незначителенъ — всего около версты длиною, а шириною не болѣе $\frac{3}{4}$ версты при глубинѣ въ ростъ человѣка. Берега озера низки, покрыты густой травой; ближе къ водѣ сильно топки, при чемъ почва здѣсь состоитъ изъ черной вязкой грязи. Такая же грязь покрываетъ и дно озера; грязь эта употребляется окрестными жителями, преимущественно обывателями Минусинска, при разныхъ болѣзняхъ, главнымъ образомъ кожныхъ, а также при ревматизмѣ; при послѣднемъ, какъ говорятъ, съ большою пользою.

Озерная грязь издаетъ рѣзкій запахъ гнѣющихъ органическихъ веществъ; запахъ этотъ слышенъ даже издали, особенно при вѣтрѣ. Запаха сѣроводорода я не замѣтилъ, хотя сторожъ, единственный при озерѣ житель, говоритъ, что иногда грязь сильно пахнетъ гнилыми яйцами, что весьма вѣроятно, такъ какъ черная окраска грязи зависитъ несомнѣнно отъ присутствія въ ней сѣрнистаго желѣза. Что за-

1) Разстояніе это, какъ и всѣ послѣдующія, приведенныя въ этихъ замѣткахъ, лишь приблизительное, потому что дороги въ Минусинскомъ округѣ еще не вымѣрены, и я пользуюсь данными, полученными на мѣстѣ.

пахъ сѣроводорода не всегда ощущается, также понятно, такъ какъ образованіе сѣроводорода зависитъ отъ многихъ факторовъ, какъ температура, соленость воды, присутствіе гипса, гнѣющихъ органическихъ веществъ и т. п.; эти факторы не всегда и не въ одинаковой комбинаціи находятся на лицо; наконецъ, отсутствіе или наличность сѣроводороднаго запаха зависитъ и оттого, сколько находится желѣза въ почвѣ; при избыткѣ желѣза, запахъ послѣдняго также не будетъ слышенъ, такъ какъ весь сѣроводородъ связывается въ этомъ случаѣ желѣзомъ.

Кругомъ озера лежитъ та же голая, холмистая степь. На одномъ берегу озера стоитъ не дѣйствующій солеваренный заводъ съ нѣсколькими домиками вокругъ. Заводъ былъ основанъ лѣтъ двадцать пять тому назадъ Тюффиномъ, затѣмъ онъ переходилъ послѣдовательно къ разнымъ лицамъ. Но такъ какъ послѣдній владѣлецъ (Корженевскій) накопилъ большую недоимку казнѣ, то заводъ этотъ уже около 10 лѣтъ тому назадъ былъ отобранъ въ казну¹⁾. Съ тѣхъ поръ выварка соли прекратилась. Остальные домики, — за исключеніемъ одного, въ которомъ живетъ сторожъ, — сдаются лѣтомъ въ наймы пріѣзжающимъ пользоваться водою и грязью. Такимъ образомъ, на берегу озера устроился небольшой первобытный курортъ, посѣщаемый весьма ограниченнымъ числомъ больныхъ, о чемъ ясно говорятъ тѣ 6 маленькихъ домиковъ, которые и представляютъ собою весь курортъ. Помимо полного отсутствія всякихъ удобствъ, которыя можно встрѣтить даже на третьестепенномъ курортѣ, самое купанье въ Тагарскомъ озерѣ мало привлекательно. Причиной этому служить, съ одной стороны очень топкая почва, съ другой стороны вода озера, которая кишитъ мелкими ракообразными, очень непривлекательными на видъ; третье неудобство — отсутствіе мѣстъ для гулянья. Единственное мѣсто, которое могло бы служить для этой цѣли, —

1) Свѣдѣнія, полученные мною на мѣстѣ.

это небольшая роща на противоположной „курорту“ стороне озера; но и она лежит на довольно значительномъ разстояніи отъ послѣдняго. Тѣмъ не менѣе сибиряки довольствуются и тѣмъ, что имѣютъ, посѣщаютъ курортъ ежегодно, хотя и въ очень ограниченномъ числѣ и, что главное, находятъ въ немъ облегченіе и нерѣдко излѣченіе отъ своихъ болѣзней.

Для изслѣдованія была взята вода и грязь. Для первой употреблялись бутылки изъ бѣлаго стекла, емкостью отъ 6—10 литровъ, съ пришлифованными пробками, а для послѣдней — стеклянныя банки, которыя закупоривались обыкновенными пробками; какъ тѣ, такъ и другія обвязывались пузыремъ. Вода фильтровалась на мѣстѣ въ бутылки черезъ шведскую фильтровальную бумагу.

Предварительное испытаніе дало слѣдующіе результаты.

а) Вода, взятая на разстояніи 5 саж. отъ NE конца.

Профильтрованная вода была совершенно прозрачна и остатка на фильтрѣ не получилось, если не считать упомянутыхъ ракообразныхъ.

Температура воды — $16\frac{1}{2}^{\circ}$ Реомюра.

„ „ „ воздуха — 17° „ „

Удѣльный вѣсъ при 21° С. на вѣсахъ Моръ-Вестфалъ — 1,016.

Соленость, по ареометру Боме — $2,1^{\circ}$.

Реакція — слабо щелочная.

Сѣководородъ — не былъ открытъ, ни запахомъ, ни растворомъ окиси свинца въ NaOH.

Запахъ — нѣтъ.

Вкусъ — горько-соленый.

Амміакъ — реактивъ Несслера далъ едва замѣтное желтое окрашиваніе.

Свободная углекислота — при стояніи воды на воздухѣ въ открытомъ стаканѣ пузырьковъ не выделялось.

Закись желѣза — ни съ растворомъ таннина, ни съ галлусовой кислотой окрашиванія не получилось.

Азотистая кислота — слабая сѣрная кислота и растворъ іодистаго калия съ крахмальнымъ клейстеромъ не дали синяго окрашиванія смѣси

1) По словамъ сторожа крѣпость разсола доходитъ зимою до 8° Боме.

б) Грязь.

Грязь взята на разстояніи около пяти сажень отъ берега на NE концѣ озера (тамъ же взята и вода). Она представляетъ собою вязкую, почти черную массу съ примѣсью довольно мелкаго песка, пахнетъ разлагающимися органическими веществами, хотя въ очень слабой степени. Реакція ея слабо щелочная; запаха сѣководорода не замѣчено, также нельзя было доказать его присутствіе реактивами. Температура грязи равнялась температурѣ воды, т. е., $16\frac{1}{2}^{\circ}$ R.

Для количественнаго опредѣленія всей углекислоты я запасся необходимыми колбочками емкостью въ 300 грм., содержащими опредѣленное количество свободного отъ углекислоты гидрата окиси кальція и хлористаго кальція. Колбочки эти наполнялись водою на мѣстѣ (разумѣется со всѣми необходимыми предосторожностями), а изслѣдованія производились впоследствии въ лабораторіи, при чемъ однако оказалось, что при незначительномъ содержаніи углекислоты и громадномъ избыткѣ сѣрной кислоты въ водѣ примѣняемый способъ вытѣсненія CO_2 соляной кислотой не пригоденъ. Такимъ образомъ не только много трудовъ пропало даромъ, но и изслѣдованіе на свободную углекислоту осталось, какъ у этого, такъ и у всѣхъ посѣщенныхъ озеръ, не выполненнымъ.

Какъ видно изъ вышеприведенныхъ данныхъ, соленость озера очень незначительна, а при такихъ условіяхъ вываривать изъ озерной воды соль, даже въ томъ случаѣ, если бы соль состояла исключительно изъ хлористаго натрія и при даровомъ топливѣ, не стоило бы труда. Однако вода озера далеко не всегда имѣетъ одинаковую соленость; зимою, напримѣръ, соленость доходитъ до 8° Боме, въ сухое лѣто она также значительно увеличивается. Въ прежніе года озеро, очевидно, было много соленѣе, такъ какъ изъ него можно было съ выгодой вываривать соль, и она дѣйствительно вываривалась, хотя въ небольшомъ количествѣ и не высокаго качества. Во время моего путешествія содержаніе солей въ изслѣдованныхъ мною озерахъ (какъ въ этомъ, такъ и во всѣхъ остальныхъ) было вообще немного ниже лѣтней нормы, вслѣдствіе сильныхъ дождей, выпавшихъ за послѣдній мѣсяцъ. Что касается Тагарскаго озера, то на

него послѣднее обстоятельство имѣло тѣмъ большее вліяніе, что въ озеро впадаетъ прѣсноводный ключъ, имѣвшій въ то время видъ настоящаго ручья, а объемъ самого озера очень небольшой.

Собравши необходимый для изслѣдованія матеріалъ, мы покинули озеро и отправились дальше черезъ село Лугавское къ деревнѣ Каменкѣ, лежащей надъ Енисеемъ. Около этой деревни мы переправились черезъ Енисей и продолжали нашъ путь по другой сторонѣ рѣки. Переправа черезъ рѣку — дѣло обычное; но если она происходитъ на такомъ суднѣ, на какомъ переправлялись мы, она пріобрѣтаетъ не совсѣмъ обычный характеръ. Представьте себѣ двѣ большихъ лодки, поставленныхъ приблизительно на сажень одна отъ другой и соединенныхъ между собою досчатымъ помостомъ, образующимъ родъ палубы, окруженной барьеромъ. По бокамъ парома, ближе къ носовой части, приделаны колеса, похожія на пароходныя; эти колеса приводятся въ движеніе парой или четверкой лошадей. Легко понять, что передвиженіе на такомъ суднѣ требуетъ не мало времени, особенно при столь быстромъ теченіи, какъ это имѣетъ мѣсто на Енисей. Что мы всѣ должны были помогать при переправѣ, это разумѣется само собой; по крайней мѣрѣ такъ понималъ это перевозчикъ, взявшій на себя роль капитана, а намъ предоставившій исполнять обязанности матросовъ.

Перебравшись черезъ Енисей, мы поднялись на гору черезъ степь, среди которой тамъ и сямъ попадались пашни и жалкія хижинны для сторожей этихъ пашенъ. Уже начало темнѣть, когда мы прибыли на солеваренный заводъ при Алтайскомъ озерѣ Андрея Долматовича Полежаева. Послѣдній, человѣкъ вѣсьма гостепріимный, принялъ меня какъ стараго знакомаго, и за стаканомъ чая мы бесѣдовали до поздней ночи.

Я прекрасно выспался въ опрятной постели (вся обстановка въ домѣ поражала своей чистотою); утромъ на другой день, т. е. 10-го іюня, я приступилъ къ осмотру Алтайскаго озера и производствѣ необходимыхъ анализовъ.

Алтайское озеро.

Это озеро находится на разстояніи 35 верстъ отъ Минусинска. Лежитъ оно въ неглубокой котловинѣ, имѣетъ почти круглую форму; какъ ширина, такъ и длина его около одной версты, а глубина озера не болѣе аршина. Цвѣтъ воды въ общей массѣ буроватый. На берегу находились бѣлыя, какъ снѣгъ массы, состоящія изъ вывѣтрившейся глауберовой соли¹⁾, выброшенной осенью волнами и собранной хозяиномъ озера, который ее сбываетъ въ небольшомъ количествѣ на мѣстный стеклодѣлательный заводъ, а послѣднее время также и на мыловаренные заводы. На днѣ, ближе къ серединѣ озера, лежитъ рядъ слоевъ очень твердаго бузуна, чередующихся съ чернымъ иломъ. Бузунъ этотъ осаждается большею частью въ сентябрѣ мѣс., или вообще тогда, когда ночи становятся холодными, при чемъ слои, находящіеся близъ берега, выбрасываются волнами на сушу, а лежащіе болѣе въ серединѣ, твердѣютъ и образуютъ такимъ образомъ твердое дно, по которому можно смѣло ходить, не подвергаясь опасности провалиться. Рядомъ съ этимъ озеромъ лежитъ другое, немного меньше перваго, отдѣленное отъ него перешейкомъ, покрытымъ бѣлымъ налетомъ вывѣтрившейся соли. Въ послѣднее озеро впадаетъ прѣсноводный ключъ, который однако такъ же, какъ и самое озеро въ сухое лѣто совершенно пересыхаетъ; какъ по этой причинѣ, такъ и потому, что озеро сильно разбавлено прѣсной водою, оно не имѣетъ никакого значенія для солеваренія.

10-го іюня въ 6 часовъ утра взята вода и бузунъ со дна и съ берега озера; вода на разстояніи 10 сажень отъ берега, бузунъ со дна значительно дальше, такъ какъ на этомъ разстояніи дно было еще свободно отъ бузуна.

1) На мѣстѣ ее называютъ бузуномъ или гуджиромъ.

Предварительное испытание дало слѣдующіе результаты.

а) Вода.

Температура воды — 16° R.

„ воздуха — 15° R.

Удѣльный вѣсъ на вѣсахъ Моръ-Вестфала при $15\frac{1}{2}^{\circ}$ R. — 1,094.

Соленость, по ареометру Боме, при той же температурѣ — $12\frac{1}{2}^{\circ}$.

Цвѣтъ — вода совершенно прозрачная, почти безцвѣтная, съ едва замѣтнымъ желтоватымъ оттѣнкомъ.

Вкусъ — сильно горько-соленый.

Запахъ — не было замѣчено никакого.

Реакція — ясно щелочная. Красная лакмусовая бумага приняла синій цвѣтъ, а желтая куркумовая бумага побурѣла.

Свободная CO_2 — при стояніи воды въ открытой посудѣ пузырьковъ никакихъ не выдѣлялось.

Амміакъ — съ реактивомъ Несслера получилось весьма незначительное желтое окрашивание.

Сѣководорода — нельзя было обнаружить ни запахомъ, ни реактивами.

Закись желѣза ¹⁾ — съ растворомъ танина вода окрашивалась въ красно-фіолетовый цвѣтъ, а растворъ галлусовой кислоты вызывалъ сине-фіолетовое окрашивание; то и другое лишь спустя нѣсколько времени послѣ прибавки реактива.

Азотистая кислота — реакція на послѣднюю дала отрицательный результатъ, т. е. отъ слабой сѣрной кислоты и раствора іодистаго калия съ крахмальнымъ клейстеромъ синяго окрашивания не наблюдалось.

б) Бузунъ съ берега.

Бузунъ представлялъ собой снѣжнобѣлый мелкій порошокъ, довольно чистый, содержащій тѣ же крупные, прозрачные кри-

1) Для количественнаго опредѣленія закиси желѣза я взялъ съ собою титрованный растворъ марганцовокислаго калия и всѣ приспособленія для титрованія, но, къ сожалѣнію, стклянка на дорогѣ разбилась и растворъ былъ потерянъ. Поэтому вода не фильтровалась на мѣстѣ, а только въ лабораторіи, при чемъ выдѣлившаяся тѣмъ временемъ окись желѣза, отдѣлялась и опредѣлялась количественно; принималось въ расчетъ все содержимое бутылки.

сталлы, которые находятся въ бузунѣ со дна, только съ тою разницею, что грязи въ нихъ значительно меньше.

с) Бузунъ со дна.

Послѣдній представлялъ собой плотныя, крупно-кристаллическія массы, толщиною въ $\frac{1}{4}$ аршина, заключающія въ себѣ много грязи, минеральной и растительной. На воздухѣ кристаллы скоро обсыхали и покрывались бѣлымъ налетомъ вывѣтрившейся соли.

Уровень воды въ озерѣ находится въ большой зависимости отъ атмосферныхъ осадковъ; это вполне понятно, если принять во вниманіе незначительный размѣръ озера и то обстоятельство, что оно представляетъ дно котловины, куда стекаетъ и собирается вся вода послѣ дождей. Вслѣдствіе этого и крѣпость разсола сильно мѣняется и колеблется отъ 4° до 30° и больше по Боме. При озерѣ имѣется варница въ которой вываривается за зиму около 6000 пуд. поваренной соли. Лѣтомъ заводъ не работаетъ, потому что съ одной стороны въ это время года горькія соли преобладаютъ надъ поваренной солью, съ другой стороны разсолъ слишкомъ слабъ. Другое дѣло зимою, когда вслѣдствіе пониженія температуры воды сильно понижается растворимость глауберовой соли, которая и осаждается на дно озера, а частью выбрасывается волнами. Морозъ оказываетъ и другую важную услугу для солеваренія на такихъ озерахъ, а именно тѣмъ, что при этомъ выдѣляется часть воды въ видѣ льда, содержащаго лишь небольшое количество солей, вслѣдствіе чего разсолъ становится концентрированнымъ и пригоднымъ для выварки поваренной соли.

Окончивъ свои работы и поблагодаривъ хозяина завода за оказанное намъ гостепріимство, мы отправились опять въ дорогу. Было 11 часовъ дня, когда мы тронулись съ мѣста. Дорога шла черезъ степь, называемую Абаканской и ограниченную съ востока р. Енисеемъ, а съ запада р. Абаканомъ. На всемъ пространствѣ, какое могъ окинуть глазъ, не было видно ни одного домика, ни одной хижины, иногда только

встрѣчались татары, пасущіе скоть. Далеко, далеко на югѣ виднѣлись покрытыя снѣгомъ вершины горы Таскила, а подъ ними темнѣла черная полоса тайги. Проѣхавъ черезъ рѣденькій березовый и сосновый лѣсокъ, на протяженіи приблизительно 15 верстъ, мы достигли озера подъ названіемъ „Большое озеро“. Это озеро прѣсное, почти круглой формы, длиною и шириною около версты; надъ нимъ стоитъ татарскій улусъ, состоящій изъ нѣсколькихъ кожаныхъ юртъ, въ которыхъ живутъ пастухи. Скоть ихъ, въ количествѣ нѣсколькихъ сотъ головъ, стоялъ, когда мы подъѣзжали къ озеру, въ водѣ озера, которое было очень мелко и представляло, вѣрнѣе сказать, большую лужу, заросшую отчасти камышомъ. Вода въ немъ была совершенно мутная и буроватаго цвѣта. Такъ какъ въ мою задачу входило изслѣдованіе только соляныхъ озеръ, а не прѣсныхъ, воды изъ этого озера я не взялъ, тѣмъ болѣе, что она была загрязнена скотомъ.

На дальнѣйшемъ пути мы встрѣтили еще нѣсколько такихъ полувысохшихъ, прѣсныхъ лужъ, носящихъ однако громкое названіе озеръ, изъ которыхъ вода, конечно, также не была взята для изслѣдованія. Солнце жгло немилосердно (термометръ показывалъ на солнцѣ 37° R.) и поэтому не удивительно, что мы рады были, когда къ вечеру увидѣли Василе-Ивановскій солеваренный заводъ при озерѣ Кизиль-Куль (или Кизиль-Кель). Озеро это находится приблизительно въ 45 верстахъ отъ Алтайскаго солянаго озера по направленію къ юго-западу. Дорога къ нему шла все время черезъ степь, въ общемъ неплоднѣю, но на болѣе низкихъ мѣстахъ покрытую сочной и довольно густой травой, въ которой весело щебетали птички, особенно жаворонки. Объ озерѣ, собственно говоря, здѣсь не можетъ быть рѣчи, такъ какъ послѣднее почти совершенно высохло и въ то время представляло собой лишь глубокую котловину, содержащую едва на 2 вершка воды и то только по срединѣ. Все остальное дно высохшаго озера занимала красная, сырая и пропитанная солью глина, давшая озеру названіе „Кизиль-Куль“,

т. е. красное озеро. Это названіе довольно распространено въ этихъ степяхъ и его носитъ цѣлый рядъ озеръ; мнѣ, на примѣръ, пришлось видѣть на нѣкоторыхъ картахъ той мѣстности озера такого же названія, но не тождественныя съ видѣннымъ мною озеромъ; одно изъ нихъ лежитъ въ Качинской соляной степи (карта Гревингга и Шварца), другое — въ степи близъ Минусинска (карта жел. дор. изд. Ильина). Что касается названія „Кель“, какъ произносятся это слово мѣстные жители (русскіе), то мнѣ кажется удобнѣе писать его по общепринятой орѳографіи „Куль“, хотя ни та, ни другая транскрипція не вполне точно соотвѣтствуетъ звуку слова „Куль“. Слово это, какъ оно произносится татарами, не можетъ быть даже написано по-русски, за неимѣніемъ соотвѣтствующихъ буквъ. Татары произносятъ это слово какъ нѣчто среднее между нѣмецкимъ „Kull“ и „Köll“; буквы, передающей одновременно звуки „ü“ и „ö“, въ русской азбукѣ не имѣется.

Вода для выварки поваренной соли добывается зимою изъ пяти колодцевъ, а лѣтомъ только изъ двухъ, которые доставляютъ достаточно матеріала для выварки; другіе колодцы, хотя они также содержатъ разсолъ надлежащей крѣпости, за лѣтнее время не разрабатываются за неимѣніемъ въ нихъ надобности. Разсолъ выкачивается изъ колодцевъ посредствомъ деревянныхъ насосовъ, приводимыхъ въ дѣйствіе коннымъ приводомъ, течетъ по желобамъ въ деревянные лари, изъ которыхъ затѣмъ поступаетъ въ желѣзный выпаривательный чрентъ, гдѣ сгущается до 28° Боме.

Изъ послѣдняго его переливаютъ въ осадочный чрентъ, гдѣ при охлажденіи выкристаллизовывается соль, которую выгребаютъ лопатами въ деревянные ящики, стоящіе на рельсахъ по срединѣ чрена; здѣсь маточный разсолъ, содержащій примѣси, стекаетъ и полусухая соль поступаетъ въ сушильню для окончательной просушки. Заводъ существуетъ съ 1894 года и вывариваетъ въ годъ около 25 тыс. пуд., а

теперь, вѣроятно, гораздо больше, такъ какъ во время моего посѣщенія завода собирались поставить новый чренъ для варки соли, который тогда былъ почти оконченъ и вѣроятно давно работаетъ. Принадлежитъ заводъ К^о Корнакова и Лыткиныхъ.

Вода взята для изслѣдованія 10-го іюня въ 9¹/₂ часовъ вечера изъ колодца на глубинѣ около 6 арш.; вся глубина колодца 12 арш.

Предварительное изслѣдованіе дало слѣдующіе результаты.

Температура воды — 3° R.

„ воздуха — 18° R.

Удѣльный вѣсъ на вѣсахъ Мора-Вестфала при 19° C. — 1,085.

Соленость, по ареометру Боме, при той же температурѣ—11,5°.

Цвѣтъ — вода почти прозрачная съ бѣловатымъ оттѣнкомъ.

Вкусъ — сильно соленый.

Запахъ — не замѣчено никакого.

Реакція — щелочная; красная лакмусовая бумага окрашивалась въ синій цвѣтъ, сохранившійся и по высушиваніи ея, а желтая куркумовая бумажка слабо бурѣла.

Свободная углекислота — присутствовала, о чемъ свидѣтельствовали пузырьки, которые выдѣлялись при стояніи разсола на воздухѣ въ открытомъ стаканѣ.

Сѣроводорода — не было открыто ни запахомъ, ни реактивами.

Амміакъ — реактивъ Несслера производилъ едва замѣтное пожелтѣніе разсола.

Закись желѣза — реакціи на послѣднюю дали положительные результаты. Получилось какъ сине-фіолетовое окрашиваніе смѣси съ растворомъ галлусовой кислоты, такъ и красно-фіолетовый цвѣтъ жидкости послѣ прибавки танина.

Азотистая кислота — также присутствовала въ видѣ слѣдовъ; это доказано было прибавленіемъ слабой сѣрной кислоты и раствора іодистаго калия съ крахмальнымъ клейстеромъ, при чемъ получилась синяя краска.

Въ виду того, что въ разсолѣ найдена была закись же-

лѣза, вода не фильтровалась на мѣстѣ, чтобы можно было въ послѣдствіи опредѣлить желѣзо въ видѣ окиси, какъ это упомянуто выше при описаніи Алтайскаго озера.

Тамъ же на заводѣ мнѣ любезно показали два анализа, одинъ анализъ — поваренной соли, другой — разсола.

Анализъ соли произведенъ въ Томской золотосплавочной лабораторіи въ январѣ м. 1898 г., при чемъ получены слѣдующіе результаты.

Въ 100 вѣсов. частяхъ соли содержится:

хлористаго натрія NaCl	83,38
„ калия KCl	1,64
сѣрноислаго калия K ₂ SO ₄	7,97
„ кальція CaSO ₄	0,44
„ магнія MgSO ₄	4,88
кристаллизаціонной воды	1,53
нерастворимаго остатка	0,36
	100,20

Разсолъ доставленъ былъ для анализа въ Томскую золотосплавочную лабораторію хозяиномъ завода г. Лыткинымъ 25-го апрѣля 1898 г., результаты анализа по свидѣтельству лабораторіи отъ 23-го мая того же года слѣдующіе.

Въ 100 вѣсов. частяхъ сухого остатка содержится:

хлора Cl	48,58
натрія Na	31,33
окиси кальція CaO	0,69
кальція Ca	0,13
окиси магнія MgO	4,13
глинозема Al ₂ O ₃	0,87
сѣрнаго ангидрида SO ₃	9,25
органич. нелетуч. вещ., растворим.	
въ водѣ	2,64
нерастворимаго въ водѣ остатка	0,26
влажности	2,12
	100,00

Составъ твердаго остатка по этимъ даннымъ слѣдующій:

хлористаго натрія NaCl	79,68
„ кальція CaCl_2	0,36
сѣрноокислаго магнія MgSO_4	12,38
„ кальція CaSO_4	1,69
глинозема Al_2O_3	0,87
органич. нелетуч. вещ., растворим. въ	
водѣ	2,64
нерастворимаго въ водѣ остатка . . .	0,26
влажности	2,12

Хотя сопоставленія анализовъ и выводы изъ нихъ составляютъ особый отдѣлъ этой книжки, тѣмъ не менѣе я здѣсь хочу въ анализѣ поваренной соли обратить вниманіе читателя на поразительно высокія цифры для калиевыхъ солей (около $9\frac{1}{2}\%$), при полномъ отсутствіи таковыхъ въ самомъ разсолѣ, изъ котораго соль выварена; очевидно, что здѣсь ошибка.

Утромъ 11-го іюня мы отправились къ Бейскому озеру, лежащему въ 15-ти верстахъ къ западу отъ Кизиль-Куль. Видъ мѣстности былъ тотъ же — степь, покрытая мѣстами синимъ ковромъ изъ цвѣтущихъ ирисовъ. Когда мы перешли черезъ рѣчку Бею, притокъ Абакана, показалось

Бейское озеро.

Озеро это имѣетъ овальную форму и простирается отъ О на Е. Длина его больше 450 саж., а ширина 270 саж., при глубинѣ въ $2\frac{3}{4}$ арш. на самомъ глубокомъ мѣстѣ; на Е сторонѣ въ него впадаетъ прѣсный мелкій ключъ. Вода озера имѣетъ въ общей массѣ буровато-желтый цвѣтъ и переполнена мелкими рачкообразными (Crustacea). По берегамъ его находилась совершенно бѣлая, вывѣтрившаяся соль, выброшенная осенью волнами, вслѣдствіе тѣхъ же причинъ, которыя изложены выше, когда говорилось объ Алтайскомъ озерѣ; съ послѣднимъ оно имѣетъ много сходства. Но соль, лежащая на томъ берегу, гдѣ находится устроенный при озерѣ заводъ, нако-

пилась тамъ благодаря тому, что туда выпускались изъ варницы маточные разсолы, обратившіеся на воздухѣ въ соль, и составъ соли на этомъ берегу не тождественъ съ солью противоположнаго берега. Въ серединѣ озера, на днѣ его, имѣются также слои бузуна, а около береговъ на днѣ лежитъ черный на видѣ илъ. Лѣтомъ верхній слой бузуна почти нацѣло растворяется и поэтому намъ не удалось достать его для изслѣдованія; соль, образовавшаяся изъ маточнаго разсола, нами также не взята съ собою, отчасти потому, что она большого значенія имѣть не можетъ, такъ какъ ея имѣется слишкомъ немного, а главнымъ образомъ вслѣдствіе того, что тѣ соли маточнаго разсола, которыя представляли бы главный интересъ, — соли брома, можетъ быть, и іода, — какъ весьма легко растворимыя, давнымъ давно выщелочены дождевой водой. Такимъ образомъ для изслѣдованія взята съ собою вода и соль съ берега.

а) Вода

(на разстояніи около 20 саж. отъ берега, близъ варницы).

Температура воды — 20° R.

Температура воздуха — 26° R.

Удѣльн. вѣсъ на вѣсахъ Моръ-Вестфаля — 1,087 при 25° C.

Соленость, по ареометру Боме — $11,9^{\circ}$ при той же температурѣ.

Цвѣтъ — вода совершенно прозрачная, съ едва желтоватымъ оттѣнкомъ.

Вкусъ — сильно горько-соленый.

Запахъ — не было никакого.

Реакція — щелочная, красная лакмусов. бумажка ясно посинѣла.

Свободная CO_2 — нельзя было замѣтить; пузырьковъ при стояніи не выдѣлялось.

Аммиакъ — отъ реактива Несслера получилось незначительное пожелтѣніе смѣси.

Сѣроводородъ — не былъ открытъ ни запахомъ, ни реактивами.

Закись желѣза — растворъ танина вызвалъ красно-фіолетовый цвѣтъ разсола, а растворъ галлусовой кислоты далъ сине-

фіолетовое окрашиваніе, — оба черезъ нѣкоторое время послѣ ихъ прибавленія.

Азотистая кислота — реакціи на послѣднюю дали отрицательные результаты.

b) Соль съ берега.

Послѣдняя взята съ противоположнаго заводу берега и представляла собой снѣжнобѣлую массу сухой вывѣтрившейся соли съ крупными кристаллами въ срединѣ.

При озерѣ расположенъ, какъ уже было сказано, солеваренный заводъ, арендуемый наслѣдникомъ Бардашева. За зиму 1894—95 г. послѣдній выработалъ 60 тыс. пуд., но за зиму 1898—99 г. только 11,600 пуд. Бываютъ даже годы, когда заводъ совсѣмъ не работаетъ вслѣдствіе недостаточной крѣпости разсола, которая чрезвычайно непостоянна и колеблется между 4-мя и 20-ю градусами по Боме. Лѣтомъ заводъ никогда не работаетъ, такъ какъ горькія соли въ то время преобладаютъ и очищать отъ нихъ разсолъ такъ, чтобы соль совершенно теряла горькій вкусъ, является невозможнымъ. Зимой, совершенно такъ же, какъ это имѣетъ мѣсто на Алтайскомъ озерѣ, очистку принимаетъ на себя сама природа: во время морозовъ выдѣляется большая часть глауберовой соли, которая всего болѣе и затрудняетъ добываніе поваренной соли.

Варницъ при заводѣ имѣется двѣ, обѣ довольно ветхія. Вода накачивается въ нихъ прямо изъ озера ведрами, прикрѣпленными къ колесу, которое приводится въ движеніе двумя лошадьми; вода отводится въ желѣзный чрентъ, находящійся въ варницѣ и служащій одновременно для вывариванія и осажденія.

На мой вопросъ, не имѣется ли какихъ-либо анализовъ разсола этого озера, мнѣ были показаны слѣдующіе анализы, произведенные въ Томской золотосплавочной лабораторіи.

1) Анализъ поваренной соли, вываренной на Александровской и Срѣтенской варницахъ въ январѣ м. 1895 г.

Въ 100 вѣсов. частяхъ обезвоженной соли содержится:

хлористаго натрія NaCl	98,37
сѣрноокислаго кальція CaSO_4	0,30
хлористаго магнія MgCl_2	0,43
нерастворимаго въ водѣ остатка	0,81
	99,91

2) Анализъ разсола, взятаго изъ озера 3 іюля 1895 г. Удѣльный вѣсъ разсола при 12°R . — 1,15 Боме. Вѣсъ твердаго остатка, высушеннаго при 150°C ., въ литрѣ разсола равняется 230,84 грм.

Составъ твердаго остатка:

хлористаго натрія NaCl	200,51
сѣрноокислаго кальція CaSO_4	4,94
„ магнія MgSO_4	2,75
хлористаго магнія MgCl_2	4,54
глинозема Al_2O_3	0,74
органическ. нелетучихъ веществъ	17,84
	230,84

Въ 100 вѣсовыхъ частяхъ содержится:

хлористаго натрія NaCl	86,86
сѣрноокислаго кальція CaSO_4	2,14
„ магнія MgSO_4	0,98
хлористаго магнія MgCl_2	1,96
глинозема Al_2O_3	0,32
органическ. нелетучихъ веществъ	7,98
	99,98

Кромѣ того мнѣ были показаны еще два анализа разсола Бейскаго озера, произведенные въ той же лабораторіи одинъ — анализъ разсола, накаченного въ запасной ларь въ декабрѣ м. 1894 г., другой — анализъ разсола, взятаго изъ озера въ іюлѣ м. 1894 г. Впослѣдствіи оба анализа появились въ печати¹⁾ и поэтому помѣщены въ отдѣлѣ о литературѣ разбираемаго вопроса.

1) См. стран. 27 и 28.

Въ 6 часовъ вечера того же дня мы оставили Бейское озеро и отправились въ село Аскызъ. Дорога вела черезъ ту же степь, покрытую скудною растительностью; направо и налево тянулись невысокіе горные хребты, покрытые лишь пожелтѣвшей, тощей травой. Солнце палило немилосердно, термометръ доходилъ до 40° R. на солнцѣ. Выѣзжая изъ дома, я имѣлъ неосторожность не взять съ собою зонтика, о чемъ мнѣ пришлось не разъ сожалѣть въ дорогѣ, такъ какъ кожа у меня на лицѣ и даже рукахъ, отъ долгаго дѣйствія солнечныхъ лучей безъ малѣйшаго вѣтра, сдѣлалась сперва темно красной и потомъ сошла; послѣднее повторялось впрочемъ нѣсколько разъ за это время. Между тѣмъ, какъ у насъ было невыносимо жарко, вдали къ сѣверу, за горными хребтами виднѣлись темныя тучи, иногда перекрещиваемыя зигзагами молніи, и темныя полосы, исходящія изъ тучъ, указывали на сильный дождь, который однако къ намъ не дошелъ.

Черезъ нѣсколько часовъ ѣзды мы приблизились къ берегамъ Абакана. Здѣсь ландшафтъ совершенно измѣнился. На смѣну твердой, каменистой почвы, накаленной лучами солнца и покрытой большею частью пожелтѣвшей, низкорослой и сухой травой, появилась высокая, сочная трава и пышно разросшіеся деревья и кустарники, которыми покрыты берега Абакана. Почва береговъ мягкая, влажная и плодородная, покрытая пестрымъ ковромъ цвѣтовъ, посреди котораго синѣютъ волны быстрого Абакана. Ложе его выстлано камнями разныхъ величинъ и названій, но всѣ они округлены постояннымъ треніемъ другъ о друга, вызваннымъ чрезвычайно быстрымъ теченіемъ этой горной рѣки, вода которой прозрачна и чиста, какъ кристаллъ.

Переправа черезъ Абаканъ не представляла никакихъ затрудненій и не требовала много времени, такъ какъ черезъ рѣку ходитъ благоустроенный паромъ съ достаточнымъ количествомъ рабочихъ. По ту сторону рѣки мы продолжали нашъ путь и скоро прибыли въ село Аскызъ, въ которомъ

остановились на ночлегъ. Село это, состоявшее въ 1835 г. только изъ маленькой деревянной церкви, дома священника и кабака¹⁾, имѣетъ теперь довольно значительные размѣры: на мѣстѣ маленькой деревянной церкви выросъ большой каменный храмъ, а вмѣсто одного кабака, вѣроятно, нѣсколько. За околицей находятся вездѣ отгороженные мѣста для скота, представляющаго собой главное богатство тамошнихъ жителей, такъ какъ хлѣбопашествомъ занимаются лишь очень немногіе. Село заселено почти исключительно татарами и имѣетъ свою инородческую управу. Съ главнымъ заправиломъ этой управы, т. е. съ ея писаремъ, я имѣлъ честь познакомиться, ибо въ его завѣдываніи находится дворянская квартира, имѣющаяся въ каждомъ селѣ и служащая для проѣзжающихъ чиновниковъ, въ которой нашелъ пріютъ и я. Писарь былъ мужчина внушительнаго роста, который вполне сознавалъ свое значеніе, какъ представителя „власти“. Войдя въ комнату, гдѣ я сидѣлъ и пилъ чай, онъ, ни чуть не стѣсняясь, поздоровался, подаль руку, досталъ себѣ стаканъ, сѣлъ возлѣ меня и налилъ себѣ чаю. Мнѣ, впрочемъ, было весьма кстати поговорить съ человѣкомъ, до тонкости знающимъ округу, и получить отъ него нѣкоторыя указанія относительно дальнѣйшаго пути, объ образѣ жизни мѣстныхъ жителей и т. п.

Послѣ плохо проведенной ночи въ душной, жаркой комнатѣ, измученный комарами и блохами, я утромъ на другой день, т. е. 12 іюня, отправился со своими двумя ямщиками въ дальнѣйшій путь. Ближайшей нашей цѣлью была татарская юрта, лежащая въ 25 верстахъ отъ Аскыза, при устьѣ рѣчки Камышты, притока Абакана, гдѣ мы должны были переѣхать лошадей. Переѣхавъ черезъ Абаканъ, мы уже вчера вечеромъ вступили въ Сагайскую степь, которая, впрочемъ, ничѣмъ не отличается отъ пройденной нами Абаканской; все то же слегка волнистое плоскогоріе съ ясно выраженнымъ

1) Степановъ. Енисейская губернія. Стр. 136.

степнымъ характеромъ. То ближе, то дальше видѣются горные хребты, поднимающіеся иногда до значительной высоты, дорогу пересѣкаетъ то прѣсный ключъ, то рѣчка, извивающаяся въ видѣ синей ленты съ широкой, зеленой каймою сочныхъ травъ и кустовъ по берегамъ, то встрѣчаются пасущіяся на болѣе низкихъ и влажныхъ мѣстахъ стада скота инородцевъ, то видны озера или солончаки и изрѣдка отдѣльные юрты или улусы татаръ. Шелъ мелкій дождикъ и термометръ показывалъ лишь 15° R. Такъ рѣзки здѣсь колебанія температуры, что указываетъ на вполне континентальный климатъ. Вчера 40° R. (на солнцѣ), а сегодня 15° R. Хотя послѣ такихъ жаровъ пониженіе температуры было весьма пріятно, но я прозябъ, хотя былъ въ ватномъ пальто, и очень былъ радъ, когда солнце опять выглянуло изъ-за тучъ. Начиная съ Бейскаго озера, по всей степи встрѣчались курганы, обставленные различной формы камнями, на которыхъ нерѣдко имѣются надписи и фигуры. Извѣстно, что курганами называются могилы давно угаснувшей народности. Однако не всѣ курганы служили могилами, нѣкоторые употреблялись татарами, какъ маяки, означающіе путь воинственныхъ ордъ.

Степановъ, бывший Енисейскій губернаторъ, говоритъ въ цитированномъ сочиненіи на стр. 124: „Курганы съ большимъ количествомъ остововъ означаютъ, безъ сомнѣнія, могилы воиновъ, но тѣ, въ которыхъ не болѣе одного, которые обставлены каменными плитами и находясь въ большомъ количествѣ и близкомъ другъ отъ друга разстояніи, составляютъ, конечно, мирныя кладбища кочевыхъ народовъ древности. Могилы, находящіяся въ Минусинскомъ округѣ, принадлежатъ къ сему послѣднему разряду“. Далѣе на той же страницѣ Степановъ говоритъ о происхожденіи кургановъ. „Между туземцами сіи могилы слывутъ Чудскими. Нѣкоторые писатели-путешественники увлеклись также мыслию, что могилы Минусинскаго края и вещи, въ нихъ находимыя, должны принадлежать народамъ, которые носятъ на себѣ

имя Чуди; другіе раздѣляли могилы на Чудскія и Киргизскія“.

Какъ видно, Степановъ самъ не согласенъ съ этимъ мнѣніемъ. Онъ предлагаетъ сравнивать предметы изъ Минусинскихъ кургановъ съ предметами, находимыми въ старыхъ могилахъ Чуди на Уралѣ и за Ураломъ по направленію къ Балтійскому морю. „Если отвѣты будутъ подтвердительны, говоритъ онъ, то могло бы оставаться вѣроятіе, что могилы Чуди смѣшаны съ Монгольскими, но и тогда мертвые свидетели — житель каждой могилы, скулатая голова каждого, опровергла бы всякое вѣроятіе“.

Относительно вещей, найденныхъ въ этихъ могилахъ Минусинскаго округа, мы тамъ же, на стр. 131 читаемъ: „Было время, что въ могилахъ Минусинскаго края находили множество серебрянныхъ и золотыхъ вещей. Тогда собрались цѣлыя артели, и подъ названіемъ могильщиковъ, ходили нарушать спокойствіе мертвыхъ. Теперь очень рѣдко можно отыскать могилу неприкосновенную. Но гдѣ же тѣ вещи, которыя достались въ добычу могильщикамъ? Большая часть изъ нихъ растоплена въ слитки; другая разбредлась по рукамъ“.

Слишкомъ мало компетентный въ этомъ дѣлѣ, я въ предыдущемъ привелъ слова стараго автора, бывшаго Енисейскаго губернатора, собравшаго всѣ данныя касательно этого предмета въ своей книжкѣ „Енисейская губернія“. Но какъ до него, такъ и послѣ много было писано о Минусинскихъ курганахъ; каждый авторъ высказывалъ свое мнѣніе и каждый старался его подтвердить предположеніями и фактами. Все, что было написано, привести невозможно и не входитъ въ мою задачу, тѣмъ болѣе, что, повидимому, вопросъ этотъ рѣшенъ, и въ энциклопедическомъ словарѣ мы читаемъ: „Несомнѣнно, что всѣ, сохранившіеся въ краѣ (Минусинскомъ) памятники, надписи, курганы и городища принадлежатъ обитавшимъ здѣсь со временъ христіанской эры, если не раньше, предкамъ киргизъ, извѣстныхъ по ки-

тайскимъ лѣтописямъ V в. по Р. Хр. подъ именемъ хакановъ и кили-кидзи“.

Но если спросить татарина тѣхъ степей, кто покоится въ этихъ могилахъ, онъ неизмѣнно отвѣчаетъ — Чудь.

Перемѣнивъ у татарской юрты лошадей, мы отправились дальше къ устью Уйбата, также притока Абакана. Дорога вела въ гору, но и здѣсь, куда не взглянешь, голая степь; не видно не единого кустика, не говоря ужъ о деревьяхъ. На десятой верстѣ отъ послѣдней юрты, а отъ села Асказы на 35-ой верстѣ, по правой сторонѣ дороги встрѣтилось озеро подъ названіемъ Доможаково.

Озеро Доможаково.

Названіе это, какъ и названіе всѣхъ другихъ озеръ, мнѣ сообщено на мѣстѣ инородцами ближайшей окрестности, поэтому я полагаю, что они наиболѣе правильныя; но на существующихъ картахъ значатся нерѣдко другія названія, при чемъ положеніе нѣкоторыхъ озеръ на картахъ приблизительно совпадаетъ съ озерами, мною посѣщенными и описанными, но я затрудняюсь признать ихъ тождественными. Весьма возможно, что озера, помѣщенные на картахъ, имѣются въблизи посѣщенныхъ мною озеръ, но рѣшительнаго я ничего сказать не могу за неимѣніемъ основательныхъ данныхъ и специальной карты этой системы озеръ, которая, къ сожалѣнію, еще не существуетъ. Итакъ, назову я это озеро мѣстнымъ именемъ Доможаково.

Длинникъ его расположенъ отъ NNE къ SSO, длиною оно приблизительно въ $\frac{1}{2}$ версты, а шириною въ $\frac{1}{4}$ версты, при глубинѣ въ $\frac{1}{4}$ аршина. Какъ видно на мѣстѣ, озеро недавно значительно отступило отъ своихъ прежнихъ береговъ, такъ какъ берегъ озера на большомъ растояніи былъ сырой и топкій. Но стоило сдѣлать нѣсколько шаговъ въ воду, какъ почва подъ ногами сразу становится твердой, такъ что по ней можно было даже ходить, благодаря слою

бузуна, находящемуся на днѣ озера и достигающему мощности 1 аршина. Подъ бузуномъ находится черный иль, совершенно похожій на иль озеръ Алтайскаго и Бейскаго. Рыбы въ озерѣ, конечно, нѣтъ, также почти не имѣется тѣхъ рачкообразныхъ, которыми кишатъ другія вышеупомянутыя озера.

Вокругъ озера та же голая степь; ни одного домика, ни одной юрты не видно на всемъ пространствѣ, сколько можетъ окинуть глазъ. Иногда лишь тамъ и сямъ среди степи показываются пастухи-татары со своими табунами, да по временамъ мертвая тишина прерывается дикими утками и турпанами, съ рѣзкимъ крикомъ поднимающимися съ озера.

На SE сторонѣ озера находится довольно высокая гора, подножье которой, — представляющее одновременно берегъ озера, — состоитъ изъ красной глины, между тѣмъ какъ на противоположной сторонѣ берегъ высланъ сѣрой глиною съ примѣсью земли.

Взяты были для изслѣдованія вода и бузунъ со дна.

а) Вода.

Температура воды — 15° R.

„ воздуха — 15° R.

Удѣльн. вѣсъ на вѣсахъ Мора-Вестфалья — 1,1340.

Цвѣтъ — едва желтоватый.

Вкусъ — очень горькій.

Запахъ — не замѣчено никакого.

Реакція — средняя.

Свободная CO_2 — не было замѣчено.

Амміакъ — отъ реактива Несслера получилось едва замѣтное пожелтѣніе смѣси.

Сѣроводора — открыть не удалось, ни запахомъ, ни реактивами.

Заиси желѣза } — реактивы на послѣднія дали отрицательные результаты.
Азотистая кислота }

б) Бузунъ со дна.

Послѣдній представлялъ собой крупно-кристаллическія массы толщиною до одного аршина, горькаго вкуса. Грязи въ ней было

немного. На воздухъ кристаллы скоро обсыхали и выветривались.

Какъ видно изъ предыдущаго, озеро очень не большое и не глубокое; бываютъ періоды, когда оно совершенно высыхаетъ, слои бузуна выходятъ на поверхность земли и тогда только эти бѣлые пласты свидѣлствуютъ о бывшемъ здѣсь озерѣ.

Къ вечеру мы пріѣхали въ улусъ инородца Ивана Ефимовича Тутачикова, находящійся при устьѣ Уйбата, въ 35 верстахъ отъ устья Камышты, послѣдней нашей станціи; въ этомъ улусѣ мы и остались ночевать. Не желая дѣлать ночлегъ въ юртѣ съ цѣлой татарской семьей, я предпочелъ ночевать подѣ открытымъ небомъ, хотя температура воздуха понизилась къ вечеру до 11° R., а ночью даже до 6° R., что особенно было чувствительно послѣ жестокаго зноя предыдущихъ дней.

На другое утро, 13-го іюня, мы были рано на ногахъ и отправились въ дальнѣйшій путь къ улусу татарина Николая Николаевича Тутачикова, находящемуся по ту сторону р. Уйбата, вверхъ по теченію. Переправившись черезъ Уйбатъ, мы вступили въ Качинскую соляную степь. Дорога наша пролегала все время неподалеко отъ Уйбата и шла противъ его теченія. Отѣхавши около 12 верстъ отъ послѣдней нашей остановки, недалеко отъ горы Копчаль и не болѣе трехъ верстъ отъ Уйбата, встрѣтили мы по обѣимъ сторонамъ дороги (так. наз. Копчальской) два высохшихъ озера. Большее изъ нихъ, по правой сторонѣ дороги, имѣетъ въ длину около версты и въ ширину около полверсты, а другое по лѣвой сторонѣ, значительно меньше перваго. Но вся поверхность перешейка, лежащаго между ними, покрыта солью, откуда видно, что когда то оба озера были слиты въ одно, и все это пространство представляло собой горько-соленое озеро. Подѣ бѣлымъ налетомъ выкристаллизовавшейся соли (солонцы) находится красная глина съ включенными въ нее кристаллами. Другое высохшее озеро — Артыкъ-куль — лежитъ въ 1½ верстахъ отъ улуса Н. Н. Тутачикова;

оно въ настоящее время также незначительнаго размѣра, но вся обширная котловина, часть которой занимаетъ Артыкъ-куль, солонцоватаго характера и вся она, вѣроятно, представляла раньше съ озеромъ одно цѣлое. Подѣ солонцами находится частью красная, частью желтая глина; какъ въ глинѣ, такъ и на поверхности ея, между бѣлымъ налетомъ выветрившейся соли, встрѣчается волокнистый гипсъ, небольшими кусочками, но въ большомъ количествѣ. Замѣчательно, что эти высохшія озера, не содержащія ни капли воды, тѣмъ не менѣе охотно посѣщаются чайками. Есть ли это признакъ большой преданности старому другу или нуждаются онѣ то же въ слабительной соли? Также замѣчаются часто на солончакахъ коровы и лошади, гдѣ онѣ лижутъ соль, состоящую однако здѣсь почти исключительно изъ сернокислаго натрія.

Въ полдень мы прибыли въ улусъ Н. Н. Тутачикова, отстоящій въ 25 верстахъ отъ улуса И. Е. Тутачикова и лежащій вблизи рѣки Уйбата на возвышенномъ мѣстѣ. Зеленые луга, раскинувшіеся по берегамъ мелкой рѣчки Уйбата, свидѣлствуютъ о благотворномъ дѣйстви ея воды во время разлива, что становится особенно ясно, если сравнить берега рѣчки съ окружающей, болѣе возвышенной степью, не заливаемой весенней водой. Здѣсь луга, покрытые пышной свѣжей порослью, тамъ — голая, гористая степь, лишенная почти всякой растительности за исключеніемъ мелкой, засохшей травы.

Отсюда мы отправились къ улусу инородца Кобылькова. Слѣдуя до сихъ поръ по теченію р. Уйбата, теперь мы взяли дорогу прямо на сѣверъ. Открывшаяся передъ нами степь представляла все ту же картину, которую мы уже неоднократно описывали. Чаше попадался только бѣлый налетъ на поверхности земли, и иногда видны были высохшія озера, покрытыя слоемъ совершенно бѣлой выветрившейся соли; покровъ этотъ, особенно на солнцѣ, представляетъ не мало сходства съ снѣжнымъ покровомъ. Говоря о снѣжномъ по-

кровѣ, я не могу не вспомнить поэтического описанія этихъ степей въ вышеупомянутомъ сочиненіи г. Степанова „Енисейская губернія“. На стр. 135 читаемъ слѣдующее: „Солнце палитъ жестокимъ образомъ; воздухъ рябѣетъ въ необозримомъ пространствѣ; ни дерева, ни кустарника; изрѣдка цвѣты ирисъ; мало травы; вся поверхность земли растрескалась; все блѣдно и желто. Но вотъ, у подножія одного возвышенія бѣлѣютъ снѣга пушистые. Какъ пріятель этотъ покровъ земли тогда, какъ термометръ показываетъ (хотя на солнцѣ) 40° тепла! Я приближаюсь, я хочу, какъ бѣлый медвѣдь, зарыться въ сугробъ отрядный; но моя нога скользитъ по кристалламъ. Это солончаки, это соль, разсыпанная по всей почвѣ сихъ богатыхъ пастбищъ; она скопилась здѣсь въ большомъ количествѣ, горитъ лучами солнца, заиндѣвѣла на поверхности земли и по растеніямъ ее покрывающимъ“. Я, какъ обыкновенный смертный, не поэтъ, принялъ этотъ покровъ и издали за то самое, чѣмъ онъ былъ въ дѣйствительности.

По дорогѣ, въ 8 верстахъ отъ покинутого нами улуса Н. Н. Тутачикова, имѣются два высохшихъ озера, овалъ которыхъ расположенъ отъ NNE къ SSO. Оба эти озера составляли прежде, а въ полую воду составляютъ и теперь одно цѣлое, о чемъ говоритъ невысокій и не широкій перешеекъ между ними, покрытый тѣмъ же бѣлымъ налетомъ. Озеро это называется Джемакъ-куль.

Джемакъ-куль.

Джемакъ-куль находится въ неглубокой котловинѣ. Длина того и другого озера приблизительно въ 2 версты, при ширинѣ въ $\frac{1}{2}$ версты. На поверхности ихъ находится слой вывѣтрившагося бузуна, представляющаго пласты въ $\frac{1}{2}$ —1 дюймъ толщины, за нимъ

слѣдуетъ сѣрая глина, а подъ глиною лежитъ слой невывѣтрившагося бузуна, мощности въ $\frac{1}{2}$ аршина; отъ обоихъ слоевъ бузуна взяты образчики для изслѣдованія. Весьма вѣроятно, что подъ этими слоями находятся еще другіе слои бузуна, но за неимѣніемъ необходимыхъ инструментовъ, изслѣдованіе въ этомъ направленіи не могло быть выполнено.

Къ вечеру мы пріѣхали къ улусу татарина Кобылькова. Въ предыдущемъ я уже нѣсколько разъ говорилъ о юртахъ и улусахъ инородцевъ-татаръ, обывателей этихъ степей, не останавливаясь однако на описаніи ихъ образа жизни, домашнего быта и т. п. Теперь я намѣренъ пополнить этотъ пробѣлъ, хотя въ самыхъ краткихъ чертахъ, и изложить, главнымъ образомъ, свои собственные путевыя наблюденія, дополняя ихъ однако, гдѣ необходимо, литературными данными.

Инородцы Минусинскихъ степей, извѣстные у русскихъ подъ общимъ именемъ „татаръ“, принадлежатъ къ тюркскому племени, дѣлятся на нѣсколько родовъ, объединенныхъ въ настоящее время въ два общества, управляемые родовыми начальниками, подъ наблюденіемъ Минусинскаго окружнаго начальника¹⁾. Главное ихъ занятіе — скотоводство; лишь немногіе занимаются хлебопашествомъ, и то хлѣба сѣютъ немного, только для собственнаго хозяйства. Живутъ они большею частью въ улусахъ, расположенныхъ въ 15-ти и больше верстахъ другъ отъ друга и состоящихъ всего изъ нѣсколькихъ юртъ; рѣже нѣсколько улусовъ соединяются вмѣстѣ, образуя небольшую деревню. Юрты повсюду деревянные, — за исключеніемъ изрѣдка попадающихся въ степи временныхъ пастушескихъ юртъ, которыя сдѣланы изъ кожи, — и представляютъ собой 6-ти, 8-ми или 10-ти угольникъ, безъ оконъ, съ одной дверью. Крыша крыта или тесомъ или корою, съ отверстіемъ въ серединѣ для свѣта и для выхода дыма. При входѣ въ юрту представляется слѣдующая

1) Энциклопедическ. словарь Брокгауза и Ефрона.


картина: всѣ стѣны, за исключеніемъ той, гдѣ продѣлана дверь, и противоположной ей, гдѣ стоитъ постель, съ верху до низу покрыты полками. По правой сторонѣ юрты полки, особенно верхнія, расположены на очень близкомъ растояніи другъ отъ друга и служатъ для храненія посуды. По числу и цѣнности этой посуды судятъ о богатствѣ хозяина и для того, чтобы она занимала какъ можно больше мѣста, стаканы, тарелки, блюда для чая и т. п. разставлены всѣ по одиночкѣ. Тщеславіе туземцевъ выражается въ пріобрѣтеніи и храненіи на показъ совершенно ненужныхъ вещей; не говоря уже о томъ, что имъ и тарелки — вещи ненужныя и употребляются онѣ развѣ только по большимъ праздникамъ, я у одного богатаго татарина насчиталъ не менѣе 13-ти штукъ однихъ только чайниковъ. Немного ниже, также на полкахъ на той же сторонѣ находится множество тазовъ, — мѣдныхъ, фаянсовыхъ, эмалированныхъ и деревянныхъ, — разныхъ величинъ и фасоновъ, а самыя нижнія полки занимаютъ деревянные кадки и ушаты, изъ которыхъ одни содержатъ закисшее молоко, называемое айраномъ, и служащее для выкуриванія араки (объ этомъ рѣчь ниже), другіе ушаты наполнены остатками отъ перегонки айрана, употребляемыми татарами вмѣсто кваса.

На другой сторонѣ юрты, т. е. слѣва отъ входа, промежутки между полками больше; на полкахъ здѣсь разставлены ящики всевозможныхъ размѣровъ, обитые листовымъ желѣзомъ и покрытые разноцвѣтнымъ лакомъ, имѣющіе большею частью четырехъ-, шести- или восьми-гранную форму. Эти ящики расположены такъ же, какъ и посуда, т. е. тѣ, что меньше, стоятъ на верхнихъ полкахъ, покрупнѣе — на нижнихъ; въ нихъ хранится все имущество семьи.

Въ каждой юртѣ, близъ головнаго конца кровати, виситъ икона. Кровать въ юртѣ не то, что наша обыкновенная кровать; это — такая же полка, какъ всѣ остальные, съ тою лишь разницею, что надъ нею нѣтъ другихъ полокъ и что она покрыта одѣяломъ, на которомъ разложены подушки.



Татарскія телѣги и татарки.



Внутренній видъ татарской юрты.

Мебели въ юртѣ очень немного; одинъ, два стула и одинъ столикъ, выкрашенные масляной краской, представляютъ большую частью весь инвентарь татарскаго хозяйства. Часто можно встрѣтить низенькій столикъ съ очень короткими ножками, служащій обѣденнымъ столомъ; всѣ татары сидятъ во время обѣда по-турецки на полу, и столъ съ высокими ножками былъ бы для нихъ крайне неудобенъ; послѣдній, какъ и стулья, имѣются только для гостей-русскихъ, посѣщающихъ изрѣдка эту глушь. На глиняномъ полу у богатыхъ лежатъ ковры, у бѣдныхъ — шкуры домашняго скота или же сосновая кора. Чтобы окончить описаніе внутренняго устройства юртъ, слѣдуетъ упомянуть еще объ одной неизмѣнной принадлежности всякой юрты; это четырехугольный очагъ съ приборомъ для выкурки араки, находящійся по срединѣ юрты. Приборъ этотъ представляетъ настоящій перегонный кубъ, хотя первобытнаго устройства. Нижняя часть его состоитъ изъ довольно плоской желѣзной чашки, въ которую вливается айранъ, а верхняя часть представляетъ собой деревянную крышку, снабженную двумя отводными трубками, ведущими къ желѣзному кувшину; послѣдній, для охлажденія, вставленъ въ корыто съ водою. Всѣ щели, какъ между отводными трубками и крышкой, такъ и между послѣднею и желѣзной чашкою, замазываютъ смѣсью глины съ конскимъ пометомъ. Вода въ корытѣ, помимо своего прямого назначенія, имѣетъ еще слѣдующія, довольно разнообразныя примѣненія: она служитъ для обмыванія вышеупомянутой замазки изъ конскаго помета и глины, для стирки бѣлья, для мытья кухонной посуды. Еще Палласъ ¹⁾, путешествовавшій въ концѣ 18-го столѣтія по Сибири, говоритъ о татарахъ, что они чрезвычайно грязны; такой же отзывъ находимъ мы почти у всѣхъ другихъ авторовъ, описывавшихъ ихъ бытъ.

1) Opus cit.

Полученный такимъ образомъ, т. е. перегонкою айрана (закисшаго молока) напитокъ, называемый „арака“, представляетъ почти прозрачную, съ бѣловатымъ оттѣнкомъ, жидкость съ запахомъ кислаго молока, которая содержитъ до 8% алкоголя. Татары очень падки до него и пьютъ его всѣ поголовно, старые и малые, мужчины и женщины. Что выкурка водки изъ молока давно уже извѣстна татарамъ Минусинскихъ степей, это мы видимъ, напр., изъ описанія путешествія по Сибири Палласа, а также изъ сочиненія Пестова, „Записки объ Енисейской губернии Восточной Сибири, изд. 1833 г.“, гдѣ мы на стр. 83 читаемъ слѣдующее: „Пристрастны они до горячаго вина; для удовлетворенія таковой страсти научились сами изъ молока гнать оное; но такое нетерпѣніе имѣютъ въ семъ промыслѣ, что едва только добудутъ съ стаканъ или рюмку вина, ту жь минуту выпиваютъ, и потомъ опять продолжаютъ свою добывку вина, доколѣ своимъ лакомствомъ насытятся допьяна и тогда уже оставляютъ свое дѣло; проспавшись опять продолжаютъ и такимъ образомъ до того времени, пока молока станетъ. Но въ запасъ сего напитка никогда не могутъ выкурить нисколько; ибо когда занимаются симъ дѣломъ, то на всякую выходящую каплю съ восторгомъ смотрятъ и какъ бы уже оную глотаютъ; и во все время курки вина, до окончанія запаса молока бываютъ какъ сонные.“ Какъ видно изъ приведенныхъ словъ г. Пестова, авторъ говоритъ о сильной страсти этихъ инородцевъ къ спиртнымъ напиткамъ; страсть эта, хотя, конечно, она и до сихъ поръ существуетъ, какъ мнѣ кажется, значительно ослабѣла; мнѣ по крайней мѣрѣ, пришлось только одинъ разъ видѣть нѣсколько пьяныхъ татаръ и то въ воскресенье вечеромъ, между тѣмъ какъ выкурка араки производилась въ каждой изъ посѣщенныхъ мною юртъ, слѣдовательно возможность напиться была ежедневно.

Пища Минусинскихъ татаръ большею частью молочная, хотя и мясные блюда не составляютъ рѣдкости; особенно охотно

употребляется въ пищу баранье мясо. Чай татары пьютъ не такъ, какъ мы, они варятъ его въ котлѣ съ водою и съ солью, затѣмъ разливаютъ въ чашки, куда каждый прибавляетъ ложечку смѣтаны. Вѣроятно, такой чай кажется имъ вкуснѣе, такъ какъ почти въ каждой юртѣ имѣется самоваръ для русскихъ гостей и слѣдовательно татары хорошо знакомы съ нашимъ способомъ приготовления чая; тѣмъ не менѣе они отдаютъ предпочтеніе своему чаю. Говоря о чаѣ, я долженъ еще прибавить, что во всей Енисейской губерціи, на сколько мнѣ извѣстно, какъ инородцами, такъ и русскими крестьянами употребляется исключительно кирпичный чай, продающійся плитками вѣсомъ до $2\frac{3}{4}$ фунта; стоимость такой плиты, называемой кирпичомъ, отъ 90 коп. до 1 рубля 10 коп. Табакъ также хорошо извѣстенъ татарамъ и курятъ они всѣ, какъ мужчины, такъ и женщины, съ большимъ наслажденіемъ. При входѣ въ юрту часто представляется слѣдующая картина: все общество — мужчины, женщины и дѣти усѣлись въ кружокъ вокругъ огня, поддерживаемаго цѣлый день; на полу — деревянная дощечка, а на ней лежитъ кусокъ березовой или осинової коры и немного дальше простой, желѣзный ножъ съ деревянной рукою. Лѣниво протянетъ старый татаринъ руку за дощечкой, вынетъ изъ кармана крѣпко свернутый листовый табакъ (растущій тутъ же на степи), разрѣжетъ его на дощечкѣ на куски и вмѣстѣ съ табакомъ крошитъ мелкихъ кусочковъ коры. Медленно извлекается изъ-за пазухи короткая толстая трубка, украшенная арабесками изъ листового желѣза, въ нее высыпается табакъ вмѣстѣ съ кусочками коры, а сверху кладется горячій уголь. Покуривъ немного, передаетъ онъ трубку своему сосѣду (или сосѣдкѣ) и тѣ въ свою очередь приступаютъ къ наслажденію.

Одежда инородцевъ Минусинскихъ степей въ настоящее время та же, что и у русскихъ крестьянъ, а дѣти бѣгаютъ лѣтомъ совсѣмъ голыми. Бывшіе еще въ серединѣ 18-го столѣтія язычниками, татары мало по малу всѣ приняли христіан-

ство и теперь уже всѣ считаются православными, хотя и нельзя отрицать, что нѣкоторая привязанность къ шаманству у нихъ осталась. О сущности ихъ прежней вѣры въ Энциклопедическомъ словарѣ мы читаемъ слѣдующее : „По представлѣніямъ Минусинскихъ татаръ на небѣ въ большой юртѣ живетъ Богъ, на землѣ летаютъ духи огня, воды, горъ и животныхъ, а подъ землею живетъ чортъ — Эрликъ-ханъ, принимающій у себя шамановъ и ихъ послѣдователей.“

Чтобы дать читателю хотя маленькое понятіе о сохранившихся еще остаткахъ шаманства, я приведу описаніе татарскаго праздника, происходившаго въ присутствіи шамана. Свѣдѣнія эти я получилъ отъ одного очевидца-русскаго, а украшенную лентами березу, вокругъ которой совершилось празднество, видѣлъ и самъ. Было это недалеко отъ улуса Кобылькова. На горѣ, вокругъ одиноко стоящей березы, собирается около 50 человѣкъ татаръ, исключительно мужчинъ; по срединѣ ставятъ большой котелъ съ водою, подъ которымъ разведенъ огонь. Привозятъ 10 головъ барановъ, каждому подгибаютъ переднюю ногу и завязываютъ ее березовымъ прутомъ такимъ образомъ, чтобы нога осталась въ согнутомъ положеніи; барановъ обводятъ сначала 3 раза вокругъ огня, затѣмъ рѣжутъ ихъ; первыми каплями крови окропляютъ огонь, мясо дѣлятъ на куски, которые кладутъ въ котелъ съ водою, а внутренности и всѣ остатки бросаютъ въ огонь. Шаманъ, въ большой широкополой шляпѣ, украшенной лентами, съ блюдомъ и чашечкой изъ березовой коры въ рукахъ, ходитъ вокругъ огня, брызгаетъ воду то вверхъ, то на присутствующихъ, то въ огонь, произнося при этомъ непонятныя слова, вѣроятно молитву; затѣмъ онъ даетъ присутствующимъ пить изъ этой чашки. Тѣмъ временемъ баранина сварилась, ее вынимаютъ березовыми палочками, кладутъ на березовую тарелку и опять шаманъ ходитъ вокругъ огня, бросая куски то вверхъ, то въ огонь. Такимъ же образомъ поступаетъ онъ съ аракою. Затѣмъ всѣ садятся вокругъ березы, около костра и начинается пиръ, дѣлятъ

баранину и запиваютъ аракой; хлѣбъ при этомъ не употребляется. Остатки бросаются въ огонь.

Какъ мы видимъ, описанные богослужебные приемы шамана не противорѣчатъ сказанному о представлѣніяхъ Минусинскихъ татаръ и сводятся къ почитанію духовъ воздуха (Бога), огня и воды, которымъ приносится въ жертву баранина и арака, представляющіе лакомства для татаръ; но кромѣ того мы замѣчаемъ, что и береза играетъ не мало-важную роль въ шаманствѣ: подъ ней происходитъ все торжество, ею завязываются ноги у барановъ, она служитъ для выниманія баранины изъ котла и изъ березоваго дерева, наконецъ, тарелка и чашечка въ рукахъ шамана.

Улусъ Кобылькова, богатаго татарина, представляетъ настоящій помѣщичій дворъ; въ немъ находятся не только юрты, но и деревянные, хотя небольшія, постройки. Занимается онъ, какъ и всѣ степные татары, скотоводствомъ и имѣетъ до 800 головъ рогатаго скота, 600 лошадей и 800 барановъ и овецъ. Тѣмъ не менѣе живетъ онъ не многимъ развѣ лучше своихъ бѣдныхъ собратьевъ; но сынъ его посѣщаетъ русскую школу въ городѣ и умѣетъ хорошо говорить, читать и писать по-русски. Ночь провелъ я опять подъ открытымъ небомъ, а утромъ на другой день отправился дальше. Ближайшею моею цѣлью была татарская деревушка Кутенбулукъ, въ 30 верстахъ отъ улуса Кобылькова. Въ пяти верстахъ отъ названной деревушки находится высохшее озеро, называемое „оз. Кобыльково“. Окружность его приблизительно 8 верстъ, а ширина не больше одной версты. Оно имѣетъ овальную форму и длинною стороною расположено отъ О на Е. Съ сѣверной стороны въ озеро впадаетъ прѣсноводный ключъ, образующій въ срединѣ озера небольшую лужу, въ которой однако вода почти прѣсная, поэтому не взята съ собою. Почва состоитъ изъ голубовато-сѣрой глины и очень вязкая; вся выступающая изъ-подъ поверхности воды почва покрыта тонкимъ слоемъ бѣлаго, какъ снѣгъ, бузуна, привлекающаго къ себѣ изъ ближайшаго

табуна лошадей, которые стоят и наслаждаются солью. Какъ въ серединѣ, такъ и по берегамъ озера виднѣются чайки и турпаны. Вдали отъ озера, на сѣверѣ, по направлению отъ О на Е тянется горный хребетъ съ красными и сѣрожелтыми породами, мѣстами онъ покрытъ лѣсомъ.

Послѣ обѣда мы пріѣхали въ Кутенбулукъ, состоящій приблизительно изъ 20 домовъ и юртъ. Дома всѣ безъ крыши, низкіе и бѣдные, а юрты покрыты большею частью сосновой корой. Вслѣдствіе наступившей непогоды, — страшный ливень и гроза — мы принуждены были остаться здѣсь до вечера, т. е. до тѣхъ поръ, пока стало хотя немного яснѣе. Къ моему величайшему сожалѣнію, мой ямщикъ и провожатый, минусинскій мѣщанинъ Александръ Солдатовъ, здѣсь покинулъ меня; но лошади его сильно утомились и должны были итти на отдыхъ. Я ему очень благодаренъ за тѣ услуги, которые онъ мнѣ оказалъ во время пути. Если представить себѣ, что за водою приходилось итти иногда на разстояніи $\frac{1}{2}$ версты и больше, по очень топкой и вязкой почвѣ, что приходилось стоять часъ или больше въ водѣ и фильтровать ее, когда на солнцѣ (а тѣни нигдѣ не было!) термометръ показывалъ до 40° R., что, наконецъ, надо было на каждомъ озерѣ доставать реактивы и другія принадлежности, а затѣмъ опять уложить ихъ такъ, чтобы они не разбились при нашей ѣздѣ безо всякой дороги, — то каждый согласится, что задача эта не легкая. Но все это А. Солдатовъ исполнилъ по собственной охотѣ и за ничтожную плату, поэтому и мое сожалѣніе и моя благодарность вполне понятны.

Вечеромъ я отправился съ двумя татарами на двухъ телѣгахъ, какъ и раньше, въ деревню „Сухая Тесь“. Для достиженія своей цѣли, мы должны были переѣхать черезъ лежащій передъ нами Кутенбулукскій горный хребетъ, поднимающійся до значительной высоты. Ландшафтъ здѣсь совершенно измѣнилъ свой характеръ, степь смѣнилась густымъ лѣсомъ, Сибирской тайгой, которая тянулась почти до самой деревни „Сухая Тесь“, отстоящей отъ Кутенбулука въ 40

верстахъ. Мы едва успѣли выѣхать, какъ начался опять мелкій дождикъ, который все болѣе и болѣе усиливался. Ночь была очень темная, а дорога отвратительная. Мы поднимались все выше и выше, вода съ горы бѣжала настоящимъ ручьемъ по тѣмъ же самымъ колеямъ, по которымъ катились наши колеса; вода лилась сверху, вода брызгала и снизу сквозь телѣгу, которая состояла только изъ четырехъ колесъ и привязанной къ нимъ плетеной корзины; у послѣдней вдобавокъ было диравое дно, такъ что мои ноги постоянно проваливались въ дыры. Дорога была такъ плоха, что я ежеминутно опасался вывалиться. Нѣсколько разъ мы должны были останавливаться и вылѣзать изъ телѣги, такъ какъ въѣзжали въ какія то ямы, изъ которыхъ только общими усилиями удавалось освобождать наши телѣги; ямы, конечно, также были наполнены водою и это невольное купанье при такой обстановкѣ мнѣ вовсе не понравилось. Было уже далеко за полночь, когда мы добрались до вершины хребта; ѣхать внизъ стало немного лучше, дождь почти пересталъ и иногда луна выглядывала изъ-за тучъ; до сихъ поръ свѣтящіеся жучки представляли единственное освѣщеніе. При лунѣ можно было видѣть какихъ то звѣрковъ, по временамъ перебѣгавшихъ дорогу, изрѣдка бросались въ глаза своей окраскою или величиной цвѣты, растущіе около дороги, а нѣсколько шаговъ дальше, съ той и другой стороны, тянулась черная дремлющая тайга. Было уже утро, когда мы добрались до деревни Сухая Тесь, гдѣ я нѣсколько часовъ отдыхалъ. Оттуда мы отправились черезъ деревню Сонъ къ озеру Шира, куда прибыли послѣ обѣда.

Озеро Шира.


Озеро это простирается въ длину отъ OON на EES; длина его 8, ширина $4\frac{1}{2}$ версты, а окружность считается равной 25 верстамъ. Соленость воды озера оказалась по ареометру $2,1^{\circ}$ Боме, при температурѣ воды 16° R. Цвѣтъ воды озера, особенно

во время волненія, кажется по срединѣ зеленымъ, по краямъ краснымъ, что зависитъ отъ красныхъ породъ, входящихъ въ составъ береговой полосы. Изслѣдованія воды озера Ширы не производилъ по причинамъ, изложеннымъ въ предисловіи, т. е. потому, что проф. І. Залѣсскій былъ специально для этой цѣли откомандированъ туда изъ С.-Петербурга и я считалъ свое изслѣдованіе въ такомъ случаѣ излишнимъ. Курортъ при озерѣ еще очень мизерный, всего нѣсколько улицъ съ бѣдными домиками, покрытыми отчасти сосновой корой, придавленной плитнякомъ, такъ что дождь легко проникаетъ внутрь жилища. Растительности, за исключеніемъ сухой травы, никакой нѣтъ, или по крайней мѣрѣ весьма скудная. Увеселеній, комфорта, какъ это бываетъ въ другихъ курортахъ, также не имѣется. На SE сторонѣ впадаетъ въ озеро неширокая, прѣсная рѣчка Сонъ. Берега озера пологіе, голые или покрытые скудной травой, а вблизи воды — бѣлымъ налетомъ солей. Ежегодно пріѣзжаетъ на курортъ до 600 человекъ изъ сосѣднихъ губерній, отчасти для купанья въ озерѣ, отчасти для внутренняго пользованія его водой, обладающей слабительнымъ дѣйствіемъ. Жизненные продукты доставляются татарами изъ ближайшихъ деревень и сравнительно дороги, но все-таки дешевле, чѣмъ въ городахъ Сибири. За послѣднее время имѣется помѣщеніе для принятія теплыхъ ваннъ изъ Ширинской воды, аптека и церковь; послѣдняя устроена богатымъ мѣстнымъ жителемъ, татариномъ Спиринымъ.


Въ разстояніи 15 верстъ отъ Ширы къ сѣверу находится

Озеро Билъе.

Расположено оно своимъ длинникомъ отъ SO къ NE, при чемъ, приблизительно въ срединѣ, озеро раздѣлено перешейкомъ. Въ этомъ озерѣ есть рыба. Размѣръ озера очень значительный, окружность его, какъ говорятъ, около



Видъ Енисея близъ деревни Даурска.



Озеро и Курортъ Шира.

60 верстъ, хотя точныхъ измѣреній не существуютъ. Вода его, въ общей массѣ, имѣетъ темно-синій цвѣтъ, мѣстами съ зеленымъ отливомъ; берега отлогіе, безлѣсные, состоятъ изъ красныхъ породъ. Вода взята изъ озера 17-го июня. Предварительный анализъ ея далъ слѣдующіе результаты.

Температура воды — $14\frac{1}{2}^{\circ}$ R.

„ воздуха — 15° R.

Соленость по ареометру Бомэ — 1° .

Реакція — слабо-щелочная.

Сѣководородъ — не былъ открытъ ни запахомъ, ни растворомъ окиси свинца въ NaOH.

Запаха — нѣтъ никакого.

Вкусъ — горько-соленый.

Амміакъ — реактивъ Несслера далъ едва замѣтное желтое окрашиваніе.

Закись желѣза — съ растворомъ танина вода окрашивалась въ красно-фіолетовый цвѣтъ, а растворъ галлусовой кислоты вызвалъ сине-фіолетовое окрашиваніе.

Азотистая кислота — открыта не была.

Къ востоку отъ озера Ши́ра, всего лишь въ 4 верстахъ разстоянія, лежитъ озеро Иткуль.

Озеро Иткуль.

Оно расположено своимъ наибольшимъ діаметромъ съ SE на NO, форма его не строго овальная. Оно вытянуто на NE сторонѣ, гдѣ образуется трехугольная бухта. Вода въ немъ въ общей массѣ синяя, почти совершенно прѣсная, такъ что можетъ служить для питья, и въ ней водится много рыбы. Размѣры озера довольно значительны, но точнѣе ихъ назвать я не могу за неимѣніемъ необходимыхъ свѣдѣній. Озеро находится въ котловинѣ, окруженной горами, которыя то приближаются, то отступаютъ отъ берега. На SO берегу озера тянется небольшой лѣсокъ, любимый уголокъ посѣтителей озера Ши́ра, гдѣ они наслаждаются тѣнью березъ и лиственницъ, ибо во-

кругъ оз. Ши́ра лишь голая, знойная степь со скудной, высохшей травой и открытыми скалами. Здѣсь я никакихъ изслѣдованій не производилъ, такъ какъ озеро Иткуль прѣсное, а моя задача — изслѣдованіе горько-соленыхъ озеръ этихъ степей.

Лишь въ нѣсколькихъ верстахъ отъ послѣдняго лежитъ въ глубокой котловинѣ, окруженной довольно высокими горами, небольшое озеро Шунеть.

Озеро Шунеть.

Вода этого озера имѣетъ въ общей массѣ желтобурый цвѣтъ и сильный горько-соленый вкусъ; форма почти овальная, окружность въ 3—4 версты. Берега его на нѣкоторомъ разстояніи топки и состоятъ изъ темно-зеленой, почти черной минеральной грязи, пропитанной рапой. Сюда ѣздятъ нѣкоторые посѣтители оз. Ши́ра купаться въ илѣ, который, сильно нагрѣваясь на солнцѣ, прекрасно дѣйствуетъ при ревматизмѣ и многихъ другихъ болѣзняхъ. Въ него впадаетъ только очень небольшой ключъ, который вдобавокъ лѣтомъ совершенно пересыхаетъ. Глубина озера въ срединѣ не болѣе $1\frac{1}{2}$ —2 аршинъ, на днѣ его находится такъ называемый черепъ, т. е. слой горькихъ солей; я, къ сожалѣнію, его достать не могъ, но привожу дальше все-таки анализъ его, произведенный надъ черепомъ, взятымъ изъ озера годомъ раньше моего посѣщенія и доставленнымъ мнѣ любезно д-ромъ Л. Г. Куркошовомъ изъ Красноярска. Лѣса кругомъ нѣтъ, также не имѣется никакихъ помѣщеній для купающихся. По временамъ, говорятъ, слышенъ вблизи озера сильный запахъ сѣроводорода, котораго я во время моего посѣщенія озера не замѣтилъ.

Взяты мною для изслѣдованій вода и минеральная грязь. Предварительныя испытанія дали слѣдующіе результаты.

а) Вода.

Температура воды — 20° R.

Температура воздуха — 21° R.

Соленость по ареометру Бо́ме — 16° .

Запахъ — не замѣчено никакого.

Вкусъ — сильно горько-соленый.

Амміакъ — реактивъ Несслера далъ едва замѣтное желтое окрашиваніе.

Закись желѣза — при прибавленіи раствора таннина вода приняла красно-фіолетовый цвѣтъ, а растворъ галлусовой кислоты вызвалъ сине-фіолетовое окрашиваніе.

Азотистую кислоту — открыть не удалось.

в) Минеральная грязь.

Послѣдняя имѣла консистенцію мягкой мази, почти чернаго цвѣта, который при высушиваніи переходилъ въ сѣрый; запахъ гнющихъ органическихъ веществъ; запаха сѣроводорода не было замѣчено. Предварительныя изслѣдованія производились лишь на присутствіе въ ней свободнаго сѣроводорода, однако съ отрицательнымъ результатомъ.

18 іюня 1899 г. я оставилъ Ши́ра и отправился къ деревнѣ „Батени“, лежащей надъ Енисеемъ, въ 40 верст. приблизительно отъ Ши́ра, чтобы оттуда сѣсть на пароходъ, идущій изъ Минусинска въ Красноярскъ. По дорогѣ посѣтилъ и изслѣдовалъ я еще оз. Горькое. Озеро „Утичь“, встрѣченное мною раньше оз. Горькаго, я не изслѣдовалъ, такъ какъ оно оказалось прѣснымъ.

Озеро Горькое.

Озеро расположено длинникомъ съ SSE на NNO, имѣетъ въ длину около $1\frac{1}{2}$ версты, въ ширину около версты. Глубина озера въ срединѣ до трехъ аршинъ, почва вязкая и топкая, но мѣстами крѣпкая, благодаря выстилающему дну бузуну (черепъ), подъ которымъ лежитъ черная минеральная грязь. По берегамъ кругомъ лежатъ солонцы, а за ними почва усыпана ирисомъ. Менѣе глубокия мѣста озера по-

крыты корою изъ водорослей, пропитанныхъ солями, такъ что водоросль вмѣстѣ съ солью представляетъ одну сплошную массу, которая кишитъ жуками и червями. На Е концѣ озера, отдѣленная широкою полосой земли, находится повидимому, другая часть озера, совершенно высохшая и представляющая собой мелкую котловину, покрытую солью. Недалеко отъ него съ SE на NO невысокій горный хребетъ, покрытый травой, а мѣстами рѣдкимъ лѣсомъ; другой, еще менѣе высокій хребетъ, находится на N сторонѣ озера и расположенъ съ NE на O.

Утромъ 19 іюня взяты съ собой для изслѣдованія вода, водоросли и бузунъ, но банка съ бузуномъ дорогою разбилась и содержимое разсыпалось по всему ящику.

Предварительныя изслѣдованія воды дали слѣдующіе результаты.

Температура воды — 16° R.

Температура воздуха — 15° R.

Соленость по ареометру Боме — $6\frac{1}{2}^{\circ}$.

Цвѣтъ — желтоватый.

Вкусъ — горько-соленый.

Запахъ — нѣтъ.

Реакція — щелочная.

Свободная углекислота — нельзя было открыть; пузырьки не выдѣлялись при стояніи воды на воздухѣ въ открытомъ стаканѣ.

Сѣроводорода — не было открыто ни запахомъ, ни реактивами.

Амміакъ — отъ реактива Несслера получилось желтоватое окрашивание.

Азотистая кислота — реакціи на послѣднюю дали положительные результаты. Получилась едва синяя окраска отъ прибавленія слабой сѣрной кислоты и раствора іодистаго калия съ крахмальнымъ клейстеромъ.

Закись желѣза — не оказалась.

На этомъ я закончу описаніе моего путешествія по солонцеватымъ степямъ Минусинскаго округа. Въ Батеняхъ, послѣ $1\frac{1}{2}$ дневнаго ожиданія, я сѣлъ на пароходъ, идущій изъ Минусинска въ Красноярскъ, куда на другой день и прибылъ.

III.

Способы опредѣленія отдѣльныхъ составныхъ частей воды, бузуна и минеральной грязи.

I. Качественныя изслѣдованія.

Каждому количественному анализу минеральной воды предшествовало подробное качественное изслѣдованіе, производившееся по извѣстному руководству аналитической химіи R. Fresenius, а поэтому способы будутъ мною описаны кратко. Для опредѣленія рѣдкихъ составныхъ частей примѣнялся спектральный анализъ, которому я подвергалъ приготовленные специально для этой цѣли осадки, строго придерживаясь указаній Фрезеніуса (см. стр. 467—472).

Азотная кислота. Въ небольшой фарфоровой чашкѣ растворялось немного бруцина въ крѣпкой сѣрной кислотѣ, къ раствору прибавлялось нѣсколько капель сгущенной выпариваніемъ на половину и больше минеральной воды, при чемъ на мѣстѣ соприкосновенія обѣихъ жидкостей, въ случаѣ присутствія азотной кислоты въ изслѣдуемой водѣ, появлялось яркочерное окрашивание, переходящее въ желтое. Хотя эта реакція весьма чувствительна, тѣмъ не менѣе мы примѣняли для провѣрки еще слѣдующій способъ: нѣсколько капель приготовленнаго надлежащимъ образомъ раствора дифениламина въ крѣпкой сѣрной кислотѣ помѣщалось въ фарфоровую чашку; къ нему прибавлялось немного испытуемой воды, — получалось по мѣрѣ смѣшиванія жидкостей темносинее кольцо, указывающее на присутствіе азотной кислоты.

Азотистая кислота. Къ 50 с. с. минеральной воды прибавлялся 1 с. с. слабой сѣрной кислоты и 1 с. с. раствора іодистаго калия съ крахмальнымъ клейстеромъ (послѣдняя смѣсь сохранялась въ темнотѣ). При положительномъ ре-

зультатъ на азотистую кислоту получалось тотчасъ, или черезъ нѣсколько мгновений, синее окрашивание смѣси.

Амміакъ. Изслѣдованіе на амміакъ производилось въ помѣщеніи, свободномъ отъ паровъ послѣдняго, такимъ образомъ: къ 100 с. с. воды прибавлялось растворовъ углекислаго и ѣдкаго натрія въ достаточномъ количествѣ, чтобы выдѣлить углекислыя соединенія магнія и кальція и освободить амміакъ; по опусканіи на дно осадка прибавлялся къ прозрачному раствору реактивъ Несслера, производящій въ присутствіи амміака желтое окрашивание раствора.

Бромъ и іодъ. Приготовленные надлежащимъ образомъ спиртныя вытяжки выпаривались, съ добавленіемъ капли ѣдкаго кали, досуха, остатокъ растворялся въ небольшомъ количествѣ воды, подкисленной сѣрной кислотой, къ раствору прибавлялось немного сѣрнистаго углерода и капля воднаго раствора азотистокислаго калия; смѣсь взбалтывалась и наблюдалось, не окрасится ли сѣрнокислый углеродъ въ фіолетовый цвѣтъ. Но такъ какъ при нашихъ изслѣдованіяхъ такого окрашивания не происходило (отсутствіе іода), то къ этому же раствору прибавлялась по каплямъ хлорная вода, что вызывало буроватожелтое окрашивание сѣроуглерода (присутствіе брома).

Барій, стронцій и литій. Выдѣленные, отфильтрованные и высушенные осадки, могущіе содержать соединенія названныхъ элементовъ и полученные при полномъ соблюденіи всѣхъ условій для ихъ выдѣленія, были подвергнуты спектральному анализу; положительные результаты получались только на литій, т. е. видна была яркая кармино-красная линія α и слабая оранжево-желтая линія β въ красной и желтой частяхъ спектра между Фрауенгоферовыми линіями С и D. Остальныхъ элементовъ — барія и стронція — открыть не удалось.

II. Количественныя изслѣдованія.

Удѣльный вѣсъ. Хотя удѣльный вѣсъ опредѣлялся непосредственно при взятіи пробъ воды ареометромъ Боде,

раздѣленнымъ на $\frac{1}{10}$ град. (о чемъ была выше рѣчь), тѣмъ не менѣе производились повѣрочныя опредѣленія въ лабораторіи посредствомъ пикнометра, снабженнаго термометромъ, или посредствомъ вѣсовъ Mohr-Westphal'я при соблюденіи требуемой температуры, что на мѣстѣ не могло быть выполнено.

Сухой остатокъ. Смотря по солёности воды, выпаривалось отъ 20 до 100 грам. ея въ взвѣшенной платиновой чашкѣ на водяной банѣ до суха. Сухой остатокъ высушивался въ воздушной банѣ при 180° С. до постоянного вѣса и взвѣшивался.

Остатокъ въ видѣ сѣрнокислыхъ солей. Для проверки результатовъ изслѣдованій высушенный остатокъ, состоящій изъ различныхъ солей, превращался въ сѣрнокислыя соли слѣдующимъ образомъ: сперва прибавлялось къ нему немного воды, затѣмъ по каплямъ соляная кислота — при слабомъ нагреваніи смѣси для ускоренія выдѣленія углекислоты —, наконецъ сѣрная кислота въ количествѣ, достаточномъ для превращенія всѣхъ находящихся солей въ сѣрнокислыя соединенія — и все выпаривалось досуха. Слабымъ прокаливаніемъ, съ добавленіемъ углекислаго аммонія въ порошокъ, удалялся избытокъ сѣрной кислоты и кислыя сѣрнокислыя соли переводились въ среднія.

Хлоръ и бромъ ¹⁾ — выдѣлялись изъ подкисленной азотной кислотой воды посредствомъ азотносеребряной соли въ видѣ бѣлаго осадка хлористаго и бромистаго серебра. Осадокъ отфильтровывался ²⁾, промывался дистиллированной водой до исчезновенія реакціи на серебро, высушивался при 80° — 100° С., снимался съ фильтра и сплавлялся въ фарфоро-

1) Присутствіе іода доказать не удалось.

2) Во всѣхъ случаяхъ, когда фильтры подвергались послѣдовательнымъ сжиганіямъ, они брались съ извѣстнымъ содержаніемъ золы, а именно для фильтровъ съ діам. въ 9 цент. — 0,00015, съ діаметромъ въ 11 цент. — 0,0012, что при вычисленіи принималось въ расчетъ.


вомъ тиглѣ, а фильтръ сжигался на крышкѣ. Осадокъ какъ въ тиглѣ, такъ и на крышкѣ обрабатывался азотной кислотой для растворенія возстановленнаго серебра, а затѣмъ каплею соляной кислоты переводился въ хлористыя соединенія, затѣмъ высушивался, снова сплавлялся и, по остываніи въ эксикаторѣ, взвѣшивался. Въ полученномъ сплавѣ бромъ не могъ быть опредѣленъ непосредственно, въ виду чрезвычайно малаго количества его, а опредѣлялся въ другой порціи, и другимъ путемъ переводился въ серебряное соединеніе и вычитался изъ вѣса осадка, состоящаго изъ смѣси серебряныхъ солей хлора и брома.

Примѣръ: Изъ 100 частей Тагарской воды посредствомъ AgNO_3 выдѣлено $\text{AgCl} + \text{AgBr} = 2,50022$ грм.

Br найдено 0,000096 грм., каковое количество соотвѣтствуетъ 0,00022 AgBr . $2,50022 - 0,00022 = 2,5000$ грм. AgCl , что соотвѣтствуетъ 0,61815 грм. хлора. (2,5000 грм. AgCl , помноженное на коэфф. 0,2473, который получится изъ пропорціи:

$$\begin{array}{l} \text{AgCl} \quad \text{Cl} \\ 143,03 : 35,37 = 1 : x; x = 0,2473 \text{ ')}. \end{array}$$

Бромъ опредѣлялся по способу, описанному v. Wesselsky'мъ²⁾. Способъ этотъ основанъ на свойствѣ хлора окислять въ щелочномъ растворѣ бромистыя соединенія въ соединенія бромноватой кислоты по слѣдующему уравненію:



Избытокъ хлора превращается въ хлористыя и хлорноватыя соли, что, однако, совершается съ желаемой полностью лишь при выпариваніи смѣси до суха; въ противномъ же

1) Для вычисленія пользовались атомными вѣсами по L. Meyer и Leubert изъ „Physikalisch-chemische Tabellen von Laudolt und Börnstein“.

2) v. Wesselsky. Eine neue titrimetrische Bestimmung des Bromide neben Chloriden und Jodiden. Zeitschrift für analytische Chemie von R. Fresenius. 1900. Heft 2.

случаѣ остаются первичные продукты соединенія хлора съ ѣдкими щелочами, именно, хлорноватистокислыя соли, препятствующія дальнѣйшему ходу изслѣдованія, который основанъ на выдѣленіи іода изъ іодистаго калия бромноватой кислотой и на опредѣленіи іода растворомъ сѣрноватистокислаго натрія. Опредѣленіе велось такимъ образомъ: къ 500 грм. изслѣдуемой воды прибавлялось два грам. K_2CO_3 и 50 грм. хлорной воды, смѣсь выпаривалась на газовой горѣлкѣ осторожно досуха; охлажденный сухой остатокъ растворялся въ 150 куб. см. воды и подкисленный растворъ, по прибавленіи къ нему іодистаго калия, титровался $\frac{1}{10}$ норм. растворомъ сѣрноватистокислаго натрія. Индикаторомъ служилъ крахмальный клейстеръ. Число куб. сант. израсходованнаго $\frac{1}{10}$ норм. раствора сѣрноватистокислаго натрія, умноженное на 0,00133, даетъ количество брома.

Кремневая кислота (кремнеземъ). Для опредѣленія SiO_2 500—750 грм. подкисленной соляной кислотой воды выпаривались досуха на водяной банѣ въ небольшой платиновой чашкѣ, при постепенномъ доливаніи изслѣдуемой воды; остатокъ слегка прокаливался, затѣмъ нагревался съ незначительномъ количествомъ подкисленной соляной кислотой воды, при чемъ большая часть его растворялась, а нерастворимая кремневая кислота отфильтровывалась, промывалась и высушивалась, затѣмъ сжигалась вмѣстѣ съ фильтромъ и, наконецъ, взвѣшивалась. Фильтратъ служилъ для опредѣленія желѣза, алюминія, кальція и магнія.

Желѣзо осаждалось изъ нагрѣтаго фильтрата въ видѣ водной окиси посредствомъ амміака, осадокъ промывался и для освобожденія отъ щелочныхъ земель (марганца при предварительномъ качественномъ анализѣ не оказалось) растворялся въ соляной кислотѣ; растворъ нейтрализовался углекислымъ аммоніемъ, кипятился и осадокъ $\text{Fe}(\text{OH})_3$ отфильтровывался. Такъ какъ получавшійся осадокъ могъ еще содержать окись алюминія и фосфорную кислоту, онъ растворялся вторично въ соляной кислотѣ, къ раствору прибавлялось виннокамен-

ной кислоты, амміака и, наконецъ, сѣрнистаго аммонія. Черный осадокъ сѣрнистаго желѣза, послѣ полного его осажденія, отдѣлялся фильтрованіемъ, растворялся въ соляной кислотѣ, растворъ хлористаго желѣза FeCl_2 окислялся азотною кислотою въ FeCl_3 и посредствомъ амміака выдѣлялся чистый гидратъ окиси желѣза; послѣ промыванія и высушиванія послѣдній сильнымъ прокаливаніемъ превращался въ окись желѣза, въ какомъ видѣ и взвѣшивался.

Алюминій опредѣлялся въ фильтратѣ отъ сѣрнистаго желѣза. Фильтратъ этотъ, по прибавленіи раствора углекислаго натрія, выпаривался досуха, остатокъ особо прокаливался въ присутствіи селитры и растворялся въ водѣ, подкисленной соляной кислотой; растворъ фильтровался и изъ него выдѣлялась амміакомъ окись алюминія. (Фосфорной кислоты открыто не было).

Кальцій. Соединенные и сгущенные фильтраты, полученные при выдѣленіи водной окиси желѣза, служили для опредѣленія кальція и магнія. Сперва осаждался кальцій амміакомъ и щавелевокислымъ аммоніемъ, прибавленнымъ въ избытокъ къ фильтратамъ, нагрѣтымъ почти до кипѣнія. Послѣ 12 часовъ стоянія, осадокъ отфильтровывался, опять растворялся въ соляной кислотѣ и еще разъ выдѣлялся посредствомъ амміака и щавелевокислаго аммонія. Послѣ полного осажденія осадокъ, состоящій изъ щавелевокислой извести, отфильтровывался, высушивался, сильно и продолжительно прокаливался для превращенія его въ окись кальція, т. е. до постоянного вѣса и взвѣшивался.

Магній. Оба такимъ образомъ полученныя фильтрата соединялись, выпаривались досуха и прокаливались до полного удаленія амміачныхъ солей, осадокъ растворялся въ подкисленной соляною кислотою водѣ, и фосфорнокислымъ натріемъ и амміакомъ магнезіальныя соли осаждались въ видѣ двойной соли фосфорнокислаго магнія и аммонія (MgNH_4PO_4); осадокъ этотъ высушивался и прокаливаніемъ переводился въ пирофосфорнокислый магній ($\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7$). Количество по-

слѣднаго, помноженное на 0,3623, давало соответственное количество окиси магнія:

$$\begin{array}{l} \text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7 \quad 2\text{MgO} \\ 222,24 : 80,52 = 1 : x; x = 0,3623. \end{array}$$

Сѣрная кислота. Небольшое количество испытуемой воды, подкисленной соляной кислотою, выпаривалось досуха, остатокъ растворялся въ водѣ, а нерастворимая кремневая кислота отфильтровывалась. Къ фильтрату, нагрѣтому почти до кипѣнія, прибавлялся растворъ хлористаго барія до тѣхъ поръ, пока больше не получалось осадка, и смѣсь оставлялась на нѣсколько часовъ въ покой. Послѣ полного осажденія, для чего иногда требовалось 10—12 часовъ, жидкость сливалась съ осадка черезъ твердый фильтръ, специально предназначенный для такихъ опредѣленій; осадокъ смѣшивался съ горячей водою и послѣ нѣсколькихъ часовъ стоянія прозрачная жидкость профильтровывалась черезъ тотъ же фильтръ. Такое промываніе осадка повторялось еще нѣсколько разъ; наконецъ, осадокъ вмѣстѣ съ жидкостью помѣщался на фильтрѣ и тамъ окончательно промывался до тѣхъ поръ, пока промывная вода не давала больше реакціи на хлоръ. Затѣмъ фильтръ съ осадкомъ высушивался и прокаливался въ платиновомъ тиглѣ на умѣренномъ огнѣ. Осадокъ въ тиглѣ обрабатывался каплею сѣрной кислоты для превращенія сѣрнистаго барія (который могъ образоваться дѣйствіемъ угля на BaSO_4), въ сѣрнокислую соль, избытокъ сѣрной кислоты удалялся слабымъ прокаливаніемъ осадка, который послѣ охлажденія въ эксикаторѣ взвѣшивался. Вѣсъ найденнаго сѣрнокислаго барія, позноженной на 0,34316, давалъ вѣсъ находившагося въ испытуемой водѣ ангидрида сѣрной кислоты (SO_3):

$$\begin{array}{l} \text{BaSO}_4 \quad \text{SO}_3 \\ 232,72 : 79,86 = 1 : x; x = 0,3432. \end{array}$$

Калій и натрій. Фильтратъ и промывныя воды, полученные при выдѣленіи сѣрнокислаго барія, выпаривались на водяной банѣ досуха, остатокъ растворялся въ водѣ и

кипятился съ избыткомъ извѣстковаго молока. Образовавшійся осадокъ отфильтровывался, изъ фильтрата осаждался кальцій, барій и магній посредствомъ амміака, углекислаго и немного щавелевокислаго аммонія; осадокъ этотъ, послѣ полного его осажденія, отдѣлялся фильтрованіемъ, а прозрачная жидкость выпаривалась досуха и умѣренно прокаливалась для удаленія аммоніевыхъ солей. Манипуляціи эти приходилось повторять нѣсколько разъ для окончательнаго освобожденія прокаленного осадка (состоящаго изъ хлористаго калия) отъ солей щелочныхъ земель, въ особенности магнія; наконецъ, чистый осадокъ взвѣшивался, снова растворялся въ незначительномъ количествѣ воды, растворъ переливался въ фарфоровую чашку, куда прибавлялся избытокъ нейтральнаго раствора хлорной платины и смѣсь выпаривалась до небольшого объема, но не досуха. По охлажденіи остатка, къ нему прибавлялся избытокъ 80% виннаго спирта, и смѣсь, при частомъ помѣшиваніи, оставлялась на нѣсколько часовъ въ покой.

Выдѣлившіеся за это время кристаллики хлороплатината калия отфильтровывались черезъ высушенный при 130° С. и взвѣшенный фильтръ; фильтръ съ осадкомъ промывался небольшимъ количествомъ 80% спирта, высушивался при 130° С. и, наконецъ, взвѣшивался. Всѣ полученнаго хлороплатината калия, помноженный на 0,30706, давалъ вѣсъ находящагося въ осадкѣ (NaCl + KCl) хлористаго калия. Вычитая послѣдній изъ общаго осадка, мы получаемъ вѣсъ хлористаго натрія. Расчетъ велся такимъ образомъ: напр., изъ 1000 гр. воды Тагарскаго озера полученъ остатокъ NaCl + KCl — 15,5 грм.; изъ него выдѣлено хлороплатината калия — 1,2945; соотвѣтствующее количество KCl = 0,4033; вычтя послѣднее ихъ 15,0000 грм. получимъ:


15,5000 грм.

— 0,4033

15,0967 — количество NaCl.

Чтобы перевести K_2PtCl_6 въ KCl, H_2O и K, найденное

количество K_2PtCl_6 было помножено на коэффициенты 0,3071, 0,1940 и 0,1611, полученные изъ слѣдующихъ пропорцій:



$$484,58 : 148,80 = 1 : X ; X = 0,3071$$




$$484,58 : 94,02 = 1 : X ; X = 0,1940$$




$$484,58 : 78,06 = 1 : X ; X = 0,1611$$

Количество NaCl, помноженное на 0,5307 или 0,394 давало соотвѣтствующее количество Na_2O и Na:



$$116,730 : 61,95 = 1 : X ; X = 0,5307$$



$$58,365 : 22,995 = 1 : X ; X = 0,394$$

Азотная кислота опредѣлялась по способу Ulsch'a¹⁾, который основанъ на возстановленіи азотной кислоты водородомъ *in statu nascendi* въ амміакъ въ кисломъ растворѣ; амміакъ поглощается избыткомъ кислоты и затѣмъ перегоняется съ ѣдкой щелочью и улавливается растворомъ $\frac{1}{10}$ нормальной сѣрной кислоты.

Опредѣленіе производилось слѣдующимъ образомъ: въ колбу съ плоскимъ дномъ, емкостью въ $\frac{1}{2}$ литра, вливалось 300 грм. изслѣдуемой воды, сгущенной выпариваніемъ на половину, т. е. до 150 грм.; къ ней приливалось 20 куб. сант. разбавленной сѣрной кислоты, удѣльнаго вѣса 1,35 и 5 грам. порошкообразнаго металлическаго желѣза. Колба закрывалась пробкою, сквозь которую проходила стеклянная трубочка съ грушевиднымъ расширеніемъ наверху, съ вытянутымъ нижнимъ концомъ. Въ расширеніе наверху наливалась вода, подкисленная сѣрною кислотою; вода держалась въ ней

1) Dr. L. König. Die menschlichen Nahrungs- und Genussmittel. S. 1179.

вслѣдствіе давленія внутри колбы, отъ выдѣленія водорода, и служила для поглощенія выдѣляющихся вмѣстѣ съ водородомъ паровъ амміака. Жидкость постепенно нагрѣвалась до кипѣнія для окончательнаго возстановленія азотной кислоты въ амміакъ, затѣмъ къ ней прибавляли 50 с. с. воды, прополоскавши ея предварительно трубочку, и 40 куб. с. раствора ѣдкаго натра, удѣльнаго вѣса 1,25; наконецъ, смѣсь перегонялась и вытѣсненный амміакъ поглощался растворомъ $\frac{1}{10}$ нормальной сѣрной кислоты.

Разсчетъ ведется такимъ образомъ: напр., въ 300 грм. зоды изъ озера Доможакова найдено амміака 0,0091, каковое количество соотвѣтствуетъ 0,0288 ангидрида азотной кислоты (N_2O_3), по слѣдующему уравненію:

$$\begin{aligned} 2NH_3 : N_2O_3 \\ 34,02 : 107,82 = 0,0091 : x; x = 0,0288 N_2O_3 \\ \text{или въ процентахъ} — 0,0096. \end{aligned}$$

Количество NH_3 , помноженное на 3,167, равно количеству N_2O_3 :

$$\begin{aligned} 2NH_3 : N_2O_3 \\ 34,02 : 107,82 = 1 : x; x = 3,167. \end{aligned}$$

Угольная кислота какъ связанная, такъ и полусвязанная не могла быть опредѣлена ѣдкимъ и хлористымъ баріемъ обычнымъ путемъ, вслѣдствіе незначительнаго количества ея при громадномъ преобладаніи солей сѣрной кислоты. Всѣ опыты, нами предпринятые въ этомъ направленіи, оказались неудачными. Способъ, который мы примѣняли и который одновременно показалъ количество углекислоты, связанное съ щелочными землями и со щелочами, указывалъ вмѣстѣ съ тѣмъ косвенно количество полусвязанной угольной кислоты. Способъ состоитъ въ слѣдующемъ: 500 грм. воды кипятится около часа въ стеклянной колбѣ, емкостью въ одинъ литръ, для выдѣленія свободного и полусвязаннаго углекислаго газа и для осажденія углекислыхъ соединений кальція и магнія. Отстоявшаяся, но еще горячая жидкость,

безъ взмучиванія осадка, отфильтровывается черезъ небольшой фильтръ, который вмѣстѣ съ углекислыми соединеніями, задержанными имъ, помѣщается въ колбу къ главному осадку; фильтратъ, содержащій углекислыя соединенія щелочныхъ металловъ, нагрѣтый почти до кипѣнія, титруется децинормальнымъ растворомъ сѣрной кислоты, при чемъ индикаторомъ служитъ розоловая кислота. Когда такимъ образомъ опредѣлено количество углекислоты, связанной со щелочами (которое впоследствии было вычислено въ видѣ углекислаго натра), переходятъ къ осадку углекислыхъ солей щелочныхъ земель; къ нему въ колбѣ предварительно прибавляется небольшое количество дистиллированной воды и смѣсь нагрѣвается почти до кипѣнія и потомъ титруется децинормальной сѣрной кислотой. Найденное такимъ образомъ количество углекислоты при разсчетѣ принимается связаннымъ съ металлами щелочныхъ земель. Но такъ какъ углекислыя соединенія послѣднихъ нерастворимы въ водѣ и могли находиться въ растворѣ лишь въ видѣ двууглекислыхъ солей съ двойнымъ противъ среднихъ солей количествомъ углекислоты, то ясно, что въ водѣ находилось полусвязанной углекислоты количество, равное найденному въ осадкѣ.

Напримѣръ, въ 100 грм. воды изъ озера Биле найдено:

въ фильтратѣ	$CO_2 = 0,0222$ грм., что
соотвѣтствуетъ	Na_2CO_3 0,0536 „ ;
въ осадкѣ	$CO_2 = 0,0179$ „ , что
соотвѣтствуетъ	$CaCO_3$ 0,0121 „
„	$MgCO_3$ 0,0212 „
полусвязанной.	$CO_2 = 0,0179$ „

Свободная угольная кислота не опредѣлялась отчасти въ виду незначительнаго содержанія ея въ изслѣдуемыхъ водахъ, а главнымъ образомъ потому, что результаты такихъ опредѣленій, произведенныхъ не на мѣстѣ, были бы неточны и не соотвѣтствовали бы дѣйствительности. Попытки къ

опредѣленію свободной кислоты на мѣстѣ были своевременно сдѣланы, но должны считаться неудачными по вышеописаннымъ причинамъ.¹⁾

IV.

Результаты изслѣдованій.

А. Минеральныя воды.

Теперь переходимъ къ изложенію результатовъ анализовъ минеральныхъ водъ, произведенныхъ въ Гигіенической Лабораторіи Юрьевского университета по вышеизложеннымъ способамъ. Результаты разсчитаны въ граммахъ на 1000 вѣсовыхъ частей воды. Анализы, произведенные на мѣстѣ, описаніе физическихъ свойствъ воды, какъ удѣльный вѣсъ, температура, вкусъ, цвѣтъ и т. д., взятыхъ образцовъ воды, выше приведены подробно,²⁾ а потому здѣсь о нихъ не упомянуто.

I. Тагарское озеро.

а) Физическія свойства воды.

Удѣльный вѣсъ при 15° С. — 1,0170; цвѣтъ едва желтоватый; вкусъ слабо горько-соленый; запаха не ощущается никакого.

б) Результаты химическихъ изслѣдованій.

Въ 1000 грам. воды найдено:

хлора Cl	6,1810
сѣрнаго ангидрида SO ₃	6,1041
кремневой кислоты SiO ₂	0,0073
(кремнеземъ)	
окиси алюминія Al ₂ O ₃	0,0184
(глиноземъ)	

1) См. Путевыя записки стр. 53.

2) См. гл. II.

окиси кальція CaO	0,0792
окиси магнія MgO	1,4396
магнія Mg	0,00014
окиси калия K ₂ O	0,2549
окиси натрія Na ₂ O	2,5999
натрія Na	4,0182
брома Br	0,00096
угольного ангидрида CO ₂	0,2380
(связаннаго)	

Итого . 20,94170

амміака	слѣды
угольного ангидрида CO ₂	0,1990
(полусвязаннаго)	

При этихъ данныхъ допускается слѣдующій составъ воды:

100 частей ея содержатъ:

бромистаго магнія MgBr ₂	0,0011
углекислаго кальція CaCO ₃	0,1414
" магнія MgCO ₃	0,2622
" натрія Na ₂ CO ₃	0,0940
сѣрноокислаго магнія MgSO ₄	3,9210
" калия K ₂ SO ₄	0,4714
" натрія Na ₂ SO ₄	5,8257
хлористаго натрія NaCl	10,1992
кремнезема SiO ₂	0,0073
глинозема Al ₂ O ₃	0,0184

Итого . 20,9417

сухой остатокъ при 180° С.	20,9823
угольного ангидрида (полусвязан.)	0,1990
амміака	слѣды

Вышеприведенная комбинація солей получена на основаніи слѣдующихъ разсчетовъ:

Въ 1000 вѣсовыхъ частяхъ воды

брома Br найдено	0,00096, связываетъ
магнія Mg	0,00014,
бромистаго магнія MgBr ₂	0,00110.
Окиси кальція CaO найдено	0,0792, связываетъ
угольного ангидрида CO ₂	0,0622
углекислаго кальція CaCO ₃ =	0,1414.

Угольн. ангидрида CO_2 (въ осадкѣ) найдено 0,1990,
израсходовано 0,0622,
остается CO_2 0,1368.

Угольного ангидрида CO_2 найдено 0,1368,
связываетъ окиси магнезія MgO 0,1254,
углекислаго магнезія $\text{MgCO}_3 = 0,2622$.

Окиси магнезія MgO найдено 1,4306,
израсходовано 0,1254,
остается MgO 1,3142,
связываетъ сернаго ангидрида SO_3 2,6068,
сернокислаго магнезія $\text{MgSO}_4 = 3,9210$.

Окиси калия K_2O найдено 0,2549,
связываетъ сернаго ангидрида SO_3 0,2165,
сернокислаго калия $\text{K}_2\text{SO}_4 = 0,4714$.

Сернаго ангидрида SO_3 найдено 6,1041,
израсходовано для K_2O 0,2165 }
" " MgO 0,6068 } 2,8233,
остается SO_3 3,2808,
связываетъ окиси натрія Na_2O 2,5449,
сернокислаго натрія $\text{Na}_2\text{SO}_4 = 5,8257$.

Угольн. ангидр. CO_2 (въ растворѣ) найдено 0,0390,
связываетъ окиси натрія Na_2O 0,0550,
углекислаго натрія $\text{Na}_2\text{CO}_3 = 0,0940$.

Хлора Cl найдено 6,1810,
связываетъ натрія Na 4,0182,
хлористаго натрія $\text{NaCl} = 10,1992$.

Для провѣрки высушенный при 180°C . остатокъ былъ обработанъ серной кислотой, чтобы перевести всѣ соединенія въ сернокислыя, и взвѣшенъ. При этомъ непосредственно найдено сернокислыхъ солей въ 1000 гр. воды — 23,2802, а изъ аналитическихъ данныхъ вычисленіемъ получалось въ 1000 грм. воды:

сернокислаго кальция CaSO_4 0,1924
" магнезія MgSO_4 4,2957
" калия K_2SO_4 0,4714
" натрія Na_2SO_4 18,3409
кремнезема SiO_2 0,0073
глинозема Al_2O_3 0,0018
Всего . 23,3095
непосредственно найдено 23,2802

Попытаемся сопоставить результаты нашихъ анализѣвъ съ данными, полученными другими изслѣдователями. Первое указаніе о производствѣ анализа мы находимъ въ Вѣстникѣ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества за 1859 г.:¹⁾ здѣсь князь Костровъ приводитъ испытаніе разсола Тагарскаго озера, сдѣланное лѣтъ пятнадцать тому назадъ (въ 1844 г.) гиттенфервальтеромъ Пылковымъ, командированнымъ туда нарочно съ этой цѣлью. Результатъ испытанія таковъ: „Разсолъ Тагарскаго озера, по испытанію, содержитъ въ себѣ до 16° . Изъ 8 ведеръ разсола, въ продолженіе суточной вари съ большимъ трудомъ получено 7 фунтовъ соли, темнаго цвѣта. Соль эта высыхала медленно, а высушенная снова впитывала въ себя воздушную влагу и снова расплывалась. На вкусъ она была горька. Вообще признано, что разсолъ этого озера состоитъ изъ трехъ частей сернокислаго натра и одной части сернокислой магнезіи, т. е. имѣетъ четверть постороннихъ частей“. Какъ видно изъ предыдущаго, собственно химическаго анализа совершенно не производилось, а весь анализъ ограничивался приблизительнымъ опредѣленіемъ твердаго остатка и нѣкоторыхъ свойствъ его. Судя по тому, что осадокъ впитывалъ влагу и только медленно высыхалъ, можно было предполагать присутствіе хлористаго магнезія въ остаткѣ, рядомъ съ указанными сернокислыми солями, о которыхъ однако ни-

1) Кн. Костровъ. Соляныя озера Минусинскаго округа, Вѣст. Имп. Р. Географ. Общества. 1859 г., ч. 25, № 3, стр. 17.

чего не говорится. Далѣе упомянуто, что разсолъ содержитъ до 16° (вѣроятно солей), что, вѣроятно, соответствуетъ процентамъ или градусамъ по Боме¹⁾. Но при такихъ ображеніяхъ нельзя понять, какимъ образомъ изъ восьми ведеръ (соотвѣтствуетъ около 200 фунт. воды) разсола получилось только 7 фунтовъ остатка; это было бы не болѣе 3 1/2% солей въ разсолѣ.

Слѣдующій по времени анализъ этого озера принадлежитъ извѣстному гидрологу и бывшему профессору химіи нашего университета Карлу Шмидту. Онъ произведенъ въ 1883 году надъ сухимъ остаткомъ, полученнымъ выпариваніемъ разсола. По этому анализу на 100 ч. соли приходится:

калія K	0,149
натрія Na	25,767
кальція Ca	0,900
магнія Mg	2,672
сѣрнаго ангидрида SO ₃	42,168
хлора Cl	11,918
брома Br	0,018
кислорода эквивал. SO ₃	8,434
растворимыхъ солей	92,026
нерастворен. накипи	0,378
при 150° неулетуч. воды и немного органич. веществъ	3,453
отъ 120°—150° улетуч. воды	0,736
при 120° улетучив. воды	3,407
	100,000

Группировка.

Сѣрноокислаго калия K ₂ SO ₄	0,331
„ натрія Na ₂ SO ₄	71,407
„ кальція CaSO ₄	3,061

1) Было опредѣлено по Ламбертіеву ареометру, какъ въ той же статьѣ сказано. Авт.

хлористаго натрія NaCl	6,648
„ магнія MgCl ₂	10,559
бромистаго магнія MgBr ₂	0,020
растворимыхъ солей	92,026
окси железа Fe ₂ O ₃	0,126
глинозема Al ₂ O ₃	0,046
фосфорной кислоты P ₂ O ₅	
кремневой кислоты SiO ₂	0,079
магнезій MgO	
углекислаго кальція CaCO ₃	0,127
воды и нѣск. органич. веществъ	7,596
	100,000

Изъ болѣе новыхъ анализовъ воды Тагарскаго озера мнѣ извѣстны еще три. Одинъ обнаруженъ въ „Горномъ Журналѣ“ за 1899 г.¹⁾, гдѣ сообщается: „Разсолъ Тагарскаго завода, изъ Минусинскаго округа, въ 100 куб. сант. содержитъ:

хлора Cl	8,62 гр.
сѣрнаго ангидрида SO ₃	0,75
натрія Na	4,48
окси кальція CaO	0,53
окси магнія MgO	0,96
всего	15,34 грм.

Въ видѣ солей:

хлористаго натрія NaCl	11,39 грм.
„ магнія MgCl ₂	2,29
сѣрноокислаго кальція CaSO ₄	1,28
избытка кислорода	0,38
всего	15,34 грм.

Крѣпость разсола при 22° С. по ареометру Боме — 13°.¹⁾ Последніе два анализа опубликованы химикомъ А. Н. Б о г а -

1) Горн. Инж. В. Тихомировъ. Отчетъ объ аналитическихъ работахъ Иркутской Золотосплавочной лабораторіи съ 1886 по 1898 годъ. Горный Журналъ. 1899 г. Томъ II, стр. 56.

чевымъ въ Томскѣ въ 1899 г. ¹⁾. Тамъ мы находимъ слѣдующія данныя относительно этого озера: „Разсолъ Тагарскаго горько-соленого озера въ Ачинско-Минусинскомъ горномъ округѣ. Разсолъ взятъ съ поверхности озера ²⁾. Удѣльный вѣсъ разсола при 15° R. — 1,045 (Боме). Вѣсъ твердаго остатка, высушеннаго при 150° C., въ литрѣ разсола 52,67 гр.

Составъ твердаго остатка разсола:

хлористаго натрія NaCl	24,85
сѣрноокислаго натрія Na ₂ SO ₄	19,49
„ кальція CaSO ₄	0,27
„ магнія MgSO ₄	7,65
органическихъ нелетуч. веществъ	0,41
	52,67

Въ 100 вѣс. частяхъ твердаго остатка содержится:

хлористаго натрія NaCl	47,18%
сѣрноокислаго натрія Na ₂ SO ₄	37,00
„ кальція CaSO ₄	0,51
„ магнія MgSO ₄	14,52
органическихъ нелетуч. веществъ	0,77

99,98.“

За этимъ слѣдуетъ второй анализъ (тамъ же): „Разсолъ Тагарскаго горько-соленого озера, взятый со дна озера. Удѣльный вѣсъ при 14,5° R. — 1,05 (Боме). Вѣсъ твердаго остатка, высушеннаго при 150° C., въ литрѣ разсола — 53,92 грм.

Составъ твердаго остатка:

хлористаго натрія NaCl	23,69
сѣрноокислаго натрія Na ₂ SO ₄	19,60
„ кальція CaSO ₄	2,32
„ магнія MgSO ₄	7,83
органич. нелетучихъ веществъ	0,48
	53,92

1) А. Н. Богачевъ. Полезныя ископаемыя Сибири со стороны химическаго состава. Вѣстникъ золотопромышленности. 1899 г. № 13.

2) Когда и въ какомъ году, къ сожалѣнію, не сказано. Авт.

Въ 100 вѣсовыхъ частяхъ твердаго остатка содержится:

хлористаго натрія NaCl	43,93%
сѣрноокислаго натрія Na ₂ SO ₄	36,53
„ кальція CaSO ₄	4,30
„ магнія MgSO ₄	14,52
органич. нелетучихъ веществъ	0,89
	100,17.“

Какъ видно изъ приведенныхъ анализовъ, одни изъ нихъ вычислены на 100 частей твердаго остатка, другіе на одинъ литръ воды; мы, наконецъ, вычисляли свои анализы на 1000 грам. воды. Чтобы возможно было ихъ сравнивать между собою, всѣ анализы мы перечислили съ одной стороны на 100 грм. сухого остатка, съ другой стороны, насколько это позволили имѣющіяся данныя, на 1000 грам. воды. Такимъ образомъ мы получили для своего анализа: въ 100 частяхъ сухого остатка, высушеннаго при 180° C., имѣется:

бромистаго магнія MgBr ₂	0,0052
углекислаго кальція CaCO ₃	0,6751
„ магнія MgCO ₃	1,2520
„ натрія Na ₂ CO ₃	0,4488
сѣрноокислаго магнія MgSO ₄	18,7227
„ калия K ₂ SO ₄	2,2509
„ натрія Na ₂ SO ₄	27,8177
хлористаго натрія NaCl	48,7011
кремнезема SiO ₂	0,0348
глинозема Al ₂ O ₃	0,0876

Итого . 99,9959

Для анализа, сообщеннаго В. Тихомировымъ:

въ 100 ч. сухого остатка содержится:

хлористаго натрія NaCl	74,2491
„ магнія MgCl ₂	14,9280
сѣрноокислаго калия K ₂ SO ₄	8,3440
избытка кислорода	2,4771

Итого . 99,9982

Остальные анализы приведены въ такомъ видѣ, въ какомъ они имѣются въ литературѣ.

Съ другой стороны, анализы Богачева и Тихомирова, указывающіе на содержаніе солей въ 1 литрѣ resp. 1000 с. с. воды, были пересчитаны на содержаніе таковыхъ въ 1000 грам. послѣдней, т. е. на вѣсъ. Анализъ профессора Шмидта такимъ образомъ не могъ быть вычисленъ за неимѣніемъ данныхъ, какому именно количеству воды соотвѣтствовали приведенныя 100 ч. сухого остатка. При этомъ получилось для анализовъ Богачева: въ 1000 гр. разсола имѣется въ граммахъ:

	съ поверх- ности озера.	со дна озера.
хлористаго натрія NaCl . . .	23,78	22,55
сѣрноокислаго натрія Na ₂ SO ₄ . .	18,65	18,65
„ кальція CaSO ₄ . . .	0,25	2,20
„ магнія MgSO ₄ . . .	7,32	7,45
органич. плотныхъ веществъ . .	0,39	0,45
	50,39	51,30
Удѣльный вѣсъ разсола . . .	1,045	1,05
	$\left(\frac{1000}{1045}=0,957; \frac{1000}{1050}=0,952\right)$	

Для анализа, сообщеннаго Тихомировымъ:

въ 1000 гр. разсола имѣется въ граммахъ:

хлористаго натрія NaCl . . .	99,89
„ магнія MgCl ₂ . . .	20,08
сѣрноокислаго кальція CaSO ₄ . .	11,22
избытка кислорода . . .	3,33
	134,42

Удѣльный вѣсъ ¹⁾ (приблизительно) — 1,14 $\left(\frac{1000}{1140}=0,877\right)$.

Для большей наглядности приведемъ всѣ анализы въ видѣ таблицъ.

1) Удѣльный вѣсъ въ оригиналѣ не показанъ. Авт.

Въ 1000 грам. воды имѣется въ граммахъ:

	Богачевъ		Тихоми- ровъ.	Людвигъ.
	съ поверхн.	со дна.		
Хлористаго натрія NaCl . . .	23,78	22,55	99,89	10,1992
Сѣрноокислаго „ Na ₂ SO ₄ . . .	18,65	18,65	—	5,8257
„ кальція CaSO ₄ . . .	0,25	2,20	11,22	—
„ магнія MgSO ₄ . . .	7,32	7,45	—	3,9210
Органич. веществъ нелетуч. . .	0,39	0,45	—	—
Хлористаго магнія MgCl ₂ . . .	—	—	20,08	—
Избытка кислорода . . .	—	—	3,33	—
Бромистаго магнія MgBr ₂ . . .	—	—	—	0,0011
Углекислаго кальція CaCO ₃ . . .	—	—	—	0,1414
„ магнія MgCO ₃ . . .	—	—	—	0,2622
„ натрія Na ₂ CO ₃ . . .	—	—	—	0,0940
Кремнезема SiO ₂ . . .	—	—	—	0,0073
Глинозема Al ₂ O ₃ . . .	—	—	—	0,0184
Сѣрноокислаго калия K ₂ SO ₄ . . .	—	—	—	0,4714
Итого . . .	50,39	51,30	134,52	20,9417
Амміака . . .	—	—	—	слѣды
Углекислоты, полусвязан. CO ₂ . . .	—	—	—	0,0622

	К. Шмидтъ.	Богачевъ съ поверх- ности.	Богачевъ со дна.	Тихоми- ровъ.	Людвигъ.
Сѣрноокислаго натрія Na_2SO_4	71,407	37,00	36,53	—	27,8177
Хлористаго магнія MgCl_2	10,559	—	—	14,9280	—
Органическихъ веществъ и воды	7,596	—	—	—	—
Хлористаго натрія NaCl	—	0,77	0,89	—	—
Сѣрноокислаго кальція CaSO_4	6,648	47,18	43,93	74,2491	48,7011
„ калия K_2SO_4	3,061	0,59	4,30	—	—
Окиси желѣза Fe_2O_3	0,311	—	—	8,3440	2,2509
„ магнія MgO	0,126	—	—	—	—
Глиноземъ, кремнев. и фосфор. кист	0,079	—	—	—	—
Углекислаго кальція CaCO_3	0,046	—	—	—	0,6751
Бромистаго магнія MgBr_2	0,127	—	—	—	0,0052
Углекислаго натрія Na_2CO_3	0,020	—	—	—	0,4488
„ магнія MgCO_3	—	—	—	—	1,2520
Сѣрноокислаго „ MgSO_4	—	14,52	14,52	—	18,7227
Кремнезема SiO_2	—	—	—	—	0,0348
Глинозема Al_2O_3	—	—	—	—	0,0876
Избытка кислорода	—	—	—	2,4771	—
Итого	100,000	99,98	100,17	99,9982	99,9959

Въ 100 гр. сухого остатка находится:

II. Алтайское озеро.

А. Физическія свойства.

Удѣльный вѣсъ при 15° С. 1,0941;
вкусъ — горько-солёный,
запахъ — не имѣется,
цвѣтъ — едва желтоватый.

В. Химическія свойства.

Въ 1000 грм. воды озера найдено въ граммахъ:

хлора Cl	15,6180
окиси кальція CaO	0,0800
„ магнія MgO	0,1638
магнія Mg	0,00012
кремнезема SiO_2	0,0334
глинозема Al_2O_3	0,0212
окиси желѣза Fe_2O_3	0,0092
сѣрнаго ангидрида SO_3	45,4160
натрія Na	10,1532
окиси натрія Na_2O	35,7031
„ калия K_2O	0,6878
брома Br	0,00079
угольнаго ангидрида CO_2 (связан- наго)	0,8983
	108,7849
угольнаго ангидрида CO_2 (полу- связаннаго)	0,0240
амміака	слѣды
сухого остатка, непосредственно опредѣленнаго при 180° С.	108,5954.

При этихъ данныхъ допускается слѣдующій составъ воды:

1000 грм. ея содержатъ въ граммахъ:

бромистаго магнія MgBr_2	0,00091
углекислаго кальція CaCO_3	0,0545
сѣрноокислаго кальція CaSO_4	0,1202
„ магнія MgSO_4	0,4887
„ калия K_2SO_4	1,2720
„ натрія Na_2SO_4	78,9053

хлористаго	„	NaCl	. . .	25,7712
углекислаго	„	Na ₂ CO ₃	. . .	2,1083
кремнезема	SiO ₂			0,0334
глинозема	Al ₂ O ₃			0,0212
окиси желѣза	Fe ₂ O ₃			0,0092
				108,7849

Вышеприведенная комбинація солей получена на основаніи слѣдующихъ расчетовъ:

брома Br	. . .	0,00079	
связываетъ Mg	. . .	0,00012	соотв. 0,0002 MgO.
MgBr ₂	=	0,00091;	
угольного ангидрида CO ₂ (въ осадкѣ)		0,0240	
связываетъ CaO		0,0305	
	CaCO ₃	=	0,0545
окиси кальція CaO найдено	. . .	0,0800	
израсходовано		0,0305	
	остается CaO	. . .	0,0495
связываетъ SO ₃		0,0707	
	CaSO ₄	=	0,1202;
окиси магнезіи MgO найдено:	. . .	0,1640	
израсходовано		0,0002	
	остается MgO	. . .	0,1638
связываетъ SO ₃		0,3249	
	MgSO ₄	=	0,4887;
окиси калия K ₂ O		0,6878	
связываетъ SO ₃		0,5842	
	K ₂ SO ₄	=	1,2720
сѣрнаго ангидрида SO ₃ найдено	. . .	45,4160	
израсходовано для CaO	. . .	0,0707	
„ „ MgO	. . .	0,3249	
„ „ K ₂ O	. . .	0,5842	0,9798
	остается SO ₃	=	44,4362
связываетъ Na ₂ O		34,4691	
	Na ₂ SO ₄	=	78,9053

хлора Cl		15,6180
связываетъ Na		10,1532
	NaCl	= 25,7712;
угольного ангидрида CO ₂ (въ растворѣ)		0,8743
	связываетъ Na ₂ O	1,2340
	Na ₂ CO ₃	2,1083.

Послѣ переведенія сухого остатка описаннымъ образомъ въ соли сѣрной кислоты, непосредственно найдено въ 1000 грм. воды 114,5352 грм. сѣрнокислыхъ соединений. Связывая всѣ найденныя основанія (за исключеніемъ Al₂O₃ и Fe₂O₃, которыя приводятся, какъ таковыя) съ сѣрной кислотой, мы получаемъ:

сѣрнокислаго кальція CaSO ₄	. . .	0,0194
„ магнезіи MgSO ₄	. . .	0,0489
„ калия K ₂ SO ₄	. . .	1,2720
„ натрія Na ₂ SO ₄	. . .	113,0341
кремнезема SiO ₂		0,0334
глинозема Al ₂ O ₃		0,0212
окиси желѣза Fe ₂ O ₃		0,0092
		114,4382
непосредственно найдено	. . .	114,5352.

Въ литературѣ, насколько намъ извѣстно, имѣется одинъ только анализъ, опубликованный горн. инж. В. Тихомировымъ¹⁾: „Разсолъ съ Алтайскаго солевареннаго завода изъ Минусинск. окр., въ 100 куб. сант. содержитъ:

хлора Cl		14,01
сѣрнаго ангидрида SO ₃		2,25
угольного „ CO ₂		1,65
окиси натрія Na ₂ O		4,06
натрія Na		9,04
		31,01 грм.;

1) Op. cit. стр. 56.

въ видѣ солей:

хлористаго натрія NaCl	23,04
сѣрноокислаго „ Na ₂ SO ₄	3,99
углекислаго „ Na ₂ CO ₃	3,98
	31,01 грм.

Крѣпость разсола при 22° С. по Боме — 25°.

Для сравненія нашихъ результатовъ съ результатами В. Тихомірова, мы вычислили анализы послѣдняго, показывающіе количество солей въ 100 куб. сант. разсола, на соотвѣтствующее количество таковыхъ въ 1000 грм. разсола, принимая въ расчетъ приблизительный удѣльный вѣсъ его при 15° С. — 1,243 ($\frac{1000}{1243} = 0,804$). Такимъ образомъ найдено было для 1000 гр. разсола:

хлора Cl	112,64
сѣрнаго ангидрида SO ₃	18,09
угольного „ CO ₂	13,26
окиси натрія Na ₂ O	32,64
натрія Na	72,68
	249,31;

въ видѣ солей:

хлористаго натрія NaCl	185,24
сѣрноокислаго натрія Na ₂ SO ₄	32,08
углекислаго натрія Na ₂ CO ₃	31,99
	249,31.

Для удобства сравненія мы помѣстили имѣющіеся анализы въ слѣдующей таблицѣ:

Въ 1000 грм. разсола съ Алтайскаго озера содержится въ граммахъ:

а.

	Тихоміровъ.	Людвигъ.
хлора Cl	112,64	15,6180
окиси кальція CaO	—	0,0800
„ магнія MgO	—	0,1638

магнія Mg	—	0,0001
кремнезема SiO ₂	—	0,0334
глинозема Al ₂ O ₃	—	0,0212
окиси желѣза Fe ₂ O ₃	—	0,0092
сѣрнаго ангидрида SO ₃	18,09	45,4160
натрія Na	72,68	10,1532
окиси натрія Na ₂ O	32,64	35,7031
„ калия K ₂ O	—	0,6878
брома Br	—	0,0008
угольного ангидрида CO ₂ (связаннаго)	13,26	0,8983
	249,31	108,7849

б.

бромистаго магнія MgBr ₂	—	0,0009
углекислаго кальція CaCO ₃	—	0,0545
сѣрноокислаго „ CaSO ₄	—	0,1202
„ магнія MgSO ₄	—	0,4887
„ калия K ₂ SO ₄	—	1,2720
„ натрія Na ₂ SO ₄	32,08	78,9053
хлористаго натрія NaCl	185,24	25,7712
углекислаго „ Na ₂ CO ₃	31,99	2,1083
кремнезема SiO ₂	—	0,0334
глинозема Al ₂ O ₃	—	0,0212
окиси желѣза Fe ₂ O ₃	—	0,0092
	249,31	108,7849
угольного ангидрида (полусвязаннаго)		0,0240
амміака		слѣды.

III. Озеро Кизыль-Кель.¹⁾

Какъ уже выше²⁾ было сказано, вода для изслѣдованія взята не изъ самого озера, а изъ буровой скважины, доставляющей разсолъ для выварки соли Василе-Ивановскому солеваренному заводу. Само озеро, во время моего

1) Такъ озеро называютъ на мѣстѣ, но вѣрнѣе было бы его называть Кизыль-Куль, т. е., Красное озеро.

2) См. гл. II, стр. 60.

пребыванія на немъ, едва покрыто было водою, а иногда оно совсѣмъ высыхаетъ, вслѣдствіе чего никакого значенія не имѣетъ.

А. Физическія свойства.

Удѣльный вѣсъ при 15° С. — 1,0858,
вкусъ — сильно соленый и горьковатый,
запахъ — не имѣется,
цвѣтъ — едва желтоватый.

В. Результаты химическаго изслѣдованія.

Въ 1000 грм. разсола найдено въ граммахъ:
сѣрнаго ангидрида SO_3 13,1776
хлора Cl 52,4740
окиси кальція CaO 1,0387
„ магнія MgO 3,3580
магнія Mg 0,0012
кремнезема SiO_2 0,0450
окиси желѣза Fe_2O_3 0,0022
„ калия K_2O 0,4492
„ натрія Na_2O 3,8483
натрія Na 34,1133
угольного ангидрида CO_2 (связан.) 0,1708
брома Br 0,0079
108,6862
угольного ангидрида CO_2 (полусвяз.) 0,1142
глинозема, азотистой кислоты, ам-
міака и литія слѣды
сухого остатка при 180° С . . . 108,7244.

То же самое въ видѣ солей:

бромистаго магнія MgBr_2 0,0091
углекислаго кальція CaCO_3 0,2595
сѣрнокислаго „ CaSO_4 2,1704
„ магнія MgSO_4 10,0189
„ калия K_2SO_4 0,8307
„ натрія Na_2SO_4 8,6267
хлористаго натрія NaCl 86,5873
углекислаго „ Na_2CO_3 0,1364
окиси желѣза Fe_2O_3 0,0022
кремнезема SiO_2 0,0450
108,6862

Вышеприведенная комбинація солей получена на осно-
ваніи слѣдующихъ расчетовъ:

брома Br . . . 0,0079
связываетъ Mg 0,0012, соотвѣтств. 0,0021 MgO
 $\text{MgBr}_2 = 0,0091$;

угольного ангидрида CO_2 (въ осадкѣ) 0,1142
связываетъ CaO 0,1453
 $\text{CaCO}_3 = 0,2595$;

окиси кальція CaO 1,0387
израсходовано 0,1453
остается CaO 0,8934
связываетъ SO_3 1,2770
 $\text{CaSO}_4 = 2,1704$;

окиси магнія MgO 3,3601
израсходовано 0,0021
остается MgO 3,3580
связываетъ SO_3 6,6609
 $\text{MgSO}_4 = 10,0189$;

окиси калия K_2O 0,4492
связываетъ SO_3 0,3815
 $\text{K}_2\text{SO}_4 = 0,8307$;

сѣрнаго ангидрида SO_3 13,1176
израсходовано для CaO — 1,2770
„ „ MgO — 6,6609
„ „ K_2O — 0,3815 8,3194
остается SO_3 4,8582
связываетъ Na_2O 3,7685
 $\text{Na}_2\text{SO}_4 = 8,6267$;

хлора Cl 52,4740
связываетъ Na 34,1133
 $\text{NaCl} = 86,5873$;

угольного ангидрида CO_2 (въ раств.) 0,0566
связываетъ Na_2O 0,0798
 $\text{Na}_2\text{CO}_3 = 0,1364$.

Послѣ переведенія для провѣрки остатка (по выпариваніи) въ сѣрноокислыя соединенія, найдено таковыхъ въ 1000 грм. воды — 127,5438 грм.; а вычисленіемъ найдено на 1000 грм. воды:

сѣрноокислаго кальція CaSO_4 . . .	2,4294
„ магнія MgSO_4 . . .	10,0242
„ калия K_2SO_4 . . .	0,8307
„ натрія Na_2SO_4 . . .	113,9946
кремнезема SiO_2 . . .	0,0450
окиси желѣза Fe_2O_3 . . .	0,0022
	127,3261 грм.

Изъ анализовъ другихъ изслѣдователей мнѣ извѣстенъ только одинъ, полученный мной на Василе-Ивановскомъ солеваренномъ заводѣ и произведенный въ Томской золото-сплавочной лабораторіи въ маѣ мѣс. 1898 г. Впослѣдствіи упомянутый анализъ былъ помѣщенъ А. Богачевымъ въ „Вѣстникъ золотопромышленности“ за 1899 г.¹⁾

По этому анализу въ 100 вѣсовыхъ частяхъ вывареннаго остатка имѣется:

хлора Cl	48,58%
натрія Na	31,33
окиси кальція CaO	0,69
кальція Ca	0,13
окиси магнія MgO	4,13
глинозема Al_2O_3	0,87
сѣрнаго ангидрида SO_3	9,25
органическихъ нелетучихъ веществъ,	
растворимыхъ въ водѣ	2,64
нерастворимаго въ водѣ остатка	0,26
влажности	2,12
	100,00%

1) А. Н. Богачевъ. Полезныя ископаемыя Сибири со стороны химическаго состава. Вѣстн. золотопромышл. 1899 г. № 13.

Составъ твердаго остатка по этимъ даннымъ слѣдующій:

хлористаго натрія NaCl	79,68%
„ кальція CaCl_2	0,36
сѣрноокислаго магнія MgSO_4	12,38
„ кальція CaSO_4	1,69
глинозема Al_2O_3	0,87
органическихъ нелетучихъ веществъ,	
растворимыхъ въ водѣ	2,64
нерастворимаго въ водѣ остатка	0,26
влажности	2,12
	100,00%

Чтобы возможно было сравнивать приведенный анализъ съ нашимъ, послѣдній вычисленъ на 100 ч. сухого остатка. Въ такомъ видѣ результаты нашего анализа будутъ ниже-слѣдующіе:

въ 100 вѣсов. частяхъ сухого остатка содержится:

сѣрнаго ангидрида SO_3	12,1234
хлора Cl	48,2760
окиси кальція CaO	0,9556
„ магнія MgO	3,0894
магнія Mg	0,0011
кремнезема SiO_2	0,0041
окиси желѣза Fe_2O_3	0,0020
„ калия K_2O	0,4132
„ натрія Na_2O	3,5404
натрія Na	31,3842
угольнаго ангидрида CO_2 (связ.)	0,1571
брома Br	0,0072
	99,9537.

То же самое въ видѣ солей:

бромистаго магнія MgBr_2	0,0084
углекислаго кальція CaCO_3	0,2387
сѣрноокислаго кальція CaSO_4	1,9967
„ магнія MgSO_4	9,2174
„ калия K_2SO_4	0,7642
„ натрія Na_2SO_4	7,9365
хлористаго натрія NaCl	79,6603

углекислого натрія Na_2CO_3	0,1254
окси желѣза Fe_2O_3	0,0020
кремнезема SiO_2	0,0041
	99,9537.

Наконецъ, сопоставивъ имѣющіеся анализы рядомъ, получаемъ слѣдующую таблицу.

Въ 100 вѣсов. частяхъ сухого остатка, полученнаго изъ воды буровой скважины на Василе-Ивановскомъ солеваренномъ заводѣ при озерѣ Кизылъ-Куль, находится:

а.	Май 1898 Богачевъ.	Іюнь 1899 Людвигъ.
хлора Cl	48,58	48,28
натрія Na	31,33	31,38
окси кальція CaO	0,69	0,95
кальція Ca	0,13	—
окси магнія MgO	4,13	3,09
глинозема Al_2O_3	0,87	слѣды.
сѣрнаго ангидрида SO_3	9,25	12,13
органич. вещ., нелетучихъ, раств. въ водѣ	2,64	—
нерастворимаго въ водѣ остатка .	0,26	—
влажности	2,12	—
магнія Mg	—	0,001
кремнезема SiO_2	—	0,004
окси желѣза Fe_2O_3	—	0,002
„ калия K_2O	—	0,41
„ натрія Na_2O	—	3,54
угольнаго ангидрида CO_2 (связ.) .	—	0,16
брома Br	—	0,007
	100,00	99,96
азотистой кислоты, амміака и литія	—	слѣды
б.		
бромистаго магнія MgBr_2	—	0,008
хлористаго натрія NaCl	79,68	79,66
сѣрнокислаго магнія MgSO_4	12,38	9,22
„ кальція CaSO_4	1,69	1,99
глинозема Al_2O_3	0,87	слѣды
органич. нелетучихъ вещ., раств. въ водѣ	2,64	—

нерастворим. въ водѣ остатка . . .	0,26	—
влажности	2,12	—
хлористаго кальція CaCl_2	0,36	—
углекислаго кальція CaCO_3	—	0,24
сѣрнокислаго калия K_2SO_4	—	0,76
„ натрія Na_2SO_4	—	7,94
углекислого натрія Na_2CO_3	—	0,12
окси желѣза Fe_2O_3	—	0,002
кремнезема SiO_2	—	0,004
азотистой кислоты, амміака и литія	—	слѣды
	100,000	99,94

IV. Бейское озеро.

А. Физическія свойства.

Удѣльный вѣсъ при 15° С. 1,0860,
вкусъ — горько-соленый,
запахъ — не имѣется,
цвѣтъ — съ желтымъ оттѣнкомъ.

В. Результаты химическаго изслѣдованія.

Въ 1000 грм. воды озера найдено въ граммахъ:

хлора Cl	23,8610
кремнезема SiO_2	0,0083
глинозема Al_2O_3	0,0116
закиси желѣза FeO	0,0031
(найдено Fe_2O_3 — 0,0035)	
окси кальція CaO	0,0992
„ магнія MgO	3,2392
магнія Mg	0,00008
окси калия K_2O	1,2654
сѣрнаго ангидрида SO_3	36,9290
окси натрія Na_2O	23,2829
натрія Na	15,5120
брома Br	0,00053
угольнаго ангидрида CO_2 (связ.) .	0,4643
	104,6766
угольнаго ангидрида CO_2 (полусвяз.)	0,2980
литія и амміака	слѣды

сухого остатка, высушенного при
180° С. 104,7423

То же самое въ видѣ солей:

бромистаго магнія $MgBr_2$. . .	0,00061
углекислаго кальція $CaCO_3$. . .	0,2409
углекислой закиси желѣза $FeCO_3$. . .	0,0049
углекислаго магнія $MgCO_3$. . .	0,2962
сѣрнокислаго магнія $MgSO_4$. . .	9,2389
„ калия K_2SO_4 . . .	2,3402
„ натрія Na_2SO_4 . . .	52,7610
хлористаго натрія $NaCl$. . .	39,3730
углекислаго „ Na_2CO_3 . . .	0,4010
кремнезема SiO_2 . . .	0,0083
глинозема Al_2O_3 . . .	0,0116
	<u>104,6766.</u>

Вышеприведенная комбинація солей получена на основаніи слѣдующихъ расчетовъ:

брома Br . . .	0,00053
связываетъ Mg . . .	0,00008, соотв. 0,00013 MgO
<u>$MgBr_2$ =</u>	<u>0,00061;</u>
окиси кальція CaO . . .	0,0992
связываетъ CO_2 . . .	0,1417
<u>$CaCO_3$ =</u>	<u>0,2409;</u>
окиси желѣза Fe_2O_3 . . .	0,0035
соотвѣтствуетъ FeO . . .	0,0031
связываетъ CO_2 . . .	0,0018
<u>$FeCO_3$ =</u>	<u>0,0049;</u>
угольнаго ангидрида CO_2 (связ.) . .	0,2980
(въ осадкѣ)	
израсходовано для CaO . .	0,1417
„ „ FeO . .	0,0018
	<u>0,1435</u>
остается CO_2 . . .	0,1545
связываетъ MgO . . .	0,1417
<u>$MgCO_3$ =</u>	<u>0,2962;</u>

окиси магнія MgO	3,2394
израсходовано для Br . . .	0,00013
„ „ CO_2 . . .	0,1417
	<u>0,14183</u>
остается MgO	3,0975
связываетъ SO_3	6,1414
<u>$MgSO_4$ =</u>	<u>9,2389;</u>
окиси калия K_2O	1,2654
связываетъ SO_3	1,0748
<u>K_2SO_4 =</u>	<u>2,3402;</u>
сѣрнаго ангидрида SO_3	36,9290
израсходовано для MgO . .	6,1414
„ „ K_2O . . .	1,0748
	<u>7,2162</u>
остается SO_3	29,7128
связываетъ Na_2O	23,0482
<u>Na_2SO_4 =</u>	<u>52,7610;</u>
хлора Cl	23,8610
связываетъ Na	15,5120
<u>$NaCl$ =</u>	<u>39,3730;</u>
угольнаго ангидрида CO_2 (связан., въ раств.)	0,1663
связываетъ Na_2O	0,2347
<u>Na_2CO_3 =</u>	<u>0,4010</u>

Превративъ сухой остатокъ въ сѣрнокислыя соли, находимъ въ 1000 грм. разсола 113,4734 грм. таковыхъ, а вычисленіемъ получаемъ:

сѣрнокислаго магнія $MgSO_4$. . .	9,6650
„ кальція $CaSO_4$. . .	0,2409
„ калия K_2SO_4 . . .	2,3402
„ натрія Na_2SO_4 . . .	101,1267
окиси желѣза Fe_2O_3 . . .	0,0035
кремнезема SiO_2 . . .	0,0083
глинозема Al_2O_3 . . .	0,0116
	<u>113,3962 грм.</u>

Что касается другихъ анализовъ разсола этого озера, то мнѣ извѣстны таковыхъ три, любезно доставленныхъ мнѣ

управляющимъ Бейскимъ солевареннымъ заводомъ Н. И. Родюковымъ. Анализы эти произведены въ Томской золотосплавочной лабораторіи и объявлены управленію завода окружнымъ инженеромъ Ачинско-Минусинскаго горнаго округа.

1) „Разсолъ взятъ изъ озера въ іюлѣ м. 1894 г. При 23° С. удѣльн. вѣсъ разсола — 1,18. Въ литрѣ разсола твердаго остатка 257,42 грм.

Составъ твердаго остатка въ 100 частяхъ:

хлористаго натрія NaCl	36,47
сѣрноокислаго „ Na ₂ SO ₄	51,63
„ магнезія MgSO ₄	9,32
органическихъ веществъ	2,07
	99,49“.

2) „Анализъ разсола, накаченного въ запасной ларь въ декабрѣ м. 1894 года.

Удѣльный вѣсъ разсола при 16,5° R. равняется 1,15 Боме. Вѣсъ твердаго остатка, высушеннаго при 150° С., въ литрѣ разсола равняется 197,03.

Составъ твердаго остатка слѣдующій:

		въ процен- тахъ.
хлористаго натрія NaCl	72,75	36,92
сѣрноокислаго „ Na ₂ SO ₄	103,23	52,39
„ магнезія MgSO ₄	15,13	7,67
„ кальція CaSO ₄	0,38	0,19
глинозема Al ₂ O ₃	1,66	0,84
органич. нелетучихъ веществъ	3,88	1,96
	197,03	99,97%“.

3) „Анализъ разсола, взятаго изъ озера 3 іюля 1895 года.

Удѣльн. вѣсъ разсола при 12° R. — 1,15 Боме. Вѣсъ твердаго остатка, высушеннаго при 150° С., въ литрѣ разсола равняется 230,84 грм.

Составъ твердаго остатка:

		въ процент.
хлористаго натрія NaCl	200,51	86,86
сѣрноокислаго кальція CaSO ₄	4,94	2,14
„ магнезія MgSO ₄	2,75	0,98
хлористаго „ MgCl ₂	4,54	1,96
глинозема Al ₂ O ₃	0,74	0,32
органич. нелетучихъ веществъ	17,84	7,98
	231,32	100,24,
въ оригиналѣ же	230,84	99,98.

О двухъ послѣднихъ анализахъ (2 и 3) сообщено въ одномъ и томъ же отношеніи упомянутаго окружнаго инженера (за № 928), но заглавія ихъ, очевидно, перепутаны. Результаты анализа № 3 относятся несомнѣнно къ разсолу, накаченному въ запасной ларь въ декабрѣ м. 1894 г. (къ анализу № 2), что явствуетъ изъ большого содержанія въ немъ хлористаго натрія; такое количество хлористаго натрія въ разсолѣ только и могло быть зимою, когда, вслѣдствіе мороза, большая часть сѣрноокислаго натрія выдѣляется и падаетъ на дно, образуя т. наз. черепъ, а разсолъ сгущается еще тѣмъ, что часть воды вымерзаетъ. Въ это время года заводъ исключительно и работаетъ. Наоборотъ, результаты анализа № 2 должны быть отнесены къ разсолу, взятому изъ озера 3 іюля 1895 года (анализъ № 3), о чемъ свидѣтельствуется какъ большое содержаніе въ немъ сѣрноокислаго натрія, мѣшающее добыванію поваренной соли и представляющее причину приостановки завода лѣтомъ, такъ и тотъ фактъ, что при отнесеніи результатовъ анализа № 2 къ лѣтнему разсолу и при сравненіи ихъ съ имѣющимися анализами, мы получимъ весьма сходныя цифры.

Только что упомянутые анализы (№ 2 и 3) мы встрѣтили также въ статьѣ А. Богачева въ „Вѣстникѣ золотопромышленности“ за 1899 годъ¹⁾.

Для сравненія имѣющіеся анализы были отчасти переведены вычисленіемъ на процентное содержаніе солей

1) Opus cit.

въ сухомъ остаткѣ (нашъ анализъ), отчасти вычислено количество солей, находящееся въ 1000 грм. разсола (остальн. анализы).

Для нашего анализа найдено въ 100 вѣсовыхъ частяхъ сухого остатка:

бромистаго магнія $MgBr_2$	0,0006
углекислаго кальція $CaCO_3$	0,2301
„ магнія $MgCO_3$	0,2829
окиси желѣза Fe_2O_3	0,0033
сѣрноокислаго магнія $MgSO_4$	8,8259
„ калия K_2SO_4	2,2355
„ натрія Na_2SO_4	50,4025
хлористаго натрія $NaCl$	37,6130
углекислаго „ Na_2CO_3	0,3830
кремнезема SiO_2	0,0079
глинозема Al_2O_3	0,0018
	0,1008

Вычисленіемъ анализовъ № 1, 2 и 3, принимая въ расчетъ уд. вѣсъ и температуру, при которой послѣдній опредѣленъ, найдено для 1000 грм. разсола въ граммахъ:

№ 1. хлористаго натрія $NaCl$	80,65
сѣрноокислаго „ Na_2SO_4	114,17
„ магнія $MgSO_4$	20,61
органич. веществъ	4,58
	220,01.

Разсолъ имѣлъ уд. вѣсъ при $23^\circ C$. — 1,18, что соотвѣтствуетъ уд. вѣсу при $15^\circ C$. — 1,17 (приблизительно) и твердому остатку въ 1000 грм. разсола 220,01 грм.

$$\left(\frac{1000}{1170} = 0,8547 \text{ и } 257,42 \text{ грм.} \times 0,8547 = 220,0168 \text{ грм.}\right)$$

№ 2. хлористаго натрія $NaCl$	63,82
сѣрноокислаго натрія Na_2SO_4	90,55
„ магнія $MgSO_4$	13,27
„ кальція $CaSO_4$	0,33
глинозема SiO_2	1,46
органич. веществъ	3,40
	172,83

Уд. вѣсъ при $16,5^\circ R$. = 1,15, соотвѣтств. приблиз. 1,14 уд. вѣсу при $15^\circ C$. $\left(\frac{1000}{1140} = 0,8772\right)$

№ 3. хлористаго натрія $NaCl$	174,34
сѣрноокислаго кальція $CaSO_4$	4,29
„ магнія $MgSO_4$	2,39
хлористаго магнія $MgCl_2$	3,94
глинозема Al_2O_3	0,64
органич. вещ.	15,51
$\left(\frac{1000}{1150} = 0,8695\right)$.	201,11

Наконецъ, всѣ анализы сопоставлены въ слѣдующихъ таблицахъ.

Въ 100 грм. сухого остатка, выпареннаго изъ разсола Бейскаго озера, найдено:

	Томская золотосплавочная лаборат.			Людвигъ.
	№ 1. Юль 1894 г.	№ 2. Декабрь 1894 г.	№ 3. Юль 1895 г.	
бромистаго магнія $MgBr_2$	—	—	—	0,0006
углекислаго кальція $CaCO_3$	—	—	—	0,2301
„ магнія $MgCO_3$	—	—	—	0,2829
окиси желѣза Fe_2O_3	—	—	—	0,0033
сѣрноокислаго магнія $MgSO_4$	9,32	7,67	0,98	8,8259
„ калия K_2SO_4	—	—	—	2,2355
„ натрія Na_2SO_4	51,63	52,39	—	50,4025
хлористаго натрія $NaCl$	36,47	36,92	86,86	37,6130
углекислаго „ Na_2CO_3	—	—	—	0,3830
кремнезема SiO_2	—	—	—	0,0079
глинозема Al_2O_3	—	0,84	0,32	0,1008
амміака NH_3	—	—	—	слѣды
литія Li	—	—	—	слѣды
органическихъ веществъ	2,07	1,96	7,98	—
сѣрноокислаго кальція $CaSO_4$	—	0,19	2,14	—
хлористаго магнія $MgCl_2$	—	—	1,96	—
	99,49	99,97	100,24	100,0855

Въ 1000 грм. разсола Бейскаго озера найдено въ граммахъ:

	Томская золотосплавочная лаборат.			Людвигъ.
	№ 1. Юль 1894 г.	№ 2. Декабрь 1894 г.	№ 3. Юль 1895 г.	Юнь 1899 г.
бромистаго магна $MgBr_2$.	—	—	—	0,00061
углекислаго кальця $CaCO_3$.	—	—	—	0,2409
„ магна $MgCO_3$.	—	—	—	0,2962
углек. закиси желѣза $FeCO_3$.	—	—	—	0,0049
сѣрнокислаго магна $MgSO_4$.	20,61	13,27	2,39	9,2389
„ калия K_2SO_4 .	—	—	—	2,3402
„ натрія Na_2SO_4 .	114,17	90,55	—	52,7610
хлористаго натрія $NaCl$.	80,65	63,82	174,34	39,3730
углекислаго „ Na_2CO_3 .	—	—	—	0,4010
кремнезема SiO_2	—	—	—	0,0083
глинозема Al_2O_3	—	1,46	0,64	0,0116
амміака NH_3	—	—	—	слѣды
литія Li	—	—	—	слѣды
органич. веществъ	4,58	3,40	15,51	—
сѣрнокислаго кальця $CaSO_4$.	—	0,33	4,29	—
хлористаго магна $MgCl_2$.	—	—	3,94	—
	220,01	172,83	201,11	104,6766
углекислаго ангидрида CO_2 (полусвяз.)	—	—	—	0,2980

Кромѣ вышеприведенныхъ анализовъ Бейскаго озера, существуетъ еще одинъ анализъ выпареннаго разсола этого озера, произведенный проф. К. Шмидтомъ въ 1876 г. ¹⁾; тамъ же находится и анализъ самоосадочной соли Бейскаго озера. Такъ какъ анализы эти подробно приведены въ литературной части работы, здѣсь же для сравненія служить не могутъ, вслѣдствіе того, что озеро въ то время еще было

1) Bulletin de l'Academie Impériale des Sciences de Saint-Petersbourg. XXVIII, стр. 477—86.

самосадочное, а выпаренный разсолъ и самосадочная соль изслѣдованы отдѣльно, то мы ограничимся здѣсь этимъ краткимъ упоминаніемъ.

V. Озеро Дomoжаково.

A. Физическія свойства.

Удѣльный вѣсъ при 15° С. 1,1344,
вкусъ — сильно горько-соленый,
запахъ — нѣтъ,
цвѣтъ — прозрачный, съ желтоватымъ оттѣнкомъ.

B. Результаты химическаго изслѣдованія.

Въ 1000 грм. разсола найдено въ граммахъ:

окиси кальця CaO 1,1750
брома Br 0,0008
магна Mg 0,0001
окиси магна MgO 1,7867
„ калия K_2O 1,0430
сѣрнаго ангидрида SO_3 77,1413
азотнаго „ N_2O_5 0,0960
угольнаго „ CO_2 (связан.) 0,0880
хлора Cl 5,3941
натрія Na 3,5067
окиси натрія Na_2O 55,2981
кремнезема Si_2O 0,0020
глинозема Al_2O_3 0,0060
желѣза, литія и амміака слѣды
145,5378

сухого остатка при 180° С. 145,7223

При этихъ данныхъ допускается слѣдующій составъ разсола:

сѣрнокислаго кальця $CaSO_4$ 2,8545
бромистаго магна $MgBr_2$ 0,0009
сѣрнокислаго магна $MgSO_4$ 5,3307
„ калия K_2SO_4 1,9289
„ натрія Na_2SO_4 126,1313
азотнокислаго „ $NaNO_3$ 0,1705
углекислаго „ Na_2CO_3 0,2122

хлористаго натрія NaCl	8,9008
кремнезема SiO_2	0,0020
глинозема Al_2O_3	0,0060
	<u>145,5378.</u>

Вышеприведенная комбинація солей получена на основаніи слѣдующихъ расчетовъ:

окиси кальція CaO	1,1750
связываетъ SO_3	1,6795
	<u>$\text{CaSO}_4 = 2,8545;$</u>

брома Br	0,00079
связываетъ Mg 0,00012, соотв. MgO — 0,00019	
	<u>$\text{MgBr}_2 = 0,00091;$</u>

окиси магнезія MgO	1,7869
израсходовано	0,00019
остается MgO	1,7867
связываетъ SO_3	3,5440
	<u>$\text{MgSO}_4 = 5,3307;$</u>

окиси калия K_2O	1,0430
связываетъ SO_3	0,8859
	<u>$\text{K}_2\text{SO}_4 = 1,9289;$</u>

сѣрнаго ангидрида SO_3	77,1413
израсходовано для CaO — 1,6795	
„ „ MgO — 3,5440	
„ „ K_2O — 0,8859	6,1094

остается SO_3	71,0319
связываетъ Na_2O	55,0994
	<u>$\text{Na}_2\text{SO}_4 = 126,1313;$</u>

азотнаго ангидрида N_2O_5	0,0960
связываетъ Na_2O	0,0745
	<u>$\text{NaNO}_3 = 0,1705;$</u>

угольнаго ангидрида CO_2 (въ раств.)	0,0880
связываетъ Na_2O	0,1242
	<u>$\text{Na}_2\text{CO}_3 = 0,2122;$</u>

хлора Cl	5,3941
связываетъ Na	3,5067
	<u>$\text{NaCl} = 8,9008.$</u>

Обработывая сухой остатокъ сѣрной кислотой, мы находимъ въ 1,000 грм. разсола сѣрнокислыхъ соединений — 147,5658. Составъ сухого остатка, обработаннаго сѣрной кислотой, по вычисленію слѣдующій:

сѣрнокислаго кальція CaSO_4	2,8545
„ магнезія MgSO_4	5,3313
„ калия K_2SO_4	1,9289
„ натрія Na_2SO_4	137,3954
кремнезема SiO_2	0,0020
глинозема Al_2O_3	0,0060
	<u>147,5181</u>

Озеро это, насколько мнѣ извѣстно, еще не было изслѣдовано, по крайней мѣрѣ, въ литературѣ не имѣется никакихъ анализовъ, касающихся его разсола.

VI. Озеро Шунеть.

А. Физическія свойства.

Удѣльный вѣсъ при 15°C . — 1,1401,
цвѣтъ — едва желтоватый,
запахъ — не имѣется,
вкусъ — горько-соленый.

В. Результаты химическаго изслѣдованія.

Въ 1000 граммовъ разсола найдено въ граммахъ:

Угольнаго ангидрида CO_2 (связ)	0,3510
окиси кальція CaO	0,9254
сѣрнаго ангидрида SO_3	40,7282
калія K	0,5075
окиси магнезія MgO	20,1769
магнезія Mg	5,6127
хлора Cl	59,0550
натрія Na	27,4706
окиси натрія Na_2O	0,0141
кремнезема SiO_2	0,0160
глинозема Al_2O_3	0,0560
	<u>154,9134</u>

угольн. ангидрида CO_2 (полусвяз.)	0,3410
железа, брома, лития и аммиака	слѣды.

То же самое въ видѣ солей:

углекислаго кальція CaCO_3	0,7749
сѣрноокислаго „ CaSO_4	1,1940
„ магнезія MgSO_4	60,2026
хлористаго калия KCl	0,9676
углекислаго натрія Na_2CO_3	0,0241
хлористаго магнезія MgCl_2	21,9518
„ натрія NaCl	69,7267
кремнезема SiO_2	0,0160
глинозема Al_2O_3	0,0560
	154,9134.

Вышеприведенная комбинація солей найдена на основаніи слѣдующихъ расчетовъ:

угольного ангидрида CO_2 (въ осадкѣ, связ.)	0,3410
связываетъ CaO	0,4339
	$\text{CaCO}_3 = 0,7749$;
окиси кальція CaO	0,9254
израсходовано	0,4339
	остается CaO 0,4915
связываетъ SO_3	0,7025
	$\text{CaSO}_4 = 1,1940$;
сѣрнаго ангидрида SO_3	40,7282
израсходовано	0,7025
	остается SO_3 40,0257
связываетъ MgO	20,1769
	$\text{MgSO}_4 = 60,2026$;
калія K	0,5075
связываетъ Cl	0,4598
	$\text{KCl} = 0,9673$;
угольного ангидрида CO_2 (въ раств.)	0,0100
связываетъ Na_2O	0,0141
	$\text{Na}_2\text{CO}_3 = 0,0241$;

натрія Na	27,4706
связываетъ Cl	42,2561
	$\text{NaCl} = 69,7267$;
хлора Cl	59,0550
израсходовано	0,4598
	42,2561 42,7159
	остается Cl 16,3391
связываетъ Mg	5,6127
	$\text{MgCl}_2 = 21,9518$.

Вслѣдствіе большого содержанія въ разсолѣ хлористаго магнезія, количество солей въ 1,000 грм. не могло быть опредѣлено въ видѣ сухого остатка, высушеннаго при 180°C . При этой температурѣ далеко не вся вода удаляется, а значительная часть ея остается удержанною хлористымъ магнезіемъ, и такимъ образомъ получаются неточные результаты. Повысить температуру также нельзя, потому что хлористый магнезія тогда разлагается, выделяя HCl , и результаты будутъ опять-таки неточны. Въ этомъ случаѣ весьма хорошія услуги оказываетъ примененный нами при всѣхъ опредѣленіяхъ провѣрочный способъ, состоящій въ превращеніи солей сухого остатка въ сѣрноокислыя соединенія и въ взвѣшиваніи послѣднихъ. Такое опредѣленіе дало въ этомъ случаѣ на 1,000 грм. разсола 167,1042 грм. сѣрноокислыхъ соединеній. Связывая всѣ найденныя основанія — за исключеніемъ Al_2O_3 и SiO_2 — съ сѣрною кислотой, мы находимъ вычисленіемъ въ 1,000 грм. разсола въ граммахъ:

сѣрноокислаго кальція CaSO_4	2,2481
„ магнезія MgSO_4	87,9667
„ калия K_2SO_4	1,1303
„ натрія Na_2SO_4	75,4850
кремнезема SiO_2	0,0160
глинозема Al_2O_3	0,0560
	166,9021 грм.;
найдено опытнымъ путемъ	167,1042.

О прежнихъ изслѣдованіяхъ разсола этого озера не имѣется никакихъ литературныхъ данныхъ. Есть однако одно сообщеніе проф. Э. Лемана¹⁾ объ изслѣдованіи имъ „соли, полученной выпариваніемъ воды озера Шунеть“, переданной ему г. В. М. Флоринскимъ. Но такъ какъ самъ проф. Леманъ говоритъ: „всѣ матеріалы, къ сожалѣнію, доставлены были мнѣ безъ точнаго обозначенія мѣста, времени, года и дня, состоянія въ то время погоды, и даже способа добыванія и собиранія“ и „всѣхъ свѣдѣній этихъ я никакъ не могъ добыть“ и т. д., — то ясно, что такому анализу нельзя придавать большого значенія.

Результаты его анализа слѣдующіе:

„въ 100 вѣсовыхъ частяхъ соли было найдено:

хлора Cl	0,98
сѣрной кислоты (ангидрида SO ₃)	54,6
кальція Ca	0,14
магнія Mg	0,943
натрія Na	30,0 (соотв. Na ₂ O—40,4),
кремневой кислоты SiO ₂	0,008
органич. вещ., песку, глины	0,95
кристаллиз. воды и потери	4,3

слѣды калия, желѣза, алюминія, азотной, фосфорной и связанной угольной кислоты“.

Группируя обнаруженныя въ этой соли кислоты и металлы въ опредѣленныя соединенія, мы получаемъ для выраженія вѣроятнаго состава Шунетской соли слѣдующее:

сѣрно-натріевой соли	88,7 %
хлористаго натрія	1,44
сѣрно-магніевой соли	3,9
хлористаго магнія	0,52

1) Проф. Э. Леманъ. Составъ солей, содержащихся въ водѣ озеръ Шира и Шунеть и рѣчки Солоновки. Извѣстія Импер. Томск. университета. 1891 г. кн. III, стр. 106—110.

сѣрнокислой извести	0,16
углекислой „	0,06
хлористаго кальція	0,02
окиси желѣза	слѣды
кремневой кислоты	0,008
органич. вещ., песку, глины	0,95
кристаллиз. воды и потери	4,3
	100,058.

Наконецъ, могу привести еще одинъ анализъ¹⁾ разсола того же озера, произведенный мною осенью 1898 года въ лабораторіи одной изъ Красноярскихъ вольныхъ аптекъ, при которой я состоялъ въ то время управляющимъ. Для изслѣдованія мнѣ была доставлена д-ромъ А. Г. Куркуто-вымъ одна хорошо закупоренная и опечатанная винная бутылка съ означеннымъ разсоломъ, который имъ же былъ взятъ изъ озера лѣтомъ 1897 года. Лѣто было сухое, и потому разсолъ почти насыщенъ солями. Удѣльный вѣсъ его оказался чрезвычайно высокимъ, именно 1,2443 при 15° С., запаха сѣроводорода при откупориваніи не было слышно, но жидкость издавала запахъ подвергнувшихся разложенію органическихъ веществъ. Цвѣтъ разсола желтоватый, немного мутный, съ розовымъ оттѣнкомъ; вкусъ затхлый, горьковато-соленый. Послѣ фильтрованія получалась прозрачная жидкость, а на фильтрѣ оставались розоватыя хлопья, которые дали реакцію на желѣзо. Что касается способовъ опредѣленія отдѣльныхъ составныхъ частей, то примѣнялись мною всѣ тѣ способы, которые выше изложены, только углекислота опредѣлялась вытѣсненіемъ соляною кислотою и поглощеніемъ ея растворомъ фѣдкаго кали; также опредѣлялся бромъ по другому способу, т. е., осаждался въ видѣ смѣси хлористаго и бромистаго серебра, изъ которой, при нагреваніи въ струѣ хлора, вытѣснялся бромъ. Къ сожалѣнію, этотъ способъ не настолько точенъ, насколько нынѣ нами при-

1) Анализъ этотъ еще не былъ напечатанъ. Авт.

мѣненій; послѣдній способъ былъ опубликованъ лишь годъ тому назадъ, а изслѣдованіе производилось мною въ 1898 году.

Результаты этого анализа слѣдующіе:

		на 100 ч. сухого остатка.
окиси кальція CaO	0,0545	0,0215
брома Br	0,4878	0,1924
магнія Mg	5,3186	2,0976
окиси магнія MgO	29,4834	11,6278
сѣрнаго ангидрида SO_3	58,5655	23,0973
калія K	1,5568	0,6140
натрія Na	51,5114	20,3153
хлора Cl	104,8122	41,3363
угольн. ангидрида CO_2 (связ.)	0,2365	0,0933
окиси натрія Na_2O	0,3339	0,1317
кремнезема SiO_2	1,1836	0,4668
	253,5442	99,9940;

въ видѣ соединений:

сѣрноокислаго кальція CaSO_4	0,1326	0,0523
бромистаго магнія MgBr_2	0,5682	0,2241
сѣрноокислаго магнія MgSO_4	87,9705	34,6943
хлористаго калия KCl	3,2752	1,2917
„ натрія NaCl	130,7406	51,5620
„ магнія MgCl_2	29,1028	11,4777
углекислаго натрія Na_2CO_3	0,5707	0,2251
кремнезема SiO_2	1,1836	0,4668
	253,5442	99,9940.

Слѣды желѣза.

Удѣльн. вѣсъ при 15°C . — 1,2443.

Сухой остатокъ, по вышеизложеннымъ причинамъ, точно опредѣлить не удалось, и примѣнялся здѣсь, какъ и всегда, способъ превращенія его въ сѣрноокислыя соединения и взвѣ-

шиванія послѣднихъ. При этомъ найдено таковыхъ на 1,000 грм. разсола 277,5530 грм., а вычисленіемъ получено:

сѣрноокислаго кальція CaSO_4	0,1326
„ калия K_2SO_4	1,8750
„ магнія MgSO_4	114,2560
„ натрія Na_2SO_4	159,5953
кремнезема SiO_2	1,1836
	277,0425.

Для сравненія анализа проф. Э. Лемана съ нашими, мы помѣстили рядомъ съ цифрами, показывающими количество солей въ 1,000 вѣсовыхъ частей разсола, графу съ цифрами, выражающими процентное содержаніе таковыхъ въ сухомъ остаткѣ.

Дѣлая то же самое съ рассматриваемымъ анализомъ, мы получаемъ:

въ 100 ч. сухого остатка такого разсола имѣется:

угольнаго ангидрида CO_2	0,2265
окиси кальція CaO	0,5973
сѣрнаго ангидрида SO_3	26,2900
калія K	0,3275
окиси магнія MgO	13,0242
магнія Mg	3,6229
хлора Cl	38,1200
натрія Na	17,7322
окиси натрія Na_2O	0,0091
кремнезема SiO_2	0,0103
глинозема Al_2O_3	0,0361
	99,9961.

Если найденныя основанія и кислоты выразить въ со-
ляхъ, то получимъ:

углекислаго кальція CaCO_3	0,5002
сѣрнокислаго кальція CaSO_4	0,7707
„ магнія MgSO_4	38,8607
хлористаго калия KCl	0,6243
углекислаго натрія Na_2CO_3	0,0155
хлористаго магнія MgCl_2	14,1698
„ натрія NaCl	45,0085
кремнезема SiO_2	0,0103
глинозема Al_2O_3	0,0361
	99,9961.

Для большей наглядности приведемъ имѣющіеся анализы въ видѣ слѣдующихъ таблицъ.

Въ 100 грм. сухого остатка, выпареннаго изъ разсола озера Шунеть, найдено:

	Проф. Э. Леманъ. 1891 г.	Людвигъ. 1897 г.	Людвигъ. 1898 г.
сѣрнокислаго натрія Na_2SO_4	88,7	—	—
хлористаго „ NaCl	1,44	51,5620	45,0085
сѣрнокислаго магнія MgSO_4	3,9	34,6943	38,8607
хлористаго „ MgCl_2	0,52	11,4777	14,1698
сѣрнокислаго кальція CaSO_4	0,16	0,0523	0,7707
углекислаго кальція CaCO_3	0,06	—	0,5002
хлористаго „ CaCl_2	0,02	—	—
окиси желѣза Fe_2O_3	слѣды	слѣды	слѣды
кремневой кислоты SiO_2	0,008	0,4668	0,0103
органич. вещ., песку, глины,	0,95	—	—
кристал. воды и потери	4,3	—	—
бромистаго магнія MgBr_2	—	0,2241	слѣды
хлористаго калия KCl	—	1,2917	0,6243
углекислаго натрія Na_2CO_3	—	0,2251	0,0155
глинозема Al_2O_3	—	—	0,0361
	100,058	99,9940	99,9961

Въ 1000 грм. разсола озера Шунеть найдено въ граммахъ:

	Людвигъ лѣтомъ 1897 г.	Людвигъ лѣтомъ 1899 г.
сѣрнокислаго кальція CaSO_4	0,1326	1,1940
бромистаго магнія MgBr_2	0,5682	—
сѣрнокислаго „ MgSO_4	87,9705	60,2026
хлористаго калия KCl	3,2752	0,9673
„ натрія NaCl	130,7406	69,7267
„ магнія MgCl_2	29,1028	21,9518
углекислаго натрія Na_2CO_3	0,5707	0,0241
кремнезема SiO_2	1,1836	0,0160
желѣза Fe	слѣды	слѣды
углекислаго кальція CaCO_3	—	0,7749
литія Li	—	слѣды
брома Br		
амміака NH_3		
глинозема Al_2O_3	—	0,0560
	253,5442	154,9134.
Удѣльный вѣсъ при 15° С.	1,2443	1,1401

VII. Озеро Бильѣ.

А. Физическія свойства.

Удѣльн. вѣсъ при 15° С. — 1,0079,
вкусъ — слабо горько-соленый,
запахъ — нѣтъ,
цвѣтъ — прозрачный и съ едва желтымъ оттѣнкомъ.

В. Результаты химическаго изслѣдованія.

Въ 1000 грм. воды найдено въ граммахъ:
окиси кальція CaO 0,0533
угольнаго ангидрида CO_2 (связ.) . . . 0,4009
окиси магнія MgO 1,0674
окиси калия K_2O 0,0919

сѣрнаго ангидрида SO_2	3,8310
азотнаго " N_2O_5	0,0824
хлора Cl	0,8709
натрія Na	0,5661
окси натрія Na_2O	1,8228
кремнезема SiO_2	0,0032
глинозема Al_2O_3	0,0026
	8,7925
сухого остатка при 180°C	8,8122
жельза, брома, литія и амміака	слѣды
угольнаго ангидрида CO_2 (полусвяз.)	0,1785

То же самое въ видѣ солей:

углекислаго кальція CaCO_3	0,1211
" магнія MgCO_3	0,2122
сѣрноислаго " MgSO_4	2,8818
" калия K_2SO_4	0,1699
" натрія Na_2SO_4	3,2821
азотноислаго " NaNO_3	0,1463
углекислаго " Na_2CO_3	0,5363
хлористаго " NaCl	1,4370
кремнезема SiO_2	0,0032
глинозема Al_2O_3	0,0026
	8,7925 грм.

Вышеприведенная комбинація солей получена на основаніи слѣдующихъ расчетовъ:

окси кальція CaO	0,0533
связываетъ CO_2	0,0678
	$\text{CaCO}_3 =$ 0,1211
угольнаго ангидрида CO_2 (въ осадкѣ)	0,1785
израсходовано	0,0678
остается CO_2	0,1107
связываетъ MgO	0,1015
	$\text{MgCO}_3 =$ 0,2122;

окси магнія MgO	1,0674
израсходовано	0,1015
остается MgO	0,9659
связываетъ SO_3	1,9159
	$\text{MgSO}_4 =$ 2,8818;
окси калия K_2O	0,0919
связываетъ SO_3	0,0780
	$\text{K}_2\text{SO}_4 =$ 0,1699;
сѣрнаго ангидрида SO_2	3,8310
израсходовано	1,9159
	0,0780 1,4450
	$\text{Na}_2\text{SO}_4 =$ 3,2821
азотнаго ангидрида N_2O_5	0,0824
связываетъ Na_2O	0,0639
	$\text{NaNO}_3 =$ 0,1463
угольнаго ангидрида CO_2 (въ раств.)	0,2224
связываетъ Na_2O	0,3139
	$\text{Na}_2\text{CO}_3 =$ 0,5363
хлора Cl	0,8709
связываетъ Na	0,5661
	$\text{NaCl} =$ 1,4370.

Сухой остатокъ переведенъ въ сѣрноислые соединения. и взвѣшанъ, далъ въ результатѣ на 1,000 грм. воды 9,4830 грм. таковыхъ, а вычисленіемъ получено:

сѣрноислаго кальція CaSO_4	0,1294
" магнія MgSO_4	3,1846
" калия K_2SO_4	0,1699
" натрія Na_2SO_4	5,9180
кремнезема SiO_2	0,0032
глинозема Al_2O_3	0,0026
	9,4077

Хотя озеро это занимаетъ обширное пространство и находится всего лишь въ 15 верстахъ отъ болѣе извѣстнаго

озера Шира, обратившаго уже давно на себя вниманіе публики и врачей и посѣщаемого ежегодно все возрастающимъ числомъ больныхъ и здоровыхъ, — тѣмъ не менѣе вода озера Билье еще совершенно не изслѣдована, и въ литературѣ не имѣется никакихъ данныхъ относительно химическаго состава ея. Единственное, что въ этомъ отношеніи сдѣлано, это — измѣреніе удѣльнаго вѣса И. Т. Савенковымъ, лѣтомъ 1889 г.¹⁾

VIII. Горькое озеро.

А. Физическія свойства.

Удѣльный вѣсъ при 15° С. — 1,05044,
цвѣтъ — прозрачный, едва желтоватый,
запахъ — нѣтъ,
вкусъ — сильно горько-соленый.

В. Результаты химическаго изслѣдованія.

Въ 1000 грм. воды найдено въ граммахъ:

окиси кальція CaO	0,1255
угольнаго ангидрида CO_2 (связ.)	0,6605
окиси магнія MgO	1,2607
окиси калия K_2O	0,9827
сѣрнаго ангидрида SO_3	21,5603
хлора Cl	11,8115
натрія Na	7,6786
окиси натрія Na_2O	14,9301
кремнезема SiO_2	0,0180
глинозема Al_2O_3	0,0040
	59,0319
сухого остатка при 180° С.	59,1065
угольнаго ангидрида CO_2 (полусвяз.)	0,5492
азотистой кислоты, амміака и брома слѣды.	

1) И. Т. Савенковъ. Къ матеріаламъ для медико-топографическаго описанія озера Шира. Протоколы и труды Общ. врачей Енисейск. губ. 1890 г.

При этихъ данныхъ допускается слѣдующій составъ солей въ водѣ озера:

углекислаго кальція CaCO_3	0,2240
„ магнія MgCO_3	0,8641
сѣрнокислаго „ MgSO_4	2,5280
„ калия K_2SO_4	1,8174
„ натрія Na_2SO_4	33,8180
хлористаго „ NaCl	19,4901
углекислаго „ Na_2CO_3	0,2683
кремнезема SiO_2	0,0180
глинозема Al_2O_3	0,0040
	59,0319.

То же самое въ видѣ сѣрнокислыхъ солей:

сѣрнокислаго кальція CaSO_4	0,3048
„ магнія MgSO_4	3,7614
„ калия K_2SO_4	1,8174
„ натрія Na_2SO_4	57,8526
кремнезема SiO_2	0,0180
глинозема Al_2O_3	0,0040
	63,7582,
найденно непосредственно опытомъ	63,8320.

Относительно воды этого озера мнѣ также не удалось найти никакихъ анализовъ, что и не удивительно, такъ какъ разсолъ его не употребляется ни для выварки поваренной соли, ни для медицинскихъ цѣлей, и самое озеро лишь незначительнаго размѣра; но съ другой стороны, находясь на дорогѣ къ курорту Шира, оно болѣе другихъ бросается въ глаза и хорошо извѣстно всѣмъ посѣтителемъ этого курорта, между которыми химиковъ, вѣроятно, было не мало.

Выше приведены результаты, полученные непосредственно при анализахъ разсоловъ, а затѣмъ составлены изъ найденныхъ ангидридовъ кислотъ и оснований соединенія, выражающія вѣроятный составъ солей въ изслѣдованныхъ разсолохъ. Здѣсь мы находимъ умѣстнымъ сказать нѣсколько

словъ о тѣхъ соображеніяхъ, которыми мы при этомъ руководились.

Сначала связывали бромъ во всѣхъ случаяхъ и магній, какъ элементы, имѣющіе наибольшее сродство между собою. Затѣмъ связывали углекислоту, найденную въ осадкѣ, полученномъ при долгомъ кипяченіи разсола, съ кальціемъ, потомъ съ желѣзомъ, а при избыткѣ ея еще съ магниемъ, такъ какъ углекислыя соединенія ихъ нерастворимы въ кипящей водѣ; но углекислоту, найденную въ растворѣ, связывали всегда съ натріемъ, имѣя въ виду легкую растворимость углекислого натрія въ водѣ. Ангидридъ сѣрной кислоты связывали сперва съ кальціемъ, затѣмъ съ магниемъ, и, наконецъ, съ калиемъ и натріемъ. Что касается хлора, то послѣдній былъ связанъ такимъ же образомъ, послѣдовательно съ магниемъ, калиемъ и натріемъ. Азотный ангидридъ привели въ видѣ азотнокислого натрія, а желѣзо — въ видѣ углекислой закиси; просто въ видѣ окисей приводились алюминій и кремній, вслѣдствіе трудности найти для нихъ соединенія, соотвѣтствующія дѣйствительности.

В. Бузунъ.

Бузуномъ, какъ извѣстно, называется смѣсь солей, состоящая, главнымъ образомъ, изъ сѣрнокислого натрія и находящаяся на днѣ нѣкоторыхъ горько-соленыхъ озеръ, гдѣ она образуетъ твердый покровъ, называемый черепомъ; но иногда, выброшенный волнами, онъ окаймляетъ берега этихъ озеръ. Въ первомъ случаѣ бузунъ представляетъ крупнокристаллическіе пласты, до полметра толщиною, въ другомъ случаѣ — снѣжно-бѣлый порошокъ, заключающій мѣстами болѣе или менѣе крупные кристаллы еще не вывѣтрившейся глауберовой соли.

Для количественнаго опредѣленія отдѣльныхъ составныхъ частей бузуна, мы примѣнили слѣдующій ходъ анализа.

75—100,0 бузуна, превращеннаго предварительно въ по-

рошокъ, сперва высушивалось, а затѣмъ слабо прокаливалось въ фарфоровой чашкѣ, для освобожденія его отъ кристаллизационной воды; при этомъ разрушались одновременно нѣкоторыя органическія вещества, такъ что цифры, показывающія въ слѣдующихъ анализахъ количество органическихъ веществъ, должны считаться немного нижедѣйствительныхъ. Обезвоженный такимъ образомъ бузунъ хранился въ эксикаторѣ и служилъ исходнымъ матеріаломъ для анализа.

Въ 5—10 грм. его опредѣлялось количество хлора, азотносеребряной солью, частью титрованіемъ, частью вѣсовымъ путемъ; послѣдній способъ примѣнялся въ тѣхъ случаяхъ, когда количество хлора было очень мало, и титрованіемъ получались неточные результаты. 0,2—0,5 грм. обезвоженнаго бузуна, раствореннаго въ подкисленной соляной кислотой водѣ, служили для опредѣленія сѣрной кислоты посредствомъ хлористаго барія; съ фильтратомъ поступали такъ, какъ это описано выше при опредѣленіи калия и натрія съ тою лишь разницею, что здѣсь калий, вслѣдствіе ничтожнаго его содержанія, не былъ опредѣляемъ количественно. 20 грм. обезвоженнаго бузуна растворялись въ водѣ, подкисленной соляной кислотой, нерастворимый остатокъ отфильтровывался черезъ высушенный и взвѣшенный фильтръ, высушивался и взвѣшивался; такимъ образомъ получался вѣсъ общаго, нерастворимаго въ HCl, остатка. Затѣмъ остатокъ, вмѣстѣ съ фильтромъ прокаливался и взвѣшивался; найденный вѣсъ показывалъ нерастворимый въ HCl неорганическій остатокъ, а разница въ вѣсѣ — органическій остатокъ.

Въ фильтратѣ осаждались желѣзо и алюминій (P_2O_5 отсутствовалъ) амміакомъ, осадокъ отфильтровывался, высушивался, прокаливался и взвѣшивался въ видѣ окисей желѣза и алюминія. Такъ какъ во всѣхъ случаяхъ получался лишь очень небольшой осадокъ, то отдѣленія ихъ другъ отъ друга не производилось. Въ фильтратѣ, полученномъ по выдѣленіи Fe и Al, осаждался кальцій шавелевокислымъ аммоніемъ, а

послѣ удаленія щавелевокислаго кальція, осаждался магній посредствомъ фосфорнокислаго натрія, какъ это подробно описано выше (при изслѣд. воды).

20 грм. обезвоженного бузуна служили для опредѣленія углекислоты, какъ той, которая находилась въ видѣ углекислаго натрія, такъ и той, которая связана съ кальціемъ и магниемъ, описаннымъ ранѣе способомъ, т. е., титрованіемъ децинормальной сѣрной кислотой, при чемъ индикаторомъ служила розоловая кислота.

I. Алтайское озеро.

а) Бузунъ со дна озера.

Въ 100 вѣс. частяхъ обезвоженной соли найдено:

угольного ангидрида CO_2	0,1186
окиси кальція CaO	0,2150
„ магнія MgO	0,1116
сѣрнаго ангидрида SO_3	53,9976
хлора Cl	0,1766
окиси желѣза и алюминія Fe_2O_3 + Al_2O_3	0,1106
натрія Na	0,1148
окиси натрія Na_2O	41,6432
нерастворимаго въ HCl остатка органическаго	1,1228
неорганическаго	2,3332
	99,9440
калія	слѣды.

Группируя найденныя основанія и кислоты въ соли, получаемъ:

углекислаго кальція CaCO_3	0,1268
„ натрія Na_2CO_3	0,1514
сѣрнокислаго кальція CaSO_4	0,3498
„ магнія MgSO_4	0,3329
„ натрія Na_2SO_4	95,1251
хлористаго натрія NaCl	0,2914

окиси желѣза и алюминія Fe_2O_3 + Al_2O_3	0,1106
нерастворимаго въ HCl остатка органическаго	1,1228
неорганическаго	2,3332
	99,9440
калія	слѣды.

Вышеприведенная комбинація солей получена на основаніи слѣдующихъ расчетовъ:

угольного ангидрида CO_2 (въ осадкѣ)	0,0558
связываетъ CaO	0,0710
	$\text{CaCO}_3 = 0,1268$;

угольного ангидрида CO_2 (въ раств.)	0,0628
связываетъ Na_2O	0,0886
	$\text{Na}_2\text{CO}_3 = 0,1514$;

окиси кальція CaO	0,2150
израсходовано	0,0710
остается CaO	0,1440
связываетъ SO_3	0,2058
	$\text{CaSO}_4 = 0,3498$;

окиси магнія MgO	0,1116
связываетъ SO_3	0,2213
	$\text{MgSO}_4 = 0,3329$;

сѣрнаго ангидрида SO_3	53,9976
израсходовано	0,2058
„	+ 0,2213
	0,4271

остается SO_3	53,5705
связываетъ Na_2O	41,5546
	$\text{Na}_2\text{SO}_4 = 95,1251$;

хлора Cl	0,1766
связываетъ Na	0,1148
	$\text{NaCl} = 0,2914$.

b) Бузунъ съ берега.

Въ 100 вѣс. частяхъ обезвоженной соли найдено:

угольного ангидрида CO_2	0,0300
окси кальция CaO	0,0113
сѣрнаго ангидрида SO_3	55,6673
хлора Cl	0,0816
окси желѣза и алюмин. $\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{Al}_2\text{O}_3$	0,0061
натрія Na	0,0530
окси натрія Na_2O	43,2108
нерастворимаго въ HCl остатка	
органическаго	0,7548
неорганическаго	0,1582
	99,9731.
магнія и калия	слѣды.

Группируя найденныя основанія и кислоты въ соли, получаемъ:

углекислаго кальция CaCO_3	0,0193
" натрія Na_2CO_3	0,0518
хлористаго натрія NaCl	0,1346
сѣрнокислаго " Na_2SO_4	98,8471
" кальція CaSO_4	0,0012
окси желѣза и алюминія Fe_2O_3	
+ Al_2O_3	0,0061
нерастворимаго въ HCl остатка	
органическаго	0,7548
неорганическаго	0,1582
	99,9731
магнія и калия	слѣды.

Вышеприведенная комбинація солей получена на основаніи слѣдующихъ расчетовъ:

угольного ангидрида CO_2 (въ осадкѣ)	0,0085
связываетъ CaO	0,0108
	$\text{CaCO}_3 = 0,0193$;
угольного ангидрида CO_2 (въ раств.)	0,0215
связываетъ Na_2O	0,0303
	$\text{Na}_2\text{CO}_3 = 0,0518$

окси кальция CaO	0,0113
израсходовано	0,0108
остается CaO	0,0005
связываетъ SO_3	0,0007
	$\text{CaSO}_4 = 0,0012$;
хлора Cl	0,0816
натрія Na	0,0530
	$\text{NaCl} = 0,1346$;
сѣрнаго ангидрида SO_3	55,6673
израсходовано	0,0007
остается SO_3	55,6666
связываетъ Na_2O	43,1805
	$\text{Na}_2\text{SO}_4 = 98,8471$.

II. Бейское озеро.

Бузунъ взятъ съ берега.

Въ 100 вѣс. частяхъ найдено въ граммахъ:

угольного ангидрида CO_2	0,0132
хлора Cl	0,2098
сѣрнокислаго ангидрида SO_3	56,0525
натрія Na	0,1363
окси натрія Na_2O	43,4983
нерастворимаго въ HCl остатка	
органическаго	0,0120
неорганическаго	
	99,9221.

Группируя найденныя основанія и кислоты въ соли, получаемъ:

углекислаго натрія Na_2CO_3	0,0316
хлористаго " NaCl	0,3461
сѣрнокислаго " Na_2SO_4	99,5324
нерастворимаго въ HCl остатка	
органическаго	0,0120
неорганическаго	
	99,9221.

Вышеприведенная комбинация солей получена на основании слѣдующихъ расчетовъ:

угольного ангидрида CO_2 (въ раств.)	0,0132
связываетъ Na_2O	0,0184
$\text{Na}_2\text{CO}_3 =$	0,0316
хлора Cl	0,2098
связываетъ Na	0,1363
$\text{NaCl} =$	0,3461;
сѣрнаго ангидрида SO_3	56,0525
связываетъ Na_2O	43,4799
$\text{Na}_2\text{SO}_4 =$	99,5324.

III. Озеро Доможаково.

Въ 100 вѣс. частяхъ бузуна, взятаго со дна озера, содержится:

угольного ангидрида CO_2	0,1136
сѣрноокислаго ангидрида SO_3	55,3129
хлора Cl	0,0852
натрія Na	0,0553
окиси натрія Na_2O	42,4233
„ калція CaO	0,5800
окиси желѣза и алюминія Fe_2O_3	
+ Al_2O_3	0,0435
нерастворимаго въ HCl остатка	
органическаго	0,3760
неорганическаго	0,9440
	99,9338.

Группируя найденныя основанія и кислоты въ соли, получаемъ:

углекислаго калція CaCO_3	0,1622
„ натрія Na_2CO_3	0,1017
хлористаго натрія NaCl	0,1405
окиси желѣза и алюминія Fe_2O_3	
+ Al_2O_3	0,0435
сѣрноокислаго калція CaSO_4	1,1884
„ натрія Na_2SO_4	96,9775

нерастворимаго въ HCl остатка

органическаго	0,3760
неорганическаго	0,9440
	99,9338.

Вышеприведенныя комбинаціи солей получены на основании слѣдующихъ расчетовъ:

угольн. ангидрида CO_2 (въ осадкѣ) .	0,0714
связываетъ CaO	0,0908
$\text{CaCO}_3 =$	0,1622;
угольного ангидрида CO_2 (въ раств.)	
связываетъ Na_2O	0,0595
$\text{Na}_2\text{CO}_3 =$	0,1017;
хлора Cl	0,0852
связываетъ Na	0,0553
$\text{NaCl} =$	0,1405;
окиси калція CaO	0,5800
израсходовано	0,0908
остается CaO	0,4892
связываетъ SO_3	0,6992
$\text{CaSO}_4 =$	1,1884;
сѣрнаго ангидрида SO_3	55,3129
израсходовано	0,6992
остается SO_3	54,6137
связываетъ Na_2O	42,3638
$\text{Na}_2\text{SO}_4 =$	96,9775.

IV. Озеро Джемакъ-Куль.

а) Бузунъ, лежащій на поверхности высохшаго озера надъ глиною.

Въ 100 вѣс. частяхъ его находится:

угольного ангидрида CO_2	0,0210
хлора Cl	0,3124
сѣрнаго ангидрида SO_3	55,8613

натрія Na	0,2030
окси натрія Na_2O	43,3513
„ кальція CaO	0,0089
„ желѣза и алюминія $\text{Fe}_2\text{O}_3 +$ Al_2O_3	0,0720
магнія и калия	слѣды
нерастворимаго въ HCl остатка	
органическаго }	0,1290
неорганическаго }	
99,9589.	

Группируя найденныя основанія и кислоты въ соли, получаемъ:

углекислаго кальція CaCO_3	0,0159
„ натрія Na_2CO_3	0,0337
хлористаго „ NaCl	0,5154
сѣрноокислаго „ Na_2SO_4	99,1929
окси желѣза и алюминія $\text{Fe}_2\text{O}_3 +$ Al_2O_3	0,0720
нерастворимаго въ HCl остатка	
органическаго }	0,1290
неорганическаго }	
99,9589.	

Вышеприведенная комбинація солей получена на основаніи слѣдующихъ расчетовъ:

углянаго ангидрида CO_2 (въ осадкѣ)	0,0070
связываетъ CaO	0,0089
$\text{CaCO}_3 =$	0,0159;
углянаго ангидрида CO_2 (въ ра- створѣ)	
связываетъ Na_2O	0,0197
$\text{Na}_2\text{CO}_3 =$	0,0337;

хлора Cl	0,3124
связываетъ Na	0,2030
$\text{NaCl} =$	0,5154;
сѣрнаго ангидрида SO_3	55,8613
связываетъ Na_2O	43,3316
$\text{Na}_2\text{SO}_4 =$	99,1929
окси натрія Na_2O	43,3513.

b) Бузунъ, лежащій подъ глиною высохшаго озера.

Въ 100 вѣс. частяхъ его находится:

углянаго ангидрида CO_2	0,4639
хлора Cl	0,6228
окси натрія Na_2O	41,1344
натрія Na	0,4048
окси кальція CaO	0,8460
„ магнія MgO	0,4090
сѣрнаго ангидрида SO_3	54,2054
окси желѣза и алюминія $\text{Fe}_2\text{O}_3 +$ Al_2O_3	0,1100
нерастворимаго въ HCl остатка	
органическаго	0,7430
неорганическаго	1,0810
100,0203.	

Группируя найденныя основанія и кислоты въ соли, получаемъ:

углекислаго кальція CaCO_3	0,9629
„ натрія Na_2CO_3	0,0969
сѣрноокислаго кальція CaSO_4	0,7453
„ магнія MgSO_4	1,2202
хлористаго натрія NaCl	1,0276
сѣрноокислаго натрія Na_2SO_4	94,0334
окси желѣза и алюминія $\text{Fe}_2\text{O}_3 +$ Al_2O_3	0,1100
нерастворимаго въ HCl остатка	
органическаго	0,7430
неорганическаго	1,0810
100,0203.	

Вышеприведенная комбинация солей получена на основании слѣдующихъ расчетовъ:

угольного ангидрида CO_2 (въ осадкѣ).	0,4237
связываетъ CaO	0,5237
$\text{CaCO}_3 =$	0,9629;
угольного ангидрида CO_2 (въ растворѣ).	0,0402
связываетъ Na_2O	0,0567
$\text{Na}_2\text{CO}_3 =$	0,0969;
окиси кальція CaO	0,8460
израсходовано	0,5392
остается CaO	0,3065
связываетъ SO_3	0,4385
$\text{CaSO}_4 =$	0,7453;
окиси магнезія MgO	0,4090
связываетъ MgO	0,8112
$\text{MgSO}_4 =$	1,2202;
хлора Cl	0,6228
связываетъ Na	0,4048
$\text{NaCl} =$	1,0276;
сѣрнаго ангидрида SO_3	54,2054
израсходовано	1,2497
остается SO_3	52,9557
связываетъ Na O	41,0777
$\text{Na}_2\text{SO}_4 =$	94,0334;

V. Озеро Шунетъ.

Хотя бузуна этого озера мнѣ не удалось достать во время путешествія по степи лѣтомъ 1899 года, тѣмъ не менѣе я могу привести одинъ анализъ его, произведенный мною осенью 1898 года. Бузунъ этотъ былъ мнѣ доставленъ д-ромъ Куркутовымъ, который его добылъ со дна озера лѣтомъ того же года. Представлялъ онъ бѣлые, покрытые пылью и грязью пласты, толщиною отъ $\frac{1}{2}$ —2 $\frac{1}{2}$ сант., съ верхнею пористой

и нижнею уплотненной стороною; средняя часть представлялась въ видѣ крупно-кристаллической массы и не содержала ни пыли, ни грязи.

Методы изслѣдованій примѣнялись тѣ же, которые уже раньше были описаны, а потому я ихъ здѣсь повторно описывать не буду.

Въ 100 вѣс. частяхъ обезвоженного бузуна найдено:

окиси кальція CaO	0,0682
сѣрнаго ангидрида SO_3	54,4525
хлора Cl	0,5566
угольного ангидрида CO_2	0,6268
окиси желѣза Fe_2O_3	0,0074
„ алюминія Al_2O_3	0,0682
кремнезема SiO_2	0,0708
окиси магнезія MgO	10,2231
„ натрія Na_2O	25,9615
натрія Na	0,3618
окиси калия K_2O	1,9286
нерастворимаго въ HCl остатка	
органическаго }	5,6962
неорганическаго }	
	100,0217.

Кромѣ того, слѣды фтора, литія и фосфорной кислоты.

Группируя найденныя основанія и кислоты въ соли, получаемъ:

углекислаго кальція CaCO_3	0,1217
„ магнезія MgCO_3	0,1409
„ натрія Na_2CO_3	1,2052
сѣрноокислаго „ Na_2SO_4	57,8153
„ магнезія MgSO_4	30,3249
„ калия K_2SO_4	3,6527
хлористаго натрія NaCl	0,9184
окиси алюминія Al_2O_3	0,0682
„ желѣза Fe_2O_3	0,0074

кремнезема SiO_2	0,0708
нерастворимаго въ HCl остатка	
органическаго }	5,6962
неорганическаго }	
	100,0217.

Вышеприведенная комбинація солей получена на основаніи слѣдующихъ расчетовъ:

окиси кальція CaO	0,0682
связываетъ CO_2	0,0535
$\text{CaCO}_3 =$	0,1217;
угольного ангидрида CO_2 (въ осадкѣ)	0,1270
израсходовано	0,0535
остается CO_2	0,0735
связываетъ MgO	0,0674
$\text{MgCO}_3 =$	0,1409;
угольного ангидрида CO_2 (въ раств.)	0,4998
связываетъ Na_2O	0,7054
$\text{Na}_2\text{CO}_3 =$	1,2052;
окиси магнезія MgO	10,2231
израсходовано	0,0674
остается MgO	10,1557
связываетъ SO_3	20,1692
$\text{MgSO}_4 =$	30,3249;
окиси калия K_2O	1,9286
связываетъ SO_3	1,7241
$\text{K}_2\text{SO}_4 =$	3,6527;
хлора Cl	0,5566
связываетъ Na	0,3618
$\text{NaCl} =$	0,9184;
сѣрнаго ангидрида SO_3	54,4525
израсходовано	20,1692
"	+ 1,7241
остается SO_3	21,8933
связываетъ Na_2O	32,5592
$\text{Na}_2\text{SO}_4 =$	25,2561
	57,8153.

Въ то время, какъ бузунъ всѣхъ вышеприведенныхъ озеръ, повидимому, еще не былъ изслѣдованъ, по крайней мѣрѣ въ литературѣ мнѣ не приходилось встрѣчать никакихъ касающихся ихъ анализовъ, бузунъ озера Шунетъ уже былъ изслѣдованъ, и результаты опубликованы А. Н. Богачевымъ¹⁾. Тамъ мы читаемъ: „Образецъ соли (смѣсь горькой и глауберовой), извлеченной со дна озера Шунетъ, въ іюнѣ 1895 года, въ видѣ плотной массы, служащей основаніемъ (черепомъ) соляного озера;

въ 100 вѣс. частяхъ обезвоженной соли по анализу найдено:

хлористаго натрія NaCl	3,07 %
сѣрноокислаго натрія Na_2SO_4	49,48
„ магнезія MgSO_4	43,55
окиси алюминія Al_2O_3	0,19
сѣрноокислаго кальція CaSO_4	2,70
нерастворимаго въ водѣ }	1,01 { 0,17 % органич. нелетуч. веществъ.
остатка	0,84 % минеральн. вещ.

Тотъ же анализъ, но съ приведеніемъ тѣхъ простыхъ составныхъ частей, изъ которыхъ комбинировались вышеприведенныя соли, напечатанъ въ Торгово-Промышленной газетѣ за 1897 г.²⁾ Здѣсь упомянуто:

„По анализу камня (черепа, покрывающаго дно озера со щелями, заполненными черной грязью) въ 100 частяхъ обезвоженной соли содержится:

хлора Cl	1,88 %
сѣрнаго ангидрида SO_3	58,84
окиси кальція CaO	1,11
„ магнезія MgO	14,63
„ алюминія Al_2O_3	0,19
„ натрія Na_2O	21,15
натрія Na	1,19

1) Вѣстникъ золотопромышленности. 1899 г. № 13.

2) Н. В. Скорняковъ. Озеро Шунетъ. Торгово-Промышл. газета. 1897 г. № 153.

нерастворимаго остатка	1,01
въ томъ числѣ органическ.	0,17
„ минеральн.	0,84

Дальше слѣдуетъ группировка этихъ составныхъ частей въ соли, какъ въ анализѣ, приведенномъ Богачевымъ.

Въ видахъ большей наглядности, для сравненія обоихъ анализовъ, помѣщаемъ слѣдующія таблицы:

Въ 100 вѣс. частяхъ обезвоженной соли найдено:

	Богачевъ лѣтомъ 1895 г.	Людвигъ лѣтомъ 1898 г.
а) простые соединенія:		
хлора Cl	1,88	0,5566
сѣрнаго ангидрида SO ₃	58,84	54,4525
окиси кальція CaO	1,11	0,0682
„ магнезія MgO	14,63	10,2231
„ алюминія Al ₂ O ₃	0,19	0,0682
„ натрія Na ₂ O	21,15	25,9615
натрія Na	1,19	0,3618
нерастворимаго въ водѣ остатка .	1,01	—
въ томъ числѣ: органическаго .	0,17	—
„ минеральнаго .	0,84	—
окиси калия K ₂ O	—	1,9286
угольнаго ангидрида CO ₂	—	0,6268
окиси желѣза Fe ₂ O ₃	—	0,0074
кремнезема SiO ₂	—	0,0708
нерастворимаго въ HCl остатка .	—	—
органическаго }	—	5,6962
неорганическаго }		
фтора, магнезія и фосфорной кислоты .	—	слѣды
	100,00	100,0217.

б) то же самое въ видѣ солей:

хлористаго натрія NaCl	3,07	0,9184
сѣрнокислаго „ Na ₂ SO ₄	49,48	57,8153
„ магнезія MgSO ₄	43,55	30,3249
окиси алюминія Al ₂ O ₃	0,19	0,0682
сѣрнокислаго кальція CaSO ₄	2,70	—
нерастворимаго въ водѣ остатка .	1,01	—

въ томъ числѣ:

органич. нелетуч. вещ.	1,17	—
минеральн. веществъ	0,84	—
углекислаго кальція CaCO ₃	—	0,1217
„ магнезія MgCO ₃	—	0,1409
„ натрія Na ₂ CO ₃	—	1,2052
сѣрнокислаго калия K ₂ SO ₄	—	3,6527
окиси желѣза Fe ₂ O ₃	—	0,0074
кремнезема SiO ₂	—	0,0708
нерастворимаго въ HCl остатка		
органическихъ }	—	5,6962
неорганическихъ }		
	100,00	100,0217.

С. Минеральная грязь.

Обыкновенно при изслѣдованіи минеральной грязи принято сперва готовить растворъ ея въ горячей водѣ, затѣмъ нерастворимый въ водѣ остатокъ обрабатывать соляной кислотою, наконецъ, нерастворимый ни въ водѣ, ни въ HCl остатокъ сплавлять съ содою, производя въ отдѣльности анализы каждаго изъ полученныхъ растворовъ.

Мы же ограничились изслѣдованіемъ лишь солянокислаго раствора и сплава, а анализы воднаго раствора не производили, потому что оба образца грязи взяты изъ озеръ одновременно съ разсолами, покрывающими ихъ и изслѣдованными нами.

Ходъ анализа былъ таковъ: 100 грм. грязи растворялись въ 1000 грм. перегнанной воды при кипяченіи; послѣ осажденія нерастворившагося вещества, растворъ отфильтровывался, остатокъ же высушивался при 180° С. и взвѣшивался.

Полученный такимъ образомъ водный растворъ грязи, какъ только что упомянуто выше, не изслѣдовался; въ немъ опредѣлялось лишь общее количество растворенныхъ веществъ выпариваніемъ досуха и послѣдовательнымъ высушиваніемъ при 180° С. Остатокъ, получающійся послѣ раство-

ренія 100 грм. грязи въ 1,000 грм. кипяч. воды, обрабатывался соляной кислотой, прибавляемой небольшими порціями во избѣжаніе слишкомъ бурнаго выдѣленія углекислаго газа и отчасти сѣроводорода, растворъ окислялся азотною кислотю, разбавлялся водою и послѣ осажденія нерастворенныхъ частей фильтровался. Къ фильтрату приливалось перегнанной воды до 500 куб. цент. 50 куб. цент. этого раствора испытывались на Fe_2O_3 , Al_2O_3 , CaO и MgO (Mn отсутствовалъ) слѣдующимъ образомъ: солянокислый растворъ почти нейтрализовался углекислымъ натріемъ, а затѣмъ осаждался уксуснокислымъ натріемъ. Осадокъ отфильтровывался, изъ фильтрата амміакомъ осаждался глиноземъ ($\text{Al}(\text{OH})_3$) и отдѣлялся фильтрованіемъ; оба осадка растворялись въ HCl , и полученные растворы соединялись, а затѣмъ дѣлились на двѣ равныя части. Въ одной части опредѣлялись совмѣстно Al_2O_3 , Fe_2O_3 и P_2O_5 осажденіемъ посредствомъ амміака, высушиваніемъ и прокаливаніемъ осадка, въ другой опредѣлялась только Fe_2O_3 , т. е., къ ней прибавлялся винный камень, затѣмъ амміакъ до сильно щелочной реакціи, наконецъ, сѣрнистый аммоній; осадокъ сѣрнистаго желѣза отфильтровывался, промывался водою съ прибавленіемъ сѣрнистаго аммонія, растворялся въ HCl , еще разъ осаждался изъ полученнаго раствора амміакомъ; осадокъ водной окиси желѣза отфильтровывался вновь, высушивался и прокаливаніемъ превращался въ Fe_2O_3 , въ видѣ котораго и взвѣшивался.

Въ фильтратѣ, освобожденномъ отъ Fe_2O_3 , Al_2O_3 и P_2O_5 , опредѣлялись CaO и MgO въ видѣ щавелевокислаго кальція и пирофосфорнокислаго магнія способомъ, выше подробно описаннымъ.

Другіе 100 куб. ц. солянокислаго раствора грязи служили для опредѣленія фосфорной кислоты. Въ виду того, что этотъ способъ нами раньше не описанъ, приведемъ его здѣсь: взятая жидкость выпаривалась на водяной банѣ почти досуха, затѣмъ избыткомъ HNO_3 , и повторнымъ выпариваніемъ соли соляной кислоты превращались въ азотнокислыя соли, между

тѣмъ, какъ соли фосфорной кислоты, въ виду нелетучести послѣдней, оставались нетронутыми. Сгущенный растворъ этихъ солей помѣщался въ химическій стаканъ и осаждался растворомъ молибденовокислаго аммонія въ азотной кислотѣ, при чемъ смѣсь оставлялась въ покоѣ на 12 часовъ при 40°C . Послѣ того, какъ реакція на полноту осажденія фосфорной кислоты давала положительный результатъ, осадокъ отфильтровывался, надлежащимъ образомъ промывался ¹⁾, растворялся посредствомъ амміака на фильтрѣ; растворъ, почти нейтрализованный HCl , осаждался магnezіальной смѣсью. Полученный такимъ образомъ осадокъ двойной соли фосфорнокислаго аммонія и магнія прокаливаніемъ превращался въ пирофосфорнокислый аммоній, въ видѣ котораго взвѣшивался.

Такимъ образомъ съ одной стороны опредѣлялись совмѣстно Al_2O_3 , Fe_2O_3 и P_2O_5 , съ другой стороны отдѣльно P_2O_5 и Fe_2O_3 ; изъ разницы вычисленіемъ получалось количество Al_2O_3 .

Въ 50 к. ц. солянокислаго раствора грязи опредѣлялись сѣрная кислота, калий и натрій тѣми способами, которые указаны нами выше при описаніи опредѣленія отдѣльныхъ составныхъ частей воды.

Нерастворимая въ HCl послѣ прибавленія HNO_3 часть грязи высушивалась, прокаливалась для разрушенія оставшихся органическихъ веществъ и для удаленія всей воды, кипятилась нѣсколько разъ съ насыщеннымъ растворомъ соды для растворенія гидрата кремнезема, выдѣлившагося изъ силикатовъ или бывшаго въ такомъ видѣ въ почвѣ. Растворъ, подкисленный HCl , выпаривался досуха, остатокъ нагревался съ водою до растворенія солей, отдѣлялся фильтрованіемъ отъ SiO_2 , который, послѣ высушиванія и прокаливанія, взвѣшивался. Нерастворившаяся послѣ обработки растворомъ

1) R. Fresenius. Anleitung zur quant. chem. Analyse. S. 404.

ни грязи въ особой для этой цѣли приспособленной печкѣ. Сжиганіе производилось въ платиновой лодочкѣ, въ которую помещалось около 2 грм. вещества, предварительно обработанного слабой фосфорной кислотой, для удаленія H_2S и CO_2 , и затѣмъ высушеннаго при $100^\circ C$. Лодочка вкладывалась въ тугоплавкую стеклянную трубку, въ переднемъ концѣ которой, между двумя асбестовыми пробками, находился слой зернистой окиси мѣди, длиною въ 1 дециметръ. Задній конецъ трубки соединялся съ двумя склянками, изъ которыхъ одна содержала крѣпкую сѣрную кислоту, а другая — хлористый кальцій съ натристой известью; передній конецъ трубки соединялся съ приборомъ Гейслера, наполненнымъ сѣрной кислотой, и съ двумя трубками съ натристой известью и хлористымъ кальціемъ. Для пропусканія черезъ трубку сперва воздуха, а затѣмъ кислорода, служилъ насосъ. H_2SO_4 въ передней части трубки служила не только для собиранія воды и высушиванія CO_2 , но и для поглощенія окисловъ азота, образующихся при сжиганіи изъ азотистыхъ веществъ грязи. Найденное количество CO_2 , умноженное на 0,471, дастъ, хотя приблизительно, количество безводныхъ и безазотистыхъ гуминовыхъ веществъ.

Амміакъ. Для изслѣдованія амміака грязь обрабатывалась избыткомъ HCl при слабомъ нагреваніи, а послѣ удаленія CO_2 и H_2S и осажденія твердыхъ частицъ, извѣстная часть солянокислаго раствора перегонялась съ избыткомъ MgO , при чемъ пары впускались въ $\frac{1}{10}$ норм. сѣрную кислоту, избытокъ которой узнавался титрованіемъ $\frac{1}{10}$ норм. растворомъ ѣдкаго натра; индикаторомъ служилъ растворъ кошенили. Вода и реактивы, передъ употребленіемъ, такимъ же образомъ изслѣдовались на амміакъ.

Результаты изслѣдованій минеральной грязи. Примѣнивъ вышеописанные способы опредѣленія, мы получили слѣдующіе результаты.

I. Озеро Тагарское.

A. Физическія свойства.

Цвѣтъ мокрой грязи — черный, высушенной — сѣрый; запахъ — сѣроводорода, какъ говорятъ, слышенъ иногда, но мы не могли открыть его въ свободномъ видѣ химическимъ путемъ. Помимо этого запаха, всегда слышенъ запахъ разлагающихся органическихъ веществъ.

Удѣльный вѣсъ влажной грязи	2,0742
„ „ высушенной на воздухѣ грязи	2,6766.

Консистенція — сметанообразная, при чемъ наощупь довольно ясно замѣчается мелкій песокъ.

Реакція — щелочная.

B. Химическія свойства.

Въ 100 вѣсов. частяхъ влажной грязи найдено:

потеря въ вѣсъ при высушиваніи при $100^\circ C$	21,905
„ „ „ „ „ на воздухѣ	18,00
„ „ „ „ „ слабомъ прокаливаніи	27,020.
Итого воды, органическ. и летучихъ веществъ	27,020
минеральныхъ веществъ	72,980
Въ числѣ послѣднихъ найдено растворимыхъ	
въ водѣ	0,580
въ HCl	8,6931
нерастворимыхъ ни въ водѣ, ни въ HCl	63,7072

Изъ нерастворимой въ водѣ части грязи HCl извлекаетъ:

окиси желѣза Fe_2O_3	0,6420
фосфорнаго ангидрида P_2O_5	0,0795
глинозема Al_2O_3	0,9045
окиси кальція CaO	3,1440
„ магнезія MgO	0,5169
сѣрнаго ангидрида SO_3	0,1317

угольного ангидрида CO_2	2,8878
окиси калия K_2O	0,0505
„ натрия Na_2O	0,3362
	<u>8,6931.</u>

Въ нерастворимой въ HCl части найдено:

кремнезема (расщепленного) SiO_2	1,4665
„ въ видѣ песку	47,2719
глинозема Al_2O_3	7,2452
окиси желѣза Fe_2O_3	3,0049
„ кальція CaO	3,9175
сѣрнаго ангидрида SO_3	0,1530
окиси магнезія MgO	0,6482
	<u>63,7072</u>
марганца	слѣды.
Кромѣ того: общаго азота N	0,1738
амміака NH_3	0,0283
Гуминовыхъ веществъ безазотист.	
и безводныхъ (соотв. $\text{C} = 0,7919$)	1,3675
сѣроводорода H_2S (соотв. $\text{FeS} = 0,0162$)	0,0063
	<u>1,5759.</u>

II. Озеро Шунетъ (лѣтомъ 1899 года).

A. Физическія свойства.

Цвѣтъ, запахъ и консистенція одинаковы съ таковыми же грязи Тагарскаго озера, только здѣсь мелкаго песку наощупъ не замѣчается.

Удѣльный вѣсъ влажной грязи	1,5780
„ „ высушенной на воздухѣ грязи	2,3211.
Реакція — щелочная.	

B. Химическія свойства.

Въ 100 вѣс. частяхъ грязи найдено:

потеря въ вѣсѣ при высушиваніи при 100°C	39,0350
„ „ „ „ „ на воздухѣ	33,5
„ „ „ „ „ слабомъ прокаливаніи	56,565.

Итого воды, органич. и летучихъ веществъ	56,565
минеральныхъ веществъ	<u>43,435.</u>

Въ числѣ послѣднихъ найдено:

растворимыхъ въ водѣ	9,690
„ въ HCl	26,8520
нерастворимыхъ въ HCl	<u>6,8930</u>
	<u>43,4350.</u>

Изъ нерастворимой въ водѣ части грязи HCl извлекаетъ:

окиси желѣза Fe_2O_3	0,6360
фосфорнаго ангидрида P_2O_5	0,0121
глинозема Al_2O_3	0,1999
окиси кальція CaO	9,7800
„ магнезія MgO	2,0180
сѣрнаго ангидрида SO_3	1,7741
угольного ангидрида CO_2	11,0154
окиси калия K_2O	0,1533
„ натрия Na_2O	<u>1,2632</u>
	<u>26,8520.</u>

Въ нерастворимой въ HCl части найдено:

кремнезема SiO_2 (расщепленного)	0,1843
„ въ видѣ песку	5,5038
глинозема Al_2O_3	0,8720
окиси желѣза Fe_2O_3	0,1164
„ кальція CaO	0,1916
сѣрнаго ангидрида SO_3	<u>0,0249</u>
	<u>6,8930</u>
марганца	слѣды.
Кромѣ того: общаго азота N	0,1996
амміака NH_3	0,0472
Гуминовыхъ веществъ, безазотистыхъ и без-	
водныхъ (соотв. $\text{C} = 1,6203$)	2,8770
сѣроводорода H_2S (соот. $\text{FeS} = 0,7002$)	<u>0,2709</u>
	<u>3,947.</u>

Другихъ анализовъ грязи этихъ двухъ озеръ въ литературѣ не имѣется; въ добавленіе къ двумъ только что описаннымъ анализамъ, я могу сообщить еще объ одномъ анализѣ минеральной грязи озера Пунетъ, произведенномъ мною осенью 1898 года въ одной изъ аптекъ г. Красноярска. Грязь была взята изъ озера лѣтомъ того же года. Цвѣтъ, запахъ и консистенція ея были такіе же, какъ и въ образцѣ 1899 года, только удѣльный вѣсъ влажной грязи былъ выше, именно 1,6135 (вмѣсто 1,5780), такъ какъ грязь 1898 г. была значительно богаче солями. Въ виду того, что рапа того же года и того же времени мнѣ не была доставлена, я произвелъ анализы не только солянокислаго раствора и нерастворимаго въ HCl остатка, но и анализъ воднаго раствора этой грязи; растворъ этотъ былъ приготовленъ изъ 100 грм. влажной грязи кипяченіемъ въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ съ 1 литромъ воды. Послѣ осажденія твердыхъ частицъ, растворъ былъ профильтрованъ, осадокъ былъ промытъ, и фильтратъ прибавленіемъ воды былъ доведенъ до 1 литра. Методы изслѣдованія отдѣльныхъ составныхъ частей воднаго раствора грязи были примѣнены тѣ же самыя, какъ описанныя выше при изслѣдованіи воды.

III. Озеро Шунеть (лѣтомъ 1898 года).

А. Физическія свойства.

Цвѣтъ влажной грязи — черный, переходящій при высушиваніи грязи въ сѣрый.

Запахъ — разлагающихся органическихъ веществъ, но запаха H_2S не было слышно; такъ же не удалось его (H_2S) открыть въ свободномъ видѣ реактивами.

Консистенція — чрезвычайно мягкая наощупь, не замѣчается никакихъ твердыхъ веществъ, подобныхъ песку.

Удельный вѣсъ влажной грязи — 1,6135; уд. вѣсъ высушенной на воздухѣ грязи не былъ опредѣленъ.

В. Химическія свойства.

Въ 100 вѣсовыхъ частяхъ влажной грязи найдено:

потеря въ вѣсъ при высушиваніи при 180° С. 38,990

" " " " слабомъ прокаливаніи . 49,6755.

Итого воды, органических и летучих веществ 49,6755

минеральных веществ 50,3245.

Въ числѣ послѣднихъ найдено:

растворимыхъ въ водѣ 15,4009

„	въ HCl	17,6357
---	------------------	---------

нерастворимыхъ въ НСІ	15,1447
-------------------------------	---------

48,1813.

Составъ 15,4009 частей, растворимыхъ въ водѣ:

хлора Cl	5,1455
--------------------	--------

окси кальція CaO	0,8805
----------------------------	--------

кремнезема SiO_2	0,2266
---------------------------	--------

окси магнію MgO	1,6451
-----------------	--------

сърного ангидрида SO_2	4,5220
---------------------------------	--------

магнія Mg	0,4667
-----------	--------

калія К	0,1282
---------	--------

натрія Na		2,3863
-----------	-----------	--------

15,4009

брома слѣды.

Если найденныя кислоты и основанія выразить въ соляхъ, то получимъ:

сѣрнокислаго кальція CaSO_4	2,1390
--------------------------------------	--------

магнія $MgSO_4$	4,9086
-----------------	--------

хлористаго	"	MgCl ₂ . . .	1,8253
------------	---	-------------------------	--------

калія KCl	0,2443
---------------------	--------

натрія NaCl	6,0571
-----------------------	--------

кремнезема	SiO ₂	0,2266
------------	------------------	--------

15,4009.

Вышеприведенная комбинация солей получена на основании слѣдующихъ расчетовъ:

окси кальция CaO	0,8805
связываетъ SO_3	1,2585
$\text{CaSO}_4 =$	2,1390;

сѣрнаго ангидрида SO_3	4,5220
израсходовано	1,2585
остается SO_3	3,2635
связываетъ MgO	1,6451
$\text{MgSO}_4 =$	4,9086;

окси магнезія MgO	2,4185
израсходовано	1,6451
остается MgO	0,7734
соотвѣтствуетъ Mg	0,4667
связываетъ Cl	1,3586
$\text{MgCl}_2 =$	1,8253;

калія K	0,1282
связываетъ Cl	0,1161
$\text{KCl} =$	0,2443;

хлора Cl	5,1455
израсходовано	1,3586
"	+ 0,1161
остается Cl	3,6708
связываетъ Na	2,3863
$\text{NaCl} =$	6,0571.

Изъ нерастворимой въ водѣ части грязи HCl извлекаетъ:

окси желѣза Fe_2O_3	0,2729
глинозема Al_2O_3	0,0996
фосфорнаго ангидрида P_2O_5	0,1073
окси магнезія MgO	4,3383
" кальция CaO	4,5442
" калия K_2O	0,1306

окси натрія Na_2O	1,0787
угольнаго ангидрида CO_2	7,0641
	17,6357
сѣрководорода H_2S	0,1118
(соотв. $\text{FeS} =$	0,2892).

Въ нерастворимой въ HCl части найдено:

окси кальция CaO	4,1093
сѣрнаго ангидрида SO_3	5,8705
сѣры S	0,2341
окси желѣза Fe_2O_3	0,9114
кремнезема SiO_2 (разлож.)	1,1257
" въ видѣ песку	2,4979
глинозема Al_2O_3	0,3958
	15,1447;

кромѣ того, слѣды марганца и фосфорной кислоты.

Д. Водоросли.

Во всѣхъ изслѣдованныхъ нами образцахъ озерной воды, какъ видно изъ предыдущаго, ни разу не удалось открыть присутствіе іода, хотя во всѣхъ ихъ находился бромъ, отчасти въ видѣ слѣдовъ, отчасти даже въ количествахъ, позволяющихъ количественное его опредѣленіе. Поэтому, найдя въ озерѣ Горькомъ водоросли, покрывающія его на многихъ мѣстахъ въ видѣ затвердѣвшей массы и заключенныя въ высохшихъ соляхъ, я взялъ съ собой образцы ихъ для химическаго изслѣдованія на присутствіе въ нихъ іода. При этомъ я имѣлъ въ виду то давно извѣстное обстоятельство, что іодъ, имѣющійся въ морской водѣ въ количествахъ слишкомъ минимальныхъ для обнаруженія (если не сгущать десятки литровъ выпариваніемъ), накапливается въ водоросляхъ, которыя вслѣдствіе этого и служатъ исходнымъ матеріаломъ для добыванія его.

Изслѣдованіе производилось слѣдующимъ образомъ: засохшія массы водорослей, пропитанныя солями и представ-

ляющія пласты толщиной въ $\frac{1}{2}$ сантиметра, превращались въ порошокъ, который смачивался растворомъ ѣдкаго кали; смѣсь выпаривалась досуха при 100° С. Оставшаяся сухая масса совершенно сжигалась въ открытомъ желѣзномъ тиглѣ, а зола извлекалась на фильтрѣ горячей водою до исчезновения щелочной реакціи. Филтратъ выпаривался до небольшого остатка, нейтрализовался слабой сѣрной кислотой, послѣ чего къ нему прибавлялся 95° спиртъ въ половинномъ количествѣ, по объему, съ нѣсколькими каплями ѣдкаго кали. Послѣ отдѣленія жидкости отъ выдѣленнаго сѣрноокислаго калия посредствомъ проѣживанія и промыванія фильтра 30° спиртомъ, филтратъ выпаривался до $\frac{1}{3}$ объема, послѣ чего къ нему снова прибавлялся 95° спиртъ. Только что описанная операція повторялась нѣсколько разъ, наконецъ, спиртный филтратъ выпаривался досуха, остатокъ растворялся въ водѣ и служилъ для колориметрическаго опредѣленія іода. При этомъ найдено въ 100 грм. сухой массы водорослей изъ озера Горькаго — 0,015 грм. іода.

IV.

Сопоставленіе полученныхъ данныхъ.

Разсматривая критически приведенныя нами литературныя данныя относительно каждаго озера въ отдѣльности и сравнивая анализы другихъ изслѣдователей съ нашими собственными, мы слѣдующимъ образомъ можемъ сгруппировать всѣ свѣдѣнія объ этихъ озерахъ.

I. Тагарское озеро.

Озеро это болѣе всѣхъ остальныхъ подвергалось измѣненіямъ, какъ въ отношеніи состава солей, такъ и въ отно-

шеніи внѣшней формы, т. е., величины и глубины. Первые свѣдѣнія — Палласа, относящіяся къ концу 18-го столѣтія, указываютъ діаметръ береговъ озера въ 400 саж. (хотя разсолу въ немъ было значительно меньше) и свидѣтельствуютъ о содержаніи въ водѣ озера большого количества глауберовой соли (осенью 1772 г.); въ 1823 и 1831 гг. сообщается, что разсолъ его для выварки соли не употребляется „по нендобности и по горькому вкусу.“ Въ 1835 году Степановъ называетъ это озеро самосадочнымъ, хотя соль его не годна къ употребленію. Здѣсь мы имѣемъ дѣло, вѣроятно, съ такъ наз. черепомъ, образующимся на днѣ многихъ озеръ этой мѣстности и состоящимъ болѣею частью изъ горькихъ солей. Глубину озера Степановъ опредѣляетъ въ $1\frac{1}{2}$ арш., окружность въ 2 версты и 400 саж., по даннымъ же князя Кострова (въ срединѣ XIX столѣтія) глубина озера = 2 вершка, ширина 50 и длина — 100 саженьямъ. Первое химическое изслѣдованіе озера относится къ 1883 году. Оно произведено проф. К. Шмидтомъ надъ остаткомъ послѣ выпариванія воды (безъ точнаго указанія количества взятой минеральной воды). Этимъ изслѣдователемъ озеро отнесено къ глауберовымъ. Къ 1889 году относятся первыя указанія (Стемпневскій) на то, что озеро служило съ 1875 по 1878 г. также для солеваренія, прекращеннаго въ 1878—1885 гг. по причинѣ наводненія. Первые указанія о лечебномъ дѣйствіи Тагарскаго озера мы находимъ въ 1890 году у Педеко, писавшаго про благоустройство курорта, состоящаго въ дѣйствительности изъ нѣсколькихъ весьма жалкихъ хижинъ.

Въ 1899 году были опубликованы Богачевымъ и Тихомировымъ¹⁾ анализы разсола Тагарскаго озера, первымъ — два анализа съ указаніемъ около 5 % твердыхъ веществъ, вторымъ же — одинъ съ указаніемъ около $13\frac{1}{2}$ %

1) Разсолъ взятъ изъ озера въ промежутокъ между 1886 и 1898 г., но когда именно, у автора не сказано.

солей; между тѣмъ, взятая мною проба содержала лишь 2 % твердыхъ минеральныхъ частей.

Если принять во вниманіе тѣ сильныя колебанія, которыя происходятъ, какъ въ глубинѣ озера, — отъ двухъ вершковъ до двухъ и болѣе аршинъ, — такъ и въ процентномъ содержаніи солей его, отъ количествъ, насыщающихъ воду и обуславливающихъ осажденіе соли, до двухъ процентовъ въ настоящее время, — то намъ станетъ вполне понятною разница въ результатахъ анализовъ различныхъ изслѣдователей: по анализу проф. Шмидта (въ 1883 году, послѣ наводненія) имѣется лишь 6,648 проц. хлористаго натрія и 10,559 проц. хлористаго магнія, по анализу Тихомірова (вѣроятно, 1886 или 1887 г.) найдено 74,249 проц. хлористаго натрія и 14,928 проц. хлористаго магнія; оказалось громадное обогащеніе озера хлористыми солями, которыя однако скоро опять уменьшаются — до 47 % NaCl , при чемъ MgCl , отсутствуетъ, какъ видно изъ послѣднихъ анализовъ, произведенныхъ Богачевымъ и нами; по мѣрѣ уменьшенія хлористыхъ солей, прибываютъ сѣрнокислыя соли.

Въ настоящее время Тагарское озеро, содержащее едва одинъ процентъ поваренной соли, потеряло всякое значеніе для солеваренія и важно исключительно въ лѣчебно-медицинскомъ отношеніи, благодаря своей минеральной грязи. Къ сожалѣнію, и грязь бѣдна солями и органическими веществами, и главное дѣйствіе ея принадлежитъ твердымъ минеральнымъ составнымъ частямъ (между которыми первую роль играетъ мелкій песокъ и другіе кремнистые минералы, отчасти также фосфорнокислый и углекислый кальцій и углекислый магній), механически дѣйствующимъ раздражающимъ образомъ. Еще надо упомянуть о сѣрководородѣ, по временамъ свободномъ, но обыкновенно связанномъ съ желѣзомъ въ видѣ весьма мягкой и вязкой массы.

II. Алтайское озеро.

Этому озеру посвящена небогатая литература. Впервые Стемпневскій сообщаетъ, что въ 1885 г. изъ Алтайскаго озера было добыто 2550 пудовъ соли, весьма плохого качества, что съ 1874 по 1882 годъ выломано на Алтайскомъ озерѣ гуджира (онъ же и бузунъ, почти чистая глауберова соль) 34 тысячи пудовъ; о добываніи соли на Алтайскомъ озерѣ сообщаетъ Боголюбскій (въ 1895 году). Въ статьѣ Тихомірова (въ 1899 году) находится анализъ озера; къ сожалѣнію, не указано, когда онъ производился, — въ какомъ году и въ какое время года. Сравнивая результаты этого анализа съ нашимъ, мы замѣчаемъ существенную разницу между ними, относящуюся къ процентному содержанію солей — съ одной стороны, съ другой — къ распредѣленію этихъ солей: нами найдено почти 11 проц. всѣхъ минеральныхъ веществъ, анализъ Тихомірова показываетъ ихъ около 25 %. Что касается отдѣльныхъ солей, то Тихоміровымъ найдено хлористаго натрія и углекислаго натрія значительно меньше, чѣмъ нами; можно думать, что разсолъ изъ озера взять осенью или зимой, когда вслѣдствіе морозовъ часть сѣрнокислыхъ солей выдѣляется и осаждается или выбрасывается волнами. Большое содержаніе соды въ озерѣ, хотя бы и зимою, я объяснить не рѣшаюсь.

Итакъ, для солеваренія Алтайское озеро большого значенія никогда не имѣло и не имѣетъ. Хотя оно и до сихъ поръ находится въ арендѣ, но солевареніе играетъ здѣсь только второстепенную роль; большее значеніе имѣетъ сѣрнокислый натрій, идущій на стеклянные заводы. При этомъ должно замѣтить, что сѣрнокислый натрій изъ озера безъ всякой обработки не только свободенъ отъ механическихъ загрязненій, но и чистъ даже химически; послѣднее относится собственно къ бузуну, покрывающему берега. Лѣтомъ, вслѣдствіе слабости разсола и большого содержанія въ немъ горькихъ солей, солеварня при озерѣ не работаетъ.

III. Озеро Кизиль-Куль.

Озеро это только послѣ дождей покрывается тонкимъ слоемъ воды, въ остальное же время бываетъ совершенно сухимъ. Поэтому понятно, что само озеро не имѣетъ никакого значенія, и разсолъ, покрывавшій озеро во время нашего посѣщенія на нѣсколько вершковъ, нами изслѣдованъ не былъ. Тѣмъ не менѣе и здѣсь вырабатывается соль; необходимый для этого разсолъ добывается изъ буровыхъ скважинъ, каковыхъ при солеварнѣ имѣется пять.

Что касается литературныхъ данныхъ, то мы можемъ указать лишь на одинъ анализъ (Богачева), приведенный нами выше. При сравненіи этого анализа съ нашимъ, мы прежде всего обращаемъ вниманіе на совершенно одинаковое въ обоихъ анализахъ процентное содержаніе хлористаго натрія; другія составныя части не совсѣмъ сходятся: у Богачева, напр., найдено 12,38% сѣрноокислаго магнія, при полномъ отсутствіи сѣрноокислаго натрія, — въ нашемъ же анализѣ получено 9,2174% сѣрноокислаго магнія и кромѣ того, почти 8% сѣрноокислаго натрія, — такимъ образомъ, нами найдено больше сѣрнокислыхъ солей.

Если принять во вниманіе то обстоятельство, что изслѣдованный Богачевымъ разсолъ взятъ въ маѣ м., а изслѣдованный нами — въ іюнѣ м., то легко объяснить разницу въ составѣ сѣрнокислыхъ солей: разсолъ въ маѣ, вѣроятно, былъ холоднѣе, чѣмъ въ іюнѣ (хотя и тогда t° разсола была только $+3^{\circ}$ R.), а чѣмъ ниже температура, тѣмъ меньше растворимость сѣрнокислыхъ щелочей. Озеро Кизиль-Куль указываетъ на весьма любопытной фактъ существованія въ разсмотренныхъ нами степяхъ подземныхъ ключей, богатыхъ солями, и въ особенности хлористымъ натріемъ; подобныхъ надземныхъ ключей мнѣ видѣть нигдѣ тамъ не приходилось, да о нихъ нигдѣ и не сообщалось.

Въ промышленномъ отношеніи расположенный при озерѣ заводъ (называемый также Василе-Ивановскимъ) стоитъ въ

болѣе выгодныхъ условіяхъ, чѣмъ пользующіеся при солевареніи разсоломъ изъ озеръ, такъ какъ вторые могутъ работать лишь зимою, когда горькія соли выдѣляются морозомъ, между тѣмъ какъ первый работаетъ круглый годъ.

IV. Бейское озеро.

Въ первыхъ печатныхъ сообщеніяхъ о Бейскомъ озерѣ указывается на непригодность его для выварки соли „по ненадобности и по горькому вкусу его соли“ (Чайковскій, 1828 г.) и потому, что разсолъ глубиною околдвухъ аршинъ, весьма слабой крѣпости (Степановъ, 1835 г., Пылковъ, 1844 г.). Однако изъ произведенныхъ проф. К. Шмидтомъ въ 1883 году анализовъ разсола и самосадочной соли мы видимъ, что разсолъ въ то время былъ настолько сгущенъ, что могла произойти садка соли. Если приведенные въ таблицѣ III анализы¹⁾, относящіеся къ лѣту 1894 г., 1895 и 1899 года, сравнить между собой, то мы замѣтимъ поразительный фактъ, — именно, процентное содержаніе главныхъ составныхъ частей, какъ NaCl, Na_2SO_4 и MgSO_4 , въ сухомъ остаткѣ почти совершенно одинаково во всѣхъ анализахъ. Остальные изъ вышеприведенныхъ анализовъ не могутъ быть сравниваемы съ послѣдними, какъ произведенные надъ инымъ матеріаломъ: проф. К. Шмидтъ изслѣдовалъ самосадочную соль (поваренную) и оставшійся разсолъ, Томская же золотосплавочная лабораторія въ декабрѣ 1894 года — зимній разсолъ, въ которомъ природа сама уже предварительно совершила очистку, выдѣливъ горькія соли на холоду.

Принимая во вниманіе все вышеизложенное, мы должны признать, что разсолъ Бейскаго озера подвергается сильнымъ колебаніямъ въ его концентрации, хотя процентное содержаніе отдѣльныхъ солей въ разсолѣ почти не измѣняется. Сильный стокъ дождевой воды, обусловленный низкимъ положеніемъ озера, а также впаденіе въ него прѣснаго ключа являются

1) См. стр. 194 и 195. Авт.

причиной не всегда успешнаго хода солеваренія; бываютъ годы, когда вслѣдствіе слабости разсола выварка соли совершенно не производится. Такимъ образомъ и это озеро имѣетъ для промышленности лишь небольшое значеніе.

V. Озеро Доможаково.

Относительно этого озера пока не имѣется никакихъ литературныхъ данныхъ. Одно разсмотрѣніе результатовъ нашихъ анализовъ говоритъ о томъ, что мы здѣсь имѣемъ дѣло съ характернымъ горькимъ озеромъ: на 136 частей горькихъ солей въ разсолѣ приходится лишь 9 $\frac{1}{2}$, ч. другихъ солей, среди которыхъ хлористый натрій занимаетъ первое мѣсто (почти 9 частей); поэтому поваренная соль здѣсь никогда не добывалась. Еще болѣйшій процентъ горькихъ солей находится въ бузунѣ со дна озера, гдѣ онъ занимаетъ мощный пластъ толщиною не меньше аршина; въ немъ содержится одного сѣрнокислаго натрія 97 % и около одного процента сѣрнокислаго кальція, при полномъ отсутствіи сѣрнокислаго магнія. Если бы это озеро не лежало въ глухой степи, лишенной ведущихъ къ нему надлежащихъ путей сообщенія, и вдали отъ населенныхъ мѣстъ, то компактная на днѣ почти чистая глауберова соль дала бы богатый матеріалъ для содоваго производства.

VI. Озеро Шунеть.

Прошло не болѣе десяти лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ появились первыя литературныя свѣдѣнія объ этомъ небольшомъ озерѣ, окруженномъ горами и лежащемъ вблизи извѣстнаго Сибирскаго курорта Ши́ра. Посѣтителѣ названнаго курорта первые и обратили на него свое вниманіе, стали въ немъ купаться и получали во многихъ случаяхъ облегченіе отъ своихъ тѣлесныхъ страданій. Появившаяся за послѣднее время садка соли, сдѣлавшая необходимыми контрольные анализы поваренной соли, добыча которой была сдана въ

аренду, благопріятствовала появленію въ печати анализовъ оз. Шунеть; при этомъ изслѣдованію былъ подвергнутъ и бузунъ со дна озера. Поэтому разсматриваемые анализы необходимо раздѣлить на анализы 1) разсола, 2) бузуна со дна, 3) поваренной соли и 4) минеральной грязи. Изъ опубликованныхъ анализовъ разсола намъ извѣстенъ одинъ, принадлежащій проф. Леману и произведенный въ 1891 году надъ сухимъ остаткомъ послѣ выпариванія разсола; нами сдѣланы два изслѣдованія самого разсола, взятаго изъ озера лѣтомъ 1897 и 1899 года. Сравнивая результаты этихъ анализовъ, мы находимъ рѣзкую разницу между ними: по Леману, содержится едва 1,5 % хлористаго натрія и около 92 % сѣрнокислыхъ солей натрія и магнія, нами же найдено почти двойное количество хлористыхъ солей сравнительно съ сѣрнокислыми. Небольшая разница въ нашихъ двухъ анализахъ обусловлена неодинаковой концентраціей разсола: въ 1897 году солей 25,3 %, въ 1899 году лишь 15,5 %. Вышеуказанное существенное отличіе анализа проф. Лемана отъ нашихъ мы можемъ объяснить только тѣмъ, что разсолъ изъ озера былъ имъ взятъ непосредственно послѣ садки поваренной соли, хотя не имѣемъ никакихъ данныхъ въ подтвержденіе того, что садка соли въ томъ году дѣйствительно происходила. Съ другой стороны, имѣя въ виду то обстоятельство, что самому автору не было извѣстно, когда и при какихъ обстоятельствахъ разсолъ взятъ изъ озера, далѣе, что не было извѣстно, кто разсолъ выпаривалъ, — можно также допустить, что здѣсь произошла ошибка: или разсолъ взятъ изъ другого озера и выпаренъ, или же мы просто имѣемъ дѣло съ бузуномъ какого-либо озера; съ бузуномъ поразительно сходны составъ и наружный видъ изслѣдованной соли.

Сравнивая единственный анализъ бузуна со дна (т. н. черепа), произведенный Богачевымъ въ 1895 году въ іюлѣ м., съ нашимъ анализомъ черепа, взятаго изъ озера лѣтомъ 1898 года, мы видимъ большое сходство между ними, въ осо-

бенности относительно главныхъ составныхъ частей его — сѣрноокислаго натра и магнезіи и хлористаго натрія, при чемъ въ обоихъ случаяхъ первые сильно преобладаютъ надъ послѣднимъ. Сообщенные тѣмъ же Богачевымъ два анализа самосадочной соли озера Шунеть показали содержаніе NaCl въ первомъ образцѣ 98% (добытъ въ 1895 году), во второмъ — 99% (добытъ въ 1896 году).

Объ изслѣдованіи грязи озера Шунеть въ литературѣ пока не имѣется указаній. О происхожденіи сѣроводорода въ грязи этого озера Савенковъ высказалъ мнѣніе, что „милліарды маленькихъ рачковъ, при гніеніи, увеличиваютъ количество сѣроводорода, получающагося отъ возстановляющаго дѣйствія органическихъ веществъ на сѣрнокислыя соли, особенно на гипсъ, присутствіе котораго въ водѣ озера Шунеть болѣе, чѣмъ вѣроятно.“ Предположеніе это вполне подтверждается нашими анализами грязи озера, въ которой гипсъ находится въ значительномъ количествѣ. Изъ другихъ составныхъ частей грязи можно упомянуть о сѣрнистомъ желѣзѣ (свободный сѣроводородъ отсутствуетъ), углекисломъ кальціи и магніи, фосфорнокисломъ кальціи, небольшихъ количествахъ глинозема и мелкаго песку, а въ рапѣ — преимущественно о сѣрнокислыхъ и хлористыхъ соляхъ натрія, магнія и калия и слѣдахъ бромистаго магнія. Мягкая, сметанообразная консистенція грязи зависитъ отъ гуминовыхъ веществъ и сѣрнистаго желѣза, при одновременномъ нахожденіи мельчайшихъ кристалликовъ гипса и весьма мелкаго песка.

Принявъ во вниманіе съ одной стороны незначительное количество добываемой изъ озера самосадочной поваренной соли¹⁾, садка которой происходитъ далеко не каждый годъ и находится въ сильной зависимости отъ атмосферныхъ осадковъ и отъ продолжительности знойнаго времени, съ другой

1) Въ 1896 году вывoločено 9206 пудовъ. Авт.

стороны весьма хорошіе результаты купанія въ озерѣ и особенно въ минеральной грязи его, — мы вполне поймемъ старанія Общества врачей Енисейск. губ. предназначить этотъ цѣлебный источникъ исключительно для лѣчебныхъ цѣлей и прекратить добычу изъ него поваренной соли. При небольшомъ размѣрѣ озера, добыча изъ него поваренной соли можетъ въ скоромъ времени повлечь за собою обѣдненіе ея озера, что будетъ имѣть послѣдствіемъ сильное измѣненіе состава рапы и вмѣстѣ съ тѣмъ ослабитъ цѣлебное дѣйствіе всего озера.

VII. Озеро Бильѣ.

Объ этомъ озерѣ, занимающемъ самое большое пространство среди нами изслѣдованныхъ, именно около 60 верстъ въ окружности, не существуетъ почти никакихъ литературныхъ свѣдѣній. Единственное измѣреніе удѣльнаго вѣса (1,009) воды озера, произведенное Савенковымъ въ 1890 году, дало результатъ, весьма сходный съ результатомъ нашего измѣренія — 1,0079. Изъ этого мы видимъ, что количество твердыхъ составныхъ частей воды озера подвержено лишь незначительнымъ колебаніямъ, что и можно было ожидать, принявъ во вниманіе величину его, при которой дождь и притокъ прѣсной воды изъ рѣки Тайомъ не могутъ такъ вліять, какъ въ маленькихъ озерахъ тѣхъ же степей. Степень солёности воды незначительна, равна едва 1%, т.-е., въ 2—3 раза меньше, чѣмъ солёность въ моряхъ и океанахъ; но въ то время, какъ въ водѣ озера Бильѣ сильно преобладаютъ горькія соли, въ моряхъ и океанахъ первенствуетъ поваренная соль. Несмотря на очень горькій вкусъ воды, въ озерѣ водится много рыбы, которая служитъ пищею окрестнымъ инородцамъ — татарамъ. Для медицинскихъ цѣлей вода озера Бильѣ не примѣняется, хотя и она можетъ приносить пользу. При тѣхъ болѣзняхъ, которыя излѣчиваются на ближайшемъ озерѣ Шира, съ тою лишь разницею

что ей слѣдуетъ принимать вдвое больше для полученія тѣхъ же или сходныхъ эффектовъ, такъ какъ она вдвое слабѣе, при почти одинаковомъ процентномъ составѣ отдѣльныхъ минеральныхъ составныхъ частей.

Сообщенный проф. К. Шмидтомъ анализъ „выпаренной соли Кизи-куль = Билью = Большое слабительное озеро при рѣкѣ Бѣлый Юссъ“, какъ по указанному географическому положенію, такъ и по составу найденныхъ солей (почти чистая глауберова соль), долженъ быть отнесенъ къ озеру Кичи-Куль, находящемуся близъ озера Билье, на восточномъ берегу Бѣлаго Юсса, въ трехъ верстахъ отъ послѣдняго. Ошибка эта легко могла произойти, такъ какъ на картѣ Гревингга названія обоихъ озеръ стоятъ другъ возлѣ друга, и проф. К. Шмидтъ отнесъ оба названія къ одному озеру; къ тому же озеро Кичи-Куль очень мало и на картѣ едва замѣтно.

VIII. Озеро Горькое.

Найти какія-нибудь печатныя свѣдѣнія объ этомъ озерѣ намъ не удалось. По своему наружному виду и еще больше по составу своихъ солей, оно напоминаетъ Бейское озеро; только въ немъ соленость не такъ велика и глубина меньше; кромѣ этого, надъ рапою замѣчается слой засохшихъ водорослей, наполненный массою червяковъ и насѣкомыхъ. Подъ рапою находится черный, пахучій, сметанообразной консистенціи илъ, сходный съ иломъ озеръ Тагарскаго, Алтайскаго, Бейскаго, Доможакова и Шунетъ. Для выварки соли озеро значенія не имѣетъ, потому что общее количество солей равно лишь 6%, между ними сильно преобладаютъ горькія соли. Для лѣчебныхъ цѣлей озеро можетъ быть нѣсколько пригодно такъ же, какъ озеро Шунетъ, хотя въ послѣднемъ рапа значительно богаче солями. Слой водорослей надъ рапою изслѣдовался нами на присутствіе іода, — результатъ получился положительный; матеріаломъ для полученія изъ

нихъ іода онѣ служить, конечно, не могутъ. Присутствіе іода въ водоросляхъ даетъ намъ право предполагать присутствіе іода также въ водѣ, въ которой онѣ росли, но прямымъ изслѣдованіемъ всѣхъ нами посѣщенныхъ озеръ открыть іодъ въ водѣ не удалось, — вѣроятно, вслѣдствіе небольшихъ количествъ, хотя его спутникъ — бромъ найденъ былъ во всѣхъ изслѣдованныхъ водахъ. Съ другой стороны, чтобы не быть сильно увѣреннымъ въ присутствіи іода въ водахъ озеръ Минусинскихъ степей, нельзя забывать того обстоятельства, что іодъ находится въ видѣ слѣдовъ также у многихъ земныхъ растений, въ которыя онъ перешелъ изъ земли.

IX. Озеро Джемакъ-Куль.

Здѣсь мы имѣемъ дѣло съ высохшимъ озеромъ, которое можетъ служить типомъ цѣлаго ряда озеръ въ тѣхъ же степяхъ. Относительно его существуетъ въ литературѣ только одно указаніе, именно „изслѣдованіе поваренной соли изъ источника Джемакъ-Куль, Минусинскаго округа“ химика Шамарина. Въ виду того, что солевареннаго завода при этомъ озерѣ не существуетъ, я держусь того предположенія, что Шамаринымъ была изслѣдована выпаренная досуха рапа, о чемъ свидѣтельствуетъ и большое содержаніе горькихъ солей (56%). Мои изслѣдованія произведены надъ сухимъ вывѣтрившимся бузуномъ, покрывающимъ озеро, и надъ слоемъ кристаллическаго бузуна, лежащаго подъ глиною. Въ обоихъ случаяхъ мы имѣли подъ руками почти чистый сѣрноокислый натрій; рапы во время взятія образцовъ не было вовсе. Верхній слой бузуна незначительной толщины и потому не имѣетъ никакого значенія; наоборотъ, нижнихъ слоевъ подъ глиной имѣется цѣлый рядъ, съ промежуточными пластами глины, и эти слои представляютъ мощные залежи почти чистаго сѣрноокислаго натрія, добыча котораго весьма легка.

Мы рассмотрѣли только озера, которыя мы лично посѣ-

тили и которые были нами изслѣдованы. Но въ литературѣ существуютъ аналитическія данныя еще о нѣкоторыхъ другихъ озерахъ Минусинскихъ степей, а именно объ озерѣ Шира, Кичи-Куль, Джабалакъ-Куль и Минусинскомъ степномъ озерѣ. Дать какія-либо заключенія объ этихъ озерахъ представляется невозможнымъ, такъ какъ мы не только не изслѣдовали ихъ, но совсѣмъ, за исключеніемъ озера Шира, даже и не видѣли; имѣющийся же литературный матеріалъ настолько скуденъ и отчасти противорѣчивъ, что существуетъ необходимость и потребность дальнѣйшихъ изслѣдованій и болѣе подробныхъ описаній названныхъ озеръ. Единственное, что можно съ увѣренностью сказать о нихъ, это то, что всѣ они принадлежатъ къ тому же типу горько-соленыхъ озеръ, къ которому должны быть отнесены нами изслѣдованные и описанные.

V.

Общіе выводы и заключенія.

Подводя итогъ изслѣдованіямъ нашимъ собственнымъ и другихъ авторовъ, мы можемъ вкратцѣ ихъ резюмировать въ слѣдующихъ положеніяхъ.

1. Всѣ озера, находящіяся въ степяхъ Соляной, Абаканской, Сагайской и Качинской Минусинскаго округа Енисейской губерніи, распадаются на прѣсныя¹⁾ и богатые солями.

2. Послѣднія принадлежатъ къ типу горькихъ и горько-соленыхъ озеръ.

3. Степень солёности этихъ озеръ весьма различна. При этомъ можно различать: а) большія озера, содержащія отъ 1—3‰ минеральныхъ составныхъ частей, б) маленькія,

1) Изслѣдованіе прѣсныхъ озеръ не входило въ нашу задачу. Авт.

содержащія отъ 5—30‰ и болѣе таковыхъ и с) высохшія или едва покрытыя разсолемъ озера.

4. Степень солёности одного и того же озера не всегда одинакова и находится въ сильной зависимости отъ атмосферныхъ осадковъ и отъ притока прѣсной воды изъ ручейковъ и рѣчекъ.

5. Лѣтомъ, вслѣдствіе продолжительнаго зноя, происходитъ въ нѣкоторыхъ небольшихъ и сильно сгущенныхъ озерахъ садка поваренной соли.

6. Зимой, при сильномъ охлажденіи разсола, выдѣляется изъ озеръ средней концентраціи (5—20‰ солей) глауберова соль, которая отчасти выбрасывается волнами на берегъ, но болѣею частью осаждается на дно, покрывая его болѣе или менѣе толстымъ и крѣпкимъ слоемъ такъ называемаго бузуна, или черепа, который лѣтомъ отчасти вновь растворяется. Поэтому составъ разсола этихъ озеръ зимой и лѣтомъ не тождественъ: зимою преобладаютъ хлористыя, лѣтомъ сѣрнокислыя соли.

7. Подъ бузуномъ всѣхъ этихъ озеръ находится черная, пахучая и мягкая наощупь минеральная грязь. Если въ озерѣ находится нѣсколько слоевъ бузунъ, — какъ это бываетъ обыкновенно и особенно хорошо замѣтно у высохшихъ озеръ, — то между ними имѣется слой глины или минеральной грязи.

8. Бузунъ представляетъ собою почти химически чистый сѣрнокислый натръ; только въ озерахъ съ большимъ содержаніемъ магнезіальныхъ солей и сѣрнокислая магнезія находится въ бузунѣ въ значительномъ количествѣ.

9. Черный цвѣтъ влажной грязи зависитъ отъ сѣрнистаго желѣза, запахъ ея — отъ гнѣущихъ органическихъ веществъ и освобождающагося по временамъ сѣроводорода, а консистенція — отъ первыхъ двухъ факторовъ, къ которымъ присоединяется вліяніе содержанія весьма мелкаго песка, кристалликовъ гипса, немного глины и солей — углекислаго и фосфорнокислой извести и углекислой магнезіи.

10. Образование сѣрнистаго желѣза зависитъ отъ гніенія въ присутствіи гипса громаднаго количества погибающихъ въ озерахъ въ концѣ лѣта мелкихъ ракообразныхъ. При этомъ необходимый кислородъ, находящійся въ водѣ лишь въ недостаточномъ количествѣ, отнимается ими отъ гипса, превращающагося въ сѣрнистый кальцій. Этотъ послѣдній, въ присутствіи воды, вступаетъ сейчасъ же въ реакцію съ соединеніями желѣза, образуя сѣрнистое желѣзо. Другою причиною образования сѣрнистаго желѣза, а также свободнаго сѣроводорода, служитъ само гніеніе органическихъ веществъ, такъ какъ образующійся при этомъ сѣроводородъ отчасти связывается желѣзомъ, отчасти улетучивается.

11. Практическое значеніе разсмотрѣнныхъ озеръ двоякое: а) медицинское и б) промышленное.

12. Озера, имѣющія значеніе для медицины, необходимо раздѣлить на двѣ группы: 1) большія, вода которыхъ можетъ употребляться какъ для питья, такъ и для купанья; сюда принадлежитъ извѣстное цѣлебное озеро Ши́ра, хотя съ тѣмъ же правомъ можно сюда причислить озеро Бильё, вода котораго весьма сходна съ водою оз. Ши́ра, только вдвое слабѣе; 2) маленькія, которыя служатъ только для купанья; въ нихъ главную роль играетъ упомянутая минеральная грязь и покрывающая ее сильно концентрированная рапа; какъ грязь, такъ и рапа, при незначительной глубинѣ этихъ озеръ, сильно нагрѣваются лучами солнца. Такимъ образомъ, мы здѣсь имѣемъ дѣло съ естественными нагрѣтыми грязевыми ваннами, дѣйствіе которыхъ сводится къ четыремъ факторамъ: къ раздражающему кожу дѣйствию мелкаго песка, гипса и другихъ солей въ твердомъ видѣ, къ дѣйствию на кожу концентрированнаго раствора сѣрнокислыхъ, хлористыхъ и отчасти бромистыхъ солей, къ дѣйствию отдаваемой грязью и рапою теплоты и, наконецъ, къ дѣйствию сѣроводороднаго газа. Пока употребляются для этой цѣли озера Шунетъ и Тагарское, но, вѣроятно, съ тою же пользою могутъ для той

же цѣли служить всѣ озера этого типа, имѣющія черную минеральную грязь. Изъ нами изслѣдованныхъ озеръ можно сюда причислить озера Алтайское, Бейское и Горькое.

13. Озера, имѣющія значеніе для промышленности, можно раздѣлить также на двѣ группы: 1) такія, изъ которыхъ можно добывать соли — поваренную, глауберовую и др. и 2) такія, изъ которыхъ можно добывать только глауберовую соль. Къ первой группѣ принадлежатъ небольшія и мелкія озера съ разсолонъ средней концентраціи (10—20 и болѣе процентовъ солей), изъ которыхъ зимою выдѣляется бузунъ, т. е., глауберова соль; остающійся же разсолъ можетъ служить для выварки поваренной соли. Добывается такимъ образомъ поваренная и отчасти глауберова соль изъ озеръ Алтайскаго и Бейскаго. При вываркѣ поваренной соли остается сравнительно богатый бромистыми солями маточный разсолъ, который могъ бы служить для приготовленія брома и его солей. Также находится въ нѣкоторыхъ озерахъ этого типа довольно значительное количество магнезійныхъ солей, которыя также удалось бы получить въ чистомъ видѣ путемъ двойного разложенія или дробной кристаллизаціи. Если лѣтомъ концентрація разсола доходитъ до извѣстнаго предѣла, начинается садка поваренной соли. Это замѣчается въ озерахъ Шунетъ, Степномъ и Бейскомъ, хотя далеко не каждый годъ, а проходятъ нерѣдко десятки лѣтъ до новой садки.

Ко второй группѣ принадлежатъ всѣ высохшія озера. Изъ нихъ можно добывать весьма чистую глауберовую соль (т. наз. бузунъ), которая покрываетъ все озеро нѣсколькими пластами, каждый толщиной въ $\frac{1}{2}$ аршина и больше, между которыми расположены промежуточные слои глины.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что въ этихъ степяхъ находятся громадные количества глауберовой соли, добываніемъ которой пока никто не занимается (за исключеніемъ арендатора Алтайскаго озера, который добываетъ ее въ небольшомъ количествѣ изъ своего озера и сбываетъ на ближай-

шій стеклотлательный заводъ). Не представляющее само по себѣ никакихъ трудностей добываніе этой соли въ глухой степи съ очень плохими дорогами, едва-ли можетъ быть выгоднымъ, такъ какъ Сибирь лишь немного ея расходуетъ, а отправка въ дальніе края уменьшаетъ дешевизну, а значитъ и сбытъ товара. Для употребленія ея на мѣстѣ при фабрикаціи соды также, врядъ-ли, найдутся, по выше приведеннымъ причинамъ, охотники, хотя известняки въ этой мѣстности въ изобиліи.

14. Другимъ исходнымъ матеріаломъ для выварки соли служить разсолъ изъ буровыхъ скважинъ. Такихъ заводовъ мы извѣстно два — Абаканскій и Василе-Ивановскій при озерѣ Кизиль-Куль. Этотъ любопытный фактъ указываетъ на наличность въ этихъ степяхъ подземныхъ ключей, богатыхъ солями, и даетъ намъ нѣкоторое право предполагать въ этихъ мѣстахъ существованіе подземныхъ залежей поваренной и другихъ солей, — залежей, образовавшихся на мѣстѣ бывшаго здѣсь моря. На бывшее здѣсь море ясно указываютъ известняки, покрывающіе весь округъ.

15. Въ вопросѣ о происхожденіи этой системы озеръ допустимы двѣ возможности: или они образовались вслѣдствіе выходения на поверхность подземныхъ богатыхъ солями ключей, или соли въ нихъ накопились постепенно, благодаря замкнутости озеръ и болѣе сильному испаренію, чѣмъ накопленіе воды изъ рѣчекъ и отъ дождей.

ТАБЛИЦЫ.

Сопоставленіе всѣхъ анализовъ водъ горько-соленыхъ озеръ степей

Таблица I.

Въ 1000 грм.

Элементарныя составныя части.	Озеро Вилье	Озеро Шира	Озеро Тагарское		Озеро Горькое
	17-го іюня 1899 г. Людвигъ.	Лѣтомъ 1889 г. Леманъ.	Между г.г. 1886—1898 Тихомі-ровъ.	9-го іюня 1899 г. Людвигъ.	19-го іюня 1899 г. Людвигъ.
Удѣльный вѣсъ при 15° С.	1,0079	1,0135 притѣсн.	ок. 1,14	1,0170	1,0504
сухой остатокъ при 180° С.	8,8122	17,5	134,52	20,9823	59,1065
окиси кальція CaO	0,0533	—	4,64	0,0792	0,1255
угольного ангидрида (связан.) CO ₂	0,4009	0,26	—	0,2380	0,6605
окиси магнезія MgO	1,0674	—	8,42	1,4396	1,2607
— калия K ₂ O	0,0919	—	—	0,2549	0,9827
сѣрнаго ангидрида SO ₂	3,8310	7,65	6,57	6,1041	21,5603
азотнаго " N ₂ O	0,0824	слѣды	—	—	—
хлора Cl	0,8709	2,3	75,59	6,1810	11,8115
натрія Na	0,5661	3,53	39,28	4,0182	7,6786
окиси натрія Na ₂ O	1,8228	—	—	2,5999	14,9301
кремнезема SiO ₂	0,0032	0,023	—	0,0073	0,0180
глинозема Al ₂ O ₃	0,0026	слѣды	—	0,0184	0,0040
железа Fe	слѣды	0,0006	—	—	—
брома Br	слѣды	слѣды	—	—	—
литія Li	слѣды	—	—	0,00096	слѣды
амміака NH ₃	слѣды	—	—	—	—
магнезія Mg	слѣды	слѣды	—	слѣды	слѣды
кальція Ca	—	1,18	—	0,00014	—
калія K	—	0,12	—	—	—
стронція Sr	—	0,035	—	—	—
фосфорнаго ангидрида P ₂ O ₅	—	слѣды	—	—	—
азотистаго " N ₂ O ₃	—	—	—	—	слѣды
окиси желѣза Fe ₂ O ₃	—	—	—	—	—
заиси " FeO	—	—	—	—	—
органическихъ веществъ	—	—	—	—	—
Сумма тверд. составныхъ частей	8,7925	15,0986	134,50	20,9417	59,0319
Угольного ангидрида CO ₂ (полусвяз.)	0,1785	—	—	0,1990	0,5092

Соляной, Абаканской, Сагайской и Качинской, Минусинск. окр. Енисейск. губ.

В о д а.

содержится:

Озеро Алтайское		Озеро Бейское	Озеро Минусинское	Озеро Доможаково	Озеро Шунеть		Буровая скважина при озерѣ Кизиль-Куль	Буровая скважина Абаканскаго завода
Между г.г. 1886—1898 Тихомі-ровъ.	10-го іюня 1899 г. Людвигъ.	11-го іюня 1899 г. Людвигъ.	Между г.г. 1886—1898 Тихомі-ровъ.	12-го іюня 1899 г. Людвигъ.	Лѣтомъ 1897 г. Людвигъ.	16-го іюня 1899 г. Людвигъ.	10-го іюня 1899 г. Людвигъ.	Между г.г. 1886—1898 Тихомі-ровъ.
ок. 1,243	1,0948	1,0860	ок. 1,080	1,1344	1,2443	1,1401	1,0858	1,098
249,31	108,5954	104,7423	97,320	145,7223	—	—	108,7244	127,40
—	0,0800	0,0992	0,278	1,1750	0,0545	0,9254	1,0387	2,002
13,26	0,8983	0,4643	—	0,0880	0,2365	0,3510	0,1708	—
—	0,1638	3,2392	10,093	1,7867	29,4834	20,1769	3,3580	3,731
—	0,6878	1,2654	—	1,0430	—	—	0,4492	—
18,09	45,4160	36,9290	32,132	77,1413	58,5655	40,7282	13,1776	6,643
—	—	—	—	0,0960	—	—	—	—
112,64	15,6180	23,8610	20,557	5,3941	104,8122	59,0550	52,4740	71,072
72,68	10,1532	15,5120	13,241	3,5067	51,5114	27,4706	34,1133	43,952
32,64	35,7031	23,2829	8,889	55,2981	0,3339	0,0141	3,8483	—
—	0,0334	0,0083	—	0,0020	1,1836	0,0160	0,0450	—
—	0,0212	0,0116	—	0,0060	—	0,0560	слѣды	—
—	—	—	—	слѣды	слѣды	слѣды	—	—
—	0,00079	0,00053	—	0,00079	0,4878	—	0,0079	—
—	—	слѣды	—	слѣды	—	слѣды	слѣды	—
—	слѣды	слѣды	—	слѣды	—	слѣды	слѣды	—
—	0,00012	0,00008	—	0,00012	5,3186	5,6127	0,0012	—
—	—	—	—	—	1,5568	0,5075	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	0,0092	—	—	—	—	—	слѣды	—
—	—	0,0031	—	—	—	—	0,0022	—
—	—	—	12,130	—	—	—	—	—
249,31	108,7849	104,6766	97,320	145,5378	253,5442	154,9134	108,6862	127,400
—	0,0240	0,2980	—	—	—	0,3410	0,1142	—

Въ 1000 грм.

Комбинація солей.	Озеро Вильё	Озеро Шира	Озеро Тагарское				Озеро Горькое
	17-го іюля 1899 г. Людвигъ.	Лѣтомъ 1899 г. Леманъ.	Между г.г. 1886—1898 Тихомировъ.	Съ поверхн. озера Богачевъ.	Со дна озера Богачевъ.	9-го іюля 1899 г. Людвигъ.	19-го іюля 1899 г. Людвигъ.
Удѣльный вѣсъ при 15° С.	1,0079	1,0135 при 16° С.	ок. 1,14	1,045 при 15° R.	1,05 при 14,5° R.	1,0170	1,0504
Сухой остатокъ при 180° С.	8,8122	17,5	134,52	50,39	51,30	20,9823	59,1065
сѣрноокислаго магнезія $MgSO_4$	2,8818	4,8	—	7,32	7,45	3,9210	2,5280
калія K_2SO_4	0,1699	0,045	—	—	—	0,4714	1,8174
натра Na_2SO_4	3,2821	7,45	—	18,65	18,65	5,8257	33,8180
азотнокислаго " $NaNO_3$	0,1463	—	—	—	—	—	—
углекислаго " Na_2CO_3	0,5363	—	—	—	—	0,0940	0,2683
хлористаго " $NaCl$	1,4370	3,1	99,89	23,78	22,55	10,1992	19,4901
кремнезема SiO_2	0,0032	0,012	—	—	—	0,0073	0,0180
гливозема Al_2O_3	0,0026	—	—	—	—	0,0184	0,0040
хлористаго калия KCl	—	0,032	—	—	—	—	—
магнезія $MgCl_2$	—	0,32	20,08	—	—	—	—
бромистаго " $MgBr_2$	—	слѣды	—	—	—	0,0011	—
двууглекисл. " $MgCO_3 + CO_2$	0,3229	0,86	—	—	—	0,3990	1,3148
хлористаго кальція $CaCl_2$	—	0,012	—	—	—	—	—
сѣрноокисл. " $CaSO_4$	—	0,32	11,22	0,25	2,20	—	—
двууглекислаго кальція $CaCO_3$	—	—	—	—	—	—	—
+ CO_2	0,1889	0,0602	—	—	—	0,2036	0,3225
двууглекислой закиси желѣза $FeCO_3 + CO_2$	—	0,0018	—	—	—	—	—
азотнокислаго амміака NH_4NO_3	—	слѣды	—	—	—	—	—
кислорода O (избытокъ)	—	—	3,33	—	—	—	—
органич. вещ., нелетучихъ	—	слѣды	—	—	—	—	—
окиси желѣза Fe_2O_3	—	—	—	0,39	0,45	—	—
желѣза Fe	слѣды	—	—	—	—	—	—
брома Br	слѣды	—	—	—	—	—	—
литія Li	слѣды	—	—	—	—	—	слѣды
амміака NH_3	слѣды	—	—	—	—	—	—
азотистаго ангидрида N_2O_3	—	—	—	—	—	слѣды	слѣды
фосфорнаго " P_2O_3	—	слѣды	—	—	—	—	—
стронція Sr	—	слѣды	—	—	—	—	—
	8,9710	17,0130	134,52	50,39	51,30	21,1407	59,5811

В о д а.

содержится:

[illegible]

Таблица III.

Въ 100 вѣсовыхъ частяхъ

В о д а.

обезвоженного остатка содержится:

Комбинація солей.	Озеро Бильё	Озеро Шира	Озеро Тагарское					Озеро Горь-кое	Озеро Алтайское		1883 г. Шмидт.	Озеро Бейское				Озеро Минусинское		Озеро Домо-жаково	Озеро Шунетъ			Буровая скваж. при оз. Кизыль-Куль		Буровая скважина Обоян-скаго завода	Озеро Кичи-Куль	Озеро Джа-балак-Куль	
	17-го июня 1899 г. Людвигъ.	1881 г. Шахарий.	Датонъ 1889 г. Деманъ.	1883 г. Шмидт.	Между г.г. 1886—1898 Тихомировъ.	Съ говоринъ оз. Богачевъ.	Со дна озера Богачевъ.	9-го июня 1899 г. Людвигъ.	19-го июня 1899 г. Людвигъ.	Между г.г. 1886—1898 Тихомировъ.		10-го июня 1899 г. Людвигъ.	Юль 1894 г. Томаж. золот. лаборат.	дек. 1894 г. (впрте юль 1895 г.) Богачевъ.	Юль 1895 г. (впрте дек. 1894 г.) Богачевъ.	11-го июня 1899 г. Людвигъ.	1883 г. Шмидт.	Между г.г. 1886—1898 Тихомировъ.	12-го июня 1899 г. Людвигъ.	1891 г. Деманъ.	Датонъ 1897 г. Людвигъ.	16-го июня 1899 г. Людвигъ.	юль 1898 г. Богачевъ.	10-го июня 1899 г. Людвигъ.	Между г.г. 1886—1898 Тихомировъ.	18-3 г. Шмидт.	1883 г. Шмидт.
Углекисл. кальція CaCO_3	1,3769	10,65	—	0,137	—	—	—	0,6751	0,3794	—	0,0500	—	—	—	0,2301	—	—	—	0,062	—	0,5002	—	0,2387	—	—	—	—
" магнія MgCO_3	2,4127	28,39	3,05	—	—	—	—	1,2520	1,4636	—	—	—	—	—	0,2829	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,547	3,0818
сѣрниокисл. " MgSO_4	32,7590	—	29,28	—	—	14,52	10,52	18,7227	4,2824	—	0,4482	9,32	7,67	0,98	8,8259	—	31,1140	3,6635	4,071	34,6943	38,8607	12,64	9,2174	4,4982	0,347	—	
" калия K_2SO_4	1,9317	—	0,16	0,358	8,3440	—	—	2,2509	3,0787	—	1,1689	—	—	—	2,2355	0,010	—	1,3251	—	—	—	—	0,7642	—	0,0076	0,1261	
" натра Na_2SO_4	37,3174	14,30	43,92	77,262	—	37,00	36,53	27,8177	57,2876	12,8637	72,5140	51,63	52,39	—	50,4025	45,250	21,0281	86,7412	92,602	—	—	—	7,9365	—	—	41,3039	
азотнокисл. " NaNO_3	1,6634	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1171	—	—	—	—	—	—	—	—	
углекислаго " Na_2CO_3	6,0977	—	—	—	—	—	—	0,4488	0,4545	12,8315	1,9375	—	—	—	0,3830	—	—	0,1457	—	0,2251	0,0155	—	0,1254	—	—	—	
хлористаго " NaCl	16,3385	1,87	17,93	7,193	74,2491	47,18	43,93	48,7011	33,0160	74,2809	23,6837	86,47	36,92	86,86	37,6130	38,401	34,7297	6,1148	1,503	51,5620	45,0085	81,35	79,6603	87,7506	—	37,9902	
кремнезема SiO_2	0,0363	—	0,06	—	—	—	—	0,0348	0,0305	—	0,0306	—	—	—	0,0079	—	—	0,0013	0,008	0,4668	0,0103	—	0,0041	—	—	—	
глинозема Al_2O_3	0,0295	2,88	0,013	—	—	—	—	0,0876	0,0067	—	0,0195	—	—	0,84	0,32	0,1008	—	0,0041	—	—	0,0361	0,88	слѣды	—	—	—	
органическ. веществъ и кристаллиз. воды.	—	27,98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
нераств. въ HCl вещ.	—	13,31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
хлористаго калия KCl	—	—	0,06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
" магнія MgCl_2	—	—	1,97	11,424	14,9280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
бромистаго " MgBr_2	—	—	слѣд.	0,021	—	—	—	0,0052	—	—	0,00083	—	—	1,96	—	16,335	—	—	0,543	11,4777	14,1698	—	—	3,3558	1,126	12,3919	
хлорист. кальція CaCl_2	—	—	0,09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,00058	0,0004	—	—	—	—	—	—	0,0084	—	0,0007	0,0097	
сѣрниокисл. " CaSO_4	—	—	1,97	3,312	—	0,51	4,30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,020	0,2241	—	—	0,37	—	—	—	—	
окиси желѣза Fe_2O_3	—	—	0,005	0,136	—	—	—	—	—	—	0,1004	—	—	0,19	2,14	—	0,6460	1,9610	0,167	0,0523	0,7707	1,73	1,9967	3,7842	—	4,2478	
азотнок. аммонія NH_4NO_3	—	—	слѣд.	—	—	—	—	—	—	—	0,0084	—	—	—	0,0033	—	—	—	слѣд.	—	—	—	0,0020	—	—	—	
песку и глины	—	—	0,27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Al_2O_3 , P_2O_5 и SiO_2	—	—	—	0,050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
окиси магнія MgO	—	—	—	0,085	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
избытка кислорода	—	—	—	—	2,4771	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
органическ. веществъ	—	—	0,18	—	—	0,77	0,89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5712	—	
глины (Fe_2O_3 , Al_2O_3 , SiO_2 безводн.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
нераствор. въ H_2O вещ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
желѣза Fe	слѣды	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	слѣды	—	слѣды	слѣды	—	—	—	—	—	
брома Br	слѣды	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
литія Li	слѣды	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
стронція Sr	—	слѣд.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	слѣды	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
амміака NH_3	слѣды	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
азотист. ангидрида N_2O_3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
фосфорнаго " P_2O_5	—	—	слѣд.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	99,9632	99,38	98,958	99,978	99,9982	99,98	100,17	99,9959	99,9994	99,9761	99,9620	100,0992	99,49	99,97	100,24	100,0854	99,9964	99,9824	100,0744	99,968	99,9940	99,9961	99,93	99,9537	99,9600	100,0143	99,9658

Таблица IV.

Въ 100 частяхъ обезвоженного

Элементарныя составныя части.	Озеро Алтайское		Озере Бейское
	10-го іюня 1899 г. Людвигъ, съ берега.	10-го іюня 1899 г. Людвигъ, со дна.	11-го іюня 1899 г. Людвигъ, съ берега.
Угольного ангидрида CO_2	0,0300	0,1186	0,0132
окиси кальція CaO	0,0113	0,2150	—
„ магнія MgO	—	0,1116	—
сѣрнаго ангидрида SO_2	55,6673	53,9976	56,0525
хлора Cl	0,0816	0,1766	0,2098
магнія Mg	—	—	—
калія K	—	—	—
окиси калия K_2O	—	—	—
„ желѣза Fe_2O_3	—	—	—
глинозема Al_2O_3	0,0061	0,1106	—
натрія Na	0,0530	—	—
окиси натрія Na_2O	43,2108	0,1148	0,1363
кремнезема SiO_2	—	41,6432	43,4983
нераствор. въ HCl остатка:	—	—	—
органическ.	0,7548	1,1228	—
неорганическ.	0,1582	2,3332	0,0120
Сумма	99,9731	99,9440	99,9221
Въ видѣ соединений:			
углекислаго кальція CaCO_3	0,0193	0,1268	—
„ магнія MgCO_3	—	—	—
„ натра Na_2CO_3	0,0518	0,1514	0,0316
хлористаго „ NaCl	0,1346	0,2914	0,3461
сѣрнокислаго „ Na_2SO_4	98,8471	95,1251	99,5324
„ калия K_2SO_4	—	—	—
„ кальція CaSO_4	0,0012	0,3498	—
окиси желѣза Fe_2O_3	—	0,1106	—
глинозема Al_2O_3	0,0061	—	—
сѣрнокислаго магнія MgSO_4	—	0,3329	—
нераствор. въ HCl остатка:	—	—	—
органическ.	0,7548	1,1228	—
неорганическ.	0,1582	2,3332	0,0120
калія K	—	—	—
магнія Mg	—	—	—
кремнезема SiO_2	—	—	—
Сумма	99,9731	99,9440	99,9221

Бузуны.

бузуна содержится:


Озеро Доможаково	Озеро Джемакъ-Куль			Озеро Шунеть	
	12-го іюня 1899 г. Людвигъ, со дна.	1885 г. Шамаринъ.	13-го іюня 1899 г. Людвигъ, верхній слой.	13-го іюня 1899 г. Людвигъ, нижній слой.	Іюнь 1895 г. Богачевъ.
0,1136	—	0,0210	0,4639	—	0,6268
0,5800	0,267	0,0089	0,8460	1,11	0,0382
—	5,525	—	0,4090	14,63	10,2231
55,3129	34,471	55,8613	54,2054	58,84	54,4525
0,0852	25,107	0,3174	0,6228	1,88	0,5566
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
0,0435	—	0,0720	0,1100	—	1,9286
—	—	—	—	—	0,0074
0,0553	16,299	0,2030	0,4048	0,19	0,0682
42,4233	17,842	43,3513	41,1344	1,19	0,3618
—	—	—	—	21,15	25,9615
—	—	—	—	—	0,0708
0,3760	—	—	0,7430	0,17	—
0,9440	0,246	0,1290	1,0810	0,84	5,6962
99,9338	99,757	99,9589	100,0203	100,00	100,0217
0,1622	—	0,0159	0,9629	—	0,1217
—	—	—	—	—	0,1409
0,1017	—	0,0337	0,0969	—	1,2053
0,1405	41,406	0,5154	1,0276	3,07	0,9184
96,9775	40,860	99,1929	94,0334	49,48	57,8153
—	—	—	—	—	3,6527
1,1884	0,668	—	0,7453	2,70	—
—	—	—	—	—	—
0,0435	—	0,0720	0,1100	—	0,0074
—	—	—	—	—	0,0682
—	16,577	—	1,2202	43,55	30,3249
0,3760	—	—	0,7430	0,17	—
0,9440	0,246	0,1290	1,0810	0,84	5,6962
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
99,9338	99,757	99,9589	100,0203	100,00	100,0217

Таблица V. Минеральная грязь.

Въ 100 вѣсов. частяхъ влажной грязи содержится:

	Озеро Шунеть.		Оз. Тагарск.
	Лѣтомъ 1897 г. Людвигъ.	16 юля 1899 г. Людвигъ.	9 июня 1899 г. Людвигъ.
Удѣльный вѣсъ влажной грязи . . .	1,6135	1,5780	2,0742
" " высушен. на воздухѣ	—	2,3211	2,6766
Воды, органическ. и летуч. веществъ	49,6755	56,565	27,020
Твердыхъ веществъ	50,3245	43,435	72,980
	—	—	—
	100,0000	100,000	100,000
Растворимыхъ въ водѣ	15,4009	9,6900	0,5800
Элементарн. составн. частей:			
хлора Cl	5,1455		
окиси кальція CaO	0,8805		
кремнезема SiO ₂	0,2266		
окиси магнезіи MgO	1,6451		
сѣрнаго ангидрида SO ₃	4,5220		
магнезіи Mg	0,4667		
калія K	0,1282		
натрія Na	2,3863		
брома Br	слѣды		
Въ видѣ солей:			
сѣрноокислаго кальція CaSO ₄	2,1390		
" магнезіи MgSO ₄	4,9086		
хлористаго магнезіи MgCl ₂	1,8253		
" калия KCl	0,2443		
" натрія NaCl	6,0571		
кремнезема SiO ₂	0,2266		
Растворимыхъ въ HCl	19,7789	26,8520	8,6931
окиси желѣза Fe ₂ O ₃	0,2729	0,6360	0,6420
фосфорнаго ангидрида P ₂ O ₃	0,1073	0,0121	0,0795
глинозема Al ₂ O ₃	0,0996	0,1999	0,9045
окиси кальція CaO	4,5442	9,7800	3,1440
" магнезіи MgO	4,3383	2,0180	0,5169
сѣрнаго ангидрида SO ₃	2,1432	1,7741	0,1317
угольнаго ангидрида CO ₂	7,0641	11,0154	2,8878
окиси калия K ₂ O	0,1306	0,1533	0,0505
" натрія Na ₂ O	1,0787	1,2632	0,3362
Нерастворимыхъ въ HCl	15,1447	6,8930	63,7072
Кремнезема (расщепленнаго) SiO ₂	1,1257	0,1843	1,4665
" въ видѣ песку	2,4979	5,5038	47,2719
глинозема Al ₂ O ₃	0,3958	0,8720	7,2452
окиси желѣза Fe ₂ O ₃	0,9114	0,1164	3,0049
" кальція CaO	4,1093	0,1916	3,9175
сѣрнаго ангидрида SO ₃	5,8705	0,0249	0,1530
сѣры S	0,2341	—	—
окиси магнезіи MgO	—	—	0,6482
марганца Mn	слѣды	слѣды	слѣды
Кромѣ того:			
общаго азота N	—	0,1996	0,1738
амміака NH ₃	—	0,0472	0,0283
гуминовыхъ веществъ (безазоти-	—	2,877	1,3675
стыхъ и безводныхъ)	—	(соотв. C=1,6202)	(соотв. C=0,7919)
сѣроводорода H ₂ S	0,1118	0,2709	0,0063
(соотв. FeS = 0,2892.)	(соотв. FeS = 0,7002.)	(соотв. FeS = 0,0162.)	

Карта Минусинского округа, Енисейской губернии
составлена по картѣ проф. К. Гревингга.



Оглавленіе.

	стр.
Предисловіе	3
Глава I. Географическія и геогностическія свѣдѣнія . . .	7
„ II. Путевыя замѣтки	48
„ III. Способъ опредѣленія отдѣльныхъ составныхъ частей воды, бузуна и минеральной грязи	89
„ IV. Сопоставленіе полученныхъ данныхъ	172
„ V. Общіе выводы и заключенія	184
„ IV. Таблицы	189
„ V. Карта.	

Замѣченныя опечатки.

Стр.	Строка :	Напечатано :	Должно читать :
8	сн. 1	Юсь	Юсь
13	св. 4	} Уюса	} Юса
13	св. 19		
17	сн. 5		
19	сн. 11	Уйбашъ	Уйбатъ
24	св. 11	Мартіянова	Мартьянова
25	сн. 8	Мартіановъ	Мартьяновъ
28	сн. 10	Уюсь	Юсь
"	" 9	Мартіановъ	Мартьяновъ
29	сн. 12	Уюса	Юса
"	" 2	Мартіановъ	Мартьяновъ
31	св. 1	Джемакуль	Джемакъ-Куль
"	св. 6	Натра Na	Окиси натрія Na_2O
"	" 7	Натрія	Натрія Na
"	" 25	Джемакуль	Джемакъ-Куль
42	св. 21	глинозема Al_2C_3	глинозема Al_2O_3
65	сн. 5	въ іюль м. 1894 г.	въ іюль м. 1895 г.
"	сн. 1	См. стр. 27 и 28	См. стр. 42 и 43.
154	св. 15	связываетъ MgO	связываетъ SO_2

Положенія.

1. Необходимо въ курсъ для фармацевтовъ ввести практическія занятія по микроскопическому изслѣдованію крови и сѣменныхъ пятенъ, распознаваніе которыхъ требуется столь часто въ судебно-химической практикѣ.
2. Желательно, чтобы при обученіи фармацевтовъ по минералогіи и ботаникѣ было обращено большее вниманіе на практическую сторону предмета — распознаваніе минераловъ и растений.
3. Аптекарскіе магазины, какъ торгующіе сильно дѣйствующими веществами, должны находиться подъ управленіемъ, наравнѣ съ аптеками, магистровъ или провизоровъ.
4. Лабораторіи для изслѣдованій пищевыхъ продуктовъ должны быть устроены не только въ большихъ, но и въ малыхъ городахъ.
5. При весьма малыхъ количествахъ связанной и полусвязанной угольной кислоты въ водахъ съ очень большимъ содержаніемъ сѣрнокислыхъ солей, можно съ пользою примѣнять способъ титрованія растворомъ $\frac{1}{10}$ норм. сѣрной кислоты, употребляя какъ индикаторъ розоловую кислоту.
6. Желательно, чтобы минеральныя богатства Минусинскаго округа Енисейской губ., какъ то: каменный уголь, желѣзные, свинцовыя и другія руды, известняки, мраморы и т. п., а также минеральныя озера, въ особенности цѣлебное озеро Шира, — были подвергнуты тщательному и систематическому химическому и физическому анализу, всего лучше на мѣстѣ.