

16398.

DISSERTATIO INAUGURALIS  
MEDICA  
SISTENS  
PROCESSUM DIGESTIONIS  
QUAM  
CONSENTIENTE AMPLISSIMO MEDICORUM  
ORDINE

IN  
UNIVERSITATE CAESAREA LITERARUM  
DORPATENSI

PRO  
GRADU DOCTORIS MEDICINAE

LEGITIME IMPETRANDO  
DIE VI. MENS. JUN. MDCCXXIII

PUBLICE DEFENDET

AUCTOR

FRIDERICUS AUGUSTUS MEYER

SARATOVIENSIS.

.....  
DORPATI LIVONORUM  
EX OFFICINA ACADEMICA J. C. SCHÜNMANNI  
MDCCXXIII.

P r a e c e p t o r i

ad

c i n e r e s   u s q u e   c o l e n d o ,

H a s c e   p r i m i t i a s   A m o r i s   D o c u m e n t u m

g r a t o   A n i x o

D .   D .   D .

A n c t o r .

## *CAPUT I.*

### *In organa digestionis animadversiones anatomicae.*

§. i. *Systema cutaneum, singularis textus mucosoi evolutio, sacci in se revertentia instar, massam organismi universam obtegit, sive aliter: organorum respirationis et intestinalis; genitalis; utropoëticí systematis membranae mucosae atque tegumenta externa semet invicem continuo nexu excipiunt. Sunt qui hoc negarint, argumentis vero parvi momenti. Analogia innumera exhibet argumenta, quorum nonnulla hic referto: a) in plerisque entozois exterior superficies est organon absorbens, tanta efficacia, ut, cum peculiari intestinalium systemate multa eorum careant;*

2

ipsa cutis organon digestionis haberi possit <sup>1</sup>); b) in multis animalibus inferioris ordinis cutis aequae ac membrana intestinalis calcaream secernunt materiam <sup>2</sup>); quod in bulla observatur; in cancris plus etiam movet admirationem, quod ventriculi ossa et dentes testae mutationem participant; c) in dentibus analogiam capillorum et unguium animadverti jam docet Bonn <sup>3</sup>); diligentius demonstrant Walther <sup>4</sup>) et Lavagna <sup>5</sup>); d) recordemur denique hydrae, cuius cutis replicata vicem membranae digestionis suscipere potest <sup>6</sup>). — Sed consilium nostrum postulat, ut systema praecipue intestinale examinemus, et analogiam inter singulas ejus membranae partes indagemus. In maxima internae membranae mucosae systematis partem tam arcte intimeque cohaerent strata singula, ut a ductu intestinali epidermidem sejungere perdifficile

---

1) Rudolphi Entozoorum hist. natur. Vol. I. p. 275.

2) Carus Lehrbuch der Zoetomie. §. 440, 448.

3) De contin. membr. §. XVI. in Sandifortii thesaur. diss. Vol. II. p. 277.

4) Physiologie. I. p. 174 sq.

5) Esperienze e riflessioni sopra la carie etc. Genov. 1812. p. 164—198.

6) Treviranus Biologie IV. p. 292.

sit (excepto ore, oesophago et fortasse ventriculo). — Quare in membranae mucosae superficie textum epidermidi similem existare non nisi conjectura consequi possumus <sup>7</sup>). — In oesophago invenitur villosae tegumentum tenuē, humidum et molle, juxta Meckelii sententiam certe epidermis, prope cardiam vero repente finem capiens <sup>8</sup>). — Internae membranae mucosae rete Malpighii mucoso carere dicuntur <sup>9</sup>). At, epidermidem rete mucosum esse induratum assumito, subit quaestio, num reperiatur ejus analogon? — In lingua saltem et oesophago existat epidermis; subalbunque intra linguae epidermidem et papillas humorem, videmus. Tunica intestinalis nervea aequat cutem; atque, Bichato duce, accipere jure possumus, villos esse formationem textui papillari similem <sup>10</sup>).

§. 2. Systema glandularum. Glandulae perfectae additamentis se applicant introrsum penetrantibus ex canalis intestinalis membrana mu-

7) Meckel's Handbuch der med. Anat. Bd. I. p. 614.

8) ibid. IV. p. 249.

9) ibid. I. p. 615.

10) Anatomie générale. Paris, 1818. T. II. p. 496.

cōsa <sup>11)</sup>). — Qua ratione membranae mucosae intestinalis formatio eum adscendat gradum, ut glandulae formentur, praesertim formationibus transitivis glandularum Peyeri, Brunneri et Lieberkühnii indicaretur. Conspiciamus nunc rationem, qua haec additamenta ductus intestinalis in regno animali gradatim evolvantur. — Quemadmodum zoophytorum tot functiones peculiaribus egent organis, ita et secretio salivae, ut in Holothuriis Cuvierus in oris circuitu saccos observabat coecos <sup>12)</sup>) In insectis item vascula quaedam cœca non raro observantur; ex quibus singulares succi effunduntur, ut v. c. in phalaena cesso. Glandulae salivales magis perspicue apparent in angue et lacerta: in avibus, praesertim iis, quae granis vescuntur, distinctius etiam in lucem prodeunt. Hoc modo glandularum istarum formatio sensim perfectior evadit, donec in mammalibus, p̄aecipue phytophagis culmē perfectionis adscendat. — Pancreatis porro formatio glandularum salivalium formationi similis. Jam in aplysiis, cephalopodibus, plerisque coleo-

---

<sup>11)</sup> Medel l. c. I. p. 437.

<sup>12)</sup> Ramdohr, Abhandl. über d. Verdauungswerkz. d. Insecten. S. 20.

pteris pancreatis analogon illae appendices pyloricae haberi possunt, donec in plerisque saltem piscibus haec additamenta coeca magis magisque increbrescant, in acipensere denique sturione, squalo et rhaja in massam quandam glandulosam conglomerantur. In amphibiis demum magis evolutum, in avibus, praecipue phytophagis quam in ceteris animalium classibus majoris relative est voluminis <sup>13)</sup>). Eandem denique formationis legetur conspicimus in hepate. — In medusis nil animadvertisitur nisi humoris cuiusdam bili similis in ventriculum excretio. Observantur organa bilifera fasciformia, colore flavo, in cancris et astacis: biliis in insectis et vermicibus yasis tantummodo coecis secerni videtur <sup>14)</sup>. — Ceterum simplicissimae glandulae mucosae, cavorum speciem saccorum gerentes, in animali regno latissime patent, omnisque glandularum formationis prototypus haber possunt. Saccus producitur, multifarie in ramos inter vasorum ramos serpentes dividitur. Congruit igitur Malpighius cum Ruyschio de interno glandularum

13) Liebemann's Zoologie II. S. 475.

14) Catulus l. c. §. 648.

textu <sup>15)</sup>). Paucia de splene commemoremus, organo parum utique cognito, quod quo jure plerique glandulam nominent infra diligentius inquiremus. Textura ejus, vario modo complicatis, maxime tenuibus et solidis fibris constat, quae a membrana lienis fibrosa proficiscentes varia formant spatiola, in quorum parietibus vasa serpunt <sup>16)</sup>. Microscopio et facile injiciendorum transitu fluidorum ampliae arterias inter et venas viae probantur. Rationem arteriarum ad venas = 1 : 5 esse, cum in caeteris partibus ea sit = 1 : 2,25, Heusinger contendit <sup>17)</sup>. Multa multi de anastomosi horum in splene vasorum locuti sunt, quam recentissimae quidem disquisitiones extare negant; sed sanguinem primo ex arteriosis penicillie in interstitia influere, inter fibrosae tunicae splenis processus sita, deinde in canales inter penicilla angustos, et denique in radiculos venae lienalis pervenire <sup>18)</sup>. Extare in splene corpuscula subalba,

<sup>15)</sup> Medel l. c. I. p. 632 sq.

<sup>16)</sup> id. l. c. IV. p. 3707 sq.

<sup>17)</sup> Allgemeine med. Annalen 1819. p. 1457.

<sup>18)</sup> Chr. Hellw. Schmidt, Commentatio de pathologia lienis, observationibus per anatomen institutis, indagata, ad illustrandam physiologiam enigmatici hujus visceris. Götting. 1816. p. II. 17.

fere rotunda, cava, ut videtur, valde mollia saltem atque cum textu splenis arcte cohaerentia, et vasorum plenissima, Malpighii, Hewsonis, Düpüytrenis, Homeri, Heusingeri et Meckelii experientia demonstrat; quae Malpighio glandulae videbantur, Ruyschio aliisque vasorum fascicula, non allata tamen causa<sup>19)</sup>). Columna vertebrali evanescente et sanguine rubro in animalium serie, splen quoque evanescit: quo contra hepar, liene decrescente, crescens in ingentem modum evolvitur, v. c. in helice nemorali. — Horum organorum inter se rationem in foetu animalium superiorum eandem esse videmus<sup>20)</sup>. Splenis vasa eo minoris momenti sunt, quo magis ipse decrescit. — Quamvis in animalium classibus variis varius etiam sit splen, sicutum tamen eundem semper fere obtinet, in proximitate nempe ventriculi atque e regione hepatis<sup>21)</sup>. De vasorum ejus conjunctione cum hepatis, ventriculi et pancreatis vasis idem enuntiari potest.

19) Meckel IV. p. 371.

20) Assolant diss. sur la rate. Paris. A. X. p. 67.

21) Cuvier's Vorlesungen über vergl. Anat., übersetzt von J. F. Meckel. III. Bd. p. 617.

§. 3. *Systema vasculosum.* Quo magis  
 vario modo cum rebus externis animal in contactum  
 venit, eo compositior est ejus fabrica; eo magis syste-  
 mata singula diffunduntur in ramos sive inferioris or-  
 dinis systemata. Non secus res se habet de systemate  
 vasculoso. — In infimis animalibus nulla discerni-  
 mus vasa, ut in infusoriis, polypis aliisque: homo-  
 genea, gelatinosa massa organicum materiae commer-  
 cium succorum penetratione efficit et seryat. — Pau-  
 latim quidem evolvitur systema vasculosum; at jam in  
 acephalis et gasteropodibus duplex lymphae per cor-  
 pus et pulmones circuitus animadvertisit <sup>22)</sup>. — Evo-  
 lutione quorundam organorum et systematum posita,  
 nil est, quod mireris in serie animalium, in mollus-  
 cis, vermibus et crustaceis, respectu vasorum inter-  
 insecta plerumque vasis carentia et altiora animalium  
 genera medium locum occupantibus; — partem sys-  
 tematis vasculosi, vasa quidem lymphatica, non evo-  
 luta esse; nisi ductus ex ventriculis medusarum alio-  
 rumque inferioris ordinis animantium radiatim excur-  
 rentes simplicissima vasorum lacteorum vestigia habi-

22) *Carus* L. a. §. 684, 685, 688, 689,

turus sis<sup>23)</sup>) — In vertebratis autem sistema lymphaticum, quo assimilanda absorbentur, sanguinei systematis exstat additamentum. Dum in molluscis sanguis secernendae bilis destinatus arteriarum tantum ope in hepar traducitur<sup>24)</sup>; contra in vertebratis peculiare quoddam majori minus insertum sistema vasculosum observamus, quod, in se ipso reclusum in splene et ductu intestinali oriundum, idem adjuvat. Praeterea memoratu dignum, quod experimentis Fohmanni<sup>25)</sup> sententiae illi, jam inveteratae et oblivioni datae: vasa lymphatica jam in abdomen cum venis osculari, nova argumenta allata sunt.

§. 4. *Systema muscularē.* Sicut in digestionis organis generatim tela cellulosa prominet, ita musculosa eorum pars a textu mucoso ad musculos transit arbitrio subjectos. In membranas abeunt tenues ductus intestinalis semi-musculi vario modo implicati; qui, cum ipsorum efficaciae finis sit communis, dimi-

23) Carus l. c. §. 686.

24) Cuvier l. c. p. 706.

25) Anatom. Unters. über die Verbindung der Augäder mit den Venen. Heidelberg, 1821.

nutio nempe canalium et cavorum iis circumdatorum, antagonistis sunt destituti. In variis strati musculosi regionibus antagonismo simile quid plus minusve distincte conspicimus: apparent enim in ductu intestinali varia loca interdum antagonismum exserentia, nec certis limitibus circumscripta; nec structura differentia, quae, alternis se vicibus dilatando et contrahendo, contenta removent<sup>26</sup>).

§. 5. Systema nervosum. Animalie vitae evolutio generatim in systematis nervosi statu manifestatur. Quae in zoophytis adeo parva est, ut in medio corpore cavum quoddam organon centrale maximi momenti sit habendum<sup>27</sup>); et systema eorum quoque nervosum nequam centralem massam tamquam in radios excurrentem se offerrat, sed cavo illi centrali peripherice circumjaceat. Hinc animalium invertebratorum annulus medullaris circum ductus intestinalis exordium primitiva est formatio, cum frequentissime occurrat; hinc in perfectioribus animalium classibus, quin etiam in homine ductui intestinali et vasis cir-

---

<sup>27) Cato. l. c. §. 64.</sup>

cumplectitur ganglionum systema. Quod attinet ad perfectiorem hujus typi evolutionem in molluscis et articulatis ganglia nascuntur, e. g. in hirudine; quae nervorum forma luculentissime repetitur, velut ganglionum catena, in vegetativo altiorum animalium systemate nervorum. In pisce nervus sympatheticus magnus in eo nervorum pari originem capit, quod ut annulus nervosus ductum intestinalem ambiens inferiorum animalium annulum medullarem repetit, et ganglionum catenam gignit. Hujus nervorum sphaerae metamorphoses in altioribus animalibus, ut valde sint variae, primitiva ganglionum indoles permanet. Duae<sup>26)</sup> ganglionum series, altera centralis, altera in extremo limite sita, progignuntur. Illa praecipue in abdome collocata truncis vasorum circumdatur; haec in utraque columnae vertebralis parte est sita et partes sympathici magni centrales cum cerebrali sphaera jungit. Plexus solaris, dynamicum sympathici magni centrum, in homine simul cum arteria coeliaca in tres dividitur plexus primarios; magnum ventriculi superiorum, qui a sinistra Pneumo-

26) Medel's Anat. I. S. 527.

28) Medel. I. p. 312. III. p. 757.

gastrico, aut accipit filamenta aut ei impertitur, maiorem hepaticum plexum, et denique splenicum. Tribus ex his ceteri evolvuntur. Atqui sicut in superiore ductus intestinalis fine cum sphæra cerebrali, intercedente Pneumogastrico, ita inferiore fine sacrum nervorum ope systema ganglionum connectitur.

§. 6. *Tractus intestinalis.* Simulac interior membrana mucosa in *systema abit intestinale*, multa illa ostiola insorbentia, v. c. in rhizostomatisbus, in peculiarem ingestionis aperturam mutantur et confluunt. Perinde ductus, quorum ope in zoophytis aliisque aperturae absorbentes junguntur cum sacco cibario, apud altiora animalia in pharyngem et oesophagum abeunt, qui tamen jam in teredine, helice pomatia aliisque occurrunt. — In echinis primum manducationis organa (laterna Aristotelis) insigniter formata sunt, magis vero in crustaceis. Dentes proprie sic dicendi non inveniuntur nisi in mammalium, reptilium pisciumque maxima parte. Formata dentibus similia etiam si in inferioribus quoque animalibus <sup>29)</sup>

conspiciamus, plerumque tamē dentes supplentur analogis; qualia forsitan, in avibus fibratum rostri cornu, in cetaceis cirri. — Memoratu quoque dignum, quod modo oesophagus organis mandibulatoriis praeditus est; modo ventriculus ipse cartilaginosas vel odontoideas praebet formationes <sup>30)</sup>. Transitum in ductu intestinali tantus est numerus et varietas, ut animo vix comprehendi possint; in alterioribus speciebus inferiorum formationes saepe repētuntur, ita ut, quae causae nervorum systema consideranti, divisionem in duas formationum series postulare visae sint, nunc non valeant. Tractus intestinalis, postquam iu pharynge cylindri sive infundibuli instar paululum de scenderat, semel pluriesve dilatatur, quo ventriculi forma prodit. In nulla mammalium et avium specie ductus intestinalis aequali excurrit diametro ab ore ad anum usque <sup>31)</sup>; quod vero in aliis classibus, nec tam frequenter accidit. — Generatim ventriculus follis speciem gerit, sed maximopere variam. — Totum hydrae L. corpus ventriculus fere haberi potest;

30) Treviranus IV. p. 315 sq.

31) ibid. p. 339.

quatuor medusae auritae sacciformes ventriculi gelatinosae massa et tantummodo incavati videntur; in unione pictorum vix membranae apparent, quod vero jam in gasteropodibus obtinet. Orthopterum quaedam ventriculi forma in mammalibus rursus observatur ruminantibus. In mammalibus simplicissimam formam (quae piscium amphibiorumque nos commonefacit) paullatim in compositam molluscorum et insectorum transire videmus. Ad simpliciores pertinet quoque hominis ventriculus, maxime compositus est ruminantium. Tunica ventriculi muscularis adparatus muscularum evolutionem sequi non videntur; inferiores enim classes, quam altiores validiore gaudent; phytophagorum crassior esse solet, quam sarcophagorum. Hominis ventriculus membranosos inter et carnosos medium tenet locum, prioribus nihilominus similior. De tunica ejus villosa infra tractabimus. — Reliqua ductus intestinalis pars ventriculi structuram imitatur. Primum simplex in genere Ophiuri Lamark saccus<sup>22</sup>), tum in asteriade jam coecis appendicibus praedita formas multifarias gradatim percurrit, donec in mam-

malibus ruminantibus summam perfectionem adipisciatur. In pluribus altiorum animalium classibus ductus intestinalis nimiam brevitatem valvis vel constrictionibus suppleri generatim observamus. Solito brevior in phytophagis pro brevitatis ratione latior evadit, atque, vice versa, in usitato longior quorundam carnivorum eo angustior est. Prout universim in illis longior quam in his, non secus in mammalibus relative longior est, ac in ceteris classibus, atque relativa ejus longitudo ad pisces usque decrescit <sup>33)</sup>. Ductus intestinalis in duas partes dividitur, in intestinum tenuem et crassum, quorum limes non semper coeco describitur intestino, sed tenuis in crassum processu <sup>34)</sup>. Quae divisio in duas partes indole membranarum interstinctas tantum abest, ut sit generalis, ut in quaque fere animalium classe genera occurrant, quibus aut omnino desit aut vix possit internosci. In plerisque vertebratis repertiuntur, sed diametris maxime variis. Inter utrumque intestinum coeca non raro animadver-tuntur additamenta. Praeter hominem, simiam pithe-

33) Cuvier p. 446.

34) Ibid. p. 470.

cum et phascolomidum genus nullum animal cœcō et simul processū vermiciformi utitur; cetera alterutro; dasypodes, bradypodes aliaque utroque carent. — In herbivoris et omnivoris magis evoluta videntur; carnivoris omnibus parva sunt et forma simplici<sup>35)</sup>. Quo inferior animalis ordo, eo magis haec pars evanescit. Ductus intestinalis tunicae ubique propemodum eaedem sunt, praeprimis in vertebratis, sed interstrata singula maximae differentiae intercedunt.

§. 7. Tunica ductus intestinalis intima. Cujus quoniam modo processus se habeant, maximi refert. — Quid villum inter et plicam discriminis sit, cum longitudine et latitudine relativa tantum distinguantur, statui paene nequit; quod praetertim villosae evolutio demonstrat. Primum nempe plicae non mediocris magnitudinis sunt; alia alii contiguae, margo earum prominens vix ut percipi posset serratim scissus; apparet. — Plicarum et numerus et incisiones harumque profunditas paullatim augentur; eum in modum, ut simplices plicas longitudinales

multa irregularia loca; clivosa et prominentia; sub quarti mensis finem subsequantur; majora quam postea. Hi sunt villi, qui antea; latius excurrunt in villosa quam postea; quoniam octavo jam mense in intestino crasso depresso fereque plani sunt; in plicarum denique longitudinalium serratarum formam abeunt. Quare ex plicis longitudinalibus sensim sensimque serratis et dilapsis villos exoriri dici potest <sup>36)</sup>. Ac licet Rudolphii <sup>37)</sup> sequamur sententiam; internam intestinorum tubicam duplicem formam exhibere; cum aut minores processus (villos) aut speciem retis sistat; evolutionis tamen hujus membranae ratio villorum originem in animalium serie maxime illustrat. Hominis villosam in oesophago, ventriculo crassoque intestino villi deficiunt, qui in aliis animalibus; ut in ansetis intestino crasso, reperiuntur. In oesophago plicas longitudinales eximia subtilitate, parvulisque in lingua papillarum similibus consitas videmus. A tardia peculiaris iectus exorditum <sup>38)</sup>. Villosam oculo

36) Meckel in Archiv für Physiol. Bd. V. S. 68.

37) Reil's Archiv für Physiol. IV. S. 359.

38) A. Mettler in Meckel's Archiv für Physiol. V. H. 2. S. 163.

non armate aequam visam, microscopium patulis foraminibus velut acū factis, in quincuncem positis, refertam ostendit. Haec inter foraminula parietes intergerini aliquam tineae favosae similitudinem tunicae praebent; quo rete apparet, (a Meckelio totius intestinalis superficie in mammalibus homineque basin creditam) in quo postea in intestino tenui villi surgunt. — Hic textus retiformis villos inter et plicas intestini tenuis ad imum usque serpit, villis passim absconditus, et in ventriculo minores maioresve sulcis disjunctas efficit insulas. Parietes in pyloro magis prominentes jamjam majorum in duodeno plicarum fabricam magis evolutam indicant, qui transitus haud repens est; ventriculi vero insulae subito cessant. Plicae duodeni multifarie sinuosae sunt. Valvulae conniventes Kerkringii, quas in permultis omnium fere ordinum mammalibus frustro Meckelius quaesivit <sup>39</sup>), pecularis humanae solae formationis character, memoratu dignae sunt. Plicis piscium amphibiorumque villi sunt nulli. Homo solus plicas transversarios simul et villos in intestino tenui obtinuit; in

teteris animalibus alterutra exstat solummodo formatio.  
In inferiori intestini tenuis parte rariores villi disper-  
tiuntur: in superiore vero quam dense collocati sint,  
existimari prope modum potest eo, quod pollex qua-  
dratus 4000 eorum circiter continet. — Prope coli  
valvulam maiores denuo apparent plicae. Typum villo-  
rum normalem et generalem A. Meckel fingere possè  
putat folii formam ad caulem lati, fine vario modo in  
acumēn excurrentis. De villorum structura multum  
et disputatum est et disputatur. Microscopii ope in iis  
granulosa massa (textum mucosum) detegitur; in quo-  
vis flocco autem ampullam inveniri, textus cellulosi  
plenam Lieberkühn<sup>40</sup>) contendit, quod nunquam He-  
wson<sup>41</sup>) et Rudolphi<sup>42</sup> videbant. — Vasis esse prä-  
ditos villos plérisque constat; nec fieri profecto potest,  
ut egregiae in villos injectiones transsudationibus, se-  
cundum A. Meckelium<sup>43</sup>), explicitur. Sed, num  
in villorum superficie ostiola existent quaeritur? — In  
eorum apice aperturas esse, optimi quidem, Hunter,

40) De fabrica et actione villorum intest. ten. hom. L. B.,  
1745.

41) Exp. inq. into the lymph. syst;

42) l. c. p. 79.

43) l. c. p. 169 — 171.

Hewson, Bleuland, Lieberkühnium secuti, experimentis suis comperti sunt; ipsequē J. F. Meckel eas re vera esse videri profitetur <sup>44)</sup>. Bleuland <sup>45)</sup> autem, microscopio nimis parvæ efficacitatis usus, quam ut discerni perspicue eas posset, icones, quos exhibuit, finxisse videtur. Nunquam Rudolph eas conspicatus est <sup>46)</sup>, atque, quæ Lieberkühn, Hedwig ceterique in observando vitia comiserint, exposuit. Cui adsentit etiam Doellinger <sup>47)</sup>.

In injectione villosae anseris affatimi bene facta ostiolorum ne vestigium quidem equidem ipse percipere potui; — rete vasculosum mirum in modum pulchre constructum in massa villorum mucosa microscopium ostendit. Quocirca Rudolphio et Doellingerο; egregiis naturae observatoribus suffragor.

44) Medel's Anat. I. c. p. 278.

45) Vascul. in intest. tenuium subtilior. anat. opera detegend. descript. Traject. ad Rhenum. Tab. 2. F. 1.

46) I. e. p. 66, 71, 76, 363.

47) Was ist Absonderung, und wie geschieht sie? Würzburg, 1819. S. 45.

**CAPUT II.***Observationes et experimenta.*

§. 8. Masticationem ad digestioñis stadia in altioribus accedere animalibus Walther<sup>48)</sup> perhibet, cum cetera cibos aut partim omnino non masticatos devorent, aut partim fluidos sugendo imbibant. Reptilia nimirum et pisces, magis etiam mollusca et vermes maxillis ad capessendos tantum cibos uti constat. Sunt tamen non solum insecta et crustacea organis manducatoriis praedita, sed quaedam etiam zoophyta ex. gr. echinus<sup>49)</sup>, quibus masticatio adscribi

48) l. c. I. p. 19.

49) Treviranus l. c. p. 314.

possit. — Maxilla<sup>m</sup>um metamorphosis dentiumque masticationis multum interest; in primis vero processus coronoidei ad condyloideum ratio; maxillae inferioris ipsius articuli indoles et forma dentium. — Uterque maxillae inferioris ramus vectis est homodromus, cuius punctum quietis fovea ossis temporum glenoidalis, vim musculi manducatorii sistunt; quod resistit, inter dentes est situm. Porro spectari oportet et locus, quo musculi illi inserti sint; nec minus, quam late aperi ri os possit. In homine et simiis processus coronoideus, parvus ut solet, paulum tantummodo, aut omnino non supra processum condyloideum prominet, longiusque ab hoc distat, quam linea ex ejus apice perpendicularis ab ultimo distaret dente <sup>50</sup>). Processus coronoideus jam in Lemuribus et generatim in carnivoris animalibus coronoideo proprius accedit, quae structura, docente mechanica, effectu parum esset utili. — In gliinis anteriori oris parti vis proprius est; cum resistentia non parva inter dentes incisivos versari soleant. Fovea ossis temporum glenoidalis in carnivoris quam in phytophagis profundior est, quo fit,

ut in his motus expeditiores evadant. In carnivoris inferior maxilla sursum tantum et deorsum movetur; in glirinis vero anterius et retrorsum quoque, in pachydermatum familia sus, prout digestionis ratione aut glirinis aut bobus proprius accedant, hoc illove modo masticant. Hominis vero quacunque ex parte maxilla inferior movetur, cum manducatoria ejus organa perfectissima sint. Quod attinet dentes, nullum propria cuique actio fugerit.

§.9. *Insalivatio et deglutitio.* Tres succi considerari in his actionibus oportet, in unum coeuntes; membranae vapor mucosae serosus; tum succus ille, qui ex dispersis folliculis in otis cavum secernitur, latex mucosior, cum in singulis folliculis peculiaris glandularum salivalium fabrica jamjamque evanescat, adeo ut lingua v. c. et uvula muco obducantur; gravissima denique maximique momenti secretio, saliva proprie sic dicta; quae non modo in variis animalibus varia, sed pro tempore vario in eodem individuo etiam quantitate qualitateque differt: adeo ut in homine (de quo praeprimis nobis tractandum) eodem haec trium glandularum salivalium utriusque

lateris secreta non ejusdem prorsus esse qualitatis veri haud absimile arbitrandum sit. Namque textura non modo inter se distinctae, sed nervi parotidis quoque, quam glandulae submaxillaris duriores se praebent; illi modo N. faciale modo cervicalem tertium adeunt; hi autem e ramo linguali orti molles sunt, (ut nervi gangliosi) et ganglion nonnunquam formant. Saliva est latex clarus, colore frequenterque gustu destitutus et admixto ei muco magis minusve viscidus; in carnivoris acrior, subsalsa, in nonnullis hominibus kali continet liberum, in aliis vero neutra est. Praeter Hapel de la Chenaye <sup>51)</sup> nemo forsitan p̄ram perscrutatus est salivam, ex ductu equi aperto sumtam, cuius tamen argumentatione minus etiam effici videtur, quam analysi recentiorum. Quippe cum zооchemia tunc temporis minus cautē adhibita sit, quam nostra aetate, v. c. Berzelio aliisque tractatur; quo docente maximam aquae copiam saliva continet nonnullaque salia cum aliis succis communia. — Materies salivalis Bostokio <sup>52)</sup>, Berzelio <sup>53)</sup> aliisque reperta minoris

51) Mem. de la sociéte roy. de Med. de Paris 1780 et 81.  
p. 525.

52) Journ. d. Chem. von Ghelen. IV. 554.

53) Schweigger's Journ. X. 432.

aestumanda esset; majoris vero forsan materies Treviranico observata, acor sanguinis et natrum saccharolacticum. — Organorum masticationis multiformi effectu cibus in homogeneas partes comminutus, illis nunc succis imbutus in lubricam pulvis instar massam commutatur, quae animalem jam obtinet odorem aeremque communem. Quotidiana didicimus experientia, salivam in alimenta non mediocrem vim exserere; ita ut carnis frussum ne manducatum quidem diu in ore locatum colorem amittat et mollescat. — Quo manducatio et insalivatio perfectior, eo facilior digestio et expeditior esse solet. Ciborum gustus edenti gratus organa secretoria musculosque incitat. In oris cavo fluidas et dissolutas alimenti particulas resorberi vel ex eo patere videtur, quod potus diu in ore moratus sitim paululum sedat. Massa manducata in frustum paulatim subacta in partem pervenit superiorem linguae, organi in deglutiendo efficacissimi. Dum cibus deglutitur, non fieri potest, quin, larynge in altum sublato et trachea clausa, respiratio interrumpatur. Glottidem in deglutitione ipsam claudi, antiquissimo jam tempore creditum est <sup>54)</sup>; atque Ma-

---

54) Halleri El. Physiol. Lib. LXVIII. p. 87.

gendie <sup>55)</sup>), investigandae hujus rei causa experimen-  
tis in canibus a se factis, solam fere hanc esse causam  
opinatur, ut, dum deglutitur, ne mica quidem in  
tracheam intret. Contra quem vero Meyer Bernen-  
sia <sup>56)</sup> epiglottide laryngis aperturam claudi oportere  
contendit, faustisque auspiciis defendit. Ac re vera,  
organon ad functionem quandam nil facere, inde col-  
ligere, quod, eorenoto, functio continuari quodam-  
modo possit, falsum esset. Iterum Magendie omnium  
adoritur illam sententiam in glintiendo pharyngis mo-  
tum esse voluntati obnoxium <sup>57)</sup>: nec omnino, con-  
cias nervis, aut cerebrali aut organica nervorum effi-  
cientia motum regi, dijudicare potest. Motus de glu-  
titionis diu continuatus nonne desatigatione potius sen-  
sim retardatus operosiorque evadit? — Voluntas haud  
dubie regionem non nisi parvam pharyngis temperat;  
frusto verum in oesophago haerente, deglutitionem in  
pharynge voluntarie incipimus; qua oesophagus ad  
actionem provocetur <sup>58)</sup>. Inter diaphragmatis crura

55) Mem. sur l'usage de l'epiglotte dans la deglution.  
Etiam Physiol. II. S. 60.

56) Galib. med. Ztg. 1814. № 62. 1815, № 16.

57) Physiol. II. S. 18.

58) Walther I. c. S. 44.

transeuntem oesophagum, diaphragmate dum respiratur contracto, licet leniter, accurate tamen comprimi verisimili est. Quemadmodum deglutiendis in pharynge cibis trachea, ita in respirando oesophagus, alternis vicibus, clauditur <sup>59)</sup>). Duae oesophagi partes superiores haud facile, nisi transeunte cibo, contrahuntur; inferior vero tertia continuo per vices contrahitur et relaxatur; frusto vero jam in ventriculum detruso, ad longius tempus contracta manet. Omnes post-hac fibrae subito relaxantur <sup>60)</sup>). Ceterum cibus, dum oesophagum percurrit, serosis et mucosis laticibus commixtus, magis magisque dissolvitur.

§. 10. Digestio in ventriculo. In media circiter ventriculi parte contractio perpetua observatur, vel post mortem remanens. Lupi, cui radix Aconiti napelli data erat, ventriculus modo ad pylorum, modo in medio constringebatur <sup>61)</sup>). Idem in catulo apparuit <sup>62)</sup>, insigniter etiam in cane aconito venena-

59) Eucä Entwurf eines Systems der med. Anthrop. Frankf. a. M. 1816. I. S. 205.

60) Magendie's Phys. II. S. 19.

61) Wepferi hist. cicut. aq. L. B. 1753. p. 329.

62) Ib. p. 281.

to<sup>63)</sup>; cuius ventriculus exsecatus vermiformi motu agitabatur, superiore ejus fine tantopere constricto ut aquae ne gutta quidem transire posset; tum contractio in media parte cum motu lento pylorum versus directo subsequebatur, ex quo erecto fluidi non multum modo leniter modo subsultim profluebat: quo facto et pyloro rursum contracto, medium ventriculi iterum contractum, cardia vero semper clausa observata est. — Haller quoque in medio ventriculo contractionem saepe observavit, quae quantum digestionis referat, Homme<sup>64)</sup> primus intellexit, juxta quem et Burns<sup>65)</sup> ventriculus mammalium alimentis digestu facilibus vescentium (ut carnivorum) ex partibus constat duas, cardiaca (splenica) parte, et pylorica, non nisi inter digestionem dispartitis. Quorum vero animalium difficiliora concoctu sunt alimenta, in plures ventriculus partes est divisus. — His praecipue adnumeranda sunt ruminantia. In avibus<sup>67)</sup> ex familia gal-

63) Wepferi hist. cicut. sq. L. B. 1733. p. 226.

64) Qp. Min. Exp. p. 303.

65) Phil. transact. f. the Y. 1807. P. I. p. 139.

66) Edinb. med. and surg. Journ. V. VI. p. 137.

67) Spalanzani's Vers. über die Verdauung u. s. w. 1785. S. 8, 10, 13, 16.

linarum hae contractiones tanta vi agunt, ut vel tubos metallicos comprimant vitrumque contundant. Minores quidem sunt in animalibus ventriculo membranoso praeditis; in plurimis nihilominus polypis et insectis obviae fiunt. Contractiones et extensiones, invicem succedentes, in variis simul ventriculi partibus locum habent, quo non raro contingit, ut ventriculus articulati speciem ostendat. Motus vermiformis, donec alimenta in chymum abeant, modo sursum modo deorsum dirigitur. Quod alimenta per neutrum ventriculi orificium elabuntur, Magendie<sup>68)</sup> in inferioris tertiae oesophagi partis actione quaerit; cuius contractiones vehementiores sint longiusque durent; quo extensior ventriculus. At vero et ventriculi partes orificiis contignae ad hanc rem, experimento Weppferi saltē docente, tribuere videntur.

Nunc sequitur, ut de ventriculi sensibilitatis ratione disseramus<sup>69)</sup>. Apud omnes fere gentes bis per 24 horas cibi sumendi mos est, ab antiquissimis iis haud dubie nobis traditus temporibus; ubi homines

68) l. c. p. 75.

69) Clefs in Meckel's Arch. f. Phys. V. p. 67 sq.

immensa et superflua nondum ad vitam necessaria sibi duxerint. — Ex somno ex perfectis edendi bibendi que apparet desiderium, magis magisque augetur, donec 10ma aut 12ma hora ad summum pervenit; tum diminuitur: vesperi quintam inter et octavam horam crescere rursus solet. — Quae appetitus decrementi et incrementi vicissitudines observari forsitan in iis potissimum possent, qui fame pereant. Vitae aetas, sexus aliaque efficiunt modificationes. Quo minor aetas, eo saepius appetitus revertitur. Sequior sexus infanti hoc in respectu propior: in menstruatione et in primis graviditatis mensibus minus cibi cum postulatum fatre potest. Quae mammæ parvulo præbet multo eget cibo, meliusque concoquit. Ut temperamentum phlegmaticum culminationis fere punctum adsequitur in cretino, qui, ut ita dicam, totus est gaster, ita etiam phlegmatici cuiusque ei simillimi immoderatissimus et ab omni ordine maxime alienus est appetitus. Ventriculi sensibilitas accuratissimas periodos servat in melancholico, cuius et cholericu*e*i finitimi, ciborum desiderium ad conservandi sui instinctum evicitur, et quam in sanguinico ad varietatem continuam propenso, rarius modum excedit. Quanto ce-

terum climatis et anni temporum in reproductibnem generatim et praesertim in digestionem sit efficacia, neminem ignorare puto. Sympathia ventriculum cum aliis systematibus et organis nectens, variis phaenomenis manifestatur. Medium stigmatum par, quorum ope in nonnullis insectis ventriculo aër suppeditatur, tempore digestionis potissimum contrahitur <sup>70</sup>). Animalia bene saginata citius quam fame emaciata, mephitici aëris respiratione vita privantur <sup>71</sup>). Acidum carbonicum post largam coenam copiosius, quam post diuturnam esuriem evolvitur <sup>72</sup>). In pluribus helicis speciebus, cum copiose avideque edissent, non diminutum, sed auctum aëris respirati azoticum observationes Spallanzanii docuerunt <sup>73</sup>). Exspirati acidi carbonici copiam intra decimam matutinam et secundam post meridiem horam, maxima; — intra octavam noctis et tertiam horam, minima esse solet <sup>74</sup>). — Dum cibus in ventriculo digeritur, transpiratio cutis maxime diminuitur. Antipathiae memorabilis et sym-

<sup>70 — 72</sup>) Sorg disq. physiol. circ. respirat. insect. et vermium. Rudolst. 1805. p. 136, 16, 17, 81, 161.

<sup>73</sup>) Mem. sur la respiration. Genève 1803. p. 230,

<sup>74</sup>) Prout in Meck, Arch. Bd. II. 5, 145.

pathiae ventriculum inter et cerebrum, multi experientiis probatae, obiter tantum moneo.

Individua etiam exstat ventriculi secretio. Sitne vero succus gastricus nec ne; qualisque sit, multi in utramque partem disputavere. Alii nihil eum esse nisi fluidum ex salivā, muco et vapore commixtum opinantur. Quod si vero singulares ejus qualitates ex natura harum materiarum satis notarum dēduci non possent, tota in eo versaretur quæstio; ut, qualis ejus sit peculiaris character, investigaretur. In plerorumque animalium ventriculo, aut ante aut illico post mortem dissecatorum hic succus est clarus; subflavus, sapore subamaro et salso; in animalibus quatuor superiorum classium liberum continet acidum<sup>73)</sup>: Quod quidem in dubium vocant nonnulli, inter quos Spallanzani; experimentis vero nihil probantibus; tum quia succo vomitu ejecto usi sunt, majore licet cum copia bilis commixto; a normali iudole abhorrente, tum quia alcalia non sat expeditè reagunt. — Lac et albumen eo spissabantur, quod quidem et aliae dunitaxat animales efficiunt materiae; sed crōtonis tint-

73) Trevitatus l. c. p. 550:

turam rubram reddi Viridet observavit in *suibus*<sup>76)</sup>, Werner<sup>77)</sup> in *equis*, *ovibus* et *cuniculis* aliisque; Brugnatelli in *pluribus* et *carnivoris* et *granivoris avibus*<sup>78)</sup>; Neergard<sup>79)</sup> in *gallinis* et *falcone lagopode*. — In *oesophago suis succo prorsus non mutari crotonis tincturam, in ventriculo vero insigniter rubescere* Viridet perhibet<sup>80)</sup>. — Majoris etiam *momenti*, quod, docente Werner, *alimentum in superiore equini ventriculi parte nondum dissolutum in crotoneum parvam tantum efficientiam edidit; maiorem vero in ima ventriculi parte; maximam chymus prope pylorum*. — Idem in *avibus* Werner *animadvertisit*. Montegre etiam, *succum gastricum plerumque esse acidum, et talem in pigmenta vegetabilia manifeste reagere, confirmat*<sup>81)</sup>. Quod qualeque *hoc acidum galacticum videtur, jam in saliva obvium*<sup>82)</sup>. Nec

76) Tract. med. phys. de prima coctionie Genev. 1692.  
C. 10, 11, 12.

77) Diss. sist. exper. circ. modum quo chymus in chylum mutatur. Tübing. 1800. p. 7, 9, 11, 56.

78) Trell's Beitr. zu den chem. Annal. Bd. I. St. 4.  
S. 74.

79) Vergl. Anatomi. und Phys. der Verdauungssw. der Säugetiere und Vögeln. Berlin, 1806. S. 125, 166.

80) l. c. p. 224.

81) Gazette de santé 1812.

82) Treviranus l. c. p. 358 sq.

Verisimile idem ubique esse. Macquart aliique phosphatem enunciant; in nonnullis ex gallinarum familia avibus fluoricum adfuisse acidum, ex quibusdam Plateri <sup>83)</sup>, Spallanzanii <sup>84)</sup> et Treviranii <sup>85)</sup> observationibus patere videtur.

Nervus pneumogastricus digestionis in ventriculo maxime refert: primo enim Brodi experimentis compertus est, secretionem mucosam et aquosam, quae in ventriculo, dato arsenico, copiosior ordiri soleat, his nervis (tum ad cervicem tum sub diaphragmate) dissecatis, statim fere cessare <sup>86)</sup>). Secundus nervorum dissecationis effectus eo manifestatur, quod, observante Wilsone <sup>87)</sup> Philipo, alimentum in ventriculo plane incoctum manet, peristaltico motu non sinente: quo fieri potuit, ut, ni vomitus impediret, alimenta tandem in duodenum pervenirent. Simul idem animadvertisit, nervo persecato et cum pilae Voltanae po-

83) Blumenbach vergl. Anat. S. 149.

84) l. c. p. 10, 13 etc.

85) l. c. p. 359—363.

86) Meck. Arch. I. p. 426.

87) Eine auf Vers. gegründete Untersuchung über die Gesetze d. Funct. d. Lebens u. s. w. Aus dem Engl., von Joh. v. Sontheimer. Stuttgart, 1822. Vers. 44, 45, 71, 72, 73.

lis armato, diu nec respirationem difficultem nec digestionem impeditam apparere; — adeo ut, cuniculo etiam mortuo, chymum ventriculus contineret, neque odore petroselino neque adspectu similem; paulumque ab eo chymo in cuniculi hoc experimentum non passi ventriculo differebat. — Multipliciter hujus experimenti reiterati iidem fuerunt exitus. Cuniculos ad XVI horas nec respirationis nec digestionis intercedente, vivos servare Philip successit. Regiae societatis Londinensis socii, Philipi experimentis examinandis designati, ei refragabantur. Broughton etiam, eodem experimento quindecies repetito, in cunicibus, equis cuniculisque, efficere inde se putat, non necessarie statim persecatum nervum digestio-  
ni turbationem sequi<sup>87)</sup>. Cujus sententiam Magendie quoque probavit. — Philip vero omnia experimenta, Brodio aliisque celeberrimis sociis praesentibus, redintegravit<sup>88)</sup>. Trium cuniculorum per XVI horas esuriem passorum, dato petroselino, duobus illico ambo in collo nervi persecabantur: alterius

87) Journ. of science, literature and the arts etc. 1821, Jan. No. XX.

88) Ibid. No. XXIII.

eorum nervos eum in modum armavit, ut galvanicae columnae polus — praecordiis, polus t̄ vero in locum praecisionis apponetur; quo facto, idem, qui supra, eventus erat. Alteri contrā cuniculo, nervo exsecato nec tamen armato respiratio gravari, nisumque ad vomitum oriri animadversum est. — Omnibus tribus eodem tempore necatis, in cuniculo operationi non subjecto omne fere alimentum jam concoctum fuit; idem prope in secundo apparuit, cujus nervi dissecati et armati fuerunt; in tertio autem alimentum perspicue non digestum, sed calore fluidisque paulisper tantum mutatum fuit. Causam vero, qua Philipi observationes antea confirmationē destitutae visae essent, Broughon in eo reperiit, quod utriusque nervi finibus non satis alter ab altero sejunctis, conducendi ipsorum facultas sublata non esset<sup>89)</sup>.

Cum ventriculus alimentis impletur, pars ejus pylorica contrahitur, quo praecipue medium versus organon et in partem splenicam contenta pelluntur: quo fit, ut alimenti crudi aut parum aut nihil in pylorica parte remaneat. Partem cibi valde parvam ven-

triculus cunctis ex partibus amplectitur<sup>90)</sup>. Vomitu cibum, dimidia hora post cibatum praeterlapsa, redditum, Gossi<sup>91)</sup> paene omnino non mutatum invenit; eodem enim fuit gustu, eodem fere pondere et succi gastrici parum admixtum. Post horam cibus cum multo succo gastrico misitus puluis formam accepit; duabus horis post simile prandium, cibi dimidiaturum partem ejusdemque qualitatis vomitu ejecit. Quo vero efficere, post aliquot certum tempus, post horam circiter, alimenta mutatum iri, praepostere et incautius esset. Namque multa hic agunt; nec eodem temporis spatio omnia cibi genera subeunt mutationem: quippe quae interdiu citius, nocte tardius incipiat; citius minore quantitate, fluidiore et probe masticato cibo, quam multo, solidiore et male comminuto. Alimenta concoctu non idonea in ventriculo diutius commorantur, quin etiam, mutatione ne incepta quidem, ductum intestinalem transeunt. Frustum panis, ceteris cibis in chylum jam mutatis, in ventriculo remansisse expertum est.

90) Walaeus de moto chyli in Th. Bartholeni anat. L. B. 1763.

91) Spallanzani l. c. p. 398.

Eadem exhibuit Viridet observata<sup>92)</sup>). In cuniculi ventriculo paulo ante mortem pasti, quam alimenti partem animal postea consumserit, eam nunquam cum priore commisceri, sed ab hoc in medio ventriculo circumdari, animadversum; interdum vero in superiore ventriculi parte inter recentissime comedendum cibum et ventriculi curvaturam parum nihilve antecedentis morari cibi. Inprimis si novum ab antecedente alimentum differt, limes inter utrumque stratum perspicitus est<sup>93)</sup>). Quae cum ita sint, mutationem a superficie, ubi molle exoritur stratum, versus centrum progredi patere videtur<sup>94)</sup>). Quoniam vero modo inter chymosin gradatim fiant mutationes, exponere perdifficile esse nullus dubitat. Viva animalia carnivoris devorata, primo emoriuntur; plantae virides et recentes pallescunt et flaccescunt; caro, rubore amisso, cinereum obtinet colorem. Quae in ventriculo vivere possunt animalia plane non digeruntur, exemplo hirudinum,

92) De prima coct. et ventriculi fermento, Gen. 1691, p. 253.

93) Philip. Eine auf Vers. gegr. u. s. w. 49, 50.

94) Magendie. II. p. 81.

ranarum, angium. Semina, cum ductum intestinalem digestione non adfecta transeunt, germinandi vim tueruntur. — In ventriculo carnivorum coalescit albumen et lac; posterius brevi in herbivoris. Caro emortua, plantae flaccidae, materies lymphatica coagulatae, omnia generatim digestibilia mox dissolvit et in pultem mutari incipiunt<sup>95)</sup>). Cibi in minore curvatura minime sunt concocti<sup>96)</sup>; magis in fundo ventriculi; magis etiam in curvatura majore; eoque perfectius, quo propiores pyloro adjacent. In nosocomio Caritatis Parisiensi in foemina, fistula ventriculi laborante, cibos, antequam fluidi formam acceperant, solidiores esse factos, observatum est<sup>97)</sup>). Philip autem contraria perhibet; compactius alimentum et siccus esse ad pylorum, praesertim digestione jam proiecta, quam prope cardiam, ubi multum fluidi extet<sup>98)</sup>). Prout concoctio magis minusve peracta fuerit, pylorum versus moveri cibus videtur, perfectioremque subire digestionem, idque hac ratione, ut extremo ejus strato,

95) Autenrieth's Handbuch d. menschl. Phys. Tübingen, 1802. II. §. 591.

96) Dict. d. sc. med. T. IX. Digestion p. 411.

97) l. c. p. 118.

jam digesto atque ad pylorum ducto, novum stratum magis minusve succo utique mutatum succedat. — Quibus rebus et formatione corpusculorum, qualia Homē in cuniculis observavit, Philip, in pylorica parte quam alibi, licet magis concoctus sit cibus, colligit in ventriculi nihilominus fundo p̄aeprimis concoqui. In foeminam nempe mortuam perscrutatus, excepto fundo, Hastings exulceratum deprehendit ventriculum; eumque ad mortem usque, excrementis enim cibos concoctos fūcse probantibus, munere suo functum esse. Quid multa? Certum utique videtur, chymosin, cum in directione a cardia pylorum versus tum a peripheria alimenti ad ejus centrum, varios et gradu et qualitate distinctos status exhibere. Quid succus gastricus, non qua fluidum spectatus, efficiat, quidve actioni ventriculi tribuendum, explicari et discerni nequit, etsi multi conati sint. Minime vero, quæ magni momenti ducantur, dignae sunt eae artificiosae digestiones, a Reaumurii et Spallanzanii inde temporibus institutae; nil enim demonstrant, nisi neglectam plane vitam. Nec ipsa recentiora experientia Montegrii <sup>99</sup>), cum saliva et succo gastrico insti-

tuta, gravius physiologiae bene fundatae documentum existunt.

Quamnam sensibus obnoxiam chymus qualitatem ostendat, nunc quaerendum est. Si ejus colorem, densitatem aliaque species, tot genera sint oporteat, quot nutrimentorum; confirmante etiam Magendie<sup>100</sup>), qui saepenumero se in cadaveribus hoc deprehendisse dicit. — Verum enimvero observatores plerique inter se consentiunt, esse chymum materiem cinereo, nonnunquam et subflavido colore, animali et fastidioso odore et sapore, semifluidam, mucosam varisque particulis dissimilibus compositam, in qua, nisi ossa, grana, aliaque indigestibilia continuerit cibus, hujus qualitates jam discerni nequeant. Perspicue acidus esse solet chymus, ut et metalla oxydet, et chartam crotone tinctam rubram reddat. Quod Magendie quoque confirmat<sup>1)</sup>). Ante prandium Montegre magnesiae dosin sumsit maiorem quam ut acidi in ventriculo copia saturaretur, atque in massa brevi post prandium vomitu reddit, quamquam digestio jam inchoata erat, acidi fere ne vestigium quidem ani-

<sup>100</sup>) l. c. p. 80.

<sup>1)</sup> Ibid. p. 81.

madvertit; paulo serius vero evomita et melius concocta fuit et acidi non parum continuit. Eodem observante, caro, magnesio obducta et aliquot tempus in ventriculo morata, acidum ostendit saporem <sup>2)</sup>). Chymus et eorum animalium, quae vegetabilia tantum ederant, principium carnis extractivum olebat <sup>3)</sup>. De chymi elementis nimis parvus diligentiorum est indagationum numerus. — In alimenti concocti fluida parte et percolata gelatinæ permultum, acidum quoddam fixum et liberum (galaticum forsitan?) et ferrum summe oxydatum aliaque contineri, albuminosæ materiei vero nihil, cum calore nil coagularet, Emmert disquisitionibus egregiis exploravit <sup>4)</sup>. Nec Prout albumen in chymo ventriculi invenit <sup>5)</sup>. Quam quidem indolem gelatinosam Emmert in equo deprehendit, animali herbivoro, cuius ergo pabulo elementa, praesertim gelatinosa et amylacea insunt. In illa, de qua supra diximus, foemina in nosocomio Parisiensi gelatinæ in cibo digesto copiam esse auctam animadversum est. — Dumas etiam hanc re-

2) l. c.

3) Treviranus l. c. p. 373.

4) Reil's Arch. VIII. p. 176. Ann.

5) Meckel's Arch. VI. p. 80.

gulam profitetur generalem, in universo (?) ductu intestinali mucoso-gelatinosas materias progigni et augeri<sup>6)</sup>. — Quoniam et animalium et vegetabilium materiarum albumen sit elementum prae ceteris nutritiendi vi praeditam, quaenam ejus in resolventia media sit actio, Treviranus investigatu opus esse automat, et longa satis experimentorum serie eluxit, certo quodam acidationis gradu in gelatinam albumen mutari<sup>7)</sup>. — Hatchett jam pridem observavit, albumen diu acido nitrico diluto impraegnatum in aqua fervida dissolvi, atque, aqua evaporata, in materiem gelatinosam redigi, quae, tauniti ope, eodem fere modo ac colla praecipitatur<sup>8)</sup>. — Treviranus quoque, albumen cum acido phosphorico et aqua mixtum in veram converti gelatinam, compertus est. Investigationes recentioris zoothemiae discrimina inter animales materias non sat distinete circumscripta esse generatim docent: mucum enim, materiam fibrosam aliaque nihil aliud esse videri, nisi ejusdem materiae albuminosae modificationes. Illa vero experimenta

6) Principes de Physiologie. Paris, 1807.

7) l. c. p. 364.

8) Phil. trans. Y. 1800. P. II. p. 327.

ejusdemque generis alia, quum extra organismum facta sint, magni nequaquam aestumari possunt; iisdem tamen comprobantibus, augurari nobis sane licet, materias dissolubiles in ventriculo muci seu gelatinæ naturam adoptare.

Restat ut quaeramus, num alimentum perfectius digestum jam in ventriculo absorbeatur? — Sunt qui contendant, in ventriculo etiam tenue bilis stratum, e.g. in vivisectionibus, inveniri <sup>9)</sup>). De quo Haller, frequenter, inquit, in ventriculum (sc. bilis) reddit, frequenter non semper. Saepe flavum in stomacho mucum vidi, et in homine et animali sanissimis, in cane, fele <sup>10)</sup>). Cui adsentit et Morgagni <sup>11)</sup>). In nonnullis insectis sub aqua vivis adhuc dissecatis, chylus inter utramque ventriculi membranam reperitus, interiorem penetrasse videbatur <sup>12)</sup>). In argulo foliaceo, corpore pellucido, contenta in ventriculo ejusque additamentis materia vel hoc vel alio loco apparere et disparere Jurino visa est; quo patuit alimento, in ventriculi digestione, nutrientes partes se-

9) Dict. d. sc. med. l. c. p. 410. Etiam Bichat l. c. l. p. 411.

10) El. Phys. Lib. XIX. Sect. IV. §. XXII.

11) Advers. III. p. 66.

12) Ramdohr l. c. p. 28.

cérni, et excrementias protinus in coecum transire<sup>13)</sup>). Inde effici videtur, in inferiorum ordinum animalibus aliquam alimentorum partem jam ex ventriculo in succorum massam resorberi. Hocce num in altioribus animalibus quoque contingit? Fluida, in primis aquam puram, maxima ex parte absorberi tantum abest, ut veri speciem prae se non ferat, ut potius fluidum gigni chyloïdeum videatur, praesertim si multiplicia exempla bilem in ventriculo existare probatura sint. Potiones, aqua, alcohol aliaeque, aut chymum omnino non praebent, aut ex parte tantum aut denique penitus fere in chymum mutantur. Potus, maxime communis est aqua, quam (et alcohol) a materiis ei admistis, concoctioni idoneis, secedere, plurimis experimentis et observationibus in homine Magendie colligere posse arbitratur<sup>14)</sup>). In splenica parte accumulari fluida, neque, applicata circum pylorum ligatura, multo majore temporis dispendio e ventriculo excedere experimentis suis eruit Home<sup>15)</sup>), cui et Magendie adsentit; adeo ut aquosa fluida per

<sup>13)</sup> Annales du Mus. d'Hist. nat. T. VII. p. 439.

<sup>14)</sup> l. c. p. 124.

<sup>15)</sup> Phil. transact. Y. 1808. p. 45, 153.

vasa lymphatica, tunc insuper succi fere vacua, non transire veri maxopere sit simile; sed per venas stagnendum est<sup>16)</sup>). Quo vero minime intelligi volo, cum chymo nullam fluidorum partem in duodenum pervenire.

Quod attinet ad ventriculi evacuationem in duodenum, Magendie haec obseruavit<sup>17)</sup>. Post maiorem minoremve intercapedinem in medio fere duodenoccontractio, ad pylorum usque persinens, incipit, quam sphincter et pars pylorica participant. Hi motus chymum in splenicam promovent partem. Quo facto, pylorica dilatatur pars, et chymus, volumine ad summum aquae duarum vel trium unciarum, colligitur: tum, motu progressivo a cardia ad pylorum exerto, in duodenum chymi aliqua pars conducitur. Aliquanto post omnia haec phænomena reiterantur. Si quando multum ventriculus cibi continet, motus in parte solummodo pylorica exstat; sed, prout cibus deducitur, eo magis propagatur, ut sub chymosis finem universo communicetur ventriculo. — Sunt qui opinentur, diaphragmatis contractiones multum

<sup>16)</sup> Treviranus l. c. p. 466.

<sup>17)</sup> l. c. p. 82.

facere ad expellendum cibum, quod quidem cum Hallero <sup>18)</sup> in dubitationem vocari potest: contractiōnibus enim his, licet directionem praecipue versus pylōrum non admodum constantem sérvent, vel subtilissima corpora ejiciuntur; sequeretur insuper, quoties cunque aēr inspiretur, chymum expelli. Quamdiu perduret digestio in ventriculo, variae sunt sententiae alia ab alia discrepantes: nam multia ex causis citius tardiusve perficitur, raro tamen quatuor vel quinque horarum temporis spatium excedit, quo contra sex ad minimum horas ad digestionem opus esse Macdonald contendit <sup>20)</sup>.

§. II. Alimenta aut vegetabilia sunt aut animalia. Ac tamen Pallas, Bonnet, Bory de St. Vincent quaedam animalia et mineris vesci narrant <sup>21)</sup>, quin etiam gentes quasdam vel terrae lapidumque quaedam genera devorare, neminem fugit. Quod ut

18) Lib. XVIII. S. IV. §. 4.

19) Magendie l. c. p. 85.

20) Diss. inaug. sist: exp. quaed. de ciborum concoct. Edinb. 1818. Exp. 16. — Etiam Meckel's Arch. VI. p. 563—566.

21) Treviranus l. c. p. 284 sq.

memoratu maxime sit dignum, animal tamen inveniri, quod solis mineris alatur, minime inde sequitur; etiamsi mineralium quandam quantitatem in chyli compositionem transire posse rationi non repugnet. Huc accedit, quod nutrimenti aliquid inhaerere mineralis non admodum est obsolum. Qui rei vero aqua, per cuncta tria naturae regna dispersa, nihil argumenti affert. — Animalia, pro nutriendi ratione, dividuntur in carnivora, herbivora et omnivora: ac dici fere licet singulam familiam singulumque individuum alia alimenta aliis praeferre. Pauca animalium genera eatenus aut huic aut illi adnumeranda sunt classi, quum modo hanc, modo illam, nutriendi rationem sequantur; ut etiam, necessitate cogente, nutriendi modum prorsus mutent. Quo inferior animantium clasis, eo saepius occurunt carnivora. Homo, cum aliis rebus tum eo etiam praestat, quod utrumque naturae regnum alimenta ei suppeditat; herbivoris tamen eum potius adnumerandum esse, ut ex rebus multis, ex dentium praesertim numero, qui 20 herbivororum, at 12 tantum carnivorum sistunt. Antiquissimis etiam traditionibus homo vegetabilibus solis vescens perhibetur; hoc alimenti genere utuntur Asiae meridionalis, Africae regionumque tropicarum Americae habi-

tatores; — Persae et Aegyptii praeter dactylos paene nihil edunt, ficus Arabes et qui Asiam minorem incolunt. Sed haec hactenus. — Quodsi vegetabilia alimenta quam animalia efficaciorē requirunt digestionem, incolarum etiam meridionalium plagarum, quam eorum, qui boreales incolant, gastricum systema minus vigore animadvertis; accedit et climatis efficacia, ut incolam calidarum regionum tot tantaque condimenta cibis admiscere nihil sit, quod mireris. — Pro terrarum quas habitat, situ, et climatis indole alimento genū etiam homo eligit sibi: sic Anglus, dum in tropicis vivit regionibus, animalēm victum, quamvis ipsi usitatum, servare raro impunē audet. — Quo magis perspicua informatio de cibi in intestinali ductu mutatione erui accuratiusque de ea judicari possit, primo variorum succorum ad cibum accedentium, indolem noscamus, quibus elementis cibi compositi fuerint indagēmus, tum denique concoquendū alimento, habito absorptionis respectu, per totum tractum intestinalem analytice perscrutemur oportebit. Analysis autem generalia tantum fragmenta exhibuit, nec, qui hodiernus est status, multa ne exspectare quidem ab ea sinet. Raro iis, quae propria alimento,

rum dicuntur alimenta, ut saccharum, mucus aliaque,  
 vescimur, sed eorum congregatio nostrum consuetum  
 componit victum. Pari modo analytica basis non sem-  
 per maximi putanda est momenti. Homo edit ossa,  
 cartilagines, carnem aliasque animalium calido et ru-  
 bro sanguine praeditorum partes molles, perro pisces,  
 insecta, fungos, farinam, mucum vegetabile, amy-  
 lon, aliaque imo et materiam ligni fibrosam. Ambo  
 hujus seriei extrema non nisi intestina percurrere vi-  
 dentur, nec digeri. Aliae in alias transeunt, ut car-  
 nis et farinarum varia genera; animalia et vegetabilia  
 quodammodo comparari inter se posse videntur, v. e.  
 albumen, gummi et mucus animalis aliaque. Quid  
 quod in glutine terra calcaria et azoticum? — Inqui-  
 ramus nunc in generales alimentorum qualitates? —  
 1) Quodque alimentum binas ad minimum illarum  
 aeriformium basium continet, carbonicum nempe et  
 hydrogenium; hinc ternariae cum oxygenio conjunc-  
 tiones: materiae animales, cum majore azotici copia  
 ubique fere insigniuntur, quaternarias sistunt mixtio-  
 nes. — Quae vegetabiles neque acidae sunt materiae  
 neque resinosae, in iis oxygénium et hydrogenium  
 eandem inter se, qua aqua componitur, rationem ha-

bent, ut saccharum, amyrum, gummi etc. His additiones sunt, hujus rei respectu, materia albuminosa, fibrosa et caseosa; aliaeque, ita tamē ut praeponens hydrogenium sit. Cujus vero quo major est copia, eo etiam plus erit azotici, ut rationem fere eandem interesse habeant, quae in ammonio requiritur. — Vegetabilia contra, oxygenii copiam in ratione minore ad hydrogenium, quam in aqua, continentia, oleosa aut resinosa sunt, aut alcoholis natura insigniuntur. Hic pertinent animalium quoque pinguedinum genera. Tertiā acida, oxygenio praevalente, classem constituant<sup>22)</sup>. 2) Quae materiae, faciliter muturæ, nova elementorum connubia sistunt, paucis ut dicam, fermentationi idoneae, alimenta animali praebet corpore præsertim possunt. 3) Quodque alimentum plus minusve in aqua dissolvitur. Omnia haec in organicis praecipue materiis manifestata deprehendimus. — Videmus etiam connubia plurium propiorum partium, majori nutriendi facultate praedita esse, quam singulare quodque elementum, ut farina cum glutine, oleata cum saccharinis, materia fibrosa cum gelatina. —

---

<sup>22)</sup> Gilbert's Annal. der Phys. 1811. St. 4. S. 401.

Carnes generatim faciliiores sunt concoctu, quam vegetabilia, quae etiam variae intercedunt differentiae, ut fructus inter et gramina. Prae ceteris e bruto magorem, ex oryza minimam chyli copiam gigni, Macdonald perhibet<sup>23)</sup>). Quo faciliores digestu sunt cibi, eo majori nutriendi facultate interdum esse solent; nec tamen non inveniuntur, qui eo minus nutriant; et concoctioni minus apti, qui parum, et alii, qui large nutriant.

§. 12. Digestio in intestino tenui. In superiore duodeni horizontali parte chymus colore, acidum saporem et odorem servat, et semifluidus manet; in perpendiculari vero bili et succo pancreatico commiscetur, in universo praeterea ductu intestinali cum muco et succo enterico. Succus pancreaticus, colore, densitate et sapore saliva fere aequalis, docente Mayero<sup>24)</sup>, alcalino est sapore nec non salia, quae in omnibus secretionibus esse solent, ostendit. Accuratio vero analysis hucusque desideratur. — Quod,

<sup>23)</sup> l. c. Exp. 28, 29, 31.

<sup>24)</sup> Meckel's Arch. III. p. 170.

exsecato pancreate, neque digestio neque nutritio labefactatur, quin etiam appetitus increscit, erroneis autem conclusionibus praebuit. Singularem quidem et fortuitam (ut falso opinabantur) edacitatem non nunquam cum pancreate infirmo cohaerere experientia compertum est<sup>25)</sup>; nec non salivae plerumque secretionem tum augeri, quod idem, pancreate extirpato, fieri observatum est. — Similis antagonismus in insectis appendices pyloricas inter et yasa salivalia manifestatur<sup>26)</sup>. Concremenia denique lapidosa in pancreate oriunda salivalibus similia lapidibus, succi pancreatici cum saliva homologiam probare videntur. Num re vera tam parva succi pancreatici copia, vel in ipsa chylosi, secernatur, licet Magendie se vidisse contendat<sup>27)</sup>, maxime dubitandum esset.

Quid est bilis et quidnam de ea secernenda experientia docuit? — Prius tamen de splene perquirere juvabit. Splenicae arteriae ab aliarum arteriarum sanguine neutiquam differt; in yena lienali vero, quam in

25) Rahn scirrhorum pancreatis diagnosis, Götting, 1796. §. VI.

26) Treviranus l. c. p. 410.

27), l. c. p. 358.

aliis venis dissolutiorem esse sanguinem et fluidiorem plerique inter se consentiunt. Non solum post mortem, sed in vivisectionibus etiam Heusinger<sup>28)</sup> idem compertus est; simulque observavit serum minus clarum et rubrius; cuius ad cruentum erat ratio = 6 : 1. Fluidum ex splene undique percisso effusum, in loco subcalido collocatum, coauit et odorem quasi assati hepatis sparsit: cum aqua destillata dilutum et percolatum humoris subflavidi et subamari speciem obtinuit. Sanguinem venae linealis, reliquo venoso comparatum, majorem aquae et albuminis in sero minus oxydati, minorem vero copiam albuminis plus oxydati et materiae fibrosae in crassamento continere Heusinger prohibet: materiam insuper fibrosam in peculiari quodam desoxydationis statu, quo gelatinam aequet, versari. Quare sanguini arterioso quaedam oxygenii et azotici pars subtrahi videtur. De liene extirpato plures existant experientiae. Malpighi, Bohn, Brunner, Valisneri, Heister, Ortlob, Deisch, Mayer et Schmidt post excisionem urinae secretionem angeri observabant. Quod quidem Tiedemann et Gmelin<sup>29)</sup> juxta

28) l. c.

29) Vers. über d. Wege, auf welchen Subst. aus dem

eorum in cane experimentum, nec non edacitatem oriri negant. Ortlob bilem minus flavescentem, pallidam et aquosam reperiisse contendit, dum Bohn, Valisneri, Morgagni aliique maxime amaram et fuscum observabant; Schmidt vero densiorem, viscidam et minore acerbitate. Quae omnia pari modo Tiedemann et Gmelin rejiciunt. — Frequenter, non semper tamen, splene aducto hepar minus et vice versa invenitur; bilisque secretio in splenis morbis cum quantitate tum qualitate mutari solet. — Victor potusque in splenis volumen et sanguinis ejus mutand rationem permultum efficiunt<sup>30)</sup>. Quae mutatio tum praecipue obtinet, cum aut per ventriculum aut immediate per venam multum aquae in circuitum transmissum est. Animalibus raro bibentibus (glirinis) parvus est splen; carnivoris quam herbivoris minor esse solet; illorum vero bilis singulares obtinet proprietates, plus enim cholici continet; horum vero bili multum inest albuminis. Frequentे lactis butyracei

Magen und DR. ins Blut gelangen, über d. Verrichtung d. Milz u. d. geheimen Harnwege. Heidelb., 1820. C. 104.

30) Heusinger l. c.

et cerevisiae usu splen augetur, quo forsitan sit, ut maiorem in glirinis, dum lacte nutriuntur, inveniamus<sup>31)</sup>). Experimentis suis Home<sup>32)</sup> humores ex ventriculo per splenem in sanguinis circuitum pervenire, conjici posse efficit, quam vero opinionem postea retractavit. Adsentit ei nihilosecius Treviranus qui, quoniam ventriculi per vasa cum liene nulla est conjunctio, colligit, fluida educi ope telae cellulosa<sup>33)</sup>). In animalibus<sup>34)</sup>, quae lac cum aqua commixtum bibent, splenem valde extensem Heusinger deprehendit: cruentis ad serum ratio fuit == 1 : 5,8. Aceto vini cum aqua dato, splen fuit parvus, et vesicularum fere expersus; ejus vena sanguinis parum continuit serosamque partem non majorem quam in vena crurali. Idem evenit, si alcohol cum aqua biberant. Quia via in lienem fluida peryenant, nisi Trevisani probes hypothesis, minime perspicuum mihi esse fateor. — Splenem organis glandulosis secretoriis similem esse confirmare videntur: structura, vesiculae illae et vasorum distributio; exigua sanguinis copia, quantam in organis solummo-

31) Phil. trans. J, 1808. p. 45.

32) l. c. p. 514.

33) Heusinger l. c.

do, ubi sanguis peculiarem subeundus sit mutationem videmus; magna vasorum lymphaticorum vis in quoque fere secretorio organo obvia; denique nonnulla pathologica phaenomena. Lien, probante Tiedemannō<sup>34)</sup>, cum glandularum lymphaticarum evolutione in animalium classibus nexu quodam jungi videtur, quin etiam multisario suorum vasorum intertextu structuram harum glandularum repetit. Jamjam Ruysch glandulam nominaverat sanguineam<sup>35)</sup>. Cum porro in testudine Myda omnia vasa ductus intestinalis lymphatica in lienem decurrant, ex quo trunci maiores ad ductum thoracicum viam petunt, lien in testudinibus glandulae mesaraicae more se habet<sup>36)</sup>. Insuper Mayer<sup>37)</sup>, Tiedemann et Gimelin<sup>38)</sup>, liene extirpatō, glandulas congregatas (cum mesenterii tum reliqui corporis) auctas fuisse et tumefactas comperti sunt. Denique vasa lymphatica lienis, etiamsi animalia consueto vescerentur pabulo, humore quodam rubicun-

34) l. c. p. 87 sq.

35) Observ. Anat. chirurg. Cent. Obs. 51. p. 48.

36) Tiedemann l. c. p. 89.

37) Galjb. med. chir. Atg. 1815. III. p. 189.

38) l. c. p. 105.

do repleta fuisse, jam Hewson<sup>39)</sup>, nuperime Tiedemann et Gmelin<sup>40)</sup> pluries observabant. Humor ille, perforatis effusus vasis, citissime in massam mollem, rubellam coauit, et postea non semper serum discessit: indole sua a chylo vasorum lacteorum et lymphā omnium lymphaticorum saltem discrepare videbatur. Qua vero ratione haec lymphā rubicunda, coaguabiliſ ſecernatur, Tiedemann nondum perspicuum est; aut in illis corpusculis glandulosis, aut inter arteriarum ſubtiliſſimos ramulos vasaque lymphatica via injiciendis fluidis patet. Quam anastomosin experientijs suis comprobant Bartholinus, Nuck, Cowper, Morgagni et Monro; recentiſſime quoque Schmidt, Tiedemann et Gmelin<sup>41)</sup>. Liene extirpato, chylum ductus thoracici limpidum, subalbidum, fluidiorem fuisse; dum refrigerebat eximie parum crassamenti multo ſero innatans, et aeris diurno effectu colorem subrubicundum ostendisse; — Tiedemann et Gmelin comperti sunt<sup>42)</sup>. Ceterum addam in ovo incubato prima lienis

39) De Methodo, quo rubrae sang. particulae formantur in Op. posth. L. B. 1785, p. 88, Exp. 1, p. 89, Exp. 2.

40) l. c. p. 90.

41) l. c. p. 95.

42) l. c. p. 99 &c.

rudimenta circa 168vam apparere horam, hepar vero, tunc ex parvulis coecis constans intestinis, hora 68 jam conspicit. Quaenam ratio voluminis in animalium serie lienem inter et hepar sit, eandem in foetu humano, in infante et adulto esse Heusinger docet.

Reliquarum venae portarum radicum origo cuique nota. In venis mesentericis sanguinem esse spissiorem, lentum, et nigriorem quam v. c. in vena cava omnes fere consentiunt; characterem igitur prae se fert majoris venositas, ideoque plus acidi carbonici continere videtur. Qui sanguis, propiorum ratione ejus elementorum, pari modo examinetur, quali Heusinger in sanguinem venae lienalis scrutatus sit, nemo est qui non desideret, — Ad ipsam nunc accedamus bilis secretionem. Jam Sylvius<sup>43)</sup> ex arterioso sanguine bilis originem trahere opinatus est; quam sententiam Bichat<sup>44)</sup> his suffulcit argumentis: 1) a sanguine certarum venarum vix discerni posse sanguinem venae portarum, bili similem saltem non esse; attamen character venosus praevalens multo defenditur auctoribus.

43) De bilis natura diss.

44) I. c. T. I. p. 496 sq.

2) Arteriam hepaticam capacitati ductuum biliferorum respondere. Quid? Num illa suppeditat sanguinis tantum, quantum nutriendo organo tam amplio opus est et secretio tam copiosa postulat? — Perhibente Malpighio<sup>45)</sup>, bilis secretio, subligata arteria, continuabatur; subligata vero vena portarum illico cessabat. Quae cum ita sint, scriptorum qui plurimum auctoritate valent, sententiam, bilis secretionem a vena portarum maxime adjuvari, sequamur. — Quae-  
nam vero quantitas, dato quovis tempore, secesseretur, indicatu difficile est; cum Hallero ex periculis in cane a Ravenhorstio institutis eam binas ad libras medicinales singulis esse diebus colligere audacter videtur. Maxima bilis pars in jejunio transit in vesicam felleam; quo discrimen inter cysticam prodit et hepaticam bilem: illa enim est majoris densitatis et amari-  
tudinis, coloris vividioris omnesque bilis indoles evi-  
dentiiores in ea sunt, ac in hac, quae flavior et flu-  
dior est. — Analysi bilis quamvis maxima semper  
data est opera, multa tamen velata manent. — Suam  
quaeque animalium classis, quodque genus, imo quod-

piam individuum peculiarem indolem ostendit. — Quantum v. c. inter bovis et suis bilem discrimen! — In recente bovis hominisque bile odor sentitur aëris hydrothionici, qui et distillatione primus<sup>46)</sup> secedit. Inter bilis elementa propiora maxime abundat aqua, ad  $\frac{7}{8}$  pl. sive, observante Thenardo, totius massae. Spiritus vini ex bile recenti flavum extrahit colorem; evaporatus flavoviridem materiam, cholicum, sistit, albuminis modificationem secundum Berzelium, quae azotici nihil continet. Est Thenardi Picromel. Acidis resinosam induit indolem; hinc resinam bilis Thenard fixxit. Occurrunt etiam albuminis vestigia, in non-nullis morbis vel praepotentis. Berzelius, a Thenardo, Johno aliisque discrepans, materiam peculiarem flavam negat; contendit vero mucum esse cysticum chlico impraeagnatum. Praeterea omnia omnibus fere secretis humoribus propria salia et bases bili quoque insunt. Bilis est secretio alcalina; quippe cum acida hebetet<sup>47)</sup>. Bilis taurinae albumen et colorantem

46) Treviranus l. c. p. 434. Fourcroy Elem. d. Chim. Ed. IV. T. IV. p. 348.

47) Pierer's anat. physiol. Real-Wörterbuch. III. S. 203.

materiam Brande vidit ad negativum, acidum phosphoricum et muriaticum ad positivum congregari columnae galvanicae polum.

Chymus, bile aliisque succis admixtis, in flavoglaucam, subspissam et saporis subamari mutatur materiam, cujus compositio haud saepe perquisita est. In gallopavone Marcet<sup>48)</sup>, in plurimis aliis animalibus Prout eum perscutatus est<sup>49)</sup>. Easdem propemodum in eo contineri substantias, quae in ventriculo, ferrum tamen minus oxydatum quam antea, nec tantum acidi generatim manifestari; Emmert exploravit<sup>50)</sup>. Neque acida neque alcalina Prout inventa contenta in duodeno ditorum canum, quorum alter panem, alter animales materias ederat; atque in tenui gallinarum intestino confessim, accidente bile, omne acidi saccatolactici vestigium deleri Trevirani<sup>51)</sup> observationes docent, quod cum plerorumque sententiis physiologorum utique congruum, qui cholico acida neutra

203. Goldwitz n. Vers. zu einer wahren Phys. d. Galle. Bamberg, 1785. S. 160, 169.

48) Meckel's Arch. II, p. 268.

49) Ibid. VI, p. 83.

50) I. c. p. 176.

51) I. c. p. 369.

feddi propterea potest, quod, eo subducto, effectus ille non prodeat. Cholicum vero, in bilis resinam mutatum, cum excretoria jungitur massa. Nunc chymus <sup>52)</sup>, ne in illis quidem animalibus, quorum alimenta in ventriculo insigniter acida sunt, succos vegetabiles cyaneos tubefacere jam valet. At vero, acida indole amissa, dissolubiles chymi partes coire rursus possunt. In animalibus vesica fellea destitutis, ubi igitur bilis lentius admiscetur et parcus, ut in equo, acida chymi natura diutius persistit. Puls in intestino tenui cibarius partim ex materiis assimilabilibus, partim excrementitiis constat; neque quales sint definiti accurate potest. In eodem intestino colorem cinereum, plus minusve flavum chymus accipit et fluido subalbo impraeagnari videtur. In superiore intestini tenuis parte albuminis nihil invenerunt Emmert et Treviranus <sup>53)</sup>, qui posterior tamen, reagentium auxilio se mucum demonstrasse putat, ex quo colligit, chymum ventriculi bile penitus dissolvi atque in muci formam reduci. Prout in primis in eo operam dedit, ut, sitne

52) Autenrieth l. c. §. 651.

53) l. c. p. 473.

in thymo albumen, indagaret, nec ne<sup>ss</sup> 4). Sed chymum nihil intelligit praeter alimenti in duodeno partem aut albuminis naturam! jam adeptam, aut brevi adepturam. In primo experimento albumen in chymo, quam ut agnosci posset, nondum satis formatum fuit. Superior duodeni pars, in cuniculo furfure et avena alito, humorem fuscoflavum continuit; viscosum, ut in filamenta duci posset, bullarum refertum; et parum residui non dissolubilis relinquenter. Existit jam vera albuminosa materia, cuius copia paulo infra aucta videbatur: paucis ut dicam, albuminis quantitas sex circiter digitos a pyloro aucta, tum diminuta est; donec digitos 24 a pyloro vix animadvertis potuit. Neque in ileo albuminis quidquam conspectum, neque in intestino crasso. Animali serius ac antea post pabulationem aperto plus albuminis inerat, in universo etiam intestino tenui; ad extremam ilei partem jam defuit. Marcket quoque in intestini tenuis contentis perspicua albuminis indicia deprehendit. Nullus nimirum dubito, quin analysi hujus materiae naturam explicare perdifficile sit. Quocirca Prout al-

buminis similem dicit formari aut saltem in conspectum venire materiam, cuius copia in certa quadam a pyloro distantia interjecta cito diminuitur, ut denique nil remaneat, nisi excretoria massa <sup>55)</sup>). Quam ob causam forsitan Emmert et Treviranus nullum invenisse albumen videntur; prior vero mucosam quandam materiam, posterior gelatinosam et in infimo intestino tenui materiam quodammodo albuminis non absimilem. Potestne fieri, ut digestione perfectiore prius, quam imperfectiore, formetur materia albuminosa? — Sed ulteriora perscrutemur. Residuum illud indigestibile chylosis, cum amara et resinosa bilis parte conjunctum, eoque magis magisque flavo colore potitum, plus minusve fluidum in intestinum crassum, idque coecum, tandem pervenit. Nunc novum digestionis incipit stadium. Similitudinem ventriculum inter et intestinum coecum intercedere plures zootomiae periti contendunt. In Halmaturo giganteo ventriculus et longitudine et marsupiformibus additamentis partem maximopere resert crassi intestini hominis <sup>56)</sup>; coe-

55) I. c. p. 107.

56) Cuvier. I. c. p. 388. Carus I. c. § 514.

cum et colon Rhinocerotis ventriculi speciem omnino prae se ferunt. Idem in Lacerta Iguana L. animadvertitur <sup>57)</sup>). In hac intestinalis tractus parte magna seceruntur humoris serosi et muci copia; chymusque in ea reiteratas subire videtur mutationes, quibus, quae cibi elementa nondum dissoluta fuerint, nunc dissolvantur partimque assimilentur; uti lac, quod Veratti <sup>58)</sup>, materiae viscidae et flavae specie, se vidisse profitetur. In hoc intestino non modo omne in cibis acidi indicium evanescit, sed alcalinam etiam indolem in quibusdam animalibus manifeste accipiunt. — Nec aluminosae vestigia materiae Prout unquam inventit. Ceterum peculiaris excrementorum odor evolvi coepit. Ipso autem intestino crasso ad formandas faeces materias subministrari, vel eo patere videtur, quod in homine mortuo, qui nullum diu cibum sumserat, concretas intestinum materias continuit. — Veri ceterum haud absimile, in intestino crasso faecium fluidiora et assimilabilia elementa resorberi: cui innueret videtur sententiae, quod quidam aegroti clysmatum

57) Liebemann in Medel's Arch. III. S. 368.

58) Comm. Bonon. T. VI. p. 269.

injectione nutrituntur. Quae vero de adipis in intestino crasso formatione Home protulit<sup>59)</sup>), cum in dubio adhuc res posita sit, huc pertinere non duxerim. Qua autem formatione prodeant faeces, parum novimus, atque, utut memoratu dignae sint Trevirani, Berzelii aliofumque de hac te indagationes; physiologiae vero exiguum largiri fructum eae videntur. Quam rem uberiori nimis peractutatur simus, si, experimentis tite instructis, faecium elementa propria cum iisdem succorum intestinalium et alimentorum, quoad quantitatem et qualitatem, compararentur. Opus sane haud facile! —

Sed quae est chymi ex duodeno in intestinum rectum transeundi ratio? — Peristaltico motu transit: facile quidem dictu. Attamen et hic obscuriora non desunt, neque vivisectiones tem prorsus illustrant: nam accessu aeris motus in intestinalis et turbari et vehementiores fieri constat<sup>60)</sup>: vel etiam prudenterissimum virum, Wilsonem Philipum experientia perduxerunt, ut intusculorum ductus intestinalis actio-

59) Meckel's Arch. II. p. 241.

60) Haller Lib. XXIV. §. XVI. p. 85. Magendie. I. c. p. 97. Krüller, die Bewegung des Darmkanals, in Horn's Arch. f. med. Erf. 1821. März. p. 237.

nem nervorum efficacia non affici opinaretur<sup>61)</sup>). Motus intestinalis ex alternis contractionibus constat et expansionibus, eaque ratione, ut, alio loco contracto, aliis plus minusve distans dilatetur. Quas oppositorum motuum vicissitudines jam in ventriculo, praecipue in utroque orificio observamus. Pari modo, duodenii quovis loco patesfacto, pylorus clauditur, et vice versa. Qui motus in tenui intestino potissimum conspicui, tertium, ut ita dicam generant motum, quo surgit intestinum, descendit et vermis instar torquetur. Regressivus etiam, brevibus ex intervallis, motus ab imo ad summum oritur; tandem vero actio contractiva deorsum directa praevalet. In statu normali hi motus magis minusve tardi, languidi sunt; atque eosdem peculiarem quandam cum abdominis musculis et dia-phragmate rationem servare, vomitu praecipue et excrementorum evacuatione probatur. Musculis enim abdominis persecatis, excrements, quamvis refertum sit intestinum crassum, ejicere animalia amplius nequeunt; idem animadvertisit, perscissa prope quartam vel quintam vertebram dorsi medulla spinali, quo

61) I. c. Vers. 46, 47.

musculi abdominis cum aliqua diaphragmatis parte resolvuntur<sup>62)</sup>). Sed diaphragmatis quam abdominalis musculorum actionem minoris esse momenti, patere eo videtur, quod horum efficacia, per sectione utriusque phrenici nervi non sublata, excrementa eyehuntur<sup>63)</sup>.

§. 13. Recentissimis temporibus de respiratione intestinali mentio facta est. — Num vero in ductum intestinalem aëris recipitur communis? Quem cum cibo potuque in ventriculum intrare jampridem animadversum est: sed quantitas alimentum comitata certe minor est, quam pro aëris communis in intestinis abundantia. Multo saepius, quam vulgo credatur, aërem deglutiri Magendie<sup>64)</sup> probare studuit, juxta quem et Krimmerum aëre semper ante vomitum impletur ventriculus. In tussiendo, oscitando et singulatiendo in oesophago Krimmer aëris continuum commatum deprehendit<sup>65)</sup>. Hystericae, hypochondriaci et

62) Krimmer l. c. p. 253.

63) Krimmer's Unters. über d. nächste Ursache des Hustens. 1819. Vierte Versuchsstreihe.

64) Mem. sur la deglution de l'air atmosphérique. Geles. im Institute. 1815.

65) Ueber d. n. Urs. d. Hust. C. 15, 16, 18 sq.

phthisici deplutire non raro solent aërem. Atque compertum est, quendam debili digestione laborantem, qui eam adjuvaret, aërem devorasse<sup>66)</sup>. Erman<sup>67)</sup>, diligentius qua ratione cobitis fossilis aërem in se recipiat perscrutatus, in modum respirationis hoc fieri intellexit. Respiratio enim per branchias, post singulas aëris deglutitiones, per 15 aut 25 minutarum temporis spatium, sine vitae discriminé, tolli potest. Aër vero deglutitus in intestinis easdem subit mutaciones, quales in branchiis; confirmante et Bischofio<sup>68)</sup>. Quorundam insectorum larvas per anum trahere spiritum Marcel de Serre demonstravit<sup>69)</sup>. Quod quidem, dixerit quis, cum in animalibus obtineat inferioribus, num in superioribus etiam? Quem oesophagi inferioris partis motum Magendie observavit, is sane cum ceteris videtur phaenomenis tam male cohaerere, ut eodem aërem in intestina duci facile opinio subire posset. Plagge<sup>70)</sup>, primus de intestinali respiratione

66) Magendie Phys. II. p. 129.

67) Gilbert's Annalen der Phys. Bd. XXX, S. 113  
— 160.

68) Schweigger's Journ. für Chemie und Phys. II,  
B. I. S. 78.

69) Oken's Isis. 1819.

70) Medde's Arch. V. S. 89.

locutus, se observasse dicit, iis quae huc pertinen organis denudatis, oesophagi motus cum tracheae motu coincidere, eoque in intestina aërem et intrare, et ex iis discedere. Idem in hernia inguinali incarcerata operanda se vidisse contendit, intestinalem motum, illaeso abdominis cavo, iisdem, quibus respiratio pulmonum obedit, temporis intervallis fieri. Sed errare potuit; et experientiae futurae rem illustrabunt. Quae experimenta circa aëris genera in ductu intestinali humano occurrentia Jurine <sup>71)</sup>, Chevreul <sup>72)</sup> et Magendie <sup>73)</sup> instituerunt, stimulare physiologos jam pridem debuissent, qui perscrutarentur, quanam ratione consumendo oxygenio acidum formetur carbonicum. Juxta Magendie ex chymo satis celeriter bullae gassis ab orificio ductus choledochi ad coecum usque nascuntur, in hoc tamen posteriore, sicut in duodeni superiore parte et ventriculo nihil hujusmodi observavit. Singulae quantitates haud dubie variae pro variis sunt momentis. Multis experimentis exploratum est, in ventriculo esse purum oxygenium, at hydro-

71) Hallé Annal. d. Chimie et d. Phys. XVI. p. 158.

72) Meckel's Arch. II.

73) l. e. p. 100 — 111.

genii parum, in reliquo ductu intestinali contra illius aëris nihil, hujus vero majorem copiam; atque acidum carbonicum a ventriculo versus intestinum rectum continuo augeri. Azoticum ubicunque exstat; praeterea etiam in intestino crasso aër hydrogenius carbonatus et sulphuratus. — Maxime opportuna nunc quaestio: unde haec aërum genera? — Quam novissimam rem statim explicare, quis tandem ausit? Tractus intestinalis non secus ac pulmonum superficies membrana mucosa formatur: sed in utraque superficie acidum carbonicum iisdemne ex causis generatur? Haud crediderim. In pulmonibus acidum hoc sanguine venoso repelli, oxygenium vero gas recipi, arteriosumque inde formari sanguinem, experimentis Lagrangii et Nassii didicimus. Venarum vero mesentericarum sanguis acido carbonico potius abundat, atque, testante Krimero<sup>74)</sup>, aëre in intestina inflato, aliarum venarum sanguine nequaquam rubrior fit. — Quin equidem etiam conjectare auderem, venarum mesenterii sanguinem, acidō illo recepto, majorem venositatis nancisci gradum. Quocirca adsentire Plag-

geo non possum, respirationem intestinalem hoc phae-nomenon nominanti, quoniam vereendum est, ne fal-lax de hac re notio inde exstet. Unde autem carboni-cum? Hoc me fugere fateor: num cibis suppeditatur, qui tantopere eo scateant? — Sed quaenam est aëris re-cepti et gasorum formationis ad ductum intestinalem et generatim ad digestionem ratio? Referri in primis aërem ad motum intestinalem Krimer experimentis colligit<sup>75)</sup>). — Sed haec est pars tantum fortasse aë-ris efficaciae: quoniam vero modo in digestionem agat, cum abrupta tantum de hac re neque bene inter se co-haerentia nobis immotuerint, determinari minime po-test. Nonne fieri potest, ut gas carbonicum, in venas mesentericas receptum, ad formandam conferat bilem carbonico abundantem, atque amari<sup>tudo</sup> ejus oxyda-tionis carbonici gradus sit effectus?

§. 14. Chylosis. Pars massae chymosae, quae assimiletur; sive in stato muciformi (Doellingeri substantia animalis?), secundum Treviranum, ver-se-tur, seu plus minusve, ut Prout contendit, materiam

aluminosam aequet, quoniam tandem perveniat, quaeritur? Adhaerescit sane, dum chymus intestinis promovetur, villis; tum hinc disparet, denique in animali aperto vasa lactea humore subalbido referta observantur, qui ad ductum thoracicum viam petit. At, cum villi nulla ostendant oscula, vasa lactea invisibilibus ostiolis omnino non oriantur in tunica villosa, quomodo humor vasa penetrat? Quod quidem in tertio capite exponere nobis liceat. Chyli absorbitio sic dicta tertia vel quinta post cibationem hora incipit pluresque perdurat. Nec facile copiam chyli formati accnratius definias; magnam tamen esse verisimile videtur. In cane, cibo animali pasto, quinque minutarum tempore e ductu thoracico ad minimum semiuncia humoris effluat, quod plures horas persistit. Quo Magendie <sup>76</sup>), sex fere uncias quaque hora in sistema venosum transire; in homine vero, cuius digestio citius perficiatur vasaque lymphatica magis evoluta sint, copiam majorem etiam esse, concludit. — Lymphae chylique quam sanguinis venosi motus tardior videtur <sup>77</sup>). Quo vero mechanismo (ut verbo

---

76) I. c. p. 160.

77) Bichat anat. gen. T. II. p. 628.

quorundam utar) chylus promoveatur, nulla docet experientia: quidam ex experimentis post mortem institutis contractilitatem assumunt vivam; sunt etiam, qui de capillari actione vasorum confabulentur, non satis conditionum memores, quas Physica constituit, quaeque in corpore organico nunquam obveniant.

Chyli analysis haec fere docet. Emmert<sup>78)</sup> chylum equi eumque e medio ductu thoracico primo statim post vasis dissectionem (a), tum paulo serius (b); deinde e superiore vasis incisi parte (c), denique magnum copiam ex cisterna chyli truncisque vasorum eam adeuntium (d) collegit. Chylus ubique liquidus, subtenax, coloris diversi; ex minoribus vasis lacteo colore; chylus, litera d notatus, albidus erat, magisque subflavus; quantitates vero a, b, c, e flavo canescentes. Chylus in genere sapore salino sperma olebat. Accessu aeris communis, chylus a et b colorem illico ducebat subrubetem floris persicæ; chylus d, paullum rubescens, specie lactis subflavi minima sanguinis parte tincti erat: e minoribus vero vasis collectus colorem, vix qui sentiri possit, subrubidum reful-

gebat. Ex chyli a et b in massam rubellam, gelatinosam (serius albuminis cocti densitate) omnium citissime coagulati superficie humor e viridi flavescentia exsudebat, cuius copia, coagulo obdurescente, magis magisque augebatur. — Chylus d non nisi aliquot post horas glebulam rubellam, muciformem, fluido ex albo flavescenti innatantem ostendebat, qua posterio die dispersa, materia crux similis subsederat. — Minorum quoque vasorum chylus paululum coaluit. Pars concreta, compressu in linteo, in fluidam et solidam secessit partem. Illa, coloris primum flavi nec non subviridis, rubicunda ob corpuscula rubra sub finem pressus apparuit. Quo plus fluidi e coagulo separabatur, eo densior, rubicundior solida; denique massam exhibuit colore cinnabaris magna que vi elastica praeditam, quae sub microscopio instar tenuissimae, variae sinuatae et rubrae apparuit fibrae: 1000 partes chyli a et b circiter 18 rubri coaguli, paululum minus c et d, praebuerunt. Pars chyli fluida, coloris ex albo flavescentis, crassior ob globulos albicantes, huc et illuc rubella erat. Aquam, qua diluta fuit, destillatam fibrosa chyli pars rubefecit; quo alborum squalidi colorem, quibusdam rubris ad-

huc locis, accepit, ut pigmentum arctius ei inhaerere videatur. Odorem vero spermaticum amisit. In aqua illa residuebant corpuscula rubra. Ex tot experimentis, quae Emmert, Reufs<sup>79)</sup>, Vauquelin<sup>80)</sup> et Prout instituebant, plerumque eadem probantibus, haec fere, quoad chylosin, consectaria sunt:

1) Chylus est humor sanguini affinis<sup>81)</sup>. Secedit nempe, sicut sanguis, in tres partes, parti fibrosae, globulis seroque sanguinis respondentes. Quae quamvis inter se eandem, quam in sanguine, rationem servent, diligentiori tamen indagine certa quaedam discrimina produnt. Nec enim eodem generatim gradu in chylo efformatae sunt. Chylus minore coalescendi natura, minore partis fibrosae et crux copia utitur; quantitate vero seri (plus quam sanguinis serum partium aquosarum continentis) praevalet. Ex vasis lymphaticis artuum inferiorum lympham et chylum id discriminis intercedit, qui globu-

<sup>79)</sup> Scherer's allg. Journ. der Chem. XXVI. p. 161, XXX. p. 691.

<sup>80)</sup> Ann. du Mus. d'hist. nat. T. XVIII. p. 240.

<sup>81)</sup> Emmert. l. c. p. 162.

los monstret et aëre rubescat; tum et majori coeundi indole, majorique albuminis copia insigniatur.

2) *Chylus in variis systematis lymphatici locis maxime variam prae se fert naturam*<sup>82)</sup>. Quoad colorem, coalescendi naturam, fibrosae partis et cruris copiam illum jamjam exposuimus. Quo autem proprior *chylus* medio ductui thoracico accedit, eo magis partes ejus differunt, eoque similiores partibus sunt sanguinis. Glandulas congregatas ad hanc mutationem multum conferre verisimile videtur, ut argumenta desint certioris momenti. Sed haec hactenus; uberiorius infra.

3) *Chylus et variorum ejusdem speciei individuorum conspicua quamquam non essentialia praebet discrimina*<sup>83)</sup>. Cujusdam momenti ciborum genus esse sane videtur<sup>84)</sup>; quaedam ad temperaturam individuam et periodicam organismi referenda sunt, ad aetatem, sexus aliaque. Coalescendi indoles et partis fibrosae copia in equis v. c. mediae vitae aetatis, quam in junioribus, in

82) Ib. p. 175.

83) Ib. p. 180.

84) Prout in Meckel's Arch. VI. p. 93 sq.

bene pastis, quam in emaciatis, maiores esse solent<sup>85)</sup>). Quae utraeque tannico, acido galico, pabulo alibiliore augentur. Canis 12 ad 36 horas jejunium passi vasa lactea parvam humoris semipellucidi, subalbidi chyloque similis copiam continent<sup>86)</sup>). Chylo e saccharo digesto parum partis inest fibro-sae<sup>86)</sup>.

Nunc materias chyli et sanguinis singulatim recenseamus.

a) Serum. Omnium fere sententia constat, sero inesse aquam et albumen, quo etiam si chyli quam sanguinis serum minus abundet, aqua vero in illo praepotens est. Berzelius<sup>87)</sup> et Treviranus<sup>88)</sup> natrum saccharolacticum materiae cuidam animali nuptum repierunt. Fourcroy et Vauquelin in sero gelatinam deprehendisse contendunt<sup>89)</sup>, quos Bostock errasse probavit<sup>90)</sup>, ipse vero errabundus, cum sero mucum

85) Emmert. l. c. p. 200.

86) Magendie l. c. p. 152 et 156.

87) Gehlen's Journal f. Chem., Phys. und Mineral. VII. S. 585. IX. S. 586.

88) l. c. p. 550.

89) Annal. de Chimie. VII. p. 146.

90) Med. chir. trans. Vol. I. p. 47.

addicat<sup>91)</sup>). Præterea salia quaedam natri et kali serum continet.

b) **Crassamentum.** Berzelio duce<sup>92)</sup>, praeter salia quaedam, in hominis sanguine et haec continet: aa) partem fibrosam Ruychii, basin suam, cui materia rubra adhaeret: in sanguine vivo, qua lympha plastica, fluidior esse videtur. Sanguis foetalis parum ejus præbet<sup>93)</sup>. Prout quidem jam in duodeno vasique lacteis ei finitimiis eam observasse opinatur; quod ipse vero non magni pendit. Quae materia cum illa sanguinis fibrosa in chylo prope ductum thoracicum et in hoc ipso generatim convenit, mollior est, in minori copia, in alcalinis facilitius dissoluta, quin etiam in ammonio, ideoque propior materiae albuminosae accedere videtur: transitum tamen in fibrosam jam præstabilitum esse eo, quod coire potest, probatur. bb) Materia albuminosam. Nam Berzelius et in ipso sanguinis crassamento invenit. Num simul cum fibrosa globulos sanguinis constituit? cc) **Cruor.**

91) Trevir. l. c. p. 555.

92) John's Handwörterbuch der allgemeinen Chemie. I. G. 113.

93) Fourcroy Annal. d. Chimie. VII. p. 162.

Cujus de natura disceptationes nondum ad finem productae sunt. Ferro, quod continet, sanguinis diu putaverunt effici ruborem, quem in primis ferro oxydato phosphorico oxydo excedente tribuendum esse Fourcroy et Vanquelin<sup>94)</sup> colligunt, experimento nictentes, quod sal hoc, dum repentinio in albūmine et aero dissolvitur, colorem rubrum, saturatum efficit, qui alcalinis vividior etiam fit. Quod vero reiteratae Berzelii<sup>95)</sup> investigationes minime probaverunt, qui contra, experientia ductus, cruorem tertiam albuminosae materiae modificationem in sanguine verisimilime sistere contendit. Organicum esse pigmentum vel etiam ex florū tam variis coloribus patere videntur; quaque chylo materiae primum album, tum flavum et subcinereum denique praebent colorem, eas cruentem esse nondum efformatum assumere licet.

Commemoremus tandem de globulis sanguinis, praesertim Loewenhoekii microscopica disquisitione celebratis. Contra Hallerum sententiam Baketi et

94) Ib. IX. p. 152 sq.

95) Gehlen's Journ. für Chem., Phys. u. s. w. VII. S. 583.

Menghinii, eos in animalibus variis varia esse magnitudine Sprengel<sup>96)</sup> feliciter defendit. Forma quoque non semper sunt sphaerica, ut Haller putavit, sed potius ovali. Globulos, si ritè praefconceptaque omni opinione vacui examinemus, e massa homogenea, compacta constare invenimus. Num in sanguine insuper vesiculae reperiantur, quas se vidisse Hewson<sup>97)</sup> et Gruithuysen<sup>98)</sup> enuntiant, nondum exploratum habemus. Nihil ejusmodi saltem Doellinger animadvertisit in ovo incubato et pisciculis<sup>99)</sup>. — Insuntne quoque chylo ejus modi globuli? — Jam eos Emmertum probasse vidimus: in chylo, qui nondum ullam glandulam permanaverat, Gruithuysen<sup>100)</sup> jam prorsus efformatos observavit; insuper quoque valde parva corpuscula, quorum forma discerni non potuit. Prorsus alia se habebant ratione haec corpuscula in chylo jam glandulas pervagato: quamvis majora, minora tamen

96) Inst. med. Vol. I. §. 157.

97) *Inquiries into the property of the blood.* Lond.  
1771.

98) *Beiträge zur Physiognosie u. Eautognosie.* S. 93.

99) *l. c.* p. 54.

100) *Med. chir. Ztg.* 1813. II. S. 73.

quam sanguinis globuli, et laeviori superficie. Attamen, addit, facile opinio subire possit ea globulos esse sanguinis, si rubra essent.



*CAPUT III.*

*Biodynamica processus digestionis natura.*

§. 15. In universa viget natura metamorphosis materiae perpetua, quam synthesi et analysi invicem sese excipientibus, manifestatam conspicimus. Eadem sistit organicum individuum. Quid, si processus formationis non certis circumscribitur limitibus? — At in alienantibus vitae processibus nexus hactenus constituti dissolvuntur, et mutua polaritatis inter vitae evolutionem et revolutionem efficitur actione, ut materiae efformandae recipiantur, et, quae jam cursum confecerint vitalem, tensioni processus vitalis polariae expellantur. — Vinculum, organica videlicet forma, tenoris sui permanet; viucta vero in quovis

temporis momento et componuntur et secedunt. In hac tantummodo materiei perpetua mutatione, dum actiones ingestivae et egestivae polaricam servant rationem, vita sustentatur et conservatur individua.

Vita, quam organismum inter et res externas mutuam dicimus, amplissimo limitum ambitu cincta homo fruitur; ei universa patet natura, qui alimenta multiplicia maximeque varia sibi quaerere, et ubique terrarum vitam degere oblectationibus abundantem possit. Animalia contra, quo inferioris sunt ordinis eo simpliciore utuntur et vita mutua, sed arctiore cum natura vinculo conjuncta ideoque magis definita. Quocirca gustus eorum, cum sensus sit systemati digestivo addictus, non tanta in discernendis saporibus acie pollet, quam in homine, cuius sensorii vivida vis altissimum ascendit gradum. Attamen animalibus natura dedit incitationem coenaesthaeos, cuius ope, quidquid in victu sit vitae infesti, homine sagacius discernant, nec gustus voluptate ad omnem libidinum intemperantiam illiciantur.

§. 16. Quatenus porro ingerendae materiae sunt, eatenus necessitudo haec appetitu (sicut ejus incre-

mento in fame) et sisi sese exserit: qui animales impetrat, qua plasticum spectant processum, ex ganglionrum sympathici systemate, ut coenaesthesiae certae immutationes, emergunt. Cum aqua, recta via, ex ventriculo in systema sanguiferum perveniat, in plerisque alienationis processibus aqua exhaletur, cum site ad summam evecta exhalationes areant, et systema vasorum infrangatur, — peculiari quodam nexu cum sanguinis vita sitis cohaerere videtur. Quae supra a nobis allata sunt, quantopere illi impetus ex intima individui vita erumpant, ex periodica processus vitalis fluctuatione, sat superque indicare videntur. — Ceterum uterque generatim polarica tenetur ratione: fame expleta exorditur sitis, si quando illa in febribus disparet, maxime haec viget, etc.

§. 17. Systema tantum cufaneum generale vias alimentis praebet; est superficies, quae vitae cum externis mutuae intermedia addicitur, area, in qua gravissima processus assimilationis et alienationis pars absolvitur. In insimis animalium ordinibus externi ejus tractus ope fieri videmus, ut in quibusdam entozois<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Rudolphi l. c. p. 275 sq.

Simulac, altiore formatione, novae antitheses in vitali processu imperio potiuntur, externo internum (ductu intestinali) opponitur membranae mucosae systema, adeo tamen, ut in polypo, replicata superficie exteriora perinde ac in sacco intestinali perficiatur digestio. Quo magis vero *systema* intestinale individuam induit naturam, eo distinctius ejus ad mucosam externam enunciatur polarica ratio: illic ingestivus, hic egestivus praevalet processus. — Quanta ubertas et copia in evolutione hujus *systēmatis* ejusque appendicū! — Per pauca hucusque eruta sunt fragmenta, qua ratione cum vita centrali cohaerentia innumerae formae. Et tamen nullum in natura phaenomenon, quin ex intima legum natura prodire debuerit! Ecce vitæ unitatem in multiplici et varia formarum indole!

§. 18. Quippe cum alimenta ore recepta, partim ob magnitudinem aut formam, partim ob majorem massæ cohaerentiam, posteriores digestionis mutationes aegerrime subire possent; eadem masticatio, qua in particulæ comminuta majorem assimilativæ energiae præbeant superficiem vividosque ubique tangant oris parietes, — digestioni apta reddit. In masticatione

tione mechanicum sese exhibet digestionis momentum; at, quantopere intimo cum vita nexu cohaereat, sensuum praesertim actio monstrat. Quae enim sapore aut odore nos afficere queunt, sensus voluptatem mouent: unde vividior non solum actio in oris cavo prodit, sed in coenaesthesia etiam reactio, quae grato affectu aut nausea magnae in digerendo se manifestat efficacie. Quo fit, ut excitata vivescat metamorphosis in oris cavo, motu perspicua et intensa membranæ mucosæ salivaliumque glandularum secretionem. Sicuti vae actionem, qua energiae assimilativae conductors, hactenus ex misionis suae indole, haud quaquam explicare valemus. Ut naturae processusque arte humanae instituti fluidam corporum, quo magis agant, indolem postulent; ita et salivæ, aquae vi scatente, propria redditur ciborum mutatio. Quod si vero biodynamicum ejus species momentum, salivæ processus inchoatur individuam alimentorum extincturus qualitatem.

¶. 19. Temporalis ventriculi in digerendo dispartitio, in ruminantibus constantem assumans formam, ex polaritate ejus parietum prodit, statim ex-

perrecta, simulac alimenta villosam tetigerint. Quam  
 in locis variis varia gaudere receptivitate non absimile  
 videtur. Cibi enim nuperrime in ventriculum detrusi  
 sane longe alio modo in eum agunt, quam postea,  
 cum partim vel omnino jam digesti sunt. — Quibus  
 non diu in organo moratis, exsurgit in ejus superficie  
 alacrior actio. Unde secretio succi gastrici augetur;  
 motus contractionis et expansionis invalescit; sensus  
 aucti caloris e regione epigastrica prodit: omnino, hoc  
 tempore, metamorphosis in plastico gangliorum syste-  
 mate abdominis eademque in hepate, pancreate vi-  
 vescere videtur. — Quatenus vero proximus centro  
 systematis gangliosi accedit ventriculus, eatenus in eo  
 intestinalis ductus, interioris nempe in processu for-  
 mativo praevalentis superficie, genericus manifestior  
 evadit character. Namque generatim dici potest: in  
 ventriculo, hac quamque peculiarem, alienigenam  
 nutrimenti indolem extingui, illac domesticam, in-  
 dividuam naturam ad tantum evehi gradum, ut in  
 chymo nullus, nisi individui, in quo efformetur, cha-  
 racter praevaleat. — Idem, quod de salivae aquosa  
 natura, de succo quoque gastrico enuntiandum est:  
 quod vera frequentiorepm acidam chymam attinet iudic-

lem, monendum videtur, quam late oxygenii in naturae processibus efficacia pateat, et oxydatione xime variae generalem characterem materiae induat. Verum enimvero non satis aëris communis nobis huc usque vis e eluet; quem in processum quoque digestio- nis agere observationes supra memoratae, ut sint paucae, docecent. — Quid tandem chymus? Zoogenium generatim forsan dici potest, i. e. materiam esse gelatinam inter et mucum ambiguam progressiva evolutione in sanguinem abituram<sup>2)</sup>.

§. 20. Cujusnam est momenti in processu vitali illa organorum trias? Hepar dico, paucreas et lie- nem, de quibus cum multa jam disputarent et confa- bularentur, et nostram afferamus liceat sententiam. Dum quidem in ventriculo materialis organicus genera- tim imprimitur character, sanguinisque germen massae excernendae, nondum plane digestae, intermixtum dif- ficillime discernitur, in duodeno contra, bile accedente, id, quod externe chymo adhuc inerat naturae, mate-

---

2) Bogorides Betrachtungen über die Verdauung im menschlichen Magen. Würzburg, 1817. S. 54.

ria albuminosa plus minusve evoluta evidentius in vitam recipitur individuali. Hic vero, quem hepatis modum in animalium serie et in foetu servet, quaque inversa ad cerebrum ratione evolvatur, contemplati majoris erit momenti. De quibus jamjam supra disseruimus. Illa vero vita organismum inter et naturam externam bipolari sese exserit evolutione; cum ille naturam, processu materiae organicae plastico, digestione in primis, realiter, sensuum activitate et contemplatione idealiter assimilandam in se recipit. Ut in interioribus animalibus massae reproductio intensitatis culmen adscendit, ita in homine idealis ad summum vita evolvitur. Quas quatenus vitae antitheses supremas in formatione sese exserere videmus, cerebrum et hepar organa esse dici potest, quibus vita in duas vergit partes. Quocirca hepar in processu plastico maximi esse momenti videtur: est re vera haematopoësis organon, at alio sane in sensu, quam Galenus ejusque sectatores enuntiaverunt. Hepar denique et ventriculus in unum componi videntur organon, cuius polarica se exhibet ratio in acida succi gastrici et alcalina bilis natura: quod etiam utriusque testatur conformatio in medusis, molluscis, gastero-

podum Cliv et Doride; in altiorum ordinum animalibus loco situque disjunguntur.

Succus pancreaticus, ut supra ex plurimis devici-  
matis argumentis, salivae analogicum se praebet. Cum  
vero in pancreate evolutio glandularum salivalium  
plane cumulateque perfecta videatur, ipsumque orga-  
non centro systematis gangliorum proxime adjaceat,  
ejus succum salivam esse potentiorem nonne colligere  
liceret? — Quod etiam materiae in chymo vitae in-  
dividuae magis addictae requiri videntur. Quaigi-  
tur ratione glandulae salivales ad ventriculi di-  
stionem, eadem pancreas ad hepar referri et chylosin in  
intestino tenui concludendum est.

In duodeno exsurgit chymum inter et succos pe-  
culiares organorum analysis et synthesis mutua, qua-  
binae producuntur materiae, chylus et excrements.  
Quatenus vero in his resina forsitan et alia bilis elemen-  
ta, in intestino crasso aer hydrothionicus, reperiun-  
tur, eatenus, ut opinor, lis componi potest, num he-  
par sit organon colatorium nec ne. Namque ex his  
mere recrementationia esse bilis non videtur. Ceterum  
puto ex his quoque elucidere, naturam in perpetua vi-  
gere metamorphosi anorganicorum corporum in orga-

nica et vice versa. — Quanta aquae copia singuli digestionis processus succi scateant, contemplatu dignum videtur. Sane, quid valeat aqua in processu plastico rite planeque exponere nondum didicimus. Autenrieth, qui aquae dissolutionem in processu vitali, quo modo ejus elementa in hydrogeneis et oxygeneis redeant secretionibus aliaque disseruit, problematis forsan solutionem exorsus est. Pariter Treviranus, cum, quo inferiora in animalium serie sint genera, eo majorem aquae consumi copiam, experientiis ~~ex~~ diceret.

Quid sit denique lien in organorum nexu, nescio an operae pretium facturus sim, cum tot tantique viri non semper felici successu aenigmatae ejus naturae eruendae studuerint. Lienem tanta sanguinis copia scatere, ut soli textus redintegrationi adscribi nequeat, recordemur, atque naturam ejus glandulosam a pleisque uberrime exhibitam esse. — Restat ut secretionem ejus peculiarem enucleemus. Sane, lienem nexus quodam cum systemate bilifero cohaerere jam dudum constat: venae portarum radix primaria dici vena lienalnis potest. — Cujus in sanguine, etsi charactere praevaleat venoso bilique secernendae aliquid

conferat, quis secretoriam organi naturam exhiberi dixerit? — Namque sanguis vénosus ubique assimilationis et alienationis residuum apparet. Quodsi insuper bilem ex arteriosō in invertebratis gigni sanguine, et, liene extirpato, homines diu vixisse<sup>3)</sup> addas, hunc cum hepate nexus non unicum esse momentum, quo omni acie intueamur, perhibendum est. Insuper lien primum in vertebratis simul cum sanguinis rubri formatione apparet, porro nexus intimum eum inter et glandulas conglobatas Tiedemann probis, ut videtur, argumentis munivit, vascula lymphatica ejus referta sunt rubella, ut Hewson et Tiedemann comperti sunt, lympha, quae maxima ex parte in aëre coit, ideoquè materia paene tantum fibrosa et crux constitui videtur. Denique, extirpato liene, chyli indolem mutari supra vidimus. — Quae si conjecteris omnia, non poteris, quin hanc de liene sententiam amplexeris: esse organon duplici modo considerandum. Primo: quatenus sanguinem vénosum hepati

3) Krause in Roppe's Jahrbuch der Staatsärzneifunde. III. S. 200. Lenhossek, Physiologia medicinalis. III. p. 161.

suppeditat, eatenus in complexum systematis biliferi recipitur, eumque inter et hepar polarica intercedit ratio; ille materiam efformandam suggerit, hoc, sanguinem advectum conformans, quid valeat, in bile exhibet. Quae tensio polarica, cum venae portarum mesentericae venae alteras sistant radices, absoluta non videtur; sed (quodque alterum erit organi momentum), lien systemati glandularum adnectitur conglobatarum. Et quidem rubelli ope humoris lien chyli vim plasticae auget, qua chylus in pulmone sanguinis evolutione potiri valeat. Unde lien invenitur parvus in anima lilius, quae parum materiae continent fibosae, prorsusque in iis, quorum corpus ex mero mucō et albamine constare videtur disparet; parvus etiam in iis, quorum organa respirationis ad majorem nondum perfectionis gradum ascendunt; unde etiam in foetu minor offertur splen, denique in quibusdam ejus morbis sanguinis plastica indeoles diminuitus<sup>4)</sup>.

§. 21. Quid de chylo fit? — Vasa lymphatica, quum ostiolis apertis non oriuntur, magis magisque

---

4) Heusinger l. c. p. 1471.

attenuata in villosae tandem textum dissolvi assumere licet, vel potius sensim sensimque ex hoc textu evolvi. In polypis nemo hucusque vasa demonstravit; nihilominus cibo intra saccum intestinalem recepto tanta cum energia nutriuntur, ut, dum pars praedae altera ori effugere conetur, alterius jam digestae ejiciantur residua: in hydra devoratus liquefit cibus, nulloque vase intermedio, in materiam abit animaliem. Nec aliter rem in nostra fieri chylosi vero proximum esse duxerimus. Chylus igitur internae superficiei efficacia progenitus, indolem non <sup>solum</sup> vitae individualis generatim, sed organi etiam, cuius in contactu evolvitur, assumit. Ut vero in columnna voltana acidum et alcali ad suum quodque polum viam petunt, ita et chylus, sanguinis germen, evolutionis hujus ratione, in totius organismi polaricam tensionem recipi tendit. Quare non, ut alieni quid, villosam penetrat, sed ipse abit homogenius in villosae textum <sup>5)</sup>), transitque cum hoc in vasa lactea. Qui observatur villorum tumor, pro momentario habendum est incremento villosae, ita ut perpetuo hic vi-

geat metamorphosis. Si quis reputet, quem sanguinis formandi modum in ovo incubato nos experientia edocuit, Swietenium<sup>6)</sup>, maximo cum ingenio chyli sanguinisque efformationem aequiparasse concessurus est. Ut nempe in foetu ex duarum mutua materiarum actione progerit sensim sensimque varia mixtionis evolvuntur partes, ita et in intestinis productus chylus certos, ut novimus, ad ductum thoracicum usque metamorphoseos percurrit gradus. Quibus biodynamica processum, quoad massae reproductionem, perpetuam generationis primariae sistere iterationem luculenter clivere videtur.

Restat ut chyli exponamus motum. Sanguinem vasis priorem in ovo incubato extare, nihilominus in massa animali huc et illuc moveri constat; ejusque naturam actuosam mirum in modum microscopicae testantur circa ejus motum observationes<sup>7)</sup>. — In perpetua intimaque actione eum versari vides; secedit nempe in infinite multa corpuscula, quae invicem sequentes attrahunt et repellunt, vel potius alia in alia ab-

6) In Boerhaav aphor. T. I. comm. ad §. 97.

7) Carl Heinr. Schulze, der Lebensprocesß im Blute. Berlin, 1822. S. 50 ff.

eunt iterumque semel ipsa resolvunt, ita ut perpetuo alius interitu aliud ejumodi reviviscat. Quod maxime temporale fugaxque phaenomenon in uno eodemque fere temporis momento et exstat et evanescit. Quocum uniuscujusque corpusculi motu simul et motus omnium intimè cohaereat necesse est. Atqui vasa ad sanguinem eadem se habere ratione, ac sanguinis corpuscula ad semet invicem ipsa, eundemque existere processum, microscopium luculenter ostendit. Vasa nempe tenuia perpetuam textus sui sistunt dissolutionem, perpetuoque sanguinis ista corpuscula et excipiunt et repellunt. Sic processus sanguinis exstat vitalis, quem in chylosi quoque ex analogia assumere debemus, et hac ratione motus chyli omnino expoundus erit. Aedepol nae, sine motu nulla vitae manifestatio, nullus in tota natura processus!

