



469398

## О П Ы Т Ъ

3447

ИЗУЧЕНИЯ СООБЩЕСТВЪ СОРНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ.

III, 237.  
1918

Нѣкоторыя данные о мѣстности, въ которой собраны растенія, вошедшія въ гербарій.

Мѣстность эта—близайшія окрестности Киржачской учительской семинаріи. Она расположена на р. Киржачѣ, ниже впаденія въ нее р. Вахчелки. Противъ семинаріи, ниже и выше ея по теченію рѣки, расположены луга, заливаляемые весеннею водою.

Берега рѣки, самаго русла ея, въ большей части своего протяженія подмываются водою и обнажены. За полосою луговъ, нѣсколько выше ея, лежать хвойные лѣса, то моховые, то вересковые, съ еловымъ (въ соснахъ) подлѣскомъ или безъ него, на чисто песчаной почвѣ. Лѣса въ возрастѣ отъ 5—10 до 50 лѣтъ. Есть лѣсъ еловый, съ сырой болотистой почвой, но большая часть лѣсной площади—сухой сосновый лѣсъ.

Лѣса поднимаются амфитеатромъ по склону прибрежной (лѣваго берега) возвышенности. Среди нихъ разбросаны поляны, очень большая порубка старого сосноваго лѣса и довольно большое, оторванное моховое съ торфомъ болото, которое въ нѣкоторой части своей покосло сосновымъ лѣсомъ. На вершинѣ прибрежной возвышенности расположены поля крестьянъ д.д. Турново и Бехтерева, Лукьянцевской волости, а за ними заросли лиственныхъ породъ вперемежку съ лугами, болѣе или менѣе сырыми.

Обслѣдованная мѣстность занимаетъ отъ 3 до 5 верстъ съ С на Ю и отъ 2 до 4 вер. съ В на З. Правый берегъ р. Киржача, луговой, съ пашнями на заднемъ планѣ, почти не былъ обслѣдованъ.

Болѣе обстоятельно были обслѣдованы яровое и рожаное поля крестьянъ д.д. Турново и Бехтерева, затѣмъ ближайшій къ семинаріи, такъ называемый Наумовскій, лугъ и ближняя часть сосноваго лѣса. Начались изслѣдованія съ ранней весны.

При опредѣленіи растеній пользовались опредѣлителемъ Маевскаго „Флора Средней Россіи“. Изслѣдоваль учитель школы при Киржачской учительской семинаріи Николай Ивановичъ Кузнецовъ.

## I. Ржаное поле.

### a) Полосы ржи.

Изслѣдовано было поле крестьянъ дер. Турковъ, Лукьянцевской волости, Покровскаго уѣзда, Владимірской губерніи. Оно расположено по гребню и скату прирѣчной возвышенности р. Киржача, верстахъ въ 3-хъ отъ нея. Въ мѣстѣ нахожденія поля возвышенность эта имѣеть склонъ къ СВ и В. Поле открытое, съ Ю, ЮЗ и З оно прилегаетъ къ яровому полю крестьянъ той же деревни, а со всѣхъ другихъ сторонъ соприкасается съ лѣсными зарослями, при чмъ у краевъ поля нивы врѣзаются въ заросли или заросли иногда далеко вдаются въ поле. Почва песчаная, сухая.

Метеорологическая условія роста ржи на этомъ полѣ обрисовываются слѣдующими данными: осень прошлаго года была очень дождливая; сибирский покровъ сошелъ рано и былъ средней высоты; весна и начало лѣта въ общемъ очень сухая. Урожай ржи въ общемъ средний; средняя высота ея около 2 арш.; колосья крупный и полны; густота средняя; засоренность посѣвовъ въ общемъ не высока.

Изъ сорныхъ травъ располагаются во ржи болѣе или менѣе густо и часто *Apera Spica venti*, достигающая наибольшаго роста (почти роста ржи) и густоты въ мѣстахъ болѣе низкихъ, затѣненныхъ (у кустовъ). Не менѣе густо, иногда (въ болѣе низкихъ мѣстахъ) почти сплошь закрывая пространство между рожью, располагаются *Sceleranthus annuus* и *Trifolium arvense*.

Эти три растенія составляютъ какъ бы фонъ сорныхъ травъ, встрѣчаясь то вмѣстѣ, то по-рознь, но всегда въ значительномъ количествѣ. На этомъ фонѣ болѣе или менѣе разбросанно встрѣчаются слѣдующія растенія, которыя мы располагаемъ въ порядкѣ въ отношеніи ихъ частоты и густоты:

*Centaurea Cyanus*, *Filago arvensis*, *Agrostis alba* — сравнительно часто, и болѣе разбросанно: *Crepis tectorum*, —мелкая форма, съ простымъ стеблемъ, тонкимъ и низкимъ, *Galeopsis speciosa*, *Gal. Ladanum*, *Myosotis stricta*, *Knautia arvensis*, *Rumex Acetosella*, *Rhinanthus Crista gallii* ♂ major, —очень высокорослая форма, до 1 арш. 2 вер., съ вѣтвистымъ стеблемъ; *Vicia angustifolia*, *Polygonum Convolvulus* — очень мелкая и слабая формы; *Veronica arvensis*, *Glechoma hederacea*, —иногда, разростаясь, сплошь закрываетъ землю; *Achillea Millefolium*, —сравнительно слабые экземпляры; *Viola tricolor*, *Spergula arvensis*, *Leucanthemum vulgare*, *Ceratium triviale*, *Sisimbrium Thalianum*, *Spergularia rubra*, *Silene inflata*, *Convolvulus arvense* —то ползучіе экземпляры, то вьющіеся на ржи и на *Apera Spica venti*; *Cirsium arvense*, *Sagina procumbens*, —лежашіе или слегка вьющіеся экземпляры; *Prunella vulgaris*, *Poa compressa* и очень рѣдко — *Triticum repens* и *Centaurea Scabiosa* —оба болѣе свойственны межамъ; кроме того по всѣмъ нивамъ болѣе или менѣе часто разбросаны экземпляры *Equisetum*, вѣроятно, *arvense*.

На нивахъ ржи, расположенныхъ около полей крестьянъ деревни Лукьянцева той же волости, встрѣчены были въ небольшомъ количествѣ и разбросанно:

*Berteroа incana*, *Delphinium Consolida*, *Chenopodium album* и *Matri-caria inodora*.

### b) Межи и пустыя нивы.

Фонъ растительности пустыхъ нивъ и межъ — злаки — *Agrostis alba* и, чаще, *A. vulgaris*, нѣсколько рѣже *Antaxanthum odoratum* и затѣмъ *Pimperella saxifraga*. Злаки располагаются группами, дерновинами. Въ промежуткахъ между ними довольно часто и всегда въ большомъ количествѣ экземпляровъ, перемѣшиваясь иногда со злаками, встрѣчаются *Hieracium pilosella*, *Antennaria dioica*, *Euphrasia officinalis* a) *pratense*, *Potentilla argentea*; разбросанно встрѣчаются въ довольно большомъ числѣ *Centaurea phrygia* и *C. scabiosa*, *Myosotis stricta*, *Silene inflata*, *Knautia arvensis*, *Hieracium pratense* (на пѣкоторыхъ нивахъ особенно часто) *Jasione montana* (изрѣдка по межамъ, но часто по пустымъ нивамъ) *Trifolium agrarium*, *T. medium* (ближе къ кустамъ), *T. pratense*, *T. repens* (слабые экземпляры), *Erigeron canadensis*, *E. acer*, *Tanacetum vulgare* (чаще по межамъ, рѣже по пустымъ нивамъ), *Filago arvensis*, *Rumex acetosa* и *R. sceleratus annuus* — значительно рѣже, чмъ во ржи.

*Acetosella* (?), *Gnaphalium sylvaticum*, *Plantago media*, *P. lanceolata*, *Berteroа incana*, (по пустымъ нивамъ), *Crepis tectorum* (крупная форма, съ сильнымъ вѣтвистымъ стеблемъ), *Achillea Millefolium*, *Hypericum perforatum*, *H. quadrangularis*, *Lychnis Viscaria*, *Linaria vulgaris*, *Leucanthemum vulgare*; значительно рѣже встрѣчаются: *Apera Spica venti*, *Spergula arvensis*, *Melampyrum nemorosum* (ближе къ кустамъ), *Veronica arvensis* (?) (видъ точно не установленъ); *Campanula patula*, *Galium sylvaticum* (около кустовъ *Salix* и *Betula*, которые изрѣдка встрѣчаются по межамъ), *Stellaria graminea* (тамъ же), *Rhinanthus Crista Gallii* (мелкая форма, сравнительно со встрѣчающемся во ржи), *Prunella vulgaris* (въ затѣненныхъ мѣстахъ), тамъ же *Myosotis intermedia*; *Vicia angustifolia*, *Solidago virga aurea* (чаще по пустырямъ), *Deschampsia caespitosa*, *Calamagrostis epigeios*, *Dianthus deltoides*, *Carlina vulgaris*, *Carex pallescens*, *Poa compressus* и очень рѣдко *Trifolium elegans*, *Briza media* (1 экз. около кустовъ на пустой нивѣ), *Hieracium umbellatum* — (то же). Разбросанно, но мѣстами часто, встрѣчается 1 видъ хвоца, — который точно не опредѣленъ.

## II. Яровое поле.

### a) Полосы овса, гречихи, яровой ржи и картофеля.

Изслѣдованы сибирские поля дер. Турковъ и Бехтерева, Лукьянцевской волости, Покровскаго уѣзда, Владимірской губерніи. Поля

расположены по склону возвышенности, имѣющему направление къ Ю и ЮЗ. Съ двухъ сторонъ, СВ и ЮЗ, поля примыкаютъ къ ржанымъ полямъ тѣхъ же деревень; на СЗ они ограничиваются смѣшаннымъ лѣсомъ, а на ЮВ — лугомъ, который у самыхъ полей густо поросъ кустами *Salix*, *Alnus*, *Rhamnus*. Съ СЗ отдельные полосы лѣсныхъ зарослей врѣзаются иногда саж. на 60, 80 въ яровое поле.

Почва сухая, песчаная. Условія роста хлѣбовъ въ общемъ таковы: конецъ апрѣля (сѣвъ овса, посадка картофеля) сырь и холодно, до 10-хъ чиселъ мая, затѣмъ до конца июня очень жарко и сухо.

Въ поляхъ преобладаетъ гречиха, затѣмъ идутъ овесъ, картофель и 2—3 нивы яровой ржи. Гречиха развилась очень хорошо: и ростъ, и густота, и развитіе отдельныхъ частей ея выше средняго; засоренность ея весьма незначительна. Гораздо слабѣе развился овесъ, давшій нерѣдко рѣдкія, пизкорослые поросли и довольно большую засоренность; рожь очень низка, рѣдка и засорена, съ мелкимъ колосомъ; картофель выглядитъ хорошо (наблюдался онъ послѣ окучивания и полки, а потому очень чистъ); стебли его не высоки, но сильны, сочны; цвѣтъ довольно обильный.

Изъ сорныхъ травъ въ гречихѣ найдены: *Chenopodium album* — очень сильные, высокорослые экземпляры въ довольно значительномъ количествѣ и *Raphanistrum silvestre*; въ овсѣ: *Agrostemma Githago*, *Lolium temulentum* — растенія, свойственныя овсу и встрѣчающіяся въ незначительномъ количествѣ и преимущественно на нивахъ, расположенныхъ въ болѣе высокой части поля, *Glechoma hederacea* — въ болѣе рѣдкихъ посѣвахъ закрываетъ всю свободную поверхность, *Spergula arvensis*, *Rumex acetosa* и *acetosella*, *Centaurea Cyanus*, *Galeopsis tetrahit* и *G. speciosa*, *Achillea Millefolium*, *Pimpinella saxifraga*, *Vicia Cracca*, *V. angustifolia*, *Trifolium hybridum*, *T. agrarium*, *T. pratense*, *T. arvense*, *Mentha arvensis*, *Poa pratensis*, *Knautia arvensis*, *Polygonum Convolvulus*, *P. lapatifolium*, *P. nodosum*, *Apera Spica venti*, *Lagina procumbens*, *Plantago major*, *Viola tricolor*, *Pisum sativum*, *Crepis tectorum*, *Triticum repens*, *Stellaria graminea*, *Ranunculus acer*, *R. repens* (очень слабые экземпляры и рѣдко), *Prunella vulgaris*, *Potentilla norvegica*, *Campanula patula*, *Antoxanthum odoratum*, *Hieracium pratense*, *Tanacetum vulgaris*, *Spergula rubra* и *Panicum miliaceum*.

Почти всѣ перечисленныя растенія встрѣчаются и въ яровой ржи. Въ картофель замѣчены были виды *Rumex* и *Letaria viridis* и *Erodium cicutarium*.

### б) Межи и пустыри въ яровомъ полѣ.

Изъ растеній, свойственныхъ межамъ и пустырямъ, бросаются въ глаза *Centaurea phrygia*, *C. Scabiosa*, *Agrostis vulgaris*, *Erigeron acer*, *Carex leporina*, *Gnaphalium sylvaticum*, *Veronica Chamaedrys*, *Potentilla argentea*, *Leontodon autumnalis* (встрѣчается изрѣдка и въ посѣвахъ),

*Melampyrum nemorosum*, *Myosotis silvatica*<sup>1)</sup>, *Sceleranthus annuus*, *Silene inflata*, *Solidago Virga aurea*, *Galium Mollugo*, *Phleum pratense*, *Angelica silvestris* (1 экз.), *Alnus incana*, *Leucanthemum vulgare*, *Stachys palustris*, *Filago arvensis*, *Trifolium media*, *Hypericum quadrangulum*, *Hieracium umbellatum* (очень сильные экземпляры), *Rhinanthus Crista Galli* и *Trifolium elegans*.

Изъ растеній, отмѣченныхъ уже для нивъ овса, замѣчены на межахъ и пустыряхъ: *Spergula arvensis*, *Stellaria graminea*, *S. linearis*, *Galeopsis speciosa*, *G. tetrahit*, — болѣе крупные экземпляры, чѣмъ въ посѣвахъ, что можно сказать и относительно *Ranunculus repens*, *Trifolium hybridum*, *T. agrarium*, *T. pratense*, *Crepis tectorum* (низкорослая и высокорослая формы), *Tanacetum vulgaris*, *Antoxanthum odoratum*, *Pimpinella Saxifraga* (очень часто), *Potentilla norvegica*, *Glechoma hederacea*, *Viola tricolor*, *Polygonum lapatifolium*, *P. nodosum*, *Rumex Acetosa*, *R. Acetosella*, *Triticum repens*, *Prunella vulgaris*, *Poa pratensis*.

### III. Луговое сообщество.

Лугъ занимаетъ луку, образуемую довольно значительной петлей р. Киржача ниже Киржачской учительской семинарии. Весною онъ всегда заливается водою на высоту отъ 1 до 2 арш. Съ одной стороны (Ю.-В.) онъ прилегаетъ къ береговой возвышенности, покрытой на большей части смежнаго съ лугомъ протяженія сосновымъ лѣсомъ, а ближе къ лугу, по склонамъ возвышенности, зарослями, среди которыхъ преобладаютъ *Populus Tremula* и *Alnus incana* и встрѣчаются *Euonymus verrucosus* и *Rhamnus Frangula*. Такія же заросли разбросаны по всему лугу, ближе къ берегамъ, при чемъ среди нихъ вмѣстѣ съ *Alnus incana* встрѣчается *Alnus glutinosa* и въ значительномъ количествѣ виды *Salix* (*amygdalina*, *fragilis*, *daphnoides*, *cinerascens*).

Наиболѣе низменная часть луга пролегаетъ около береговой возвышенности; эта часть и наиболѣе сырая, болотистая, не высыхающая даже въ жаркое лѣто; наиболѣе высокая и сухая часть — самый мысъ. Отъ него по направлению къ сырой части и идетъ постепенный, почти незамѣтный склонъ. Вершина его, мысъ, съ песчаной, видимо намывной почвой; низменность — торфянникъ не особенно глубокій (около арш.); почва средней части луга — тяжелый суглинокъ. Нѣкоторая часть луга разработана подъ огородъ (около  $\frac{1}{4}$  десятины). На лугу, кроме указанного болота, есть еще 2 болотца; одно изъ нихъ не высыхаетъ, другое текущимъ лѣтомъ было сухо.

Растительный покровъ луга въ верхней его части рѣзко отличается отъ растительности низменной, болотистой части; средина луга представляетъ значительныя особенности по сравненію съ этими двумя

<sup>1)</sup> Определеніе, впрочемъ, сомнительное.

формациями, и наконецъ выдѣляется рѣзко сорная растительность огорода.

Фонъ растительности возвышенной части луга (назовемъ ее прибрежной) виды *Agrostis* (*alba* и *vulgaris*), *Festuca elatior*, которые располагаются порядочными дерновинами и группами. На этомъ фонѣ замѣтно выдѣляются *Equisetum* (точно не опред.), *Sedum acre*, *Galium Mollugo* (съ желтыми и бѣлыми цветами), *G. ruboides*, *Pimpinella Saxifraga*, *Libanotis montana*. *All.* и *Bunias orientalis* (рѣже по мѣрѣ углубленія въ лугѣ), *Capsella Bursa pastoris*, *Heracleum sibiricum*, *Aegopodium Podagraria* (ближе къ зарослямъ и среди нихъ), *Myosotis intermedia*, *Silene inflata*, а ближе къ берегамъ и *S. noctiflora* (определение впрочемъ сомнительное, можетъ быть и видъ *Saponoria*), *Poa pratensis* и *P. annua*, *Rumex Acetosella*, *Knautia arvensis*, *Linaria vulgaris Mill.*, *Trifolium montanum*, *Rhinanthus Crista Galli*  $\alpha$  *minor*, *Carduus crispus* (чаще у зарослей), *Berteroia incana*, *Geranium pratense*, *Leucanthemum vulgare*, *Carex vulgaris* (?), *C. Schreberi*, *Lychnis Viscaria*, *Euphrasia officinalis*, *Veronica Chamaedrys*, *Hypericum perforatum*, *Anthoxanthum odoratum*; нѣсколько рѣже и разбросаннѣе: *Silene tatarica* (у береговъ), *Achillea Millefolium* (разбросано), *Bromus inermis* (у береговъ), *Crepis tectorum* (какъ крупная, такъ мелкая форма), *Dianthus Seguierii*. *Vill.*  $\gamma$  *dentosus* (далеко у береговъ не встрѣчается), *Megicago falcata*, *Vicia cracca*, *V. angustifolia* (у самыхъ береговъ), *Campanula glomerata* (чаще по мѣрѣ углубленія въ лугѣ отъ береговъ), *Phleum pratense*,  $\beta$  *nodosum* (у береговъ), *Centaurea Scabiosa* (чаще по мѣрѣ углубленія въ лугѣ), какъ и *Centaurea phrygia*, *Triticum repens* и *Alchemilla vulgaris*, *Dianthus deltoides*, *Tanacetum vulgare*—главнымъ образомъ у береговъ и около зарослей.

Средняя часть описываемаго луга, которую назовемъ по преимуществу луговою, характеризуется тоже злаками главнымъ образомъ, изъ которыхъ и составляется фонъ растительности. Къ видамъ *Festuca* и *Agrostis*, которые въ общемъ достигаютъ здѣсь лучшаго развитія, чѣмъ въ прибрежной полосѣ, присоединяются виды *Poa* (*serotina pratensis*) и *Deschampsia caespitosa*, при чѣмъ послѣднее мѣстами, гдѣ посыреѣ, разрастаясь, почти вытѣсняетъ остальные злаки и вообще не даетъ простора другимъ растеніямъ; *Alopecurus pratensis*—вообще часто, но разбросанно; *A. geniculatus*—на болѣе сырватыхъ мѣстахъ, такъ же какъ *Apera Spica venti*; *Antoxanthum odoratum*—по всему лугу и часто, но рѣже на мѣстахъ сырватыхъ; *Phleum pratense*—не часто. На фонѣ этихъ злаковъ разбросаны болѣе или менѣе часто: *Pimpinella Saxifraga*,—исчезаетъ на мѣстахъ сырватыхъ; *Ranunculus acer*, *R. auricomus*, *R. repens* и рѣже *R. polyanthemos*, *Centaurea phrygia* и *Knautia arvensis*—исчезаетъ на мѣстахъ сырватыхъ, *Cerastium viscosum*, *Leontodon autumnalis* и рѣже *L. hastilis*, *Lathyrus pratensis*, *Trifolium medium*, *T. pratense*, *T. repens*, *T. hybridum*, и на сырватыхъ мѣстахъ *T. spadicem.*, *Campanula glomerata*. *Inula britannica* (ближе къ берегу, гдѣ посыреѣ), *Juncus filiformis* (сырватыя мѣста),

*Euphrasia officinalis*  $\alpha$  *pratensis* и изрѣдка, гдѣ посушѣ, *E. 3 nemorosa*, *Stellaria graminea* и *S. glauca*, *Luzula campestris*  $\beta$  *multiflora*, *Hieracium Pilosella*, *Dactylis glomerata*, *Brunella vulgaris*, *Rumex Acetosa*, *Rhinanthus Crista Galli*—по всей части часто, но на сырватыхъ мѣстахъ исчезаетъ, *Potentilla Anserina*, *P. Tormentilla*—ближе къ зарослямъ, *Caltha palustris*—болѣе сырья мѣста, *Lysimachia Nummularia*—разбросано между другими растеніями, *Galium palustre* и *G. uliginosum*—по болѣе сырьимъ мѣстамъ, *Carex leporina*—разбросанно, тамъ же *Carex pallescens*—разбросанно, *Carex vulgaris*, *Cardamine pratensis*, *C. amara* (болѣе сырья мѣста, свойственно скорѣе болотистой части луга, гдѣ встрѣчается часто); *Barbarea vulgaris*—по всей части разбросанно; *Draba nemorosa*, *Bromus inermis* (по болѣе сухимъ мѣстамъ); *Mentha arvensis*, *Veronica scutellata*, сырвато; *Campanula rotula*; *Leucanthemum vulgare*, *Ajuga reptans* (разбросанно); *Thalictrum simplex*—очень слабые экземпляры безъ цветовъ; *Polygala vulgaris*—не часто; *Lychnis Viscaria*; *Lychnis flos cuculi*—по сырватымъ мѣстамъ развивается сильнѣе; *Veronica longifolia*—чаще у береговъ и зарослей, *V. Chamaedrys*—по всему лугу; *Galium rubioides*—болѣе сухо, *Carex vulpina*—по мокрымъ мѣстамъ среди луга, у края болота, *Achillea Millefolium*, *Lysimachia vulgaris*, *Equisetum*—видъ точно не установленъ, *Plantago media*—разбросано, *Carex Schreberi*—гдѣ по-сушѣ, *Dactylis glomerata*—разбросанно, *Ranunculus Flammula* болѣе сырья мѣста и *Trollius europaeus*; виды *Viola*.

Третья, болотистая часть луга характеризуется видами *Carex* (*vesicaria*, *ampullacea*, *stricta*, *stellulata*), которые сплошь покрываютъ болото, мѣстами совершенно вытѣснія другие виды растеній. На болѣе сырьихъ, топкихъ мѣстахъ осоки разрастаются слабѣе и тогда между ними появляются: *Menyanthes trifoliata*, *Elatine triandra*, *Callitricha autumnalis* и *palustris*, *Geum rivale*, *Calla palustris*.

Затѣмъ въ болотистой части луга замѣчены слѣдующіе виды:  
а) около пней, кустарниковъ—*Solanum Dulcamara* (кучно), *Filipendula Ulmaria*—тоже, *Epilobium angustifolium*—тоже, *Humulus Lupulus*, *Rubus idaeus* (?) опр. безъ цветовъ, *Galeopsis speciosa*, *Lysimachia vulgaris*, *Veronica longifolia*—(главнымъ образомъ по окраинамъ у кустовъ и среди ихъ), *Cuscuta europaea* (на хмѣль), *Scrophularia nodosa*, *Impatiens noli tangere*—чаще въ заросляхъ, гдѣ сильно разрастается, *Rosa cinnamomea*, *Polygonum dumetorum*; б) болѣе или менѣе разбросанно по всему болоту: *Ranunculus acer*, *R. repens*—въ большомъ количествѣ и крупные экземпляры, способные выдерживать даже натискъ осокъ, кустятся между ихъ корневищами. *R. Flammula*, *Myosotis palustris*—между осокъ, гдѣ попросторнѣе, тоже *Lychnis Vesicaria* и *L. flos cuculi*—послѣднее болѣе сильно разрастается, чѣмъ на луговой части, *Pedicularis palustris*—часто и очень сильные экземпляры, *Glyceria fluitans*—въ одной части болота, ближе къ берегу рѣки вытѣсняетъ даже осоки, въ другихъ мѣстахъ очень разбросанно, *Comarum palustre*—чаще и

сильно разрастается на болѣе сырыхъ мѣстахъ, *Viola epipsila* — по кочкамъ, *Juncus filiformis*, *Eriophorum angustifolium*, *E. vaginatum*, *Deschampsia caespitosa* — разбросанно, *Cardamine amara*, *Caltha palustris*, *Trifolium repens* — по окраинамъ, *Brunnella vulgaris* — тоже и изрѣдка, *Poa pratensis*, *serotina* — тоже, но гораздо чаще, *Erysimum cheiranthoides* — тоже, *Scirpus silvaticus* — часто ближе къ окраинамъ у кустовъ, *Linaria vulgaris* — у окраины, среди кустарниковъ, *Sparganium simplex* — въ одномъ мѣстѣ, на днѣ большого углубленія, *Equisetum* — по болѣе топкимъ мѣстамъ, *Ptarmica vulgaris* — по окраинамъ болота и среди зарослей, гдѣ достигаетъ наибольшаго развитія (до 150 см.), *Calamagrostis lanceolata*, *Polygonum Hydropiper* — ближе къ окраинамъ, *Rumex domesticus* — среди болота и у зарослей (определение сомнительн. по отсутствію плода), *Alisma Plantago* — среди болота, *Digraphis arundinacea* — разбросанно среди видовъ *Carex*, *Alopecurus geniculatus* — болѣе сильные экземпляры ближе къ окраинѣ болота, *A. pratensis*, *Cirsium palustre* рѣдко на болотѣ, но часто по окраинѣ его у зарослей, *Tanacetum vulgare* — по окраинѣ, *Scutellaria galericulata*, *Leontodon autumnalis* — у окраинѣ, *Juncus effusus*, *Mentha arvensis* (а м. б. *aquatica*?), *Lythrum Salicaria* — въ прибрежной части болота, *Sium latifolium* и *Oenanthe Phellandrium* (въ другомъ болотцѣ, на топи), *Urtica dioica* — въ заросляхъ, рѣже на болотѣ, *Dactylis glomerata* — свойственно больше луговой части, *Cicuta virosa* — на болѣе сырыхъ и топкихъ мѣстахъ.

По зарослямъ, разбросаннымъ по окраинамъ и среди всего луга, встрѣчаются виды: *Poa*, *Festuca*, *Antoxanthum odoratum*, *Campanula glomerata*, *Urtica dioica*, *Geum strictum*, *Artemisia vulgare*, *Scrophularia nodosa*, *Stachys palustris*, *Aegopodium Podagraria*, *Bromus inermis*, *Cirsium arvense*, *Lappa tomentosa*, *Galeopsis Tetrahit*, *Lamium maculatum*, *Dactylis glomerata*, въ прибрежныхъ заросляхъ — *Bidens tripartita*, *Lysimachia vulgaris*, *Mentha arvensis*, *Scirpus silvaticus*, *Digraphis arundinacea*, *Inula britannica*, *Ribes nigrum*, *Veronica longifolia*, *Solanum Dulcamara*, *Ptarmica vulgaris*, *Tanacetum vulgare*, *Medicago falcata*, *Rumex aquaticus* (до 2 метр. вышиной), *Silene tatarica* — рѣдко, болѣе свойственно открытымъ мѣстамъ, *Ficaria ranunculoides*, *Adoxa Moschatellina*.

Совершенно особенную картину представляеть наконецъ засаженный капустою огородъ, расположенный тутъ же на лугу, у берега р. Киржача. Топографическая и почвенные условия здѣсь тѣ же, что на средней части луга, но картина растительности совершенно иная. Фонъ представляютъ — *Stellaria media* и *S. graminea* въ *lanceolata*. которыхъ, особенно первая, разростаясь, сплошь покрываютъ гряды и межи. Затѣмъ рѣзко выдаются очень сильные, вѣтвистые экземпляры (до 1 метра) *Chenopodium album* и *C. rubrum*, а также и *Polygonum lapathifolium* и *P. nodosum* (весыма сильные экземпляры), *Sonchus arvensis*, *S. asper*, *Erysimum cheiranthoides* (сильные вѣтвистые *foliosum* вмѣстѣ съ болѣе слабыми, даже мелкими формами), *Solanum nigrum*, — всѣ эти растенія встрѣчаются особенно часто и рѣзко выдѣляются на общемъ

фонѣ описываемой формациі. Далѣе слѣдуютъ довольно часто: *Glechoma hederacea*, *Spergula arvensis*, *Amaranthus Blitum* — сильные экземпляры, съ приподнимающимися или лежачими вѣтвями, *Echinochloa crus galli* — очень сильные экземпляры, *Potentilla anserina*, *Nasturtium officinale*, *Mentha arvensis*, *Setaria viridis*, *Trifolium repens*, *hybridum*, *pratense*.

Рѣже, разбросаніе встрѣчаются: *Rumex acetosella*, *Urtica urens* и *dioica*, *Linaria vulgaris*, *Stachys palustris* и *Cirsium arvense* (сильные экземпляры), *Capsella Bursa pastoris*, *Erodium cicutarium*, *Lamium incisum*, *Camelina sativa*, *Polygonum Convolvulus*, *Vicia angustifolia* и рѣдко: *Gnaphalium uliginosum*, *Polygonum amphphybium* — (одна листва, опредѣление сомнительное), *Eryngium hirsutum*, *Artemisia absinthium* (одна листва), *Matricaria inodora* — сильные экземпляры и *Plantago major* — одинъ экземпляръ.

Н. Кузнецовъ.