

16843.

ANALECTA QUAEDAM  
AD INFUSIONEM

.....  
DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA

QUAM  
CONSENTIENTE AMPLISSIMO MEDICORUM  
ORDINE

IN  
CAESAREA LITERARUM UNIVERSITATE  
DORPATENSI

PRO GRADU  
DOCTORIS MEDICINAE

LEGITIME IMPETRANDO

LOCO CONSUETO

PUBLICE DEFENDET

AUCTOR

J O A N N E S P R E V O T

LIVONUS.



.....  
DORPATI LIVONORUM  
EX OFFICINA ACADEMICA J. C. SCHÜNMANNI  
MDCCGXXIII.

In primatur,

ea tamen conditione, ut, simulac typis excusa fuerit  
dissertatio, septem exemplaria collegio, cui librorum  
censura est, tradantur.

Dorpati Livonor. d. xx. Mens. Maij.

MDCCXXIII.

Dr. J. C. Moier,  
h. t. Decanus.

E. G. B R A C H M A N N

avunculo suo dilectissimo

Div 6 60

P r a e m o n i t a.

studiorum primitias

pia grataque mente

D. D. D.

A U C T O R.

Medendi methodus, quam tractandam  
deligere visum est, cum parum adhuc  
esset sive tractata, sive exulta, mihiique  
deessent virorum doctorum, qui in ea  
disquirenda versati sunt quaedam opera:  
cum variis conflictandum mihi erat  
difficultatibus. Hinc habeo sane, quod  
nimiae brevitatis et manci nullaque ex  
parte perfecti in hujus medendi methodi  
historia contexenda sermonis veniam  
mihi exorem a beneolis lectoribus.  
Praeterea neutiquam mihi proposueram  
omnino exantlare hancce materiem, non  
nisi methodi illius medendi tractandae, a  
tam multis medicis despiciatui habitae  
omninoque rejectae, plerumque in ni-  
miae artis argutiis numeratae, collatu-

rum qualescunque symbolas. Verum enim vero salutarem mirumque istius methodi vim probaturo insignia quae-dam ac memorabilia in medium proferre visum est exempla. Non in ancipitibus suspectisque opinionibus fingendis theo-riisve fabricandis versatus, magis de mirae illius methodi fine pratico cogitavi. Quam quidem ob causam experimenta ab Ill. Hornio facta necdum cognita, atque ex ephemeridibus suis clinicis benevole mecum communicata nauci floc- cique nemo habuerit lectorum.

Quos denique, hoc qualemque opusculum tironis esse medici haud im-memores, ex aequo bonoque judicare velint, ea, qua par est, observantia enixe rogo.

.....

## C a p u t I.

### *Prooemium.*

#### §. 1.

Ingestionem fluidorum in animantibus corporis vasa sanguifera, infusionem dicimus.

#### §. 2.

Primum infusionis adhibitae finis mere physiologicus erat, experimentis in mammalibus factis; ex iis, quae inde erant comperta, circula-tionis sanguinis ab Harvey detectae argumenta mutuabantur. Deinde sensim invalescere coepit infusionis usus, ut turbatae valetudini hac etiam ratione medicamine corpori ingestu, consuleretur.

## §. 3.

Experimenta per vices varioque tempore facta qui examinaverit, diffiteri non potuerit, quorundam saltem prosperrimum fuisse successum. Est igitur, quod doleas, infusionis usum non fuisse unquam frequentiorem, nec omnino studium ejus frequentius. Nam si quis hujusc methodi medendi historiam lustraverit, non intelligere non potest, hodieque eam versari in ipsis suis incunabulis.

## §. 4.

Jam diu est compertum, esse materias, quarum vis ac virtutes in tractu intestinorum utique pereant assimilando, quippe quae non nisi proxime susceptae vigere in sanguine possint, ut venenum viperarum, contagium hydrophobicum, lympha variolae vaccinae, fortassis et plura alia istum in finem nondum satis examinata. Nonne experientis illis adducti, ad morbos curandos, in quibus tractandis medicamentorum solita via adhibitorum iners atque inefficax vis cernitur, quorumque cura consueta methodo instituta, sive plerumque sive omnino successu caret, ad infusionis usum configere suaserimus?

## §. 5.

Infusionis hodieque nimis raro adhibitae, neque ad altiorem perfectionis gradum evectae vera causa tum in eo quaerenda esse videtur, quod complures docerent auctores, medicamentorum salutarem vim in organismum exserendam esse nullam, nisi in organis assimilantibus ante immutatorum; tum quod Metzgerus \*) aliquie illam medendi methodum criminarentur ac de famâ ejus detrahere studerent, tum denique, et maxime quidem, quod experimenta longe frequentius sine fructu atque insauste, quam fauste, essent instituta. Infusionis vero male succendentis exempla diligentius examinans facile plerumque edocetur aut operationem male esse factam, aut in eligendis aegrotis, quibus infusionis usu medicari vellent, ea, qua par erat, cura ac sollicitudine usos non fuisse medicos, periculo in aegris facto, qui, Hemmanno \*\*) mouente, omnino non,

\*) Metzgeri Skizze einer pragmatischen Litterargeschichte der Medicin, §. 268, Königsberg 1792.

\*\*) Hemmanni medicinisch - chirurgische Aufsätze, Berlin 1778.

nisi miraculo portentoque sanari potuerant, aut in medicamentorum adhibitorum sive quantitate, sive qualitate determinanda fuisse hallucinatos, quum constet, cujuscunque medicamenti efficaciam tum omnino ex vario statu vitali, tum ex organo suscipiente, ejusque relatione ad uniuersum organismum, pendere.

§. 6.

Etiamsi vis medicamentorum per tractum intestinorum quae suscipiuntur, cum iis, quae venis injiciuntur, certa quaedam reperta esset convenientia, ex horum organorum receptivitate specifica, atque ex materie in ejusmodi locis suscepta, in quae alioquin non nisi per ambages influxum quempiam exercere potest, et quo, tanquam materia rufis, neque omnino assimilata nunquam pervenit, magna non enasci non potest differentia, solis sane experimentis reperienda.

§. 7.

Jam operationis locus, magis minusve ab organo systematis vasorum centrali, ab corde remotus, circa vim medicamentorum magnum infert differentiae gradum. Quanto quidem huic est proprior, tanto celerior magisque vigens compa-

ret reactio. Quod ad probandum et confirmandum, experimentorum quorundam illuc spectantium mentionem facere liceat: experimento in duobus canibus a Baglivio \*) facto, alteriusque venae jugulari duabus uncii spiritus vini vixdum injectis canis mortuus est; iisdem alterius canis venae crurali injectis, per minutiores unius horae particulas vehementi horrore canis correptus, copiosa urina reddita, mox convaluit. Deidierius \*\*) similia in animalibus fecit experimenta, felle hominum peste peremtorum injecto. Celerius, saevioribusque symptomatiibus concomitata mors consequebatur infusione in venam jugularem, tardius in venam cruralem, facta. Bichatus \*\*\*) aere in venam portae canis immisso, seriorem animadvertebat effectum minusve vehementem, quam venis injecto, sanguinem, via magis compendiaria ad cor devehentibus.

\*) G. Baglivii opera. Norimberg. 1751, p. 674.

\*\*) Deidier in: collection de la peste, An. 1744, p. 566.

\*\*\*) Bichat Recherches sur la vie et la mort, seconde édition, Paris 1802, p. 180.

## §. 8.

In animalibus plurima hodieque facta sunt experimenta, et ad determinandam quidem medicamentorum utique in vasorum sistema ingestorum efficaciam. Et fac, haud satis tuto statui posse, eadem et in homine non comparere non posse phaenomena, unicam tamen illam periculorum faciendorum rationem dixeris ad remediorum hoc quidem modo adhibitorum efficaciam in humano corpore quodammodo cognoscendam. Hallerus \*) observat, canes plerumque majoris doseos patientes esse, quam ipsos homines. Minus tamen in definienda infusionis usus opportunitate versati sunt medici, neque in morbis valde diversis hodieque adhibuerunt. Quando, et quibus in morbis suadendus sit infusionis usus, hoc quidem monstrandi postrema dissertationis nostrae sectione magis opportunus fuerit locus, id tamen praemonendum nobis esse videtur, infusionem, exemplorum, quae nobis quidem innotuerunt, ratione habita, hodieque faustissimo

\*) Halleri Elementa physiologiae. Lausanne, An. 1757, Tom. I, p. 229.

successu esse adhibitam in iis morbis curandis, in quibus sanguinis *duorum*, in morsu viperæ, sicut in spasmis tonicis et chlonicis, in morbis animi et in oesophago corporibus heterogeneis occluso, ad vomitus accelerandos. Praeterea et cerebri exsudationem lymphaticam cum sensibilitate depressa concomitantam infusione fere omnino sanatam commemorat Hunnius. Cel. Magendius experimenti notatu dignissimi in cane, Hydrophobia laborante a se facili mentionem facit. In medium proferre liceat quaedam gravioris notae momenta:

## §. 9.

Febri putrida laboranti cuiquam de cuius salute fere desperandum erat, Hemmannus injiciebat decocti cortic. petuviani concentrati, in quo aliquantulum salis C. C. solutum fuerat,  $\frac{Z}{3}$  jjj. Haud ita multo post, invalescente pulsatione audore male olente subsecuto, melior aegroti conditio erat. Subsequentis diei autem matutino tempore cum in pejus recideret, injectione extra-

\*) Hemman, l. c.

cti chiae cum sale essentiali, (utroque in aqua soluto), per venam repetita, omnino convalevit aeger.

Scorbutus aqua cochlearia injecta est sanatus. \*)

§. 10.

Larreyus et Petitius \*\*) multa in tetano experimenta fecerunt et solutione quidem extracti opii aquosi injecta exoptatos animadverterebant successus. Post in nosocomio Abattoriensi, Memilmonte constituto, in militibus rossicis infusionis periculo publice facto, sanatorum ad mortuos relatio erat 5:8. Nulladum mihi quidem innotuit medendi methodus, cuius in tractando tam horrido morbo tam faustus unquam fuisse successus.

Feminam spasmis epilepticis vexatam, haemorrhagia narium ita restincta, ut frigida aqua capiti subito infunderetur, moscho injecto omnino sanavit Hemmannus. \*\*\*)

\*) Italienische Bibliothek v. Weigel, 3. Bd. 2. St. p. 48.

\*\*) Dictionnaire des sciences medicales, Tom. 25, p. 31.

\*\*\*) Hemman, l. c.

§. 11.

Maniae, infusionis beneficio, sanatae exemplum commemorat C. W. Hufelandius \*) et in puella quidem viginti duos annos nata. Tartaro stibiato, frigidae aquae superfusionibus balneaque sine ullo fructu adhibitis, novus dirusque morbi impetus cum rediret, Tart. stibiat. gr. jv, Camphor. gr. jv cum mucilaginis Gumm. arabici 3jj sinistri brachii venae medianae injectis, horis viginti quatuor elapsis cum nullus dum animadverteretur effectus, sequente die dextri brachii venae eadem medicamentorum commemoratorum portio est ingesta. Sub vesperam insequerentur vehemens eructatio, vomitus, aestus, maniaeque remissio. Nocte somno tranquillo perfecta, mane sui utique conscientia erat puella, queribunda de summo languore! Diebus XVI. quiete consumatis, redibant maniae symptomata. Hinc Tartari stibiat gr. vij. cum aequali Camphorae portione et Gumm. arabici mucilagine injectis, post horas XV. quiescere quidem cooperat morbus,

\*) Hufelands neues Journal der practischen Heilkunde, Bd. 23, St. 1, p. 177.

sed non nisi dierum XVII. illa erat remissio. Quum deinde, et quarta quidem vice, injectio modo commemorata repetita fuisset, quietus aegram occupavit somnus, ingente sudore per complures horas madentem. Expergiscente puella disparuerat omnis mania. Per sex hebdomadas diligenter observata, nullo omnino symptomate virgo vexata, unde maniae redditum licuisset suspicari.

§. 12.

Adversus viperarum morsu*s* infusione Guazzius \*) usus est faustissimo successu, adeo remediis omnibus quorum et internum et externum usum ars medica suaserat, frustra adhibitis, aegro vix dum spirante, citra motum jacente, corpore jam frigescente, pulsione haud amplius percipienda. Spirit. C. C. guttis XVI. vix ac ne vix quidem injectis, oculis apertis, loqui coepit aeger; haud ita multo post satis facilis erat artuum motus, pulsatione vigente ac celerante, calore reduce, tranquillus erat nocturnus somnus, ita, ut, sequente mane par eset obeundis suis negotiis. Jam ante

\*) Italienische Bibliothek, l. c. p. 47.

Guazzium, Hannibal Bastianus \*) et Valisnerius \*\*) infusione spiritus C. C. pariter usi sunt prosperrimo successu, vel tum etiam, cum parum spei salutis fuisset.

§. 13.

Venae medianae militis, cujus in oesophago frustum carnis fixum haerebat, ita, ut neque extahiri, nec detrudi posset, solutionis Tartari stibiani gr. jjj a Köhlero \*\*\*) injectis, vomitus est obortus, quo carnis frustum ejiciebatur. Duo alia exempla huic fere similia commemorat Baleckius \*\*\*\*). Cel. Graefius, Med. Prof., \*\*\*\*\*) paria, infusionis Tart. stibiat. gr. jj, in mucilagine G. arab. solutis, expertus, successu gaudebat prosperrimo in homine, cui os quoddam deglutitum oesophagum omnino obstruxerat, adeoque inhaesit, ut medicorum complurium id vel extrahendi vel deru-

\*) Nuovo magazino Toscano, Vol. III., p. 174.

\*\*) In Galer. di Minerva, T. VII., p. 155.

\*\*\*) Schmuckers vermischtte Schriften, Berlin 1772, p. 239.

\*\*\*\*) Mursinna's Journal für Chirurgie, Bd. II, St. 2, p. 64.

\*\*\*\*\*) Salzburger Zeitung 1819, No. 54.

dendi conatus, per triduum adhibiti, irriti essent, quum demissius haereret, quam quod laryngotomia depromi posset.

§. 14.

Hunnius \*) hominem annorum LXXVIII, ceteroquin robustum, exsudatione ventriculorum cerebri laborantem curaturus, Serpentaria, Senega, Camphora, Belladonna et similibus usus erat remediis, sine ullo fructu. Periculum, cui obnoxius aeger erat, cum magis magisque auctum videretur, ita, ut vix suscitandus esset ex suo sopore; responsa ejus omnimodam mentis alienationem proderent, ad lecti sui inferiorem asserem saepe laberetur, os pateret, manus pedesque frigerent, pulsus parvi et intermittentes, fere omni salutis spe abjecta, infusionis periculum facere statuit ille. Dextri brachii venae medianae injiciebat Camphorae gr. vij. cum tenuis mucilaginis seminum cidoniorum 3; &. Quibus vix ingestis, adaperiebat oculos aegrotus, compos sanae mentis. Mirum in modum invaluerat dextri brachii

pulsatio, sinistri pulsatione parum immutata. Unius horae minutis particulis x elapsis in quietem recreantemque somnum incidit. Postero die auctae vires erant; deinde idoneis medicamentis solita via adhibitis, horum beneficio brevi tempore fere omnino pristinam recuperavit sanitatem.

§. 15.

Efficacissima maximeque praesentanea aliquin medicamenta, ut narcotica, vasis sanguiferis injecta Magendio \*) quidem auctore, neque in homines, neque in animalia hydrophobia quae laborant, vim exserunt ullam. Monet vir Cellerimus, venis hydrophobia correpti canis opii ad gr. x sese injicisse, nullo omnino prodeunte narcatico effectu, dum sanus, beneque valens canis ex uno grano abripi soleat in somnum. Ille et Cel. Dupuytrenius adolescentis hydrophobiae obnoxii venae radiali extracti opii gummosi gr. vijj injiciebant, vix percipiendo effectu. Canes rabirosi acidum hydrocyanicum venis injectum sustinebant, morbi sui conditione neutiquam immu-

\*) Hufeland l. c., Bd. 22, St. 4, p. 44.

\*) Journal de physiologie expérimentale, No. 1.

tata. Magendio, memori, rabie correpta animalia, tum omnino abstinere a fluidorum potu, tum perspiratione, motum vi insignem istorum facere jacturam (inde videre quidem licet densum serique fere utique expertem sanguinem e vena emisum); memori praeterea, vasis artis ope aqua repletis mirum in modum infringi ac debilitari systema nervorum, insigne in mentem veniebat, ad hydrophobiam debellandam, calidae aquae infundendae consilium. Hinc in cane femella, summa rabie correpta, hocce fecit experimentum: Vena jugulari sinistra denudata atque incisa sanguisque circiter lib. j emissa, aquae calidae unciae circa L. x. vicissim injiciebantur. Cujus quantitatis dimidia fere parte in venam ingesta, jam valde extensa erant vasa. Quam ob causam Cl. Magendius inferiori venae parti, dum infundere pergebat, ex superiori, sanguinis aqua jam permisi uncias x — xij emisit. Quo facto quieta ac tranquilla decubuit canis, incurvata; tanquam dormitura, id quod, ex quo correpta hoc morbo erat, nunquam animadverti licebat. Nec minax amplius videbatur vultus. Verum enim vero experimento finito verebatur vir Gel. ne nimium

aquae injecerit, indeque pulmonum vasis sanguiferis justo magis oppletis, ne in vitae discriminine versari canis posset. Neque irritus metus erat. Nam quinque horis post infusionem calidae factam angore pectoris afficta canis, magis magisque aucto, hora dimidia post exspiravit. Sed rabiei tamen ipius nullus amplius redierat impetus. Cadaveris sectione facta, nulla observabatur sive cerebri, sive medullae spinalis, sive organorum coctionis enormis alienatio, nisi quod glandulae salivales tumore insigne ruberent, ex aquoso sanguine turgidi reperirentur pulmones, trachea et bronchia spuma subfusca repleta, membrana pituitaria inflammata.

Fortassis igitur aliquando contigerit, ut hydrophobia, quam medicorum crucem ac flagellum dicere possit, quippe quae hodieque omnibus medendi methodis pertinaciter obstinateque obsticeret, hac curandi methodo admissa fausto Marte impugnetur.

#### §. 16.

Quum, infusione, a sanguine proxime excipiantur medicamenta, remediis cor proxime incitantibus illa est adnumeranda, digna igitur, cu-

ius in asphyxiis usus haud minus, quam ceterorum, ut caloris, electricitatis, aëris in pulmones inflati etc. commendetur. Vena jugularis, aut, infan- tum asphyxiae obnoxiorum, umbilicalis, infusioni perficiendae quam maxime videtur esse ut idonea, ita et commendabilis. An in hominibus istiusmodi experimenta facta fuerint cum fausto suc-cessu, equidem ignoro. Unius quidem in catello asphyxia correpto, facti, mentionem facit Schurigius<sup>\*)</sup> Spiritus vini Rhenani aliqua pétuncula venae istius umbilicali infundendo injecta, vita, quae ante quasi condormuerat, mox expurgis- batur.

§. 17.

Submonendum mihi praeterea videtur, infu- sione facta, locum illius, per jam ampliorem jam arctiorem ambitum haud raro levi inflammatione compicuum esse solet, insuper venae sanguine ibidem coagulatæ. Maxime vero ex acidis inge- stis, quae sanguinis albuminosam partem adiungunt ad coagulandum, id quod præsertim injectione

justo velocius temereque facta, periculum adferre potest aegroto. Cujus rei compluria Haller<sup>\*)</sup> in medium protulit experimenta. At cum levior fuerit inflammatio, neque insignis coagulatio, ni- hil minantur periculi, chirurgiae beneficio utra- que facile depellenda.

<sup>\*)</sup> Haller elementa Physiologie, T. 1, p. 227.

<sup>\*)</sup> Embryologia a Schurigio. Dresdae et Lipsiae, 1732, p. 227.

## Caput II.

### *Historiae infusionis breviarium.*

§. 18.

Ad prima infusionis fabulosa vestigia si retrogradi velis in Aesonis mytho \*) ea deprehenditis, Medeamque veneficam (*Φαρμακία*) eam dixeris, quae, quod sciamus, prima hanc adhibuerit medendi methodum. Post millia annorum elapsa A. S. MDCXXVIII, Collius \*\*), Medicinae in Paduana literarum universitate Professor publicus, primus istam methodum fusius descriptis et A. S. MDCXLII, Wahrendorfii, equitis Lusatici,

\*) Ovid. Metamorphos. Lib. VII., v. 285.

\*\*) Colle Methodus facile parandi jucunda, tuta et nova medicamenta. Venetiis 1628. Cap. 7, p. 170.

nobili stirpe oriundi, quidam venator canum venis vinum infusisse fertur \*). Sanguinis circulatio ab Harveyo detecta ad theoretica infusionis praecepta reperiunda non adducere nec fidem ejus tueri non poterat. Anno deinde MDCLVIL Cl. Wrenius \*\*), societatis scientiarum Londinensis conditor, Roberto Boylio \*\*\*) Timotheo Clarkio \*\*\*\*), Henshawio †), et, aliquo tempore post, Richardo Lowerio ††) medicamentorum in viventium animalium venas infundendorum pericula faciendi ansam praebuit. Inter Germanos A. S. MDCLXI, similia Joannes Sigismundus Eleholz ††) facere ausus est experimenta. His quidem omnibus, ultra pericula in animalibus facta

\*) Sprat history of the royal society of London, London 1667, p. 317. Christoph Wren was the first author of the noble anatomical experiment of injecting liquors into the veins of animals.

\*\*) Boyle in philosophical Transact, nq. 22.

\*\*\*) Clarke in philos. Transact, 1628, nq. 35 sq.

\*\*\*\*) Henshaw in philos. Transact. 1628.

†) Lower de corde, Amstel., c. 4, p. 117.

††) Clysmata nova et ratio, qua in venam seetam medicamenta immitti possunt. Coloniae ad Spream 1667.

non progressis, Colladonius \*) primus fuisse perhibetur, qui eo audaciae processerit, ut venia humanis fluida injiceret. Jamnunc publice prodibat Joannes Daniel Major, Medicinae Professor Kiloniensis, in compluribus suorum operum docens atque adserens, \*\*) infusionis fluidorum in viventium animalium venas inventae (quae tum, et aliquo etiam tempore post et artis infusoriae et chirurgiae infusoriae nomine venire solebat) sibi soli deberi honorem, enumeratis quidem factis a se periculis. Ex quibus id saltem illuscescit, primum hunc fuisse, qui in

\*) P. Scheel, die Transfusion des Blutes und die Einspritzung der Arzneien in die Adern, Koppenhagen 1802, 1. B., p. 38.

\*\*) D. Major prodromus inventae a se chirurgiae infusoriae, Lips. 1664.

Eiusdem Chirurgia infusoria, Kilon. 1667.

- Occasus et regressus Chir. infus., Gothae 1667.
- Appendix ad scriptum Occas. et Regress. Chir. infus., Gothae 1667.
- Memoriale anatomico - miscellaneum, Kil. 1669.
- Deliciae hibernae s. tria inventa medica, Kil. 1670.
- Dissertatio de clysteribus veterum ac novis, Kil. 1670.

transfundendo sanguine in homines periclitaretur. Quae sanguinis transfusio tum quoque ipsa infusione frequentius exercebatur, usque dum transfusionem quarundam funestus successus aulae supremae regni Franco-Gallici Parisiis Lutetiorum constitutae (Parlement) decreti publicandi ansam praeverberet, cujus tenore transfusione in hominibus uti nefas esset, id quod pontifex Romanus jam ante ediderat. A. S. MDCLXVIII Schmidtius \*) et Fabricius \*\*), uterque Gedani, in syphiliticis, arthriticis atque epilepticis infusione usi sunt haud sine fausto successu. Et Mathias Godofredus Purmännus \*\*\*) A. S. MDCLXXXIII infundendo supra ipsius medicus factus, inverteratam, qua laboraverat, scabiem, deinde etiam febrem intermittentem quotidianam, qua serius vexatus erat, infusione in semet ipso adhibita, dexterime sanavit. Inter Italos, in infusione primi periclitati sunt

\*) Journal des savans 1668, p. 436.

Ettmüller, de chirurgia transfusoria, p. 36.  
Philosoph. Transact, nq. 30, 34.

\*\*) Fabritius in philosophical, Transact nq. 30,

\*\*\*) Chirurg. Lorbeerkrantz, T. III, p. 277.

Sarpium et Follius \*) A. S. MDCLXXX. Follius quidem acres animalium venis ingerebat materies, quorum experimentorum mentionem facit rationemque reddit in litteris ad Malpighium datis. Plurimorum eventus erat lethalis. Deinde et Regnerus de Graaf \*\*), A. de Heyde \*\*\*), Freindius \*\*\*\*) et Franciscus Petitius †) et physiologis quidem rationibus ducti, maxime ad sanguinis coagulationem ejusque rationem rectius perspicientam, in animalibus infundendi faciebant pericula. Sub initium Seculi XVIII. Valisnerius ‡‡) ad viperae morsum usus est infusione. Pinellius †††) in venenis infundendis est periclitatus, id

\*) Folli stadera medica nelle quale oltre la medecina infusoria si bilancia la transfusione del sangue Fivene 1680.

\*\*) R. de Graaf def. contra Swammerdam, p. 319.

\*\*\*) Heyde observationum, nq. 90.

\*\*\*\*) Freind Emmenologia, p. 217 seq.

†) Lettres d'un Medecin à un autre medecin, Namur. 1704.

††) In Galer di minerva, T. VII, p. 135.

†††) Pinelli del origine e principio della podagra, Romae 1734.

quod deinde Sproegelius \*) ausus est, venenis venae jugulari ingestis. Deidierius \*\*) pestilentiae vi Massiliae late vagante, acidorum animalibus infundendorum pericula fecit. Loesekins et Lieberkühnius periclitabantur potissimum in emeticis ac purgantibus infundendis. Eodemque fere tempore, circa medium Seculi XVIII. ad viperarum morsus, infusione usi sunt Guazzius \*\*\*) et Hannibal Bastianius \*\*\*\*). Emetico injecto ex suffocationis discrimine hominem eripuit Köhlerus †) eodem tentamine a Baleckio ‡‡‡) deinde repetito. Anno MDCCCLXXVIII Hemmannus in febre putrida et epilepsia et Anno MDCCCLXXX Regnaudotus †††) infusione usus est in asphycticiis,

\*) Sproegel Diss. experimenta circa venena in varia animalibus instituta, Goetting. 1753.

\*\*) Haller Physiologia, T. II., p. 75. Deidier experiences sur la bile et les cadavres des pestifères etc., 1772.

\*\*\*) Vid. §. 11.

\*\*\*\*) Vid. §. 11.

†) Vid. §. 12.

††) Vid. §. 12.

†††) Regnaudot Diss. de chirurgia infusoria renovanda, Lugd. Batav. 1780.

at sine fructu. Recentiori aetate in curandis equis,  
maxime blenorhoea narium laborantibus, Vibor-  
gius et Scheelius \*), multa faciebant infusionis  
experimenta, qua et ill. C. W. Hufelandius \*\*) ad  
morbos animi, Hunnius \*\*\*) ad exsudationem ce-  
rebrei fractamque sensibilitatem, Graefius \*\*\*\*) osse  
oesophago inhaerente usi sunt haud sine prospero  
successu; aliis praeterea a Bichato, Magendio,  
Orfila, Larreyo, Nystenio, Dupuyo aliisque inter  
Franco-Gallos factis infundendi periculis.

---

\*) Scheel l. c.

\*\*) Hufeland l. c., B. 23, St. 1, p. 177.

\*\*\*) Vid. §. 13.

\*\*\*\*) Vid. §. 12.

### C a p u t III.

#### *Infusionis exercendae methodus.*

##### §. 19.

Quae, circa varium ejusdem remedii venae  
injecti effectum, invenisse sibi videntur medici,  
aliquam certe partem ex ipsius actionis methodo  
prodierint. Quo velocius instituitur injectio, eo  
celerior & validiorque illius est effectus. Hinc fere  
factum esse videtur, ut medicorum observata,  
circa aërem venae inflatum cum vulgo communi-  
cata alia aliis contradicerent. Sic Bichatus \*)  
adserit, jam aërem semipollisis (quoad altitudi-

---

\*) Anatomie generale, T. II.

nem et longitudinem latitudinemque) spatum impletum ( $\frac{1}{2}$  Cubicoll) cani, mediae corporis magnitudinis, inflatum, mortem omnino inferre. Magendius \*) contra, venae tantidem canis sensim aëris ejusmodi pollicibus LV inflatis, non nisi exlem vixque acceleratam respirationem inde effectam animadvertis.

Experimentis magis exoptato successu factis satis edocemur, injectionem lente, nec nisi guttatum esse instituendam, et fluida ingerenda quaeque, temperiei i. e. caloris sanguinis esse debere. Suspiciari igitur licet, vehementiorem medicamentorum more solito assumtorum vim saliva, succo gastrico, mucilagine gummosa, quibuscum miscentur, frangi.

#### §. 20.

Infusorii, seu supellectilis, quo ad injicienda fluida utuntur, forma varia ac diversa est, inde ex Harveyi aetate vario modo immutata. Wrenius \*\*) utebatur exili tubulo coniformi, cum adfixa vesica, fluido injiciendo replenda.

\*) Dictionnaire des scienc. medic. T. XXV. p. 29.

\*\*) Philosoph. Transact. No. 7.

Ad opus adgrediendum se accingens, cuto dissecta, vena denudata eademque aperta tubuli cupidem caute solliciteque immittebat. Blumenbach \*) magis arridebat, vesicae loco, ampullula ex resina elastica facta. — Stanneo seu argenteo siphunculo duarum unciarum molem capiente, uti visum est Scheelio \*\*). Cuspideri fecerat ex resina elastica, finem argenteum. Deducebat hunc super specillo concavo in venam. — Alius supellectilis conditio ac ratio haec est: Cogitato de infundibulo ventrioso in tubulum fere angularem desinente. Tubuli hujus superiori parte obturamento occlusa, spatum superius fluidi injiciendi praestituta quantitate, oppletur. Obturamento deinde extracto, sua ipsis gravitate fluidum guttatum detruditur in venam \*\*\*). Quum autem istis supellectilibus exhibitis sanguinis jactura arceri nequeat, ad hanc, quantum ejus fieri

\*) Blumenbach introd. ad historiam medic. litterar. p. 299.

\*\*) Scheel Transfusion des Blutes, Bd. II., p. 239.

\*\*\*) Pierer's anatomisch + physiol. Realwörterbuch, Bd. 4, p. 215.

possit, maxime imminnendam, Ill. Graefius \*),  
Med. Prof. suadet, cute dissecta, subili acu tri-  
quetra eademque curvata venam aperire, acuque  
retracta, tubulo in vena relicto, siphonis aequo  
curvatam cuspidem immittere.

\* Eduard Graefe Diss. de nova infusionis methodo,

.....

#### C a p u t . I V.

*Experiundo de infusione, Ill. Hornii,  
Prof. Med. auspiciis cognita.*

#### §. 21.

Transimus jam ad experimenta cintumferenda  
infusione, in nosocomio caritatis Berolinensi, Ill.  
Hornio atuspice ac moderatore facta, et in homi-  
nibus quidem, qui vehementibus spasmis, maxi-  
me vero epilepsia mentisque alienationibus labo-  
rabant, in quibus tractandis, per complures annos  
singulis, quas ratio medica suaserat, medens  
di methodis adhibitis, oleum et operam perdi-  
rant artis salutaris peritissimi. Quanta infusionis  
vis fuerit, in miseros exserta, ex infra commen-

morandis experimentis ipsis intelligas. Infusione non nisi in affecto nervorum systemate adhibita, quum internus organismi factor, tanquam aeterna vitae idea, definiri nullo modo possit, nec nisi externus, circa vim, qua in organismum pollet, regi ac determinari, eaque re sola peculiarem atque arbitrariam vitae evolutionem provocari licet, minus equidem singularum nervosae passionis formarum rationem habui, quam efficaciae qualiscunque adhibitorum medicaminum ac phaenomenorum istis praebitis animadversorum; quae quidem potissimum commemorare consultum duximus. Nec temere, uti videtur; cum plurimorum medicamentorum infundendo adhibitorum usus iteratus crebro fuisset, qua quidem crebra repetitione infusionis omnis vis, quam humanis organis praestat, tutius expeditiusque definiri possit.

Materies medicæ, infundendo tunc adhibitæ, quarum definienda nobis sese obfert efficacia, sunt, quæ sequuntur: Acid. sulphuric. dilut. Aq. laurocerasi. Extract Belladonnae. Extr. Hyoscyami. Extr. et Tinct. Nucis vomicae. Extr. opii aquosi. Hydro muriam corros. Kali carbonicum,

Tamar. etibatus. Zinc. sulphuricam. Infusionis locus deligebatur vena mediana.

§. 22.

Acidum sulphuric. dilut.

Hujus; in: quatuor epilepticis, gumi: + v aquæ; unctu: una temperatae; venæ injicieban- tur. Inter infundendum acres urentesque oboriente- bantur brachii dolores; infusione vixdum finita, nausea, dimidia aut duabus horis post, febris, pulsus parvi, frequentesque, nausea, capitis do- lores, siti concomitatum stadium frigoris; quo in calorem verso, pulsus pleni, faciei rubor, accede- dente aurium susurrus. Augescebant et capitis do- lores, et sitiæ et nausea, aliquibz horis post totius corporis manante sudore. Inter febriæ impetus de atroculis pectoris doloribus, reponens die con- tinuans ibz, conquesti sunt aegrit. Quæ ipso die, in tribus aegrotantium, præterea accedebant ip- ritata pulsatio, languor, capitis dolores, nau- que. In quarto istorum miserorum febrilis pa- roxysmus ex omni parte utique repetitus. In in- fusionis loco inflammatio erysipelati simili exorie- batur, quæ, sicut brachii dolores, complures dies cessabat, utrisque fomentorum non omnino

sublatia. In ipsum morbum nulla infusionis via est animadversa.

## §. 23.

Aqua laurocerasi.

Infusis aquae lanrocerasi guttis  $\frac{1}{2}$  ex aquae fontanae uncia una, duabus mulieribus epilepsia vexatis, altera statim post infusionem factam brevi syncope correpta, cerebroque vomitu vexata, in altera leves spasmi oborietabantur, ambabus deinde de artuum tensione, capitis doloribus, levique horrore conquerentibus, vehementi duarum horarum frigore subsecuto; pulsus utriusque ut frequentes erant, ita et spastici. Vehementi calore sex fere horarum deinde insecuto, accelerata plenaque percipiebatur pulsatio. Sudore profuso madentium calor cessavit. Insequentibus diebus de nausea languorisque sensu conquerebatur utramque miserorum. Inde a tertio die zedierant ad priorem suam conditionem.

## §. 24.

Extractum Belladonnae.

In feminis stricibus spasmis laborante, extracti Belladonnae gemitus ex aquae uncia una injiciendi commendabilius visus est usus. Infusione

vix ac ne vix quidem peracta; leves oborti sunt spasmi, haud diu vigentes. Dilatata conspiciebatur pupilla, vehementer corporis frigus exortum, jam in calorem, deinde in profusum sudorem conversum. Vesperi (infusione antemeridiana tempore facta) febris immunis erat aegra, sequente die satis bene valens, et matutino tempore conspicua adhuc erat pupillae dilatatio. Intra dierum undecim intervallum minus vehementes spasmi fuerant, majora erant interyalla. Quo facto, kali carbonico infuso, priorem vehementiam adeptus est morbus.

## §. 25.

Extractum Hyosciami.

Extracti Hyosciami grana uno — quatuor in aquae uncia una solutis quinques utebantur ad infundendum. Et bis quidem in femina, melancholia furibunda tantopere affecta, ut rarissima essent, lucida quaedam intervalla. Prima vice grana uno injecto, post semihoram insigne frigus invaserit aegrotam. Quam cum unam horam agitasset, vertebarit in calorem, artuum tensionis doloresque sensu, ac vehementibus capitis doloribus coniunctum, profuso sudore finitum. Quo facto lan-

guoris vitiumque omnino fractarum sensus remansit. Furore per horas duodecim placato, dum illa quiescebat, ciborum haud ulla erat appetentia. Sequentे die pristinum malum reversum. Post dies XIV Hyosciam gr. jv infusione repetita, hac quidem vice nec febrilis insequebatur motus, nec omnino faustus erat eventus, quum, operatione peracta, ad medium usque noctem aevius, quam antea, fureret aegrota. Reliqui, quibus exi. Hyosc. gr. j injectum est, epilepsia laborabant. Operatione vix peracta, febrilis impetus — frigus, aestus, sudor, — ad somnum pronitas, artuum infirmitas et gravedo invadebant singulos. Duorum paroxysmi epileptici aliquot intermittebant dies. Mirandum, notamque dignum erat exanthema, ipso infusionis factae die, in horum segrorum uno obortum, minutarum pararumque pustularum, clara lympha repletarum speciem tenera, punicea area circumdatum. Area aliquot diebus post evanescente subflavescere cooperat lympha. Hoc quidem exanthema, pustularum sularum congerie, floreni argentei spaciis regens, in diversissimis corporis locis reperiebatur eruptions, ut in capo, in facie, circa os et nasum.

In femore superiori et in osse sacro, Duodecim diebus elapsis crustae generabantur ex fusco subflavae se secernentes post aliquot dies. In alio, alterius genae erysipelas comparebat, sequente die vomitorio adhibito disparens.

### §. 26.

#### Extractum et Tinctura Nucis Vomicae.

Extracti nucis vomicae, in aquae uncia una soluta, gr. jj, et tincturae  $\text{ij}$  ex aqua  $\text{Zj}$ ; infundebantur epilepticis.

Extracti usum, statim post infusionem factam sequebantur congestiones capitis, nauses, impedita respiratio, in aegrorum ictorum uno etiam spasmi cum delirio. Mox deinde frigus continuum, quo vigente nausca, nonnullam et vomitus insequebantur. Frigori succedebant aestus, pulsus parvi, frequentes et spastici, de capitis doloribus, faucium siccitate, languore, gravedinis infirmitatisque sensu in artibus movendis querentibus aegrotis; terminabatur profuso sudore paroxysmus febrilis, quo in stadio maxime laxa solebat esse alvis, creberrime dejecta. Subsequente etiam die continuabant capitis dolores,

faticium siccitas, sitis, fracta ciborum appetentia, cum aliquot alvi dejectionibus. Tincturae nucis vomicae infundendae quater periculum factum. In duobus aegris sequebatur febricula, — frigus, calor et sudor. Tertii aegrotorum vehementer febris erat, frigus continuum, cum vomitu laxaque alvo conjunctum; caloris stadium comites habebat motus convulsivos, angorem, inquietudinem, profuseque subsequentem sudorem. Nocet inquiete peregit aegrotus, sequente die, infusione non repetita, iterata saepe vexatus cum iisdem, quibus pridie ejus diei obnoxius fuerat, symptomatis, nisi quod minus vigerent. Quo facto subflavi coloris speciem cutis induit. Teratio die cutis flavedo insignior erat, exanthemate pustuloso eoque pruriante in labio, in nasi, inferiori parte, osseque sacro exorto, die quinto una cum cutis flavedine evanescere; quo facto in brachii anterioris dextra parte idem exanthema erupit, id quod evanuit post aliquot dies. Hebdomadibus tribus elapsis, infusione in eodem aegro repetita, hac quidem vice nulla oborietur febris, nisi quod de ingrato urenteque sensu queratur per uniuersum corpus disperso. Praeterea

infestabatur palpitationibus, artuum tremore, magno angore, animo demissio, vehementique ad plorandum pronitate. Memorabilis erat, quia quatuor horis post infusionem factam adficietur, aphonia horae quadrantem, et quod excurrat, perdurans. Subsequente die remanserat languoris, turbidi abjectique animi sensus et pallor faciei. Paroxysmi epileptici hoc in aegroto, alias quotidie repetiti, intermittebant prima quidem vice duas, altera tres hebdomadas; tum quidem reduces primo quidem mitiores ac rariores, sensim autem priori vi recuperata. Omnino beneficis ac salutaris erat nucis vomicae, infundendi methodo exhibitae, usus, potissimum in spasmis compescendis. A duobus aegrotis cum discesseris, in quibus nulla conspicua erat mutatio; in reliquis duos sexve dies spasmi intermittebant, praeterea primo reduces vi impetuque prioribus multe erant inferiores.

§. 27.  
Extractum Opii aquosum.  
Extracti opii aquosi gr. j in aquae uncia una solutum decies et septies hominibus spasmis, maxime epilepticis, laborantibus est infusum. Pe-

riculo gr. j infundendi novies facta semper salutarem se exhibuit effectus. Jam inter infundendum, aut infusione vixdum facta, cordis arteriarumque pulsatio magis vigens, velocior erat, insignior turgor vitalis, insignior eadem caloris externa potentis evolutio; jucundus in aegris corporis sensus. Sex octo horis post obdormiebant quieto somno, unde expurgabantur nullo incommodo percepto. In plurimis istorum aegrorum paroxysmi epileptici vi ipsa ut erant mitiores, ita et omnino rariores. In tribus eorum, compluribus alioquin paroxysmis epilepticis per diem vexatis, hi quidem pluribus hebdomadibus utique intermittebant. In muliere, inde a compluribus jam annis pectoris abdominisque spasmis fere quotidie saevissimo impetu reducibus affecta, et quam vitio cuiquam organico obnoxiam esse sane erat, quod medici suspicarentur, ex omnibus ad hunc morbum compescendum unquam adhibitis remediis, nullum tam diu minuebat modestos hujus morbi paroxysmos, quam ejusmodi infusio.

Extracti commemorati largioris portionis infinitae effectus minus erat exceptatus, atque receptio-

vitas varia. Duebus tribusve extracti granis injectis, in aliis aegris subsequebatur dirus angon minans suffocationem, in aliis horripilatio; per complures dies continuus, in alio laxa alvus. Tres, quibus tria grana erant ingesta, infestabant vehementioribus febrilibus motibus. Horror ex frigoris sensu fere dimidia vel integrae horae, transibat in aestum ardenter cum saevis capitis, doloribus, pulsatione frequente ac dura, faciei, rubore, oculi ipsa membrana conjunctiva rubente, auriumque susurru. Obversabantur etiam confusae imagines aegrotorum oculis. Sensim caloris ista vis in sudorem profusum conversus, de languore querentibus aegris, alto gravique, somno denique sopitis. Permanebant per dies complures stupor, turbidus sensus, nervorum systematis alienatio, turbata concoctio; praeterea exanthemate instar pustularum proxime juxta sese positarum, subflava lympha repletarum, crustas deinde formantium, exorto. In aegrotorum uno spasmi post infusionem peractam dirius, quam antea in reliquis, saeviebant; in duobus aliis nulla fere hujusmodi mutatione observata. Et hoc quidem animadvergi idem licebat in singulis,

quibus opii majores doses fuerant infusaæ; a tribus cum discesseris, quotidianis spasmis obnoxiiis, qui aliquot dies horum manebant immunes.

§. 28.

**Hydrargyr. muriatic. corrosiv.**

Hydr. muriat. corros. gr. j semel gr. jjj aquae uncia una temperata ter sunt adhibita in epilepticis. In eo, cui gr. unum erat ingestum, nulla omnino organismi mutatio percipiebatur. In reliquis, quibus gr. jjj erant injecta, statim post operationem frigus est insecurum, cum capitis doloribus nauseaque conjunctum; quae subsequebantur in ipso infusionis loco levis calor brachiique dolores. Horis quinque septemve elapsis cesserat, quaecunque mutatio infundendo advecta, nisi quod brachii dolores continuarent, aliquot diebus post demum evanescentes. In duabus ex aegritate, quibus gr. jjj injecta fuerant, intermittebant paroxysmi epileptici aliquot diebus.

§. 29.

**Kali carbonicum.**

Kali carbonici gr. j, ad summum octo, aquæ jy soluta, hominibus triginta uni, spasmis chloro- nictis, maxime epilepticis, qui laborabant sunt

infusa. Consueta et facta quidem infusione principi solita haec erant phænomena: aut jam inter infundendum, aut infusione peracta, febrilemotus et primo quidem frigus tremendum, pallida facies, collapsa; cutis anserina universi corporis, unguium livor, et pulsus parvi, frequentesque; frigus jam horae quadrantis, jam integrarum horarum duarum, versum in calorem, faciei rubor, aucta cutis temperies, pleni pulsus. Plerumque oboriebantur capitis dolores, nausea, sitis, rarius ipse vomitus. Terminabat utique paroxysmum febrilem sudor universus. Hoc quidem finito subsequebatur languoris sensus. Per noctes, inequentes jucundus aegros recreabat somnus. Paroxysmi epileptici, qui plus una vice per diem plurimos istorum miserorum vexaverant, maximam partem intermittebant pluribus diebus, in duabus istorum adeo quatuor integris septimanis. — Qui deinde cum reverterentur, ut mitiores primi erant, ita et rariores, nec nisi sensim priorem vehementiam adepti. Kali carbonici vis irritans non eadem erat in singulis. In aliis levissima fuerant febrilia phænomena, ut quae nonnunquam in sola quadam artuum tensione cerne-

rentur. In aegrorum istorum uno, epilepsia laborante, simulque maniae periodicae obnoxio, kali carbonici gr. viiiij, aquae uncia una solutorum usum nil sequebatur, nisi levis horripilatio, intra unius horae aliquot minutiora momenta finita, irritatione etiam, pro infusionis repetitae frequen-  
tia, magis magisque iminuta. In aegrorum alio contra, spasmi, adeo inter infundendum, in aliis, et in duobus quidem, febrili frigore vigente spasmi redibant. Memorabile notatunque dignissimum est, in quatuor aegrotis, in quibus feb-  
ilia phaenomena, praevia infusione, vim maxi-  
mam exseruerant, sequentibus diebus tribus ma-  
gis magisque mitescentia, infusione non repetita,  
omnino esse reverse.

#### §. 30.

#### Tartarus stibiatus.

Tart. stibiati gr. i — jv in aquae uncia una solutis, atque hominibus, qui convulsionibus, potissimum spasmis epilepticis, cruciabantur, qua-  
ter et vicies infusis, haec plerumque animadversa sunt phaenomena: Infusione vixdum facta inse-  
quebantur coenesthesia alienata, angor, languo-  
ria diffractarumque virium sensus, succedenti-

bus nausea, vomitu frequente, mox horrore ex percepto frigore, converso deinde in ipsum frigus tremulum, vigens jam horae unius quadrantem, jam integrum horam. Exillis erat pulsatio, spa-  
stica, stricta; facies pallida, lividi unguis. Fri-  
gore sensing in calorem, calore in sudorem verso,  
invalescebat pulsatio, rubescet facies; saevis  
capitis doloribus, oculorum ardore sitique exor-  
tis. Febrili hocce impetu finito, quieto somno  
usi sunt aegri. Incitatio ex Tart. stibiato profecta  
non semper eadem erat. In epilepticis tribus fere  
nulla organismi insignior animadversa est reactio,  
tametsi aegrotorum uni solutionis gr. jv fuissent  
injecta. In aliis nulli comparebant distincti pa-  
roxysmi febriles, ita, ut, frigore non antecedente,  
nausea et aestus exorirentur. Pariter memorabile  
erat, notatunque dignissimum, quod idem multo-  
rum horum aegrotantium paroxysmus, infusione  
non repetita, rediret.

In spasmos infringendos, salutaris omnino  
hujus infusionis vis reperta. Plurimorum sane  
paroxysmi spastici aut intermittebant compluribus  
diebus, aut certe mitescebant, omninoque erant  
rariores. Non nisi paucissimi nulli omnino ob-  
noxii erant mutationi.

## §. 31.

*Zincum sulphuricum.*

Zinci sulphurici dimidio grano, in aquae uncia una soluto, atque epilepticis tribus infuso, exemplo languoris sensus est perceptus. In uno ex aegrotis subsequebantur saevus paroxysmus febrilis, — frigor, aestus, sudor. In alio sola horripilatio; in alio, post aliquot horas, (quamdiu organorum affectio nulla, non distincta quidem, est animadversa) saevior, quam quo ante unquam vexatus fuerat aeger, paroxysmus epilepticus. At nullam tamen vim in morbi decursum exseruerat infusio. Aliorum, et duorum quidem, intermittebat epilepsia per aliquot dies. Tribus illis, et singulis quidem, sustinendi erant aliquot diebus brachii dolore.

.....

**C a p u t V.***Infusionis Indicatio.*

## §. 32.

Fluidis infundendis medendi methodus, in qua tractanda versamur, tam parce tenuiterque est exculta, tam anceps est atque incerta, medicorum experta circa morbos infusionis beneficio

sanatos, cum vulgo communicata publicique iuris facta tantopere a se ipsa abhorrent, ut illius utique admittendae aut adhibendae opportunitas expeditius indicanda ac determinanda in arduis difficillimisque possit numerari. Praeterea cum in organismum proximam vim non exserere non possit, nec raro permultis difficultatibus laboret ipsa infusio; prudentis medici est, ejus periculum neutiquam facere, nisi consuetis methodis aut frustra omnino adhibitis, aut, praesagiendo sese, experientia satis edocto, recte suspicante, consuetorum remediorum nullum fore salutarem usum, neque ullo igitur alio modo exoptatum finem se consecuturum sperare licuerit. His quidem positis, equidem crediderim, ad infestam dolorosamque deglutitionem, cum aliena corpora temere sunt deglutita, atque impedita est glutitio, aut oesophago mechanico modo vomitibus ista sunt ejicienda; aut sensibilitatis systemate affecto, qua quidem re sive sensorii activitate sublata, (sicut in catalepsia, apoplexia, asphyxia etc.) sive deglutitionis organorum spasmis vigentibus (ut in trismo, tetano, hydrophobia) tum quidem, inquam, salutarem fore ac suadendum utique esse infusionis usum existimavérim.

Deinde etiam ubicunque *duodecima* sanguinis fuerit (ut in febre putrida, in vehementioris noctae scorbuto, forte et in periculis ex viperarum morsu oriundis etc.)

Nonne fortassis et in morbis cum tractu interstiorum affecto, ut Scirrho, carcinomate ventriculi conjunctis, commendabilis fuerit infusionis usus, in quibus curandis medicamenta alioquin adhibita aut assumi omnino nequeunt, aut ratione spastico mox vicissim eruotantur?

Denique submonere liceat, medicos in tractandis multis morbis nervosis, iisdemque chronicis, maxime in epilepsia, mentisque turbationibus, ceteris remedii arte nostra praescriptis frustra omnino adhibitis, aut in tantis vitae periculis, ut de salutari medicamentorum consuetudo atque ab arte medica de meliori commendato usu utique desperandum esset, infusionem, tanquam ultimum solumque amplexos esse refugium; qua rite adhibita haud raro faustissimo beatos oblectatores que fuisse eventu. Cujus remedii audacter sane arrepti fidem facit summus Hippocrates \*) idem; ut qui „ad extremos morbos extrema remedia exquisite optima,“ dicere non dubitaret.

Equidem hanc ipsam legem, a tanto viro latam, ad infusionis usum utique adigere medicos, haud existimem, at persuasum tamen habeo, in morbis curandis, supra a me commemoratis, fortassis et in quibusdam aliis, non omnino rejiciendum esse illius usum.

---

\*) Sect. 1, Aphor. VI.